

习题集 儿科学 儿童保健

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 哪项是百白破三联疫苗的接种程序

- A．生后1个月开始，连续3次，每次间隔2周
- B．生后1个月开始，连续3次，每次间隔4周
- C．生后2个月开始，连续3次，每次间隔2周
- D．生后3个月开始，连续3次，每次间隔2周
- E．生后3个月开始，连续3次，每次间隔4周

正确答案：E 您选择的答案：

第2题 接种麻疹疫苗的常见反应为

- A．丸发热
- B．拒乳
- C．轻微腹泻
- D．嗜睡
- E．皮疹

正确答案：A 您选择的答案：

第3题 患有结核病、急性传染病、肾炎、心脏病、湿疹及其它皮肤病者不应接种以下哪种疫苗

- A．麻疹减毒疫苗
- B．乙肝病毒疫苗
- C．百白破混合制剂
- D．卡介苗
- E．脊髓灰质炎三型混合疫苗

正确答案：D 您选择的答案：

第4题 小儿接种麻疹疫苗后出现发烧，T38.5，烦躁，吃奶少，其最可能的原因为

- A．上呼吸道感染
- B．疫苗反应
- C．消化不良
- D．其他感染性疾病的初期
- E．疫苗反应+上呼吸道感染

正确答案：B 您选择的答案：

第5题 初种麻疹减毒活疫苗的时间是

- A 生后2个月
- B 生后4个月
- C 生后8个月
- D 4岁时加强一次
- E 8岁时加强一次

正确答案：C 您选择的答案：

第6题 下列何者为卡介苗的初种年龄

- A 2天~2个月
- B 3天~3个月
- C 4天~4个月
- D 5天~5个月
- E 6天~6个月

正确答案：A 您选择的答案：

第7题 以下哪种疫苗不是我国卫生部规定的儿童计划免疫程序

- A．麻疹疫苗
- B．乙肝疫苗
- C．流感疫苗
- D．卡介苗
- E．百白破混合制剂

正确答案：C 您选择的答案：

第8题 乙肝疫苗的接种，以下哪项是错误的

- A．初次接种应连续接种3次
- B．12岁时加强接种
- C．接种后1年内应复查免疫效果
- D．接种成功后，免疫效果可持续终生
- E．接种后局部反应轻微

正确答案：D 您选择的答案：

第9题 脊髓灰质炎初种的年龄应自什么时候开始

- A 1个月
- B 2个月
- C 3个月
- D 4个月
- E 5个月

正确答案：B 您选择的答案：

第10题 脊髓灰质炎糖丸疫苗的正确服用方法为

- A．热水送服

- B. 母乳送服
- C. 可与食物一起服用
- D. 凉开水送服
- E. 冷饮送服

正确答案：D 您选择的答案：

第11题 卡介苗接种后OT试验阳性的时间为

- A. 1~周
- B. 2~3周
- C. 3~4周
- D. 6~8周
- E. 8~12周

正确答案：D 您选择的答案：

第12题 下列哪一项不是婴儿期的保健重点

- A. 保温
- B. 喂养
- C. 清洁卫生
- D. 消毒隔离
- E. 预防接种

正确答案：A 您选择的答案：

第13题 以下哪项不是卡介苗接种后的疫苗反应

- A. 局部红肿
- B. 局部脓肿
- C. 局部溃疡
- D. 腋下淋巴结肿大
- E. 锁骨上淋巴结肿大

正确答案：E 您选择的答案：

第14题 关于疫苗的接种方式，以下哪项是错误的

- A. 口服
- B. 肌肉注射
- C. 静脉注射
- D. 皮内注射
- E. 皮下注射

正确答案：C 您选择的答案：

第15题 麻疹疫苗的初种年龄为

- A. 4个月
- B. 5个月
- C. 6个月
- D. 7个月
- E. 8个月

正确答案：E 您选择的答案：

第16题 以下哪项不是预防接种的禁忌证

- A. 不伴发热的上呼吸道感染
- B. 免疫功能缺陷
- C. 严重营养不良
- D. 感染性腹泻
- E. 近1个月内使用被动免疫制剂

正确答案：A 您选择的答案：

第17题 按照我国卫生部规定，婴儿必须在1岁内完成的预防接种项目中，应除外以下哪项

- A. 卡介苗
- B. 脊髓灰质炎三型混合疫苗
- C. 百白破混合制剂
- D. 麻疹减毒疫苗和乙肝病毒疫苗
- E. 乙脑疫苗

正确答案：E 您选择的答案：

第18题 下列哪一项不是幼儿期的保健重点

- A. 防止意外创伤
- B. 防止中毒
- C. 防止风湿热
- D. 防止营养缺乏
- E. 防止消化功能紊乱

正确答案：C 您选择的答案：

第19题 百白破的初种年龄应自什么年龄开始

- A. 2个月
- B. 3个月
- C. 4个月
- D. 5个月
- E. 6个月

正确答案：B 您选择的答案：

第20题 关于卡介苗的接种，以下哪项是错误的

- A. 初种一般在生后2~3天之内

- B. 初种只接种一次
 - C. 接种2周左右局部可出现红肿浸润
 - D. 接种局部化脓时应切开引流
 - E. 复种前应做结核菌素试验，阴性者方可接种
- 正确答案：D 您选择的答案：

第21题 新生儿期的保健重点包括以下几个方面，但其中有一项不是必需的

- A. 保温
 - B. 喂养
 - C. 清洁卫生
 - D. 消毒隔离
 - E. 预防传染病
- 正确答案：E 您选择的答案：

第22题 脊髓灰质炎三价混合疫苗的初种年龄为

- A. 1个月、2个月、3个月
 - B. 2个月、3个月、4个月
 - C. 3个月、4个月、5个月
 - D. 4个月、5个月、6个月
 - E. 5个月、6个月、7个月
- 正确答案：B 您选择的答案：

第23题 一小儿接种百白破三联疫苗后出现发烧，T38.5，哭闹，烦躁，正确的处置是

- A. 退热
 - B. 退热和抗生素
 - C. 退热和抗病毒药物
 - D. 镇静
 - E. 不给任何处理
- 正确答案：A 您选择的答案：

第24题 2个月以上小儿首次接种卡介苗以下哪点最重要

- A. 皮内注射
 - B. 接种前应做结核菌素试验
 - C. 接种剂量应减半
 - D. 应注意避免感染
 - E. 接种浓度应减低(1:1000)
- 正确答案：B 您选择的答案：

二、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第25-27题

- A. 严重湿疹
 - B. 腹泻
 - C. 消瘦
 - D. 低热
 - E. 惊厥
1. 针对卡介苗的特殊禁忌证是
 2. 针对百白破混合制剂的特殊禁忌证是
 3. 针对脊髓灰质炎疫苗的特殊禁忌证是
- 正确答案：AEB 您选择的答案：

第28-30题

- A. 1岁
 - B. 2岁
 - C. 3岁
 - D. 4岁
 - E. 7岁
1. 麻疹疫苗的复种年龄
 2. 脊髓灰质炎疫苗的复种年龄
 3. 百白破混合制剂的第一次复种年龄
- 正确答案：EDB 您选择的答案：

第31-33题

- A. 初生至生后2个月
 - B. 生后2~6个月
 - C. 1~3岁
 - D. 3~7岁
 - E. 生后8~10个月
1. 卡介苗初种
 2. 脊髓灰质炎疫苗初种
 3. 麻疹疫苗初种
- 正确答案：ABE 您选择的答案：

第34-36题

- A. 活疫苗
- B. 死疫苗
- C. 类毒素
- D. 外毒素

E. 病原体的部分成分

1. 乙肝疫苗

2. 麻疹疫苗

3. 破伤风疫苗

正确答案：EAC 您选择的答案：

习题集 儿科学 遗传性疾病

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 苯丙酮尿症属于

- A. 染色体畸变
- B. 常染色体显性遗传
- C. 常染色体隐性遗传
- D. X连锁显性遗传
- E. X连锁隐性遗传

正确答案：C 您选择的答案：

第2题 先天愚型的主要特点为

- A. 肥胖，身矮，肝肿大，低血糖
- B. 面容丑陋，耳聋，多发骨畸形
- C. 头发黄，蓝眼睛，惊厥，智力低下
- D. 身矮，智力低下，皮肤粗糙
- E. 特殊面容，智力低下，肤色异常和多发畸形

正确答案：E 您选择的答案：

第3题 先天愚型临床表现，除了

- A. 智力低下
- B. 身材矮小
- C. 韧带松弛
- D. 皮肤粗糙、发干
- E. 通贯手

正确答案：D 您选择的答案：

第4题 苯丙酮尿症临床表现最突出的特点是

- A. 尿有“鼠尿样”气味
- B. 毛发黄褐色
- C. 智力低下
- D. 皮肤白皙
- E. 抽搐发作

正确答案：C 您选择的答案：

第5题 21-三体综合征患儿的确诊需经

- A. 骨骼X线检查
- B. 染色体核型检查
- C. 血清T3、T4检查
- D. 尿三氯化铁试验
- E. 血浆游离氨基酸分析

正确答案：B 您选择的答案：

第6题 经典型苯丙酮尿症，是由于缺乏下列哪种酶引起的苯丙氨酸代谢障碍

- A. L-谷氨酸脱羧酶
- B. 二氢生物喋呤还原酶
- C. 6-丙酮酰四氢喋呤合成酶
- D. 酪氨酸羟化酶
- E. 苯丙氨酸-4-羟化酶

正确答案：E 您选择的答案：

第7题 新生儿期苯丙酮尿症诊断的主要依据是

- A. 生后即有智力低下和生长发育落后
- B. 皮肤白皙，发黄，尿霉臭味
- C. Guthrie细菌抑制试验阳性
- D. 尿三氯化铁试验阳性
- E. 2、4-二硝基苯肼试剂检测尿 α -酮酸

正确答案：C 您选择的答案：

第8题 苯丙酮尿症治疗主要是

- A. 补充苯丙氨酸羟化酶
- B. 补充酪氨酸
- C. 给予低苯丙氨酸饮食
- D. 给予低脂饮食
- E. 补充酪氨酸羟化酶

正确答案：C 您选择的答案：

第9题 苯丙酮尿症属

- A. 染色体畸变
- B. 常染色体显性遗传
- C. 常染色体隐性遗传
- D. X连锁显性遗传
- E. X连锁隐性遗传

正确答案：C 您选择的答案：

第10题 常用的诊断苯丙酮尿症的试验方法，以下哪项不正确

A. Guthrie细菌生长抑制试验
B. 三氯化铁试验
C. 血浆游离氨基酸分析
D. 尿嘌呤分析
E. 苯丙氨酸-4-羟化酶活性测定
正确答案：E 您选择的答案：

第11题 先天愚型染色体检查中，下列哪项核型最常见

A. 47, XX(XY), +21
B. 46, XX(XY), -14, +t(14q; 21q)
C. 45, XX(XY), -14, -21, +t(14q; 21q)
D. 46, XX(XY), -21, +t(21q)
E. 46, XX(XY), -22, +t(21q; 22q)
正确答案：A 您选择的答案：

第12题 苯丙酮尿症的发病是由于哪种物质的代谢障碍

A. 碳水化合物
B. 脂肪酸
C. 氨基酸
D. 碳水化合物与脂肪酸
E. 碳水化合物与氨基酸
正确答案：C 您选择的答案：

第13题 关于21-三体综合征下列哪项不正确

A. 本征不属于常染色体畸变
B. 小儿染色体病中最常见的一种
C. 母亲年龄越大本病的发病率越高
D. 60%的患儿在胎儿早期即夭折流产
E. 活婴中发生率约1/600~800
正确答案：A 您选择的答案：

第14题 未经饮食治疗的苯丙酮尿症患者出现神经系统症状的年龄为

A. 1~2天
B. 1~2周
C. 1~2个月
D. 3~6个月
E. 4~8个月
正确答案：D 您选择的答案：

第15题 先天愚型最具有诊断价值是

A. 骨骼X线检查
B. 染色体检查
C. 血清T3、T4检查
D. 智力低下
E. 特殊面容，通贯手
正确答案：B 您选择的答案：

第16题 苯丙酮尿症神经系统表现主要为

A. 智能发育落后
B. 行为异常
C. 癫痫小发作
D. 肌张力增高
E. 腱反射亢进
正确答案：A 您选择的答案：

第17题 关于苯丙酮尿症的临床表现，以下哪项是错误的

A. 抽搐发作
B. 尿有特殊霉臭味
C. 智力低下
D. 皮肤白皙
E. 毛发呈浓密黑色
正确答案：E 您选择的答案：

第18题 下列哪项可诊断先天愚型

A. 骨骼X线检查
B. 血清T3、T4测定
C. 染色体核型分析
D. 血清蛋白结合碘测定
E. 以上均不是
正确答案：C 您选择的答案：

第19题 苯丙酮尿症的诊断需作下列哪项检查

A. 染色体核型分析
B. 血清T3、T4测定
C. 血浆游离氨基酸分析
D. 骨骼X线检查
E. 尿液粘多糖检测
正确答案：C 您选择的答案：

第20题 苯丙酮尿症的遗传方式是

- A. 常染色体显性遗传
- B. 常染色体隐性遗传
- C. 性连锁隐性遗传
- D. 性连锁显性遗传
- E. 以上都不是

正确答案：B 您选择的答案：

第21题 Down综合征的临床表现应除外下列哪项

- A. 智力低下
- B. 体格发育正常
- C. 特殊面容
- D. 喂养困难
- E. 抵抗力低下

正确答案：B 您选择的答案：

第22题 先天愚型患儿临床特点应除外

- A. 特殊面容
- B. 皮纹特殊
- C. 喂养困难
- D. 免疫功能正常
- E. 易伴发先天性心脏病

正确答案：D 您选择的答案：

第23题 典型的苯丙酮尿症是因肝脏缺乏

- A. 酪氨酸羟化酶
- B. 谷氨酸羟化酶
- C. 苯丙氨酸羟化酶
- D. 二氢生物蝶呤还原酶
- E. 羟苯丙酮酸氧化酶

正确答案：C 您选择的答案：

第24题 苯丙酮尿症患儿初现症状通常在

- A. 生后1~3个月
- B. 生后3~6个月
- C. 生后6~9个月
- D. 生后9~12个月
- E. 生后1~3岁

正确答案：B 您选择的答案：

第25题 典型的苯丙酮尿症是因肝脏缺乏

- A. 苯丙氨酸羟化酶
- B. 酪氨酸羟化酶
- C. 谷氨酸羟化酶
- D. 二氢生物蝶呤合成酶
- E. 羟苯丙酮酸氧化酶

正确答案：A 您选择的答案：

第26题 苯丙酮尿症神经系统早期表现主要为

- A. 神经行为异常
- B. 癫痫小发作
- C. 智力发育落后
- D. 肌张力增高
- E. 腱反射亢进

正确答案：A 您选择的答案：

第27题 先天愚型属

- A. 常染色体畸变
- B. 常染色体显性遗传
- C. 常染色体隐性遗传
- D. X连锁显性遗传
- E. X连锁隐性遗传

正确答案：A 您选择的答案：

第28题 患儿1岁，生后4月发现智力发育落后，尿有鼠尿臭味，毛发及皮肤颜色浅，7月开始出现癫痫小发作，实验室检查确诊为典型的PKU，给予低苯丙氨酸饮食，每天允许苯丙氨酸的摄入量为

- A. 5~10mg/kg
- B. 10~20mg/kg
- C. 20~30mg/kg
- D. 30~50mg/kg
- E. 50~70mg/kg

正确答案：D 您选择的答案：

第29题 苯丙酮尿症患儿通常在什么时候出现临床症状

- A. 出生时
- B. 生后1~3月
- C. 生后3~6月
- D. 生后6~9月
- E. 生后9~12月

正确答案：C 您选择的答案：

第30题 有关苯丙酮尿症的治疗，下列哪项不正确

- A. 尽早开始饮食治疗
- B. 低苯丙氨酸饮食
- C. 严格的饮食治疗适用于血浆苯丙氨酸水平持续高于 1.22mmol/L (20mg/dl) 的患者
- D. 血浆苯丙氨酸水平低于 1.22mmol/L (20mg/dl) 的轻型病例无需饮食治疗
- E. 注意补充各种维生素、矿物质及微量元素

正确答案：D 您选择的答案：

第31题 先天愚型染色体核型绝大部分为

- A. 嵌合型21-三体
- B. G/D易位型21-三体
- C. G/G易位型21-三体
- D. 标准型21-三体
- E. 12-三体

正确答案：D 您选择的答案：

第32题 先天愚型患儿的皮肤纹理特征之一是

- A. 通贯手
- B. atd角正常
- C. 第3、4指桡箕增多
- D. 脚拇指球胫侧弓形纹五指褶纹
- E. 第5指有两条指褶纹

正确答案：A 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第33题 患儿6岁，精神运动发育明显落后，只会说简单话，两眼外侧上斜，两眼距宽，鼻梁低平，经染色体核型分析，诊断为易位型21-三体综合征，其母正常，其父为D/C易位，家长准备要第二胎来遗传咨询，应告诉再发风险率为

- A. 1%
- B. 4%
- C. 10%
- D. 20%
- E. 100%

正确答案：B 您选择的答案：

第34题 一女孩，3岁，为21-三体综合征的易位型。其下列染色体核型中哪种最常见

- A. $46\text{XX}, -22, +t(21q; 22q)$
- B. $46\text{XX}, -21, +t(21q; 22q)$
- C. $46\text{XY}, -21, +t(21q; 22q)$
- D. $46\text{XX}, -14, +t(14q; 21q)$
- E. $46\text{XY}, -14, +t(14q; 21q)$

正确答案：D 您选择的答案：

第35题 患儿8月，智力发育较同龄儿差，时有抽搐和肌痉挛，毛发、皮肤和虹膜色泽较浅，进食后常呕吐，常出湿疹，尿有鼠尿臭味，该患儿最有可能的诊断是

- A. 先天愚型
- B. 呆小病
- C. 苯丙酮尿症
- D. 癫痫
- E. 佝偻病

正确答案：C 您选择的答案：

第36题 1岁半小儿，至今不会独立行走，智力低下。体检：两眼距增宽，两眼外侧上斜，鼻梁低平，眼裂小，鼻翼不宽，舌伸出口外，小指向内弯曲，通贯手。最可能的诊断是

- A. 呆小症
- B. 先天愚型
- C. 苯丙酮尿症
- D. 佝偻病活动期
- E. 软骨发育不良

正确答案：B 您选择的答案：

第37题 患儿2岁，生后半年发现尿有霉臭味，且经常呕吐，1岁时发现智力较同龄儿落后，目光呆滞，皮肤白皙，毛发浅黄，下列哪项对该患儿诊断最有帮助

- A. 头颅CT
- B. 脑电图
- C. 染色体核型分析
- D. 尿三氯化铁试验
- E. 血液T3、T4测定

正确答案：D 您选择的答案：

第38题 患儿2岁，生后半年发现智力落后，尿有霉臭味，8个月开始出现癫痫小发作，诊断为典型苯丙酮尿症，给予低苯丙氨酸饮食，每日允许摄入量应为

- A. $5 \sim 10\text{mg/kg}$
- B. $10 \sim 30\text{mg/kg}$
- C. $30 \sim 50\text{mg/kg}$
- D. $50 \sim 70\text{mg/kg}$
- E. $70 \sim 90\text{mg/kg}$

正确答案：C 您选择的答案：

第39题 患儿，男性，3岁，生后半年发现智能发育落后，反复惊厥，且尿有鼠尿臭味，体检：目光呆滞，毛发棕黄，心肺正常，四肢肌张力高，膝腱反射亢进，尿三氯化铁试验阳性，该患儿可能诊断为

- A 苯丙酮尿症
- B 半乳糖血症
- C 高乳酸血症
- D 组氨酸血症
- E 肝糖原累积症

正确答案：A 您选择的答案：

第40题 5岁患儿因体格和智力发育落后来诊，体检身材矮小，眼距宽，舌常伸出口外，鼻梁低，外耳小，头围小于正常，骨龄落后于年龄，通贯手，听诊心脏有杂音，患儿最需作下列哪项检查

- A 染色体核型分析
- B 血清T3、T4检测
- C 智力测定
- D 超声心动图检查
- E 头颅CT

正确答案：A 您选择的答案：

第41题 患儿3岁，智能发育较同龄儿明显落后，体检：发育较小，两眼距宽，鼻梁低平，双眼外侧上斜，外耳小，舌常伸出口外，临床上拟诊先天愚型，下列哪项最具有确诊意义

- A 智能低下
- B 特殊面容
- C 血清TSH、T4检查
- D 染色体核型分析
- E 血浆游离氨基酸分析

正确答案：D 您选择的答案：

第42题 患儿2岁，因体格智力发育落后来诊，体检：表情呆滞，两眼距宽，两眼外侧上斜，鼻梁低平，舌常伸出口外，通贯手，该患诊断考虑为

- A 苯丙酮尿症
- B 21-三体综合征
- C 18-三体综合征
- D 呆小病
- E 粘多糖病

正确答案：B 您选择的答案：

第43题 1岁患儿，平素易患肺炎，喂养困难，身材较同龄儿矮小，智力发育落后，体检两眼眼距宽，外眦上斜，鼻梁低平，舌常伸出口外，下列哪项诊断可能性最大

- A 21-三体综合征
- B 先天性甲状腺功能低下
- C 苯丙酮尿症
- D 18-三体综合征
- E 13-三体综合征

正确答案：A 您选择的答案：

第44题 男，1岁，因生长发育落后就诊。不认识父母，不能独坐，表情呆滞。生后6个月起反复抽搐发作，毛发黄褐色，尿有鼠尿臭味。最可能的诊断是

- A 小儿癫痫
- B 婴儿痉挛症
- C 甲状腺功能减低
- D 脑瘫
- E 苯丙酮尿症

正确答案：E 您选择的答案：

三、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第45-46题

患儿，1岁。生后半年经常呕吐，且逐渐发现智能及体格发育均低于同龄儿，尿有霉臭味，近一个月经常抽搐发作，体检：表情呆滞，毛发棕黄，面部见湿疹，皮肤白皙，尿三氯化铁试验阳性

1. 最可能的诊断为

- A 21-三体综合征
- B 苯丙酮尿症
- C 呆小病
- D 癫痫
- E 佝偻病性手足抽搐症

2. 应采取的措施是

- A 观察，抽搐时给予止抽搐药物
- B 口服甲状腺素片
- C 静推10%葡萄糖酸钙，同时口服维生素D
- D 限制苯丙氨酸摄入量
- E 口服碘化钾

正确答案：BD 您选择的答案：

第47-49题

患儿2岁，智力低下，体格发育迟缓，眼距宽，鼻梁低平，眼裂小，有内眦赘皮，外耳小，舌常伸出口外，头围小于正常，出牙延迟，四肢短，关节可过度弯曲，atd角增大。

1. 最可能的诊断为
 - A. 21-三体综合征
 - B. 高苯丙氨酸血症
 - C. 先天性甲状腺功能低下
 - D. 苯丙酮尿症
 - E. 半乳糖血症
 2. 下列哪项检查对明确诊断最有意义
 - A. 尿三氯化铁试验
 - B. 染色体检查
 - C. 血清甲状腺素检测
 - D. 尿蝶呤分析
 - E. 酶学检测
 3. 该病可有下列情况，除外
 - A. 约50%的患儿伴有先天性心脏病
 - B. 免疫功能正常
 - C. 白血病的发生率较正常儿增高
 - D. 性发育延迟
 - E. 先天性甲状腺功能减低症发生率增高
- 正确答案：ABB 您选择的答案：

第50-51题

患儿9月，生后6月起进食后经常呕吐、皮肤湿疹，智力及体格发育渐落后于同龄儿，喜睡，有癫痫小发作，尿有鼠尿臭味，毛发及虹膜颜色浅，皮肤白，尿三氯化铁试验阳性

1. 最可能的诊断为
 - A. 苯丙酮尿症
 - B. 呆小病
 - C. 癫痫
 - D. 先天愚型
 - E. 组氨酸血症
 2. 本病的治疗措施不包括
 - A. 治疗开始越早，效果越好
 - B. 予低苯丙氨酸奶粉喂养
 - C. 每日仍应保证30~50mg/kg的苯丙氨酸摄入
 - D. 饮食控制至少需持续至青春期
 - E. 添加辅食以蛋白质类食物为主
- 正确答案：AE 您选择的答案：

第52-53题

患儿男性，2岁。因体格、智力发育迟缓就诊。体检：身长66cm，表情呆滞，眼距宽，鼻梁低平，双眼外侧角上斜，口半张，舌伸出口外，通贯手，四肢肌张力低下。

1. 最可能的诊断是
 - A. 呆小病
 - B. 21-三体综合征
 - C. 苯丙酮尿症
 - D. 半乳糖血症
 - E. 粘多糖症
 2. 下列哪项检查与患儿疾病无关
 - A. 染色体核型分析
 - B. 红细胞中SOD-1活性测定
 - C. 淋巴母细胞转化试验
 - D. 血清免疫球蛋白测定
 - E. CH释放试验
- 正确答案：BE 您选择的答案：

第54-56题

6个月婴儿，女，发现表情呆滞2个月，易激惹，时有痉挛发作，每日约2~3次。体检：反应差，精神呆滞，头发黄褐色，皮肤白，尿有霉臭味，脑电图示较多棘慢波。

1. 该患儿最可能的诊断是
 - A. 小运动型发作
 - B. 先天愚型
 - C. 婴儿痉挛症
 - D. 苯丙酮尿症
 - E. 粘多糖病
 2. 其发病机制是因为肝内缺乏
 - A. 酪氨酸酶
 - B. 苯丙氨酸羟化酶
 - C. 羧基丙酮酸羧化酶
 - D. 尿黑酸酶
 - E. 谷氨酸脱氢酶
 3. 其遗传方式为
 - A. 常染色体显性遗传
 - B. 常染色体隐性遗传
 - C. X连锁显性遗传
 - D. X连锁隐性遗传
 - E. X连锁不完全显性遗传
- 正确答案：DBB 您选择的答案：

第57-58题

患儿，4岁。智能运动发育落后，两眼内侧距离宽，鼻梁低平，双眼外侧上斜，经常伸舌，通贯手

1. 其最可能的诊断为

- A 先天性甲状腺功能低下
 - B 21-三体综合征
 - C 苯丙酮尿症
 - D 18-三体综合征
 - E 粘多糖病
2. 为确定诊断需做下述哪项检查
- A 血清TSH、T₃、T₄测定
 - B 尿三氯化铁试验
 - C 染色体核型分析
 - D 骨龄测定
 - E 尿喋呤分析

正确答案：BC 您选择的答案：

四、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第59-61题

- A. 智力低下，特殊外貌，关节过伸，通贯手
 - B. 智力低下，特殊外貌，四肢粗短，躯干较长
 - C. 智力低下，特殊外貌，听力障碍，肝脾肿大
 - D. 智力低下，表情呆滞，反复抽搐，尿发霉臭味
 - E. 智力低下，表情呆滞，面色蜡黄，舌头震颤
1. 先天性甲状腺功能减低症
 2. 苯丙酮尿症
 3. 先天愚型

正确答案：BDA 您选择的答案：

第62-64题

- A. 血浆苯丙氨酸浓度
 - B. 苯丙氨酸耐量试验
 - C. 四氢生物喋呤负荷
 - D. 尿三氯化铁试验
 - E. Guthrie细菌抑制试验
- 下列各例可疑苯丙酮尿症患儿确诊应选择的检查是
1. 新生儿8期正常，生后1~3个月出现呕吐、喂养困难
 2. 新生儿期正常，生后3个月出现吞咽困难，肌张力增强及惊厥
 3. 母亲已分娩1例苯丙酮尿症患儿，现为第二胎第二产，目前已生后4周，尚无症状出现

正确答案：ADE 您选择的答案：

第65-66题

- A 21-三体综合征
 - B 18-三体综合征
 - C 先天性甲状腺功能减低症
 - D 苯丙酮尿症
 - E 粘多糖病
1. 患儿1岁，表情呆滞，眼距宽，眼裂小，鼻梁低平，双眼外侧上斜，通贯手
 2. 患儿1岁，表情呆滞，眼距宽，舌常伸出口外，鼻梁宽平，毛发稀少，面部粘液性水肿，皮肤粗糙，躯干长，四肢短

正确答案：AC 您选择的答案：

习题集 儿科学 循环系统疾病

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 易发生脑血栓的先天性心脏病是

- A．房间隔缺损
- B．室间隔缺损
- C．动脉导管未闭
- D．法洛四联症
- E．肺动脉狭窄

正确答案：D 您选择的答案：

第2题 关于房间隔缺损的胸部X线征象，以下哪项除外

- A．心脏外形轻中度扩大
- B．肺动脉段凹陷
- C．肺门舞蹈征
- D．主动脉影缩小
- E．右房、右室大

正确答案：B 您选择的答案：

第3题 室间隔缺损患儿有时出现声音嘶哑，其原因是

- A 扩张的右心房压迫喉返神经
- B 扩张的左心房压迫喉返神经
- C 扩张的主动脉压迫喉返神经
- D 扩张的肺动脉压迫喉返神经
- E 扩张的左、右心房压迫喉返神经

正确答案：D 您选择的答案：

第4题 心导管检查右心室血氧含量高于右心房的先心病是

- A 房间隔缺损
- B 室间隔缺损
- C 动脉导管未闭
- D 法洛四联症
- E 肺动脉狭窄

正确答案：B 您选择的答案：

第5题 房间隔缺损的杂音形成的原因为

- A．血流于分流处形成涡流
- B．血流冲击右心房
- C．右房室瓣相对狭窄
- D．右心室流出道相对狭窄
- E．肺动脉相对狭窄

正确答案：D 您选择的答案：

第6题 艾森曼格综合征是指

- A．肺动脉高压明显，出现左向右分流
- B．肺动脉高压明显，出现右向左分流
- C．肺动脉狭窄明显，出现左向右分流
- D．肺动脉狭窄明显，出现右向左分流
- E．出现双向分流

正确答案：B 您选择的答案：

第7题 法洛四联症其青紫的轻重和出现的早晚取决于

- A 肺动脉狭窄的程度
- B 室间隔缺损的大小
- C 主动脉骑跨的程度
- D 有无右心室明显增大
- E 以上全是

正确答案：A 您选择的答案：

第8题 室间隔缺损可引起心脏下列各部位负荷增加但除了

- A 右心房
- B 右心室
- C 左心房
- D 左心室
- E 肺循环

正确答案：A 您选择的答案：

第9题 关于室间隔缺损的心脏听诊，以下哪项是错误的

- A．胸骨左缘3、4肋间闻及3/6~4/6级粗糙的全收缩期杂音
- B．干下型合并主动脉瓣关闭不全时，于主动脉瓣第二听诊区闻及高音调舒张期杂音
- C．当出现右向左分流时，心脏杂音减轻
- D．P2减弱
- E．P2>A2

正确答案：D 您选择的答案：

第10题 小儿心脏发育的特点是

- A．7岁时心腔容积已达成人水平

B. 新生儿和小于2岁的幼儿心脏呈斜位
C. 左、右心室的生长不平衡
D. 10岁以前主动脉的直径较肺动脉宽
E. 心率相对较慢，是因心搏出量比成人小所致
正确答案：C 您选择的答案：

第11题 在胸骨左缘第2肋间可听到 ~ 级连续性机器样杂音的先天性心脏病是

- A. 室间隔缺损
- B. 房间隔缺损
- C. 动脉导管未闭
- D. 法洛三联症
- E. 肺动脉狭窄

正确答案：C 您选择的答案：

第12题 在胸骨左缘第2~4肋间可听到 ~ 级喷射性收缩期杂音的先天性心脏病是

- A. 室间隔缺损
- B. 房间隔缺损
- C. 动脉导管未闭
- D. 法洛三联症
- E. 肺动脉狭窄

正确答案：D 您选择的答案：

第13题 下列有关脐静脉血的说法，正确的是

- A. 由胎盘来的动脉血(纯氧合血)
- B. 由胎盘来的静脉血
- C. 由肺来的动脉血(纯氧合血)
- D. 由肺来的静脉血
- E. 是动、静脉混合血

正确答案：A 您选择的答案：

第14题 常见先心病治疗原则以下哪项不正确

- A. 按时预防接种
- B. 积极防治感染
- C. 手术最适年龄多在学龄前
- D. 左向右分流型大多能根治，效果较好
- E. 合并心衰时慎用洋地黄，不能长时间用

正确答案：E 您选择的答案：

第15题 诊断室间隔缺损，下述哪一项不符合

- A. 胸骨左缘3、4肋间粗糙收缩期杂音
- B. 肺动脉第二音亢进
- C. 心电图电轴右偏，不完全性右束支阻滞
- D. X线: 肺门血管增粗，肺野充血
- E. 反复患呼吸道感染

正确答案：C 您选择的答案：

第16题 以下哪项不是法洛三联症的胸部X线特征

- A. 心尖圆钝上翘
- B. 肺动脉段凹陷
- C. 肺纹理减少
- D. 肺透光度减低
- E. 肺门血管影缩小

正确答案：D 您选择的答案：

第17题 脉压增宽，伴毛细血管搏动，提示

- A. 室间隔缺损
- B. 房间隔缺损
- C. 动脉导管未闭
- D. 法洛三联症
- E. 肺动脉狭窄

正确答案：C 您选择的答案：

第18题 室间隔缺损的血流动力学改变，首先引起

- A. 左心室增大
- B. 右心室增大
- C. 左心房扩大
- D. 主动脉扩张
- E. 肺动脉扩张

正确答案：A 您选择的答案：

第19题 以下哪项不是法洛三联症的常见并发症

- A. 心力衰竭
- B. 脑血栓
- C. 脑脓肿
- D. 缺氧发作
- E. 感染性心内膜炎

正确答案：A 您选择的答案：

第20题 差异性紫绀见于哪种先天性心脏病

- A. 房间隔缺损

- B. 室间隔缺损
- C. 动脉导管未闭
- D. 法洛三联症
- E. 肺动脉狭窄

正确答案：C 您选择的答案：

第21题 差异性青紫可发生于下述哪种情况下

- A. 肺动脉狭窄
- B. 法洛三联症
- C. 房缺合并肺动脉高压
- D. 室缺合并肺动脉高压
- E. 动脉导管未闭合并肺动脉高压

正确答案：E 您选择的答案：

第22题 关于室间隔缺损胸部X线征象，以下哪项是错误的

- A. 左室增大
- B. 肺血管影增粗
- C. 肺动脉段突出
- D. 心尖圆钝上翘
- E. 主动脉弓影较小

正确答案：D 您选择的答案：

第23题 以下是左向右分流型先心病的共同临床特点，但应除外

- A. 易患肺炎
- B. 生长发育落后
- C. 哭闹后出现青紫
- D. 差异性青紫
- E. 肺血增多

正确答案：D 您选择的答案：

第24题 婴儿期持续性青紫，提示

- A. 房间隔缺损
- B. 室间隔缺损
- C. 动脉导管未闭
- D. 法洛三联症
- E. 肺动脉狭窄

正确答案：D 您选择的答案：

第25题 在胸骨左缘第3、4肋间可听到 ~ 级粗糙全收缩期杂音的先天性心脏病是

- A. 室间隔缺损
- B. 房间隔缺损
- C. 动脉导管未闭
- D. 法洛三联症
- E. 肺动脉狭窄

正确答案：A 您选择的答案：

第26题 右心导管检查发现肺动脉血氧含量较右心室高，提示

- A. 右向左分流
- B. 肺动脉高压
- C. 肺动脉狭窄
- D. 房间隔缺损
- E. 以上都不是

正确答案：E 您选择的答案：

第27题 关于房间隔缺损的临床表现，以下哪项是不常见的

- A. 体格发育较瘦小
- B. 乏力
- C. 多汗
- D. 活动后气促
- E. 咯血

正确答案：E 您选择的答案：

第28题 房间隔缺损患儿于胸骨左缘2、3肋间可闻及收缩期杂音产生的机理是

- A. 血流通过缺损口
- B. 主动脉瓣相对狭窄
- C. 肺动脉瓣相对狭窄
- D. 三尖瓣相对狭窄
- E. 二尖瓣相对狭窄

正确答案：C 您选择的答案：

第29题 以下哪项不是法洛三联症的心电图表现

- A. 电轴右偏
- B. 右心室肥大
- C. 心肌劳损
- D. 右心房肥大
- E. 左心室肥大

正确答案：E 您选择的答案：

第30题 心导管检查发现肺动脉血氧含量较右心室高，提示

- A. 右向左分流

- B. 肺动脉高压
- C. 肺动脉狭窄
- D. 房间隔缺损
- E. 以上都不是

正确答案：E 您选择的答案：

第31题 下列哪一种类型的室间隔缺损没有自然闭合的可能

- A. 干下型
- B. 室上嵴型
- C. 三尖瓣后
- D. 肌部
- E. 膜部

正确答案：A 您选择的答案：

第32题 胎儿血液循环出生后的改变，下列哪项是不正确的

- A. 肺小动脉肌层退化
- B. 肺循环压力增高
- C. 卵圆孔未闭
- D. 体循环压力增高
- E. 动脉导管闭塞

正确答案：B 您选择的答案：

第33题 导致先天性心脏病的病因不包括

- A. 染色体畸变
- B. 宫内感染
- C. 孕妇与大剂量放射线接触
- D. 孕妇服用抗癌药物
- E. 新生儿窒息

正确答案：E 您选择的答案：

第34题 小儿动脉收缩压应用下列哪项公式计算

- A. $(\text{年龄} \times 2) + 85$
- B. $(\text{年龄} \times 2) + 80$
- C. $(\text{年龄} \times 5) + 85$
- D. $(\text{年龄} \times 2) + 75$
- E. 以上都不是

正确答案：B 您选择的答案：

第35题 动脉导管未闭，不应出现下述哪项体征

- A. 脉压增宽
- B. 胸骨左缘第2肋间连续性杂音
- C. 三尖瓣区舒张期杂音
- D. 二尖瓣区舒张期杂音
- E. 股动脉枪击音

正确答案：C 您选择的答案：

第36题 80%的小儿动脉导管解剖上关闭的时间是

- A. 生后3天
- B. 生后30天
- C. 生后3个月
- D. 生后6个月
- E. 生后30个月

正确答案：C 您选择的答案：

第37题 请指出以下哪项不符合单纯房间隔缺损右心导管检查的特点

- A. 右心室血氧含量高于左心房血氧含量
- B. 右心房血氧含量高于上、下腔静脉平均血氧含量
- C. 导管可由右心房进入左心房
- D. 右心房、室压力多正常
- E. 肺动脉压力多属正常或轻度增高

正确答案：A 您选择的答案：

第38题 对法洛三联症为何出现蹲踞现象，下述哪项解释是错误的

- A. 下肢血管扭曲
- B. 静脉回流减少，心脏负担减轻

- C. 右向左分流增加
- D. 体循环阻力增加
- E. 缓解缺氧症状

正确答案：C 您选择的答案：

第39题 法洛三联症患儿吃奶或哭闹时突然出现晕厥、抽搐，最可能的原因是

- A. 脑血栓
- B. 脑脓肿
- C. 肺静脉压突然升高
- D. 肺动脉漏斗部狭窄痉挛
- E. 左心负荷过重

正确答案：D 您选择的答案：

第40题 低位室间隔缺损位于

- A 室间隔肌部
- B 室间隔膜部、室上嵴上方
- C 室上嵴下方
- D 肺动脉瓣下
- E 主动脉瓣下

正确答案：A 您选择的答案：

第41题 关于房间隔缺损的杂音特点，以下哪项除外

- A．位于胸骨左缘2～3肋间
- B．杂音响度为2/6～3/6级
- C．杂音为收缩期
- D．杂音为喷射性
- E．杂音粗糙伴震颤

正确答案：E 您选择的答案：

第42题 心导管检查，平均血氧含量右房高于上下腔静脉的先心病是

- A 房间隔缺损
- B 室间隔缺损
- C 动脉导管未闭
- D 肺动脉狭窄
- E 法洛四联症

正确答案：A 您选择的答案：

第43题 室间隔缺损伴明显肺动脉高压时可有以下临床表现，但应除外

- A．右心室显著增大
- B．原有心脏杂音明显增强
- C．P2亢进
- D．肺动脉段明显突出
- E．右心室压力明显升高

正确答案：B 您选择的答案：

第44题 有关正常胎儿血循环的描述，错误的是

- A．肺动脉的血液大部分进入降主动脉，仅少量流入肺
- B．胎儿血液经过脐静脉回流至胎盘以获取营养和氧气
- C．供应心、脑、肝及上肢血氧量较下半身的高
- D．胎儿时期存在房间隔相通
- E．胎儿时期存在动脉导管未闭

正确答案：B 您选择的答案：

第45题 法洛四联症的4种心脏畸形中，对患儿的病理生理和临床表现影响最大的是

- A．肺动脉狭窄
- B．室间隔缺损
- C．主动脉骑跨
- D．右心室肥厚
- E．以上均不是

正确答案：A 您选择的答案：

第46题 第二孔未闭型房间隔缺损血液动力学改变，不应出现的是

- A 左房、左室增大
- B 右房、右室增大
- C 肺循环血流量增多
- D 体循环血流量减少
- E 以上均不是

正确答案：A 您选择的答案：

第47题 法洛四联症常见的并发症有

- A．支气管炎
- B．支气管肺炎
- C．肺水肿
- D．充血性心力衰竭
- E．脑脓肿

正确答案：E 您选择的答案：

第48题 关于出生后血循环的改变，以下哪项不正确

- A．肺循环的阻力下降
- B．左心房压力增高，体循环压力升高
- C．卵圆孔功能上关闭
- D．动脉导管功能上关闭
- E．脐血管血流停止，立即形成韧带

正确答案：E 您选择的答案：

第49题 何组年龄范围内响亮的心脏杂音对诊断先心病最有价值

- A 6岁以上
- B 5～6岁
- C 4～5岁
- D 3岁以后
- E 3岁以前

正确答案：E 您选择的答案：

第50题 被称为“无创性心血管造影”的心脏检查方法是

A. M型超声心动图
B. 二维超声心动图
C. 三维超声心动图
D. 多普勒彩色血流显像
E. 经导管选择性心血管造影
正确答案：D 您选择的答案：

第51题 心电图示左室肥厚，提示

A. 房间隔缺损
B. 室间隔缺损
C. 法洛四联症
D. 肺动脉狭窄
E. 艾森曼格综合征
正确答案：B 您选择的答案：

第52题 室间隔缺损，动脉血氧饱和度降低，提示

A. 室间隔缺损自然闭合
B. 干下型室间隔缺损合并主动脉关闭不全
C. 大型室间隔缺损
D. 室间隔多发缺损
E. 艾森曼格综合征
正确答案：E 您选择的答案：

第53题 小儿心脏听诊可闻及生理性杂音，其特点如下，但其中一点例外

A. 位于心尖区或肺动脉瓣区
B. 可伴轻度震颤
C. 卧位比坐位清楚
D. 性质柔和，一般为 Ⅱ级
E. 杂音局限不传导
正确答案：B 您选择的答案：

第54题 法洛四联症的蹲踞症状是为了

A. 减少组织耗氧量
B. 减轻漏斗部肌肉痉挛
C. 减轻心脏负荷
D. 使体循环阻力增加
E. 减少下肢静脉回流量
正确答案：D 您选择的答案：

第55题 婴儿出现以下症状可考虑先天性心脏病，但应除外

A. 喂养困难
B. 易患肺炎
C. 持续性青紫
D. 哭声嘶哑
E. 嗜睡
正确答案：E 您选择的答案：

第56题 请指出以下哪项不是室间隔缺损的常见并发症

A. 支气管肺炎
B. 充血性心力衰竭
C. 脑脓肿
D. 肺水肿
E. 亚急性感染性心内膜炎
正确答案：C 您选择的答案：

第57题 动脉导管未闭时，血液的分流方向是下述哪项

A. 肺动脉 主动脉
B. 主动脉 肺动脉
C. 左室 右室
D. 右房 左房
E. 左房 右房
正确答案：B 您选择的答案：

第58题 室间隔缺损患儿出现声音嘶哑的原因是

A. 扩张的左心房压迫喉返神经
B. 扩张的右心房压迫喉返神经
C. 扩张的主动脉压迫喉返神经
D. 扩张的肺动脉压迫喉返神经
E. 扩张的左右心房压迫喉返神经
正确答案：D 您选择的答案：

第59题 以下哪项不是法洛四联症的心脏畸形

A. 肺动脉狭窄
B. 室间隔缺损
C. 主动脉狭窄
D. 主动脉骑跨
E. 右心室肥厚
正确答案：C 您选择的答案：

第60题 法洛四联症的几种畸形中最重要的是

- A. 肺动脉狭窄
- B. 室间隔缺损
- C. 房间隔缺损
- D. 主动脉骑跨
- E. 右心室肥大

正确答案：A 您选择的答案：

第61题 房间隔缺损最常见的类型为

- A. 卵圆孔未闭
- B. 原发孔缺损
- C. 继发孔缺损
- D. 原发孔缺损伴二尖瓣裂
- E. 继发孔缺损伴部分肺静脉异位引流

正确答案：C 您选择的答案：

第62题 肺循环血流量增多，而左心室、主动脉及体循环血流量减少的先心病为

- A. 动脉导管未闭
- B. 室间隔缺损
- C. 房间隔缺损
- D. 法洛四联症
- E. 肺动脉狭窄

正确答案：C 您选择的答案：

第63题 下列有关血压的测定哪一项是错误的

- A. 正常情况下，下肢血压高于上肢血压
- B. 收缩压高于按公式测算值20mmHg为高血压
- C. 小儿年龄愈小，血压愈低
- D. 袖带的宽度应为上臂长度的1/4
- E. 一般收缩压低于75~80mmHg为低血压

正确答案：D 您选择的答案：

第64题 关于房间隔缺损的血流动力学改变，以下哪项是错误的

- A. 肺循环血流量增多
- B. 合并肺动脉高压，可出现心房水平的右向左分流
- C. 右心室收缩期负荷过重
- D. 右心室增大
- E. 右心房增大

正确答案：C 您选择的答案：

第65题 心电图示右心室肥大，最不可能的先心病是

- A. 法洛氏四联症
- B. 房间隔缺损
- C. 艾森曼格综合征
- D. R0ger病
- E. 肺动脉狭窄

正确答案：D 您选择的答案：

第66题 导致右心室舒张期负荷过重的先心病是

- A. 室间隔缺损
- B. 房间隔缺损
- C. 动脉导管未闭
- D. 法洛四联症
- E. 肺动脉瓣狭窄

正确答案：B 您选择的答案：

第67题 动脉导管未闭的脉压增宽是由于周围动脉

- A. 收缩压升高
- B. 收缩压降低
- C. 舒张压升高
- D. 舒张压降低
- E. 收缩压升高加舒张压降低

正确答案：D 您选择的答案：

第68题 法洛四联症常见的并发症，下述哪项不正确

- A. 脑缺氧发作
- B. 脑血栓
- C. 脑脓肿
- D. 细菌性心内膜炎
- E. 梗阻型肺动脉高压

正确答案：E 您选择的答案：

第69题 关于动脉导管未闭的常见体征，以下哪项是错误的

- A. 胸骨左缘第2肋间闻及粗糙、响亮的连续性机器样杂音
- B. P2增强
- C. 分流量大者，可在心尖区听到收缩期杂音
- D. 可闻及股动脉枪击音
- E. 可触及水冲脉

正确答案：C 您选择的答案：

第70题 先天性心脏病最重要的无创性诊断方法是

- A. 胸部X线
- B. 心动电流图
- C. 超声心动图
- D. 心导管检查
- E. 放射性核素心血管造影

正确答案：C 您选择的答案：

第71题 右向左分流型先天性心脏病包括

- A. 房间隔缺损
- B. 室间隔缺损
- C. 动脉导管未闭
- D. 法洛四联症
- E. 肺动脉狭窄

正确答案：D 您选择的答案：

第72题 P2 固定分裂、亢进，提示

- A. 房间隔缺损
- B. 室间隔缺损
- C. 动脉导管未闭
- D. 法洛四联症
- E. 肺动脉狭窄

正确答案：A 您选择的答案：

第73题 先天性心脏畸形的形成时期在胚胎的

- A. 第1~3周
- B. 第2~4周
- C. 第2~8周
- D. 第4~8周
- E. 第4~12周

正确答案：C 您选择的答案：

第74题 肺动脉瓣区第二音亢进和固定分裂多见于

- A. 房间隔缺损
- B. 室间隔缺损
- C. 动脉导管未闭
- D. 法洛四联症
- E. 肺动脉瓣狭窄

正确答案：A 您选择的答案：

第75题 小儿收缩压的推算公式是

- A. $(\text{年龄} \times 2) + 60\text{mmHg}$
- B. $(\text{年龄} \times 2) + 70\text{mmHg}$
- C. $(\text{年龄} \times 2) + 80\text{mmHg}$
- D. $(\text{年龄} \times 2) + 90\text{mmHg}$
- E. $(\text{年龄} \times 2) + 100\text{mmHg}$

正确答案：C 您选择的答案：

第76题 关于室间隔缺损的临床表现，以下哪项不常见

- A. 消瘦
- B. 乏力
- C. 气促
- D. 眩晕
- E. 多汗

正确答案：D 您选择的答案：

第77题 X线检查显示肺动脉段凸出的先天性心脏病不包括

- A. 室间隔缺损
- B. 房间隔缺损
- C. 动脉导管未闭
- D. 法洛四联症
- E. 肺动脉狭窄

正确答案：D 您选择的答案：

第78题 X线检查示肺血少，提示

- A. 右向左分流
- B. 差异性青紫
- C. 主动脉骑跨
- D. 肺动脉狭窄
- E. 动脉导管未闭

正确答案：D 您选择的答案：

第79题 属于右向左分流的先天性心脏病是

- A. 房间隔缺损
- B. 室间隔缺损
- C. 动脉导管未闭
- D. 法洛四联症
- E. 肺动脉狭窄

正确答案：D 您选择的答案：

第80题 法洛四联症，不应存在下述哪种

- A 肺动脉狭窄
- B 右心室肥大
- C 室间隔缺损
- D 主动脉骑跨
- E 动脉血氧饱和度 > 95%

正确答案：E 您选择的答案：

第81题 法洛四联症右向左分流量的大小主要取决于

- A 室间隔缺损的大小
- B 肺动脉狭窄的程度
- C 主动脉骑跨的程度
- D 主动脉直径的大小
- E 右心室肥厚的程度

正确答案：B 您选择的答案：

第82题 法洛四联症出现持续青紫的原因不包括

- A 肺动脉狭窄，气体交换不足
- B 主动脉骑跨，接受一部分静脉血
- C 室间隔缺损，左向右分流
- D 肺循环血量减少，气体交换血量减少
- E 右心室肥厚，出现右向左分流

正确答案：C 您选择的答案：

第83题 室间隔缺损的常见并发症不包括

- A 支气管肺炎
- B 充血性心力衰竭
- C 肺水肿
- D 亚急性细菌性心内膜炎
- E 脑脓肿

正确答案：E 您选择的答案：

第84题 先心病X线检查，有肺缺血性改变的是

- A 房间隔缺损
- B 室间隔缺损
- C 动脉导管未闭
- D 法洛四联症
- E 艾森曼格综合征

正确答案：D 您选择的答案：

第85题 室间隔缺损常出现

- A 左房、左室大
- B 右房、右室大
- C 左房、右房大
- D 左室、右室大
- E 不出现房室扩大

正确答案：D 您选择的答案：

第86题 室间隔缺损血流动力学改变首先引起

- A 右心室增大
- B 左心室增大
- C 左心房增大
- D 主动脉扩张
- E 肺动脉扩张

正确答案：B 您选择的答案：

第87题 促使早产儿动脉导管关闭的药物是

- A 硝苯地平
- B 卡托普利
- C 前列腺素
- D 吲哚美辛
- E 双嘧达莫

正确答案：D 您选择的答案：

第88题 下述情况中，除外哪一项均可见于动脉导管未闭

- A 胸骨左缘第2肋间连续性杂音
- B X线检查肺野清晰
- C 心尖部短促的舒张期杂音
- D 股动脉枪击音
- E 心电图正常或左心室肥厚

正确答案：B 您选择的答案：

第89题 动脉导管未闭，在婴幼儿期或形成肺动脉高压或合并心衰时，常见

- A 胸骨左缘第2肋间连续性杂音
- B 胸骨左缘第4肋间连续性杂音
- C 胸骨左缘第4肋间舒张期杂音
- D 胸骨左缘第2肋间收缩期杂音
- E 胸骨左缘第2肋间舒张期杂音

正确答案：D 您选择的答案：

第90题 关于小儿血管的特点，以下哪项是正确的

- A. 小儿的动脉相对比成人粗
- B. 随年龄增长, 动脉口径相对变宽
- C. 10岁以前肺动脉直径较主动脉窄
- D. 青春期肺动脉直径超过主动脉
- E. 婴儿期毛细血管特别粗大

正确答案: E 您选择的答案:

第91题 关于先天性心脏病的治疗, 错误的是

- A. 小型室间隔缺损不一定需手术治疗
- B. 小于6个月的室间隔缺损患儿发生反复充血性心力衰竭, 内科难以控制者需手术治疗
- C. 房间隔缺损宜在学龄前期予以手术修补
- D. 动脉导管未闭的手术治疗必要时可在任何年龄施行
- E. 法洛三联症难以手术治愈

正确答案: E 您选择的答案:

第92题 卵圆孔形成解剖上闭合的最迟时间大多在

- A. 生后2~3月
- B. 生后5~7月
- C. 1岁
- D. 2岁
- E. 3岁

正确答案: B 您选择的答案:

第93题 蹲踞现象常见于哪种先天性心脏病

- A. 房间隔缺损
- B. 室间隔缺损
- C. 动脉导管未闭
- D. 法洛三联症
- E. 肺动脉狭窄

正确答案: D 您选择的答案:

第94题 左向右分流型先天性心脏病, 应除外以下哪一种

- A. 动脉导管未闭
- B. 主动脉狭窄
- C. 房间隔缺损
- D. 肺静脉异位引流
- E. 室间隔缺损

正确答案: B 您选择的答案:

第95题 第一孔未闭型房间隔缺损的解剖所见, 下述哪种是错误的

- A. 房间隔下部缺损
- B. 缺损口较大
- C. 二尖瓣裂
- D. 三尖瓣裂
- E. 肺动脉瓣裂

正确答案: E 您选择的答案:

第96题 10个月小儿, 正常心率是

- A. 120~140次/分
- B. 110~130次/分
- C. 100~120次/分
- D. 80~100次/分
- E. 70~90次/分

正确答案: B 您选择的答案:

第97题 以下哪项不是动脉导管未闭的常见症状

- A. 气促、咳嗽
- B. 乏力、多汗
- C. 心悸
- D. 声音嘶哑
- E. 缺氧发作

正确答案: E 您选择的答案:

第98题 正常胎儿血循环中血氧含量最高的部位是

- A. 主动脉
- B. 肺动脉
- C. 左心房
- D. 脐静脉
- E. 脐动脉

正确答案: D 您选择的答案:

第99题 动脉导管完全闭合绝大多数发生于

- A. 3个月内
- B. 5个月内
- C. 6个月内
- D. 9个月内
- E. 1岁以内

正确答案: E 您选择的答案:

第100题 法洛三联症的血流动力学改变主要是

- A. 左心室收缩期负荷过重
- B. 右心室收缩期负荷过重
- C. 左心室舒张期负荷过重
- D. 右心室舒张期负荷过重
- E. 肺动脉负荷过重

正确答案：B 您选择的答案：

第101题 脉压增宽，伴有毛细血管搏动，提示

- A. 室间隔缺损
- B. 房间隔缺损
- C. 动脉导管未闭
- D. 法洛四联症
- E. 肺动脉狭窄

正确答案：C 您选择的答案：

第102题 肺循环血流量增多，而左心室、主动脉及体循环血流量减少的先心病是

- A. 动脉导管未闭
- B. 室间隔缺损
- C. 房间隔缺损
- D. 法洛四联症
- E. 肺动脉狭窄

正确答案：C 您选择的答案：

第103题 以下先心病均表现有P2亢进，但应除外

- A. 室间隔缺损
- B. 房间隔缺损
- C. 原发性肺动脉高压
- D. 肺动脉狭窄
- E. 动脉导管未闭

正确答案：D 您选择的答案：

第104题 出生后卵圆孔解剖上关闭的时间是

- A. 生后3~4个月
- B. 生后5~7个月
- C. 生后8~9个月
- D. 生后10~12个月
- E. 生后30个月

正确答案：B 您选择的答案：

第105题 卵圆孔解剖上关闭的时间为

- A. 生后3周内
- B. 生后5周内
- C. 生后8~10周
- D. 生后3~4个月
- E. 生后5~7个月

正确答案：E 您选择的答案：

第106题 超声心动图示：右室大，室间隔与左室后壁呈矛盾运动，提示

- A. 房间隔缺损
- B. 左向右分流型先天性心脏病
- C. 左向右分流量大
- D. 室间隔缺损
- E. 动脉导管未闭

正确答案：A 您选择的答案：

第107题 室间隔缺损伴有肺动脉高压时，不应出现的表现是

- A. 原有心脏杂音显著增强
- B. 右心室显著增大
- C. 肺动脉第二音显著亢进
- D. X线胸片肺动脉段显著膨出
- E. 右心室压力显著升高

正确答案：A 您选择的答案：

第108题 下列哪项不符合动脉导管未闭的临床表现

- A. 胸骨左缘第2肋间粗糙响亮的连续性机器样杂音
- B. 周围血管征阳性
- C. 肺动脉高压时出现差异性青紫
- D. 胸部X线示主动脉影缩小
- E. 右心导管示肺动脉血氧高于右心室

正确答案：D 您选择的答案：

第109题 给一动脉导管未闭患儿行右心导管检查，请指出以下哪种改变是不可能出现的

- A. 肺动脉血氧含量较右心室高
- B. 导管可由肺动脉通过未闭的动脉导管进入降主动脉
- C. 右心室和肺动脉压力增高
- D. 右心室和肺动脉压力正常
- E. 右心室和肺动脉压力降低

正确答案：E 您选择的答案：

第110题 以下各项说明中，哪一项是错误的

A. 青紫型心脏病，可有杵状指
B. 心力衰竭者肝增大，肝颈静脉回流征阳性
C. 3岁以前发现心脏病，以先心病可能性大
D. P2亢进，提示肺动脉高压
E. 下肢血压低于上肢，提示动脉导管未闭
正确答案：E 您选择的答案：

第111题 关于法洛四联症的右心导管检查，以下哪项不正确

A. 导管从右心室进入主动脉
B. 导管从右心室进入左心室
C. 导管容易进入肺动脉
D. 右心室压力增高
E. 肺动脉压力下降

正确答案：C 您选择的答案：

第112题 关于胎儿血循环特点，以下哪项是错误的

A. 胎盘来的动脉血经脐动脉进入胎儿体内
B. 右心房血可经卵圆孔入左心房
C. 动脉导管开放
D. 胎儿肺处于压缩状态
E. 胎儿期供应上肢血氧含量较下半身高

正确答案：A 您选择的答案：

第113题 胸部X线检查，肺门舞蹈多见于哪种先心病

A. 房间隔缺损
B. 室间隔缺损
C. 动脉导管未闭
D. 法洛四联症
E. 艾森曼格综合征

正确答案：A 您选择的答案：

第114题 动脉导管未闭的血流动力学改变首先引起

A. 右室大
B. 左房大
C. 肺动脉扩张
D. 左室大
E. 右房大

正确答案：C 您选择的答案：

第115题 以下哪项不符合房间隔缺损的体征

A. 心前区隆起
B. 心尖搏动弥散
C. 心浊音界扩大
D. P2分裂受呼吸影响
E. P2亢进

正确答案：D 您选择的答案：

第116题 以下是室间隔缺损的临床体征，但应除外

A. 心界扩大
B. 杂音最响处可触及收缩期震颤
C. 杂音传导广泛
D. P2固定分裂
E. 心尖搏动弥散

正确答案：D 您选择的答案：

第117题 请指出以下哪项不是法洛四联症常见的临床表现

A. 青紫
B. 充血性心力衰竭
C. 蹲踞
D. 缺氧发作
E. 杵状指

正确答案：B 您选择的答案：

第118题 关于动脉导管未闭的胸部X线征象，以下哪项是错误的

A. 肺动脉突出
B. 肺门血管影变细
C. 肺门搏动
D. 主动脉增大
E. 左心室增大

正确答案：B 您选择的答案：

第119题 在胸骨左缘第2、3肋间可听到 ~ 级收缩期吹风样杂音，通常无震颤的先天性心脏病是

A. 室间隔缺损
B. 房间隔缺损
C. 动脉导管未闭
D. 法洛四联症
E. 肺动脉狭窄

正确答案：B 您选择的答案：

第120题 动脉导管未闭有显著肺动脉高压时可出现

- A. 头面部青紫
- B. 上半身青紫
- C. 全身青紫
- D. 末梢青紫
- E. 下半身青紫

正确答案：E 您选择的答案：

第121题 房缺者，胸骨左缘下方听到舒张期杂音，提示

- A. 肺动脉高压
- B. 左向右分流量大
- C. 合并室间隔缺损
- D. 右室流出道相对狭窄
- E. 以上都不是

正确答案：E 您选择的答案：

第122题 左向右分流型先心病，不包括

- A. 房间隔缺损
- B. 室间隔缺损
- C. 动脉导管未闭
- D. 部分型心内膜垫缺损
- E. 三尖瓣闭锁

正确答案：E 您选择的答案：

第123题 下列哪项符合动脉导管未闭的检查所见

- A. X线检查，主动脉结小
- B. 心电图检查，电轴右偏，右室肥厚
- C. 心导管检查，肺动脉血氧含量高于右心室
- D. 舒张压正常
- E. 奇脉

正确答案：C 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第124题 患儿，2岁。既往确诊先心病室缺，近1周发热、咳嗽、近3天喘，听诊双肺可闻及中小水泡音，胸骨左缘3、4肋间闻及 级收缩期杂音，肝肋弓下4cm，下述哪项处置是错误的

- A. 吸氧
- B. 快速洋地黄化
- C. 静点抗生素
- D. 应用利尿剂
- E. 以上均不是

正确答案：E 您选择的答案：

第125题 男孩，5岁半。生后发现心脏杂音。平时易感冒。曾患过肺炎3次，体重16kg，无发绀。体格检查：心前区隆起，胸骨左缘第三肋间可闻及 级收缩杂音伴震颤，心尖区 级舒张期滚筒样杂音，P2亢进。EKG示电轴不偏RV5+SV1：46mm+12mm，RV124mm。初步最可能的诊断为

- A. 房间隔缺损(第一孔)
- B. 房间隔缺损(第二孔)
- C. 动脉导管未闭
- D. 不典型法洛四联症
- E. 室间隔缺损

正确答案：E 您选择的答案：

第126题 女孩，2岁。经常患感冒和肺炎。体检：心前区隆起，无震颤，胸骨左缘第2肋间可闻及 级喷射性杂音，P2>A2伴有固定分裂，心电显示电轴右偏，V1呈rsR₁，波型，Rv1 14mm，Pv1 2mm，P-R间期0.16"，该患儿考虑何种先心病

- A. 房间隔缺损
- B. 室间隔缺损
- C. 动脉导管未闭
- D. 肺动脉狭窄
- E. 法洛四联症

正确答案：A 您选择的答案：

第127题 女，5岁。自幼易感冒，生长发育尚可，心前区隆起，肺动脉瓣区有收缩期震颤，P2亢进。胸骨左缘第2~3肋间闻及 ~ 级收缩期、 级舒张期杂音，血压12/4kPa。胸片示左右心室肥大(左室为主)，肺充血明显，肺动脉段突出，主动脉弓增宽，考虑最可能的诊断为

- A. 室间隔缺损
- B. 房间隔缺损
- C. 动脉导管未闭
- D. 肺动脉狭窄
- E. 主动脉瓣狭窄伴关闭不全

正确答案：C 您选择的答案：

第128题 12岁女性，自10岁起下肢青紫，逐渐加重。体检：胸骨左缘第2肋间闻及2/6级收缩期杂音，P2亢进。血气分析提示：右桡动脉血氧饱和度96%，股动脉血氧饱和度80%。最可能的诊断是

- A. 房间隔缺损
- B. 室间隔缺损
- C. 动脉导管未闭
- D. 法洛四联症

E. 肺动脉狭窄

正确答案：C 您选择的答案：

第129题 患儿，6岁。经常咳嗽气促，不爱玩耍，活动后乏力，体检：发育落后，胸骨左缘2、3肋间闻及 级收缩期杂音，无震颤，传导范围小，P2亢进伴固定分裂。胸片：右房右室增大，肺动脉段突出，肺野充血，最可能的诊断是

- A. 房间隔缺损
- B. 室间隔缺损
- C. 动脉导管未闭
- D. 法洛四联症
- E. 肺动脉狭窄

正确答案：A 您选择的答案：

第130题 3岁男孩，自幼喂养困难，易患肺炎。体检：胸骨左缘3、4肋间闻及4 / 6级全收缩期杂音，传导广泛，伴有震颤，P2亢进。最可能的诊断是，

- A. 房间隔缺损
- B. 室间隔缺损
- C. 动脉导管未闭
- D. 风湿性心肌炎
- E. 法洛四联症

正确答案：B 您选择的答案：

第131题 4岁，男孩。体检时发现胸骨左缘第三、四肋间 级粗糙收缩期杂音，肺动脉第二音稍增强，为确诊需进一步做哪一项无创性检查

- A. X线胸片
- B. 心血管造影
- C. 心导管检查
- D. 超声心动图
- E. 心电图

正确答案：D 您选择的答案：

第132题 男孩，2岁半。患有法洛四联症。每当哭闹后出现呼吸困难，即出现抽搐，这种现象是由于肺动脉漏斗部狭窄的基础上，突然发生该处肌肉的痉挛。出现上述缺氧发作时最有效的抢救措施是

- A. 加压面罩吸氧
- B. 身体取胸膝位
- C. 静脉注射普萘洛尔(心得安)
- D. 静滴碳酸氢钠
- E. 口服消炎痛

正确答案：C 您选择的答案：

第133题 患儿，4岁。自1岁出现口唇青紫，活动后加剧，喜坐少动，胸骨左缘2、3肋间可闻及收缩期杂音，有震颤，动脉血氧饱和度75%，此例可能的诊断是

- A. 原发性肺动脉高压症
- B. 肺动脉狭窄
- C. 艾森曼格综合征
- D. 较大室间隔缺损
- E. 法洛四联症

正确答案：E 您选择的答案：

第134题 10岁女孩，常有活动后心悸、气促，心脏听诊于胸骨左缘第2～3肋间可闻及 - 级喷射性收缩期杂音，肺动脉瓣区第二音亢进和固定分裂。该患儿最可能的诊断是

- A. 房间隔缺损
- B. 室间隔缺损
- C. 动脉导管未闭
- D. 法洛四联症
- E. 肺动脉狭窄

正确答案：A 您选择的答案：

第135题 患儿，6岁。出生后反复呼吸道感染，平时较少活动。体检：无发绀，心前区隆起，于胸骨左缘第3、4肋间闻及 级粗糙全收缩期杂音，有震颤，肺动脉第二音亢进，最可能的诊断是

- A. 房间隔缺损
- B. 室间隔缺损
- C. 法洛四联症
- D. 动脉导管未闭
- E. 艾森曼格综合征

正确答案：B 您选择的答案：

第136题 3岁男孩，生后6个月开始出现发绀，有杵状指。胸部X线检查示：“靴形”心影，肺血减少。最可能的诊断是

- A. 肺动脉狭窄
- B. 室间隔缺损
- C. 动脉导管未闭
- D. 法洛四联症
- E. 艾森曼格综合征

正确答案：D 您选择的答案：

第137题 3岁男孩，平时易感冒，有活动后气促，已确诊为动脉导管未闭。以下哪项不符合

- A. 胸骨左缘可闻及粗糙的连续性机器样杂音
- B. 心电图检查可出现左心室肥大
- C. X线检查显示主动脉弓有增大
- D. 心导管检查可发现肺动脉血氧含量较右心室为低
- E. 可行手术治愈

正确答案：D 您选择的答案：

第138题 3岁女孩，诊断为动脉导管未闭，其血流动力学改变错误的是

- A．分流量大小与动脉导管的粗细及主、肺动脉之间的压力阶差有关
- B．肺动脉接受来自右心室及主动脉两处的血流，肺循环血量增加
- C．左房、左室扩大
- D．周围动脉舒张压升高，脉压降低
- E．肺动脉压力超过主动脉压力时可产生右向左分流而出现青紫

正确答案：D 您选择的答案：

第139题 6岁女孩，出生后反复患呼吸道感染，平时少活动，体检，无发绀，心前区稍隆起，胸骨左缘3、4肋间 级粗糙全收缩杂音、伴震颤，P2亢进，最可能的诊断是

- A 房间隔缺损
- B 室间隔缺损
- C 动脉导管未闭
- D 法洛四联症
- E 肺动脉狭窄

正确答案：B 您选择的答案：

第140题 患儿，1个月。体格检查左侧心前区有 ~ 级收缩期粗糙杂音。以后经多方面检查确诊为室间隔缺损。缺损自然闭合一般发生在

- A 生后3个月内
- B 生后5个月内
- C 生后6个月内
- D 生后9个月内
- E 5岁以下

正确答案：E 您选择的答案：

第141题 4岁女孩，平日偶有膝关节痛。体检发现胸骨左缘第3肋间有3 / 6级收缩期杂音，胸骨左缘下方听到舒张期杂音，P2亢进。X线检查：右心室大。可能的诊断是

- A．风湿性心脏病
- B．房间隔缺损
- C．室间隔缺损
- D．肺动脉狭窄
- E．法洛四联症

正确答案：B 您选择的答案：

第142题 7个月婴儿，已确诊为动脉导管未闭，近1周来出现哭声嘶哑，考虑其可能的原因是

- A．扩张的主动脉压迫喉返神经
- B．扩张的肺动脉压迫喉返神经
- C．左心房扩大压迫喉返神经
- D．右心房扩大压迫喉返神经
- E．左心室扩大压迫喉返神经

正确答案：B 您选择的答案：

第143题 6岁，男孩。患先天愚型，消瘦、乏力、气短、多汗。近年来发生青紫。体检：营养发育差，于胸骨右缘3、4肋间闻及粗糙的全收缩期杂音，可触及震颤，肺动脉第二音亢进，X线以右室大为主，此例可能的诊断

- A 房间隔缺损
- B Roger病
- C 高位室间隔缺损
- D 艾森曼格综合征
- E 动脉导管未闭

正确答案：D 您选择的答案：

第144题 早产儿，胎龄35周。体格检查发现胸骨左缘第2肋间有粗糙响亮的连续性机器样杂音，后经超声心动图检查为动脉导管未闭，可以选用下列哪一种药物治疗使其导管闭合

- A 阿司匹林
- B 消炎痛
- C 氨基比林
- D 肾上腺皮质激素
- E 肾上腺素

正确答案：B 您选择的答案：

第145题 2岁女孩，身体瘦弱，多次患肺炎。胸部X线检查：肺血多，左心房，左心室增大，主动脉增宽。应诊断为

- A．房间隔缺损
- B．室间隔缺损
- C．动脉导管未闭
- D．法洛四联症
- E．艾森曼格综合征

正确答案：C 您选择的答案：

第146题 女，5岁，体格发育落后。自幼啼哭时唇面青紫，会行走后喜蹲踞，近2年活动后心悸、气促，发绀明显。体检：无明显杵状指，血压90 / 60mmHg(12 / 8kPa)，胸骨左缘2~3肋间闻及3 / 6级收缩期杂音伴收缩期震颤，P2减弱，有单一感。EKG示：电轴右偏，RV120mm。胸片示：靴形心，心腰凹陷，心尖上翘，肺纹理稀少。最可能的诊断是

- A．房间隔缺损伴肺动脉高压
- B．室间隔缺损伴肺动脉高压
- C．动脉导管未闭伴肺动脉高压
- D．法洛四联症
- E．单纯肺动脉狭窄

正确答案：D 您选择的答案：

第147题 5岁小儿，自述多汗、乏力3年。测血压为110 / 60mmHg(14 . 7 / 8kPa)，胸骨左缘第2肋间闻及收缩期杂音，心电图示左心室肥大。最可能的诊断是

- A . 室间隔缺损(干下型)
- B . 房间隔缺损(第1孔未闭型)
- C . 动脉导管未合并肺动脉高压
- D . 肺动脉狭窄
- E . 法洛四联症

正确答案：C 您选择的答案：

第148题 2岁女孩，常有活动后气促、发绀，胸骨左缘可闻及收缩期粗糙杂音，经心脏彩超诊为室间隔缺损。近1月来上述症状加重，呈现青紫，心脏杂音明显减轻而肺动脉第二音显著亢进。该患儿可能合并了

- A . 中毒性心肌炎
- B . 心力衰竭
- C . 肺水肿
- D . 亚急性细菌性心内膜炎
- E . 艾森曼格综合征

正确答案：E 您选择的答案：

第149题 3岁男孩，因自幼活动后气促，多汗，乏力来诊。体检：身高102cm，胸骨左缘第2～3肋间闻及收缩期杂音。心电图示：电轴右偏，不完全右束支传导阻滞。最可能的诊断是

- A . 房间隔缺损
- B . 室间隔缺损
- C . 肺动脉狭窄
- D . 法洛四联症
- E . 动脉导管未闭

正确答案：A 您选择的答案：

第150题 患儿，10岁。发育正常，无明显症状。听诊于胸骨左缘2、3肋间 级收缩期杂音，心电图显示右心室肥厚及不完全性右束支传导阻滞，本例诊断最大可能是

- A 肺动脉狭窄
- B 法洛四联症
- C 室间隔缺损
- D 房间隔缺损
- E 右位心

正确答案：D 您选择的答案：

第151题 10岁女孩，学校常规体查时发现胸骨左缘第2肋间可闻及 级收缩期杂音，经心脏彩超诊断为房间隔缺损。该患儿杂音产生的原理是

- A . 二尖瓣相对狭窄
- B . 三尖瓣相对狭窄
- C . 主动脉瓣相对狭窄
- D . 肺动脉瓣相对狭窄
- E . 缺损口处的血液湍流

正确答案：D 您选择的答案：

第152题 患儿女，2岁半。心前区听到 ～ 级收缩期杂音。胸部X线片显示两肺野肺纹理减少，以下哪一种先天性心脏病的可能性最大

- A 房间隔缺损
- B 室间隔缺损
- C 动脉导管未闭
- D 法洛四联症
- E 肺动脉狭窄

正确答案：D 您选择的答案：

第153题 患儿，11个月。生后反复患肺炎，2天前开始发热、咳嗽、气促、烦躁不安。体检：口唇发绀，呼吸48次 / 分，心率198次 / 分，心音低钝，胸骨左缘3、4肋间可闻及 级收缩期杂音，双肺中、小水泡音，肝肋下3 . 0cm，双足背轻度水肿。本例可能的诊断

- A 室间隔缺损
- B 室间隔缺损合并肺炎
- C 室间隔缺损合并肺炎和心力衰竭
- D 室间隔缺损合并亚急性细菌性心内膜炎
- E 室间隔缺损合并心力衰竭

正确答案：C 您选择的答案：

第154题 男孩，11岁。体格检查心脏有杂音而就诊血压14 / 10kPa胸骨左缘未扪及震颤，在左侧第二肋间闻及 ～ 级收缩期喷射性杂音，P2亢进。胸片示梨形心脏，右心房、右心室增大，肺动脉段饱满，主动脉结小，肺纹理增多。ECG示电轴右偏，V：呈rsR'型，最可能的诊断是

- A 室间隔缺损
- B 房间隔缺损
- C 动脉导管未闭
- D 法洛四联症
- E 肺动脉狭窄

正确答案：B 您选择的答案：

第155题 4岁女孩，已明确诊断为法洛四联症。5天来发热伴腹泻，1天来头痛，惊厥2次，右侧肢体不能活动。最可能的诊断是；法洛四联症并发

- A . 脑血栓
- B . 脑出血
- C . 结核性脑膜炎

- D. 癫痫
E. 中毒性脑病

正确答案：A 您选择的答案：

第156题 男，1岁。生后全身青紫，哭泣后青紫更为明显。心前区隆起，胸骨左缘第2~4肋间听到 ~ 级喷射性收缩期杂音。胸片心脏呈靴型超声心动图检查后诊断为法洛四联症。该畸形首先引起以下哪一方面的改变

- A 左心室收缩期负荷过重
B 右心室收缩期负荷过重
C 左心室舒张期负荷过重
D 右心室舒张期负荷过重
E 肺动脉负荷过重

正确答案：B 您选择的答案：

第157题 女孩，8岁。于4个月前开始不规则发烧，体温38~39℃，2个月前出现气促、咳嗽、下肢浮肿，抗结核治疗后无效，1岁时诊断为“先心病”。体检：T: 38.5℃，P: 114次/分，R: 48次/分，颈静脉怒张，心前区隆起，于胸骨左缘2、3肋间可闻及连续杂音，伴震颤，肝肋下4.0cm，尿常规：蛋白(+)，本例应诊断为

- A 先心病(动脉导管未闭)合并心力衰竭
B 先心病(动脉导管未闭)合并肺炎
C 先心病(动脉导管未闭)合并肺结核
D 先心病(动脉导管未闭)合并亚急性细菌性心内膜炎
E 先心病(动脉导管未闭)合并心力衰竭，亚急性细菌性心内膜炎

正确答案：E 您选择的答案：

第158题 5个月男婴，生后反复患支气管肺炎和心力衰竭，平时常有吃奶或哭闹后口唇发绀，生长缓慢，已确诊为室间隔缺损，缺损直径为12mm。以下说法中正确的是

- A. 患儿已合并有肺动脉高压
B. 1岁后再行手术治疗
C. 应尽早进行手术治疗
D. 患儿已失去手术机会
E. 容易并发脑脓肿

正确答案：C 您选择的答案：

第159题 女孩，6岁。3岁时发现有室间隔缺损，当时未曾手术治疗，最近来门诊检查时发现有显著的肺动脉高压，在这种情况下主要引起哪一方面的改变

- A 肺充血显著
B 右心房增大
C 左心房增大
D 右心室增大
E 左心室增大

正确答案：D 您选择的答案：

第160题 2岁男孩，诊断为法洛四联症，有关其血流动力学的改变不正确的是

- A. 肺动脉狭窄可导致血液进入肺循环受阻，右心室代偿性肥厚
B. 肺循环血量增加
C. 主动脉同时接受左、右心室血液
D. 支气管动脉和肺血管之间易形成侧支循环
E. 有右向左分流

正确答案：B 您选择的答案：

第161题 新生儿，生后3天发现明显青紫，呼吸急促，不吃奶，体检：心脏扩大无明显杂音，应首先想到可能是

- A 法洛四联症
B 肺动脉狭窄
C 艾森曼格综合征
D 大动脉错位
E 动脉导管未闭

正确答案：D 您选择的答案：

第162题 动脉导管未闭、室间隔缺损、房间隔缺损当有肺动脉高压时，以下哪一项胸部X线摄片时的改变为动脉导管未闭所特有的

- A 肺动脉段突出
B 肺门血管增粗
C 肺野充血
D 主动脉弓有所增大
E 可有左右心室扩大

正确答案：D 您选择的答案：

第163题 女孩，6岁。自幼啼哭时唇面青紫，会行走后喜蹲踞。轻度杵状指(趾)。血压12/8kPa。胸骨左缘第2~3肋间可闻及 ~ 级收缩期杂音伴收缩期震颤，P2单一感。胸片心脏外形靴状，心腰凹陷，心尖上翘，肺纹理稀少。最可能的诊断为

- A 房间隔缺损伴肺动脉高压
B 室间隔缺损伴肺动脉高压
C 动脉导管未闭伴肺动脉高压
D 法洛四联症
E 单纯性肺动脉狭窄

正确答案：D 您选择的答案：

第164题 室间隔缺损、房间隔缺损、动脉导管未闭及法洛四联症，上述的先天性心脏病患儿平时最常见的并发症是

- A 肺炎
B 脑栓塞
C 心律失常

- D 喉返神经麻痹
E 感染性心内膜炎

正确答案：A 您选择的答案：

第165题 2岁男孩，体格瘦弱，易乏力、多汗，曾患肺炎5次。体检：胸骨左缘3、4肋间闻及3 / 6级全收缩期杂音，传导广泛，有震颤，P2亢进。以下病理生理改变，哪项不符

- A. 左向右分流
B. 肺动脉高压
C. 体循环血量减少
D. 左心室血量减少
E. 肺血增多

正确答案：D 您选择的答案：

第166题 1岁男婴，发现双下肢青紫1月。体检：胸骨左缘第2肋间可闻及粗糙响亮的连续性机器样杂音，诊断考虑

- A. 房间隔缺损
B. 室间隔缺损
C. 动脉导管未闭
D. 法洛四联症
E. 肺动脉狭窄

正确答案：C 您选择的答案：

第167题 5岁女孩，平时常“感冒”，易患肺炎。体检时发现胸骨左缘第3、4肋间可闻及 级粗糙全收缩期杂音，诊断考虑

- A. 房间隔缺损
B. 室间隔缺损
C. 动脉导管未闭
D. 法洛四联症
E. 肺动脉狭窄

正确答案：B 您选择的答案：

第168题 4岁男孩，平时常有气急和青紫，行走或游戏时喜主动下蹲片刻。体检：发育、营养差，口唇及指(趾)甲床青紫，胸骨左缘第3肋间可闻及 级喷射性收缩期杂音，肺动脉第二音消失。诊断考虑为

- A. 房间隔缺损
B. 室间隔缺损
C. 动脉导管未闭
D. 法洛四联症
E. 肺动脉狭窄

正确答案：D 您选择的答案：

第169题 患儿，4岁。消瘦，活动后有气急、心悸。检查：于胸骨左缘第2肋间听到粗糙而响亮的连续性机器杂音，初步诊断为动脉导管未闭。该畸形首先可以引起以下哪一方面的改变

- A 右心室增大
B 左心房增大
C 肺动脉扩张
D 左心室增大
E 右心房增大

正确答案：C 您选择的答案：

第170题 女孩，4岁。因外院诊断为先天性心脏病而来检查：胸骨左缘可闻及响亮而粗糙的全收缩期杂音，肺动脉第二音稍增强。经超声心动图检查诊断为室间隔缺损，由于该畸形首先可以引起以下哪一方面的改变

- A 左心室增大
B 右心室增大
C 左心房扩大
D 主动脉扩张
E 肺动脉扩张

正确答案：A 您选择的答案：

第171题 4岁，女孩。咳嗽，呼吸困难两天入院，查体：口唇微绀，心率：130次 / 分，胸骨左缘第三四肋间闻及 粗糙收缩期杂音，肺动脉 音稍强，两肺细小水泡音，该患儿诊断是

- A 室间隔缺损并发肺炎
B 房间隔缺损并发肺炎
C 动脉导管未闭并发肺炎
D 法洛四联症并发肺炎
E 房缺伴肺炎心衰

正确答案：A 您选择的答案：

第172题 5岁女孩，已确诊房间隔缺损，听诊，于胸骨左缘2、3肋间可及 级收缩期杂音胸骨左缘下端短促舒张期杂音，肺动脉第二音亢进提示：

- A 产生右向左分流
B 左向右分流量较大
C 左向右分流量较小
D 预兆将发生心力衰竭
E 合并主动脉瓣关闭不全

正确答案：B 您选择的答案：

三、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第173-175题

5岁女孩，自幼身体瘦弱，易患感冒。体检：心前区稍隆起，未触及震颤，胸骨左缘第2肋间闻及2/6级收缩期杂音，P2亢进，固定分裂。

1. 最可能的诊断是

- A. 房间隔缺损
- B. 室间隔缺损
- C. 动脉导管未闭
- D. 法洛三联症
- E. 病毒性心肌炎

2. 最可能出现的心电图改变是

- A. T波低平、倒置
- B. P-R间期延长
- C. 不完全右束支传导阻滞
- D. 左前分支阻滞
- E. 左心室肥大

3. 最可能出现的超声心动图改变是

- A. 左室大，左室流出道增宽
- B. 右房大，右室流出道增宽
- C. 室间隔与左室壁反向运动
- D. 主动脉增宽
- E. 左室内膜增厚

正确答案：ACC 您选择的答案：

第176-179题

2岁男孩，生后即发现有青紫现象，久站喜蹲踞，心脏听诊可在胸骨左缘第2肋间闻及 级喷射性杂音，肺动脉第二音减低。

1. 该患儿最可能的诊断是

- A. 房间隔缺损
- B. 室间隔缺损
- C. 动脉导管未闭
- D. 法洛三联症
- E. 肺动脉狭窄

2. 一般首选哪项检查以进一步明确诊断

- A. 心电图
- B. 胸部X线检查
- C. 多普勒彩色血流显像
- D. 心血管造影
- E. 磁共振成像

3. 如行胸部X线检查，最可能的改变是

- A. 右房、右室大，肺动脉段凸出，肺野充血
- B. 左房、左室大，肺动脉段凹陷，肺野充血
- C. 左室、右室大，肺动脉段凸出，肺野充血
- D. 右室大，肺动脉段凸出，肺野清晰
- E. 右室大，肺动脉段凹陷，肺野清晰

4. 若患儿突发偏瘫，检查血常规示白细胞 $12.6 \times 10^9/L$ ，红细胞 $5.7 \times 10^{12}/L$ ，则可能并发了

- A. 亚急性细菌性心内膜炎
- B. 脑脓肿、脑栓塞
- C. 病毒性脑炎
- D. 脑积水
- E. 艾森曼格氏综合征

正确答案：DCEB 您选择的答案：

第180-182题

患儿，男6个月。咳嗽10天入院。体检：体温 $38.5^\circ C$ ，心率150次/分，双肺呼吸音粗，闻及中、小水泡音，胸骨左缘3、4肋间闻及3/6级粗糙的收缩期杂音，传导广泛。

1. 最可能的诊断是

- A. 室间隔缺损并支气管肺炎
- B. 房间隔缺损并支气管肺炎
- C. 动脉导管未闭并支气管肺炎
- D. 肺动脉狭窄并支气管肺炎
- E. 法洛三联症并支气管肺炎

2. 以下X线检查不可能出现的结果是

- A. 心胸比例为55%
- B. 肺下野可见高密度影
- C. 心影呈靴形
- D. 肺血管影增粗
- E. 肺动脉搏动强烈

3. 于主动脉瓣第二听诊区闻及高音调的舒张期杂音，提示

- A. 干下型室间隔缺损合并主动脉瓣关闭不全
- B. 室间隔缺损合并动脉导管未闭
- C. 房间隔缺损合并动脉导管未闭
- D. 室间隔缺损合并肺动脉高压
- E. 动脉导管未闭合并肺动脉高压

正确答案：ACA 您选择的答案：

第183-184题

女孩，12岁。经常患感冒和肺炎。体检：心前区隆起，无震颤，胸骨左缘第2肋间可闻及 级喷射性杂音， $P2 > A2$ ，伴有固定分裂，心电显示电轴右偏，vl呈rsR'波型，Rv114mm，Pv12mm，P-R间期0.16秒

1. 该患儿考虑何种先天性心脏病

- A. 房间隔缺损
- B. 室间隔缺损

- C 动脉导管未闭
 - D 肺动脉狭窄
 - E 法洛三联症
2. 该患儿的超声心动图改变是
- A 左心房、右心房、右心室内径增宽，室间隔活动正常
 - B 右房增大，右室流出道增宽，室间隔与左室后壁呈矛盾运动
 - C 左心房、左心室内径增宽，主动脉内径增宽
 - D 右心室和右心房内径增宽，右心室前壁及室间隔增厚
 - E 主动脉骑跨于室间隔之上，内径增宽
3. 该患儿典型X线改变是
- A 肺动脉段突出，肺门血管影增粗，主动脉影缩小
 - B 肺动脉段突出，肺门血管影增粗，主动脉弓增大
 - C 肺纹理减少，肺野清晰
 - D 肺野呈网状肺纹理
 - E 肺纹理增多，肺充血
- 正确答案：AB 您选择的答案：

- 第185-187题
- 患儿，11个月。生后反复患肺炎，2天前开始发热咳嗽、气促、烦躁不安。体检：口唇发绀，呼吸48次/分，心率198次/分，心音低钝，胸骨左缘3、4肋间可闻及 级收缩期杂音，双肺中、小水泡音，肝肋下3.0cm，双足背轻度水肿
1. 此例可能的诊断
- A 室间隔缺损
 - B 室间隔缺损合并肺炎
 - C 室间隔缺损合并肺炎和心力衰竭
 - D 室间隔缺损合并亚急性细菌性内膜炎
 - E 室间隔缺损合并心力衰竭
2. 下述哪项处置是错误的
- A 吸氧
 - B 快速洋地黄化
 - C 静点抗生素
 - D 静注钙剂
 - E 应用利尿剂
3. 该病治疗原则哪项不正确
- A 按时预防接种
 - B 积极防治感染
 - C 手术最适年龄多在学龄前
 - D 手术治疗大多能根治
 - E 慎用洋地黄，不能长时间用
- 正确答案：CDE 您选择的答案：

- 第188-190题
- 男孩，3岁。经常反复呼吸道感染，体格检查发现胸骨左缘第2肋间有 - 级收缩期杂音，无震颤，P2亢进伴固定分裂。胸透示肺门血管增粗，搏动强烈，右心室饱满。EKG示电轴右偏，V1呈rsR'型，RV1 15mm
1. 该患儿最可能的诊断是
- A 室间隔缺损
 - B 房间隔缺损
 - C 病毒性心肌炎
 - D 动脉导管未闭
 - E 法洛三联症
2. 根据其血液动力学改变，主要表现为
- A 右心房、右心室增大
 - B 左心房、左心室增大
 - C 左心房、右心房增大
 - D 左心室、右心室增大
 - E 右心室、肺动脉增大
3. 最佳的治疗措施是
- A 长期随访，待自行闭合
 - B 建议4~5岁时手术修补
 - C 随访至学龄期手术
 - D 可以等到成人期手术
 - E 增加营养，促使缺损自己闭合
- 正确答案：BAB 您选择的答案：

- 第191-193题
- 6岁，女孩。出生后反复呼吸道感染，平时少活动，体检：无发绀，心前区稍隆起，胸骨左缘3、4肋间 级粗糙全收缩期杂音、伴震颤，P2亢进
1. 最可能的诊断是
- A 房间隔缺损
 - B 室间隔缺损
 - C 动脉导管未闭
 - D 法洛三联症
 - E 肺动脉狭窄
2. 哪一项不是该病常出现的合并症
- A 肺水肿
 - B 支气管肺炎
 - C 脑血栓
 - D 充血性心力衰竭
 - E 亚急性细菌性心内膜炎
3. 该病血液动力学改变首先引起
- A 右心室增大

- B 左心室增大
- C 左心房增大
- D 主动脉扩张
- E 肺动脉扩张

正确答案：BCB 您选择的答案：

第194-196题

患儿，女，3岁。自幼活动后气促，平素易患上呼吸道感染及支气管肺炎。体检：体格瘦小，无发绀，双肺呼吸音粗，P₂增强，胸骨左缘第2肋间闻及粗糙响亮的连续性机器样杂音，可闻及股动脉枪击音。

1. 此患儿为以下哪种先心病
 - A. 室间隔缺损
 - B. 房间隔缺损
 - C. 肺动脉狭窄
 - D. 动脉导管未闭
 - E. 法洛四联症
2. 对于此种类型先心病目前最先进的治疗方法是
 - A. 心脏移植
 - B. 介入治疗
 - C. 外科手术治疗
 - D. 前列腺素E治疗
 - E. 吲哚美辛(消炎痛)药物治疗
3. 以下哪种体征在此患儿不可能出现
 - A. 声音嘶哑
 - B. P₂增强
 - C. 杂音最响亮处可扪及震颤
 - D. 脉压减小
 - E. 股动脉枪击音

正确答案：DBD 您选择的答案：

第197-198题

男，2岁半。发热咳嗽3天气急半天。出生后3个月发现心脏有杂音。曾患肺炎5次，并发心力衰竭一次。体格检查：消瘦，唇周青紫，有轻度鼻扇。体温39℃(R)，心率150次/分，呼吸50次/分。心前区隆起，胸骨左缘第3-4肋间有收缩期震颤伴Ⅱ级全收缩期杂音，广泛传导。两肺背部有细湿啰音。肝肋下2cm。EKG RV5 30mm。胸片示两肺下部有炎性渗出病灶。肺动脉段凸出，左心室扩大，主动脉弓小

1. 根据以上资料考虑其诊断为
 - A. 法洛四联症合并肺炎
 - B. 动脉导管未闭合并心力衰竭
 - C. 室间隔缺损合并肺炎
 - D. 房间隔缺损合并肺炎
 - E. 室间隔缺损合并心力衰竭
2. 入院后给予以下治疗，哪一项是不妥的
 - A. 氧气吸入
 - B. 毛花苷C
 - C. 酚妥拉明
 - D. 退热药物
 - E. 头孢拉定

正确答案：CB 您选择的答案：

第199-200题

患儿，男，2岁。咳嗽发热3天，烦躁气促半天。体检：体温38.0℃，呼吸40次/分，心率168次/分。体格发育落后，呼吸急促，三凹征阳性，口唇发绀，双肺可闻及中、小水泡音，P₂亢进；胸骨左缘第3、4肋间闻及3/6级粗糙的全收缩期杂音，向四周广泛传导，杂音最响亮的部位触及收缩期震颤，肝肋下3cm，质软。

1. 此患儿的诊断以下哪项最正确
 - A. 先心病，室间隔缺损
 - B. 先心病，室间隔缺损并支气管肺炎
 - C. 先心病，室间隔缺损并肺动脉高压
 - D. 先心病，室间隔缺损并心力衰竭
 - E. 先心病，室间隔缺损并支气管肺炎、心力衰竭
2. 目前最紧急正确的治疗是
 - A. 纠正心力衰竭
 - B. 控制感染
 - C. 应用扩血管药减轻心脏负荷
 - D. 室间隔缺损封堵术
 - E. 室间隔缺损修补术

正确答案：EA 您选择的答案：

第201-202题

患儿，10岁。发育正常，无明显症状。听诊于胸骨左缘2、3肋间Ⅱ级收缩期杂音，心电图显示右心室肥厚及不完全性右束支传导阻滞

1. 本例可能的诊断
 - A. 肺动脉狭窄
 - B. 法洛四联症
 - C. 室间隔缺损
 - D. 房间隔缺损
 - E. 右位心
2. 为确诊，选用下列哪项无创性检查最好
 - A. 心电图
 - B. 超声心动图
 - C. 多普勒彩色血流显像
 - D. 心导管检查

E 心血管造影

正确答案：DC 您选择的答案：

第203-205题

患儿，4岁。自1岁出现口唇青紫，活动后加剧，喜坐少动，胸骨左缘2、3肋间可闻及收缩期杂音，有震颤，动脉血氧饱和度75%

1. 此例可能的诊断是

- A 原发性肺动脉高压症
- B 肺动脉狭窄
- C 艾森曼格综合征
- D 较大型室间隔缺损
- E 法洛三联症

2. 该患儿X线检查可见心脏呈

- A "靴状"心影
- B 右心房，右心室增大
- C 左心房，左心室增大
- D 右心室，左心房增大
- E 右心室增大，肺动脉突出

3. 该病常见的并发症是

- A 支气管肺炎
- B 肺水肿
- C 充血性心力衰竭
- D 脑脓肿
- E 喉返神经麻痹

正确答案：EAD 您选择的答案：

第206-208题

4岁男孩，自1岁起出现青紫，逐渐加重，哭闹时明显，有昏厥，抽搐史，喜蹲踞。体检：胸骨左缘第3肋间有2/6级收缩期喷射性杂音，P2减弱，有杵状指。

1. 最可能的诊断是

- A. 房间隔缺损
- B. 室间隔缺损
- C. 动脉导管未闭
- D. 法洛三联症
- E. 肺动脉狭窄

2. 出现昏厥、抽搐的原因是

- A. 肺动脉梗阻，缺氧发作
- B. 脑血栓
- C. 心力衰竭
- D. 中毒性脑病
- E. 低钙惊厥

3. 最可能出现的心电图改变是

- A. P-R间期延长
- B. 不完全性右束支传导阻滞
- C. 期前收缩
- D. 低电压
- E. 右心室肥大

正确答案：DAE 您选择的答案：

四、A4型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第209-213题

5岁女孩，因活动后气促2年就诊。体检：体格较瘦小，无发绀，双肺呼吸音清，P2亢进、分裂，胸骨左缘第2、3肋间闻及2/6级收缩期杂音。

1. 此患儿最可能的诊断是

- A. 动脉导管未闭
- B. 肺动脉狭窄
- C. 房间隔缺损
- D. 室间隔缺损
- E. 主动脉缩窄

2. 此病X线检查，以下哪项是错误的

- A. 右房大
- B. 右室大
- C. 肺门舞蹈
- D. 肺纹理纤细
- E. 肺动脉段突出

3. 如给该患儿做右心导管检查，对诊断最有价值的是

- A. 导管从右心房进入左心室
- B. 右心房血氧含量增高
- C. 右心室血氧含量减低
- D. 右心房压力增高
- E. 肺动脉压力增高

4. 如该患儿胸骨左缘下方闻及舒张期杂音，提示

- A. 三尖瓣相对关闭不全
- B. 三尖瓣相对狭窄
- C. 二尖瓣相对关闭不全
- D. 二尖瓣相对狭窄
- E. 以上都不是

5. 对此病目前最先进的治疗方法是

- A. 开胸修补术
- B. 经导管封堵术
- C. 经导管栓塞术
- D. 经导管修补术
- E. 经导管球囊扩张术

正确答案：CDBBB 您选择的答案：

第214-217题

3岁女孩，因生长发育瘦小，肤色及口唇较黯，怀疑有先天性心脏病就诊。

1. 对初步诊断有意义的首要检查是

- A. 血常规
- B. 全面体格检查
- C. 血T3、T4测定
- D. 胸部X线摄片
- E. 心动电流图

2. 若该患儿体检发现口唇黏膜青紫，胸骨左缘2~3肋间闻及2/6~3/6级收缩期杂音，P2减弱、轻度杵状指(趾)，为进一步明确心病类型，最简便经济的检查是

- A. 动脉血氧饱和度测定
- B. 心动电流图
- C. 心脏X线摄片
- D. 二维超声心动图
- E. 右心导管造影

3. 假如该患儿半年后因不规则发热，头痛3周，偶伴呕吐，又来诊。体检：除心脏原体征外，咽充血，扁桃体二度肿大

伴黄白色渗出，右Barbinski征阳性。血白细胞 $18 \times 10^9/L$ ，淋巴0.86，中性0.14。诊断考虑合并

- A. 渗出性扁桃体炎
- B. 脑脓肿
- C. 脑栓塞
- D. 感染性心内膜炎
- E. 肺部感染

4. 当治疗合并症后，关于进一步治疗应建议家长

- A. 继续随访观察
- B. 预防脱水
- C. 抗生素预防感染
- D. 做分流手术
- E. 施行根治手术

正确答案：BCBE 您选择的答案：

第218-220题

3岁患儿，曾多次患肺炎，平时无发绀。体检：心前区隆起，心尖搏动弥散，胸骨左缘第2肋间闻及3/6级粗糙的连续性机器样杂音，向颈部传导，有连续性震颤，有水冲脉。

1. 该患儿还可有下列哪项体征

- A. 脉压减小
- B. 脉压增大
- C. 下肢血压低
- D. 腹部血管杂音
- E. 三凹征

2. 血流动力学改变是

- A. 体循环血流量增加
- B. 肺循环血流量增加
- C. 肺循环血流量减少
- D. 右向左分流
- E. 左心室舒张期容量减少

3. 心电图可能的结果是

- A. 右心室肥大
- B. 右心房肥大
- C. 左心室肥大
- D. 不完全性右束支阻滞
- E. 左束支阻滞

正确答案：BBC 您选择的答案：

第221-223题

3岁患儿，曾多次患肺炎，平时无发绀。体检：心前区隆起，心尖搏动弥散，胸骨左缘第2肋间闻及3/6级粗糙的连续性机器样杂音，向颈部传导，有连续性震颤，有水冲脉。

1. 右心导管检查可出现的结果是

- A. 股动脉血氧含量低
- B. 右桡动脉血氧含量低
- C. 右心房血氧含量高于上、下腔静脉平均血氧含量
- D. 右心室血氧含量高于右心房
- E. 肺动脉血氧含量高于右心室

2. 如果此患儿心尖部出现舒张中期隆隆样杂音，提示

- A. 肺动脉高压
- B. 肺动脉狭窄
- C. 左向右分流量大
- D. 左向右分流量小
- E. 心功能不全

3. 如果此患儿心尖部仅闻及收缩期杂音，提示合并

- A. 感染性心内膜炎
- B. 主动脉瓣关闭不全

- C. 房间隔缺损
- D. 肺动脉高压
- E. 相对性二尖瓣狭窄

正确答案：ECD 您选择的答案：

五、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第224-227题

- A. 胸骨左缘第3~4肋间闻及3/6~4/6级粗糙的全收缩期杂音
- B. 胸骨左缘第2~3肋间闻及2/6~3/6级喷射性收缩期杂音
- C. 胸骨左缘第2肋间闻及粗糙响亮的连续性机器样杂音
- D. 胸骨左缘第2~4肋间闻及2/6~3/6级喷射性收缩期杂音
- E. 心尖区闻及3/6~4/6级吹风样收缩期杂音

- 1. 房间隔缺损的特征性杂音
- 2. 室间隔缺损的特征性杂音
- 3. 动脉导管未闭的特征性杂音
- 4. 法洛四联症的特征性杂音

正确答案：BACD 您选择的答案：

第228-230题

- A. 室间隔缺损
- B. 房间隔缺损
- C. 动脉导管未闭
- D. 法洛四联症
- E. 完全性大动脉错位

- 1. 肺血多，左心室血流量减少
- 2. 肺动脉高压时可出现差异性青紫
- 3. 儿童期最少出现并发症

正确答案：BCB 您选择的答案：

第231-234题

- A. 右房、右室大，肺动脉段凸出
- B. 左房、左室大，肺动脉段凸出
- C. 左室、右室大，肺动脉段凸出
- D. 右室大，肺动脉段凸出，肺野清晰
- E. 右室大，肺动脉段凹陷，肺野清晰

- 1. 房间隔缺损
- 2. 室间隔缺损
- 3. 动脉导管未闭
- 4. 法洛四联症

正确答案：ACBE 您选择的答案：

第235-237题

- A. 120~140次/分
- B. 110~130次/分
- C. 100~120次/分
- D. 80~100次/分
- E. 70~90次/分

- 1. 婴儿正常心率范围是
- 2. 幼儿正常心率范围是
- 3. 学龄前儿童正常心率是

正确答案：BCD 您选择的答案：

第238-240题

- A. 室间隔缺损
- B. 房间隔缺损
- C. Roger病
- D. 法洛氏四联症
- E. 卵圆孔未闭

- 1. 易并发脑血栓
- 2. 易并发充血性心力衰竭
- 3. 易并发支气管肺炎

正确答案：DAA 您选择的答案：

第241-243题

- A. 房间隔缺损
- B. 室间隔缺损
- C. 动脉导管未闭
- D. 法洛四联症
- E. 肺动脉狭窄

- 1. 右心房血氧含量高于上、下腔静脉平均血氧含量
- 2. 主动脉逆行造影可见主、肺动脉同时显影
- 3. 胸部X线呈现双肺网状肺纹理

正确答案：ACD 您选择的答案：

第244-246题

- A. 室间隔缺损
- B. 房间隔缺损

C. 动脉导管未闭
D. 法洛四联症
E. 艾森曼格综合征
1. 脉压增大, 伴股动脉枪击音
2. P2减低
3. P2亢进, 固定分裂
正确答案: CDB 您选择的答案:

第247-250题
A 室间隔缺损
B 动脉导管未闭合并肺动脉高压
C 房间隔缺损
D 法洛四联症
E 动脉导管未闭
1. X线检查肺动脉段凹陷见于
2. 周围血管征见于
3. 下半身青紫见于
4. 脑缺氧发作常见于
正确答案: DEBD 您选择的答案:

习题集 儿科学 绪论

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 死亡率最高的时期是

- A. 新生儿期
- B. 婴儿期
- C. 幼儿期
- D. 学龄前期
- E. 青春期

正确答案：A 您选择的答案：

第2题 关于幼儿期以下哪项是正确的

- A. 饮食仍以乳类食品为主
- B. 此期是小儿生长发育最快的时期
- C. 生后1~3岁
- D. 具有较大的可塑性，应做好入学前准备
- E. 理解、分析、综合能力逐步改善

正确答案：C 您选择的答案：

第3题 以下哪项不是小儿疾病的特点

- A. 起病急
- B. 变化快
- C. 合并症多
- D. 后遗症多
- E. 感染性疾病多

正确答案：D 您选择的答案：

第4题 以下哪项不是青春期的发育特点

- A. 淋巴系统发育迅速
- B. 生殖系统发育迅速
- C. 体格发育迅速
- D. 一过性甲状腺肿
- E. 心理失调多见

正确答案：A 您选择的答案：

第5题 关于儿科疾病的特点，正确的是

- A. 儿科疾病病种简单，相应患儿的临床表现明显
- B. 儿童免疫功能不完善，对疾病的修复能力差，易遗留后遗症
- C. 儿童用药量应按儿童的身高来计算
- D. 儿童时期适当采取预防措施，可减少成人时某些疾病的发生
- E. 儿童对病情的表诉常有困难，因此向家长了解病史比体格检查更重要

正确答案：D 您选择的答案：

第6题 小儿生长发育的两个高峰是指

- A. 新生儿期，婴儿期
- B. 婴儿期，青春期
- C. 婴儿期，幼儿期
- D. 幼儿期，学龄期
- E. 学龄期，青春期

正确答案：B 您选择的答案：

第7题 新生儿期是指

- A. 从出生到生后满28天
- B. 生后1个月~1岁
- C. 生后1~3岁
- D. 生后3~7岁
- E. 生后7~12岁

正确答案：A 您选择的答案：

第8题 关于青春期的划分，哪项是正确的

- A. 8~18岁
- B. 10~16岁
- C. 10~20岁
- D. 15~20岁
- E. 16~20岁

正确答案：C 您选择的答案：

第9题 小儿年龄阶段的划分中，婴儿期是指

- A. 从出生~28天
- B. 出生~出后12个月
- C. 生后13个月~2岁
- D. 生后2~3岁
- E. 生后3~5岁

正确答案：B 您选择的答案：

第10题 以下哪项不是小儿年龄阶段的划分依据

- A. 身高和体重

B. 生理特点
C. 病理特点
D. 解剖特点
E. 发育规律
正确答案：A 您选择的答案：

第11题 婴儿期指的是
A 从出生后~满1周岁之前
B 从出生后28天~满1周岁之前
C 从出生后1个月~1周岁之前
D 从1岁~2周岁之前
E 从1岁~3周岁之前
正确答案：B 您选择的答案：

第12题 以下哪项符合婴儿期的发育特点
A. 模仿性强
B. 语言发育迅速
C. 体格发育呈加速生长
D. 营养紊乱多见
E. 违拗性强
正确答案：D 您选择的答案：

第13题 我国将围生(产)期定为
A 自妊娠20周到生后7足天
B 自妊娠28周到生后7足天
C 自妊娠20周到生后14足天
D 自妊娠28周到生后14足天
E 自妊娠28周到生后28足天
正确答案：B 您选择的答案：

第14题 新生儿期指的是
A 从孕期28周至生后28天内
B 从孕期28周至生后1个月内
C 从出生后脐带结扎时起至生后28天内
D 从出生后脐带结扎时起至生后30天内
E 从出生后脐带结扎时起至生后1个月内
正确答案：C 您选择的答案：

第15题 幼儿期指的是
A 生后28天~满2周岁
B 生后1个月~满2周岁
C 生后1周岁~满2周岁之前
D 生后1周岁~满3周岁之前
E 生后2周岁~满3周岁之前
正确答案：D 您选择的答案：

第16题 幼儿期是指
A. 1岁以后到满2周岁以前
B. 2岁以后到满3周岁以前
C. 1岁以后到满3周岁以前
D. 1岁以后到满4周岁以前
E. 2岁以后到满4周岁以前
正确答案：C 您选择的答案：

二、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第17-18题
A. 死亡率最高的时期
B. 易患感染性疾病的时期
C. 食物的品种和质量发生转换的时期
D. 易患免疫性疾病的时期
E. 生殖系统发育最快的时期
1. 幼儿期
2. 学龄前期
正确答案：CD 您选择的答案：

习题集 儿科学 新生儿与新生儿疾病

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 新生儿早发型败血症是指

- A 生后1天内起病
- B 生后一周尤其3天内起病
- C 生后3天~7天后发病
- D 出生7天后发病
- E 出生10天发病

正确答案：B 您选择的答案：

第2题 关于新生儿窒息的复苏方案中，以下哪项是错误的

- A 清除呼吸道黏液
- B 用复苏器加压给氧
- C 应用肾上腺素
- D 胸外按压心脏
- E 给予足量抗生素

正确答案：E 您选择的答案：

第3题 新生儿缺氧缺血性脑病多见于

- A 早产儿
- B 小于胎龄儿
- C 足月儿
- D 微小儿
- E 足月小样儿

正确答案：C 您选择的答案：

第4题 新生儿寒冷损伤综合征发病的内因是

- A 体内热量不足，皮下脂肪中饱和脂肪酸含量多
- B 体内热量不足，皮下脂肪中不饱和脂肪酸含量多
- C 体内含棕色脂肪较多
- D 早产
- E 感染或窒息

正确答案：A 您选择的答案：

第5题 新生儿溶血病中A、B、O血型不合的溶血症最确切的诊断依据为

- A 黄疸出现较早，进展很快
- B 贫血肝脾肿大，网织红细胞增高
- C 母亲的血型为O型，小儿血型为A型
- D 新生儿血清胆红素增高同时，血色素明显下降
- E 血型抗体(游离、释放试验)阳性

正确答案：E 您选择的答案：

第6题 核黄疸的发生与下列哪项血清浓度升高关系较大

- A 总胆红素
- B 结合胆红素
- C 未结合胆红素
- D 血浆球蛋白
- E 血钠浓度

正确答案：C 您选择的答案：

第7题 新生儿轻度窒息，Apgar评分标准为

- A 0~3分
- B 3~5分
- C 4~7分
- D 5~8分
- E 6~9分

正确答案：C 您选择的答案：

第8题 正常足月儿生后可抱至母亲处给予吸吮的时间是

- A 生后半小时左右
- B 生后1小时左右
- C 生后2小时左右
- D 生后4小时左右
- E 生后8小时左右

正确答案：A 您选择的答案：

第9题 新生儿血液中免疫球蛋白从母体通过胎盘获得的是

- A IgA
- B IgD
- C IgG
- D IgM
- E IgE

正确答案：C 您选择的答案：

第10题 Rh溶血病的临床表现如下，除了

- A 黄疸

- B. 胎儿水肿
- C. DIC症状
- D. 贫血
- E. 核黄疸症状

正确答案：C 您选择的答案：

第11题 新生儿生后2~3天出现黄疸者最常见的是

- A 败血症
- B 母乳性黄疸
- C 新生儿肺炎
- D 生理性黄疸
- E 胆道闭索

正确答案：D 您选择的答案：

第12题 新生儿生后

- A 6小时内排出胎便
- B 12小时内排出胎便
- C 18小时内排出胎便
- D 24小时内排出胎便
- E 36小时内排出胎便

正确答案：D 您选择的答案：

第13题 关于败血症的产前感染途径，以下哪项是错误的

- A. 孕母妊娠后期有菌血症
- B. 羊膜囊穿刺
- C. 经宫颈取绒毛标本
- D. 宫内输血消毒不严
- E. 经脐部感染胎儿

正确答案：E 您选择的答案：

第14题 产后感染引起新生儿败血症最常见的病原菌是

- A B群链球菌
- B 大肠杆菌
- C 金葡菌
- D 绿脓杆菌
- E 肠杆菌

正确答案：C 您选择的答案：

第15题 新生儿接种卡介苗的时间是

- A 出生后1天
- B 出生后2天
- C 出生后3天
- D 出生后4天
- E 出生后7天

正确答案：C 您选择的答案：

第16题 引起新生儿败血症的病原菌种类随不同的地区和年代而异，我国一直最常见的是

- A 葡萄球菌
- B 大肠杆菌
- C B群链球菌(CBS)
- D 表皮葡萄球菌
- E 绿脓杆菌

正确答案：A 您选择的答案：

第17题 关于新生儿胆红素代谢特点，以下哪项是错误的

- A. 胆红素生成增多
- B. 转运胆红素能力不足
- C. 肝脏葡萄糖醛酸转移酶活性低
- D. 肠道内β-葡萄糖醛酸苷酶活性较低
- E. 肝细胞内Y、Z蛋白含量低

正确答案：D 您选择的答案：

第18题 10天新生儿，近4天吃奶不好，抽搐2次。周身皮肤黄染，脐部少许脓性分泌物，前囟较饱满，颈部有抵抗感，白细胞 $25.0 \times 10^9/L$ 、中性74%，诊断考虑

- A. 新生儿败血症、脐炎
- B. 新生儿败血症、颅内出血
- C. 新生儿败血症、低钙抽搐
- D. 新生儿败血症、化脓性脑膜炎
- E. 新生儿败血症、肝炎

正确答案：D 您选择的答案：

第19题 关于早产儿的概念，是指

- A. 胎龄不足36周，体重<2500g
- B. 胎龄不足37周，体重<2500g
- C. 胎龄不足37周，无论体重是多少
- D. 胎龄不足38周，体重<2500g
- E. 胎龄不足39周，体重<2500g

正确答案：C 您选择的答案：

第20题 重度新生儿寒冷损伤，临终前易出现

- A. 肺出血
- B. 肾出血
- C. 硬肿部位出血
- D. 颅内出血
- E. 消化道出血

正确答案：A 您选择的答案：

第21题 新生儿寒冷损伤综合征的发病机制与下列哪项无关

- A. 早产，体温调节中枢发育不成熟
- B. 体表面积相对较大
- C. 棕色脂肪含量少
- D. 免疫功能低下
- E. 寒冷损伤

正确答案：D 您选择的答案：

第22题 治疗新生儿缺氧缺血性脑病控制惊厥首选

- A. 苯巴比妥钠
- B. 安定
- C. 水合氯醛
- D. 氯丙嗪
- E. 苯妥英钠

正确答案：A 您选择的答案：

第23题 母乳性黄疸的特点，下列哪项是错误的

- A. 多于生后4~7天出现黄疸
- B. 血清胆红素可 $>342\mu\text{mol/L}$ (20mg/dl)但尚无核黄疸报告
- C. 胆红素在停止哺乳24~72小时后即下降
- D. 胃纳差，体重不增
- E. 继续哺乳1~4月胆红素亦降至正常

正确答案：D 您选择的答案：

第24题 下列哪一项与新生儿肺透明膜病的病理生理无关

- A. 肺内淋巴管和静脉运转液体功能不完善
- B. 肺泡表面活性物质缺乏，表面张力增加，呼气时肺泡萎陷
- C. 气体交换减少，产生缺氧、酸中毒，肺血管痉挛使青紫加重
- D. 肺组织缺氧，毛细血管和肺泡壁渗透性增高，液体外漏
- E. 血浆纤维蛋白渗入肺泡，形成嗜伊红透明膜，更阻碍了换气

正确答案：A 您选择的答案：

第25题 足月，剖宫产，生后呼吸困难，鼻扇，口周发绀，双肺有细小水泡音，经吸氧、抗感染等治疗，第二天明显好转，该患儿可能是

- A. 胎粪吸入综合征
- B. 新生儿肺炎
- C. 肺透明膜病
- D. 湿肺
- E. 先心病

正确答案：D 您选择的答案：

第26题 新生儿肠腔内 β -葡萄糖醛酸苷酶的主要作用是

- A. 水解结合胆红素
- B. 水解葡萄糖醛酸
- C. 水解间接胆红素
- D. 促进合成结合胆红素
- E. 促进合成葡萄糖醛酸转移酶

正确答案：A 您选择的答案：

第27题 关于新生儿败血症，以下哪项是错误的

- A. 新生儿易患败血症是因为免疫功能不完善
- B. 在我国新生儿败血症的主要病原体是B组链球菌
- C. 新生儿败血症引起高胆红素血症时有可能并发核黄疸
- D. 血培养阳性是新生儿败血症的可靠诊断依据
- E. 新生儿败血症出现硬肿是感染严重的表现

正确答案：B 您选择的答案：

第28题 足月儿是指

- A. 胎龄 >30 周至 <40 周的新生儿
- B. 胎龄 >37 周至 <40 周的新生儿
- C. 胎龄 >37 周至 <42 足周的新生儿
- D. 胎龄 >20 周至第37周的新生儿
- E. 胎龄 >30 周至 <37 足周的新生儿

正确答案：C 您选择的答案：

第29题 下列哪一项不是光疗副作用

- A. 青铜症
- B. 皮疹
- C. 肝脾增大
- D. 腹泻
- E. 发热

正确答案：C 您选择的答案：

第30题 足月儿生后第1小时内呼吸率可达

- A 40~50次/分
- B 50~60次/分
- C 60~70次/分
- D 60~80次/分
- E 70~80次/分

正确答案：D 您选择的答案：

第31题 关于早产儿的喂养，下述哪项是错误的

- A. 早开奶，刺激母乳分泌
- B. 吮吸能力差者可予滴管或胃管喂养
- C. 每次喂奶量约2~5ml
- D. 每次增加奶量1~2ml
- E. 根据出生体重确定哺乳间隔时间

正确答案：A 您选择的答案：

第32题 新生儿每日共需热量约为

- A 334.4~376.2kJ/kg(80~90kcal/kg)
- B 376.2~418kJ/kg(90~100kcal/kg)
- C 418~459.8kJ/kg(100~110kcal/kg)
- D 418~502kJ/kg(100~120kcal/kg)
- E 418~534kJ/kg(100~130kcal/kg)

正确答案：D 您选择的答案：

第33题 新生儿硬肿症有下列特点，但除外

- A. 常因寒冷、感染、早产引起
- B. 大多数患儿伴有低体温
- C. 凡有皮下脂肪积聚的部位均可发生硬肿
- D. 可伴有水肿
- E. 硬肿部位可有波动

正确答案：E 您选择的答案：

第34题 新生儿寒冷损伤综合征，硬肿最先出现的部位是

- A. 面颊部
- B. 上肢
- C. 臀部
- D. 躯干部
- E. 小腿及大腿外侧

正确答案：E 您选择的答案：

第35题 新生儿是指从出生到生后

- A 14天内的婴儿
- B 28天内的婴儿
- C 30天内的婴儿
- D 32天内的婴儿
- E 60天内的婴儿

正确答案：B 您选择的答案：

第36题 关于新生儿溶血病的实验室检查，以下哪项不正确

- A. 红细胞、血红蛋白减少
- B. 血清间接胆红素升高
- C. 母婴ABO和Rh血型有不合的证据存在
- D. 患儿红细胞直接抗人球蛋白试验阴性可确诊溶血病
- E. 网织红细胞和有核红细胞增高

正确答案：D 您选择的答案：

第37题 新生儿败血症主要感染途径是

- A. 胎内
- B. 产道
- C. 脐部
- D. 肠道
- E. 口腔粘膜

正确答案：C 您选择的答案：

第38题 关于缺氧缺血性脑病，以下哪项不正确

- A. 发生于窒息的足月儿
- B. 脑组织的水肿、软化、坏死和出血为主要病变
- C. 症状大多出现在生后3天内
- D. 轻症以兴奋症状常见，重症以抑制症状常见
- E. 因脑缺氧不宜用镇静药

正确答案：E 您选择的答案：

第39题 关于新生儿硬肿症复温方法正确的是

- A. 使其体温于4小时内恢复正常
- B. 逐渐复温，希望12~24小时内，使体温恢复正常
- C. 使体温在12小时内恢复正常
- D. 使体温在36小时内恢复正常
- E. 使体温在48小时内恢复正常

正确答案：B 您选择的答案：

第40题 A、B、O血型不合的新生儿溶血症，需要换血时最适合的血液为

- A 0型全血
- B 0型血细胞和AB型血浆
- C 0型血浆和AB型血细胞
- D 与新生儿相同的ABO血型
- E 与新生儿相同的血细胞，与母亲血型相同的水浆

正确答案：B 您选择的答案：

第41题 新生儿败血症的感染途径最常见的是

- A 母孕期血内有细菌时经胎盘血行感染胎儿
- B 胎膜早破
- C 产时胎儿通过产道时吸入
- D 产后感染
- E 羊水穿刺

正确答案：D 您选择的答案：

第42题 关于正常足月儿的生理特点，下述哪项是错误的

- A 出生1小时后呼吸40次 / 分
- B 睡眠时平均心率140次 / 分
- C 脊髓末端约在第3、4腰椎下缘
- D 腹壁反射，提睾反射均可引出
- E 生后10日内不需补钾

正确答案：D 您选择的答案：

第43题 新生儿肺透明膜病生后24小时胸部X线表现如下，但除外

- A 两侧肺野普遍性透明度减低
- B 内有均匀的细小颗粒和网状阴影
- C 支气管充气征
- D 有时出现局限性肺气肿
- E 严重时肺野全部一致性密度增高，心影看不清即"白肺"

正确答案：D 您选择的答案：

第44题 关于新生儿病理性黄疸的特点哪项是正确的

- A 黄疸多在生后24小时内出现
- B 胆红素每日上升不超过5mS/dl
- C 黄疸2周消失
- D 黄疸持续时间超过1周
- E 早产儿黄疸于3周内逐渐消退

正确答案：A 您选择的答案：

第45题 关于新生儿胆红素生成较多的原因，以下哪项不正确

- A 胎儿处于相对缺氧的环境中，红细胞相对较多
- B 出生后环境氧分压提高
- C 胎儿血红蛋白半衰期比成人长
- D 新生儿红细胞寿命短
- E 旁路胆红素生成较多

正确答案：C 您选择的答案：

第46题 治疗新生儿缺氧缺血性脑病控制惊厥首选苯巴比妥，其负荷量为

- A 5mg / kg
- B 10mg / kg
- C 15mg / kg
- D 20mg / kg
- E 25mg / kg

正确答案：D 您选择的答案：

第47题 对Rh溶血病换血时，应选用的血液为

- A Rh和ABO系统均与母亲相同
- B Rh系统与母亲相同，ABO系统与新生儿相同
- C Rh和ABO系统均与新生儿相同
- D Rh系统与新生儿相同，ABO系统与母亲相同
- E Rh系统与母亲相同的"0"型血

正确答案：B 您选择的答案：

第48题 下列哪一项反射不属于新生儿的原始反射

- A 吸吮反射
- B 腹壁反射
- C 拥抱反射
- D 握持反射
- E 觅食反射

正确答案：B 您选择的答案：

第49题 新生儿消化系统特点中，下列哪项是错误的

- A 贲门括约肌发达
- B 幽门括约肌较发达
- C 下食管括约肌压力低
- D 胃底发育差，呈水平位
- E 肠管壁较薄，通透性高

正确答案：A 您选择的答案：

第50题 新生儿缺氧缺血性所致颅内出血多见于

- A. 早产儿
- B. 足月小样儿
- C. 巨大儿
- D. 适于龄儿
- E. 足月儿

正确答案：A 您选择的答案：

第51题 以下哪项检查在诊断新生儿溶血症时最为重要

- A. 血常规
- B. 母儿血型
- C. 网织红细胞
- D. 抗人球蛋白试验
- E. 红细胞脆性试验

正确答案：B 您选择的答案：

第52题 足月婴儿臀位产，生后第二天突然抽搐、尖叫。查体：前囟饱满、肌张力低、唇微绀，心率132次/分，肺未闻及啰音。化验：白细胞 $10.0 \times 10^9/L$ ，中性核55%，血钙 $2mmol/L$ ($8mg/dl$)，最可能的诊断是

- A. 低钙血症
- B. 颅内出血
- C. 败血症
- D. 化脓性脑膜炎
- E. 肺炎

正确答案：B 您选择的答案：

第53题 新生儿败血症国内最常见的病原体是

- A. 大肠杆菌
- B. 厌氧菌
- C. 葡萄球菌
- D. 溶血性链球菌
- E. 肺炎球菌

正确答案：C 您选择的答案：

第54题 严重新生儿溶血的患儿生后第一天处理哪些是不正确的

- A. 光照疗法
- B. 立即用压缩红细胞换血，以改善胎儿水肿
- C. 多输白蛋白，以预防胆红素脑病
- D. 交换输血
- E. 防止低血糖，低体温

正确答案：C 您选择的答案：

第55题 新生儿化脓性脑膜炎，常并发于

- A. 骨髓炎
- B. 尿路感染
- C. 肺炎
- D. 肠炎
- E. 败血症

正确答案：E 您选择的答案：

第56题 关于早产儿的保暖措施，以下哪项是正确的

- A. 根据体重、日龄选择适中的温度
- B. 头部戴绒布帽
- C. 体温低时不宜沐浴
- D. 使用热水袋时应避免烫伤
- E. 以上均正确

正确答案：E 您选择的答案：

第57题 关于正常足月新生儿的概念，以下哪项不正确

- A. 胎龄满37周至42周
- B. 体重大于2500g
- C. 身长大于47cm
- D. 无畸形和疾病
- E. 体重大于3000g

正确答案：E 您选择的答案：

第58题 新生儿败血症常见的临床表现，以下哪项不正确

- A. 精神差，拒乳
- B. 黄疸退而复现或进行性加重
- C. 腹胀，肝脾肿大
- D. 均有高热，体温达 39.0 以上
- E. 皮肤发花

正确答案：D 您选择的答案：

第59题 约60%足月儿和80%以上的早产儿可于生后

- A. 生后1~2天出现黄疸
- B. 生后2~3天出现黄疸
- C. 生后2~4天出现黄疸
- D. 生后2~5天出现黄疸

E 生后2~6天出现黄疸

正确答案：D 您选择的答案：

第60题 新生儿娩出后，心率为96次/分，呼吸佳，四肢能活动，吸液刺激喉部有些动作，全身皮肤红润，该小儿按Apgar评分法可评为

- A. 10分
- B. 9分
- C. 8分
- D. 7分
- E. 6分

正确答案：C 您选择的答案：

第61题 新生儿生理性黄疸，下列哪项是错误的

- A 生后2~5天出现黄疸
- B 一般情况良好
- C 足月儿14天内消退
- D 早产儿4周内消退
- E 血清胆红素 $< 257 \mu\text{mol/L}$ (15mg/dl)

正确答案：E 您选择的答案：

第62题 新生儿生后24小时内出现黄疸，应首先考虑

- A. 新生儿肝炎
- B. 新生儿溶血病
- C. 新生儿败血症
- D. 新生儿肺炎
- E. 母乳性黄疸

正确答案：B 您选择的答案：

第63题 新生儿ABO血型不合溶血症的病因是

- A. 同族免疫性溶血
- B. 红细胞膜的缺陷
- C. 红细胞酶的缺陷
- D. 异常血红蛋白
- E. 异族免疫性溶血

正确答案：A 您选择的答案：

第64题 新生儿由抗D引起的Rh溶血症发生在

- A. 母亲Rh阳性，胎儿Rh阴性
- B. 母亲Rh阴性，胎儿Rh阴性
- C. 母亲Rh阳性，胎儿Rh阳性
- D. 母亲Rh阴性，胎儿Rh阴性或阳性
- E. 母亲Rh阴性，胎儿Rh阳性

正确答案：E 您选择的答案：

第65题 产时窒息的紧急治疗措施首先是

- A. 弹足底，刺激呼吸
- B. 吸氧
- C. 人工呼吸
- D. 注射呼吸兴奋剂
- E. 清除呼吸道分泌物

正确答案：E 您选择的答案：

第66题 新生儿出生时有窒息，经抢救2~4分钟后呼吸恢复，生后5小时出现烦躁、尖叫、囟门饱满、拥抱反射消失，最可能诊断是

- A. 新生儿败血症
- B. 新生儿脑膜炎
- C. 新生儿颅内出血
- D. 新生儿低血钙
- E. 新生儿低血糖

正确答案：C 您选择的答案：

第67题 关于新生儿胆红素脑病，以下哪项是错误的

- A. 多发生于生后2~7天
- B. 早产儿多见
- C. 随黄疸加重而出现神经系统症状
- D. 死亡率高
- E. 幸存者症状逐渐恢复，无神经系统后遗症

正确答案：E 您选择的答案：

第68题 轻度新生儿缺氧缺血性脑病症状最明显的时间是

- A 出生6小时内
- B 出生12小时内
- C 出生24小时内
- D 出生48小时内
- E 出生72小时内

正确答案：C 您选择的答案：

第69题 新生儿ABO血型不合是指

- A 母亲为A型，婴儿是O型

B 母亲为B型，婴儿是O型
C 母亲为AB型，婴儿是O型
D 母亲为O型，婴儿是A或B型
E 母亲为O型，婴儿是AB型
正确答案：D 您选择的答案：

第70题 新生儿败血症主要的感染途径是

A．胎内
B．产道
C．肠道
D．脐部
E．口腔黏膜
正确答案：D 您选择的答案：

第71题 新生儿溶血病的产后治疗生后1天内禁用

A 压缩红细胞换血
B 白蛋白
C 光照疗法
D 换血疗法
E 5%碳酸氢钠
正确答案：B 您选择的答案：

第72题 新生儿硬肿症治疗首先是

A．补液
B．喂养
C．复温
D．抗生素
E．肾上腺皮质激素
正确答案：C 您选择的答案：

第73题 治疗轻度新生儿寒冷损伤，首先采取

A．中药治疗
B．激光治疗
C．维生素C治疗
D．复温治疗
E．光疗
正确答案：D 您选择的答案：

第74题 新生儿败血症病原体未明确时，首选的抗生素是

A．红霉素+氯霉素
B．林可霉素+氯霉素
C．新生霉素+新青霉素
D．青霉素类+氨基糖苷类
E．青霉素类+四环素
正确答案：D 您选择的答案：

第75题 生后24小时内出现黄疸者，应首先考虑

A 新生儿肝炎
B 胆道闭索
C 新生儿溶血病
D 败血症
E 母乳性黄疸
正确答案：C 您选择的答案：

第76题 新生儿败血症早期最主要的特点是

A．高热
B．白细胞总数升高
C．皮肤有感染
D．硬肿
E．缺乏特异症状
正确答案：E 您选择的答案：

第77题 中度新生儿缺氧缺血性脑病症状最明显的时间是

A 生后6～8小时
B 生后8～12小时
C 生后12～24小时
D 生后24～48小时
E 生后24～72小时
正确答案：E 您选择的答案：

第78题 一新生儿于生后24小时内出现黄疸，最恰当的处理是

A．正常现象，可暂时观察
B．做细菌培养及药敏试验
C．肝功血清学检查
D．检测母子血型
E．肝胆B超
正确答案：D 您选择的答案：

第79题 新生儿窒息复苏时最根本的是

A 尽量吸尽呼吸道粘液

B 触觉刺激
C 复苏器加压给氧
D 胸外按压心脏
E 喉镜下经口气管插管
正确答案：A 您选择的答案：

第80题 ABO母子血型不合溶血症诊断的最主要依据为

A．生后24小时内出现黄疸
B．贫血、肝脾肿大、黄疸出现早，进展快
C．母血型是O型，子血型是A型
D．母血型是O型，子血型是B型
E．血型抗体(游离，释放试验)阳性
正确答案：E 您选择的答案：

第81题 月新生儿肝细胞内葡萄糖醛酸转移酶的活性于生后多久可达正常水平

A．生后1周内
B．生后1周后
C．生后2周后
D．生后3周后
E．生后4周后
正确答案：B 您选择的答案：

第82题 关于足月儿的外观特点，下列哪项是错误的

A．肤色红润，皮下脂肪丰富
B．鼻软骨发育良好
C．指(趾)甲过指尖
D．足底纹理多
E．女婴大阴唇不能遮盖小阴唇
正确答案：E 您选择的答案：

第83题 新生儿溶血病发生胆红素脑病(核黄疸)一般在生后

A 1~2天
B 2~3天
C 2~4天
D 2~5天
E 2~7天
正确答案：E 您选择的答案：

第84题 一新生儿患Rh溶血病，以下哪种情况不会出现

A．母亲RhD阴性，胎儿RhD阳性
B．Rh溶血病多发生于第二胎
C．Rh溶血病多发生于未输过血母亲的首次妊娠中
D．Rh溶血病症状随胎次增加而加重
E．母体产生抗Rh-IgG抗体进入胎儿母体内产生溶血
正确答案：C 您选择的答案：

第85题 判定新生儿轻度窒息是指生后1分钟的Apgar评分为

A 0~1分
B 2~3分
C 4~7分
D 5~8分
E 8~10分
正确答案：C 您选择的答案：

第86题 母乳性黄疸出现黄疸的时间

A 多于生后1天
B 多于生后2~3天
C 多于生后4~7天
D 多于生后8~9天
E 多于生后10天
正确答案：C 您选择的答案：

第87题 早产儿指

A 胎龄>20周至37足周的新生儿
B 胎龄>28周至<37足周的新生儿
C 胎龄>28周至第37周的新生儿
D 胎龄>20周至第37周的新生儿
E 胎龄>30周至<37足周的新生儿
正确答案：B 您选择的答案：

第88题 诊断新生儿胆溶血病有确诊价值的试验是

A 母亲血型
B 婴儿血型
C 患儿红细胞直接抗人球蛋白试验
D 患儿血清游离抗体
E 改良法抗人球蛋白试验
正确答案：C 您选择的答案：

第89题 新生儿重度窒息，Apgar评分标准为

A．0~3分

- B. 0~5分
- C. 0~6分
- D. 0~2分
- E. 0~4分

正确答案：A 您选择的答案：

第90题 关于新生儿生理性黄疸的临床特点，以下哪项是错误的

- A. 生后2~3天出现，4~5天高峰
- B. 一般情况良好
- C. 足月儿2周内消退
- D. 早产儿3~4周消退
- E. 足月儿、早产儿的血清胆红素上限值均为 $205 \sim 257 \mu\text{mol/L}$

正确答案：E 您选择的答案：

第91题 新生儿红细胞寿命多为

- A. 60~80天
- B. 70~90天
- C. 80~100天
- D. 90~110天
- E. 100~120天

正确答案：C 您选择的答案：

第92题 下列足月新生儿特点，哪项不正确

- A. 生后第1小时内呼吸率可达60~80次/分
- B. 血压平均为 $9.3/6.7 \text{ kPa}$
- C. 生后24小时后排出胎便
- D. 具备拥抱反射
- E. 巴氏征阳性

正确答案：C 您选择的答案：

第93题 足月新生儿睡眠时平均心率为

- A. 100次/分
- B. 110次/分
- C. 120次/分
- D. 130次/分
- E. 140次/分

正确答案：C 您选择的答案：

第94题 新生儿肺透明膜病出现呼吸困难的时间一般不超过

- A. 出生后即刻
- B. 生后6小时内
- C. 生后12小时内
- D. 生后24小时内
- E. 生后72小时

正确答案：C 您选择的答案：

第95题 重度新生儿缺氧缺血性脑病症状最明显的时间是

- A. 初生至6小时
- B. 初生至12小时
- C. 初生至24小时
- D. 初生至48小时
- E. 初生至72小时

正确答案：E 您选择的答案：

第96题 新生儿病理性黄疸，下列哪项是错误的

- A. 生后24小时内出现黄疸
- B. 血清胆红素 $> 205 \mu\text{mol/L}$ (12 mg/dl)
- C. 足月儿黄疸持续 > 2 周，早产儿黄疸持续 > 4 周
- D. 黄疸退而复现
- E. 血清结合胆红素 $> 17.1 \mu\text{mol/L}$ (1 mg/dl)

正确答案：E 您选择的答案：

第97题 关于过期产儿的概念是

- A. 胎龄 > 37 周
- B. 胎龄 > 38 周
- C. 胎龄 > 40 周
- D. 胎龄 > 42 周
- E. 胎龄 > 44 周

正确答案：D 您选择的答案：

第98题 正常足月新生儿

- A. 出生体重 $2000 \sim 2499 \text{ g}$
- B. 出生体重 $2500 \sim 3999 \text{ g}$
- C. 出生体重 $2500 \sim 3000 \text{ g}$
- D. 出生体重 $3000 \sim 3999 \text{ g}$
- E. 出生体重 $> 4000 \text{ g}$

正确答案：B 您选择的答案：

第99题 关于早产儿的生理特点，下述哪项是错误的

- A. 胎粪排出延迟
 - B. 血容量范围在89 ~ 105ml / kg
 - C. 产热储备不足
 - D. 常可发生低钙血症
 - E. 免疫球蛋白水平与足月儿相似
- 正确答案：E 您选择的答案：

第100题 新生儿Apgar评分体征中，以下哪项是无关的

- A. 皮肤颜色
- B. 心率和呼吸次数
- C. 弹足底反应
- D. 肌肉张力
- E. 出生体重

正确答案：E 您选择的答案：

第101题 新生儿败血症时最有诊断意义的是

- A. 高热
- B. 白细胞和中性粒细胞升高
- C. 皮肤感染灶
- D. 无特征性
- E. 血培养细菌阳性

正确答案：E 您选择的答案：

第102题 诊断新生儿寒冷损伤综合征的主要依据是

- A. 早产，缺氧，呼吸困难，体温不升
- B. 足背、手背、眼睑、头皮水肿，体温不升
- C. 枕、背、臀受压部皮肤变硬水肿
- D. 四肢躯干皮肤及皮下组织硬化水肿，体温不升，活动少
- E. 面色苍白，呼吸浅快、暂停，心率快，体温不升

正确答案：D 您选择的答案：

第103题 新生儿排胎便时间多在

- A. 生后6小时内
- B. 生后8小时内
- C. 生后10小时内
- D. 生后12小时内
- E. 生后24小时内

正确答案：E 您选择的答案：

第104题 ABO血型不合的新生儿溶血病可发生于第1胎，因自然界的ABO抗原因子可使O型血母亲的血清中产生

- A. IgA抗A或B
- B. IgG抗A或B
- C. IgM抗A或B
- D. IgE抗A或B
- E. 以上都不是

正确答案：B 您选择的答案：

第105题 新生儿缺氧缺血性脑病下列哪一项不正确

- A. 有宫内窘迫或出生窒息时
- B. 多见于早产儿
- C. 可出现意识障碍
- D. 原始反射减弱或消失
- E. 肌张力增高或减弱

正确答案：B 您选择的答案：

第106题 关于重度新生儿寒冷损伤的治疗，以下哪项不正确

- A. 液体量按1ml / kcal 给予
- B. 使患儿体温36 ~ 48小时恢复正常
- C. 热量供给以每日209 . 2kJ (50kcal) / kg开始
- D. 根据并发感染性质选用抗生素
- E. 有出血倾向者可静脉滴入维生素K

正确答案：B 您选择的答案：

第107题 新生儿神经系统反射，下列哪项不正确

- A. 觅食反射
- B. 吸吮反射
- C. 克氏征阳性
- D. 拥抱反射
- E. 腹壁反射稳定

正确答案：E 您选择的答案：

第108题 可使新生儿黄疸加重的因素下列哪项不正确

- A. 饥饿
- B. 缺氧
- C. 便秘
- D. 失水
- E. 低热

正确答案：E 您选择的答案：

第109题 小于胎龄儿的定义是

- A. 体重小于2500克
B. 体重小于同龄正常体重的50百分位以下
C. 体重小于同龄正常体重的10百分位以下
D. 体重小于同龄正常体重的90百分位以下
E. 足月儿，但体重小于3000克
正确答案：C 您选择的答案：

第110题 新生儿黄疸的治疗重点是
A. 降低胆红素，防止核黄疸的发生
B. 控制感染
C. 对症治疗
D. 光照疗法
E. 换血疗法
正确答案：A 您选择的答案：

第111题 新生儿出生3天后出现黄疸者，下列哪项不可能
A. 败血症
B. 新生儿肺炎
C. 胆道闭锁
D. 母乳性黄疸
E. 新生儿溶血病
正确答案：E 您选择的答案：

第112题 下列哪项在诊断ABO溶血时最有意义
A. 改良Coombs试验
B. 游离抗体试验
C. 胎儿血红蛋白测定
D. 红细胞脆性试验
E. 网织红细胞
正确答案：A 您选择的答案：

第113题 关于早产儿的外观特点，下述哪项是错误的
A. 皮肤发亮，水肿，毳毛多
B. 头发分条清楚
C. 耳廓软骨发育不良，耳廓紧贴颞骨
D. 乳腺结节<4mm
E. 男婴睾丸未进入阴囊
正确答案：B 您选择的答案：

第114题 关于ABO溶血母婴血型不合，以下哪种情况最多见母血型婴儿血型
A. AB0
B. ABA或B
C. A或BO
D. OAB
E. OA或B
正确答案：E 您选择的答案：

第115题 关于病理性黄疸的临床特点，以下哪项不正确
A. 生后24小时内出现
B. 无论早产儿还是足月儿，血清胆红素均>205~257μmol/L
C. 足月儿黄疸持续2周不消退
D. 早产儿持续4周不消退
E. 黄疸退而复现
正确答案：B 您选择的答案：

第116题 生后10天患儿，近4天吃奶不好，周身凉，哭声弱，抽搐1次，查体：面色发灰，皮肤明显黄染，脐窝少许脓性分泌物，前囟饱满，为明确诊断首先检查的项目是
A. 血糖测定及胰岛素定量
B. 血钙、磷及硷性磷酸酶定量
C. 血镁定量
D. 脑B超或脑CT检查
E. 血细菌培养及脑脊液检查
正确答案：E 您选择的答案：

第117题 新生儿生后4~5天，气促、发绀、吐沫、呼吸快，肺部听诊，双肺呼吸音正常，最可能的诊断
A. 新生儿窒息
B. 新生儿RDS
C. 新生儿低血糖
D. 新生儿颅内出血
E. 新生儿肺炎
正确答案：E 您选择的答案：

第118题 下列新生儿胎便的特点哪项是错误的
A. 新生儿12小时内排出胎便
B. 由肠粘膜脱落的上皮细胞，羊水及消化液组成
C. 墨绿色
D. 3~4天排完
E. 早产儿胎便排出常延迟
正确答案：A 您选择的答案：

第119题 新生儿期是指

- A. 脐带结扎至生后27天
- B. 脐带结扎至生后28天
- C. 脐带结扎至生后30天
- D. 脐带结扎至生后40天
- E. 脐带结扎至生后50天

正确答案：B 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第120题 女婴，足月顺产，生后15小时出现黄疸，总胆红素 $102\mu\text{mol/L}$ ，第2、3天血清胆红素分别为 $204\mu\text{mol/L}$ ，和 $306\mu\text{mol/L}$ 。为明确诊断，首选哪些检查

- A 血型及血型抗体检查
- B 肝功能检查
- C 红细胞C-6PD活性测定
- D 血培养及白细胞分类计数
- E 血清甲胎蛋白含量测定

正确答案：A 您选择的答案：

第121题 患儿日龄3天，足月顺产，生后2天出现黄疸，迅速加重，一般状态尚好。血清胆红素 $298\mu\text{mol/L}$ ，母血O型，子血A型，抗体释放试验阳性。下列治疗措施哪一项应先考虑

- A 光照疗法
- B 换血疗法
- C 输血浆
- D 纠正酸中毒
- E 苯巴比妥

正确答案：A 您选择的答案：

第122题 足月儿，有窒息史，生后2天嗜睡，面色微绀，呼吸32次/分，心率95次/分，前囟紧张，心音较低钝，四肢肌张力差，拥抱反射消失。最可能的诊断是

- A. 吸入综合征
- B. 湿肺
- C. 新生儿肺透明膜病
- D. 缺血缺氧性脑病
- E. 低血糖

正确答案：D 您选择的答案：

第123题 一新生儿娩出1分钟时心率为96次/分，呼吸不规则，20次/分，四肢活动好，弹足底能皱眉，躯体肤红，四肢青紫。Apgar评分为

- A. 9分
- B. 8分
- C. 7分
- D. 6分
- E. 5分

正确答案：D 您选择的答案：

第124题 一足月儿生后5分钟检查，心率120次/分，四肢末梢发绀，肌张力正常，哭声响，导管插鼻打喷嚏。Apgar评分为

- A. 6分
- B. 7分
- C. 8分
- D. 9分
- E. 10分

正确答案：D 您选择的答案：

第125题 足月儿生后2天出现黄疸，母血AB型，第3天血清胆红素 $18.81\mu\text{mol/L}$ (11mg/dl)。本例诊断最大可能是

- A ABO溶血病
- B Rh溶血病
- C 生理性黄疸
- D 败血症
- E 胆道闭锁

正确答案：C 您选择的答案：

第126题 一足月儿分娩时脐带绕颈，Apgar评分1分钟与5分钟分别为3、7分，经复苏抢救于生后6小时出现激惹，拥抱反射增强，肌张力高。最可能的诊断是

- A. 新生儿低血钙
- B. 新生儿低血糖
- C. 新生儿脑膜炎
- D. 室管膜下出血
- E. 新生儿缺氧缺血性脑病

正确答案：E 您选择的答案：

第127题 女婴，2天，因高胆红素血症作血清学检查，抗人球蛋白试验直接法阳性，释放试验释放出抗E、C抗体，其母的趾血型可能是

- A cCdee
- B ocDEE

C ccDee
D cCDEe
E CCDEE

正确答案：D 您选择的答案：

第128题 Rh阴性孕妇既往有死胎，流产史，本次妊娠中应作的产前处理中，以下哪项是错误的

- A．测定孕妇血清Rh抗体效价
- B．测定羊水胆红素浓度
- C．测定羊水磷脂酰胆碱 / 鞘磷脂比例
- D．所有Rh阴性孕妇均应于产前反复血浆置换治疗
- E．孕妇于预产期前1~2周口服苯巴比妥

正确答案：D 您选择的答案：

第129题 一日龄7天新生儿，因拒奶2天，惊厥2次来院。体检：反应差，全身中度黄染，心肺检查正常，肝肋下3cm，脐部少量脓性分泌物，前囟饱满，白细胞 $21 \times 10^9 / L$ ，中性0.80，淋巴0.20，血钙 $2.45 \text{ mmol} / L$ ($9 \text{ mg} / \text{dl}$)，血糖 $3 \text{ mmol} / L$ ($54 \text{ mg} / \text{dl}$)，主要诊断是

- A．新生儿低钙血症
- B．新生儿低血糖症
- C．新生儿颅内出血
- D．新生儿脐炎
- E．新生儿败血症并化脓性脑膜炎

正确答案：E 您选择的答案：

第130题 女婴，胎龄256天，生后第二天，家长见他每隔15~20秒后有5~8秒"不呼吸"，但无皮肤颜色及心率改变。应作何处理

- A 给氨茶碱
- B 供氧
- C 给咖啡因
- D 向家长解释
- E 持续气道正压

正确答案：D 您选择的答案：

第131题 女婴，足月顺产，出生体重3200g，生后48小时，血清总胆红素 $297.5 \mu \text{mol} / L$ 。在检查黄疸的原因时，首选的治疗方法

- A 光照疗法
- B 换血
- C 口服苯巴比妥
- D 白蛋白输注
- E 输血浆

正确答案：A 您选择的答案：

第132题 一足月新生儿，日龄4天，在家出生，1天来拒奶，面色灰，手足凉，黄疸迅速加重。白细胞 $20 \times 10^9 / L$ ，中性0.75，淋巴0.25，血总胆红素 $222.3 \mu \text{mol} / L$ ($13 \text{ mg} / \text{dl}$)，最可能的诊断是

- A．新生儿破伤风
- B．新生儿败血症
- C．新生儿低血糖症
- D．核黄疸
- E．新生儿硬肿症

正确答案：B 您选择的答案：

第133题 女婴，足月顺产，生后8天，母乳喂养，食欲减退2天，烦躁，呕吐2天。体检：小儿烦躁，皮肤黄染，呼吸45次 / 分，心率160次 / 分，血压 $9.04 / 6.25 \text{ kPa}$ ($68 / 47 \text{ mmHg}$)，血红蛋白 $120 \text{ g} / L$ ，总胆红素 $255 \mu \text{mol} / L$ 。最可能的诊断是

- A 宫内感染
- B 败血症
- C 母婴血型不合溶血病
- D 母乳性黄疸
- E 甲状腺功能减退

正确答案：B 您选择的答案：

第134题 男婴，娩出1分钟时，心率为104次 / 分，呼吸不规则而且慢，四肢活动好，青紫，弹足底有反应，躯干皮肤粉红，1分钟Apgar评分可评为

- A 9分
- B 8分
- C 7分
- D 6分
- E 5分

正确答案：C 您选择的答案：

第135题 足月儿出生7天后出现黄疸，下列哪项诊断是不可能的

- A 败血症
- B ABO溶血病
- C 新生儿肺炎
- D 胆道闭锁
- E 母乳性黄疸

正确答案：B 您选择的答案：

第136题 足月儿母乳喂养，生后6天巩膜、皮肤黄染，胃纳良好，血清胆红素 $205 \mu \text{mol} / L$ ($12 \text{ mg} / \text{dl}$)，你认为应先采用何种疗法

A 光照疗法
B 换血疗法
C 输血浆
D 苯巴比妥
E 暂停止母乳24~72小时后复查血清胆红素
正确答案：E 您选择的答案：

第137题 一新生儿于妊娠258天出生，出生体重为2.5kg，应诊断为

A. 早产儿
B. 足月儿
C. 适于胎龄儿
D. 小于胎龄儿
E. 低出生体重儿

正确答案：A 您选择的答案：

第138题 男婴，足月，有宫内窘迫史，羊水度污染，经产钳助产娩出。生后1分钟四肢青紫，心率每分钟95次，刺激时皱眉，呼吸浅弱，肌张力低，下列哪项措施不正确

A 擦干，保暖
B 吸出污染的羊水，保持呼吸道通畅
C 给氧
D 注射山梗茶碱刺激呼吸
E 若心率每分钟<60次，进行胸外心脏按摩

正确答案：D 您选择的答案：

第139题 新生儿生后1分钟检查，四肢青紫，心率110次/分，弹足底有皱眉动作，四肢略屈曲，呼吸不规则，其，Apgar评分应为

A 2分
B 3分
C 4分
D 5分
E 6分

正确答案：E 您选择的答案：

第140题 一足月儿，生后2天，出现黄疸，肝脏略肿大。血总胆红素 $255\mu\text{mol/L}$ (15mg/dl)，血型A型，Rh阳性，直接抗人球蛋白试验阴性，抗体释放试验IgG抗A抗体阳性。此患儿诊断为

A. 新生儿生理性黄疸
B. 新生儿ABO血型不合溶血症
C. 新生儿Rh血型不合溶血症
D. 新生儿肝炎早期
E. 新生儿早期败血症

正确答案：B 您选择的答案：

第141题 新生儿生后1分钟检查，皮肤苍白，无呼吸和心跳，肌张力松弛，弹足底无反应，其Apgar评分为

A 0分
B 1分
C 2分
D 3分
E 4分

正确答案：A 您选择的答案：

第142题 一足月新生儿，日龄3天，生后16小时出现黄疸，总胆红素 $102\mu\text{mol/L}$ ，第2、3天血清胆红素分别为 $204\mu\text{mol/L}$ 和 $306\mu\text{mol/L}$ ，为明确诊断，首选哪项检查

A. 血型及血型抗体检查
B. 血培养及白细胞分类计数
C. 肝功能检查
D. 血清甲胎蛋白含量测定
E. 红细胞G-6-PD活性测定

正确答案：A 您选择的答案：

第143题 一新生儿于妊娠262天出生，出生体重为2.6kg，身长50cm，头围34.1cm，肤色红润，足纹遍及整个足底，生后第3天可扪及乳腺结节约7mm。应诊断为

A. 早产儿
B. 足月新生儿
C. 适于胎龄儿
D. 小于胎龄儿
E. 低出生体重儿

正确答案：B 您选择的答案：

第144题 一足月儿，出生体重3.0kg，有胎儿窘迫史，生后1分钟、5分钟Apgar评分分别为3、6分。生后3小时患儿出现肌张力增高，有呼吸暂停。下列各项检查哪项不是必需的

A. 血糖
B. 血钙
C. 呼吸、心率、血压监测
D. 头颅超声检查
E. 血清总胆红素和结合胆红素测定

正确答案：E 您选择的答案：

第145题 男婴，足月，自然分娩，娩出时脐带绕颈一周，Apgar评分1分钟与5分钟分别为3分、7分。体检：小儿激惹，拥抱反射增强，肌张力高。最可能是

- A 新生儿低血钙
- B 新生儿低血糖
- C 新生儿脑膜炎
- D 室管膜下出血
- E 新生儿缺氧缺血性脑病

正确答案：E 您选择的答案：

第146题 男婴，足月顺产，22天。出生体重3100g，生后母乳喂养。第3天出现皮肤黄染，至今黄疸不退。胃纳好，体温正常。体检：体重3750g，除皮肤黄染外，无其他异常。血常规及尿常规均正常，血清胆红素 $204\mu\text{mol/L}$ 。如何处理

- A 血培养
- B 测G-6PD活性
- C 暂停母乳喂养
- D 网织红细胞计数
- E 以上都不是

正确答案：C 您选择的答案：

第147题 10月男婴，血象白细胞数 $10 \times 10^9/\text{L}$ 中性粒细胞占60%，淋巴细胞占35%，单核细胞占2%，以下哪一个结论是正确的

- A 总数不正常，分类正常
- B 总数正常，分类不正常
- C 总数分类均正常
- D 总数、分类均不正常
- E 总数偏高，淋巴细胞偏低

正确答案：B 您选择的答案：

第148题 男婴，足月，母乳喂养，生后第2天，血清总胆红素 $289\mu\text{mol/L}$ ，小儿血型A，趾阳性，母血型O，趾阳性，小儿血直接抗人球蛋白的试验弱阳性，已查血常规及网织细胞计数。进一步作何种检查

- A 血培养
- B 肝功能检查
- C 血涂片找红细胞
- D 释放试验
- E 测TORCH抗体

正确答案：D 您选择的答案：

第149题 男婴，胎龄291天，出生体重3850g，其体重位于同胎龄标准体重的第80百分位，下列诊断哪个是正确而全面的

- A 过期产儿巨大儿
- B 过期产儿，大于适龄儿
- C 足月儿，适与胎龄儿
- D 足月儿，大于胎龄儿
- E 足月儿，巨大儿

正确答案：C 您选择的答案：

第150题 一足月新生儿生后第2天出现黄疸，未结合胆红素 $>221\mu\text{mol/L}$ (12.9mg/dl)，以下哪项诊断是不可能的

- A 新生儿ABO血型不合溶血症
- B 新生儿Rh因子血型不合溶血症
- C 新生儿败血症
- D 先天性胆道闭锁
- E G-6-PD缺乏症

正确答案：D 您选择的答案：

第151题 生后两天的新生儿，一般状态良好，但其网织红细胞5%，血涂片发现计100个白细胞，可见大量的有核红细胞和少量幼稚中性粒细胞，提示

- A 新生儿溶血病
- B 髓外造血
- C 先天性营养性贫血
- D 先天性小儿白血病
- E 正常血象

正确答案：E 您选择的答案：

第152题 一日龄6天新生儿，2日来不吃奶，精神差，面色灰白，体温 37.0 呼吸急促，皮肤黄染，心肺正常，脐带未脱落，脐根部有少量稀薄分泌物，肝肋下3cm，脾肋下1cm，血清胆红素 $239.4\mu\text{mol/L}$ (14mg/dl)，间接胆红素为主，最可能的诊断是

- A 新生儿肺炎
- B 新生儿肝炎
- C 新生儿溶血症
- D 新生儿败血症
- E 新生儿低血糖症

正确答案：D 您选择的答案：

第153题 男婴，胎龄266天，自然分娩，Apgar评分1分钟和5分钟为10分，体检时，下列哪项反射阴性是正常的

- A 拥抱反射
- B 颈肢反射
- C 腹壁反射
- D 觅食反射
- E 握持反射

正确答案：C 您选择的答案：

三、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第154-156题

足月新生儿，日龄3天，胎头吸引分娩，生时曾窒息3分钟，住院后一直嗜睡，呕吐，枕部有血肿，前囟 $2\text{cm} \times 2\text{cm}$ 。

1. 最可能的诊断是
- A. 新生儿化脓性脑膜炎
- B. 新生儿败血症
- C. 低血糖
- D. NHIE
- E. 新生儿先天性脑积水
2. 诊断的重主要手段是
- A. 血培养
- B. 头颅CT检查
- C. 血糖
- D. 血电解质
- E. 脑脊液
3. 治疗首选
- A. 改善肺通气给氧
- B. 大剂量青霉素
- C. 10%葡萄糖
- D. 10%葡萄糖酸钙
- E. 侧脑室穿刺

正确答案：DBA 您选择的答案：

第157-159题

一早产儿，胎龄32周，日龄3天。近2天来全身硬肿，5小时来呕吐咖啡样物，来门诊。

1. 该患儿最可能的诊断是
- A. 新生儿出血症
- B. 新生儿败血症
- C. 新生儿寒冷损伤综合征
- D. 新生儿皮下坏疽
- E. 新生儿消化道溃疡
2. 该患儿最可能的合并症为
- A. 败血症
- B. 消化道溃疡
- C. 皮肤感染
- D. 弥散性血管内凝血(DIC)
- E. 新生儿呼吸窘迫综合征(NRDS)
3. 该患儿以下哪项治疗是错误的
- A. 开始热卡按每日 $313\text{kJ}(75\text{kcal})$ 计算
- B. 于12~24小时内恢复正常体温
- C. 可采用恒温水浴，远红外线抢救台复温
- D. 可给肝素，首剂 $1 \sim 1.5\text{mg/kg}$
- E. 液量按 1ml/kcal 计算

正确答案：CDA 您选择的答案：

第160-161题

足月新生儿，日龄8天，母乳喂养，皮肤黄染，血清胆红素 $153.9\mu\text{mol/L}(9\text{mg/dl})$ ，其余体检及实验室检查均正常。

1. 应诊断为
- A. 母乳性黄疸
- B. 溶血性黄疸
- C. 新生儿肝炎综合征
- D. 先天性胆道闭锁
- E. 生理性黄疸
2. 此时应采取何种处理措施
- A. 光照疗法
- B. 静滴白蛋白
- C. 肾上腺皮质激素
- D. 苯巴比妥钠
- E. 以上均不是

正确答案：EE 您选择的答案：

第162-164题

女性足月新生儿，第1胎第1产。娩出经过顺利，无窒息，母乳喂养，生后18小时出现黄疸并加重，胎粪已排空。生后第3天住院。体检：皮肤、巩膜中至重度黄染，心、肺听诊正常，肝肋下 2.5cm ，脾未及。血红蛋白 12.5g/L ，网织红细胞 0.05 ，白细胞数 $11 \times 10^{12}/\text{L}$ ，中性粒细胞 0.7 ，血型A，血清总胆红素 $255\mu\text{mol/L}(15\text{mg/dl})$ ，一分钟胆红素 $8\mu\text{mol/L}$ 。

1. 该患儿诊断首先考虑
- A. 新生儿败血症
- B. 新生儿溶血症
- C. 新生儿肝炎综合征
- D. 母乳性黄疸
- E. 先天性胆道畸形
2. 为明确诊断，应选以下哪项检查项目
- A. 血培养
- B. 红细胞G-6-PD活性测定

- C. 肝功能、乙肝五项
- D. 血型抗体检查
- E. 肝及胆道超声检查
- 3. 治疗措施为
- A. 换血疗法
- B. 输血
- C. 输注白蛋白
- D. 光照疗法
- E. 抗生素疗法

正确答案：BDD 您选择的答案：

第165-167题

一男婴，日龄4天，足月顺产，生后2天出现黄疸，拒奶，反应差，体温不升，皮肤发花。

1. 其母亲妊娠史中最能提供诊断线索的是

- A. 异常妊娠史
- B. 孕早期感染史
- C. 产程过长史
- D. 孕期肝损史
- E. 应用药物史

2. 体检最能支持诊断的发现是

- A. 反射和肌张力减低
- B. 心音低钝，心率快
- C. 皮肤苍白，贫血貌
- D. 肝脾肿大
- E. 脐部脓性分泌物

3. 最具诊断价值的实验室检查是

- A. 白细胞计数
- B. 血清胆红素测定
- C. 肝功能
- D. 血培养
- E. 微量血沉

正确答案：CED 您选择的答案：

第168-169题

足月新生儿，因胎心率每分钟>160次而以产钳助产，第二产程延长，Apgar评分3分。

1. 首先应采取的措施是

- A. 供给氧气
- B. 人工呼吸，心脏按压
- C. 清除呼吸道分泌物
- D. 纠正酸中毒
- E. 肌注山梗菜碱

2. 如该患儿心率<80次/分，在下列复苏措施中，哪项是错误的

- A. 心外按压术
- B. 气管插管术
- C. 1:10000肾上腺素
- D. 纠正酸中毒
- E. 输全血及血浆

正确答案：CE 您选择的答案：

第170-172题

一日龄5天女婴，拒食，反应差1天来院。体检：体温37.0，皮肤黄染并加深10小时，面部及颈部散在小脓疱，心肺无异常，脐部稍湿，肝右肋下1.5cm。

1. 宜选择何种检查以快速检测致病菌

- A. 血培养
- B. 脐脓性分泌物
- C. 脓疱液培养
- D. 免疫荧光检测细菌抗原
- E. 血白细胞层涂片找细菌

2. 该患儿最易出现的并发症是

- A. 化脓性脑膜炎
- B. 支气管肺炎
- C. 肺脓肿
- D. 肝脓肿
- E. 骨髓炎

3. 首选的抗生素是

- A. 新青霉素
- B. 头孢三嗪
- C. 氯霉素
- D. 红霉素
- E. 林可霉素

正确答案：DAA 您选择的答案：

第173-176题

足月儿，C4P1，出生时一般情况好，无青紫窒息，纯母乳喂养，生后12小时即出现黄疸，其母孕期体健，前3胎中，第1胎为人工流产，第2、3胎在生后均因黄疸死亡。

1. 该患儿黄疸的原因最可能为

- A. 生理性黄疸
- B. 新生儿溶血病
- C. 新生儿败血症
- D. 新生儿肝炎

- E. 以上都不是
2. 检查发现患儿血红蛋白100g/L, 血清胆红素386μmol/L, 此时下列哪项检查最重要
- A. 血培养
- B. 母婴血型鉴定
- C. 肝功能
- D. 肝炎标志物检查
- E. TORCH检查
3. 检查发现母亲为“O”型Rh阳性血, 患儿为“A”型Rh阳性血, 此时应立即进行哪项检查
- A. 血清特异性抗体检测
- B. 血培养
- C. 肝功能
- D. 血常规
- E. 脑脊液检查
4. 若患儿的血清特异性抗体检测中发现抗体释放试验为阳性, 在治疗中, 哪项不合适
- A. 蓝光照射
- B. 白蛋白治疗
- C. 碳酸氢钠治疗
- D. 抗生素治疗
- E. 必要时换血
- 正确答案: BBAD 您选择的答案:

- 第177-178题
- 患儿出生一天, 足月顺产, 24小时内出现黄疸, 嗜睡, 吸吮无力, 肝脾肿大较轻
1. 此患儿诊断最大可能是
- A 生理性黄疸
- B 新生儿肝炎
- C 母乳性黄疸
- D 新生儿溶血症
- E 胆道闭锁
2. 该患儿拟采用光照疗法光照需多长时间可使血清胆红素下降
- A 6~8小时
- B 8~12小时
- C 12~24小时
- D 16~28小时
- E 18~30小时
- 正确答案: DC 您选择的答案:

- 第179-181题
- 患儿, 男, 出生时Apgar评分4分, 生后2天, 嗜睡, 肌张力减退, 瞳孔缩小, 时而出现惊厥, 头颅CT扫描, 可见右叶有低密度影
1. 该患儿临床诊断最大可能为
- A 新生儿窒息
- B 新生儿缺氧缺血性脑病
- C 新生儿蛛网膜下腔出血
- D 新生儿硬膜下出血
- E 核黄疸
2. 控制该患儿的惊厥, 应首选什么药物
- A 安定肌注
- B 水合氯醛灌肠
- C 甘露醇
- D 苯巴比妥钠
- E 利尿剂
3. 该患儿的支持疗法应采取哪些措施, 除了
- A 供氧
- B 纠正酸中毒
- C 纠正低血糖
- D 静点地塞米松
- E 补液
- 正确答案: BDD 您选择的答案:

- 第182-184题
- 34周早产儿, 出生时Apgar评分7分。生后4小时出现进行性呼吸困难及紫绀, 两肺呼吸音低, 深吸气末少量细湿啰音。
1. 该患儿发生呼吸困难的原因, 最可能是
- A. 大量羊水吸入
- B. 胎粪阻塞细支气管
- C. 宫内感染
- D. 缺乏表面活性物质
- E. 肺液潴留较多
2. 最可能的诊断是
- A. 感染性肺炎
- B. 羊水吸入综合征
- C. 湿肺
- D. 肺透明膜病
- E. 持续肺动脉高压
3. 最紧急的处理是
- A. 保暖
- B. 纠正酸中毒
- C. 抗生素

D. 激素

E. 正压给氧

正确答案：DDE 您选择的答案：

第185-186题

一足月新生儿，日龄5天，7月份出生，出生时有窒息，Apgar评分6分，2天来少吃，不哭，体温低。体检：肛温32.0℃，面颊、四肢皮肤暗红，皮下脂肪硬，心率90次/分。

1. 引起该患儿发生皮下脂肪变硬的原因最可能是

A. 感染导致机体缺氧

B. 窒息导致棕色脂肪产热过程受抑制

C. 饥饿导致机体产热减少

D. 寒冷导致皮下脂肪硬化

E. 以上都不是

2. 为使患儿复温，宜选的方法是

A. 立即安置于37.0~38.0℃的暖箱中

B. 放入37.0~38.0℃温水中进行温水浴

C. 静脉高价营养

D. 立即安置于暖箱中，箱温高于体温1~2℃

E. 在28.0~30.0℃的室温中，缓慢自然复温

正确答案：BD 您选择的答案：

第187-189题

女婴，出生体重3200g，足月顺产。生后第7天黄疸加重。无热，进乳后有时呕吐，大便浅黄，尿色深黄，肝于肋下可触及3.0cm，3周后黄疸仅略有减轻

1. 母亲病史中应注意的线索是

A. 母孕的胎次与产次

B. 既往妊娠的流产史或活产儿的黄疸史

C. 孕期感染史

D. 妊娠晚期高血压和水肿情况

E. 孕期营养情况

2. 对此患儿，临床诊断首先应考虑

A. 母乳性黄疸

B. 新生儿溶血症

C. 生理性黄疸

D. 新生儿肝炎

E. 胆道闭锁

3. 首先考虑要作的一项实验室检查是

A. 血常规，网质红细胞计数

B. 腹部B超

C. 血培养

D. 母、女血型鉴定

E. 血清转氨酶测定

正确答案：CDE 您选择的答案：

第190-192题

男，孕36周出生。出生体重2000g，生后1天，吸吮欠佳。睾丸未降，皮肤毳毛多。

1. 判断该儿应为

A. 足月儿

B. 早产儿

C. 超低体重儿

D. 足月小样儿

E. 正常体重儿

2. 该患儿拟补给液体，其需要量为

A. 第一天补液量50~70ml/kg

B. 第一天补液量60~80ml/kg

C. 第一天补液量70~90ml/kg

D. 第一天补液量80~100ml/kg

E. 第一天补液量90~110ml/kg

3. 该患儿如出现黄疸，可持续多久消退

A. 5~7天消退

B. 7~10天消退

C. 1~2周消退

D. 2~3周消退

E. 3~4周消退

正确答案：BBE 您选择的答案：

四、A4型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第193-196题

一足月新生儿，生后第1天开始发热，腹泻，生后第6天出现烦躁，拒奶，第8天出现黄疸，入院当日上午抽搐3次。体检：体温38.5℃，呼吸50次/分，前囟饱满，心率160次/分，白细胞 $28 \times 10^9/L$ ，中性0.75，淋巴0.25，血总胆红素 $222.3 \mu\text{mol/L}$ (13mg/dl)，大便常规正常，X线胸片正常。

1. 诊断最可能是

A. 核黄疸

B. 新生儿肠炎

C. 新生儿败血症合并化脓性脑膜炎

D. 新生儿肝炎

- E. 新生儿肺炎合并心衰
 2. 若追问病史该患儿母亲在分娩时有胎膜早破，产程延长。最可能的感染途径是
 A. 产前感染
 B. 产时感染
 C. 产后感染
 D. 母妊娠后期发热
 E. 婴儿室环境污染
 3. 若此患儿血培养为大肠杆菌，选用哪组抗生素最合理
 A. 青霉素+氯霉素
 B. 阿莫西林
 C. 氯林可霉素+氯霉素
 D. 氨苄西林+庆大霉素
 E. 氨苄西林+头孢氨噻肟
 4. 应用抗生素的一般疗程为
 A. 5~6天
 B. 7~14天
 C. 15~20天
 D. 20~25天
 E. 30天左右

正确答案：CBEB 您选择的答案：

第197-201题

足月儿，第1胎。生后2天黄疸明显，肝脾略肿大。血总胆红素 $255\mu\text{mol/L}$ (15mg/dl)，一分钟胆红素 $2\mu\text{mol/L}$ ，血型A，Rh，CcDee，直接抗人球蛋白试验弱阳性，母血型O，Rh，CcDEe。

1. 此小儿黄疸的原因最可能是
 A. 生理性黄疸
 B. 新生儿败血症
 C. 新生儿ABO溶血
 D. Rh溶血病
 E. G-6-PD缺乏症
 2. 本病最有诊断价值而阳性率又高的检查是
 A. 血红蛋白测定及网织红细胞计数
 B. 母婴ABO血型检查
 C. 直接抗人球蛋白试验
 D. 抗体释放试验
 E. 游离抗体试验
 3. 为降低血清胆红素，首选哪项措施
 A. 换血疗法
 B. 光照疗法
 C. 肾上腺皮质激素
 D. 输血浆或白蛋白
 E. 苯巴比妥+尼可刹米
 4. 为防止本病发生胆红素脑病，制定治疗方案时，下列哪项是没有价值的
 A. 输白蛋白
 B. 保持血pH正常范围
 C. 维持动脉血二氧化碳分压正常
 D. 选用抗生素
 E. 光照疗法
 5. 若患儿血清胆红素超过 $342\mu\text{mol/L}$ (20mg/dl)，考虑换血，下列血源何者最理想
 A. O型血
 B. A型血
 C. A型血、Rh，CcDEe
 D. O型血、Rh，CcDEe
 E. AB型血浆、O型血细胞

正确答案：CDBDE 您选择的答案：

第202-205题

足月新生儿，臀位产，生后1分钟、5分钟、10分钟Apgar评分分别为4、6、8分。生后12小时，小儿烦躁，肢体抖动。体检：体温正常，前囟饱满，肌张力增高，双眼凝视，瞳孔等大，心、肺听诊正常。血白细胞数 $11.0 \times 10^9/\text{L}$ ，中性0.65，血钙 2.4mmol/L ，血糖 2.5mmol/L 。

1. 最可能的诊断是
 A. NHIE
 B. 新生儿颅内出血
 C. 新生儿败血症合并化脓性脑膜炎
 D. 新生儿低血糖
 E. 新生儿低钙惊厥
 2. 下列措施哪项不妥
 A. 适量控制入液量
 B. 应用甘露醇脱水剂
 C. 腰穿放脑脊液
 D. 监测心率、呼吸
 E. 维持正常血压
 3. 若该患儿入院10小时后四肢抽搐，心率每分钟100次/分。下列哪项处理不妥
 A. 氧吸入
 B. 立即做腰椎穿刺
 C. 立即静注苯巴比妥钠
 D. 复查血糖、血钙
 E. 清除咽部分泌物
 4. 为止惊应首选下列哪种药物

- A. 安定(地西洋)
- B. 水合氯醛
- C. 苯巴比妥钠
- D. 硫贲妥钠
- E. 苯妥英钠

正确答案：ACEC 您选择的答案：

五、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第206-208题

- A. 新青霉素类
- B. 氨基青霉素或第3代头孢菌素
- C. 青霉素类
- D. 抗菌谱较宽的抗生素
- E. 联合用药
- 1. 耐药金黄色葡萄球菌败血症首选
- 2. 大肠杆菌败血症首选
- 3. 重症败血症首选

正确答案：ABE 您选择的答案：

第209-212题

- A. 生理性黄疸
- B. 新生儿溶血病
- C. 先天性胆道闭锁
- D. 新生儿败血症
- E. 母乳性黄疸
- 1. 生后24小时内出现黄疸
- 2. 一般情况良好，1~3个月黄疸消退
- 3. 进行性加重的黄疸，大便陶土样
- 4. 黄疸退而复现，反应差，体温不升

正确答案：BECD 您选择的答案：

第213-215题

- A. 肌注维生素K1
- B. 补充维生素C
- C. 补充维生素B族
- D. 补充维生素D
- E. 添加铁剂
- 1. 新生儿生后10天
- 2. 新生儿生后立即
- 3. 出生4周后

正确答案：DAE 您选择的答案：

第216-220题

- A. 皮肤发亮，水肿毳毛多
- B. 皮肤色红润，皮下脂肪丰满，毳毛少
- C. 肝葡萄糖醛酸基转移酶活性低
- D. 呼吸常不规则，甚至呼吸暂停
- E. 男女足月新生儿生后3~5天出现乳腺肿大
- 1. 新生儿常见的特殊生理状态之一是
- 2. 早产儿的外观特点之一是
- 3. 足月儿的外观特点之一是
- 4. 早产儿的呼吸特点是
- 5. 新生儿生理性黄疸的主要原因是

正确答案：EABDC 您选择的答案：

习题集 儿科学 小儿造血系统疾病

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 叶酸缺乏性巨幼红细胞贫血的主要诊断依据是

- A 皮肤色黄、虚胖
- B 典型血象改变
- C 血清叶酸含量降低
- D 骨髓中出现巨幼红细胞
- E 毛发稀疏发黄

正确答案：C 您选择的答案：

第2题 8个月女婴贫血的标准是

- A . Hb < 80g/L
- B . Hb < 90g/L
- C . Hb < 100g/L
- D . Hb < 110
- E . Hb < 120g/L

正确答案：D 您选择的答案：

第3题 下列哪一项不是营养性巨幼细胞性贫血的病因

- A 长期羊奶喂养
- B 长期服用抗癫痫药
- C 慢性腹泻
- D 长期服用维生素C
- E 肝脏疾病

正确答案：D 您选择的答案：

第4题 下列哪些症状不是营养性巨幼红细胞性贫血的表现

- A 面色苍黄，疲乏无力
- B 虚胖，毛发稀疏发黄
- C 肝脾轻度肿大
- D 异食癖
- E 舌炎，腹泻

正确答案：D 您选择的答案：

第5题 新生儿贫血是指

- A . Hb<220g / L
- B . Hb<180g / L
- C . Hb<145g / L
- D . Hb<100g / L
- E . Hb<90g / L

正确答案：C 您选择的答案：

第6题 维生素B12缺乏性巨幼红细胞性贫血，肌注维生素B12的停药指征是

- A 网织红细胞降至正常
- B 临床症状明显好转、血象恢复正常
- C 骨髓象中幼红细胞恢复正常
- D 血清维生素B12含量恢复正常
- E 皮肤粘膜红润

正确答案：B 您选择的答案：

第7题 关于贫血的治疗原则，以下哪项不正确

- A 寻找病因，去除病因
- B 加强护理，预防感染，合理膳食
- C 针对病因选择有效药物治疗
- D 输血是贫血治疗中关键的治疗措施
- E 积极治疗并发症

正确答案：D 您选择的答案：

第8题 小儿出现生理性贫血的时期是

- A . 生后5~7天
- B . 生后1个月左右
- C . 生后2~3个月
- D . 生后5~7个月
- E . 生后1年

正确答案：C 您选择的答案：

第9题 营养性巨幼红细胞性贫血的血象具有早期诊断意义的是

- A . 大细胞性贫血
- B . 红细胞减少比血红蛋白减少更为明显
- C . 嗜多色性和嗜碱性点彩红细胞易见
- D . 网织红细胞计数常减少
- E . 中性粒细胞变大并有分叶过多现象

正确答案：E 您选择的答案：

第10题 有关缺铁性贫血输血治疗的原则，错误的是

- A . 一般病例无需输血

B. 重症贫血并发心功能不全或明显感染者可输浓缩红细胞以尽快改善贫血状态
C. 贫血越重，每次输血量宜越大，速度宜越快
D. 血红蛋白30g/L时应输血
E. 极重患儿可用浓缩红细胞换血治疗
正确答案：C 您选择的答案：

第11题 从母体带来的铁，可供小儿使用多长时间

- A. 1~2周
- B. 4周
- C. 8~12周
- D. 4~5个月
- E. 1周岁

正确答案：D 您选择的答案：

第12题 有关缺铁性贫血的实验室检查，正确的是

- A. 血清铁蛋白降低
- B. 红细胞游离原卟啉降低
- C. 血清铁和总铁结合力降低
- D. 骨髓可染铁增加
- E. 转铁蛋白饱和度增加

正确答案：A 您选择的答案：

第13题 关于缺铁性贫血的预防措施，以下哪项是错误的

- A. 做好卫生宣教工作
- B. 提倡母乳喂养
- C. 及时添加辅食
- D. 婴幼儿食品可加入适量铁剂进行强化
- E. 早产儿、低体重儿宜在生后立即补充铁剂

正确答案：E 您选择的答案：

第14题 新生儿初生时红细胞数 $4.5 \times 10^{12}/L$ ，血红蛋白130g/L，提示

- A. 正常新生儿
- B. 轻度贫血
- C. 中度贫血
- D. 重度贫血
- E. 极重度贫血

正确答案：B 您选择的答案：

第15题 下列哪一项改变证实体内红细胞生成所需的铁开始减少

- A. 血清铁蛋白减低
- B. 血清总铁结合力增高
- C. 红细胞游离原卟啉增高
- D. 血清铁减少
- E. 血象可见血红蛋白降低

正确答案：C 您选择的答案：

第16题 小儿时期中性粒细胞与淋巴细胞两次比例相等发生在什么时间

- A. 1~2天与1~2岁
- B. 2~4天与2~4岁
- C. 4~6天与4~6岁
- D. 6~8天与6~8岁
- E. 8~20天与8~10岁

正确答案：C 您选择的答案：

第17题 缺铁性贫血实验室检查最灵敏的指标是

- A. 血清铁蛋白降低
- B. 血清铁降低
- C. 红细胞原卟啉增高
- D. 总铁结合力增高
- E. 红细胞中央淡染区扩大

正确答案：A 您选择的答案：

第18题 婴儿期“生理性贫血”发生在什么时间

- A. 生后15天~1个月
- B. 生后1个月~2个月
- C. 生后2个月~3个月
- D. 生后3个月~4个月
- E. 生后4个月~5个月

正确答案：C 您选择的答案：

第19题 维生素B12缺乏与叶酸缺乏所致的营养性巨幼红细胞贫血的区别点是

- A. 面色蜡黄，颜面水肿虚胖
- B. 肝、脾肿大
- C. 精神神经症状
- D. 血象改变
- E. 骨髓象改变

正确答案：C 您选择的答案：

第20题 关于小儿骨髓外造血，以下哪项是错误的

- A. 骨髓外造血不是正常小儿的主要造血场所

- B. 造血需要增加时恢复到胎儿时期的造血状态
 - C. 出现肝、脾和淋巴结肿大
 - D. 外周血中可出现有核红细胞和(或)幼稚中性粒细胞
 - E. 贫血矫正后仍不能恢复到正常造血状态
- 正确答案：E 您选择的答案：

第21题 营养性巨幼红细胞性贫血的患儿出现精神、神经症状的治疗应是

- A 维生素B12+输血
- B 维生素B12+叶酸
- C 维生素B12+维生素C
- D 维生素B12+铁剂
- E 维生素B12+镇静剂

正确答案：E 您选择的答案：

第22题 维生素B12治疗营养性巨幼红细胞性贫血时，网织红细胞的变化规律是怎样的

- A 2~4天开始升高，6~7天达到高峰，2周降至正常
- B 3~4天开始升高，7~10天达到高峰，3周降至正常
- C 4~5天开始升高，10~15天达到高峰，3周降至正常
- D 6~7天开始升高，15~20天达到高峰，4周降至正常
- E 1周后开始升高，3周达到高峰，1个月恢复正常

正确答案：A 您选择的答案：

第23题 下列贫血表现中哪一项不符合营养性缺铁性贫血

- A 皮肤、粘膜苍白
- B 肝脾轻度肿大
- C 头晕眼花耳鸣
- D 肢体震颤
- E 食欲减退，常有呕吐、腹泻

正确答案：D 您选择的答案：

第24题 营养性缺铁性贫血的预防措施是

- A 母乳喂养
- B 预防感染
- C 注意饮食卫生
- D 多晒太阳
- E 及时添加含铁丰富的辅食

正确答案：E 您选择的答案：

第25题 以下哪项下早营养性巨幼红细胞性贫血的临床表现

- A. 虚胖
- B. 皮肤出血点
- C. 肝脾大
- D. 震颤
- E. 头围增大

正确答案：E 您选择的答案：

第26题 为了增加新生儿体内的储铁量，可采取以下哪项措施

- A. 孕母孕后期3个月多食肉、鱼、动物肝脏等食物
- B. 在胎儿娩出时将结扎脐带时间延迟
- C. 尽早喂奶
- D. 尽早补充铁剂
- E. 及时添加含铁丰富的辅食

正确答案：B 您选择的答案：

第27题 关于小儿时期白细胞总数的特点，以下哪项是错误的

- A. 初生时为 $15 \sim 20 \times 10^9/L$
- B. 婴儿期 $10 \times 10^9/L$
- C. 3岁以后接近成人水平
- D. 生后1周时平均为 $12 \times 10^9/L$
- E. 以上都不是

正确答案：D 您选择的答案：

第28题 诊断营养性巨幼红细胞性贫血，首选

- A. 血清维生素B12测定
- B. 血清铁含量测定
- C. 骨髓象检查
- D. X线腕骨照片
- E. 叶酸、维生素B12试验性治疗

正确答案：C 您选择的答案：

第29题 营养缺铁性贫血主要治疗原则是

- A 加强护理，给予铁剂
- B 预防感染，给予铁剂
- C 给予铁剂，必要是输血
- D 去除病因，给予铁剂
- E 给予铁剂同时给予维生素C治疗

正确答案：D 您选择的答案：

第30题 早期诊断缺铁性贫血最灵敏的指标为

- A 末梢血中红细胞减少

- B 末梢血中血红蛋白减少
- C 红细胞游离原卟啉增高
- D 血清铁减少
- E 血清铁蛋白减低

正确答案：E 您选择的答案：

第31题 母乳中铁的吸收率可高达

- A . 20%
- B . 30%
- C . 40%
- D . 50%
- E . 60%

正确答案：D 您选择的答案：

第32题 小儿造血分哪两个阶段

- A . 胚胎期造血和生后造血
- B . 胚胎期造血和骨髓造血期
- C . 骨髓造血期和肝造血期
- D . 骨髓造血期和骨髓外造血
- E . 中胚叶造血期和骨髓造血期

正确答案：A 您选择的答案：

第33题 小儿易发生营养性缺铁性贫血的主要原因是

- A . 先天储铁不足
- B . 铁摄入量不足
- C . 生长发育快
- D . 铁吸收障碍
- E . 铁丢失过多

正确答案：B 您选择的答案：

第34题 有关维生素B12所致的巨幼红细胞性贫血的描述，错误的是

- A . 精神神经症状突出
- B . 血清维生素B12含量低于100ng/L
- C . 维生素B12治疗有效
- D . 重度贫血者可予输血治疗
- E . 应先加用叶酸联合治疗

正确答案：E 您选择的答案：

第35题 关于缺铁性贫血患儿输血治疗，以下哪项是错误的

- A . 一般病例毋需输血
- B . 重症贫血并发心功能不全或明显感染者可输浓缩红细胞
- C . 贫血愈重，一次输血量应愈大，速度应愈快，以尽快改善贫血状态
- D . 极重度贫血患儿可用浓缩红细胞换血
- E . 血红蛋白<30g / L者，每次输血5 ~ 10ml / kg

正确答案：C 您选择的答案：

第36题 含维生素B12丰富的食物是

- A . 肉类、海产品、蛋类
- B . 新鲜绿叶菜、肝、肾
- C . 水果、果仁
- D . 人乳
- E . 牛乳

正确答案：A 您选择的答案：

第37题 营养性缺铁性贫血患儿最适合的治疗应是

- A 餐前服用富马酸铁
- B 餐后服用硫酸亚铁及B族维生素
- C 反复多次少量输血及硫酸亚铁
- D 肌注左旋糖酐铁及维生素C口服
- E 餐间服用硫酸亚铁及维生素C

正确答案：E 您选择的答案：

第38题 胚胎期造血的特点是

- A . 造血部位首先在肝脏，然后在卵黄囊
- B . 肝脏是胎儿中期的主要造血部位
- C . 骨髓是胎儿中期的主要造血部位
- D . 卵黄囊是胎儿中期的主要造血部位
- E . 脾脏是胎儿中期的主要造血部位

正确答案：B 您选择的答案：

第39题 营养性缺铁性贫血临床特征性症状是哪一项

- A 皮肤粘膜苍白
- B 头晕、乏力
- C 肝脾轻度肿大
- D 记忆力减退
- E 异食癖

正确答案：E 您选择的答案：

第40题 关于生理性贫血出现的原因，以下哪项是错误的

- A . 红细胞破坏增加

- B. 骨髓暂时性造血功能低下
- C. 婴儿生长发育迅速
- D. 循环血量迅速增加
- E. 红细胞寿命长

正确答案：E 您选择的答案：

第41题 营养性巨幼红细胞贫血多见于

- A. 新生儿
- B. 婴幼儿
- C. 学龄前期
- D. 学龄期
- E. 青春期

正确答案：B 您选择的答案：

第42题 关于红细胞和血红蛋白生成不足所致的贫血，以下哪项不正确

- A. 营养性巨幼红细胞贫血
- B. 营养性缺铁性贫血
- C. 再生障碍性贫血
- D. 感染性贫血
- E. 珠蛋白生成障碍性贫血

正确答案：E 您选择的答案：

第43题 下列哪一项与营养性巨幼细胞性贫血的发病机制无关

- A. DNA合成减少
- B. 红细胞的分裂增殖时间延长
- C. 红细胞中血红蛋白合成减少
- D. 红细胞的胞体变大，形成巨幼红细胞
- E. 巨幼红细胞在骨髓内易遭破坏

正确答案：C 您选择的答案：

第44题 巨幼红细胞性贫血的血象改变，错误的是

- A. 呈大细胞性贫血
- B. 血涂片可见红细胞大小不等，以大红细胞多见
- C. 网织红细胞计数常增多
- D. 中性粒细胞变大并有分叶过多现象
- E. 血小板常减少

正确答案：C 您选择的答案：

第45题 极重症营养性贫血的患儿，需输血治疗时，其输血量应如何掌握

- A. 每次输血1~5ml / kg
- B. 每次输血5~10ml / kg
- C. 每次输血10~15ml / kg
- D. 每次输血15~20ml / kg
- E. 随意

正确答案：B 您选择的答案：

第46题 正常小儿白细胞分类中淋巴细胞与中性粒细胞的比例变化有2次时间交叉，是指

- A. 1~3天及1~3个月
- B. 1~3天及1~3岁
- C. 4~6天及4~6个月
- D. 4~6天及4~6岁
- E. 4~6个月及4~6岁

正确答案：D 您选择的答案：

第47题 维生素B12缺乏性巨幼红细胞性贫血治疗反应恢复最慢的是

- A. 贫血外貌
- B. 网织红细胞
- C. 精神、神经症状
- D. 红细胞数
- E. 血红蛋白量

正确答案：C 您选择的答案：

第48题 关于铁剂治疗缺铁性贫血，以下哪项不正确

- A. 二价铁盐较易吸收
- B. 最好于两餐之间服药
- C. 常用口服剂量为硫酸亚铁1~2mg / (kg·次)，每日2~3次
- D. 铁剂应用至血红蛋白达正常水平后2个月左右再停药
- E. 注射铁剂能用肌肉注射者应尽量不用静脉注射

正确答案：C 您选择的答案：

第49题 营养性巨幼红细胞性贫血的患儿，当其无神经系统症状时，首先的治疗药物是

- A. 维生素B12+叶酸
- B. 叶酸
- C. 维生素B12
- D. 维生素C
- E. 维生素B6

正确答案：B 您选择的答案：

第50题 新生儿初生时网织红细胞数0.05提示

- A. 正常现象

- B. 生理性溶血
- C. 生理性贫血
- D. 新生儿溶血症
- E. 宫内胎儿失血

正确答案：A 您选择的答案：

第51题 铁剂治疗缺铁性贫血时，最早显示疗效的是

- A. 血红蛋白及红细胞增多
- B. 网织红细胞增多
- C. 血清铁增多
- D. 口唇色泽开始变红
- E. 血小板增多

正确答案：B 您选择的答案：

第52题 在小儿白细胞分类中，粒细胞与淋巴细胞的交叉发生于

- A. 4~6天，4~6岁
- B. 7天，1岁
- C. 4~6周，4~6岁
- D. 4~6天，4~6周
- E. 1岁，6岁

正确答案：A 您选择的答案：

第53题 营养性、巨幼红细胞贫血的骨髓象，最有特征性的改变是

- A. 骨髓增生活跃
- B. 各期幼红细胞均出现巨幼变
- C. 中性粒细胞胞浆空泡形成
- D. 巨核细胞核过度分叶现象
- E. 晚幼及杆状核粒细胞巨幼变

正确答案：B 您选择的答案：

第54题 关于缺铁性贫血的一般临床表现，以下哪项不正确

- A. 皮肤、黏膜苍白
- B. 易疲乏无力
- C. 头晕，眼前发黑，耳鸣
- D. 不爱活动
- E. 肝脾可轻度肿大

正确答案：E 您选择的答案：

第55题 关于缺乏维生素B12所致营养性巨幼红细胞贫血的病因，以下哪项不正确

- A. 先天储存量过低而摄入不足
- B. 长期偏食动物性食物
- C. 慢性萎缩性胃炎
- D. 慢性肝炎
- E. 严重感染

正确答案：B 您选择的答案：

第56题 生后造血的特点不包括

- A. 骨髓是出生后的主要造血部位
- B. 婴儿期所有骨髓均为红骨髓，全部参与造血
- C. 年长儿和成人期红骨髓仅限于肋骨、胸骨、脊椎、骨盆、颅骨、锁骨和肩胛骨
- D. 正常情况下骨髓外造血极少
- E. 小婴儿在遇到各种感染性贫血或造血需要增加时，骨髓造血功能将成倍增加

正确答案：E 您选择的答案：

第57题 小儿出生后主要造血场所是

- A. 肝脏
- B. 骨髓
- C. 脾脏
- D. 淋巴结
- E. 胸腺

正确答案：B 您选择的答案：

第58题 所有骨髓均为红骨髓见于

- A. 1周岁内
- B. 2周岁内
- C. 3周岁内
- D. 4周岁内
- E. 5周岁内

正确答案：A 您选择的答案：

第59题 含叶酸丰富的食物是

- A. 绿叶蔬菜、动物内脏
- B. 奶类、蛋类
- C. 肉类、鱼类
- D. 人乳
- E. 羊乳

正确答案：A 您选择的答案：

第60题 营养性巨幼红细胞性贫血对治疗最早出现反应的是

- A. 网织红细胞增高

B. 红细胞数上升
C. 血红蛋白量增加
D. 骨髓中巨幼红细胞恢复正常
E. 白细胞和血小板恢复正常
正确答案：D 您选择的答案：

第61题 小儿生理性贫血出现的时间为生后

A. 1~2个月
B. 2~3个月
C. 4~5个月
D. 6~7个月
E. 8~10个月

正确答案：B 您选择的答案：

第62题 下列有关小儿血红蛋白种类的描述，错误的是

A. 胎儿6个月时HbF占90%
B. 出生时HbF占30%，HbA约占70%
C. 1岁时HbF不超过5%
D. 2岁时HbF不超过2%
E. 成人HbF不超过2%

正确答案：B 您选择的答案：

第63题 重症营养性缺铁性贫血典型的血象应是

A. 以红细胞减少为主
B. 血红蛋白减少比红细胞减少的更加明显
C. 血红蛋白，红细胞成比例地减少
D. 血红蛋白正常，红细胞减少
E. 血红蛋白减少，红细胞正常

正确答案：B 您选择的答案：

第64题 营养性缺铁性贫血的血涂片检查为

A. 红细胞大小不等，以大者为多，中央淡染区不明显
B. 红细胞大小不等，可见异形，靶形红细胞
C. 红细胞大小不等，大者中央淡染区扩大
D. 红细胞大小不等，以小者为多，中央淡染区扩大
E. 红细胞大小不等，染色较深

正确答案：D 您选择的答案：

第65题 营养性缺铁性贫血的确诊，除铁的生化检查外，下列哪一项亦可以协助确诊

A. 喂养史
B. 临床表现
C. 血象特点
D. 骨髓象特点
E. 铁剂治疗有效

正确答案：E 您选择的答案：

第66题 营养性缺铁性贫血实验室检查中下述哪项错误

A. 血清铁蛋白 $< 12\mu\text{g/L}$
B. 红细胞游离原卟啉 $> 500\mu\text{g/L}$
C. 血清铁 $< 50 \sim 60\mu\text{g/dl}$
D. 血清总铁结合力 $< 350\mu\text{g/dl}$
E. 骨髓铁粒幼细胞数 $< 15\%$

正确答案：D 您选择的答案：

第67题 足月新生儿在生后4个月内很少患营养性缺铁性贫血，其原因是

A. 生长发育速度相对较慢
B. 有充足的母乳喂养
C. 铁的排泄量较少
D. 红细胞破坏较少
E. 从母体获得足够的贮存铁

正确答案：E 您选择的答案：

第68题 1岁小儿营养性贫血时肝脾肿大由于

A. 感染
B. 铁和维生素B12缺乏
C. 营养不良
D. 心力衰竭
E. 骨髓外造血

正确答案：E 您选择的答案：

第69题 下列哪项是营养性缺铁性贫血的主要原因

A. 生长发育加快
B. 从食物中摄入的铁不足
C. 贮存铁耗尽
D. 铁的消耗过多
E. 造血功能增加

正确答案：B 您选择的答案：

第70题 小儿最常见的贫血是

- A. 营养性缺铁性贫血
- B. 营养性巨幼红细胞性贫血
- C. 溶血性贫血
- D. 感染性贫血
- E. 生理性贫血

正确答案：A 您选择的答案：

第71题 关于贫血的临床表现，以下哪项是错误的

- A. 皮肤，黏膜出血点或瘀斑
- B. 肝、脾和淋巴结肿大
- C. 心动过速，呼吸加速
- D. 食欲减退
- E. 精神不振，注意力不集中

正确答案：A 您选择的答案：

第72题 正常小儿血象白细胞分类以中性粒细胞占优势的年龄为

- A. 生后7~10天前及7~10岁后
- B. 生后4~6天前及4~6岁后
- C. 生后2~4天前及4~6岁后
- D. 生后15天前及18岁后
- E. 生后30天及20岁后

正确答案：B 您选择的答案：

第73题 红细胞或血红蛋白生成不足所导致的贫血不包括

- A. 缺铁性贫血
- B. 再生障碍性贫血
- C. 巨幼红细胞性贫血
- D. 感染性贫血
- E. 葡萄糖6-磷酸脱氢酶缺乏症

正确答案：E 您选择的答案：

第74题 刚出生的新生儿血红蛋白量为

- A. 110~170g/L
- B. 120~180g/L
- C. 130~190g/L
- D. 140~210g/L
- E. 150~220g/L

正确答案：E 您选择的答案：

第75题 刚出生的新生儿白细胞总数为

- A. $21 \times 10^9 \sim 28 \times 10^9 / L$
- B. $18 \times 10^9 \sim 25 \times 10^9 / L$
- C. $15 \times 10^9 \sim 20 \times 10^9 / L$
- D. $13 \times 10^9 \sim 18 \times 10^9 / L$
- E. $10 \times 10^9 \sim 15 \times 10^9 / L$

正确答案：C 您选择的答案：

第76题 治疗维生素B12缺乏所致的营养性巨幼红细胞性贫血，以下哪项不正确

- A. 肌肉震颤可用镇静剂
- B. 肌注维生素B12至血象恢复正常为止
- C. 必须同时加用叶酸治疗
- D. 严重贫血伴心功能不全者应及时输血
- E. 神经症状大多恢复较慢

正确答案：C 您选择的答案：

第77题 营养性缺铁性贫血在什么情况下可给予输血治疗

- A. 重症贫血，伴有呕吐、腹泻
- B. 重症贫血，伴有嗜睡或烦躁
- C. 重症贫血，伴有头晕、乏力、耳鸣
- D. 重症贫血，伴有心率增快
- E. 重症贫血，伴有明显感染

正确答案：E 您选择的答案：

第78题 下列哪项符合营养性缺铁性贫血

- A. RBC数减少>Hb量减少，TIBC降低
- B. RBC数减少=Hb量减少，TIBC升高
- C. RBC数减少<Hb量减少，TIBC升高
- D. RBC数减少=Hb量减少，TIBC降低
- E. RBC数减少<Hb量减少，TIBC降低

正确答案：C 您选择的答案：

第79题 6个月以后婴儿容易发生营养性缺铁性贫血的主要原因是

- A. 先天储铁不足
- B. 铁摄入量不足
- C. 生长发育快
- D. 铁吸收障碍
- E. 铁的丢失过多

正确答案：B 您选择的答案：

第80题 早期诊断缺铁性贫血最灵敏的指标

- A. 末梢血中红细胞减少
- B. 末梢血中血红蛋白减少
- C. 红细胞游离原卟啉增高
- D. 血清铁减少
- E. 血清铁蛋白减少

正确答案：E 您选择的答案：

第81题 营养性缺铁性贫血临床主要特点是

- A. 婴幼儿发病率高
- B. 为小细胞低色素性贫血
- C. 发病缓慢，病程较长
- D. 红细胞和血红蛋白均减少
- E. 头晕、乏力、眼花、耳鸣

正确答案：B 您选择的答案：

第82题 食物中的铁在消化道的主要吸收部位是

- A. 胃和十二指肠
- B. 十二指肠和空肠
- C. 空肠和回肠
- D. 回肠和升结肠
- E. 十二指肠和空肠上部

正确答案：E 您选择的答案：

第83题 生后1周新生儿，胎龄32周，查外周血HbI 50g/L，需何时补充铁剂预防缺铁性贫血

- A. 立即开始
- B. 生后1个月
- C. 生后2个月
- D. 生后3个月
- E. 无需补充

正确答案：C 您选择的答案：

第84题 造血首先出现的部位是

- A. 骨髓
- B. 肝脏
- C. 胸腺
- D. 卵黄囊
- E. 淋巴结

正确答案：D 您选择的答案：

第85题 胚胎造血首先出现在

- A. 肝脏
- B. 胸腺
- C. 卵黄囊
- D. 骨髓
- E. 淋巴结

正确答案：C 您选择的答案：

第86题 根据世界卫生组织资料，6个月～6岁小儿血红蛋白值的低限是

- A. 90g/L
- B. 100g/L
- C. 110g/L
- D. 120g/L
- E. 130g/L

正确答案：C 您选择的答案：

第87题 早产儿比同龄足月儿更易发生缺铁性贫血的主要原因是

- A. 生理性溶血释放铁较少
- B. 食物中铁利用率较低
- C. 生长发育快及先天储铁少
- D. 红细胞寿命短
- E. 铁排泄量多

正确答案：C 您选择的答案：

第88题 营养性缺铁性贫血的典型骨髓象改变不包括

- A. 幼红细胞增生活跃，以中、晚幼红细胞增生为主
- B. 各阶段红细胞均较小
- C. 红细胞胞核成熟程度落后于胞浆
- D. 粒细胞系无明显异常
- E. 巨核细胞系无明显异常

正确答案：C 您选择的答案：

第89题 小细胞低色素性贫血的形态分类是

- A. $MCV < 80fl$ ， $MCH < 26pg$ ， $MCHC < 31\%$
- B. $MCV < 80fl$ ， $MCH < 28pg$ ， $MCHC 31\% \sim 38\%$
- C. $MCV 80 \sim 94fl$ ， $MCH < 28pg$ ， $MCHC < 31\%$
- D. $MCV < 80fl$ ， $MCH 28 \sim 32pg$ ， $MCHC < 31\%$
- E. $MCV < 80fl$ ， $MCH 28 \sim 32pg$ ， $MCHC 31\% \sim 38\%$

正确答案：A 您选择的答案：

第90题 维生素B12的吸收部位是

- A. 胃
- B. 十二指肠
- C. 空肠
- D. 回肠末端
- E. 升结肠

正确答案：D 您选择的答案：

第91题 叶酸的吸收部位是

- A. 胃
- B. 十二指肠
- C. 十二指肠和空肠
- D. 空肠和回肠
- E. 升结肠

正确答案：C 您选择的答案：

第92题 缺铁性贫血根治的关键是

- A. 铁剂治疗
- B. 病因治疗
- C. 输血治疗
- D. 饮食治疗
- E. 预防各种感染

正确答案：B 您选择的答案：

第93题 营养性缺铁性贫血实验室检查中下述哪项正确

- A. 血清铁降低，总铁结合力增高，铁粒幼红细胞增加
- B. 血清铁蛋白降低，血清铁降低，总结合力降低
- C. 血清铁蛋白降低，红细胞游离原卟啉增高，血清铁降低
- D. 总铁结合力降低，血清铁降低，铁粒幼红细胞减少
- E. 红细胞游离原卟啉增高，铁粒幼红细胞增高，血清铁降低

正确答案：C 您选择的答案：

第94题 营养性缺铁性贫血的典型血象改变是

- A. 呈小细胞正色素性贫血
- B. 血涂片可见靶形红细胞
- C. 血涂片可见红细胞中央淡染区扩大
- D. 网织红细胞数增多
- E. 血小板常常减少

正确答案：C 您选择的答案：

第95题 维生素B12和叶酸储存于

- A. 肝
- B. 脾
- C. 胆囊
- D. 骨髓
- E. 脂肪组织

正确答案：A 您选择的答案：

第96题 2周岁正常小儿血象白细胞分类以

- A. 杆状核细胞占优势
- B. 单核细胞占优势
- C. 分叶粒细胞占优势
- D. 淋巴细胞占优势
- E. 幼稚淋巴细胞占优势

正确答案：D 您选择的答案：

第97题 关于缺乏叶酸所致营养性巨幼红细胞性贫血的病因，以下哪项不正确

- A. 单纯羊乳喂养，未及时添加辅食
- B. 长期偏食绿叶蔬菜及动物内脏
- C. 长期服用广谱抗生素
- D. 长期应用MTX
- E. 慢性腹泻

正确答案：B 您选择的答案：

第98题 下列哪一项代表体内贮存铁减少

- A. 血清铁减少
- B. 血清铁蛋白减低
- C. 总铁结合力增高
- D. 红细胞原卟啉增高
- E. 血象可见血红蛋白降低

正确答案：B 您选择的答案：

第99题 下列哪一项在营养性巨幼红细胞贫血时，有早期诊断意义

- A. 红细胞数和血红蛋白量减少
- B. 血涂片中可见中性粒细胞的多分叶现象
- C. 骨髓象中出现巨幼红细胞
- D. 出现神经、精神系统症状
- E. MCV, MCH, MCHC改变显示大细胞性贫血

正确答案：B 您选择的答案：

第100题 关于缺铁性贫血的非造血系统症状，以下哪项不正确

- A. 食欲减退，少数有异食癖
 - B. 常有烦躁不安或萎靡不振
 - C. 贫血严重时心率增快，心脏扩大
 - D. 肝、脾、淋巴结肿大
 - E. 因免疫功能低下，常合并感染
- 正确答案：D 您选择的答案：

第101题 营养性缺铁性贫血的病因不包括

- A. 先天储铁不足
- B. 铁摄入量不足
- C. 生长发育慢
- D. 铁吸收障碍
- E. 铁丢失过多

正确答案：C 您选择的答案：

第102题 营养性巨幼红细胞性贫血出现精神状主要由于

- A. 缺乏维生素B12
- B. 缺乏叶酸
- C. 缺乏维生素C
- D. 缺乏铁
- E. 缺乏四氢叶酸

正确答案：A 您选择的答案：

第103题 关于红细胞破坏过多所致的贫血，以下哪项不正确

- A. 遗传性球形细胞增多症
- B. 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症
- C. 珠蛋白生成障碍性贫血
- D. 铅中毒所致的贫血
- E. 自身免疫性溶血性贫血

正确答案：D 您选择的答案：

第104题 反应体内贮铁情况的较敏感的指标是

- A. 血清铁蛋白(SF)<12μg / L
- B. 红细胞游离原卟啉(FEP)>0.9μmol / L
- C. 血清铁(SI)<9.0~10.7μmol / L
- D. 总铁结合力(TIBC)>62.7μmol / L
- E. 转铁蛋白饱和度(TS)<15%

正确答案：A 您选择的答案：

第105题 维生素B12缺乏性巨幼红细胞性贫血确诊重要依据是

- A. 明显的精神、神经症状
- B. 典型血象改变
- C. 血清叶酸含量降低
- D. 血清维生素B12含量降低
- E. 典型的骨髓象改变

正确答案：D 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第106题 患儿8个月，母乳喂养，未添加辅食，近1个月来面色蜡黄，虚胖，手足抖动，肝肋下2cm，红细胞 $2.1 \times 10^{12} / L$ ，血红蛋白80g / L。以下有关治疗哪项是错误的

- A. 维生素B12肌肉注射
- B. 镇静剂治疗
- C. 及时添加辅食
- D. 改为羊奶喂养
- E. 加强护理防治感染

正确答案：D 您选择的答案：

第107题 14个月男婴，牛奶和稀粥喂养，近2个月腹泻不愈，食欲欠佳，但时而自食墙皮或泥块，皮肤粘膜渐苍白，肝脾轻度肿大，Hb60g / L，BBC $3.5 \times 10^{12} / L$ ，最可能是

- A. 生理性贫血
- B. 再生障碍性贫血
- C. 营养性缺铁性贫血
- D. 地中海性贫血
- E. 营养性巨幼红细胞性贫血

正确答案：C 您选择的答案：

第108题 患儿，1岁。以面色苍白一个月入院查体：心率138次 / 分，心尖区闻及 级收缩期杂音，血象：Hb50g / L，RBC $2.54 \times 10^{12} / L$ ，临床诊断为缺铁性贫血，该患儿的贫血程度如何判定

- A. 正常血象
- B. 轻度贫血
- C. 中度贫血
- D. 重度贫血
- E. 极重度贫血

正确答案：D 您选择的答案：

第109题 10个月男婴，长期腹泻，近1个月发现其面色渐发黄，不愿活动，外观虚胖，皮肤散在出血点，头部时而震

颤，该患儿血象应是什么改变

- A 红细胞以大者为多，其总数减低，血红蛋白减低
- B 红细胞以大者为多，其总数减低 < 血红蛋白减低
- C 红细胞以小者为多，其总数减低，血红蛋白减低
- D 红细胞以小者为多，其总数减低 < 血红蛋白减低
- E 红细胞与血红蛋白成比例减低

正确答案：A 您选择的答案：

第110题 患儿女，10个月。母乳喂养，未加辅食，近半月患儿皮肤渐苍白，进食少，不愿活动，血象Hb100g/L，RBC $3.08 \times 10^{12}/L$ ，为明确贫血的原因，下列哪项检查具有早期诊断价值

- A 骨髓穿刺
- B 红细胞游离原卟啉测定
- C 血清铁测定
- D 血清铁蛋白的测定
- E 总铁结合力测定

正确答案：D 您选择的答案：

第111题 12个月女婴，近日来手足震颤，面色苍黄，智力落后，少哭不笑。查体：皮肤粘膜苍黄，肝脾轻度肿大，踝阵挛(+)，化验：RBC $2.0 \times 10^{12}/L$ ，Hb 90g/L，WBC $4 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞分叶过多，其诊断应是

- A 再生障碍性贫血
- B 营养性缺铁性贫血
- C 营养性巨幼红细胞性贫血
- D 营养性混合性贫血
- E 感染性贫血

正确答案：C 您选择的答案：

第112题 1岁男婴，因反复患感染性疾病就诊，化验发现，RBC $2.6 \times 10^{12}/L$ ，Hb70g/L，RBC大小不等明显，大细胞中心淡染区扩大，应选用下列哪组药物治疗

- A 铁剂+维生素C稀盐酸
- B 叶酸+维生素B12+维生素C
- C 维生素B12+维生素C+稀盐酸
- D 叶酸+维生素C+铁剂
- E 叶酸+维生素C+稀盐酸

正确答案：D 您选择的答案：

第113题 患儿，10个月。母乳喂养近一个月，面色渐苍白，不愿活动，食欲差，查体发现肝脏增大，于右肋下可触及3cm，心率124次/分，节律不整，心音尚有力，其肝大的原因最大的可能是

- A 心功能不全
- B 急性肝炎
- C 正常现象
- D 骨髓外造血
- E 营养不良

正确答案：D 您选择的答案：

第114题 8个月婴儿，因皮肤粘膜苍白，食欲欠佳来诊，查体发现肝脾轻度肿大，化验：Hb70g/L，RBC $3.5 \times 10^{12}/L$ ，血涂片可见RBC大小不等，以小细胞为主，中心淡染区扩大，最可能是

- A 地中海贫血
- B 再生障碍性贫血
- C 铁粒幼红细胞性贫血
- D 营养性巨幼细胞性贫血
- E 营养性缺铁性贫血

正确答案：E 您选择的答案：

第115题 9个月男婴，近2个月表情呆滞，活动减少，便秘，呈蛋花汤样便，舌常抖动，查体，面色黄，发黄稀疏，腱反射亢进，化验：BBC $1.5 \times 10^{12}/L$ ，Hb 80g/L，WBC $4 \times 10^9/L$ ，最可能的诊断为

- A 营养性缺铁性贫血
- B 感染性贫血
- C 再生障碍性贫血
- D 营养性巨幼红细胞性贫血
- E 溶血性贫血

正确答案：D 您选择的答案：

第116题 患儿8个月，单纯母乳喂养，近一个月表情呆滞，活动减少，稀便。查体：面色苍白，虚胖，四肢震颤，肝肋下3cm，血常规：白细胞 $2.3 \times 10^{12}/L$ ，血红蛋白90g/L，白细胞 $10 \times 10^9/L$ ，网织红细胞0.5%。诊断首先考虑

- A 营养性缺铁性贫血
- B 营养性巨幼红细胞性贫血
- C 慢性感染性贫血
- D 溶血性贫血
- E 失血性贫血

正确答案：B 您选择的答案：

第117题 患儿，9个月。一个月前肺炎，治愈后始终不愿进食，仅吃母乳。近半个月，面色渐白，活动减少，血象BBC $3.05 \times 10^{12}/L$ ，Hb70g/L，WBC $8 \times 10^9/L$ ，PLT $156 \times 10^9/L$ ，MCV 72pg，MCH 5fl，MCHC 30%，该患儿诊断应考虑什么

- A 巨幼细胞性贫血
- B 缺铁性贫血
- C 营养性混合性贫血
- D 再生障碍性贫血
- E 急性白血病

正确答案：B 您选择的答案：

第118题 一个正常小儿，其血象白细胞分类为：杆状核粒细胞1%，分叶核粒细胞35%，淋巴细胞60%，单核细胞2%，该小儿的年龄约为

- A 生后一天
- B 生后5天
- C 生后1周岁
- D 生后5周岁
- E 生后8周岁

正确答案：C 您选择的答案：

第119题 18个月小儿，因长期腹泻入院。查体：患儿面色苍白，表情呆滞，皮肤散在出血点，经化验血象发现：RBC $2.0 \times 10^{12}/L$ ，Hb 90g/L，WBC $3.5 \times 10^9/L$ ，血清铁 $14.32\mu\text{mol}/L$ ($80\mu\text{g}/\text{d1}$)，此患应诊断为

- A 营养性缺铁性贫血
- B 营养性巨幼红细胞性贫血
- C 再生障碍性贫血
- D 营养性混合性贫血
- E 地中海贫血

正确答案：B 您选择的答案：

第120题 刚出生的新生儿，尚未哺乳，无黄疸，血象白细胞 $20 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞0.65，淋巴细胞0.35，最大可能是

- A 宫内感染
- B 正常现象
- C 新生儿败血症
- D 先天性白血病
- E 以上都不是

正确答案：B 您选择的答案：

第121题 患儿，14个月。慢性腹泻二个月，近日发现面色发黄，皮肤散在出血点，查体：心肺正常，肝脾轻度肿大，无震颤，血象：Hb90g/L，WBC $2.65 \times 10^{12}/L$ ，要早期诊断，应首先做什么检查

- A 骨髓穿刺
- B MCV MCH MCHC
- C 血清V_{it}B₁₂测定
- D 血涂片：查中性粒细胞分叶过多现象
- E 血清叶酸测定

正确答案：D 您选择的答案：

第122题 2岁幼儿，诊断为营养性巨幼红细胞性贫血，下列哪项符合其外周血象的特点

- A. MCV(fl)100；MCH(pg)36；
- B. MCV(fl)100；MCH(pg)31；
- C. MCV(fl)100；MCH(pg)33；
- D. MCV(fl)90；MCH(pg)31；
- E. MCV(fl)90；MCH(pg)36；

正确答案：A 您选择的答案：

第123题 生后3天的新生儿，查血红蛋白为110g/L，其贫血的程度是

- A. 轻度
- B. 中度
- C. 重度
- D. 极重度
- E. 无贫血

正确答案：B 您选择的答案：

第124题 患儿，8个月。单纯母乳喂养，近半个月脸色渐苍白，查体，肝脾轻微肿大，血象Hb80g/L，WBC $3.06 \times 10^{12}/L$ ，血清铁 $8.59\mu\text{mol}/L$ ($48\mu\text{g}/\text{dl}$)，临床确诊为缺铁性贫血拟给予铁剂治疗，铁剂治疗的注意事项有以下各项，除了

- A 铁剂用量按元素铁计算
- B 铁剂应选用二价铁盐
- C 用药应在两餐之间服用
- D 铁剂治疗的同时给予维生素C口服
- E 口服铁剂1周仍无效者考虑诊断错误

正确答案：E 您选择的答案：

第125题 一新生儿36周，体重2000g，家长咨询，生后什么时间给予铁剂预防贫血

- A 生后1个月
- B 生后2个月
- C 生后3个月
- D 生后4个月
- E 生后5个月

正确答案：B 您选择的答案：

第126题 10个月女婴，单纯母乳喂养，面色渐苍白2个月，烦躁，食欲不佳，不愿活动，肝肋下2cm，脾肋下可触及边缘，Hb70g/L，RBC $3.6 \times 10^{12}/L$ ，MCV 70fl，MCH 23pg，CMHC 29%，最可能的诊断是

- A 营养性巨幼红细胞性贫血
- B 营养性缺铁性贫血
- C 再生障碍性贫血
- D 地中海贫血
- E 铁粒幼红细胞性贫血

正确答案：B 您选择的答案：

第127题 8个月男婴，一直母乳喂养，未添加辅食。近1月来出现面色苍白，查外周血象示小细胞低色素性贫血，白细胞和血小板正常。该患儿诊断首先考虑

- A. 生理性贫血
- B. 营养性缺铁性贫血
- C. 营养性巨幼红细胞性贫血
- D. 再生障碍性贫血
- E. 地中海贫血

正确答案：B 您选择的答案：

第128题 10个月男婴，进行性面色苍白2个月，近3天出现嗜睡、头部震颤、不能独坐。查体：反应迟钝，肢体轻微震颤，踝阵挛阳性。外周血Hb55g/L，MCV105fl，MCH38pg，MCHC32%，血清V_{it}B₁₂为89ng/L。该患儿治疗首选

- A. 铁剂
- B. 铁剂+维生素C
- C. 维生素B₁₂
- D. 叶酸
- E. 叶酸+维生素B₁₂

正确答案：C 您选择的答案：

第129题 患儿，8个月。因面色苍白20天入院，查体：贫血外观，肝于右肋入触及2.5cm，血象Hb 80g/L，RBC $3.08 \times 10^{12}/L$ ，诊断为小细胞低色素性贫血，给予铁剂治疗，如有效，网织红细胞何时可达高峰

- A. 2~4天
- B. 3~5天
- C. 4~6天
- D. 6~8天
- E. 7~10天

正确答案：E 您选择的答案：

第130题 患儿，9个月。母乳喂养，其母明显偏食，鱼肉类均不吃，患儿近2个月面色苍黄，呆滞，尚不能独坐，查体：嗜睡，伸手时手颤，心肺正常，肝肋下4cm，脾未触及，膝反射亢进，踝阵挛阴性，血象Hb75g/L，BBC $2.0 \times 10^{12}/L$ ，WBC $3.09 \times 10^9/L$ ，PLT $96 \times 10^9/L$ ，此患儿诊断可能性最大的是

- A. 营养性缺铁性贫血
- B. 营养性巨幼细胞性贫血
- C. 营养性混合性贫血
- D. 再生障碍性贫血
- E. 急性白血病

正确答案：B 您选择的答案：

第131题 患儿10个月，生后6个月内生长发育好，近4个月呆滞，面黄。体检：四肢及唇舌抖，舌炎，腱反射亢进，踝阵挛阳性。血象：血红蛋白65g/L，红细胞 $1.5 \times 10^{12}/L$ ，白细胞 $4.5 \times 10^9/L$ ，中性0.15，淋巴0.80，单核0.05，中性粒细胞有核右移现象。患儿最可能的诊断是

- A. 脑性瘫痪
- B. 营养性缺铁性贫血
- C. 呆小病
- D. 婴儿痉挛症
- E. 营养性巨幼红细胞性贫血

正确答案：E 您选择的答案：

第132题 1岁患儿因腹泻就诊。发现血象：RBC $2.5 \times 10^{12}/L$ ，Hb 90g/L，MCV 99fl，MCH 37pg，MCHC 35%，血涂片嗜多色性和嗜碱性点彩红细胞易见，其最可能诊断为

- A. 营养性缺铁性贫血
- B. 再生障碍性贫血
- C. 感染性贫血
- D. 溶血性贫血
- E. 巨幼红细胞性贫血

正确答案：E 您选择的答案：

第133题 患儿，11个月。近一个月面色渐苍白，该患儿出生时为足月顺产，生长发育正常，未患过任何疾病，母乳喂养，其母孕期和哺乳期身体均健康，该患经检查诊断为缺铁性贫血，其缺铁的主要原因是什么

- A. 先天储铁不足
- B. 铁摄入量不足
- C. 生长发育过快
- D. 铁吸收障碍
- E. 铁丢失过多

正确答案：B 您选择的答案：

第134题 患儿1岁，男性。因长期腹泻引起营养性缺铁性贫血，近一个月来患支气管肺炎，Hb40g/L，BBC $2.5 \times 10^{12}/L$ ，应首先采用哪项措施

- A. 硫酸亚铁口服
- B. 肌注右旋糖酐铁
- C. 增加富含铁质的饮食
- D. 抗感染治疗
- E. 输血

正确答案：E 您选择的答案：

第135题 1岁女婴，诊断为营养性缺铁性贫血，给予铁剂治疗，其疗程为用药

- A. 至临床症状完全消失
- B. 至血红蛋白含量恢复正常
- C. 至血红蛋白含量恢复正常后再用药4周

D. 至血红蛋白含量恢复正常后再用药6~8周
E. 至血红蛋白含量恢复正常后再用药8~12周
正确答案：D 您选择的答案：

第136题 1岁患儿，逐渐苍白2个月，单纯母乳喂养，肝肋下2.5cm，脾肋下0.5cm，血红蛋白60g/L，红细胞 $3 \times 10^{12}/L$ ，红细胞中心浅染区扩大，网织红细胞、血小板、白细胞均正常，首先应考虑诊断为

- A. 营养性缺铁性贫血
- B. 营养性巨幼红细胞性贫血
- C. 营养性混合性贫血
- D. 再生障碍性贫血
- E. 雅克什贫血

正确答案：A 您选择的答案：

三、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第137-139题

男，3岁。偏食，不吃鱼肉类制品，近一个月来，家长发现其脸色渐苍白，自诉全身无力，查体心尖部可闻及二级收缩期杂音，肝于右肋下可触及3.0cm，脾于肋下可触及边缘，Hb 50g/L，RBC $2.95 \times 10^{12}/L$ ，MCV 74fl，MCH 26pg，MCHC 30%，考虑为缺铁性贫血

1. 铁剂治疗的剂量是多少

- A. 元素铁0.5~1mg/kg，每日2~3次
- B. 元素铁1~1.5mg/kg，每日2~3次
- C. 元素铁1~2mg/kg，每日2~3次
- D. 元素铁1.5~4mg/kg，每日3~4次
- E. 元素铁2~4mg/kg，每日3~4次

2. 铁剂治疗后，如果有效，首先出现什么变化

- A. 红细胞上升
- B. 血红蛋白上升
- C. 血清铁蛋白上升
- D. 网织红细胞上升
- E. 总铁结合力升高

3. 铁剂治疗后，Hb恢复正常，还需继续用药多长时间

- A. 10天左右
- B. 1个月左右
- C. 1.5个月左右
- D. 2个月左右
- E. 半年左右

正确答案：CDD 您选择的答案：

第140-142题

男，15个月。单纯母乳喂养，不愿进辅食，其母不吃肉类鱼类食品，近一个月面色渐苍黄，目光呆滞，肝肋下2.5cm，脾未及，伸手时手有震颤，Hb90g/L，RBC $2.05 \times 10^{12}/L$

1. 该患儿诊断最大可能是什么

- A. 营养性缺铁性贫血
- B. 混合性贫血
- C. 营养性巨幼红细胞性贫血
- D. 再生障碍性贫血
- E. 溶血性贫血

2. 要想确诊应做什么检查

- A. MCV，MCH，MCHC
- B. 血胆红素测定
- C. 血清铁蛋白
- D. 骨髓穿刺
- E. 血清叶酸测定

3. 该患儿未查出病因前的最佳治疗方案是什么

- A. 铁剂、维生素C、维生素B12
- B. 维生素B12、叶酸
- C. 强的松、维生素B12、叶酸、铁剂
- D. 给予瘦肉、蛋、肝类
- E. 维生素B12、镇静剂、铁剂、维生素C

正确答案：CDE 您选择的答案：

第143-145题

1岁患儿，母乳喂养未加辅食。因食欲不振、无力、懒动1个月来院门诊。体检：皮肤黏膜苍白，肝肋下2cm，脾肋下1cm，化验血象血红蛋白78g/L，红细胞 $3.6 \times 10^{12}/L$ ，血小板 $121 \times 10^9/L$ 。

1. 最可能的诊断是

- A. 营养性缺铁性贫血
- B. 营养性巨幼红细胞性贫血
- C. 营养性混合性贫血
- D. 生理性贫血
- E. ABO溶血

2. 贫血的程度为

- A. 轻度贫血
- B. 中度贫血
- C. 重度贫血
- D. 极重度贫血
- E. 以上都不是

3. 此患儿最可能出现的化验结果是

MCV(f1)	MCH(pg)	MCHC(%)
A. 80 ~ 94	28 ~ 32	32 ~ 38
B. >94	>32	32 ~ 38
C. 80 ~ 94	>32	32 ~ 38
D. <80	<28	32 ~ 38
E. <80	<28	<32

正确答案：ABE 您选择的答案：

第146-148题

1岁患儿，母乳喂养未添加辅食。体检：虚胖，毛发稀黄，面色苍黄，肝肋下3cm，脾肋下1.5cm，表情呆滞，智力发育落后，肢体震颤，踝阵挛阳性。

1. 首选的实验室检查是

- A. 心电图
- B. 脑电图
- C. B型超声检查
- D. 尿常规检查
- E. 血常规检查

2. 可确诊的实验室检查是

- A. 网织红细胞计数
- B. 血气分析
- C. 血常规检查
- D. 血沉测定
- E. 骨髓细胞学检查

3. 此患儿最不可能出现的指标是

- A. Hb86g/L
- B. RBC $2.2 \times 10^{12}/L$
- C. PLT $82 \times 10^9/L$
- D. WBC $3.5 \times 10^9/L$
- E. 网织红细胞数10%

正确答案：EEE 您选择的答案：

第149-151题

男，4岁。一向偏食，不吃鱼肉蛋，仅食蔬菜，近日发现面色渐苍白，不愿活动，时而腹泻，查体心肺正常，肝脏于肋下触及3cm，脾未及，血Hb 60g/L，RBC $2.90 \times 10^{12}/L$ ，血涂片：红细胞大小不等，以小为主，中心淡染区扩大

1. 该患儿最可能诊断是

- A. 溶贫
- B. 再生障碍性贫血
- C. 巨幼红细胞性贫血
- D. 缺铁性贫血
- E. 营养性混合性贫血

2. 确定此病最灵敏的指标是

- A. 血涂片，中性粒细胞多分叶现象
- B. 血清铁蛋白测定
- C. 骨穿及骨髓象分析
- D. MCV、MCH、MCHC
- E. 血清维生素B12测定

3. 引起此病的主要病因是什么

- A. 长期腹泻
- B. 生长发育过快
- C. 先天贮备不足
- D. 摄入量不足
- E. 患有慢性失血性疾病

正确答案：DBD 您选择的答案：

第152-153题

早产儿，现9个月，单纯牛奶喂养，3个月来肤色苍白，食欲减退。体检：皮肤黏膜苍白，心前区2/6级收缩期吹风样杂音。肝肋下3cm，脾肋下1cm。红细胞 $2.0 \times 10^{12}/L$ ，血红蛋白50g/L。外周血涂片示红细胞形态大小不均，以小细胞为主，中央浅染。

1. 最可能的诊断是

- A. 营养性缺铁性贫血
- B. 营养性巨幼红细胞性贫血
- C. 营养性混合性贫血
- D. 地中海贫血
- E. 再生障碍性贫血

2. 根据目前病例之诊断，主要治疗应包括

- A. 铁剂+维生素
- B. 铁剂+维生素B12
- C. 铁剂+叶酸
- D. 泼尼松+丙酸睾酮
- E. 铁剂+维生素C+输血

正确答案：AE 您选择的答案：

第154-156题

1岁女孩，面色苍白3个月，体查：口唇黏膜及甲床苍白，心肺未见异常。外周血Hb66g/L，诊断为营养性缺铁性贫血。

1. 首选药物是

- A. 口服铁剂
- B. 静脉注射铁剂
- C. 肌肉注射铁剂
- D. 维生素C

- E. 输血治疗
 - 2. 若给予口服补铁，应注意
 - A. 餐前服用
 - B. 餐后口服
 - C. 同时服用维生素C
 - D. 同时服用维生素E
 - E. 同时服用胃粘膜保护剂
 - 3. 如铁剂治疗有效，则网织红细胞的变化为
 - A. 服用铁剂后立即升高
 - B. 2~3周后开始升高
 - C. 2~3周达高峰
 - D. 2~3周下降至正常
 - E. 4周之后回落至正常
- 正确答案：ACD 您选择的答案：

第157-159题

女，14个月。仍单纯母乳喂养，不愿进辅食，近一个月面色渐苍白，活动少，捡土块吃，血象Hb60g/L，RBC $3.05 \times 10^{12}/L$ ，WBC $8 \times 10^9/L$ ，PLT $225 \times 10^9/L$ ，MCV 74pg MCH 26fl，MCHC 28%

- 1. 该患儿最可能的诊断是
 - A. 巨幼红细胞性贫血
 - B. 再生障碍性贫血
 - C. 混合性贫血
 - D. 缺铁性贫血
 - E. 溶血性贫血
 - 2. 要想进一步确诊，该患儿应做什么检查
 - A. 血清维生素B12测定
 - B. 血清铁蛋白测定
 - C. 血清叶酸测定
 - D. 骨髓穿刺
 - E. 血涂片检查
 - 3. 该患儿最佳治疗方案是什么
 - A. 铁剂加维生素C
 - B. 铁剂加维生素B12
 - C. 铁剂加叶酸
 - D. 强的松加铁剂
 - E. 铁剂加输血
- 正确答案：DBA 您选择的答案：

第160-162题

11个月男婴，纯母乳喂养，未添加辅食，3个月出现进行性面色苍黄，智力及运动发育倒退，体查：表情呆滞，逗引不笑，舌颤，肺未见异常，肝肋下2cm，脾肋下1cm。血红蛋白70g/L，MCV98fl，MCH34pg，MCHC32%，网织红细胞0.5%，血清VitB1286ng/L。

- 1. 诊断考虑
 - A. 营养性缺铁性贫血
 - B. VitB12缺乏所致巨幼红细胞性贫血
 - C. 叶酸缺乏所致巨幼红细胞性贫血
 - D. 溶血性贫血
 - E. 再生障碍性贫血
 - 2. 如行骨髓穿刺检查，则骨髓象改变不符合的是
 - A. 骨髓增生减低
 - B. 粒：红比值倒置
 - C. 各期幼红细胞均出现巨幼变
 - D. 细胞核发育落后于胞浆
 - E. 巨核细胞有核过度分叶现象
 - 3. 治疗疗程为
 - A. 至临床症状好转为止
 - B. 至血象恢复正常再继续使用1个月
 - C. 至血象恢复正常再继续使用2个月
 - D. 至血象恢复正常再继续使用3个月
 - E. 至临床症状明显好转、血象恢复正常为止
- 正确答案：BAE 您选择的答案：

四、A4型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第163-166题

10个月患儿，早产，出生体重2kg，母乳喂养，未添加辅食，发现面色苍白5个月。体检：体重7kg，苍白，肝肋下3cm，脾肋下1.5cm，心肺(一)。血象：红细胞 $3.5 \times 10^{12}/L$ ，血红蛋白75g/L，白细胞 $6.0 \times 10^9/L$ ，中性0.30，淋巴0.68，单核0.02，网织红细胞计数0.004。

- 1. 考虑可能的诊断为
 - A. 地中海贫血
 - B. 营养性缺铁性贫血
 - C. 营养性巨幼红细胞性贫血
 - D. 营养性混合性贫血
 - E. 溶血性贫血
- 2. 贫血的程度为
 - A. 轻度贫血
 - B. 中度贫血
 - C. 重度贫血

D. 极重度贫血

E. 无贫血

3. 若为进一步确诊, 给患儿做以下辅助检查, 结果为: 血清铁蛋白(SF)低于 $10\mu\text{g/L}$, 血清铁(SI)低于 $50\mu\text{g/L}$, 总铁结合力(TIBC)大于 $62.7\mu\text{mol/L}$, 红细胞游离原卟啉(FEP)大于 $0.9\mu\text{mol/L}$, 骨髓铁粒幼细胞减少, $<15\%$ 。下列哪项治疗欠妥

A. 添加含铁辅食

B. 两餐之间服用铁剂

C. 口服硫酸亚铁I ~ 2mg/kg , 2 ~ 3次/日

D. 加服维生素C

E. 反复输血, 以刺激骨髓造血

4. 若治疗有效, 以下哪项是正确的

A. 网织红细胞于服药3 ~ 4天后升高

B. 网织红细胞于服药后1周下降至正常

C. 网织红细胞于服药后立即下降

D. 血红蛋白最早升高

E. 以上都不正确

正确答案: BBEA 您选择的答案:

第167-171题

患儿10个月, 因间断腹泻2个月, 面色苍白1个月就诊。大便2 ~ 3次/日, 呈糊状, 母乳喂养, 4个月添加辅食。患儿3个月时因患坏死性小肠结肠炎, 而行小肠大部切除术, 术后一般情况渐好转。体检: 皮肤黏膜苍白, 舌细微震颤, J心脏(一), 肝肋下2.5cm, 脾肋下1cm。

1. 为作出初步诊断, 最简便的辅助检查方法为

A. 血常规+血涂片检查

B. 血清维生素B12含量测定

C. 血清铁测定

D. 红细胞寿命测定

E. 血清叶酸含量测定

2. 若检查结果为: 血红蛋白 70g/L , 红细胞 $2 \times 10^{12}/\text{L}$, 白细胞 $5.2 \times 10^9/\text{L}$, 红细胞大小不均, 以大细胞为主, 部分中性粒细胞有核右移。初步诊断为哪种贫血

A. 生理性贫血

B. 营养性巨幼红细胞性贫血

C. 营养性缺铁性贫血

D. 营养性混合性贫血

E. 再生障碍性贫血

3. 此患儿主要的发病原因为

A. 喂养不当

B. 丢失过多

C. 营养物质吸收障碍

D. 生长发育快, 需要增多

E. 慢性感染

4. 下列哪项治疗方法最佳

A. 口服铁剂治疗

B. 肌注维生素B12治疗

C. 输血治疗

D. 口服叶酸治疗

E. 肌注维生素B12+口服叶酸治疗

5. 下述哪项治疗方法欠妥

A. 肌注维生素B12 $100\mu\text{g}$ /次, 每周2 ~ 3次, 连用数周

B. 添加富含铁、维生素B12及叶酸的辅食

C. 口服叶酸 5mg /次+维生素C $0.1 \sim 0.3\text{g}$ /次, 每日3次

D. 少量多次输血以刺激骨髓造血

E. 以上都不是

正确答案: ABCED 您选择的答案:

五、B1型题: 以下提供若干组考题, 每组考题共用在前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第172-173题

A. $\text{MCV} > 94$, $\text{MCH} > 32$, $\text{MCHC} 32 \sim 38$

B. $\text{MCV} 80 \sim 94$, $\text{MCH} 28 \sim 32$, $\text{MCHC} 32 \sim 38$

C. $\text{MCV} < 80$, $\text{MCH} < 28$, $\text{MCHC} 32 \sim 38$

D. $\text{MCV} < 80$, $\text{MCH} < 28$, $\text{MCHC} < 32$

E. $\text{MCV} > 94$, $\text{MCH} > 32$, $\text{MCHC} > 38$

1. 大细胞性贫血

2. 小细胞性低色素性贫血

正确答案: AD 您选择的答案:

第174-175题

A. 维生素B12

B. 叶酸

C. 维生素C

D. 铁剂

E. 维生素B6

1. 治疗有神经系统症状的大细胞贫血首选药物

2. 能促进叶酸利用, 同时口服可提高疗效的药物

正确答案: AC 您选择的答案:

第176-179题

- A. 肝
 - B. 卵黄囊
 - C. 骨髓
 - D. 脾
 - E. 髓外造血
 - 1. 胚胎期造血首先在
 - 2. 胚胎2个月胎儿主要造血部位是
 - 3. 出生后唯一造血场所是
 - 4. 婴儿发生溶血性贫血时可出现
- 正确答案：BACE 您选择的答案：

第180-182题

- A 红细胞游离原卟啉 $> 500\mu\text{g} / \text{L}$
 - B 血清铁 $< 8.95 \sim 10.74\mu\text{mol} / \text{L} (< 50 \sim 60\mu\text{g} / \text{dl})$
 - C 红细胞数和血红蛋白量减低
 - D 血清铁蛋白 $< 12\mu\text{g} / \text{L}$
 - E 骨髓象提增生性贫血
 - 1. 铁减少期实验室的特征性指标
 - 2. 红细胞生成缺铁期的实验室特征性指标
 - 3. 缺铁性贫血期的实验室检查的特征性指标
- 正确答案：DAB 您选择的答案：

第183-184题

- A. 正细胞性贫血
 - B. 大细胞性贫血
 - C. 单纯小细胞性贫血
 - D. 小细胞低色素性贫血
 - E. 单纯低色素性贫血
 - 1. 营养性缺铁性贫血
 - 2. 营养性巨幼红细胞性贫血
- 正确答案：DB 您选择的答案：

第185-186题

- A. 血清铁
 - B. 血清铁蛋白
 - C. 红细胞游离原卟啉
 - D. 总铁结合力
 - E. 血红蛋白
 - 1. 铁减少期有变化的是
 - 2. 红细胞生成缺铁期无变化的是
- 正确答案：BE 您选择的答案：

第187-188题

- A. 智力及动作发育落后，有倒退现象
 - B. 兴奋、多动
 - C. 注意力不集中，记忆力减退
 - D. 腱反射减弱
 - E. 感觉异常
 - 1. 缺铁性贫血的神经系统表现
 - 2. 营养性巨幼红细胞性贫血的神经系统表现
- 正确答案：CA 您选择的答案：

第189-191题

- A 红细胞生成素减少
 - B 先天储铁不足
 - C 铁摄入量不足
 - D RNA合成减少
 - E DNA合成不足
 - 1. 生理性贫血的主要原因是
 - 2. 营养性缺铁性贫血的主要原因是
 - 3. 营养性巨幼红细胞性贫血的主要发病机制是
- 正确答案：ACE 您选择的答案：

习题集 儿科学 消化系统疾病

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 腹泻患儿补充累积损失量应于开始输液的多长时间内完成

- A . 30 ~ 60分钟
- B . 1 ~ 2/小时
- C . 3 ~ 4/小时
- D . 8 ~ 12/小时
- E . 12 ~ 16/小时

正确答案：D 您选择的答案：

第2题 中度脱水的临床表现，下列哪项是错误的

- A 精神萎靡或烦躁不安
- B 眼窝及前囟明显凹陷
- C 哭时泪少，尿量明显减少
- D 四肢厥冷，血压下降
- E 皮肤干燥，弹性极差

正确答案：D 您选择的答案：

第3题 中度脱水的临床表现哪项是不正确的

- A 失水量为体重的5% ~ 10%
- B 皮肤弹性较差
- C 眼窝、前囟明显凹陷
- D 四肢厥冷
- E 尿量明显减少

正确答案：D 您选择的答案：

第4题 小儿腹泻时低钾症状见于血钾(mmol / L)低于

- A 2
- B 2 . 5
- C 3
- D 3 . 5
- E 4

正确答案：D 您选择的答案：

第5题 婴儿腹泻轻度酸中毒在临床上的早期诊断可依据

- A . 呕吐次数
- B . 腹泻的次数
- C . 脱水程度
- D . 口唇樱红
- E . 呼吸有烂苹果味

正确答案：D 您选择的答案：

第6题 不能测血钠时补液种类应选择

- A 等张含钠液
- B 2 / 3张含钠液
- C 1 / 2张含钠液
- D 1 / 3张含钠液
- E 1 / 4张含钠液

正确答案：C 您选择的答案：

第7题 小儿消化系统解剖特点下列哪项不正确

- A 新生儿贲门括约肌发育不成熟
- B 婴儿胃呈水平位
- C 婴儿幽门括约肌发育不成熟
- D 婴儿肠道相对较长
- E 婴儿肠道固定性较差

正确答案：C 您选择的答案：

第8题 10月婴儿，长期应用抗生素后突然出现吐泻伴高热3天，大便6~8次/日，暗绿色，量多，带粘液和脓血，大便镜检见较多脓细胞和G+球菌。T39.5℃，精神差，哭无泪，眼窝明显凹陷，口唇和皮肤干燥，四肢冰凉，尿量明显减少，最可能的诊断是

- A . 致病性大肠杆菌性肠炎伴中度脱水
- B . 侵袭性大肠杆菌性肠炎伴中度脱水
- C . 出血性大肠杆菌性肠炎伴重度脱水
- D . 空肠弯曲菌性肠炎伴中度脱水
- E . 金黄色葡萄球菌性肠炎伴重度脱水

正确答案：E 您选择的答案：

第9题 小儿腹泻代谢性酸中毒的治疗，下列哪项是错误的

- A 轻症不需要另给碱性溶液
- B 碳酸氢钠为首选药物
- C 碱性溶液需要量可按公式计算
- D 先给总需要量的1 / 2
- E 1 . 4%碳酸氢钠5ml / (kg · 次)

正确答案：E 您选择的答案：

第10题 小儿腹泻每日补钾量正确的是(mmol / kg)

- A 一般按3~4mmol / kg
- B 缺钾明显者按6~8mmol / kg
- C 轻者按1~2mmol / kg
- D 重者按500mg / kg
- E 极少数病例可按600mg / kg

正确答案：A 您选择的答案：

第11题 小儿腹泻重度脱水，第一天静脉补液总量为(ml / Kg)

- A 60~90
- B 90~120
- C 120~150
- D 150~180
- E 180~210

正确答案：D 您选择的答案：

第12题 单纯母乳喂养儿肠道内占绝对优势的细菌为

- A 大肠杆菌
- B 嗜酸杆菌
- C 双歧杆菌
- D 肠球菌
- E 空肠弯曲菌

正确答案：C 您选择的答案：

第13题 引起小儿秋季腹泻，最常见的病原体是

- A 病毒
- B 细菌
- C 真菌
- D 寄生虫
- E 以上都不是

正确答案：A 您选择的答案：

第14题 婴儿腹泻的饮食治疗，下述哪项不正确

- A 腹泻严重者应禁食
- B 母乳喂养者可继续哺乳，暂停辅食
- C 双糖酶显著缺乏者慎用糖类食品
- D 病毒性肠炎应暂停乳类，改为豆制代乳品
- E 人工喂养者，可给等量米汤或水稀释的牛奶，或脱脂奶

正确答案：A 您选择的答案：

第15题 婴儿腹泻伴低钾血症时下列哪一项不正确

- A 腹泻时排钾过多致低钾
- B 酸中毒时血钾更低
- C 血钾低于3.5mmol / L时出现低钾症状
- D 补液后钾从尿中排出增加
- E 补液后血钾较补液前相对较低

正确答案：B 您选择的答案：

第16题 重度脱水临床表现哪项是错误的

- A 口腔粘膜极干燥
- B 四肢厥冷
- C 失水量为50~100ml / kg
- D 尿量极少或无尿
- E 眼窝和前囟深陷

正确答案：C 您选择的答案：

第17题 小儿腹泻脱水尤明显循环障碍时，前8~12小时最合适的补液速度[ml / (kg · h)]是

- A 2~4
- B 5~7
- C 8~10
- D 11~13
- E 14~16

正确答案：C 您选择的答案：

第18题 关于小儿腹泻的非感染因素中，以下哪项是错误的

- A 喂养不当
- B 气候突然变化，腹部受凉
- C 天气过冷，消化液分泌减少
- D 上呼吸道感染并发腹泻
- E 牛奶或大豆过敏

正确答案：C 您选择的答案：

第19题 应用口服补液时，口服补液盐中所含葡萄糖的作用主要是

- A 使口服液具有一定的渗透压
- B 提供能量
- C 增加小肠对钠、水的重吸收
- D 利用渗透利尿作用排泄毒素
- E 治疗酮症酸中毒

正确答案：C 您选择的答案：

第20题 轮状病毒肠炎常出现

- A. 明显中毒症状
- B. 休克
- C. 脱水、酸中毒
- D. 黏液脓血便
- E. 肠紊乱

正确答案：C 您选择的答案：

第21题 小儿腹泻中重度脱水伴低血钾时应

- A. 立即快速给予补钾
- B. 纠正脱水不必补钾
- C. 纠正脱水同时以0.5%浓度缓慢补钾
- D. 口服氯化钾
- E. 纠正酸中毒同时缓慢补钾

正确答案：E 您选择的答案：

第22题 婴儿腹泻的发病易感因素不包括

- A. 消化系统发育不成熟
- B. 胃酸和消化酶分泌少，酶活力偏低
- C. 生长发育快，所需营养物质较多，胃肠道负担重
- D. 婴儿胃酸偏低，胃排空快
- E. 母乳喂养儿的发生率高

正确答案：E 您选择的答案：

第23题 关于小儿腹泻的病因，下列哪项是错误的

- A. 肠道内感染
- B. 喂养不当
- C. 消化系统发育不成熟
- D. 血清ISG水平低下
- E. 肠道外感染

正确答案：D 您选择的答案：

第24题 口服补液盐适合于

- A. 新生儿肠炎
- B. 心肾功能不全者
- C. 腹胀明显的腹泻患儿
- D. 腹泻时脱水的预防
- E. 腹泻重度脱水

正确答案：D 您选择的答案：

第25题 口服补液盐不适合于

- A. 新生儿腹泻
- B. 腹泻时脱水的预防
- C. 腹泻伴轻度脱水
- D. 腹泻伴中度脱水而无明显周围循环障碍者
- E. 补充继续失去量

正确答案：A 您选择的答案：

第26题 关于小儿腹泻不正确的是

- A. 多病原引起
- B. 多因素引起
- C. 主要表现为大便次数增多和大便性状改变
- D. 6月~2岁婴幼儿发病率高
- E. 不会对小儿的生长发育产生影响

正确答案：E 您选择的答案：

第27题 婴幼儿体内含水量较成人相对多，其主要增多部分是

- A. 细胞外液
- B. 血浆
- C. 间质液
- D. 细胞内液
- E. 脑脊液

正确答案：C 您选择的答案：

第28题 婴儿腹泻有明显的周围循环障碍者，扩容宜选用

- A. 1/2张含钠液20ml/kg
- B. 等张含钠液20ml/kg
- C. 2/3张含钠液20ml/kg
- D. 等张含钠液30ml/kg
- E. 3:2:1含钠液20ml/kg

正确答案：B 您选择的答案：

第29题 除哪一项外，均为低渗性脱水的特点

- A. 主要是细胞外液减少重点为低钠血症
- B. 多见于营养不良伴腹泻的病儿
- C. 易高热，烦渴
- D. 易脱水，休克
- E. 易嗜睡，昏迷

正确答案：C 您选择的答案：

第30题 小儿腹泻第一天补液方法，下列哪项是错误的

- A 低渗性脱水用4:3:1溶液
- B 高渗性脱水用3:2:1溶液
- C 等渗性脱水用2:3:1溶液
- D 脱水性质不明用2:3:1溶液
- E 同时见尿补钾4~6天

正确答案：B 您选择的答案：

第31题 婴儿腹泻治疗原则包括以下内容，哪项除外

- A 调整和适当限制饮食
- B 纠正水、电解质紊乱
- C 加强护理，防止并发症
- D 控制肠道内外感染
- E 长期应用广谱抗生素

正确答案：E 您选择的答案：

第32题 小儿腹泻应用2:1等张含钠液的适应证是

- A 重度或中度脱水有明显周围循环障碍者
- B 中度脱水无循环衰竭者
- C 补充继续损失量
- D 补充生理需要量
- E 高渗性脱水

正确答案：A 您选择的答案：

第33题 重型腹泻的临床表现主要指

- A 呕吐重
- B 食欲差
- C 发热
- D 腹泻频繁
- E 有脱水、酸中毒和电解质紊乱

正确答案：E 您选择的答案：

第34题 婴儿体内含水量较成人相对多，其主要增多部分是

- A 细胞外液
- B 血浆
- C 间质液
- D 细胞内液
- E 脑脊液

正确答案：C 您选择的答案：

第35题 引起小儿病毒性肠炎的主要病原为

- A 人类轮状病毒
- B 柯萨奇病毒
- C 埃可病毒
- D 腺病毒
- E 冠状病毒

正确答案：A 您选择的答案：

第36题 婴儿腹泻重度脱水的主要诊断依据是

- A 眼眶前囟深凹
- B 皮肤弹性极差
- C 哭无泪，尿量极少
- D 精神极度萎靡
- E 外周循环衰竭

正确答案：E 您选择的答案：

第37题 小儿秋季腹泻最常见的病原是

- A 轮状病毒
- B 埃可病毒
- C 腺病毒
- D 诺沃克病毒
- E 柯萨奇病毒

正确答案：A 您选择的答案：

第38题 婴幼儿秋冬季腹泻的最常见病原是

- A 腺病毒
- B 诺沃克病毒
- C 轮状病毒
- D 埃可病毒
- E 柯萨奇病毒

正确答案：C 您选择的答案：

第39题 轮状病毒肠炎常伴有

- A 发热，上呼吸道感染症状
- B 皮疹
- C 肝大
- D 淋巴结肿大
- E 肠紊乱

正确答案：A 您选择的答案：

第40题 所有侵袭性细菌性肠炎的共同临床表现中，最具特点的是

- A. 呕吐
- B. 发热
- C. 腹痛
- D. 恶心
- E. 排黏液脓血便

正确答案：E 您选择的答案：

第41题 关于小儿消化系统的解剖生理特点，以下哪项是错误的

- A. 3个月以下小儿唾液中淀粉酶缺乏，不宜喂淀粉类食物
- B. 贲门括约肌发育不成熟，控制能力差，常发生胃食管反流
- C. 婴儿胃呈水平位，当开始行走时变为垂直
- D. 肠系膜柔软而长，升结肠与后壁固定差，易发生肠套叠
- E. 人乳喂养儿粪便为淡黄色或灰黄色，较干稠，有蛋白分解的臭味

正确答案：E 您选择的答案：

第42题 关于小儿腹泻的易感因素中，下列哪项是错误的

- A. 婴幼儿消化系统发育不成熟
- B. 婴儿胃酸偏低
- C. 胃肠道分泌型IgA缺乏
- D. 人工喂养儿肠道抗感染能力弱
- E. 正常肠道菌群对致病微生物无拮抗作用

正确答案：E 您选择的答案：

第43题 迁延性腹泻的病程正确的是

- A. 2周~2月
- B. 1月~2月
- C. 2月以上
- D. 2~3月
- E. 3月以上

正确答案：A 您选择的答案：

第44题 纯母乳喂养儿，正常时每日排便次数为

- A. 1~2次
- B. 2~4次
- C. 5~6次
- D. 6~7次
- E. 7~8次

正确答案：B 您选择的答案：

第45题 轻型和重型腹泻的区别是

- A. 呕吐的次数
- B. 发热
- C. 腹泻每天超过10次以上
- D. 不能进食
- E. 脱水和酸中毒

正确答案：E 您选择的答案：

第46题 轻型腹泻与重型腹泻的区别点是

- A. 大便每日10次以上
- B. 食欲不振
- C. 呕吐频繁
- D. 黄色水样便或蛋花汤样便
- E. 较重的胃肠道症状，伴较明显的脱水及电解质紊乱

正确答案：E 您选择的答案：

第47题 小儿秋季腹泻的临床表现不正确的是

- A. 多见于6~24月的婴幼儿
- B. 潜伏期1~3天
- C. 常伴发热和上呼吸道感染
- D. 大便水样或黄色蛋花样，无腥臭味
- E. 不易发生脱水和酸中毒

正确答案：E 您选择的答案：

第48题 婴儿腹泻重型与轻型的主要区别点是

- A. 发热、呕吐
- B. 每日大便超过10次
- C. 有水、电解质紊乱
- D. 大便含粘液、腥臭
- E. 镜检有大量脂肪滴

正确答案：C 您选择的答案：

第49题 哪一项提示低血钾

- A. 神经肌肉兴奋性增加
- B. 肠鸣音消失，四肢肌力低下
- C. 心音亢进，心率减慢
- D. 呼吸深大
- E. 肠鸣音亢进

正确答案：B 您选择的答案：

第50题 低渗性脱水主要是

- A. 血钾低
- B. 血钙低
- C. 血镁低
- D. 血钠低
- E. 血磷低

正确答案：D 您选择的答案：

第51题 小儿腹泻重度低渗性脱水第一天补液，下列哪项最适合

- A. 2:1含钠液
- B. 2:3:1含钠液
- C. 3:2:1含钠液
- D. 4:3:2含钠液
- E. 2:6:1含钠液

正确答案：A 您选择的答案：

第52题 单纯母乳喂养儿肠道的优势菌群是

- A. 双歧杆菌
- B. 大肠杆菌
- C. 嗜酸杆菌
- D. 肠球菌
- E. 变形杆菌

正确答案：A 您选择的答案：

第53题 除哪一项外，均为高渗性脱水的特点

- A. 高热、出汗多而饮水不足
- B. 烦躁不安、肌张力高、惊厥
- C. 细胞内、外液均减少
- D. 无明显口渴
- E. 可出现脑出血或脑血栓形成

正确答案：D 您选择的答案：

第54题 2:3:1含钠液下列哪项是错误的

- A. 0.9%氯化钠2份
- B. 5%葡萄糖3份
- C. 1.4%碳酸氢钠1份
- D. 或1.87%乳酸钠1份
- E. 1.2%氯化钾1份

正确答案：E 您选择的答案：

第55题 婴儿腹泻在脱水性质不明时，第一天静脉补液可选用

- A. 1/2张含钠液
- B. 1/3张含钠液
- C. 1/4张含钠液
- D. 2/3张含钠液
- E. 2:1等张含钠液

正确答案：A 您选择的答案：

第56题 病毒性肠炎治疗最好选用

- A. 饮食和支持疗法
- B. 口服病毒灵
- C. 静滴氨苄青霉素
- D. 肌注病毒唑
- E. 口服庆大霉素

正确答案：A 您选择的答案：

第57题 小儿腹泻时低钾血症的原因主要指

- A. 丢失增多
- B. 进食少，钾入量少
- C. 肾脏排泄
- D. 钾向细胞外转移
- E. 肾脏保钾功能差

正确答案：A 您选择的答案：

第58题 下列哪项不是小儿腹泻的易感因素

- A. 消化系统发育不成熟
- B. 消化道负担重
- C. 肠道内感染
- D. 血中免疫球蛋白及胃肠道分泌型IgA低
- E. 胃内酸度低

正确答案：C 您选择的答案：

第59题 口服补液盐适用于

- A. 新生儿肠炎
- B. 心功能不全者
- C. 腹胀明显的腹泻患儿
- D. 腹泻并重度脱水
- E. 有轻、中度脱水，无酸中毒

正确答案：E 您选择的答案：

第60题 关于轻型腹泻的临床表现不正确的是

- A. 以胃肠道症状为主
- B. 大便次数增多
- C. 食欲不振
- D. 无脱水
- E. 血钾 $< 3.5 \text{ mmol/L}$

正确答案：E 您选择的答案：

第61题 不造成肠粘膜损伤的腹泻致病菌是

- A. 空肠弯曲菌
- B. 耶尔森菌
- C. 金葡菌
- D. 产毒性大肠杆菌
- E. 侵袭性大肠杆菌

正确答案：D 您选择的答案：

第62题 腹泻引起代谢性酸中毒的原因主要是

- A. 吐泻丢失大量的碱性物质
- B. 进食少热卡不足
- C. 肾排酸障碍
- D. 组织中乳酸堆积
- E. 酮体产生增多

正确答案：A 您选择的答案：

第63题 轮状病毒肠炎多见于

- A. 6个月以内的婴儿
- B. 6~24个月的婴儿
- C. 4岁以上的儿童
- D. 1~10岁小儿
- E. 新生儿

正确答案：B 您选择的答案：

第64题 小儿腹泻轻度酸中毒时，早期诊断的可靠依据是

- A. 呕吐、腹泻次数
- B. 脱水程度
- C. 酸中毒症状
- D. 呼吸症状
- E. 血气分析

正确答案：E 您选择的答案：

第65题 引起小儿腹泻的最常见的病原是

- A. 产毒性大肠杆菌
- B. 侵袭性大肠杆菌
- C. 空肠弯曲菌
- D. 金葡菌
- E. 白色念珠菌

正确答案：A 您选择的答案：

第66题 小儿腹泻脱水，在脱水纠正后出现惊厥，最常见的原因是

- A. 脑水肿
- B. 低钠血症
- C. 低钙血症
- D. 低血糖
- E. 低镁血症

正确答案：C 您选择的答案：

第67题 高渗性脱水补液应选择

- A. 等张含钠溶液
- B. 5%葡萄糖
- C. 1/2张含钠液
- D. 1/3张含钠液
- E. 2/3张含钠液

正确答案：D 您选择的答案：

第68题 婴儿腹泻重度脱水静脉补液总量应给予

- A. 100ml/kg
- B. 80~100ml/kg
- C. 100~120ml/kg
- D. 120~150ml/kg
- E. 150~180ml/kg

正确答案：E 您选择的答案：

第69题 关于迁延性腹泻不正确的是

- A. 病因复杂
- B. 感染、过敏、酶及免疫缺陷均可引起
- C. 急性腹泻治疗不彻底迁延引起
- D. 营养不良小儿易伴发
- E. 禁食时间应较长，以利肠道功能的恢复

正确答案：E 您选择的答案：

第70题 小儿腹泻是指

- A. 病毒性肠炎
- B. 喂养不当引起的肠炎
- C. 细菌性痢疾
- D. 多病原、多因素引起的腹泻为主的综合征
- E. 肠道外感染引起的腹泻

正确答案：D 您选择的答案：

第71题 关于婴儿易发生溢乳的原因，以下哪项是错误的

- A. 吸奶时吞咽过多空气
- B. 食管呈漏斗状
- C. 贲门括约肌张力高
- D. 胃食管反流
- E. 胃呈水平位

正确答案：C 您选择的答案：

第72题 小儿腹泻患儿如需禁食，一般不应超过

- A. 24小时
- B. 18小时
- C. 24~36小时
- D. 12小时
- E. 4~6小时

正确答案：E 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第73题 8月婴儿，呕吐腹泻3天，大便黄色水样，量多，无发热，精神萎靡，呼吸深快，唇樱红，面色苍灰，前囟眼窝明显凹陷，尿量减少，哭无泪，皮肤弹性极差，四肢冰冷，补液应首选

- A. 2/3张含钠液50ml/kg
- B. 5%碳酸氢钠20ml/kg
- C. 2:1等张含钠液20ml/kg
- D. 1/2张含钠液40ml/kg
- E. 1/3张含钠液20ml/kg

正确答案：C 您选择的答案：

第74题 患儿，8个月。腹泻4天，水样便，1日10余次。12小时无尿，呼吸深大，前囟、眼窝明显凹陷，四肢凉，血钠127mmol/L，血钾4mmol/L，血钙9mg%，二氧化碳结合力11.2mmol/L，首批应输入下述哪种混合液

- A. 4:3:2液(2/3张)
- B. 3:2:1液(1/2张)
- C. 2:1等张含钠液
- D. 1:2液(1/3)
- E. 1:1液(1/2张)

正确答案：C 您选择的答案：

第75题 患儿腹泻4天，中度脱水。经2天补液后脱水基本纠正，但仍肢软，心音稍钝，进食甚少。在整个补液治疗过程中对补钾按以下方案进行。但哪一项是错误的

- A. 治疗时注意到给钾前6小时曾排尿
- B. 静脉钾盐点滴浓度不超过0.3%
- C. 滴注时间不少于6~8小时
- D. 脱水纠正后第二天停止补钾
- E. 补钾量一般为3~4mmol/(kg·d)

正确答案：D 您选择的答案：

第76题 14个月男孩发热，腹泻、呕吐3天入院，精神萎靡，呼吸45次/分。略促及深长、中度失水征，腹软气胀，余无异常。血钠127mmol/L，血钾4mmol/L，氯100mmol/L，Co2CP15mmol/L，第一天补液应是

- A. 100ml/(kg·d)1:1液，不补钾
- B. 100ml/(kg·d)4:3:2液，不补钾
- C. 150ml/(kg·d)2:3:1液，见尿后补钾
- D. 150ml/(kg·d)4:3:2液，见尿后补钾
- E. 200ml/(kg·d)4:3:2液，见尿后补钾

正确答案：D 您选择的答案：

第77题 女婴，10个月。腹泻每日5~7次，水样便。伴呕吐2次。每日尿量较平日略少些。体检：前囟平，哭有泪。口唇略干，四肢温暖，无腹胀。皮肤弹性尚可。该儿腹泻病情为轻型与重型的区别点主要是

- A. 有无发热呕吐
- B. 每日大便，10次以上为重型
- C. 有无水、电解质紊乱
- D. 大便含粘液、血性为重型
- E. 镜检有大量脂肪滴为重型

正确答案：C 您选择的答案：

第78题 1岁半小儿，发热、恶心、呕吐、排黏液脓血便3天，下列哪项可能性最小

- A. 产毒性大肠杆菌肠炎
- B. 侵袭性大肠杆菌肠炎
- C. 细菌性痢疾
- D. 空肠弯曲菌肠炎
- E. 鼠伤寒沙门菌小肠结肠炎

正确答案：A 您选择的答案：

第79题 3个月小儿，母乳喂养，腹泻2个月余，大便3~4次/日，糊状，无黏液脓血，精神食欲好，多种药物治疗无效，现体重5.8kg，诊断为

- A. 霉菌性肠炎
- B. 病毒性肠炎
- C. 大肠杆菌肠炎
- D. 生理性腹泻
- E. 迁延性腹泻

正确答案：D 您选择的答案：

第80题 秋季流行腹泻中，6个月小儿，2天吐泻20余次，精神萎靡，皮肤干燥，弹性较差，眼窝明显凹陷，尿量明显减少，唇干肢冷，血压9.3/5.3kPa，体温36.5，恰当补液应为

- A 90ml / (kg·d)
- B 90~120ml / (kg·d)
- C 120~150ml / (kg·d)
- D 150~180ml / (kg·d)
- E >180ml / (kg·d)

正确答案：C 您选择的答案：

第81题 9个月男婴，腹泻3天，大便10次/日，量多，呈蛋花汤样，精神萎靡，眼泪少、尿少，血清钠135mmol/L，皮肤弹性差，唇红，呼吸深快，应诊断为

- A. 轻度等渗性脱水，酸中毒
- B. 重度低渗性脱水，酸中毒
- C. 中度低渗性脱水，酸中毒
- D. 中度等渗性脱水，酸中毒
- E. 重度等渗性脱水，酸中毒

正确答案：D 您选择的答案：

第82题 6个月患儿，吐泻2天，呼吸46次/分，脉搏124次/分，皮肤弹性较差，哭时泪少，血钠136mmol/L，血钾4.0mmol/L，二氧化碳结合力14mmol/L，此患儿脱水程度及性质考虑

- A 轻度脱水，等渗性
- B 轻度脱水，低渗性
- C 中度脱水，低渗性
- D 中度脱水，等渗性
- E 重度脱水，高渗性

正确答案：D 您选择的答案：

第83题 12月中旬，一8个月婴儿来院就诊，呕吐、腹泻2天伴发热流涕，大便：10次/日，水样便，呕吐4~6次/日。体检：皮肤干燥，弹性差，口唇樱红，腹泻，腱反射弱。大便镜检：白细胞0~1个/高倍，下列何种治疗措施不恰当

- A. 暂停乳类食品，代之以豆类代乳品
- B. 及时足量、足疗程给予抗肠道杆菌之抗生素
- C. 根据脱水程度进行补液
- D. 补液的同时纠正酸中毒
- E. 有尿后，静脉补钾浓度为0.3%

正确答案：B 您选择的答案：

第84题 11月婴儿，9月份因腹泻5天入院，大便呈水样和蛋花汤样，无臭味，有时有少量粘液但无脓血，大便常规有少量白细胞，有轻度脱水征，诊断考虑

- A. 致病性大肠杆菌性肠炎
- B. 饥饿性腹泻
- C. 空肠弯曲菌肠炎
- D. 病毒性肠炎
- E. 生理性腹泻

正确答案：D 您选择的答案：

第85题 男，11个月，发热咳嗽3~4天，食后呕吐，腹泻5~6次/天，蛋花汤样。T39.5 P140次/分，R60次/分，神萎，气促，唇周青紫，口唇干燥，心音略低，二肺底湿啰音，腹部皮肤弹性减退。其酸碱平衡紊乱；血pH 7.24，PaCO₂ 26.4kPa，SB 24mmol/L，BE 6mmol/L。应考虑

- A 代谢性酸中毒，代偿性
- B 呼吸性酸中毒，代偿性
- C 呼吸性酸中毒，失代偿性
- D 代谢性酸中毒，失代偿性
- E 代谢性合并呼吸性酸中毒

正确答案：E 您选择的答案：

第86题 患儿，6个月。腹泻20余天，每日10余次稀水样便，体重5.3kg，精神萎靡，皮肤弹性极差，前囟及眼窝明显凹陷，四肢凉，血压偏低，口渴轻度，尿量极少，血钠125mmol/L考虑诊断为

- A 中度等渗脱水
- B 重度等渗脱水
- C 中度低渗脱水
- D 重度低渗脱水
- E 重度高渗脱水

正确答案：D 您选择的答案：

第87题 婴儿腹泻经第1天补液后脱水症状改善，第2天后的处理应为

- A 停止补液，恢复正常饮食
- B 口服补液，恢复正常饮食
- C 给补累积损失+继续损失量
- D 补充异常的继续损失+生理需要量

E 仅补生理需要量+钾盐

正确答案：D 您选择的答案：

第88题 6个月女孩，中度脱水酸中毒，经纠正酸中毒与补液12小时后出现嗜睡，呼吸较前为浅，心音低钝，心率160次/分，腹胀，肠鸣音弱，血钠为135mmol/L，应考虑

A 血液低渗所致脑水肿

B 低镁血症

C 水中毒

D 低钾血症

E 低钙血症

正确答案：D 您选择的答案：

第89题 6个月患儿，腹泻水样便5天，精神萎靡，眼窝及前囟明显凹陷，四肢稍凉，尿量明显减少，呼吸稍快，血清钠未测，应补给0.9%氯化钠:5%葡萄糖:1.87%乳酸钠的溶液的比例的ml数为

A 450:300:150

B 400:300:200

C 300:450:150

D 200:600:100

E 400:600:200

正确答案：C 您选择的答案：

第90题 男婴，6个月。因呕吐腹泻3天，加剧一天，尿少来院急诊，体温38℃，眼窝前囟显凹，皮肤弹性较差，血Na⁺140mmol/L，动脉血气:pH7.2，BE 12mmol/L最适宜处理是

A 禁食6小时，以后牛奶喂养

B 静注25%葡萄糖溶液

C 静脉注射速尿

D 2:3:1溶液静滴

E 1.4%碳酸氢钠静滴

正确答案：E 您选择的答案：

第91题 8个月女孩，发热、腹泻轻咳2天入院，大便10余次/日，蛋花汤样，大便镜检:白细胞2~3个/HP，大便细菌培养阴性，血常规:WBC为7.5×10⁹/L，除轻度脱水征外，无其他异常。最可能的诊断是

A 致病性大肠杆菌肠炎

B 细菌性痢疾

C 病毒性肠炎

D 金葡菌肠炎

E 霉菌性肠炎

正确答案：C 您选择的答案：

第92题 7个月女婴，腹泻水样便2天，大便10次/日，高热1天，汗多，进食少，尿少，口渴。体检：烦躁不安，四肢暖，皮肤弹性差，心、肺(-)，膝腱反射亢进，最可能的诊断是

A 轻度等渗性脱水

B 轻度低渗性脱水

C 中度等渗性脱水

D 中度低渗性脱水

E 中度高渗性脱水

正确答案：E 您选择的答案：

第93题 8个月患儿，腹泻5天，稀水便1日10余次，尿减少，体重5.5g皮下脂肪0.4cm，足稍凉，二氧化碳结合力为9mmol/L，血钠128mmol/L，本例脱水程度及性质是

A 轻度脱水，等渗性

B 轻度脱水，低渗性

C 中度脱水，等渗性

D 中度脱水，低渗性

E 重度脱水，低渗性

正确答案：D 您选择的答案：

第94题 男，3个月。混合喂养，腹泻2个月，大便5~6次/天，稀或糊便，无脓血，食欲好，面有湿疹，体重5.6kg。最可能诊断是

A 迁延性腹泻

B 慢性腹泻

C 生理性腹泻

D 饮食性腹泻

E 感染性腹泻

正确答案：C 您选择的答案：

第95题 10个月女孩，1周先吐后泻，大便呈蛋花汤样，腥臭粘液但无脓血。精神萎靡，皮肤弹性较差，眼窝凹陷，唇樱红，呼气深快有丙酮味，尿量明显减少，四肢稍凉，需静脉补液

A 第一天总量120~150ml/kg

B 第一天用等张含钠液

C 开始的30~60分钟用2:1等张含钠液60ml

D 补充累积损失按20ml/(kg·h)

E 补充氯化钾0.3%浓度，40ml/(kg·d)

正确答案：A 您选择的答案：

第96题 3个月婴儿，出生体重2.8kg，母乳喂养，未加辅食，食欲好。大便次数每日6~8次，为黄色软便无特殊臭味，经治无好转，现在体重5.5kg，体格检查无异常所见。哪一种情况最可能

A "生理性腹泻"

B 慢性痢疾

C 迁延型腹泻

D 霉菌性肠炎

E 肠结核

正确答案：A 您选择的答案：

第97题 小儿腹泻，重度等渗性脱水，酸中毒，循环障碍明显，按计划完成第一天补液后，第二天腹泻仍然明显，应按下列哪种方案补液

A. 2:1等张含钠液扩容

B. 2:2:1液补充累计损失量

C. 5%碳酸氢钠纠酸

D. 10%葡萄糖维持

E. 继续丢失与生理需要

正确答案：E 您选择的答案：

第98题 2个月小儿，腹泻2天，大便1日10余次，蛋花汤样，呕吐、尿少，精神萎靡，拒奶、面色苍白、前囟明显凹陷，大便镜检每高倍视野2~3个白细胞，应考虑小儿腹泻伴有

A 休克

B 酸中毒

C 低钾血症

D 食物中毒

E 败血症

正确答案：B 您选择的答案：

第99题 女孩，2岁。发热，腹泻腹痛一天，大便5~6次，粘冻便，镜检示RBC25个/HP，WBC 25~30个/HP。下列哪种疾病不考虑

A 细菌性痢疾

B 产毒性大肠杆菌

C 空肠弯曲菌肠炎

D 金黄色葡萄球菌肠炎

E 侵袭性大肠杆菌肠炎

正确答案：B 您选择的答案：

第100题 1岁患儿，10月份患腹泻大便呈水样或蛋花汤样，无腥臭味，有少量粘液但无脓血；有脱水征，考虑引起病原是

A 致病性大肠杆菌

B 金黄色葡萄球菌

C 白色念珠菌

D 粘附性大肠杆菌

E 肠道或呼吸道病毒

正确答案：E 您选择的答案：

第101题 10月小儿，呕吐和腹泻4天，大便黄色蛋花汤样，不臭，无粘液和脓血，精神萎靡，皮肤弹性差，眼窝凹陷，唇樱红，呼吸深快有丙酮味，尿量稍减，四肢稍凉，静脉需补充液体为

A. 第一天总量为120~150ml/kg

B. 第一天用等张含钠液，30ml/kg

C. 开始的30~60分钟用2:1等张含钠液

D. 补充累积损失按20ml/kg

E. 补充氯化钾按0.3%的浓度，40ml/kg·d

正确答案：A 您选择的答案：

第102题 1岁小儿，腹泻7天，经第一阶段输液后已排尿，呼吸见平稳，脉搏有力，血钠136mmol/L，CO₂CP 13.6mmol/L血钾3.0mmol/L，第二阶段应用哪种液体，继续输给

A 含0.15%氯化钾的4:3:2含钠液

B 含0.15%氯化钾的生理盐水

C 含0.15%氯化钾1:4含钠液

D 含0.15%氯化钾2:1等张含钠液

E 含0.15%氯化钾2:3:1含钠液

正确答案：C 您选择的答案：

第103题 8个月男婴呕吐，腹泻3天，无尿12小时，T:37.8℃，嗜睡与烦躁交替，双眼深陷，口唇干燥，皮肤弹性差，四肢冷，见花纹，脉细弱160次/分，心音低，呼吸深长60次/分，腹部肠鸣音亢进，血象:Hb:150g/L，WBC 13.0×10⁹/L，S:0.40，L:0.60，初步诊断小儿腹泻伴有

A 重度脱水，代谢性酸中毒

B 中度低渗性脱水，代谢性酸中毒

C 重度脱水，低钾血症，代谢性酸中毒

D 败血症休克，低钾血症，代谢性酸中毒

E 重度高渗性脱水，代谢性酸中毒

正确答案：A 您选择的答案：

第104题 对一例低渗重度脱水患儿进行补液，第一天用4:3:2(2/3)混合液按100~120ml/kg给予(暂先禁食6~8小时)。所用4:3:2液的组成是

A 4份10%葡萄糖，3份生理盐水，2份1.4%碳酸氢钠

B 4份生理盐水，3份10%葡萄糖，2份5%碳酸氢钠

C 4份5%葡萄糖，3份生理盐水，2份5%碳酸氢钠

D 4份生理盐水，3份5%葡萄糖盐水，2份11.2%乳酸钠

E 4份生理盐水，3份5%葡萄糖，2份1.4%碳酸氢钠

正确答案：E 您选择的答案：

第105题 男婴，6个月。腹泻2天，稀水样便5~6次/天，量中等，偶吐奶，尿略减少。前囟及眼窝稍凹陷。下列处理哪项不妥

- A 喂母乳，暂停辅食
- B 口服补液盐
- C 给鞣酸蛋白
- D 加强护理
- E 补充各种维生素

正确答案：C 您选择的答案：

第106题 10kg患儿，腹泻后精神萎靡，皮肤弹性差，四肢稍凉，尿量明显减少，CO₂CP为11.2mmol/L，选用以下哪种混合液最恰当(混合液组成按着生理盐水:5%葡萄糖:1.4%碳酸氢钠或1.87%乳酸钠配剂)

- A 3:3:1液
- B 2:3:1液
- C 4:3:2液
- D 2:2:1液
- E 2:6:1液

正确答案：B 您选择的答案：

第107题 8kg小儿，临床表现重度酸中毒，CO₂CP 8mmol/L，初次为提高CO₂CP达到13mmol/L需补1.4%碳酸氢钠液是

- A 75ml
- B 100ml
- C 140ml
- D 200ml
- E 250ml

正确答案：C 您选择的答案：

第108题 1岁女孩，腹泻3天，每日约20次，大便呈蛋花汤样，无脓血。体检：前囟、眼窝凹陷，皮肤弹性极差，四肢凉，脉搏细速。化验血清钠130mmol/L，CO₂CP 10mmol/L，首先应给的液体是

- A. 维持液120~150ml/kg
- B. 2:1等张含钠液20ml/kg扩容
- C. 2:2:1液20ml/kg扩容
- D. 5%葡萄糖120~150ml/kg
- E. 10%氯化钾10ml/kg

正确答案：B 您选择的答案：

第109题 5月婴儿，外观虚胖，经常有湿疹，生后不久即出现腹泻，每天4~5次，除大便次数增多外，无其他症状，食欲好，生长发育正常，大便多次化验未发现异常，诊断考虑

- A. 婴儿腹泻
- B. 生理性腹泻
- C. 迁延性腹泻
- D. 慢性腹泻
- E. 病毒性肠炎

正确答案：B 您选择的答案：

第110题 腹泻患儿，补液后排尿，输液瓶中有余液220ml，最多可加10%或15%氯化钾注射液各多少毫升

- A. 4ml, 2ml
- B. 5ml, 3ml
- C. 9ml, 6ml
- D. 6ml, 4ml
- E. 7ml, 3.5ml

正确答案：D 您选择的答案：

第111题 6个月男孩，患支气管肺炎，用多种抗生素治疗20天，体温下降，病情好转。近2天再次发热，呕吐，腹泻，大便4~5次/日，呈暗绿色水样便，有黏液，味腥臭，镜检见大量白细胞、脓球及革兰阳性球菌，最可能的诊断是

- A. 霉菌性肠炎
- B. 病毒性肠炎
- C. 金黄色葡萄球菌性肠炎
- D. 侵袭性大肠杆菌性肠炎
- E. 细菌性痢疾

正确答案：C 您选择的答案：

第112题 某婴，腹泻3天，伴发热39℃(R)，每日大便7~10次，稀水样，粪质少。患儿今烦躁、哭吵，面色红，口唇及舌干燥欲饮。估计其为

- A 高渗性脱水
- B 等渗性脱水
- C 低渗性脱水
- D 无脱水
- E 接近休克状态

正确答案：A 您选择的答案：

第113题 一腹泻婴儿，体重6kg，中度脱水，血清钠135mmol/L，第一天补液总量为

- A 600~720ml
- B 720~900ml
- C 900~1000ml
- D 900~1080ml
- E 1000~1200ml

正确答案：B 您选择的答案：

三、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第114-116题

男，4个月。体重5kg。腹泻3天，每日7~8次，蛋花汤样、无腥臭，奶后呕吐2次。面色稍苍白，上腭裂，精神较差，皮肤稍干燥，眼窝、前囟凹陷，皮下脂肪0.3cm，皮肤弹性较差。哭有泪。四肢末梢较冷，血清钠128mmol/L。

1. 估计该患儿的脱水程度及性质是

- A 轻度等渗性脱水
- B 中度等渗性脱水
- C 轻度低渗性脱水
- D 中度低渗性脱水
- E 重度低渗性脱水

2. 其第一天补液总量应补充每公斤为

- A 60~80ml
- B 81~90ml
- C 90~120ml
- D 120~150ml
- E 150~180ml

3. 当患儿痊愈出院时，对家长可作以下指导，哪项除外

- A 继续母乳喂养，避免夏季断乳
- B 先天性畸形(上腭裂)矫治
- C 注意食具、尿布、玩具消毒
- D 加强气候变化时的护理
- E 迅速添加辅食如蛋黄、炼乳

正确答案：DDE 您选择的答案：

第117-119题

6个月女孩，中度脱水酸中毒，经纠正酸中毒与补液12小时后出现嗜睡，呼吸较前为浅，心音低钝，心率160次/分，腹胀，肠鸣音弱，血钠为135mmol/L

1. 为明确诊断应做的辅助检查是

- A 二氧化碳结合力测定
- B 电解质测定
- C 血渗透压测定
- D 腰穿脑脊液检查
- E 心脏超声心动图

2. 治疗应采取的措施是

- A 继续纠酸
- B 补钠
- C 脱水
- D 补钾
- E 能量合剂

3. 输液的成分是

- A 5%碳酸氢钠5ml/kg
- B 2:1含钠液20ml/kg
- C 20%甘露醇5ml/kg
- D 10%氯化钾3ml/kg
- E 1.6-二磷酸果糖3ml/kg

正确答案：BDD 您选择的答案：

第120-122题

6个月患儿，腹泻水样便，每天10余次。为稀水样便，今日病儿昏睡，呼吸深快，尿量极少，查体：四肢厥冷，二氧化碳结合力8mmol/L，血钾4.0mmol/L，血钠：140mmol/L

1. 最可能的诊断是

- A 重度脱水酸中毒
- B 中度脱水酸中毒
- C 重度脱水，低钾血症
- D 中度脱水，低钾血症
- E 重度脱水酸中毒，低钾血症

2. 该患儿第一天补液首选下列哪种液体

- A 2:1液
- D 4:3:2含钠液860ml
- C 2:3:1含钠液860ml
- D 2:6:1含钠液860ml
- E 5%碳酸氢钠360ml

3. 该患儿第一天补液的总量是

- A 720ml
- B 800ml
- C 880ml
- D 980ml
- E 1080ml

正确答案：AAE 您选择的答案：

第123-125题

1岁半小儿，突起腹泻，大便每日10多次，粘液状，带脓血，伴恶心、呕吐、高热和腹痛。查体：139.5℃，精神极差，意识模糊，呼吸深快，有烂苹果味，面色苍灰，前囟眼窝明显凹陷，哭无泪，口唇干燥，皮肤弹性差，脉细弱，尿少，四肢冰冷，心音低钝可闻及早搏。化验：大便常规见较多的红白细胞；血钠135mmol/L，血钾3.4mmol/L，CO₂CP9mmol/L

1. 该患儿的诊断可能为

- A 病毒性肠炎、重度脱水伴酸中毒
- B 致病性大肠杆菌肠炎，重度脱水伴酸中毒
- C 产毒性大肠杆菌性肠炎伴重度脱水伴酸中毒

- D. 侵袭性大肠杆菌性肠炎伴重度脱水伴酸中毒
E. 出血性大肠杆菌性肠炎伴重度脱水伴酸中毒
2. 该患儿的治疗应首选
- A. 抗感染、扩容、纠酸
B. 禁食
C. 止泻
D. 微生态疗法
E. 肠粘膜保护剂
3. 第一天的补液总量为
- A. 50ml /kg
B. 60 ~ 90ml /kg
C. 90 ~ 120ml /kg
D. 120 ~ 150ml /kg
E. 150 ~ 180ml /kg
- 正确答案：DAE 您选择的答案：

- 第126-128题
- 患儿，8个月。腹泻4天，水样便，1日10余次。12小时无尿，呼吸深大，前囟眼窝明显凹陷，四肢凉，血钠127mmol / L，血钾4mmol / L，血钙2.25mmol / L，二氧化碳合力11.2mmol / L
1. 该患儿的诊断是小儿腹泻伴
- A. 中度脱水酸中毒，低钾血症
B. 重度脱水酸中毒，低钾血症
C. 中度等渗性脱水，酸中毒
D. 重度低渗性脱水，酸中毒
E. 中度低渗性脱水，酸中毒
2. 首批应输入下述哪种混合液
- A. 1:1含钠液
B. 1:2含钠液
C. 2:3:1含钠液
D. 2:1含钠液
E. 4:3:2含钠液
3. 补充累积损失为主阶段的输液速度，张力以及补液量
- A. 每小时8 ~ 10ml / kg，1 / 2张600ml
B. 每小时8 ~ 10ml / kg，1 / 3张600ml
C. 每小时8 ~ 10ml / kg，2 / 3张450ml
D. 每小时4 ~ 5ml / kg，1 / 2张450ml
E. 每小时4 ~ 5ml / kg，1 / 3张450ml
- 正确答案：DDC 您选择的答案：

- 第129-131题
- 6个月女孩，7月中旬，因吐、泻3天入院。大便10 ~ 15次 / 日，呈蛋花汤样，有腥臭气味，尿量极少，前囟、眼窝凹陷，皮肤弹性极差，脉细弱，四肢厥冷，大便偶见白细胞，血清钠125mmol / L。
1. 最可能的诊断是
- A. 中度低渗性脱水
B. 重度等渗性脱水
C. 中度等渗性脱水
D. 重度低渗性脱水
E. 重度高渗性脱水
2. 最可能的病原菌是
- A. 金黄色葡萄球菌
B. 产毒性大肠杆菌
C. 白色念珠菌
D. 耶尔森菌
E. 轮状病毒
3. 哪项处理是正确的
- A. 因吐泻明显，禁食2天
B. 立即给予止泻剂
C. 肌注抑制肠蠕动剂
D. 静脉滴注青霉素
E. 静脉补液纠正脱水
- 正确答案：DBE 您选择的答案：

- 第132-133题
- 10个月患儿，轻咳伴发热半天，晚上呕吐4次，不久频泻水样便，初色黄后转白，量多粘液少，无腥臭，尿极少，于10月底就诊。T 39，面色苍白，前囟眼窝凹陷，哭泪少，咽充血，心肺无异常，腹稍胀，皮肤弹性减退
1. 最可能诊断是
- A. 产毒性大肠杆菌肠炎
B. 致病性大肠杆菌肠炎
C. 轮状病毒肠炎
D. 诺沃克病毒肠炎
E. 侵袭性大肠杆菌肠炎
2. 对该儿下列处理哪项不是必须的
- A. 暂禁食6小时
B. 口服ORS
C. 动脉血气分析
D. 血钠钾氯测定
E. 大便镜检和培养
- 正确答案：CE 您选择的答案：

第134-135题

女婴，4个月。腹泻、中度脱水，经静脉补液后脱水纠正，突然出现精神萎靡，嗜睡，呼吸变浅，心率140次/分，心音低钝腹胀，膝反射未引出。血清钠145mmol/L，钾3.2mmol/L，ECG示窦性心动过速，T波低平

1. 最可能诊断是

- A 败血症
- B 重症肌无力
- C 中毒性心肌炎
- D 低钾血症
- E 中毒性肠麻痹

2. 对患儿应立即给予

- A 血浆20ml/kg静滴
- B 10%葡萄糖酸钙10ml稀释后静注
- C 10%氯化钾3~4ml/kg加入液体中静滴
- D 1.4%碳酸氢钠20ml/kg静滴
- E 10%氯化钾1~2ml/kg加入液体中静滴

正确答案：DC 您选择的答案：

第136-138题

7个月女婴，因呕吐、腹泻4天于11月下旬入院，患儿大便稀水样，无腥臭味，10余次/日，量中等。体检：呼吸46次/分，脉搏140次/分，精神萎靡，皮肤弹性差，四肢温，前囟眼窝凹陷，心音低钝，腹胀，肠鸣音减弱，四肢无力，腱反射弱。化验血钠125mmol/L。大便镜检：白细胞0~1个/高倍。

1. 患儿病原学诊断最可能是

- A 致病性大肠杆菌肠炎
- B 耶尔森菌小肠结肠炎
- C 轮状病毒性肠炎
- D 侵袭性大肠杆菌肠炎
- E 空肠弯曲菌肠炎

2. 除以上诊断外，还应考虑

- A 低钙血症
- B 低钾血症
- C 低镁血症
- D 低磷血症
- E 低血糖

3. 下列处理中哪项正确

- A 立即用5%碳酸氢钠扩容
- B 累积损失量宜用维持液补充
- C 补钾需4~6天
- D 补钾量应至少每天8mmol/kg
- E 选择敏感抗生素治疗

正确答案：CBC 您选择的答案：

第139-140题

男婴，2岁。呕吐腹泻1天。突然脐周阵发性腹痛，继恶心呕吐3~4次，大便5~6次。初蛋花汤样后呈赤豆汤水样便，腥臭，无脓。T 39 (R)，腹软，稍胀，不固定压痛，无肌紧张，未及包块，皮疹(-)

1. 可能诊断是

- A 婴儿腹泻
- B 急性坏死性肠炎
- C 细菌性痢疾
- D 过敏性紫癜
- E 肠套叠

2. 为早期确诊，哪项检查最有价值

- A 血白细胞计数分类
- B 大便常规加隐血试验
- C 大便培养加药敏
- D 动脉血气分析
- E 腹部X线片

正确答案：BE 您选择的答案：

第141-142题

8月婴儿，因患秋季腹泻伴中度脱水入院，经治疗后病情好转，尿量增加，脱水纠正，但患儿突然出现腹胀，心音低钝，可闻及早搏，肠鸣音1~2次/分，膝反射消失。

1. 最可能的诊断是

- A 中毒性心肌炎
- B 中毒性肠麻痹
- C 低钾血症
- D 低钠血症
- E 低血糖

2. 应给予下列哪项治疗

- A 加大抗感染力度
- B 补钾
- C 用高张含钠液静滴
- D 输葡萄糖
- E 补钙

正确答案：CB 您选择的答案：

四、A4型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第143-145题

8个月婴儿，体重8kg，腹泻4天，每天10余次，尿很少，精神萎靡，呼吸深长，皮肤发花，弹性差，前囟、眼眶明显

凹陷，肢冷脉弱，心率160次/分，心音低钝。

1. 如给该患儿从第一阶段开始补液，用2:1等张含钠液的正确方法是

- A. 20ml/kg，于30~60分钟内静脉推注
- E. 20ml/kg，速度为每小时8~10ml/kg
- C. 20ml/kg，速度为每小时5ml/kg
- D. 20ml/kg，2小时静滴完
- E. 20ml/kg，3小时静滴完

2. 若经过第一阶段及第二阶段的部分补液，该患儿开始排尿，此时应考虑补钾。关于静脉补钾，以下哪项不正确

- A. 宜快宜早，每日补钾总量静滴时间不应短于4小时
- B. 治疗前6小时排过尿可以静脉补钾
- C. 输液后有尿可以静脉补钾
- D. 酸中毒纠正后可使血钾浓度下降，应注意补钾
- E. 氯化钾静滴浓度不宜超过0.3%
- 3. 若该患儿脱水纠正后出现明显的腹胀，下列哪项处理不正确
- A. 补充钾盐
- B. 肛管排气
- C. 肌注新斯的明
- D. 肌注阿托品
- E. 针灸

正确答案：AAD 您选择的答案：

第146-148题

8个月婴儿，体重8kg，腹泻4天，每天10余次，尿很少，精神萎靡，呼吸深长，皮肤发花，弹性差，前囟、眼眶明显凹陷，肢冷脉弱，心率160次/分，心音低钝。

1. 应考虑下列哪组诊断

- A. 重度脱水+酸中毒
- B. 中度脱水+酸中毒+心力衰竭
- C. 重度脱水+低钾血症
- D. 中度脱水+低钾血症
- E. 重度脱水+低钾血症+心力衰竭

2. 首先确定第1天的补液总量为

- A. 60~90ml/kg
- B. 90~120ml/kg
- C. 120~150ml/kg
- D. 150~180ml/kg
- E. 180~210ml/kg

3. 若此时测得该患儿血生化结果为： CO_2CP 为11.2mmol/L(25Vol%)，血钠135mmol/L，应选用下列哪种混合配制液

(按生理盐水：葡萄糖：1.4%碳酸氢钠配制)进行第一天补液

- A. 3:3:1液
- B. 2:3:1液
- C. 4:3:2液
- D. 2:2:1液
- E. 2:6:1液

正确答案：ADB 您选择的答案：

五、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第149-152题

- A. 2:1等张含钠液
- B. 3:2:1液
- C. 4:3:2液
- D. 1:4液
- E. 2:6:1液

1. 小儿腹泻低渗性脱水，第1个24小时补液应选用

2. 小儿腹泻等渗性脱水，第1个24小时补液应选用

3. 小儿腹泻高渗性脱水，第1个24小时补液应选用

4. 小儿腹泻脱水伴循环衰竭，扩容应选用

正确答案：CBEA 您选择的答案：

第153-154题

- A. 等渗性脱水
- B. 低渗性脱水
- C. 高渗性脱水
- D. 高钾血症
- E. 高钙血症

1. 脱水加低钠血症

2. 烦渴、高热、肌张力增高，甚至惊厥

正确答案：BC 您选择的答案：

第155-159题

- A. 便色黄或暗绿，有腥臭味
- B. 便次较多，发育不受影响
- C. 粘液脓血便，常伴有发热
- D. 血便或呈“赤豆汤样”便
- E. 便泡沫多，含粘液，豆渣样

1. 生理性腹泻

2. 侵袭性细菌性肠炎

- 3. 坏死性肠炎
- 4. 金葡菌肠炎
- 5. 白色念珠菌肠炎

正确答案：BCDAE 您选择的答案：

第160-162题

- A. 黄色水样便后转为血便，有特殊臭味
 - B. 黄绿色水样便夹有白膜
 - C. 黄色稀便，泡沫较多，带粘液，有时可见豆腐渣样物质
 - D. 暗绿色，量多带粘液，有腥臭味，少数为血便
 - E. 大便粘液状，带脓血
- 1. 侵袭性大肠杆菌性肠炎
 - 2. 真菌性肠炎
 - 3. 出血性大肠杆菌肠炎

正确答案：ECA 您选择的答案：

第163-165题

- A. 等张含钠液
 - B. 1/2张含钠液
 - C. 2/3张含钠液
 - D. 1/3张含钠液
 - E. 1/4张含钠液
- 1. 高渗性脱水，第1日应输
 - 2. 低渗性脱水，第1日应输
 - 3. 等渗性脱水，第1日应输

正确答案：DCB 您选择的答案：

第166-169题

- A. 生理性腹泻
 - B. 病毒性肠炎
 - C. 细菌性痢疾
 - D. 坏死性肠炎
 - E. 大肠杆菌性肠炎
- 1. 病初呕吐，大量黄色水样或蛋花汤样便，少量粘液无脓血
 - 2. 发病5~8月为多，中等量蛋花汤样稀便，伴较多粘液有霉臭味，镜检少量白细胞
 - 3. 5个月虚胖患儿，大便每日8~10次，食欲好，生长发育正常
 - 4. 腹胀、腹痛、呕吐伴血便，X-线示小肠局限性充气扩张肠壁积气

正确答案：BEAD 您选择的答案：

习题集 儿科学 生长发育

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 正常小儿何时学习爬的动作

- A. 3~4个月
- B. 5~6个月
- C. 7~8个月
- D. 8~9个月
- E. 12个月

正确答案：D 您选择的答案：

第2题 小儿生长发育的一般规律，不正确的是

- A. 由下到上
- B. 由近到远
- C. 由粗到细
- D. 由低级到高级
- E. 由简单到复杂

正确答案：A 您选择的答案：

第3题 小儿语言发育的三个阶段是

- A. 单词、词组、句子
- B. 名词、动词、代名词
- C. 词组、简单句、复杂句
- D. 发音、理解、表达
- E. 以上都不是

正确答案：D 您选择的答案：

第4题 2岁以内乳牙的数目约为

- A. 月龄减2~4
- B. 月龄减4~6
- C. 月龄减6~8
- D. 月龄减8~10
- E. 月龄减10~12

正确答案：B 您选择的答案：

第5题 乳牙出齐的年龄，正常情况下最晚不超过

- A. 1岁半
- B. 2岁
- C. 2岁半
- D. 3岁
- E. 3岁半

正确答案：C 您选择的答案：

第6题 1岁小儿正常的体格发育指标，以下哪项是错误的

- A. 体重9kg
- B. 身长75cm
- C. 出牙8颗
- D. 腕部骨化中心2个
- E. 头围48cm

正确答案：E 您选择的答案：

第7题 正常小儿前囟门闭合的年龄应是

- A. 3~4个月
- B. 1岁左右
- C. 1~1岁半
- D. 2岁左右
- E. 2岁半

正确答案：C 您选择的答案：

第8题 小儿体重后半年每月平均增长

- A. 200~300g
- B. 300~400g
- C. 400~500g
- D. 500~600g
- E. 600~800g

正确答案：B 您选择的答案：

第9题 以下小儿生长发育规律中，哪项是错误的

- A. $2\sim 12$ 岁身长(cm) = 年龄 $\times 7 + 70$ (cm)
- B. 小于6月龄婴儿体重(kg) = 出生体重 + 月龄 $\times 0.7$
- C. 生后第一年头部生长最快，脊柱次之
- D. 6岁时上下部量相等
- E. 青春期下肢增长最快

正确答案：D 您选择的答案：

第10题 小儿体重前半年每月平均增长

- A. 200~300g

B 300 ~ 400g
C 400 ~ 500g
D 500 ~ 600g
E 600 ~ 800g
正确答案：E 您选择的答案：

第11题 小儿巴氏征阳性在何时为生理现象

A 2岁之前
B 2.5岁之前
C 3岁之前
D 3.5岁之前
E 4岁之前
正确答案：A 您选择的答案：

第12题 小儿体重在2岁至12岁时每年增长约

A 1ks
B 2kg
C 3kg
D 4kg
E 5ks
正确答案：B 您选择的答案：

第13题 小儿何月龄克氏征阳性是正常的

A 3~4个月前
B 5~6个月前
C 7~8个月前
D 9~10个月前
E 11~12个月前
正确答案：A 您选择的答案：

第14题 关于小儿身长发育中头围与胸围相等的年龄，以下哪项正确

A. 出生时
B. 1岁左右
C. 1岁以后
D. 15个月
E. 24个月
正确答案：B 您选择的答案：

第15题 12个月婴儿平均体重是

A. 3kg
B. 6kg
C. 9kg
D. 12kg
E. 15kg
正确答案：C 您选择的答案：

第16题 关于腕部骨化中心，下列那一项是错误的

A. 反映机体的发育情况
B. 较实际年龄更有意义
C. 腕部骨化中心总数为10个
D. 腕部骨化中心开始出现的年龄为12个月
E. 8岁前骨化中心数约为年龄+1
正确答案：D 您选择的答案：

第17题 小儿前囟早闭见于

A 克汀病
B 佝偻病
C 小头畸形
D 极度消瘦者
E 脑炎
正确答案：C 您选择的答案：

第18题 12个月婴儿头围应是

A. 34cm
B. 46cm
C. 48cm
D. 50cm
E. 54cm
正确答案：B 您选择的答案：

第19题 胸围赶上头围的年龄应不晚于

A. 6个月
B. 9个月
C. 12个月
D. 15个月
E. 18个月
正确答案：C 您选择的答案：

第20题 小儿腕骨骨化中心出全的年龄是

A 5岁

- B 6岁
- C 8岁
- D 10岁
- E 12岁

正确答案：D 您选择的答案：

第21题 正常2岁小儿的平均身长应是

- A . 50cm
- B . 75cm
- C . 85cm
- D . 95cm
- E . 100cm

正确答案：C 您选择的答案：

第22题 乳牙开始萌出的月龄是

- A 3~4个月
- B 4~10个月
- C 10~12个月
- D 12~15个月
- E 15~18个月

正确答案：B 您选择的答案：

第23题 15个月小儿发育正常，应萌出几颗牙

- A . 1~2颗
- B . 3~5颗
- C . 5~7颗
- D . 9~11颗
- E . 20~24颗

正确答案：D 您选择的答案：

第24题 关于体格生长的总规律，以下哪项不正确

- A . 不同小儿的生长发育有个体差异
- B . 身体各个器官系统的发育大致平衡，儿童时期发育最快，青春期以后下降
- C . 头部先发育，躯干四肢在后
- D . 整个小儿时期生长不断进行，但不同年龄阶段生长速度不同
- E . 大运动先发育，细动作发育在后

正确答案：B 您选择的答案：

第25题 用离均差法评价儿童体格生长，正常范围一般指

- A . 均值上下半个标准差以内
- B . 均值上下一个标准差以内
- C . 均值上下二个标准差以内
- D . 均值上下三个标准差以内
- E . 均值上下四个标准差以内

正确答案：C 您选择的答案：

第26题 小儿前囟闭合的时间约在

- A 3~4个月
- B 4~6个月
- C 6~12个月
- D 1~1.5岁
- E 2岁

正确答案：D 您选择的答案：

第27题 小儿出现第一个条件反射是

- A 觅食反射
- B 握持反射
- C 拥抱反射
- D 吞咽反射
- E 吸吮动作

正确答案：E 您选择的答案：

第28题 BMI (kaup)指数是指

- A . 体重/身高×1000
- B . 体脂含量
- C . 体重/身高²×10000
- D . 胸围/身高×100
- E . 体脂含量/身高×100

正确答案：C 您选择的答案：

第29题 10个月婴儿，出生体重3.5kg，若体格发育正常，其体重约为

- A . 4.5kg
- B . 5.5kg
- C . 6.5kg
- D . 8.5kg
- E . 10.5kg

正确答案：D 您选择的答案：

第30题 正常小儿头围的增长规律，以下哪项是错误的

- A . 出生时平均为34cm

- B. 生后前3个月增长6cm
- C. 生后第二年增长2cm
- D. 2~5岁增长2cm
- E. 1岁时头围近48cm

正确答案：E 您选择的答案：

第31题 小儿乳牙的萌出特点，以下哪项是正确的

- A. 一般2个月开始出牙
- B. 10个月尚未出牙为出牙延迟
- C. 乳牙总数为16个
- D. 全部乳牙应在2.5岁前出齐
- E. 4岁后乳牙开始被恒牙代替

正确答案：D 您选择的答案：

第32题 正常小儿胸围发育规律，以下哪项是错误的

- A. 出生时胸围平均32cm，比头围小1~2cm
- B. 1岁时胸围超过头围1cm
- C. 头围与胸围交叉时间延迟，可能与不重视上肢与胸廓锻炼有关
- D. 胸围的大小与肺和胸廓的发育有关
- E. 1岁后胸围超过头围的差数等于小儿的岁数减1

正确答案：B 您选择的答案：

第33题 正常小儿乳牙萌出的年龄应为

- A. 4个月
- B. 5个月
- C. 6个月
- D. 10个月
- E. 4~10个月

正确答案：E 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第34题 一个健康儿前囟2.0cm×2.0cm，体重7kg，能独坐一会、用手摇玩具，能认识熟人和陌生人，其月龄为

- A. 3个月
- B. 6个月
- C. 8个月
- D. 10个月
- E. 12个月

正确答案：B 您选择的答案：

第35题 7岁男孩，身材矮小，出生体重：3.2kg，出生身高：50cm，3岁后每年平均身高生长3cm，X光显示左腕部有3枚骨化核，智力正常，生长激素刺激试验阳性，相应的治疗为

- A. 口服锌片治疗
- B. 生长激素治疗
- C. 口服铁剂治疗
- D. 口服钙剂治疗
- E. 无需治疗

正确答案：B 您选择的答案：

第36题 一健康儿体重8.5kg，身长70cm，已会爬，试独站，会从抽屉中取玩具，能懂几个较复杂的词句，如“再见”等，不能模仿成人的动作，但看见熟人会伸手要人抱，其月龄最可能为

- A. 6个月
- B. 7个月
- C. 8个月
- D. 9个月
- E. 10~11个月

正确答案：D 您选择的答案：

第37题 女孩，5岁，营养发育正常，其标臣体重、身长最可能为

- A. 16kg，100cm
- B. 16kg，105cm
- C. 18kg，105cm
- D. 18kg，110cm
- E. 20kg，110cm

正确答案：C 您选择的答案：

第38题 一健康儿，前囟容指尖，出牙10颗，体重10kg，能独自走稳，会用匙，会说单词。其年龄大约是

- A. 10个月
- B. 12个月
- C. 13个月
- D. 15个月
- E. 18个月

正确答案：D 您选择的答案：

第39题 一正常小儿的身长是98cm，乳牙20颗，腕部骨化中心5个，其年龄大约是

- A. 1岁
- B. 2岁
- C. 3岁

D. 4岁

E. 5岁

正确答案：D 您选择的答案：

第40题 有关儿童体格生长发育，正确的是

A. 儿童身高体重在不同年龄阶段生长速度不同，以青春期生长最快

B. 淋巴系统在儿童时期发育较慢，至青春期后发育迅速

C. 躯干的生长先于四肢，肢体远端的生长先于近端

D. 人脑的发育在生后头两年最快，5岁时脑的大小和重量接近成人水平

E. 肌肉系统的发育以学龄期最快

正确答案：D 您选择的答案：

第41题 9岁男孩，营养发育正常，体重26kg，身高133cm，头围53cm，胸围最可能是

A. 53cm

B. 57cm

C. 61cm

D. 63cm

E. 65cm

正确答案：C 您选择的答案：

第42题 正常儿身高90cm，体重14kg，乳牙20个，腕骨骨化中心4个，能说短歌谣，会穿鞋，其最可能年龄为

A. 12个月

B. 18个月

C. 2岁

D. 3岁

E. 4岁

正确答案：D 您选择的答案：

第43题 有关儿童的身高，错误的是

A. 男孩的平均身高在各个时期均比同龄女孩平均身高高

B. 青春期身高的加速增长女孩比男孩早两年

C. 身高的生长发育以生后第一年速度最快

D. 达到最终身高的年龄，男孩比女孩晚

E. 学龄期及学龄前期的儿童身高约呈匀速生长

正确答案：A 您选择的答案：

第44题 一生长发育正常儿童，经左腕部X光检查发现腕部有2枚骨化核，估计其可能的年龄为

A. 1岁

B. 2岁

C. 3岁

D. 4岁

E. 5岁

正确答案：A 您选择的答案：

第45题 3个月患儿体检时发现后囟尚未闭合，为明确病情，首选的检查是

A. 腰穿，检查脑脊液

B. T₃、T₄、TSH

C. 血碱性磷酸酶

D. 全身骨骼X光片

E. 属正常情况，无需检查

正确答案：B 您选择的答案：

第46题 1岁小儿体格发育正常，体重9kg，头围46cm，身高75cm，其胸围最可能是

A. 32cm

B. 34cm

C. 46cm

D. 48cm

E. 50cm

正确答案：C 您选择的答案：

第47题 一正常小儿，身高112cm，体重21kg，身长之中点位于脐与耻骨联合之间，腕部骨化中心出现7个，恒牙尚未萌出，其最可能的年龄是

A. 12岁

B. 10岁

C. 8岁

D. 6岁

E. 4岁

正确答案：D 您选择的答案：

第48题 一正常婴儿，体重7.5kg，身长68cm，前囟0.5cm×0.5cm，头围44cm，出牙4颗，能独坐，并能左右转身，能以拇、示指拾物，喜撕纸。该儿最可能的月龄是

A. 5个月

B. 6个月

C. 8个月

D. 12个月

E. 18个月

正确答案：C 您选择的答案：

第49题 一女孩，身高75cm，体重9kg，出牙4颗，能独站，不能独走，其最可能的年龄为

A. 6个月

- B. 9个月
- C. 12个月
- D. 15个月
- E. 18个月

正确答案：C 您选择的答案：

第50题 一个健康儿体重7.5kg，身长62cm，会翻身，能独坐很久，不会爬，能发出“爸爸”、“妈妈”等复音，但无意识，能听懂自己的名字，其月龄最可能为

- A. 3~4个月
- B. 5个月
- C. 6个月
- D. 7个月
- E. 8个月

正确答案：D 您选择的答案：

第51题 一健康婴儿，体重4.5kg前囟1.5cm×1.5cm，后囟0.2cm，能微笑，头不能竖立，最可能的年龄是

- A. 1月以内
- B. 1~2个月
- C. 3~4个月
- D. 5~6个月
- E. 7~8个月

正确答案：B 您选择的答案：

第52题 4岁小儿，体重16kg，身高98cm，臂围13cm，出牙20个，考虑为

- A. 体重、身高略低
- B. 营养不良
- C. 肥胖
- D. 身材高大
- E. 正常范围

正确答案：E 您选择的答案：

第53题 一女孩，身高68cm，体重8kg，前囟2cm×2cm，出牙2颗，下列行为中异常的是

- A. 不会独站
- B. 不能说简单句
- C. 不会抬头
- D. 不会走
- E. 不认生

正确答案：C 您选择的答案：

第54题 一健康儿前囟约0.5cm×0.5cm，出牙8个，体重10kg，开始能独走，能叫出物品名字，指出自己的手、眼，其月龄大约为

- A. 6个月
- B. 8个月
- C. 12个月
- D. 16个月
- E. 20个月

正确答案：C 您选择的答案：

三、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第55-56题

一小儿体重20kg，身长110cm，身长之中点位于脐与耻骨联合之间，腕部骨化中心出现7个，已出现第一磨牙，没开始换牙

1. 最可能的年龄是

- A. 3岁
- B. 4岁
- C. 5岁
- D. 6岁
- E. 7岁

2. 小儿腕部骨化中心共有

- A. 8个
- B. 9个
- C. 10个
- D. 11个
- E. 12个

正确答案：DC 您选择的答案：

第57-59题

女婴，营养状况良好，能坐，见生人即哭，前囟2×2cm，有2颗乳牙

1. 该女婴的月龄为

- A. 4~5个月
- B. 5~6个月
- C. 6~8个月
- D. 8~9个月
- E. 10~12个月

2. 该婴儿的头围约为

- A. 34cm
- B. 40cm

- C. 46cm
- D. 50cm
- E. 48cm
- 3. 该婴儿的腕部骨化中心数目是
- A. 无骨化中心
- B. 1个
- C. 2个
- D. 3个
- E. 4个

正确答案：CBB 您选择的答案：

第60-61题

女孩，12岁。身材矮小，且比例不匀称，伴智力低下，测其身高及上部量

- 1. 上部量指测量
- A 头顶至耻骨联合上缘的距离
- B 头顶至耻骨联合下缘的距离
- C 头顶至坐骨结节的距离
- D 头顶至耻骨联合中点的距离
- E 头顶至尾骨的距离
- 2. 测量结果身高为100cm，上部量为60cm，诊断为
- A 正常儿童
- B 佝偻病
- C 克汀病
- D 垂体性侏儒
- E 先天愚型

正确答案：AC 您选择的答案：

第62-63题

婴儿体重4kg，前囟1.5cm×1.5cm，能笑，头不能竖立，已形成第一个条件反射，即抱起喂奶时出现吸吮动作

- 1. 最可能的月龄是
- A 1周
- B 2周
- C 1~2个月
- D 3~4个月
- E 4~6个月
- 2. 第一个条件反射何时出现
- A 生后1周左右
- B 生后2周左右
- C 1~2个月
- D 3~4个月
- E 4~6个月

正确答案：CB 您选择的答案：

第64-67题

1. 一家长带小儿来医院进行体格检查，欲衡量小儿的营养状况，首先应做下列哪项检查

- A. 体重
- B. 身高
- C. 上、下部量
- D. 头围
- E. 胸围
- 2. 该小儿的体重为12kg，其正常年龄大约为
- A. 5岁
- B. 12个月
- C. 3岁
- D. 2岁
- E. 18个月
- 3. 该小儿的正常身高大约为
- A. 75cm
- B. 80cm
- C. 90cm
- D. 100cm
- E. 105cm
- 4. 该婴儿的腕部骨化中心数目应为
- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5
- E. 6

正确答案：ADCB 您选择的答案：

四、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第68-70题

- A. 身高
- B. 体重
- C. 骨龄
- D. 身高别体重
- E. 坐高/身高

1. 欲了解儿童近期的营养状况，最准确的指标是
 2. 欲了解儿童长骨的成熟程度，应测量的指标是
 3. 欲了解身体的匀称程度，应测量的指标是
- 正确答案：DCE 您选择的答案：

第71-73题

- A. 身长的中点在脐上
 - B. 身长的中点在脐下
 - C. 身长的中点在脐与耻骨联合上缘之间
 - D. 身长的中点在耻骨联合上缘
 - E. 身长的中点在耻骨联合下缘
1. 2岁小儿中点位于
 2. 6岁小儿中点位于
 3. 12岁小儿中点位于
- 正确答案：BCD 您选择的答案：

第74-77题

- A. 3kg
 - B. 6kg
 - C. 10kg
 - D. 12kg
 - E. 14kg
1. 1岁儿童平均体重约为
 2. 平均出生体重为
 3. 3个月儿童平均体重约为
 4. 2岁儿童平均体重约为
- 正确答案：CABD 您选择的答案：

第78-80题

- A. 抬头，可注视光源
 - B. 伸手取物
 - C. 独坐
 - D. 独走
 - E. 双足跳
1. 4个月小儿应会的动作
 2. 岁小儿应会的动作
 3. 2岁小儿应会的动作
- 正确答案：ADE 您选择的答案：

习题集 儿科学 神经系统疾病

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 化脓性脑膜炎的并发症不包括

- A. 智力障碍
- B. 脑积水
- C. 脑性低钠血症
- D. 原发性癫痫
- E. 脑室管膜炎

正确答案：D 您选择的答案：

第2题 用氯霉素治疗化脓性脑膜炎，最易出现的药物副作用是

- A. 皮疹
- B. 胃肠道反应
- C. 脱发
- D. 骨髓抑制
- E. 血尿

正确答案：D 您选择的答案：

第3题 有关化脓性脑膜炎的病因及病理，以下哪项下正确

- A. 常见的致病菌有脑膜炎双球菌、流感嗜血杆菌及肺炎链球菌
- B. 小于2个月的小儿以革兰阳性细菌所致的化脑为主
- C. 长期使用肾上腺皮质激素者可发生由条件致病菌(如表皮葡萄球菌)所致的化脓性脑膜炎
- D. 病理可见脑组织炎性渗出物覆盖，可有广泛的血管病变及脑组织缺氧缺血性改变
- E. 可由上呼吸道感染通过血行播散所致

正确答案：B 您选择的答案：

第4题 以下哪个年龄段脑重已达成人脑重的85%~90%左右

- A. 1~3岁
- B. 4~6岁
- C. 7~9岁
- D. 10~12岁
- E. 13~15岁

正确答案：B 您选择的答案：

第5题 化脓性脑膜炎的抗生素使用原则包括

- A. 尽量使用头孢三代抗生素
- B. 待明确病原菌后立即使用抗生素治疗
- C. 联合用药
- D. 静脉给药
- E. 总疗程1周

正确答案：D 您选择的答案：

第6题 新生儿化脓性脑膜炎，脑膜刺激征不明显的原因是

- A. 机体的反应能力差
- B. 脑膜炎不如年长儿强
- C. 颅缝及前囟未闭，对颅内压升高起缓冲作用
- D. 颈肌尚不发达
- E. 大脑处于抑制状态

正确答案：C 您选择的答案：

第7题 化脓性脑膜炎并发硬膜下积液的确诊依据是

- A. 脑脊液正常但前囟进行性隆起
- B. 体温持续不退或退而复升
- C. 颅脑透照试验检查
- D. 头颅CT或MRI
- E. 头围进行性增大

正确答案：D 您选择的答案：

第8题 关于化脓性脑膜炎的脑脊液检查，以下哪项不正确

- A. 脑脊液压力大多数增高
- B. 外观混浊，甚至呈脓性
- C. 白细胞总数正常或明显增多
- D. 蛋白质、糖含量增高
- E. 脑脊液涂片染色和细菌培养是明确脑膜炎病因的重要方法

正确答案：D 您选择的答案：

第9题 婴幼儿化脓性脑膜炎的表现，下列哪项不正确

- A. 可有尖声哭叫
- B. 可有凝视
- C. 可有惊厥
- D. 可有颈抵抗感
- E. 较少有硬膜下积液发生

正确答案：E 您选择的答案：

第10题 小儿化脓性脑炎的脑脊液变化为

- A. 细胞数增高，蛋白正常，糖降低

B 细胞数增高，蛋白增高，糖降低
C 细胞数正常，蛋白正常，糖降低
D 细胞数增高，蛋白升高，糖升高
E 细胞数升高，蛋白正常，糖正常
正确答案：B 您选择的答案：

第11题 化脓性脑膜炎的致病菌可通过多种途径进入脑膜，以下哪种途径最多见

A 呼吸道侵入
B 皮肤粘膜
C 新生儿脐部
D 消化道
E 腰骶部皮肤窦道使脑脊液与外界交通
正确答案：A 您选择的答案：

第12题 小儿脑生长发育最快的时期是

A 生后第一个月
B 生后第一年
C 生后第二年
D 生后第三年
E 生后第四年
正确答案：B 您选择的答案：

第13题 小儿化脓性脑膜炎，最可靠的诊断依据是

A 脑脊液外观混浊或脓性
B 脑脊液细胞数显著增加
C 糖定量降低
D 脑脊液检菌阳性
E 脑膜刺激征阳性
正确答案：D 您选择的答案：

第14题 关于小儿脑和脊髓的发育，以下哪项不正确

A 新生儿脑重平均370g，达成人脑重的25%
B 1岁时脑重达900g，为成人脑重的60%
C 3岁时神经细胞分化已基本完成
D 5岁完成神经纤维髓鞘化
E 脊髓下端在胎儿时位于第2腰椎下缘
正确答案：D 您选择的答案：

第15题 肺炎双球菌脑膜炎治疗首选药物为

A 青霉素
B 氨苄青霉素
C 先锋霉素
D 红霉素
E 青霉素+氯霉素
正确答案：A 您选择的答案：

第16题 化脓性脑膜炎并发硬脑膜下积液时下列哪项不符

A 常发生于经特异治疗后脑脊液好转而体温不退或热退后复升
B 多数患儿可无症状
C 多发生于婴儿或新生儿
D 积液可以是无菌性渗出液
E 脑脊液检查可确诊
正确答案：E 您选择的答案：

第17题 化脓性脑膜炎与结核性脑膜炎在脑脊液检查中根本区别是

A 脑脊液细胞数及分类
B 脑脊液压力
C 糖及氯化物定量
D 脑脊液检菌
E 脑脊液外观
正确答案：D 您选择的答案：

第18题 小儿化脓性脑膜炎合并脑积水原因是

A 由于炎症累及下丘脑和垂体
B 由于不规律用药
C 由于血脑屏障功能差
D 由于炎性渗出物阻碍脑脊液循环而致
E 以上都不是
正确答案：D 您选择的答案：

第19题 对始终未明确病原菌的化脓性脑膜炎患儿抗生素疗程应为

A 7~8天
B 9~10天
C 10~14天
D 15~20天
E 21~25天
正确答案：C 您选择的答案：

第20题 治疗大肠杆菌脑膜炎首选抗生素为

A 青霉素+氯霉素

- B 先锋霉素V+氨苄青霉素
- C 氨苄青霉素+庆大霉素
- D 红霉素+庆大霉素
- E 青霉素+庆大霉素

正确答案：C 您选择的答案：

第21题 化脓性脑膜炎最常见的并发症是

- A．脑积水
- B．癫痫
- C．脑性低钠血症
- D．脑室管膜炎
- E．硬脑膜下积液

正确答案：E 您选择的答案：

第22题 治疗化脓性脑膜炎，选择易透过血脑屏障的药物，以哪种抗生素为最好

- A 青霉素
- B 氨苄青霉素
- C 庆大霉素
- D 氯霉素
- E 先锋霉素

正确答案：D 您选择的答案：

第23题 对病原菌不明确的化脓性脑膜炎的治疗首选

- A．青霉素+氨苄西林
- B．氯霉素
- C．头孢氨苄
- D．红霉素+氯霉素
- E．青霉素

正确答案：A 您选择的答案：

第24题 预防性使用抗生素常用于以下哪种化脓性脑膜炎

- A．脑膜炎双球菌脑膜炎
- B．绿脓杆菌脑膜炎
- C．肺炎链球菌脑膜炎
- D．金黄色葡萄球菌脑膜炎
- E．大肠杆菌脑膜炎

正确答案：A 您选择的答案：

第25题 关于小儿化脓性脑膜炎的病因，以下哪项是错误的

- A．致病菌的存在
- B．先天性免疫球蛋白缺陷
- C．补体和备解素系统发育成熟
- D．长期使用肾上腺皮质激素导致机体免疫功能低下
- E．先天性或获得性神经与皮肤的解剖异常

正确答案：C 您选择的答案：

第26题 对于病因不明的化脓性脑膜炎，首选治疗是

- A 青霉素+氨苄青霉素
- B 头孢三嗪或头孢噻肟
- C 氯霉素
- D 大剂量青霉素
- E 大剂量氨苄青霉素

正确答案：B 您选择的答案：

第27题 化脓性脑膜炎和结核性脑膜炎的主要区别为

- A 病史
- B OT试验
- C 胸部X线检查
- D 周围血象变化
- E 脑脊液检查

正确答案：E 您选择的答案：

第28题 急性化脓性脑膜炎与病毒性脑膜炎在脑脊液检查中根本区别是

- A．脑脊液压力
- B．脑脊液细胞数
- C．蛋白增高程度
- D．脑脊液透明度
- E．糖和氯化物定量

正确答案：B 您选择的答案：

第29题 血培养阳性率甚高的化脓性脑膜炎多见于

- A 婴幼儿
- B 儿童
- C 学龄前
- D 新生儿
- E 所有的儿童

正确答案：D 您选择的答案：

第30题 婴幼儿患化脓性脑膜炎时，最常见的病原菌是

- A 大肠杆菌，金黄色葡萄球菌

B 肺炎双球菌，流感嗜血杆菌
C 脑膜炎双球菌，流感嗜血杆菌
D 肺炎链球菌，脑膜炎双球菌
E 绿脓杆菌， β -溶血性链球菌
正确答案：B 您选择的答案：

第31题 关于小儿神经纤维髓鞘化的描述，以下哪项不正确
A．神经纤维髓鞘化4岁才完成
B．婴儿期各种刺激引起的神经冲动传导缓慢
C．婴儿期神经冲动易于集中而形成兴奋灶
D．婴儿期大脑易于疲劳而进入睡眠状态
E．以上描述均不正确
正确答案：C 您选择的答案：

第32题 化脓性脑膜炎最可靠的诊断依据是
A．脑脊液细胞数增多，蛋白升高，糖降低
B．脑膜刺激征阳性
C．硬膜下积液
D．头痛、呕吐、惊厥、前囟饱满
E．脑脊液检出病原菌
正确答案：E 您选择的答案：

第33题 对脑水肿，何者疗效为佳
A 可的松
B 氢化可的松
C 去氢化可的松
D 促肾上腺素皮质激素
E 地塞米松
正确答案：E 您选择的答案：

第34题 典型化脓性脑膜炎脑脊液变化是
A．细胞数增高，蛋白升高，糖正常
B．细胞数增高，蛋白降低，糖正常
C．细胞数增高，蛋白升高，糖升高
D．细胞数增高，蛋白升高，糖降低
E．细胞数增高，蛋白降低，糖降低
正确答案：D 您选择的答案：

第35题 新生儿时期最常见的脑膜炎是
A 病毒性脑膜炎
B 流行性脑膜炎
C 大肠杆菌脑膜炎
D 流感嗜血杆菌脑膜炎
E 脑膜炎双球菌脑膜炎
正确答案：C 您选择的答案：

第36题 关于小儿的神经反射，以下哪项是错误的
A．出生时即具有觅食、吸吮、吞咽、拥抱、握持反射
B．出生时即具有对强光、寒冷、疼痛等反应
C．吸吮、握持、拥抱等原始反射随月龄增长而消失
D．新生儿和婴儿肌腱反射较强，腹壁反射和提睾反射灵敏
E．2岁以下小儿Barbinski征阳性可为生理现象
正确答案：D 您选择的答案：

第37题 脑脊液涂片找病原菌，是诊断小儿化脓性脑膜炎的重要依据，找菌的阳性率是
A 40%～50%
B 50%～70%
C 70%～90%
D 30%～40%
E 10%～20%
正确答案：C 您选择的答案：

第38题 以下表现可发生于化脓性脑膜炎新生儿，除了
A．前囟隆起
B．体温不升
C．惊厥发作
D．拒食吐奶，面色青紫
E．剧烈头痛
正确答案：E 您选择的答案：

第39题 婴幼儿化脓性脑膜炎常见的病原菌是
A．脑膜炎双球菌，流感嗜血杆菌和大肠杆菌
B．脑膜炎双球菌，流感嗜血杆菌和肺炎链球菌
C．脑膜炎双球菌，流感嗜血杆菌和金黄色葡萄球菌
D．脑膜炎双球菌，肺炎链球菌
E．脑膜炎双球菌，流感嗜血杆菌
正确答案：B 您选择的答案：

第40题 化脓性脑膜炎合并硬膜下积液的治疗方法是

- A 加大青霉素剂量
- B 加大地塞米松
- C 用甘露醇脱水
- D 应做硬膜下穿刺放液
- E 以上都不是

正确答案：D 您选择的答案：

第41题 下列哪种化脓性脑膜炎最易出现休克和皮肤出血点或瘀斑

- A 脑膜炎双球菌脑膜炎
- B 肺炎链球菌脑膜炎
- C 流感嗜血杆菌脑膜炎
- D 金黄色葡萄球菌脑膜炎
- E 大肠埃希菌脑膜炎

正确答案：A 您选择的答案：

第42题 1岁小儿，因发热，头痛，呕吐，诊断为化脓性脑膜炎，应用大剂量青霉素静滴治疗7天，明显好转，热退，停药后2天再次出现发热，头痛，惊厥，前囟隆起，查脑脊液正常。可能的诊断及进一步的检查为

- A 结核性脑膜炎，脑脊液检查
- B 病毒性脑炎，脑脊液检查
- C 脑脓肿，颅脑CT检查
- D 硬脑膜下积液，颅透光检查
- E 脑积水，颅脑CT检查

正确答案：D 您选择的答案：

第43题 脑膜炎双球菌脑膜炎首选哪种抗生素治疗

- A 青霉素
- B 氨苄青霉素
- C 氯霉素
- D 头孢曲松钠
- E 万古霉素

正确答案：A 您选择的答案：

第44题 以下哪项提示患儿最可能存在脑膜炎

- A 持续高热
- B 脑膜刺激征阳性
- C 抽搐
- D 瘫痪
- E 意识障碍

正确答案：B 您选择的答案：

第45题 关于小儿脊髓发育，以下哪项是正确的

- A 胎儿的脊髓发育相对较成熟
- B 脊髓随年龄而增长，加长
- C 胎儿时脊髓下端位于第2腰椎下缘
- D 4岁时上移至第1腰椎
- E 以上均正确

正确答案：E 您选择的答案：

第46题 3个月内的患儿患化脓性脑膜炎的典型表现是

- A 拒食，吐奶，面色发青灰
- B 嗜睡，凝视，尖叫
- C 惊厥
- D 脑膜刺激征常阳性
- E 以上都不是

正确答案：E 您选择的答案：

第47题 化脓性脑膜炎最常见的感染途径是

- A 皮肤黏膜
- B 脑脊膜膨出感染
- C 呼吸道
- D 穿通性脑外伤
- E 耳、鼻、乳突感染

正确答案：C 您选择的答案：

第48题 3个月女孩，高热，频繁呕吐2天，嗜睡1天，惊厥2次。体检：精神差，双眼凝视，前囟隆起，颈抵抗，心肺无异常。外周血白细胞 $16 \times 10^9/L$ ，中性0.90，淋巴0.10，最可能的诊断是

- A 上呼吸道感染
- B 急性肾炎
- C 化脓性脑膜炎
- D 结核性脑膜炎
- E 病毒性脑炎

正确答案：C 您选择的答案：

第49题 6个月的婴儿患化脓性脑膜炎，疑有硬膜下积液，为明确诊断，首先需做下列哪项检查

- A 做腰穿，观察脑脊液蛋白是否增高
- B 做腰穿，观察脑脊液细胞数升高否
- C 拍摄头骨X线平片
- D 头颅超声波检查，观察中线有无移位
- E 颅骨透照检查

正确答案：E 您选择的答案：

第50题 在化脓性脑膜炎与病毒脑膜炎在CSF检查中有根本区别的项目是

- A 脑脊液透明
- B 脑脊液压力
- C 脑脊液细胞总数
- D 蛋白增高程度
- E 糖减少

正确答案：E 您选择的答案：

第51题 6个月小儿，诊断为化脓性脑膜炎，治疗1周后全身症状明显好转，体温正常，脑脊液正常，但前囟门又膨隆，头围增大，双眼下视，可考虑为

- A 继发性病毒性脑炎
- B 并发中毒性脑病
- C 并发脑积水
- D 并发硬膜下积液
- E 并发脑室管膜炎

正确答案：C 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第52题 9个月男婴，高热，呕吐3日，抽搐2次，查体：嗜睡，前囟膨隆，颈强(+)，腰穿脑脊液的外观混浊，白细胞数 $5000 \times 10^6/L$ ，蛋白阳性，糖、氯化物正常。大剂量青霉素治疗5天后，体温恢复正常，复查脑脊液好转，几天后，再度出现高热，呕吐惊厥，前囟又隆起，应考虑为

- A 化脓性脑炎
- B 结核性脑膜炎
- C 化脓性脑膜炎合并脑脓肿
- D 结核性脑膜炎合并脑积水
- E 化脓性脑膜炎合并硬膜下积液

正确答案：E 您选择的答案：

第53题 1岁小儿，高热剧烈呕吐二天入院，经腰穿脑脊液检查，确诊为“化脓性脑膜炎”近一日昏睡，意识不清，颈强(+)，反复抽搐，给予相应处理后，持续高热，并出现双瞳孔不等大，肢体张力增强，进一步紧急处理为

- A 给予退热，止抽
- B 配伍更有效抗生素
- C 给予地塞米松静点
- D 20%甘露醇脱水
- E 给予速尿脱水

正确答案：D 您选择的答案：

第54题 女孩，4岁。发热，头痛3天，呕吐二次，喷射状，当天晚上开始抽搐，而入院，体温 $39^\circ C$ ，面色较苍白，白细胞 $22 \times 10^9/L$ ，中粒细胞88%，如果该患儿诊断为化脓性脑膜炎，在查体时，最常发现的是

- A 深昏迷，呼吸不规则
- B 瞳孔不等大，对光反应迟钝
- C 颈强存在，神经系统检查有异常
- D 肢体张力增高
- E 血压明显升高

正确答案：C 您选择的答案：

第55题 男孩，6个月。已诊断为化脓性脑膜炎，近二日，突然烦躁哭闹，头围增大，疑有硬膜下积液，为进一步确诊，应选择哪项检查

- A 腰穿
- B 硬膜下穿刺
- C 眼底检查
- D 头CT
- E 摄颅骨X线片

正确答案：B 您选择的答案：

第56题 7个月婴儿，已患化脑2周，经大剂量青霉素加氯霉素静点治疗，但发热持续不退，查体：嗜睡，前囟膨，颈强直，布氏征(+)，应采取何种措施

- A 加大抗生素剂量
- B 改用其他抗生素
- C 硬膜下穿刺
- D 鞘内注射抗生素
- E 侧脑室穿刺

正确答案：C 您选择的答案：

第57题 6个月患儿，确诊为“化脓性脑膜炎”，已用大剂量青霉素与氨苄青霉素联合治疗，病情好转，体温恢复正常2天。近1天再次出现高热，体温 $39.5^\circ C$ ，并伴有抽搐，脑脊液压力为180mmH₂O，脑脊液外观清亮，细胞数 $10 \times 10^6/L$ ，蛋白0.5g/L，氯化物119mmol/L，糖3.6mmol/L。诊断应首先考虑

- A 脑水肿
- B 硬脑膜下积液
- C 脑室管膜炎
- D 脑积水
- E 化脓性脑膜炎复发

正确答案：B 您选择的答案：

第58题 正常新生儿，足月顺产，无窒息史，第四天突然出现拒乳，体温不升，双眼凝视，前囟膨隆，抽搐一次，颈强不明显，心肺正常，血常规白细胞 $20 \times 10^9/L$ ，其致病菌最可能是

- A 金黄色葡萄球菌
- B 肺炎双球菌
- C 流感嗜血杆菌
- D 大肠杆菌
- E 脑膜炎双球菌

正确答案：D 您选择的答案：

第59题 8月男婴，反复二次皮肤脓疱疹，伴发热已五天，近一天呕吐，呈喷射状，且抽搐一次，诊断为化脓性脑膜炎，给大剂量青霉素治疗7天后停药，近几日发现头围增大，前囟门隆起，叩诊头颅呈破壶声，两眼球向下看似落日，应考虑诊断

- A 并发硬膜下积液
- B 并脑室管膜炎
- C 并脑积水
- D 并发脑脓肿
- E 发生了颅内肿瘤

正确答案：C 您选择的答案：

第60题 1岁8个月女孩，下列各项中尚属正常表现的是

- A．握持反射阳性
- B．吸吮反射阳性
- C．颈抵抗感明显
- D．克氏征阳性
- E．巴氏征阳性

正确答案：E 您选择的答案：

第61题 2岁男孩因感冒2天伴发热来诊，查体：T39℃，P130次/分，神清，咽及右鼓膜中度充血，其余检查正常，在体检中，突然发呆，双眼上翻，出现四肢强直性阵挛性运动，对该患儿首先应该进行

- A 全面体检
- B 保持呼吸道通畅，解痉
- C 腰穿刺术
- D 静脉注射安定
- E 以上都不是

正确答案：B 您选择的答案：

第62题 患儿，男，1岁。因化脓性脑膜炎住院治疗，按正规治疗1周，体温正常3天，精神转好，1天来发热，呕吐，哭闹不止，前囟紧张，考虑出现了

- A 化脑恶化
- B 并发硬膜下积液
- C 并发“上感”
- D 并发急性胃肠炎
- E 药物热

正确答案：B 您选择的答案：

第63题 6个月患儿，发热咳嗽5天，近一日呕吐，喷射状，抽搐二次，静点抗生素3天，查体：嗜睡，前囟饱满，两肺闻及少许中小水泡音，X线片：右下肺少许斑片状阴影，血常规：白细胞 $14.8 \times 10^9/L$ ，淋巴31%，脑脊液检查外观混浊，白细胞 $500 \times 10^6/L$ ，蛋白阳性，糖、氯化物均下降，作OT试验，硬结直径为0.5cm

- A 结核性脑膜炎
- B 病毒性脑膜炎
- C 肺炎双球菌脑膜炎
- D 流行性乙型脑炎
- E 肺炎，中毒性脑病

正确答案：C 您选择的答案：

第64题 7月女婴，近一周易激惹，烦躁不安，呕吐二次，大便稀，2次/日，查体：嗜睡，前囟膨，有张力，颈强(±)，心肺正常，布氏征(+)，巴氏征(±)，为明确诊断，应作哪项检查

- A 脑电图
- B 脑CT
- C 脑脊液检查
- D OT试验
- E X线胸片

正确答案：C 您选择的答案：

第65题 化脓性脑膜炎患儿治疗五天明显好转后，体温又复回升，嗜睡惊厥，前囟门隆起，头围增大，查脑脊液正常，可考虑为

- A 继发性病毒性脑膜炎
- B 并发脑积水
- C 并发硬膜下积液
- D 并发中毒性脑病
- E 以上都不是

正确答案：C 您选择的答案：

第66题 8个月女婴，频繁抽搐，高热4天，脑脊液检查：压力升高，外观微混，细胞数 $1200 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞70%，淋巴细胞30%，糖 $2.2mmol/L$ ，氯化物 $100mmol/L$ ，该患儿诊断为脑膜炎，首选治疗方案是

- A 雷米封+链霉素
- B 头孢三嗪
- C 二性霉素B
- D 青霉素+庆大霉素
- E 青霉素+氨苄青霉素

正确答案：B 您选择的答案：

第67题 一男婴，8个月。已发热惊厥3天，诊断为“化脓性脑膜炎”，下述哪项处理不当

- A 及时退热，控制惊厥发作
- B 及早选用有效抗生素进行治疗
- C 保证足够的热量及液体
- D 急性期可应用激素
- E 必要时抽放脑脊液以降压

正确答案：E 您选择的答案：

第68题 一个2岁的男婴，近4日来发热38~39℃，烦躁不安，精神不振，喷射性呕吐，2~3次/日，体检：精神萎靡，目光凝视，心音纯整，有力，呼吸粗糙，双扁桃体充血，肝，脾不大，颈轻度抵抗，克氏征(++)，巴氏征(+)，为确诊首先应做何种检查

- A 血细胞计数和分类
- B 盐水灌肠查大便
- C 腰穿检查脑脊液
- D 结核菌素试验
- E 头颅CT

正确答案：C 您选择的答案：

三、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第69-71题

男孩，5岁。发热，喷射性呕吐3天，半剧烈头痛1天，全身性抽搐二次，每次约3分钟缓解，抽后嗜睡。查体：神志恍惚，面色灰白，体温38.8℃，末梢血检查：白细胞明显升高，以中性粒细胞为主

1. 若患儿拟诊化脑，最可能见到的体征为

- A 呼吸不规则，深昏迷，对光反射消失
- B 颈强，瞳孔不等大
- C 颈强，神经系统检查有异常
- D 跟膝，腱反射亢进
- E 四肢瘫软，肌张力低下

2. 为确定诊断为化脓性脑膜炎，最重要的检查是

- A 血常规，白细胞总数和分类
- B 腰穿做脑脊液，常规及生化
- C 腰穿做脑脊液，免疫球蛋白测定
- D 脑电图检查
- E 脑CT检查

3. 该患儿疾病的病变部位主要见于

- A 硬脑膜
- B 软脑膜
- C 软脑膜及蛛网膜
- D 大脑皮质
- E 脑室膜

正确答案：CBC 您选择的答案：

第72-74题

3个月男婴，因发热6天，反复呕吐1天伴抽搐4次就诊。体查：体温40℃，脉搏140次/min，呼吸50次/min，神志清楚，前囟隆起，颈有抵抗感，巴氏征阳性，踝阵挛阳性。左上臂三角肌处可见“卡痕”。外周血象白细胞 $16.6 \times 10^9/L$ ，中性0.79，淋巴0.21。

1. 患儿最可能的诊断是

- A 病毒性脑炎
- B 化脓性脑膜炎
- C 结核性脑膜炎
- D 真菌性脑膜炎
- E 脑脓肿

2. 进一步确定诊断，最重要的检查是

- A 腰穿做脑脊液检查
- B 脑电图检查
- C 头部CT
- D 结核抗体检测
- E 血培养

3. 本病的治疗方案不包括

- A 抗生素治疗
- B 抗结核治疗
- C 降颅压治疗
- D 短期使用地塞米松
- E 止惊及退热处理

正确答案：BAB 您选择的答案：

第75-77题

男婴，生后24天。近四天哭闹剧烈，拒乳，呕吐1天，抽搐3次入院，患儿生后无窒息史，查体：体温不升，反应差，消瘦，脐部见少量脓性分泌物，前囟膨满，双眼凝视，心肺正常，脑膜刺激征(-)

1. 该患儿最可能的诊断是

- A 颅内出血
- B 新生儿缺氧缺血性脑病
- C 化脓性脑膜炎
- D 脑发育不全
- E 低钙惊厥

2. 该患儿最易出现的并发症是

- A 脑积水

- B 智力落后
C 硬膜下积液
D 低钙抽搐
E 脑萎缩
3. 为了明确是否发生了并发症应首选
A 腰穿，查脑脊液
B 查瞳孔的大小，做对光反射
C 叩头颅骨是否有“破壶”音
D 做颅骨透照检查
E 血生化检查
- 正确答案：CCD 您选择的答案：

第78-81题

10个月小儿，因高热4天伴反复惊厥入院。体检：体温39.2℃，神志清，嗜睡，颈部抵抗，心、肺、腹无异常。Kerning征、Brudzinski征阳性，Barbinski征阴性；血常规：白细胞 $8 \times 10^9/L$ ，中性0.89，淋巴0.11，脑脊液常规：白细胞 $1200 \times 10^6/L$ ，中性0.78，淋巴0.22，涂片可见革兰阳性双球菌，PPD试验阴性(1:2000)。

1. 此患儿诊断为
A. 结核性脑膜炎
B. 病毒性脑炎
C. 流行性脑脊髓膜炎
D. 化脓性脑膜炎
E. 流行性乙型脑炎
2. 主要诊断依据是
A. 脑膜刺激征阳性
B. 脑脊液白细胞数增多
C. 发热，惊厥
D. 外周血中性粒细胞增多
E. 脑脊液涂片找到革兰阳性双球菌
3. 确诊后，应选用以下哪项治疗
A. 万古霉素
B. 氯霉素
C. 头孢唑林钠+氨苄西林
D. 大剂量青霉素+氨苄西林
E. 红霉素+庆大霉素
4. 治疗过程中，哪种并发症最易出现
A. 硬膜下积液
B. 脑脓肿
C. 脑室管膜炎
D. 脑积水
E. 脑性低钠血症
- 正确答案：DEDA 您选择的答案：

四、A4型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第82-85题

11个月小儿，发热3天，体温39.0℃，呕吐2次，抽搐1次。体检：神志清，精神萎靡，皮肤无出血点，前囟稍隆起，颈略抵抗，Barbinski征阳性。曾于半岁时有高热惊厥1次。

1. 初步诊断，应首先考虑
A. 中枢神经系统感染
B. 中毒型菌痢
C. 高热惊厥
D. 手足搐搦症
E. 脑发育不全
2. 为明确诊断，首先宜进行
A. 血钙、磷测定
B. 大便镜检+培养
C. 脑电图检查
D. 脑脊液检查+培养
E. 血培养+药敏
3. 若该患儿脑脊液报告：细胞数 $1200 \times 10^6/L$ ，中性0.88，蛋白1.0/L，糖2.4mmol/L，氯化物122mmol/L，涂片(-)。脑脊液培养有流感嗜血杆菌生长。抗生素治疗应首选
A. 大剂量青霉素
B. 氨苄西林
C. 氨苄西林+庆大霉素
D. 头孢曲松钠或头孢噻肟钠
E. 氨苄西林+氯霉素
4. 应采取的预防措施，以下哪项不正确
A. 痊愈出院前应服用利福平4天
B. 家中有<4岁接触者，应全家同样服药
C. 可注射被动免疫预防
D. 加强卫生知识宣传
E. 合理喂养，增强机体免疫力
- 正确答案：ADDC 您选择的答案：

五、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第86-88题

- A. 病毒性脑炎
 - B. 化脓性脑膜炎
 - C. 结核性脑膜炎
 - D. 真菌性脑膜炎
 - E. 高热惊厥
 - 1. 易并发硬脑膜下积液的是
 - 2. 墨汁染色阳性的是
 - 3. 抗酸染色阳性的是
- 正确答案：BCB 您选择的答案：

第89-91题

- A. 结核性脑膜炎
 - B. 病毒性脑膜炎
 - C. 隐球菌脑膜炎
 - D. 化脓性脑膜炎
 - E. 中毒性脑病
 - 1. 病程较长，视神经乳头水肿
 - 2. 易侵犯面神经
 - 3. 易出现硬脑膜下积液
- 正确答案：CAD 您选择的答案：

第92-94题

- A. 氨苄西林
 - B. 青霉素
 - C. 利福平
 - D. 庆大霉素
 - E. 万古霉素
 - 1. 脑膜炎双球菌脑膜炎选择
 - 2. 流感嗜血杆菌脑膜炎选择
 - 3. 肺炎链球菌脑膜炎选择
- 正确答案：BAB 您选择的答案：

第95-97题

- A. 白细胞数 $5 \times 10^6/L$ ，淋巴细胞为主，蛋白 $0.3g/L$ ，糖 $3.5mmol/L$
 - B. 白细胞数 $50 \times 10^6/L$ ，淋巴细胞为主，蛋白 $0.8g/L$ ，糖 $1.5mmol/L$
 - C. 白细胞数 $2000 \times 10^6/L$ ，中性粒细胞为主，蛋白 $1g/L$ ，糖 $1.5mmol/L$
 - D. 白细胞数 $50 \times 10^6/L$ ，淋巴细胞为主，蛋白 $0.8g/L$ ，糖 $3.5mmol/L$
 - E. 白细胞数 $5 \times 10^6/L$ ，淋巴细胞为主，蛋白 $0.3g/L$ ，糖 $2.5mmol/L$
 - 1. 结核性脑膜炎的脑脊液改变
 - 2. 中毒性脑病的脑脊液改变
 - 3. 化脓性脑膜炎的脑脊液改变
- 正确答案：BAC 您选择的答案：

第98-100题

- A. 肺炎链球菌脑膜炎
 - B. 脑膜炎双球菌脑膜炎
 - C. 金葡菌脑膜炎
 - D. 流感嗜血杆菌性脑膜炎
 - E. 结核性脑膜炎
 - 1. 青霉素 $30万U/(kg \cdot d)$
 - 2. 选用青霉素C，头孢噻肟
 - 3. 乙氧萘青霉素，头孢呋新
- 正确答案：BAC 您选择的答案：

第101-103题

- A. 10% ~ 12%
 - B. 25%
 - C. 60%
 - D. 75%
 - E. 85% ~ 90%
 - 1. 新生儿脑重占成人脑重的百分比
 - 2. 11岁时小儿脑重占成人脑重的百分比
 - 3. 4~6岁小儿脑重占成人脑重的百分比
- 正确答案：BCE 您选择的答案：

第104-105题

- A. 金黄色葡萄球菌脑膜炎
 - B. 流感嗜血杆菌性脑膜炎
 - C. 肺炎链球菌脑膜炎
 - D. 脑膜炎双球菌性脑膜炎
 - E. 绿脓杆菌脑膜炎
 - 1. 同时有脑膜刺激征、皮肤出血点及瘀斑、休克者，最可能的诊断是
 - 2. 在使用抗生素的同时，可每日静注地塞米松以减轻炎症反应，除了
- 正确答案：DD 您选择的答案：

第106-108题

- A. 1岁之内患儿患化脑易合并
- B. 结核性脑膜炎

C 脑膜炎双球菌脑炎
D 新生儿化脓性脑膜炎
E 脑炎链球菌性脑膜炎
1. 硬膜下积液
2. 面神经受损
3. 皮肤瘀斑，涂片检菌阳性
正确答案：ABC 您选择的答案：

第109-111题

A. 1岁
B. 3岁
C. 4岁
D. 6岁
E. 8岁
1. 脑重量为成人60%的年龄为
2. 神经纤维髓鞘化完成的时间为
正确答案：ACB 您选择的答案：

第112-114题

A 糖正常，氯化物升高，蛋白明显下降，细胞数升高，以中性粒细胞为主
B 糖明显下降，氯化物下降，蛋白明显升高，细胞数升高，以中性粒细胞为主
C 糖明显下降，氯化物下降，蛋白明显升高，细胞数升高，以淋巴增高为主
D 细胞数增高，淋巴为主，糖正常，氯化物正常，蛋白升高
E 糖明显升高，氯化物正常，蛋白正常，细胞数正常
1. 化脓性脑膜炎
2. 病毒性脑膜炎
3. 结核性脑膜炎
正确答案：BDC 您选择的答案：

习题集 儿科学 内分泌疾病

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 下列哪项不是新生儿甲状腺功能减低症的特点

- A. 精神及动作反应迟钝
- B. 食量少，吞咽缓慢，常腹泻
- C. 很少哭闹，声音嘶哑
- D. 生理性黄疸时间延长
- E. 不爱活动，多睡

正确答案：B 您选择的答案：

第2题 先天性甲状腺功能减低症的辅助检查，下列哪项最有意义

- A. 血清T₃、T₄、TSH测定
- B. TRH刺激试验
- C. 骨龄测定
- D. 甲状腺吸¹³¹I试验
- E. 甲状腺B超

正确答案：A 您选择的答案：

第3题 导致先天性甲状腺功能减低症的病因不包括

- A. 甲状腺不发育或发育不全
- B. 甲状腺素合成途径缺陷
- C. 促甲状腺激素缺乏
- D. 甲状腺或靶器官反应性低下
- E. 碘摄入过多

正确答案：E 您选择的答案：

第4题 先天性甲状腺功能减低症服用甲状腺制剂的时间是

- A. 1~2年
- B. 2~4年
- C. 4~6年
- D. 6~8年
- E. 终生

正确答案：E 您选择的答案：

第5题 地方性甲状腺功能减低症的病因是

- A. 甲状腺发育异常
- B. 母亲孕期应用抗甲状腺药物
- C. 孕妇饮食中缺碘
- D. 孕妇体内有抗甲状腺球蛋白抗体
- E. 甲状腺素合成缺陷

正确答案：C 您选择的答案：

第6题 先天性甲状腺功能减低症用甲状腺片治疗，下列错误的是

- A. 治疗开始时间愈早愈好
- B. 终生治疗
- C. 初始剂量为5~10mg/d
- D. 维持剂量为5~10mg(kg·d)
- E. 维持量个体差异较大

正确答案：D 您选择的答案：

第7题 地方性甲状腺功能减低症患儿给甲状腺片治疗改善

- A. 智力低下
- B. 功能低下症状
- C. 听力障碍
- D. 运动障碍
- E. 共济失调

正确答案：B 您选择的答案：

第8题 先天性甲状腺功能减低症服用甲状腺制剂治疗时间是

- A. 1~2年
- B. 2~4年
- C. 4~6个
- D. 6~8年
- E. 终生

正确答案：E 您选择的答案：

第9题 治疗先天性甲状腺功能减低症用甲状腺片的维持量[mg/(kg·d)]为

- A. 1~2
- B. 2~4
- C. 4~8
- D. 8~12
- E. 12~16

正确答案：C 您选择的答案：

第10题 地方性甲状腺功能减低症的原因是

- A. 孕妇饮食中缺乏碘

- B 孕妇患甲状腺炎
- C 孕妇血液中有抗体
- D 孕妇服用甲状腺素
- E 孕早期病毒感染

正确答案：A 您选择的答案：

第11题 新生儿甲状腺功能减低症下列哪项是错误的

- A 精神及动作反应迟钝
- B 食量少，吞咽缓慢，常腹泻
- C 很少哭吵、声音嘶哑
- D 生理性黄疸时间延长
- E 不爱活动，多睡

正确答案：B 您选择的答案：

第12题 新生儿甲状腺功能减低症常见于

- A 早产儿
- B 足月儿
- C 小于胎龄儿
- D 过期产儿
- E 低出生体重儿

正确答案：D 您选择的答案：

第13题 新生儿甲状腺减低症常见于

- A．早产儿
- B．足月儿
- C．小于胎龄儿
- D．过期产儿
- E．低出生体重儿

正确答案：D 您选择的答案：

第14题 下列哪项不符合先天性甲状腺功能减低症的辅助检查表现

- A．心电图P-R间期延长，T波平坦
- B．TSH可升高
- C．T4降低，T3降低或正常
- D．骨骼X线片示骨龄提前
- E．T4降低，TSH升高

正确答案：D 您选择的答案：

第15题 垂体发育缺陷导致先天性甲状腺功能减低症的机制是

- A．促甲状腺素缺乏
- B．促甲状腺素释放激素缺乏
- C．生长激素缺乏
- D．促肾上腺皮质激素缺乏
- E．碘缺乏

正确答案：A 您选择的答案：

第16题 先天性甲状腺功能减低症，新生儿期的表现，以下哪项不正确

- A．常为过期产
- B．生理黄疸期延长
- C．生后即有腹胀、便秘
- D．易激惹
- E．喂养困难，声音嘶哑

正确答案：D 您选择的答案：

第17题 先天性甲状腺功能减低症的确诊靠

- A．新生儿筛查
- B．血T3、T4、TSH检查
- C．TRH刺激试验
- D．骨骼X线检查
- E．放射性核素检查

正确答案：B 您选择的答案：

第18题 先天性甲状腺功能减低症与先天性巨结肠的临床鉴别点是

- A．有无特殊面容及精神神经反应迟钝
- B．有无便秘
- C．有无腹胀
- D．有无脐疝
- E．有无吐奶

正确答案：A 您选择的答案：

第19题 先天性甲状腺功能减低症与佝偻病的主要鉴别点为

- A．有无动作发育迟缓
- B．是否生长落后
- C．有无特殊面容
- D．年龄不同
- E．性别不同

正确答案：C 您选择的答案：

第20题 引起先天性甲状腺功能减低症的主要原因是

- A．甲状腺不发育或发育不全

B. 甲状腺素合成途径缺陷
C. 促甲状腺激素缺乏
D. 甲状腺或靶器官反应性低下
E. 孕妇饮食中缺乏碘
正确答案：A 您选择的答案：

第21题 先天性甲状腺功能减低症的典型临床表现，不包括
A. 小指向内弯曲，只有一条指褶纹
B. 特殊面容和体态
C. 反应低下，喂养困难
D. 身材矮小，智力低下
E. 生理性黄疸延迟
正确答案：A 您选择的答案：

第22题 新生儿甲状腺功能减低症的初筛试验中，如果TSH>20mU/L，需要进一步检查下列哪项可以确诊
A. 血清T4
B. 血清T3
C. 血清T3、TSH
D. 血清T4、TSH
E. 血清TRH
正确答案：D 您选择的答案：

第23题 新生儿甲状腺功能减低症筛查的最佳时间是
A. 生后即查血
B. 生后2~3天
C. 生后1周左右
D. 生后1个月左右
E. 生后3个月左右
正确答案：B 您选择的答案：

第24题 有关先天性甲状腺功能减低症临床表现的描述，不正确的是
A. 症状出现的早晚与残留的甲状腺分泌功能有关
B. 酶缺陷患儿生后数年可出现甲状腺肿大
C. 甲状腺发育不良患儿生后即出现明显症状
D. 未经治疗的患儿在生命早期即可有严重的神经系统损害
E. 新生儿期症状不明显
正确答案：C 您选择的答案：

第25题 先天性甲状腺功能减低症，在新生儿筛查时测定的是
A. 血清碘
B. T3、T4
C. TSH
D. 游离T3、游离T4
E. 游离T3、游离T4、TSH
正确答案：C 您选择的答案：

第26题 先天性甲状腺功能减低症治疗的主要目的是
A. 减轻神经系统损害，维持正常生理功能
B. 延长寿命
C. 增加身高
D. 增加体重
E. 防止肥胖
正确答案：A 您选择的答案：

第27题 治疗先天性甲状腺功能减低症的常用药物是
A. 糖皮质激素
B. 左旋甲状腺素钠
C. 促甲状腺素
D. 促甲状腺释放激素
E. 促垂体后叶素
正确答案：B 您选择的答案：

第28题 先天性甲状腺功能减低症的新生儿筛查下列哪项是错误的
A. 生后2~3天的新生儿
B. 应用于血滴纸片
C. 测TSH的浓度
D. TSH>20mU/L时即可确诊
E. 该方法简便实用
正确答案：D 您选择的答案：

第29题 有关先天性甲状腺功能减低症治疗的描述，错误的是
A. 需甲状腺素终生治疗
B. 用量不足时影响小儿身高及骨骼增长
C. 从大剂量开始用药以迅速缓解症状
D. 治疗开始时间越早，治疗效果就越好
E. 定期检测血T4、TSH变化以调整用药剂量
正确答案：C 您选择的答案：

第30题 多数先天性甲状腺功能减低症患儿出现明显症状的时间是
A. >1个月

- B > 3个月
- C > 6个月
- D > 9个月
- E > 12个月

正确答案：C 您选择的答案：

第31题 甲状腺激素的主要生理作用，下列哪项是错误的

- A 促进新陈代谢
- B 促进生长
- C 增加酶活力
- D 促进中枢神经系统发育
- E 抑制脂肪分解和利用

正确答案：E 您选择的答案：

第32题 治疗先天性甲状腺功能减低症用甲状腺片治疗开始剂量(mg / d)，下列哪项是正确的

- A 1~5
- B 5~10
- C 10~15
- D 15~20
- E 20~25

正确答案：B 您选择的答案：

第33题 关于先天性甲状腺功能减低症的治疗，以下哪项是错误的

- A．甲状腺素终生治疗
- B．临床症状改善，T4、TSH正常
- C．甲状腺素治疗维持至青春期即可停药
- D．甲状腺素自小剂量开始逐渐增加剂量
- E．生后1~2个月开始治疗，可不遗留神经系统损害

正确答案：C 您选择的答案：

第34题 先天性甲状腺功能减低症与21-三体综合征的主要鉴别点是

- A．智能是否低下
- B．有无身材矮小
- C．骨龄落后
- D．动作发育迟缓
- E．甲状腺功能检查和染色体检查

正确答案：E 您选择的答案：

第35题 在胎儿期和婴儿期甲状腺素缺乏，下列哪种器官受损害最严重

- A．心脏
- B．肺脏
- C．肾脏
- D．脑组织
- E．肝脏

正确答案：D 您选择的答案：

第36题 无甲状腺组织的先天性甲状腺功能减低症出现症状的时间是

- A 出生时
- B 婴儿早期
- C 3~6个月
- D 6~9个月
- E 9~10个月

正确答案：B 您选择的答案：

第37题 先天性甲状腺功能减低症患儿的特殊面容和体态不包括

- A．头大、颈短
- B．面部粘液水肿，眼睑浮肿
- C．皮肤苍黄、干燥，毛发稀少
- D．眼距宽，鼻梁宽平
- E．呈匀称性矮小

正确答案：E 您选择的答案：

第38题 先天性甲状腺功能减低症时血清甲状腺素水平为

- A．T3 、T4 、TSH
- B．T3 、T4 、TSH
- C．T3 、T4 、TSH
- D．T3 、T4 、TSH
- E．T3 、T4 、TSH

正确答案：C 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第39题 患儿，4岁。诊断为先天性甲状腺功能减低症，给甲状腺素片治疗，医生嘱咐，出现下列情况考虑为甲状腺素片过量，但哪项除外

- A．食欲好转
- B．心悸
- C．发热
- D．多汗

E. 腹泻

正确答案：A 您选择的答案：

第40题 20天女婴，生后3天行新生儿筛查发现TSH浓度为30mU/L，为进一步明确诊断，必须再进行以下何项检查

- A. 骨龄测定
- B. 染色体核型分析
- C. 血清T₃、T₄、TSH测定
- D. TRH刺激试验
- E. 血钙、磷及碱性磷酸酶测定

正确答案：C 您选择的答案：

第41题 女婴，30天。过期产，出生体重4.5kg，母亲无糖尿病史。生后人工喂养，常鼻塞，时有呼吸困难，吃奶差。哭声弱、反应差、便秘，体检：T35.5（R），P90次/分，皮肤轻度黄染。血象：Hb 90g/L，RBC $3.6 \times 10^{12}/L$ ，WBC $11 \times 10^9/L$ 。对该儿最主要的治疗是

- A. 应用抗生素抗感染
- B. 保肝、利胆、退黄
- C. 不需用药，继续观察
- D. 保暖给氧，支持呼吸
- E. 服用甲状腺制剂

正确答案：E 您选择的答案：

第42题 1岁男婴，因腹胀、便秘、反应低下、少哭、多睡11个月来诊。体检：体温36.2℃，四肢稍凉，皮肤粗糙，毛发枯黄稀疏，心率68次/分，心音低钝，眼距宽，唇厚舌大，身高70cm，四肢短粗，不会独坐及爬行，奉情呆滞，哭声嘶哑，腹部膨隆，有脐疝。最可能的诊断是

- A. 软骨发育不良
- B. 粘多糖病
- C. 苯丙酮尿症
- D. 先天性甲状腺功能减低症
- E. 染色体病

正确答案：D 您选择的答案：

第43题 3岁男孩，确诊为先天性甲状腺功能减低症，服用甲状腺素片已2年，连续3次复查血清T₄、TSH正常。该患儿的下一步治疗是

- A. 可停止用药
- B. 甲状腺素可逐渐减量，3月后停药
- C. 3月后再次复查血清T₄、TSH，若正常则可停药
- D. 维持原剂量继续治疗
- E. 加大剂量继续治疗

正确答案：D 您选择的答案：

第44题 患儿，女，2岁。因语言、运动发育迟缓就诊。患儿9个月会坐，现刚会站，尚不会说话。体检：身长70cm，表情呆滞，皮肤粗糙，眼睑肿，眼距宽，鼻梁低，舌大且厚，伸出口外，心率80次/分，心音较低，双肺呼吸音清，腹膨隆，有脐疝，四肢短粗，为明确诊断，应选择下列哪项检查

- A. 染色体核型分析
- B. 血清T₃、T₄、TSH测定
- C. 尿三氯化铁试验
- D. 药物刺激GH释放试验
- E. 骨骼X线检查

正确答案：B 您选择的答案：

第45题 患儿，6岁。粘液水肿面容，智力低下，口服甲状腺素片治疗3个月，病儿近日出现心悸，多汗，性情烦躁，食欲亢进，血压：20/12kPa，心率：130次/分，心尖区 收缩期杂音，该患儿诊断是

- A. 心肌炎
- B. 小儿神经症
- C. 原发性高血压
- D. 糖尿病
- E. 甲亢

正确答案：E 您选择的答案：

第46题 患儿，女，10个月。新生儿期确诊先天性甲状腺功能减低症，即开始口服甲状腺干粉片治疗，目前维持剂量为每日50mg，近日发现患儿烦躁，多汗，消瘦，腹泻，此时应采取的措施是

- A. 减少甲状腺片剂量
- B. 增加甲状腺片剂量
- C. 停药
- D. 改用甲状腺素钠
- E. 不做特殊处理

正确答案：A 您选择的答案：

第47题 某地山村，不少小儿生后表现智力低下，对声音无反应，运动障碍，有的皮肤粗糙，身材矮小，四肢粗短。为预防此病，下列措施哪项不正确

- A. 给育龄妇女服碘油
- B. 孕妇多食含碘食物
- C. 给村民发放碘化食盐
- D. 改善水源，饮水消毒
- E. 给孕妇多食含氟食物

正确答案：E 您选择的答案：

第48题 出生25天新生儿，胎龄43周，出生体重4.5kg，反应迟钝，哭声低，大便2~3天一次。体检：肛温35.4℃，前囟3cm×3cm，喜伸舌，皮肤巩膜黄染，腹胀。该患儿最可能的诊断是

- A. 新生儿肝炎综合征

B. 佝偻病
C. 先天性巨结肠
D. 21-三体综合征
E. 先天性甲状腺功能减低症
正确答案：E 您选择的答案：

第49题 患儿，20天，过期产儿。出生体重4.2kg，哭声低哑，反应迟钝，食量少，黄疸未退，便秘，体重低，腹胀，该患儿最可能的诊断是

A 甲状腺功能减低症
B 苯丙酮尿症
C 先天愚型
D 先天性巨结肠
E 粘多糖病
正确答案：A 您选择的答案：

第50题 女孩，7个月。因逗笑少，对玩具不感兴趣，矮小，而去医院要求检查，医生疑为智能低下。对其病因如先天性甲状腺功能低下未能肯定，如需确诊，进一步应作的实验室检查是

A 干血滴纸片检测TSH浓度
B 测血清T4和TSH浓度
C TRIt刺激试验
D X线腕骨片判定骨龄
E 核素检查(甲状腺SPECT)
正确答案：B 您选择的答案：

第51题 女婴，30天。过期产，出生体重4500克，母亲无糖尿病病史。生后人工喂养，常鼻塞，时有呼吸困难，吃奶差。哭声弱、反应差、便秘，体检：T35.5℃，P90次/分，皮肤轻度黄染。血象(答案)：E：Hb90g/L，RBC3.6×10¹²/L，WBC11×10⁹/L。对该患儿最主要的治疗是

A. 应用抗生素抗感染
B. 保肝、利胆、退黄
C. 不需用药，继续观察
D. 保暖给氧，支持呼吸
E. 服用甲状腺制剂
正确答案：E 您选择的答案：

第52题 患儿，1岁。不会走，不会叫爸爸，妈妈，查体：眼距宽，鼻梁宽平，唇厚，舌大反应差，皮肤粗糙，脐疝，下部量短，为确诊，应做下哪项检查

A X线腕骨片
B 染色体检查
C 三氯化铁试验
D GH测定
E T3，T4，TSH
正确答案：E 您选择的答案：

三、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第53-55题

10个月男婴，不能独坐，尚不能认识亲人与陌生人。平时少哭少动，经常便秘，进食少。体查：表情呆板，前囟未闭，头大，颈短，眼距宽，眼睑浮肿，舌大常伸出口外，头发稀少，心率86次/分，心音稍低钝，腹部膨隆，腹胀明显。

1. 该患儿最可能的诊断是
A. 佝偻病
B. 先天愚型
C. 先天性巨结肠
D. 先天性甲状腺功能减低症
E. 粘多糖病
2. 应进行何项检查以明确诊断
A. 血钙、磷及碱性磷酸酶测定
B. 染色体检查
C. 腹部B超
D. 血T3、T4、TSH
E. 骨骼X线片
3. 该患儿的治疗药物首选
A. 维生素D
D. 钙剂
C. 甲状腺素
D. 特殊饮食疗法
E. 胃肠动力药
正确答案：DDC 您选择的答案：

第56-57题

病儿，6个月。因便秘，食欲差，嗜睡，反应迟钝来诊。查体：体温：35.5℃ 脉搏：100次/分，呼吸：30次/分，皮肤粗糙，干燥，头大，颈短，眼距宽，鼻梁宽平，腹胀，脐疝

1. 该患儿的诊断是
A 苯丙酮尿症
B 先天愚型
C 甲状腺功能减低症
D 粘多糖病
E 佝偻病

2. 为明确诊断应做哪项检查

- A 三氯化铁试验
- B T₃, T₄, TSH
- C 染色体检查
- D 血离子
- E 代谢病筛查

正确答案: CB 您选择的答案:

第58-60题

2岁女孩, 因生长发育落后, 智力发育落后来诊。此患儿出生后即有吃奶差, 腹胀、便秘, 少哭、少动; 哭声嘶哑, 近2~3个月出现面部、眼睑水肿。至今不会说话、不会走路。体检: 体温35.7, 心率66次/分, 呼吸22次/分, 皮肤粗糙, 毛发干燥, 表情呆滞, 声音嘶哑, 眼距宽, 鼻梁低平, 舌伸出口外, 面部眼睑水肿, 双肺听诊无啰音, 心音低钝, 腹膨隆, 有脐疝, 四肢肌张力弱。

1. 最可能的诊断是

- A. 21-三体综合征
- B. 先天性甲状腺功能减低症
- C. 苯丙酮尿症
- D. Turner综合征
- E. 先天性生长激素缺乏症

2. 以下哪项检查可以确诊

- A. 染色体检查
- B. 血苯丙氨酸浓度
- C. GH刺激试验
- D. 血清T₃、T₄、TSH浓度
- E. 骨龄X线片

3. 应选择的最佳治疗药物是

- A. γ -hGH
- B. 多巴胺
- C. 甲巯咪唑
- D. 左旋甲状腺素钠
- E. 钙剂

正确答案: BDD 您选择的答案:

第61-63题

男婴, 40天。过期产, 出生后第3天出现黄疸, 至今尚未完全消退。生后少哭, 少动。吃奶尚可, 大便2天1次, 色黄。腹软较胀, 有脐疝, 肝肋下2cm。血清总胆红素170 μ mol/L, 结合胆红素21 μ mol/L, 血红蛋白110g/L, RBC 8×10^9 /L

1. 该儿最可能的诊断是

- A 新生儿肝炎
- B 先天性胆道闭锁
- C 先天性甲状腺功能减低症
- D 败血症
- E 先天性巨结肠

2. 为确诊, 应选择哪项检查

- A 血清病毒特异抗体检测
- B 肝胆B超
- C 血清T₃、T₄、6H检查
- D 血培养
- E 钡剂灌肠

3. 应及时给予何种治疗

- A 护肝利胆类药物
- B 外科手术
- C 甲状腺素片口服
- D 应用有效抗生素
- E 应用抗病毒药

正确答案: CCC 您选择的答案:

四、A4型题: 以下提供若干个案例, 每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息, 在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第64-66题

男, 6岁。身高85cm, 智能落后, 只能数1~10。体检: 皮肤粗糙, 眼睑水肿, 眼距宽, 鼻梁扁平, 牙列不齐, 常舌伸口外, 流涎, 毛发黄, 发际低, 骨龄摄片示腕部骨化中心4个。

1. 为确诊, 应选择下列哪项检查

- A. 智测
- B. 尿三氯化铁试验
- C. T₃、T₄、TSH测定
- D. 尿粘多糖分析
- E. 血生长激素测定

2. 若追问病史, 父母为非近亲结婚, 患儿自幼生长于沿海城市, 无偏食习惯。下列哪项与该患儿病因无关

- A. 母孕期饮食中缺碘
- B. 患儿甲状腺缺如
- C. 母孕期用抗甲状腺药物
- D. 甲状腺激素合成障碍
- E. 下丘脑发育异常

3. 患儿确诊后给予治疗, 下列哪项措施不恰当

- A. 服用甲状腺素片
- B. 从小剂量开始, 逐渐增加量

- C. 治疗期定期复查T4、TSH
- D. 临床症状消失后停药
- E. 剂量随年龄不同而不同

正确答案：CAD 您选择的答案：

五、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第67-69题

- A 先天愚型
 - B 软骨发育不全
 - C 承露病
 - D 垂体性侏儒症
 - E 先天性甲状腺功能减低症
1. 有粘液性水肿的是
 2. 均称性矮小的是
 3. 尿中粘多糖增高的是

正确答案：EDC 您选择的答案：

第70-72题

- A. 甲状腺功能正常
 - B. 血清T4降低、TSH增高，TRH刺激试验阴性
 - C. 血清T4降低、TSH增高，TRH刺激试验阳性
 - D. 血清T4增高、TSH降低
 - E. 血清T4增高、TSH增高
1. 垂体病损所致先天性甲状腺功能减低症
 2. 下丘脑病损所致先天性甲状腺功能低下
 3. 佝偻病

正确答案：BCA 您选择的答案：

第73-75题

- A. 囟门迟闭，出牙延迟，但智力发育正常
 - B. 骨龄落后，具有特殊面容，黏液水肿
 - C. 头大，四肢短小，智力正常
 - D. 智力体格发育迟缓，具有特殊面容和皮纹特点
 - E. 智力落后，皮肤毛发色素减少，尿有鼠尿臭味
1. 呆小病
 2. 先天愚型
 3. 佝偻病

正确答案：BDA 您选择的答案：

第76-78题

- A 先天性甲状腺功能减低症
 - B 佝偻病
 - C 软骨发育不全
 - D 垂体性侏儒症
 - E 先天性巨结肠
1. 智能低下，特殊面容是
 2. 外观矮小，全身比例匀称是
 3. 头大、四肢短小，智能正常是

正确答案：ADC 您选择的答案：

习题集 儿科学 免疫、变态反应、结缔组织病

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 心包炎早期心电图改变错误的是

- A 高电压
- B ST段抬高(早期)
- C 以后ST段下降
- D T波平坦
- E T波亦可倒置

正确答案：A 您选择的答案：

第2题 下列哪一项不是婴幼儿哮喘的诊断标准

- A 喘息发作 3次
- B 肺部出现哮鸣音
- C 具有特异性体质
- D 一定伴有发热
- E 一、二级亲属中有哮喘史

正确答案：D 您选择的答案：

第3题 下列哪项与特异性细胞免疫无关

- A 胸腺
- B T细胞
- C 干扰素
- D 巨噬细胞
- E 肿瘤坏死因子

正确答案：D 您选择的答案：

第4题 风湿热急性期应用青霉素的目的是

- A 控制风湿活动的进展
- B 纠正急性心力衰竭
- C 减少瓣膜病的发生
- D 清除链球菌感染病灶
- E 预防病程中继发感染

正确答案：D 您选择的答案：

第5题 风湿性二尖瓣狭窄的形成时间约需

- A 1年左右
- B 2年左右
- C 3年左右
- D 4年左右
- E 5年左右

正确答案：B 您选择的答案：

第6题 揭示风湿活动的诊断依据以下哪项是错误的

- A 具有发热乏力、苍白、脉搏增快等表现
- B 血沉增快
- C CRP粘蛋白增高
- D 抗链"O"增高
- E P-R间期延长

正确答案：D 您选择的答案：

第7题 急性风湿热不伴有心脏炎的患儿，阿司匹林治疗的总疗程为

- A 1~3周
- B 3~6周
- C 6~12周
- D 半年
- E 1年

正确答案：B 您选择的答案：

第8题 能通过胎盘的抗体是

- A IgA
- B IgG
- C IgM
- D IgD
- E IgE

正确答案：B 您选择的答案：

第9题 下列哪项不是T淋巴细胞产生的细胞因子

- A 白细胞介素2
- B γ-干扰素
- C 白细胞介素4
- D 白细胞介素5
- E 冷凝集素

正确答案：E 您选择的答案：

第10题 关于皮下结节的描述以下哪项是错误的

- A 粟米或豌豆大小，圆形，质硬
- B 分布于肘、腕、踝、膝关节屈侧
- C 见于5%~10%的风湿热病人
- D 起病数周后出现
- E 2~4周自然消失

正确答案：B 您选择的答案：

第11题 风湿性心内膜炎最常受累的瓣膜是

- A. 二尖瓣
- B. 三尖瓣
- C. 肺动脉瓣
- D. 左心房内膜
- E. 右心房内膜

正确答案：A 您选择的答案：

第12题 风湿热患儿急性期心尖区出现舒张期杂音往往提示

- A. 心肌炎
- B. 二尖瓣狭窄
- C. 伴有先天性心脏病
- D. 为发热所致
- E. 无临床意义

正确答案：A 您选择的答案：

第13题 导致风湿热的病原菌是

- A 金黄色葡萄球菌
- B 肺炎双球菌
- C A组乙型溶血性链球菌
- D 流感杆菌
- E 大肠杆菌

正确答案：C 您选择的答案：

第14题 选择性IgA缺陷下列哪项是错误的

- A 本病可无症状
- B 婴幼儿期反复患呼吸道、胃肠道、泌尿道感染
- C 常伴有自身免疫性疾病和过敏性疾病
- D 如不并发严重感染，多数能存活到壮年或老年
- E 可给予输血治疗

正确答案：E 您选择的答案：

第15题 风湿热发热后形成二尖瓣闭锁不全的时间是

- A 2个月左右
- B 4个月左右
- C 6个月左右
- D 8个月左右
- E 10个月左右

正确答案：C 您选择的答案：

第16题 关于儿童哮喘的诊断依据，以下哪项不正确

- A. 喘息呈反复发作
- B. 发作时肺部出现哮鸣音
- C. 平喘药物治疗有效
- D. 血中嗜酸性粒细胞计数增高
- E. 肾上腺素试验有明显疗效

正确答案：D 您选择的答案：

第17题 下列哪一种药物不属于支气管扩张剂

- A 舒喘灵
- B 喘乐宁
- C 茶妥英纳
- D 异丙阿托品
- E 肾上腺皮质激素类

正确答案：C 您选择的答案：

第18题 下列哪项不是B细胞功能的检测方法

- A. 血清Ig量测定
- B. 抗体测定
- C. 用单克隆抗体CD19、CD20测B细胞
- D. 血清蛋白电泳
- E. 皮肤迟发超敏反应

正确答案：E 您选择的答案：

第19题 新生儿期各种吞噬细胞功能可呈暂时性低下的原因中，应除外下列哪项

- A. 分娩过程缺氧
- B. 缺乏血清补体
- C. 缺乏调理素
- D. 缺乏趋化因子
- E. 缺乏IgA

正确答案：E 您选择的答案：

第20题 小儿扁桃体发育规律

A 2岁后扁桃体增大,6~7岁时达顶峰
B 生后扁桃体增大,5~6岁时明显增大
C 3岁时扁桃体增大,8~9岁时缩小
D 5~6岁时扁桃体增大,9~10岁时缩小
E 3~4岁时扁桃体增大,青春期缩小
正确答案:A 您选择的答案:

第21题 急性风湿热抗链"O"增高与下降的时间是
A 链球菌感染后7天增高,持续2周下降
B 链球菌感染后10天增高,持续4周下降
C 链球菌感染后2周增高,持续2个月下降
D 链球菌感染后4周增高,持续2个月下降
E 链球菌感染后2周增高,持续1个月下降
正确答案:C 您选择的答案:

第22题 风湿性心肌炎的临床表现下列哪项是错误的
A 出现早搏和心动过速
B 心率增快
C 心前区第一心音减弱
D 严重时可能出现奔马律
E 心尖区可听到隆隆样收缩期杂音
正确答案:E 您选择的答案:

第23题 风湿热的发病常与下列哪种病原体感染有关
A. A组A型溶血性链球菌
B. A组B型溶血性链球菌
C. 皮肤溶血性链球菌
D. 肺炎链球菌
E. 金黄色葡萄球菌
正确答案:B 您选择的答案:

第24题 判定风湿热心瓣膜已发生不可逆性损害须观察
A 2~4个月
B 4~8个月
C 半年~1年
D 半年~1年半
E 半年~2年
正确答案:E 您选择的答案:

第25题 发病率最高的原发性免疫缺陷病是
A 抗体缺陷病
B 细胞免疫缺陷
C 抗体和细胞免疫联合缺陷
D 吞噬功能缺陷
E 补体缺陷
正确答案:A 您选择的答案:

第26题 急性风湿热青霉素治疗至少需要多长时间
A 2周
B 3周
C 1个月
D 2个月
E 10天
正确答案:A 您选择的答案:

第27题 确诊风湿热的主要表现哪项是错误的
A 心脏炎
B 游走性多发性关节炎
C 舞蹈病
D 发热
E 环形红斑
正确答案:D 您选择的答案:

第28题 风湿性心脏炎激素治疗的总疗程
A 2~4周
B 4~8周
C 8~12周
D 12~24周
E 半年
正确答案:C 您选择的答案:

第29题 对哮喘持续状态的处理哪一项是错误的
A 吸O₂
B 补液纠正酸中毒
C 糖皮质激素类静脉滴注
D 支气管扩张剂
E 脱敏疗法
正确答案:E 您选择的答案:

第30题 下列哪项是免疫活性细胞

- A. NK细胞
- B. T细胞、B细胞
- C. 单核-巨噬细胞
- D. 各类多形核细胞
- E. 肥大细胞

正确答案：B 您选择的答案：

第31题 关于婴幼儿哮喘的诊断标准，以下哪项是错误的

- A. 喘息发作 3次
- B. 肺部哮鸣音
- C. 喘息症状突然发作
- D. 有其他特异性病史
- E. 临床有感染征象

正确答案：E 您选择的答案：

第32题 血清IgG达到成人水平的年龄是

- A. 3~4岁
- B. 4~5岁
- C. 5~6岁
- D. 10岁左右
- E. 14岁

正确答案：E 您选择的答案：

第33题 下列哪一项是链球菌感染证据

- A. 抗“O” > 500U
- B. 血沉增快
- C. CRP阳性
- D. 扁桃体化脓
- E. 白细胞增高

正确答案：A 您选择的答案：

第34题 小儿体液免疫特点中，下述哪项是错误的

- A. 免疫球蛋白包括IgA, IgG, IgM, IgD及IgE五类
- B. IgG有四个亚类
- C. IgA含量增高揭示有宫内感染可能性
- D. 免疫球蛋白是巨噬细胞产物
- E. 小儿体液免疫的发育随年龄增长逐步完善

正确答案：D 您选择的答案：

第35题 在哮喘的药物治疗中，以何种为主导

- A. β_2 受体激动剂
- B. 糖皮质激素
- C. 免疫抑制剂
- D. 肥大细胞膜稳定剂
- E. 茶碱类药物

正确答案：B 您选择的答案：

第36题 风湿性心包炎的X检查，以下哪项是错误的

- A. 心脏搏动减弱或消失
- B. 心影向两侧扩大，呈烧瓶状
- C. 卧位时心腰增宽
- D. 立位时阴影又复变窄
- E. 初次发作的急性期变化是由于瓣膜病变所致

正确答案：E 您选择的答案：

第37题 关于咳嗽变异性哮喘的诊断依据，以下哪项不正确

- A. 咳嗽持续或反复发作>1个月
- B. 发作时肺部出现哮鸣音
- C. 临床无感染征象
- D. 用支气管扩张剂可使咳嗽发作缓解
- E. 有个人或家族过敏史

正确答案：B 您选择的答案：

第38题 原发性免疫缺陷病治疗错误的是

- A. 合并感染时，应选用杀菌强的抗菌药物治疗
- B. 选择性IgA缺乏病禁忌输血或血制品
- C. 丙种球蛋白制剂仅适用于治疗IgG缺乏病
- D. 有严重细胞免疫缺陷的各种病人输血，只能输库血或经X线照射的血
- E. 胸腺发育不全出现低钙抽搐除给钙剂，还应给VitD₃

正确答案：C 您选择的答案：

第39题 外周血中淋巴细胞数低于下列哪项数值，提示T细胞缺陷

- A. $1.0 \times 10^9/L$
- B. $1.2 \times 10^9/L$
- C. $1.4 \times 10^9/L$
- D. $1.5 \times 10^9/L$
- E. $1.3 \times 10^9/L$

正确答案：B 您选择的答案：

第40题 下列哪项不是T细胞在机体防御机制中的作用

- A. T辅助功能
- B. T抑制功能
- C. T杀伤功能
- D. 合成各种免疫球蛋白
- E. 排斥同种异型移植植物

正确答案：D 您选择的答案：

第41题 下列哪一项不是咳嗽变异性哮喘的诊断依据

- A. 咳嗽持续或反复发作 > 1个月
- B. 临床无感染征象，或经较长期抗生素治疗无效
- C. 支气管扩张剂可使咳嗽发作缓解
- D. 有个人或家族过敏史
- E. 常在白天发作，运动后减轻

正确答案：E 您选择的答案：

第42题 下列风湿性心肌炎的特点，应除外哪项

- A. 心肌、心内膜、心包均可受累
- B. 活动性心肌炎多有心脏增大
- C. 心尖区有收缩期或舒张期杂音
- D. 心瓣膜损害均不可逆
- E. 常伴皮下小结或环形红斑

正确答案：D 您选择的答案：

第43题 风湿性舞蹈病的临床特征中哪一项是错误的

- A. 多见于女性患者
- B. 以四肢和面部为主的自主、无目的的快速运动
- C. 兴奋和注意力集中时消失
- D. 病程呈自限性
- E. 其动作入睡后可消失

正确答案：C 您选择的答案：

第44题 以下哪项不是风湿热的主要临床表现

- A. 游走性、多发性、大关节炎
- B. 心脏炎
- C. 舞蹈病
- D. 皮下结节与环形红斑
- E. 白细胞增多及血沉明显增快

正确答案：E 您选择的答案：

第45题 胸腺何时开始萎缩？其X线影何时消失

- A. 学龄期开始萎缩，婴儿期X线影消失
- B. 11~14岁开始萎缩，3~4岁时X线影消失
- C. 18~20岁开始萎缩，5~6岁时X线影消失
- D. 青春期开始萎缩，4~6岁时X线影消失
- E. 青春期开始萎缩，3~4岁时X线影消失

正确答案：E 您选择的答案：

第46题 出生时血清IgM>0.2~0.3g/L，提示

- A. 母体IgM抗体通过胎盘输送给胎儿
- B. 母亲妊娠后期有感染
- C. 胎儿宫内有感染
- D. 胎儿出生后感染
- E. 以上都不是

正确答案：C 您选择的答案：

第47题 下列哪项不是确诊风湿热的主要表现

- A. 心脏炎
- B. 多发性关节炎
- C. 舞蹈病
- D. 发热
- E. 环形红斑

正确答案：D 您选择的答案：

第48题 急性风湿热合并心衰的治疗，下列哪一项是错误的

- A. 吸氧、低盐饮食
- B. 大剂量激素
- C. 洋地黄制剂给予足量
- D. 利尿剂
- E. 维持电解质平衡

正确答案：C 您选择的答案：

第49题 下列哪项与风湿热的发病机制无关

- A. Ⅰ型变态反应
- B. Ⅱ型变态反应
- C. 毛细血管的变态反应性炎症
- D. 抗心肌抗体
- E. 抗链球菌抗体

正确答案：C 您选择的答案：

第50题 风湿性心肌炎下列哪项不正确

- A. 心尖区可听到吹风样收缩期杂音
 - B. 可有心音低钝
 - C. 可出现心律失常
 - D. 不会出现心力衰竭
 - E. 心电图可有I度房室传导阻滞，ST段下移
- 正确答案：D 您选择的答案：

第51题 风湿性心脏炎最常受累的是

- A. 心包膜
 - B. 左心房内膜
 - C. 左心瓣膜
 - D. 右心瓣膜
 - E. 右心房内膜
- 正确答案：C 您选择的答案：

第52题 风湿热的次要表现不正确的是

- A. 发热
 - B. 关节痛
 - C. CRP阳性
 - D. P-R间期延长
 - E. 血沉降低
- 正确答案：E 您选择的答案：

第53题 关于支气管哮喘的预防不恰当的是

- A. 避免接触过敏原
 - B. 清除感染灶
 - C. 去除各种诱发因素
 - D. 经激素治疗后缓解的患儿不需继续用激素
 - E. 自我管理教育
- 正确答案：D 您选择的答案：

第54题 风湿性心包炎的特点，以下哪项是错误的

- A. 心前区疼痛，呼吸困难
 - B. 早期可听到心包摩擦音
 - C. 心音遥远少见
 - D. 发病早期积液量增多
 - E. X线心脏搏动减弱
- 正确答案：D 您选择的答案：

第55题 治疗风湿热急性期伴有心脏炎的患儿时，下述治疗哪项是错误的

- A. 宜绝对卧床休息至急性症状消失，血沉接近正常值
 - B. 如有心衰，待心衰控制后再卧床3~4周
 - C. 首选阿司匹林治疗
 - D. 总疗程为2~8周
 - E. 停药后的反跳现象在2~3天内自动消失
- 正确答案：C 您选择的答案：

第56题 下列何者不属于缓解支气管痉挛的药物

- A. 沙丁胺醇溶液
 - B. 特布他林
 - C. 倍氯米松气雾剂
 - D. 克伦特罗
 - E. 氨茶碱
- 正确答案：C 您选择的答案：

第57题 下列哪项不是风湿活动的指标

- A. 不规则发热、乏力
 - B. 面色苍白，心率增快
 - C. 血ASO大于500单位
 - D. 血沉增快，粘蛋白增加
 - E. 心电图示P-R间期延长
- 正确答案：C 您选择的答案：

第58题 风湿性关节炎特点中下列哪项是错误的

- A. 主要累及大关节
 - B. 呈游走性和多发性
 - C. 局部可呈红肿热痛和功能障碍
 - D. 治疗后可治愈
 - E. 但常留有畸形
- 正确答案：E 您选择的答案：

第59题 下列哪一项不是婴幼儿哮喘的诊断依据

- A. 喘息发作 3次
 - B. 肺部出现哮鸣音
 - C. 喘息症状突然发作
 - D. 一定伴有发热
 - E. 一、二级亲属中有哮喘病史
- 正确答案：D 您选择的答案：

第60题 表现为心脏炎并心力衰竭的急性风湿热的治疗下列哪一项是不恰当的

- A. 吸氧、低盐饮食
- B. 大剂量激素
- C. 小剂量阿司匹林
- D. 利尿剂
- E. 维持电解质平衡

正确答案：C 您选择的答案：

第61题 以下哪项不是风湿性关节炎的临床特点

- A. 强直性脊柱炎
- B. 游走性、多发性、大关节炎
- C. 关节局部红、肿、热、痛、功能障碍
- D. 治疗后不遗留关节畸形
- E. 轻症病人仅有关节酸痛

正确答案：A 您选择的答案：

第62题 胸腺开始萎缩的年龄是

- A. 1~2个月
- B. 1~2岁
- C. 3~4岁
- D. 青春期后
- E. 18岁以后

正确答案：D 您选择的答案：

第63题 风湿性心脏炎，具有重要病理意义的早期表现是

- A. 心尖区全收缩期杂音
- B. 心尖区舒张期杂音
- C. 主动脉瓣区舒张期杂音
- D. 心脏明显扩大
- E. 心电图示P-R间期延长

正确答案：C 您选择的答案：

第64题 有关风湿热的预后下述哪项有错误

- A. 舞蹈病的预后一般良好
- B. 首次发作累及心脏者，预后较差
- C. 反复发作累及心脏者预后不良
- D. 并发心功能不全者预后不良
- E. 伴发心包炎者预后良好

正确答案：E 您选择的答案：

第65题 关于支气管哮喘的治疗措施，以下哪项是不可取的

- A. 避免接触过敏原
- B. 清除感染灶
- C. 缓解支气管痉挛
- D. 减轻气道黏膜水肿
- E. 长期口服肾上腺皮质激素控制气道炎症

正确答案：E 您选择的答案：

第66题 下列哪项不是T细胞免疫功能的检测方法

- A. 外周血象和淋巴细胞计数
- B. 皮肤迟发型超敏反应
- C. T细胞及其亚群数量的检测
- D. T细胞功能检测
- E. 血清蛋白电泳

正确答案：E 您选择的答案：

第67题 确诊风湿热的次要表现哪一项是错误的

- A. 发热
- B. 关节酸痛
- C. 皮下结节
- D. 沉加快
- E. 有风湿热既往史

正确答案：C 您选择的答案：

第68题 唯一能通过胎盘进入胎儿体内的免疫球蛋白是

- A. IgA
- B. IgC
- C. IgM
- D. IgD
- E. IgE

正确答案：B 您选择的答案：

第69题 风湿热最常见的皮肤损害是

- A. 环形红斑
- B. 结节性红斑
- C. 多形红斑
- D. 蝶状红斑
- E. 圆形红斑

正确答案：A 您选择的答案：

第70题 关于风湿热环形红班的描述，以下哪项是错误的

- A 多见于躯干及四肢屈侧
- B 呈环形或半环形，中心肤色正常
- C 红斑出现缓慢
- D 数小时或1~2天内消失
- E 消退后不留痕迹

正确答案：C 您选择的答案：

第71题 关于风湿热实验室检查结果的判定，下列哪项是错误的

- A 抗链"O"增高，只能说明近期有过链球菌感染
- B 20%病人抗链"O"不增高
- C 舞蹈病患者抗链"O"一定增高
- D 血沉增快是风湿活动的重要标志
- E C反应蛋白可提示风湿活动

正确答案：C 您选择的答案：

第72题 风湿性心肌炎最常见的心电图改变是

- A I度房室传导阻滞
- B 过早搏动
- C 室上性心动过速
- D 右心室肥厚
- E Q-T间期延长

正确答案：A 您选择的答案：

第73题 风湿性关节炎的临床表现不正确的是

- A 游走性
- B 多发性
- C 主要累及膝、踝、肩、肘、腕等大关节
- D 局部出现红、肿、热和痛，以疼痛和功能障碍为主
- E 可导致关节畸形

正确答案：E 您选择的答案：

第74题 治疗风湿性心肌炎的首选药是

- A 阿司匹林
- B 维体舒
- C 消炎痛
- D 布洛芬
- E 肾上腺皮质激素

正确答案：E 您选择的答案：

第75题 支气管哮喘的现代概念是

- A 气道慢性感染
- B 气道高反应性
- C 气道慢性炎症
- D 气道狭窄
- E 气道过敏反应

正确答案：C 您选择的答案：

第76题 在下列T细胞功能检测的各项方法中，应除外

- A 同种血凝素效价测定
- B 淋巴细胞转化试验
- C IFN γ 水平测定
- D IL-2、4水平测定
- E 用协同培养方法测定T辅助与T抑制的功能

正确答案：A 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第77题 患儿6岁，近半个月不规则发热，伴关节肿痛，查体，心率稍增快，心音低钝，心电可见T波平坦，医院确诊为风湿热，该患儿应首选什么药物治疗

- A 强的松
- B 阿司匹林
- C 抗生素
- D ATP、Co-A、VitC等
- E 强心药物

正确答案：A 您选择的答案：

第78题 患儿4岁，突然出现喘憋，烦躁不安，大汗淋漓，不能平卧。曾有毛细支气管炎病史，查体，两肺布满哮鸣音，此症状及体位已持续26小时未缓解，下列治疗措施哪项不正确

- A 吸氧
- B 补液，纠正酸中毒
- C 静脉滴注地塞米松
- D 脱敏疗法
- E 支气管扩张剂

正确答案：D 您选择的答案：

第79题 患儿6岁，近2个月反复出现发作性咳嗽，尤其在夜间或清晨为著，痰少，运动后加重，无发热，一直使用先锋霉素和利菌沙治疗，效果不明显，近日使用舒喘灵，却有较好疗效，此病该做哪种诊断

- A 呼吸道异物
- B 呼吸道合胞病毒性肺炎
- C 儿童哮喘
- D 支气管炎
- E 咳嗽变异性哮喘

正确答案：E 您选择的答案：

第80题 患儿男，3岁。自5个月起反复患上呼吸道感染和肺炎，曾住院4次，本次因类风湿关节炎入院并伴有中耳炎，医生考虑该患儿为原发性免疫缺陷病，主要因为有哪些诊断依据，除了

- A 反复出现感染性疾病
- B 伴有自身免疫性疾病
- C 白细胞数值 $12 \times 10^9/L$
- D 查体发现扁桃体发育不良
- E 查血清抗体总量低于正常

正确答案：C 您选择的答案：

第81题 患儿女，6岁，近两周发热，伴肘膝关节不规则肿痛，查体：发现心音低钝，心率176次/分，肝于右肋下可触及3cm，实验室检查，抗“O”，500U，血沉65mm/h，诊断为风湿热，并伴有心功能不全，治疗需给洋地黄制剂，剂量应如何掌握

- A 给一般剂量
- B 给足剂量
- C 给 $1/3 \sim 1/2$
- D 给 $1/4 \sim 1/3$
- E 给 $1/2 \sim 1/4$

正确答案：C 您选择的答案：

第82题 12岁，女孩，发热，双膝关节肿痛1个月，心尖区吹风性 ~ 级收缩期杂音，血沉第一小时50mm/h，心电图：P-R间期0.15秒，RBC $300 \times 10^{12}/L$ 。可能诊断

- A. 病毒性心肌炎
- B. 风湿热
- C. 链球菌感染后状态
- D. 贫血
- E. 风心病、二尖瓣关闭不全

正确答案：B 您选择的答案：

第83题 患儿4岁，半月前确诊为风湿热，并出现心功不全表现，经治疗，心功能刚刚恢复，该患儿应卧床休息多长时间

- A 心功能恢复再卧床1~2周
- B 心功能恢复再卧床2~3周
- C 心功能恢复再卧床3~4周
- D 心功能恢复再卧床4~5周
- E 心功能恢复再卧床5~6周

正确答案：C 您选择的答案：

第84题 9岁的女孩，因患风湿热住院，经治疗后症状、体征消失，出院后要进行预防复发的指导，首选药物及方法是

- A. 青霉素，每次60万单位，每日2次，共10天
- B. 青霉素，每次60万单位，每日2次，共14天
- C. 青霉素，每次60万单位，每日2次，共20天
- D. 长效青霉素，每次120万单位，每月1次，共5年
- E. 长效青霉素，每次120万单位，每月2次，共5年

正确答案：D 您选择的答案：

第85题 患儿女，5岁。因发热10天不退，皮肤出现环形红斑，并伴有肘膝关节游走性疼痛而入院，查抗“O” $> 500U$ ，考虑为风湿热，治疗中给予青霉素静点，目的是

- A 防止心脏病变
- B 控制皮肤和关节症状
- C 制止风湿的活动
- D 清除链球菌感染病灶
- E 防止感染加重

正确答案：D 您选择的答案：

第86题 患儿5岁，半年来不规则发热，游走性大关节疼痛，伴局部红肿，查体，可见四肢屈侧有环形红斑，为了明确诊断医生做了一些实验室检查，请找出对诊断没有意义的指标

- A 抗“O”
- B 血沉
- C 血常规
- D C反应蛋白
- E 谷草转氨酶

正确答案：E 您选择的答案：

第87题 患儿，18个月。自8个月起多次患肺炎，中耳炎和脓疱病，为寻查原因家长带其到医院就诊，查体发现该患儿扁桃体缺如，血常规正常，可能诊断是什么

- A 选择性IgA缺陷症
- B 胸腺发育不全症
- C X连锁无丙种球蛋白血症
- D 选择性IgM缺陷病
- E 联合免疫缺陷病

正确答案：C 您选择的答案：

第88题 患儿女，5岁。近半年反复患咽扁桃体炎，现发热二周，每日热退时，精神状态良好，但面色渐苍白，肘膝关节不固定痛，查体，发现心音低钝，心尖区可听到吹风样收缩期杂音。提示该患儿可能患有

- A 风湿性心肌炎
- B 二尖瓣狭窄
- C 伴有先天性心脏病
- D 发热所致
- E 无临床意义

正确答案：A 您选择的答案：

第89题 患儿男，10岁。发热20余天，伴游走性关节疼痛，查体抗“O” 500U，临床诊断为风湿性关节炎，引起此病的病原是什么

- A 肺炎双球菌
- B 腺病毒
- C A族β溶血性链球菌
- D 葡萄球菌
- E 肺炎支原体

正确答案：C 您选择的答案：

第90题 患儿，8岁。因发热，关节肿痛而入院，经检查确定为风湿性关节炎，查体时未发现心脏异常，医生嘱其服用阿司匹林，其总疗程一般为

- A 2~4周
- B 3~6周
- C 4~8周
- D 8~12周
- E 10~12周

正确答案：B 您选择的答案：

第91题 患儿，10个月。因患风疹住院治疗，追问病史，得知患儿曾两次患病毒感染性疾病，新生儿曾频繁抽搐，补钙后缓解，查体发现，两眼距增宽，耳部低位有切迹，可能诊断是什么

- A 严重联合免疫缺陷病
- B 先天性胸腺发育不全
- C X连锁无丙种球蛋白血症
- D 选择性IgM缺陷症
- E 原发性非特异性免疫缺陷

正确答案：B 您选择的答案：

第92题 患儿，20天。出生后多次出现抽搐，并两次患肺炎。查体，发现有先心病，胸片未见胸腺影，疑有细胞免疫缺陷，需做有关的实验室检查，下列哪项对诊断没有帮助

- A 结核菌素试验阴性
- B 植物血凝素试验阴性
- C 末梢血淋巴细胞 $<1.2 \times 10^9/L$
- D T淋巴细胞转化率 $<60\%$
- E 同族血型凝集素测定减低

正确答案：E 您选择的答案：

第93题 患儿3岁，因发热，四肢关节游走性肿痛而入院。查体发现，心率快，176次/分，心音低钝，颈静脉怒张，肝大。立即进行治疗，请找出下列措施中，不正确的一项

- A 吸氧
- B 洋地黄制剂
- C 利尿剂
- D 维持电解质平衡
- E 阿司匹林

正确答案：E 您选择的答案：

第94题 患儿4岁，反复患呼吸道和胃肠道疾病，要求查找原因，医生疑其为原发性免疫缺陷病，拟行进一步检查，下列检查项目，哪项临床意义解释错误

- A T淋巴细胞减少，提示细胞免疫缺陷
- B 皮肤迟发型超敏反应阴性，提示体液免疫缺陷
- C 白喉毒素试验阴性，提示体液免疫缺陷
- D 对植物血凝素的增殖反应缺如或降低提示细胞免疫缺陷病
- E 扁桃体发育不良或缺如，提示体液免疫缺陷

正确答案：B 您选择的答案：

第95题 12岁女孩，因反复患呼吸道感染，故注射丙种球蛋白，注射后出现严重过敏反应，追问病史，得知其患过过敏性鼻炎及类风湿关节炎，其血清IgG 3g/L，IgA 0.04g/L，IgM 200mg/L，其可能诊断为

- A 先天性胸腺发育不全
- B X连锁无丙种球蛋白血症
- C 联合免疫缺陷病
- D 选择性IgM缺陷症
- E 选择性IgA缺陷症

正确答案：E 您选择的答案：

第96题 患儿男，2岁。因上感和肺炎住院3次，近一周腹泻，时而呕吐，查体：发育营养差，皮肤有湿疹，心肺正常，血小板计数 $70 \times 10^9/L$ ，为确诊应进一步检查

- A 血、便培养
- B 骨髓穿刺涂片
- C 血常规
- D 血清免疫球蛋白测定
- E 便常规

正确答案：D 您选择的答案：

第97题 患儿4岁，近一个月来发热，面色渐苍白，多汗，易疲倦，近几日四肢大关节游走性疼痛，为确定是否为风湿性关节炎，医生做了一些检查，下列哪一项对风湿性的可能有提示作用

- A C反应蛋白
- B 抗"O"
- C 血沉
- D 心电图
- E 血常规

正确答案：B 您选择的答案：

第98题 患儿5岁，2个月前确诊为风湿热，近日又开始不规则发烧，为了确定是否为风湿活动，医生做了下列一些检查，请找出与风湿活动不相关的指标

- A 血沉增快
- B C反应蛋白增高
- C 抗"O" > 500U
- D 血常规白细胞数增高，血红蛋白降低
- E 心电图P-R间期延长

正确答案：C 您选择的答案：

第99题 患儿男，1岁。自7个月开始反复患感染性疾病，细菌性肺炎两次，皮肤脓疱病一次，医生疑其为某种免疫缺陷病，做了有关的实验室检查，有一项与此病无关

- A 血清免疫球蛋白测定
- B 白喉毒素试验
- C 结核菌素试验
- D 同族血型凝集素测定
- E 淋巴结活检，查找浆细胞

正确答案：C 您选择的答案：

三、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第100-102题

患儿，5周岁。两周前曾患上感，目前不规则发热，易疲倦，脸色略苍白。查体发现，心率增快，心尖部第一心音减弱，并可闻及早搏，心电图检查：P-R间期延长，ST段下移，实验室检查：C反应蛋白增高

1. 该患儿的临床诊断最可能是什么

- A 病毒性心肌炎
- B 风湿性心肌炎
- C 风湿性心包炎
- D 结核性心包炎
- E 类风湿性心包炎

2. 下列哪项检查可以帮助确诊

- A 抗透明质酸酶
- B 谷草转氨酶
- C 血沉
- D 心脏X线检查
- E 肌酸磷酸激酶

3. 该患儿首选药物是什么

- A 水杨酸制剂
- B 洋地黄类药物
- C 地塞米松制剂
- D 镇静剂
- E 抗生素

正确答案：BAC 您选择的答案：

第103-105题

6岁女孩，近2月来出现发热及关节肿痛，患儿先出现左膝关节痛，几天后又出现双肘、腕关节红肿、疼痛，到当地医院服用抗生素后疗效不佳。近1月患儿自诉心慌、偶有胸闷。体查：体温38.0℃，心率135/min，第一心音减弱，心尖区可闻及吹风样收缩期杂音，偶可闻及早搏。左膝、双肘腕关节红肿、有触痛，实验室检查：外周血白细胞 $12 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞0.8，血沉40mm/h，血ASO600U；心电图示I°房室传导阻滞，ST段下移，T波平坦。

1. 该患儿可能的诊断是

- A. 化脓性关节炎
- B. 结核性关节炎
- C. 儿童类风湿性关节炎
- D. 风湿性心肌炎
- E. 风湿性全心炎

2. 该患儿需卧床休息

- A. 2周
- B. 急性症状完全消失
- C. 4周
- D. 5~6周
- E. 血沉正常后即可

3. 对该患儿的治疗重要的药物是

- A. 抗心律失常药
- B. 阿司匹林
- C. 洋地黄制剂
- D. 泼尼松
- E. 利尿剂

正确答案：DCD 您选择的答案：

第106-108题

患儿男，2个月。自出生后反复患病毒性肺炎，在新生儿期曾多次抽搐，目前又因鹅口疮来院诊疗。查体：眼距宽，人中短，两耳位置低，心前区3~4肋间可听到粗糙的全收缩期杂音

1. 该患儿诊断最大可能是

- A 无丙种球蛋白症
- B 选择性IgA缺陷病
- C 胸腺发育不全
- D SCID(严重联合免疫缺陷病)
- E Wiskott-Aldrich综合征

2. 在下列检查中哪一项不会在此患儿出现

- A 末梢血淋巴细胞 $<1.2 \times 10^9/L$
- B 植物血凝素试验阴性
- C 胸部X线检查胸腺发育不良
- D 结核菌素试验阴性
- E 血清抗体水平很低或缺如

3. 下列哪项治疗手段是错误的

- A 可给予抗病毒和抗真菌药物
- B 可输入新鲜血
- C 新生儿期可用钙剂与维生素D
- D 新生儿期还可使用甲状旁腺激素
- E 胎儿胸腺移植

正确答案：CEB 您选择的答案：

第109-111题

女性患儿，2岁，一年来喘息反复发作2次，发作前无明显诱因及先兆症状，突然发生喘憋，发作时肺部闻及广泛哮鸣音，心脏听诊无异常。追问病史其母亲患有哮喘病。

1. 最可能的诊断是

- A 婴幼儿哮喘
- B 儿童哮喘
- C 喘息性毛细支气管炎
- D 支气管肺炎
- E 支气管炎

2. 以下哪项检查最有利于确诊

- A 外周血嗜酸性粒细胞计数
- B 胸部X线拍片
- C 肺功能测定
- D 皮肤过敏原试验
- E 肾上腺素试验

3. 发病初期最有效的治疗应为下列哪项

- A 单用沙丁胺醇气雾剂
- B 单用倍氯米松气雾剂
- C 沙丁胺醇+倍氯米松雾化吸入
- D 有效抗生素清除感染病灶，并长期预防感染
- E 长期糖皮质激素静脉点滴

正确答案：AEC 您选择的答案：

第112-114题

女，11岁，小学五年级学生，以往成绩优良。近1个月来上课做小动作，走路不稳，握笔困难，不能完成作业。3个月前曾患猩红热。体检：右侧面部肌肉不自主抽动，肢体无意识地舞动，肌张力稍低，Barbinski征阴性。心率110次/分，心尖区2/6级收缩期杂音。

1. 最可能的诊断是

- A 儿童多动症
- B 风湿性舞蹈病
- C 儿童抽动症
- D 病毒性脑炎
- E 小脑肿瘤

2. 入院后进行如下检查，哪项结果不属于本病的表现

- A 血沉30mm/小时
- B 抗"O"500单位
- C C反应蛋白阴性
- D EEG有癫痫样放电波
- E EKG示P-R间期延长

3. 下列治疗哪项是错误的

- A 绝对卧床休息
- B 细心护理
- C 口服苯巴比妥
- D 口服泼尼松
- E 口服苯妥英钠

正确答案：BDE 您选择的答案：

第115-117题

患儿女，6岁。晚饭后突然出现喘憋，大汗，烦躁不安，不能平卧，该患儿在幼年时曾两次患毛细支气管炎，查体，痛苦面容，呼气性呼吸困难，两肺闻及哮鸣音，体温正常

1. 该患儿的临床诊断最大可能是

- A 肺结核
- B 大叶性肺炎
- C 气管异物
- D 支气管哮喘
- E 急性支气管炎

2. 下列检查哪一项对诊断有帮助

A 胸部正侧位片

B 气管镜检查

C 肺功能检查

D 胸部CT检查

E 外周血嗜酸粒细胞计数

3. 下列治疗措施, 哪一项应慎用或禁用

A 给予抗生素静点

B 肾上腺皮质激素

C 舒喘灵雾化吸入

D 10%葡萄糖盐静点

E 鲁米那镇静

正确答案: DEE 您选择的答案:

四、A4型题: 以下提供若干个案例, 每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息, 在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第118-121题

女, 6岁, 持续发热2周, 伴双下肢关节酸痛、乏力来院。2周前患扁桃体炎, 曾用青霉素治疗3天。体温38.00℃, 脉搏92次/分, 面色苍白, 心尖区1/6级收缩期杂音, 左踝关节稍红肿, 轻压痛, 活动障碍, 胸腹部散在红色斑丘疹, 压之褪色, 1cm×2cm大小, 中央色淡, 高热时明显。

1. 为明确诊断给予下列检查, 但应除外哪项

A. 血常规

B. ESR、ASO

C. CRP、黏蛋白

D. 心电图

E. 超声心动图

2. 若该患儿化验结果示: 红细胞 $3.0 \times 10^{12}/L$, 白细胞 $12 \times 10^9/L$, 中性0.8, ESR60mm/小时, ASO625U, CRP(+), 黏蛋白120mg/L, 心电图正常。其诊断考虑为

A. 风湿热

B. 类风湿病

C. 链球菌感染后状态

D. 化脓性关节炎

E. 结核性关节炎

3. 入院后, 按上述诊断治疗, 下列哪项不妥

A. 急性期卧床休息

B. 少量多餐富于营养

C. 肌注青霉素

D. 口服泼尼松

E. 口服阿司匹林

4. 患儿即将出院, 有关出院医嘱, 下列哪项不正确

A. 继续休息, 定期门诊随访

B. 阿司匹林疗程需4~6周

C. 过早停药易出现反跳

D. 长效青霉素预防, 持续5年

E. 可发展成慢性心瓣膜病

正确答案: EADE 您选择的答案:

五、B1型题: 以下提供若干组考题, 每组考题共用在前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第122-125题

A 可治疗严重联合免疫缺陷病

B 可治疗细胞免疫缺陷

C 可治疗腺苷脱氨酶(ADA)缺陷所致的严重联合免疫缺陷病

D 可治疗选择性IgC亚类缺陷, Ig水平近于正常的抗体缺陷

E 可治疗选择性IgA缺陷

1. 丙种球蛋白制剂

2. 骨髓移植

3. 胎儿胸腺移植

4. 基因治疗

正确答案: DABC 您选择的答案:

第126-128题

A. 持续吸入维持量皮质激素6个月~2年

B. 早期, 较大剂量静滴琥珀酸氢化可的松

C. 吸入β-肾上腺素能受体激动剂+肾上腺皮质激素类

D. 口服肾上腺皮质激素

E. 口服β-肾上腺素能受体激动剂

1. 支气管哮喘发作时宜选用

2. 哮喘持续状态时宜选用

3. 哮喘发作间歇期宜选用

正确答案: CBA 您选择的答案:

第129-132题

A 瓣膜病

B 皮下结节

C 抗链"O" > 500U
D 血沉增快, CBP阳性
E 心电图可见Sr段下移及T波平坦或倒置
1. 属于急性风湿热的主要表现可有
2. 属于急性风湿热风湿活动的证据
3. 属于急性风湿热的次要表现
4. 属于链球菌感染证据
正确答案: BDAC 您选择的答案:

第133-134题
A. 心脏炎
B. 心瓣膜病
C. 关节痛
D. 咽拭子培养阳性
E. 心电图ST-T改变
1. 为风湿热主要表现的是
2. 为风湿热次要表现的是
正确答案: AC 您选择的答案:

习题集 儿科学 泌尿系统疾病

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 肾病综合征出现水肿的特点是

- A. 下行性，凹陷性
- B. 下行性，非凹陷性
- C. 上行性，凹陷性
- D. 上行性，非凹陷性
- E. 向心性，凹陷性

正确答案：A 您选择的答案：

第2题 下列是肾炎性肾病的临床特点，除了

- A. 血尿，红细胞 > 10 个/HP (2周内3次离心尿)
- B. 持续性氮质血症
- C. 持续性高血压
- D. 持续性氮质血症
- E. 对激素无效应

正确答案：E 您选择的答案：

第3题 引起急性肾小球肾炎的链球菌主要是

- A. A组 α 溶血性链球菌
- B. A组 β 溶血性链球菌
- C. B组 α 溶血性链球菌
- D. B组 β 溶血性链球菌
- E. 草绿色链球菌

正确答案：B 您选择的答案：

第4题 肾病综合征患儿，应用免疫抑制剂时，白细胞下降需停药的指征是

- A. $< 1.5 \times 10^9 / L$
- B. $< 4 \times 10^9 / L$
- C. $< 3 \times 10^9 / L$
- D. $< 5 \times 10^9 / L$
- E. $< 2 \times 10^9 / L$

正确答案：C 您选择的答案：

第5题 急性肾炎严重病例发生的时间多在起病后

- A. 1~2天内
- B. 2周内
- C. 3周左右
- D. 2~3周
- E. 4周左右

正确答案：B 您选择的答案：

第6题 下列关于小儿尿液特点的描述，错误的是

- A. 寒冷季节尿排出后呈白色混浊，属异常现象
- B. 小儿尿液接近中性或弱酸性，pH在5~7左右
- C. 尿渗透压在1岁后接近成人水平
- D. 尿蛋白主要来自血浆蛋白，其中2/3为白蛋白
- E. 12小时Addis计数红细胞 < 50 万，白细胞 < 100 万，管型 < 5000 个，为正常现象

正确答案：A 您选择的答案：

第7题 肾炎性肾病的实验室检查结果正确的是

- A. 多系选择性蛋白尿
- B. 离心尿红细胞 < 10 个/高倍视野
- C. 一般多不伴有氮质血症
- D. 血补体下降
- E. 血清胆固醇明显增加

正确答案：D 您选择的答案：

第8题 肾病综合征的低蛋白血症的临界值是

- A. 血浆白蛋白 $< 40g/L$
- B. 血浆白蛋白 $< 30g/L$
- C. 血浆白蛋白 $< 20g/L$
- D. 血浆白蛋白 $< 15g/L$
- E. 血浆白蛋白 $< 10g/L$

正确答案：B 您选择的答案：

第9题 关于小儿尿量问题，以下哪项错误

- A. 婴儿每日尿量100~200ml
- B. 幼儿每日尿量500~600ml
- C. 学龄前期每日尿量600~800ml
- D. 学龄期每日尿量800~1400ml
- E. 正常每日尿量(ml) = (年龄-1) $\times 100 + 400$

正确答案：A 您选择的答案：

第10题 关于新生儿肾小球滤过率低下的原因，以下哪项是错误的

- A. 皮质表层小球发育不成熟
- B. 入球与出球小动脉阻力高
- C. 肾小球毛细血管通透性低
- D. 滤过面积相对较成人大
- E. 心搏出量低, 肾血流量少

正确答案: D 您选择的答案:

第11题 下列有关小儿肾功能的描述, 不正确的是

- A. 生后头10天的新生儿, 钾排泄能力较差
- B. 尿液浓缩功能较差, 入量不足时易发生脱水
- C. 尿液稀释功能差, 易出现水肿
- D. 易发生代谢性酸中毒
- E. 新生儿排钠能力较差, 容易发生钠潴留和水肿

正确答案: C 您选择的答案:

第12题 下列哪项指标支持肾炎性肾病综合征

- A. 大量蛋白尿
- B. 高脂血症
- C. 血清补体C3降低
- D. 低蛋白血症
- E. 水肿

正确答案: C 您选择的答案:

第13题 急性肾小球肾炎的常见致病菌是

- A. 溶血性链球菌
- B. 葡萄球菌
- C. 肺炎链球菌
- D. 柯萨奇病毒B
- E. 草绿色链球菌

正确答案: A 您选择的答案:

第14题 肾病综合征的并发症不包括

- A. 原发性腹膜炎
- B. 高血容量休克
- C. 低钙血症
- D. 肾静脉栓塞
- E. 肾小管功能障碍

正确答案: B 您选择的答案:

第15题 肾病综合征的特征中最主要的是

- A. 大量蛋白尿
- B. 低蛋白血症
- C. 高胆固醇血症
- D. 不同程度水肿
- E. 血沉明显增快

正确答案: A 您选择的答案:

第16题 关于小儿肾浓缩功能差的原因, 以下哪项错误

- A. 肾小球滤过率低
- B. 肾小管细胞发育未成熟
- C. 髓袢较长
- D. 尿素生成少
- E. 肾小管对血管加压素反应差

正确答案: C 您选择的答案:

第17题 小儿肾功能达成人水平的年龄为

- A. 0.5~1岁
- B. 1~1.5岁
- C. 1.5~2岁
- D. 2~2.5岁
- E. 2.5~3岁

正确答案: B 您选择的答案:

第18题 关于急性肾炎下列哪项不正确

- A. 水肿为最早出现的症状, 常呈上行性
- B. 起病时几乎都有血尿
- C. 起病后头数日有高血压
- D. 起病2周内可出现循环充血
- E. 病程早期突然抽搐应考虑高血压脑病

正确答案: A 您选择的答案:

第19题 急性链球菌感染后肾炎的典型病理改变是

- A. 毛细血管外肾炎
- B. 膜性肾病
- C. 系膜增生性肾炎
- D. 毛细血管内增生性肾炎
- E. 致密物沉积性肾炎

正确答案: D 您选择的答案:

第20题 肾病综合征哪种病理类型对激素治疗最敏感

- A. 微小病变
- B. 膜性肾病
- C. 膜增生性肾炎
- D. 系膜增殖性肾炎
- E. 局灶节段硬化性肾炎

正确答案：A 您选择的答案：

第21题 关于肾病综合征的主要临床特征，以下哪项最正确

- A. 大量蛋白尿，高血压，血尿，低蛋白血症
- B. 高度水肿，高血压，血尿，高脂血症
- C. 大量蛋白尿，低蛋白血症，高脂血症，水肿
- D. 高度水肿，少尿，严重贫血，高脂血症
- E. 高血压，血尿，低补体血症，少尿

正确答案：C 您选择的答案：

第22题 下列哪项不符合单纯性肾病

- A. 大量蛋白尿
- B. 明显水肿
- C. 胆固醇明显增高
- D. 多为非选择性蛋白尿
- E. 暂时性氮质血症

正确答案：D 您选择的答案：

第23题 单纯性肾病的诊断依据不包括

- A. 大量蛋白尿
- B. 低蛋白血症
- C. 持续性氮质血症
- D. 高胆固醇血症
- E. 不同程度水肿

正确答案：C 您选择的答案：

第24题 肾病综合征出现低钙惊厥，最常见的原因是：

- A. 尿中常有白蛋白结合的钙排出
- B. 肠道钙吸收不良
- C. 进食少
- D. 使用利尿剂
- E. 钙质沉着于骨

正确答案：A 您选择的答案：

第25题 肾病综合征出现低蛋白血症的原因不包括

- A. 血浆蛋白从尿中大量丢失
- B. 血浆蛋白从肾小球滤出后被肾小管吸收分解
- C. 血浆蛋白丢失速度超过肝合成蛋白的速度
- D. 肾小球毛细血管通透性增高
- E. 肾小球滤过率降低

正确答案：E 您选择的答案：

第26题 关于小儿尿液浓缩稀释功能，以下哪项正确

- A. 新生儿尿浓缩功能接近成人
- B. 婴幼儿尿浓缩功能接近成人
- C. 新生儿尿稀释功能接近成人
- D. 婴幼儿尿稀释功能低于成人
- E. 新生儿尿浓缩稀释功能均接近成人

正确答案：C 您选择的答案：

第27题 关于小儿排尿问题，以下哪项错误

- A. 新生儿在生后24小时内开始排尿
- B. 生后1周内每日排尿15次
- C. 1周后每日排尿20~25次
- D. 1岁时每日排尿15~16次
- E. 3岁后减至每日排尿6~7次

正确答案：B 您选择的答案：

第28题 链球菌感染后肾炎，补体C3恢复时间为

- A. 起病2周以内
- B. 起病4周以内
- C. 起病8周以内
- D. 起病3个月以内
- E. 起病6个月以内

正确答案：C 您选择的答案：

第29题 急性肾小球肾炎治疗初期使用抗生素的目的是

- A. 治疗疾病本身
- B. 预防复发
- C. 预防并发症
- D. 彻底清除体内残存细菌
- E. 治疗并发症

正确答案：D 您选择的答案：

第30题 急性肾炎的病理变化特点是

A 局灶~节段性病变
B 毛细血管外增生性肾炎
C 硬化性肾炎
D 致密沉积物肾炎
E 弥漫性渗出性增生性肾小球肾炎
正确答案：E 您选择的答案：

第31题 鉴别血尿与血红蛋白尿的主要手段是

A. 尿潜血检查
B. 尿三杯试验
C. 尿胆原
D. 血尿颜色
E. 尿沉渣检查

正确答案：E 您选择的答案：

第32题 急性肾小球肾炎在病程早期突然发生惊厥，应首先考虑

A 高热惊厥
B 低钙惊厥
C 低钠惊厥
D 低血糖
E 高血压脑病

正确答案：E 您选择的答案：

第33题 肾病综合征首选药物治疗是

A 青霉素
B 强的松
C 环磷酰胺
D 潘生丁
E 消炎痛

正确答案：B 您选择的答案：

第34题 关于肾炎性肾病综合征的临床特点，以下哪项不符合

A. 尿红细胞多次检查超过10个/高倍
B. 反复出现高血压
C. 持续性氮质血症
D. 血清补体C3反复降低
E. 糖皮质激素治疗敏感

正确答案：E 您选择的答案：

第35题 关于急性肾炎实验室检查不正确的是

A 尿沉渣镜检均有红细胞增多
B 早期尿白细胞可增高，并非感染
C 常有轻度贫血
D ASO滴度与肾炎严重程度呈正相关
E 总补体及C3补体于起病2周内明显下降

正确答案：D 您选择的答案：

第36题 急性肾炎出现水肿的特点是

A. 下行性，凹陷性
B. 下行性，非凹陷性
C. 上行性，凹陷性
D. 上行性，非凹陷性
E. 向心性，非凹陷性

正确答案：B 您选择的答案：

第37题 小儿肾病综合征常见的并发症中，不包括以下哪项

A. 感染
B. 低血容量休克
C. 电解质紊乱
D. 高血压脑病
E. 血管栓塞

正确答案：D 您选择的答案：

第38题 小儿可自动控制排尿的年龄约为

A 0.5岁
B 1岁
C 1.5岁
D 2岁
E 2.5岁

正确答案：C 您选择的答案：

第39题 肾病综合征用激素正规治疗后频繁复发者应选用

A 中药
B 免疫抑制剂
C 肾上腺皮质激素+中药
D 肾上腺皮质激素+免疫抑制剂
E 中药+免疫抑制剂

正确答案：D 您选择的答案：

第40题 急性肾炎，正确的治疗方案是

- A. 卧床休息8周以上
 - B. 无盐饮食至尿蛋白消失
 - C. 低蛋白饮食4周以上
 - D. 青霉素治疗7~10天
 - E. 血压正常后,可恢复上学及正常活动
- 正确答案:D 您选择的答案:

第41题 鉴别单纯性肾病和慢性肾炎肾病型主要观察什么

- A. 水肿程度
- B. 尿蛋白量
- C. 低蛋白血症程度
- D. 血胆固醇量
- E. 肾功能情况

正确答案:E 您选择的答案:

第42题 肾病综合征患儿的首选用药是

- A. 氢氯噻嗪或安体舒通
- B. 青霉素
- C. 白蛋白
- D. 泼尼松
- E. 环磷酰胺

正确答案:D 您选择的答案:

第43题 治疗急性肾炎错误的是

- A. 卧床休息水肿消退,肉眼血尿消失
- B. 血沉接近正常可恢复上学
- C. 尿Addis计数正常才能正常活动
- D. 水肿及高血压的患儿应限制钠盐摄入
- E. 初期给予青霉素至少2周

正确答案:E 您选择的答案:

第44题 急性肾小球肾炎的主要临床表现是

- A. 少尿,水肿,蛋白尿,低蛋白血症
- B. 血尿,蛋白尿,水肿,低蛋白血症
- C. 水肿,少尿,血尿,高血压
- D. 血尿,少尿,水肿,蛋白尿
- E. 水肿,少尿,蛋白尿,高血压

正确答案:C 您选择的答案:

第45题 治疗单纯性肾病的首选药物是

- A. 甲基泼尼松龙
- B. 环孢菌素A
- C. 泼尼松
- D. 环磷酰胺
- E. 霉酚酸酯

正确答案:C 您选择的答案:

第46题 关于小儿尿液的性质,以下哪项正确

- A. 正常小儿尿pH为7.5~8.0
- B. 小儿尿渗透压1岁后接近成人水平
- C. 正常小儿尿蛋白定性试验弱阳性
- D. 尿蛋白主要来自血浆球蛋白
- E. 寒冷季节小儿尿排出后变为白色浑浊为异常

正确答案:B 您选择的答案:

第47题 肾病综合征患儿预防接种可在

- A. 病程中进行
- B. 水肿消退后进行
- C. 应推迟到肾病完全缓解且停用糖皮质激素3个月后进行
- D. 蛋白尿消失后进行
- E. 血沉正常后进行

正确答案:C 您选择的答案:

第48题 急性肾炎小儿恢复上学的指标是

- A. 血压正常
- B. C3补体正常
- C. 血沉正常
- D. 血尿消失
- E. Addis计数正常

正确答案:C 您选择的答案:

第49题 新生女婴尿道长仅

- A. 0.5cm
- B. 1cm
- C. 1.5cm
- D. 2cm
- E. 2.5cm

正确答案:B 您选择的答案:

第50题 单纯性肾病患儿血浆蛋白降低一般以哪项为主

- A. 清蛋白和球蛋白
- B. α_2 球蛋白和 β 球蛋白
- C. γ 球蛋白和 β 球蛋白
- D. 清蛋白和 γ 球蛋白
- E. 清蛋白和 α_2 球蛋白

正确答案：D 您选择的答案：

第51题 急性肾小球肾炎患者在病程早期突然出现惊厥，可能性最大的是

- A. 高热惊厥
- B. 低钙惊厥
- C. 低钠血症
- D. 高血压脑病
- E. 中毒性脑病

正确答案：D 您选择的答案：

第52题 小儿肾脏功能达到成人水平的年龄是

- A. 出生时
- B. 生后6月
- C. 生后1~2岁
- D. 3岁
- E. 7岁

正确答案：C 您选择的答案：

第53题 肾炎性肾病不同于单纯性肾病的是

- A. 水肿明显
- B. 大量蛋白尿
- C. 血尿、高血压
- D. 胆固醇增高
- E. 浆蛋白降低

正确答案：C 您选择的答案：

第54题 急性肾小球肾炎首先出现水肿的部位常为

- A. 面部
- B. 胫前
- C. 双足
- D. 眼睑
- E. 腹部

正确答案：D 您选择的答案：

第55题 急性肾炎，严重循环充血的治疗措施，以下哪项不正确

- A. 严格限制水、钠摄入量
- B. 应用强利尿剂
- C. 肺水肿时可用硝普钠扩血管
- D. 立即应用饱和量快速强心剂
- E. 血液透析排出过多体液

正确答案：D 您选择的答案：

第56题 肾病综合征合并感染时最多见的是

- A. 上呼吸道感染
- B. 腹膜炎
- C. 尿路感染
- D. 皮肤丹毒
- E. 胃肠炎

正确答案：A 您选择的答案：

第57题 肾炎性肾病与单纯性肾病的主要鉴别点是

- A. 大量蛋白尿
- B. 血尿高血压
- C. 高胆固醇血症
- D. 低蛋白血症
- E. 高度浮肿

正确答案：B 您选择的答案：

第58题 关于新生儿肾小管吸收和分泌功能，以下哪项是错误的

- A. 新生儿的肾糖阈较低
- B. 新生儿的肾排钠能力较强
- C. 未成熟儿肾保钠能力差
- D. 生后10天内肾排钾能力较差
- E. 新生儿远端肾小管吸收钠强于近端小管

正确答案：B 您选择的答案：

第59题 小儿肾脏浓缩功能差的原因不包括

- A. 肾小球滤过率低
- B. 肾小管未成熟
- C. 间质难以建立浓度梯度
- D. 肾小管对血管加压素反应差
- E. 髓袢相对过长

正确答案：E 您选择的答案：

第60题 激素治疗肾病综合征，其中长疗程的时间为

- A. 8~12周
- B. 4~6个月
- C. 6~9个月
- D. 9~12个月
- E. 1~2年

正确答案：C 您选择的答案：

第61题 小儿肾功能何时达成人水平

- A. 1~1.5岁
- B. 2~3岁
- C. 4~5岁
- D. 6~7岁
- E. 8~9岁

正确答案：A 您选择的答案：

第62题 肾病综合征患儿最常见的并发症是

- A. 急性肾衰
- B. 血管栓塞
- C. 电解质紊乱
- D. 低血容量休克
- E. 感染

正确答案：E 您选择的答案：

第63题 急性肾小球肾炎出现严重循环充血的机制是

- A. 水、钠潴留
- B. 心力衰竭
- C. 少尿
- D. 高血压
- E. 氮质血症

正确答案：A 您选择的答案：

第64题 目前对肾病患儿不主张反复多次输入人血清白蛋白的主要原因是

- A. 价格昂贵
- B. 可用血浆代替
- C. 可增加血液黏稠度
- D. 可能感染艾滋病病毒
- E. 可能会延迟肾病缓解和增加复发机会

正确答案：E 您选择的答案：

第65题 以下哪项不符合急性肾炎重症病例的临床表现

- A. 心脏扩大，心率增快，奔马律
- B. 呼吸增快，端坐呼吸，肺底细小湿啰音
- C. 剧烈头痛，恶心呕吐，惊厥或昏迷
- D. 尿少，高钾血症，低钠血症
- E. 肉眼血尿，可呈洗肉水样

正确答案：E 您选择的答案：

第66题 急性肾小球肾炎起病常在前驱感染后

- A. 1周内
- B. 1~3周
- C. 3~4周
- D. 2~4周
- E. 4~5周

正确答案：B 您选择的答案：

第67题 引起急性肾小球，肾炎常见致病菌为

- A. A组β溶血性链球菌
- B. 肺炎链球菌
- C. 葡萄球菌
- D. 草绿色链球菌
- E. B组β溶血性链球菌

正确答案：A 您选择的答案：

第68题 有关急性链球菌感染后肾炎的诊断，不正确的是

- A. 尿液检查可见尿蛋白
- B. 尿沉渣镜检可见红细胞和白细胞
- C. 血尿素氮可升高
- D. 血ASO可升高
- E. 血清补体一定下降

正确答案：E 您选择的答案：

第69题 急性肾小球肾炎的主要临床表现是

- A. 浮肿、血尿、高血压
- B. 贫血、浮肿、高血压
- C. 蛋白尿、血尿、高血压
- D. 少尿、氮质血症、浮肿
- E. 管型尿、浮肿、高血压

正确答案：A 您选择的答案：

第70题 肾病综合征患儿可进行预防接种的时间是

- A. 病情部分缓解后进行
- B. 病情完全缓解，停用糖皮质激素后立即进行
- C. 病情完全缓解，停用糖皮质激素3个月后进行
- D. 完全治愈后进行
- E. 病情完全缓解停用糖皮质激素1年后进行

正确答案：C 您选择的答案：

第71题 单纯性肾病综合征多见于

- A. 婴儿
- B. 1~3岁
- C. 2~7岁
- D. 7~10岁
- E. 10~14岁

正确答案：C 您选择的答案：

第72题 急性肾炎患儿恢复体力活动的时间是

- A. 水肿消退
- B. 肉眼血尿消失
- C. 血压恢复正常
- D. 血沉正常
- E. 尿沉渣细胞绝对计数正常

正确答案：E 您选择的答案：

第73题 急性肾炎限盐饮食每日供盐

- A. 0.5~1g
- B. 1~2g
- C. 2~3g
- D. 3~4g
- E. 4~5g

正确答案：B 您选择的答案：

第74题 治疗原发性肾病综合征错误的是

- A. 有高血压和水肿时应低盐饮食
- B. 给予高蛋白饮食，蛋白质摄入量应每日大于4g/kg
- C. 应用激素期间给予钙及维生素D
- D. 预防接种应在使用激素半年~1年后进行
- E. 严重水肿者给予利尿剂

正确答案：B 您选择的答案：

第75题 以下是肾病综合征常见的并发症，但除外

- A. 感染
- B. 电解质紊乱
- C. 血栓形成
- D. 肾上腺危象
- E. 营养不良

正确答案：E 您选择的答案：

第76题 急性肾炎患儿，经过治疗，可以复原的指标是

- A. 水肿消退
- B. 肉眼血尿消失
- C. 血压正常
- D. 尿常规正常
- E. 尿常规好转，仅能检出少量蛋白及红细胞

正确答案：E 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第77题 6岁女孩，反复颜面浮肿、腹胀伴尿少20天，血压120/80mmHg，腹部移动性浊音阳性。尿蛋白(++++)，镜检红细胞10~12个/HP，白细胞0~2个/HP，血红蛋白25g/L，胆固醇7.6mmol/L，血ASO200U，血尿素氮10.3mmol/L，补体正常。诊断考虑

- A. 急性链球菌感染后肾炎
- B. 单纯性肾病
- C. 肾炎性肾病
- D. 慢性肾炎急性发作
- E. 病毒性肾炎

正确答案：C 您选择的答案：

第78题 患儿，10岁。反复水肿，少尿一年，体检：四肢明显水肿，呈凹陷性，血压：17/12kPa(130/90mmHg)，心肺正常，腹软，尿检：蛋白(+++)，红细胞15~20个/HP，血红蛋白23g/L，胆固醇9.2mmol/L，该患儿做肾病理活检可呈以下改变，但除了

- A. 微小病变型
- B. 系膜增生性
- C. 局灶、节段性肾小球硬化
- D. 膜性肾病
- E. 膜增生性肾炎

正确答案：A 您选择的答案：

第79题 患儿，5岁。水肿少尿10余日，既往健康，体检：神志清，血压13 / 9kPa(100 / 70mmHg)，颜面及四肢凹陷性水肿，尿检：蛋白(+++)，红细胞8 ~ 10个 / HP，血浆白蛋白25g / L，胆固醇9mmol / L，治疗应选

- A 强的松口服8 ~ 12周
- B 强的松口服9 ~ 12月
- C 强的松+环磷酰胺口服8 ~ 12周
- D 静脉注射速尿+青霉素
- E 静脉注射速尿+苯丁酸氮芥口服8周

正确答案：A 您选择的答案：

第80题 患儿，9岁。水肿、少尿3天，头痛、呕吐1日，因突然抽搐急来就诊，体检：意识不清，颜面明显水肿，四肢抽搐，血压22 / 16kPa(165 / 120mmHg)，给予紧急处理，错误的是

- A 吸氧
- B 肌注安定
- C 20%甘露醇滴注
- D 硝普钠静推
- E 二氮嗪快速静推

正确答案：D 您选择的答案：

第81题 患儿，12岁。水肿、少尿、血尿1个月余，病情加重1周，发病前10余日曾患“上感”，近1周尿极少，腹胀、乏力、恶心，体检：全身高度水肿，血压19 / 15kPa(140 / 110mmHg)，双肺有湿啰音，血尿素氮22 . 8mmol / L，尿常规：红细胞15 ~ 20个 / HP，蛋白(++)，颗粒管型1 ~ 2个 / HP，血清白蛋白21g / L，胆固醇6 . 9mmol / L，诊断为

- A 急性肾炎
- B 急进性肾炎
- C 单纯性肾病
- D 肾炎性肾病
- E 慢性肾炎

正确答案：B 您选择的答案：

第82题 3岁男孩，全身浮肿2周，尿蛋白(+ + +)，血白蛋白28g/L，胆固醇8 . 7mmol / L，诊断为单纯性肾病，下列治疗不正确的是

- A 反复输注白蛋白以纠正低蛋白血症
- B 给予氢氯噻嗪利尿
- C 采用少盐饮食
- D 给予泼尼松治疗
- E 如发生感染应及时使用抗生素

正确答案：A 您选择的答案：

第83题 患儿，5岁。水肿1周，加重2日，开始为眼睑，渐及全身，自昨日起尿量明显减少，一日150 ~ 200ml，尿检：蛋白(+)，红细胞20个 / HP，血压16 / 10kPa(120 / 75mmHg)，治疗应选

- A 口服双氢克尿噻
- B 静注50%葡萄糖
- C 静注20%甘露醇
- D 静注速尿
- E 肌注利血平

正确答案：D 您选择的答案：

第84题 8岁男孩，急性起病，诊断为急性肾小球肾炎合并严重循环充血，首选治疗是

- A 强利尿剂如呋塞米
- B 快速强心药如西地兰
- C 硝普钠
- D 甘露醇
- E 血液透析

正确答案：A 您选择的答案：

第85题 9岁肾病综合征患儿，激素治疗8周，2天前因进食水果后腹泻，5 ~ 6次 / 天，为水样便，1天前水肿加剧，嗜睡，四肢凉，血压86 / 54mmHg。此患儿目前的病症可能是

- A 肾静脉血栓
- B 中毒性脑病
- C 低钙血症
- D 肾上腺危象
- E 低钾血症

正确答案：D 您选择的答案：

第86题 9岁男孩，浮肿、尿少、肉眼血尿5天，诊断为急性肾炎。1天前浮肿加重，感头晕、心悸、气促，尿量减至每日200ml。体检：血压135/85mmHg，双肺可闻及细湿啰音，心率130次/分，心脏扩大，肝右肋下2cm。考虑合并了

- A 支气管肺炎
- B 心力衰竭
- C 高血压脑病
- D 严重循环充血
- E 急性肾功能不全

正确答案：D 您选择的答案：

第87题 患儿，6岁。4天前患上呼吸道感染，今日发现血尿，眼睑无水肿，血压13 / 8kPa(100 / 60mmHg)CH50，C3均正常，抗“O”200U，尿检：蛋白(+)，红细胞20 ~ 30个 / HP，最可能是

- A 急性肾炎
- B 单纯性肾病
- C 肾炎性肾病
- D 肾盂肾炎
- E 病毒性肾炎

正确答案：E 您选择的答案：

第88题 患儿，11岁。因急性肾炎住院治疗1个月，现水肿消退，血压正常，血沉9mm，尿蛋白(±)，尿红细胞2~4个/HP，出院后医嘱哪项是合适的

- A 卧床休息2周
- B 休学静养
- C 高蛋白低盐饮食
- D 可做户外活动不能上学
- E 可上学不能做剧烈活动

正确答案：E 您选择的答案：

第89题 10岁患儿，急性肾炎，近2天出现尿量明显减少，每日尿量在100ml以下，血尿素氮为20mmol/L，考虑合并有急性肾功能不全。实验室检查以下哪项不符

- A 血补体C3下降
- B 血沉增快
- C 高钾血症
- D 低钠血症
- E 代谢性碱中毒

正确答案：E 您选择的答案：

第90题 男，6岁。颜面浮肿5天，尿少，尿呈暗棕色或茶色，呕吐3次，头痛烦躁。血压114/90mmHg(15/12kPa)，外周血红细胞112g/L，尿常规示：蛋白质+，红细胞40~60个/高倍，白细胞0~3个/高倍，颗粒管型0~2个/高倍，尿素氮3.6mmol/L。应首先考虑的诊断是

- A 急性肾炎，氮质血症
- B 急性肾炎，高血压脑病
- C 急进性肾炎
- D 慢性肾炎急性发作
- E 原发性肾病综合征

正确答案：B 您选择的答案：

第91题 6岁男孩，患肾病综合征1年，服用泼尼松治疗3个月，近1个月剂量为每日顿服30mg，尿蛋白在+~++之间。2天前受凉后出现高热、腹泻，家长停用泼尼松改用口服抗生素治疗，半天前患儿病情突然加重，出现烦躁不安、脉搏细速、四肢冷、血压下降。应立即给予的急救处理是

- A 强有力的抗生素治疗
- B 强利尿剂
- C 西地兰
- D 口服泼尼松
- E 静脉滴注氢化可的松

正确答案：E 您选择的答案：

第92题 患儿，8岁。水肿，少尿，尿量浓茶色，伴头痛、眼花，呕吐，血压22.7/16kPa(170/120mmHg)，尿蛋白(+)，红细胞30个/HP，颗粒管型0~1个/HP，诊断可能为

- A 肾炎性肾病
- B 急性肾炎高血压脑病
- C 慢性肾炎
- D 急性肾炎循环充血
- E 急进性肾炎

正确答案：B 您选择的答案：

第93题 患儿，7岁。急性肾炎，血压19/13kPa(140/100mmHg)，水肿重，尿量明显减少，呼吸困难不能平卧，心率140次/分，心音低钝，肝肋下2cm，X线胸片：肺纹理增强，该患儿可能出现

- A 肺炎、心衰
- B 高血压脑病
- C 肾功能衰竭
- D 循环充血
- E 支气管炎

正确答案：D 您选择的答案：

第94题 8岁女孩，颜面、眼睑浮肿伴尿少10天，尿常规示蛋白(++)，红细胞(+)；血胆固醇3.1mmol/L；总蛋白65g/L；白蛋白35g/L；补体C₃下降；血ASo600U。该患儿最可能的诊断是

- A 急性链球菌感染后肾炎
- B 单纯性肾病
- C 肾炎性肾病
- D 慢性肾炎急性发作
- E 病毒性肾炎

正确答案：A 您选择的答案：

第95题 患儿，8岁。3周前曾患脓疱病，近3天浮肿、少尿，肉眼血尿，血压20/14kPa(150/105mmHg)，尿蛋白(+++)，有大量红细胞，管型1~2个/HP，抗“O”500U，补体C₃减少，最可能的诊断是

- A 单纯性肾病
- B 肾炎性肾病
- C 急性肾炎
- D 慢性肾炎
- E IgA肾病

正确答案：C 您选择的答案：

第96题 6岁患儿患肾病综合征，已治疗一年，长期忌盐，昨日发热，呕吐，腹泻，今日食欲下降，精神萎靡，嗜睡，血压下降，除病因治疗外，应立即给予

- A 补钙
- B 补镁

- C. 补钠
D. 补钾
E. 以上都不是

正确答案：C 您选择的答案：

第97题 患儿，5岁。既往曾患肾病综合征，近5日患水痘，颜面及四肢浮肿，体检：体温37.5，颜面及四肢明显浮肿，血压13/8kPa(100~60)，躯干部皮肤和粘膜见水痘疹及结痂，尿常规：蛋白(+++)，红细胞5~8个/HP，以下治疗不妥当的是

- A 给予抗生素控制感染
B 给予利尿药物口服
C 给予强的松口服
D 给予丙种球蛋白注射
E 给予减盐饮食

正确答案：C 您选择的答案：

第98题 患儿，8岁。反复水肿8个月，血压20/13kPa(150/100mmHg)，尿常规蛋白(抖)，红细胞满视野，血浆蛋白15g/L，球蛋白20g/L，胆固醇12.5mmol/L，诊断最可能是

- A 急性肾炎
B 单纯性肾病
C 肾炎性肾病
D 慢性肾炎
E 急进性肾炎

正确答案：C 您选择的答案：

第99题 患儿，4岁。诊断为单纯性肾病，强的松治疗不规律，反复出现水肿，自病后一直低盐饮食，近日来精神萎靡，嗜睡，且浮肿加重，血压：9.315.3kPa(70/40mmHg)，最可能发生

- A 低钙血症
B 低钠血症
C 低钾血症
D 低镁血症
E 低蛋白血症

正确答案：B 您选择的答案：

第100题 患儿，4岁。4天前开始发热，咳嗽，近2日尿少、水肿，体检：体温37.8，眼睑及下肢水肿，咽部充血，血压12/8kPa(90/60mmHg)，心肺正常，尿常规：蛋白(++)，红细胞5~8个/HP，各项血化验暂未出结果，治疗应

- A 低盐高蛋白饮食
B 给予利尿药物
C 强的松
D 给予青霉素治疗上呼吸道感染
E 给予白蛋白

正确答案：D 您选择的答案：

第101题 患儿，7岁。水肿1周，体检：全身明显水肿，血压15/10.6kPa(120/80mmHg)，尿常规：蛋白(+++)，红细胞10~15个/HP，血红蛋白22g/L，胆固醇7.8mmol/L，诊断为肾病综合征，给予泼尼松1.5~2mg/(kg·d)口服，2周后尿蛋白转性，进一步治疗应

- A 停药
B 继续用原量2周再逐渐减量
C 继续用原量4周再逐渐减量
D 继续用原量至8周骤然停药
E 上述剂量改为隔日晨顿服2~4周减量一次

正确答案：B 您选择的答案：

第102题 患儿，5岁。水肿，少尿4天，尿检：蛋白(+++)，红细胞0~3个/HP，血浆总蛋白40g/L，白蛋白20g/L，胆固醇12mmol/L，尿素氮4.5mmol/L，本例最可能诊断为

- A 单纯性肾病
B 肾炎性肾病
C 急性肾炎
D 慢性肾炎
E 尿路感染

正确答案：A 您选择的答案：

第103题 患儿，3岁。已确诊为单纯性肾病，下列检查除哪项外均符合该诊断

- A 呈选择性蛋白尿
B 尿24h定量>0.05~0.1g/kg
C 血浆白蛋白明显下降，α2球蛋白及γ球蛋白明显增高
D 血清胆固醇明显增高
E 血沉明显增快

正确答案：C 您选择的答案：

第104题 5岁患儿，血压90/60mmHg，颜面及双下肢凹陷性水肿，血浆蛋白41g/L，血浆白蛋白20g/L，血胆固醇>7.2mmol/L，BUN5.3mmol/L，尿蛋白+++，红细胞1~2个/高倍。此患儿最可能的诊断为

- A. IgA肾病
B. 急性肾炎
C. 单纯性肾病
D. 肾炎性肾病
E. 急进性肾炎

正确答案：C 您选择的答案：

第105题 7岁患儿，水肿1个月就诊。实验室检查：尿蛋白十++，24小时尿蛋白定量3.5g，为非选择性蛋白尿，补体

C3降低。可能的诊断是

- A. 单纯性肾病
- B. 肾炎性肾病
- C. 急进性肾炎
- D. IgA肾病
- E. 膜性肾病

正确答案：B 您选择的答案：

第106题 患儿，9岁。咽痛2天后出现颜面及下肢浮肿，平素食欲不佳，近三年夜尿增多，血压17 / 12kPa(130 / 90mmHg)，尿检：蛋白(+)，红细胞10~15个 / HP，尿比重1.010，末梢血红细胞 $2.5 \times 10^9 / L$ ，血红蛋白80g / L，尿素氮9.2mmol / L，最可能的诊断是

- A 急性肾炎伴贫血
- B 慢性肾炎急性发作
- C 肾炎性肾病
- D 肾盂肾炎
- E 以上都不是

正确答案：B 您选择的答案：

第107题 8岁女孩，因眼睑浮肿1周，伴下肢水肿4天，咳嗽伴喘憋1天入院。体检：血压135 / 96mmHg，半卧位，呼吸急促，眼睑浮肿，双下肢非凹陷性水肿，心率135次 / 分，律齐，心音有力，双肺底部可闻及细小水泡音，肝肋下3.5cm。此患儿诊断应为

- A. 急性肾炎
- B. 支原体肺炎
- C. 急性肾炎伴肺炎
- D. 支气管肺炎合并心力衰竭
- E. 急性肾炎合并循环充血

正确答案：E 您选择的答案：

三、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第108-111题

7岁男孩，晨起眼睑浮肿伴尿少1周，发现肉眼血尿1天，病前7天有“咽痛”。体查：体温38.0，血压120/80mmHg，发育营养好，双侧扁桃体Ⅱ度肿大。外周血示血红蛋白112g/L；尿常规示蛋白+ + /HP，红细胞+ + + /HP，白细胞1~4/HP，比重1.015；血尿素氮7.2mmol / L，血总蛋白52g/L，白蛋白32g/L；胆固醇4.6mmol / L。

1. 该患儿诊断首先考虑

- A. 急性肾小球肾炎
- B. 肾病综合征
- C. 慢性肾炎急性发作
- D. 继发性肾炎
- E. 泌尿系感染

2. 患儿入院后突发抽搐1次，测体温38.5，血压150/90mmHg，考虑合并了

- A. 高血压脑病
- B. 热性惊厥
- C. 病毒性脑炎
- D. 中毒性脑病
- E. 脑栓塞

3. 该患儿降压首选

- A. 硝普钠
- B. 速尿
- C. 西地兰
- D. 硝苯地平
- E. 利血平

4. 患儿应卧床休息至

- A. 水肿消退、肉眼血尿消失、血压正常
- B. 尿常规正常
- C. 尿常规正常后1个月
- D. 尿常规正常后2个月
- E. Addis计数正常

正确答案：AAAA 您选择的答案：

第112-113题

-患儿，10岁。水肿，少尿4日，今头晕、眼花，恶心、呕吐2次，抽搐1次。体检：体温37.6，血压22 / 16kPa(165/120mmHg)，眼睑及双下肢水肿，尿检：白(++)，红细胞15~20个 / HP，血尿素5.8mmol / L

1. 诊断考虑为

- A 急性肾炎合并肾功能不全
- B 急性肾炎合并高血压脑病
- C 急性肾炎合并循环充血
- D 急进性肾炎
- E 慢性肾炎

2. 急诊处置原则为

- A 利尿、镇静、吸氧
- B 降颅压、镇静、吸氧
- C 控制感染、降颅压、镇静吸氧
- D 利尿、降压、镇静、吸氧
- E 利尿、降尿素氮

正确答案：BD 您选择的答案：

第114-116题

男孩5岁，水肿1个月，体检有高度水肿，血压120 / 75mmHg，尿蛋白+++，24小时尿蛋白定量2500mg，BUN5 . 4mmol / L。

1. 最可能的诊断是

- A. 急性肾炎
- B. 慢性肾炎
- C. 单纯性肾病
- D. 肾炎性肾病
- E. 迁延性肾炎

2. 治疗应首选

- A. 口服泼尼松
- B. 甲基泼尼松龙冲击
- C. 环磷酰胺冲击
- D. MTX冲击
- E. 地塞米松冲击

3. 患儿突然出现肉眼血尿伴腰痛，最可能的是

- A. 并发泌尿系感染
- B. 肾功能衰竭
- C. 并发肾结石
- D. 并发肾静脉血栓
- E. 病理类型转变

正确答案：CAD 您选择的答案：

第117-119题

患儿，9岁。眼睑浮肿4天，近2日加重，浮肿渐及全身，尿少，今晨感觉上腹部不适，频咳，气急，体检：体温37 . 5℃，眼睑及下肢浮肿，血压20 / 13kpa(150 / 10-0mmHg)，心率116次 / 分，心音钝，两肺闻及水泡音，肝肋下2. 0cm，尿常规：蛋白(++)，红细胞20 ~ 30个 / HP，血尿素氮6mmol / L

1. 诊断考虑为

- A. 急性肾炎伴肺炎
- B. 急性肾炎伴肾功能不全
- C. 急性肾炎伴循环充血
- D. 急性肾炎伴高血压脑病
- E. 急性肾炎伴心肌炎

2. 该病急性期应卧床休息至

- A. 血沉降至正常
- B. 抗"O"恢复正常
- C. 肉眼血尿消失，血压正常
- D. 镜下血尿消失，浮肿消退
- E. 尿Addis计数正常

3. 该患儿应做何处置最适当

- A. 限制水、钠摄入
- B. 肌注利血平
- C. 肌注速尿
- D. 快速毛地黄化
- E. 静脉滴注硝普钠

正确答案：CCE 您选择的答案：

第120-123题

4岁男孩，反复颜面及眼睑浮肿1月，诊断为肾病综合征，近3天浮肿加重，尿量明显减少，每日100ml，并伴有腹胀、腹痛。体检：血压120/75mmHg，腹膨隆，全腹压痛，轻微反跳痛，腹部移动性浊音阳性。尿蛋白(+++)，镜检红细胞0 ~ 3个/HP，白细胞1 ~ 3个/HP。

1. 该患儿可能合并了

- A. 腹膜炎
- B. 肾静脉栓塞
- C. 低钾血症
- D. 急性肾功能不全
- E. 泌尿道感染

2. 该患儿拟给予泼尼松长程疗法，正确的疗程是

- A. 8周
- B. 3个月
- C. 6个月
- D. 9个月
- E. 1 ~ 1 . 5年

3. 患儿使用泼尼松每日1 . 5mg/kg，共8周后复查尿蛋白仍有(+++)，则该患儿存在

- A. 激素敏感
- B. 激素部分敏感
- C. 激素耐药
- D. 激素依赖
- E. 使用剂量不规范

4. 如出现上述激素治疗疗效不佳的情况，可酌情进行如下治疗，但不包括

- A. 延长泼尼松诱导期
- B. 甲基强的松龙冲击疗法
- C. 环磷酰胺冲击疗法
- D. 环孢霉素A
- E. 输注白蛋白

正确答案：ADCE 您选择的答案：

第124-125题

患儿，5岁。因发热、咳嗽1周，水肿、尿少5天入院，体检：全身明显浮肿，呈凹陷性，血压13 / 8kPa(110 / 60mmHg)，尿检：蛋白(m)，红细胞5 ~ 7个 / HP，血浆白蛋白23g / L，胆固醇9 . 2mmol / L

1. 该患儿最可能的诊断为

- A 急性肾炎
- D 病毒性肾炎
- C 单纯性肾病
- D 肾炎性肾病
- E 慢性肾炎

2. 该患儿在治疗中出现腹胀无力, 反射弱, 且心电图出现T波低平且有U波, 应用以下何药物最恰当

- A 静脉给予葡萄糖酸钙
- B 白蛋白静脉滴注
- C 口服果味钾
- D 3%氯化钠缓慢静滴
- E 给予洋地黄制剂

正确答案: CC 您选择的答案:

第126-127题

8岁男孩, 面部浮肿3天, 少尿, 血尿2天, 伴呼吸困难, 两肺底少许细湿啰音, 心率142次/分, 肝肋下2.5cm, 血压120/83mmHg。

1. 可能的诊断是

- A. 支气管肺炎, 心力衰竭
- B. 急性肾炎, 循环充血
- C. 急性肾炎, 呼吸衰竭
- D. 肾病综合征, 肾炎型
- E. 急性肾炎, 高血压脑病

2. 紧急处理的重点是

- A. 静滴青霉素
- B. 口服泼尼松
- C. 应用地高辛
- D. 口服硝苯地平
- E. 静注呋塞米

正确答案: BE 您选择的答案:

第128-130题

患儿, 3岁。眼睑及双下肢明显浮肿, 少尿1周, 体检: 精神状态尚好, 眼睑浮肿, 双下肢呈凹陷性水肿, 血压12/8kPa(90/60mmHg), 心肺正常, 尿常规: 蛋白(++), 红细胞0~3个/HP, 血浆总蛋白45g/L, 蛋白22g/L, 抗"O"正常, C3补体正常, 胆固醇11.2mmol/L

1. 该患儿诊断为

- A 急性肾炎
- B 单纯性肾病
- C 肾炎性肾病
- D 急进性肾炎
- E 病毒性肾炎

2. 该患儿病理类型最可能为

- A 微小病变型
- B 系膜增生性
- C 局灶性节段性肾小球硬化
- D 膜性肾病
- E 膜增生性肾炎

3. 该患儿治疗应选

- A 强的松短程疗法
- B 强的松中程疗法
- C 强的松长程疗法
- D 甲基强的松龙冲击疗法
- E 强的松+环磷酰胺

正确答案: BAA 您选择的答案:

第131-132题

患儿, 7岁。3周前曾患上呼吸道感染, 3日来眼睑浮肿, 尿少, 有肉眼血尿, 体检: 咽部不充血, 眼睑浮肿, 血压: 20/14.7kPa, 尿蛋白(+++), 有大量红细胞, 抗"O"500U, CH50C3减少, 诊断为急性肾炎, 给予利尿、降压治疗同时给予青霉素治疗

1. 应用青霉素的疗程是多少

- A 3~5天
- B 5~7天
- C 7~10天
- D 10~14天
- E 4~21天

2. 应用青霉素的目的是

- A 控制肾脏炎症
- B 预防肾炎复发
- C 治疗并发症
- D 防止交叉感染
- E 清除体内残存的链球菌

正确答案: CE 您选择的答案:

四、A4型题: 以下提供若干个案例, 每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息, 在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第133-135题

9岁男孩, 眼睑浮肿4天, 伴头痛、眼花、尿呈深茶色2天入院。2周前曾患扁桃体炎, 经用青霉素治愈。

1. 如果此患儿血压急剧升高, 出现惊厥, 首选的处理是

- A. 强力利尿剂

- B. 硝苯地平口服
C. 硝普钠静滴
D. 快速洋地黄化
E. 口服复方降压片
2. 如果此患儿病情急剧恶化，2~3周后出现进行性肾功能减退，尿毒症，则考虑诊断是
- A. 急性肾小球肾炎
B. IgA肾病
C. 薄基底膜肾病
D. 肾炎型肾病综合征
E. 急进性肾小球肾炎
3. 如果此患儿蛋白尿明显，血清补体持续降低超过8周，则考虑诊断是
- A. 肾炎型肾病综合征
B. IgA肾病
C. 膜增生性肾小球肾炎
D. 急进性肾小球肾炎
E. 慢性肾小球肾炎
- 正确答案：CEC 您选择的答案：

第136-139题

4岁患儿，全身水肿20天，血压90/60mmHg，尿蛋白+++~++++血浆蛋白总量45g/L，清蛋白20g/L，血BUN4.2mmol/L。

1. 最可能的诊断是
- A. 单纯性肾病
B. 肾炎性肾病
C. IgA肾病
D. 急进性肾炎
E. 膜性肾病
2. 如给该患儿口服泼尼松10mg，1日3次，1周后水肿消退，2周后尿蛋白转阴，最可能的病理诊断是
- A. 系膜增殖性肾炎
B. 膜性肾病
C. 膜增殖性肾炎
D. 微小病变
E. 新月体肾炎
3. 尿蛋白转阴后选择激素减量的方案是
- A. 即可停用泼尼松
B. 即可改隔日顿服
C. 继续用泼尼松原剂量，2周后停药
D. 继续用泼尼松原剂量，2周后改隔日顿服
E. 继续用泼尼松原剂量，4周后改隔日顿服
4. 为预防肾病复发，应用泼尼松疗程最好为
- A. 4~6周
B. 6~8周
C. 8~12周
D. 6~9个月
E. 1~2年
- 正确答案：ADDD 您选择的答案：

第140-142题

9岁男孩，眼睑浮肿4天，伴头痛、眼花、尿呈深茶色2天入院。2周前曾患扁桃体炎，经用青霉素治愈。

1. 体检的重点是
- A. 血压
B. 腹部血管杂音
C. 尿道口有无红肿
D. 肾区叩击痛
E. 扁桃体
2. 首选的辅助检查是
- A. 腹部B超检查
B. 心电图检查
C. 乙肝两对半测定
D. 胸部X线拍片
E. 尿常规
3. 如果此患儿出现呼吸困难，颈静脉怒张，吐粉红色泡沫痰，两肺满布湿啰音，错误的治疗是
- A. 严格限制水、钠摄入量
B. 强力利尿剂
C. 静滴硝普钠
D. 快速洋地黄化
E. 腹膜透析
- 正确答案：AED 您选择的答案：

五、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第143-145题

- A. 400~500ml
B. 500~600ml
C. 600~700ml
D. 600~1000ml
E. 1000~1500ml
1. 6月婴儿每日正常尿量约

2. 2岁幼儿每日正常尿量约
3. 4岁儿童每日正常尿量约
正确答案：ABC 您选择的答案：

第146-148题

A 8~12周
B 4~6个月
C 6~9个月
D 9~12个月
E 1~1.5年
1. 肾病综合征激素短程疗法时间为
2. 肾病综合征激素中程疗法时间为
3. 肾病综合征激素长程疗法时间为
正确答案：ABD 您选择的答案：

第149-151题

A 激素敏感
B 激素部分敏感
C 激素耐药
D 激素依赖
E 激素高度敏感
1. 激素治疗8周，尿蛋白完全转阴性
2. 激素治疗8周，尿蛋白减少至+~++
3. 激素治疗8周尿蛋白仍>+++
正确答案：ABC 您选择的答案：

第152-154题

A. 尿蛋白+++，血总蛋白降低，白蛋白降低，胆固醇增高，血压正常
B. 尿蛋白+++，红细胞++，血总蛋白降低，胆固醇增高，血尿素氮增高，血压增高
C. 少尿持续2周以上，尿红细胞+++，血尿素氮明显增高，血压增高
D. 尿蛋白+，红细胞++，血补体降低，血压增高
E. 尿蛋白++，白细胞+++，血补体正常，血压正常
1. 急性链球菌感染后肾炎
2. 单纯性肾病
3. 肾炎性肾病
正确答案：DAB 您选择的答案：

第155-157题

A. 硝苯地平
B. 卡托普利
C. 硝普钠
D. 地高辛
E. 呋塞米
1. 高血压脑病治疗首选
2. 急性肾炎少尿时治疗首选
3. 保护肾功能，延缓肾组织纤维化，延缓肾功能慢性进展病程
正确答案：CEB 您选择的答案：

习题集 儿科学 结核病

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 原发型肺结核时，下列哪项表现少见

- A. 乏力、盗汗、消瘦、纳差
- B. 发热
- C. 肺部有湿啰音
- D. 病变好发部位为右肺上下叶交界处
- E. 有时仅表现为肺门淋巴结肿大

正确答案：C 您选择的答案：

第2题 以下哪项不是结核性脑膜炎的脑脊液特点

- A. 外观清或略混浊，呈毛玻璃样
- B. 细胞数约 $(50 \sim 500) \times 10^6 / L$
- C. 单核细胞约为 $0.7 \sim 0.8$
- D. 糖含量常在 $3 \sim 4 mmol / L$
- E. 蛋白多为 $1.0 \sim 3.0 g / L$

正确答案：D 您选择的答案：

第3题 结核病的主要传染源为

- A. 健康带菌者
- B. 血沉增快者
- C. OT试验为(++)者
- D. 结核菌涂片阳性病人
- E. 胸部X线片有钙化灶者

正确答案：D 您选择的答案：

第4题 结核菌素试验阳性意义的判断错误的是

- A. 接种卡介苗后
- B. 婴幼儿尤其是未接种卡介苗者阳性反应多表示体内有新的结核病灶
- C. 强阳性反应表示体内有活动性结核病
- D. 由阴性反应转为阳性，或反应强度由原 $< 10 mm$ 转为 $> 10 mm$ ，或增幅 $> 6 mm$ 时表示新近有感染
- E. 年长儿无明显的临床症状呈阳性反应时表示一定有结核感染

正确答案：E 您选择的答案：

第5题 关于典型的原发综合征，“双极”病变的描述，以下哪项是错误的

- A. 肺部初染病灶
- B. 支气管淋巴结结核
- C. 引导初染病灶至淋巴结之间的淋巴管炎
- D. 初染病灶邻近的胸膜炎
- E. 病灶侧肺野浸润灶

正确答案：E 您选择的答案：

第6题 肾上腺皮质激素治疗结核性脑膜炎的疗程是

- A. 2~3周
- B. 3~6周
- C. 6~8周
- D. 8~12周
- E. 3~6个月

正确答案：D 您选择的答案：

第7题 糖皮质激素治疗结脑的疗程是

- A. 1~2周
- B. 3~4周
- C. 5~6周
- D. 7~8周
- E. 8~12周

正确答案：E 您选择的答案：

第8题 下列哪组症状表明结核性脑膜炎已进入晚期

- A. 少言、懒动、易倦、烦躁
- B. 剧烈头痛，喷射性呕吐
- C. 发热、纳差、盗汗、消瘦
- D. 惊厥、意识模糊、昏迷
- E. 颈项强直，Kerning征、Brudzinski征阳性

正确答案：D 您选择的答案：

第9题 一般情况下结核菌素试验何浓度仍为阴性可排除结核病

- A. 1:20000
- B. 1:10000
- C. 1:2000
- D. 1:1000
- E. 1:100

正确答案：E 您选择的答案：

第10题 小儿时期结核病最常见的类型为

- A. 原发型肺结核

- B. 结核性胸膜炎
- C. 粟粒性肺结核
- D. 结核性脑膜炎
- E. 结核性腹膜炎

正确答案：A 您选择的答案：

第11题 结核病预防性化疗的疗程是

- A 3~6个月
- B 6~12个月
- C 12~18个月
- D 18~24个月
- E 24~30个月

正确答案：B 您选择的答案：

第12题 抗结核病的首选药和必选药是

- A. 异烟肼
- B. 利福平
- C. 乙胺丁醇
- D. 吡嗪酰胺
- E. 链霉素

正确答案：A 您选择的答案：

第13题 抗结核预防应用的化疗药物是

- A 利福平
- B 异烟肼
- C 链霉素
- D 乙胺丁醇
- E 吡嗪酰胺

正确答案：B 您选择的答案：

第14题 下列哪项不是结核性脑膜炎中期临床表现

- A 头痛剧烈
- B 呕吐加重
- C 脑膜刺激征
- D 颅神经障碍
- E 嗜睡、频繁惊厥

正确答案：E 您选择的答案：

第15题 下列哪项不符合小儿原发型肺结核的临床表现

- A. 上肺叶有空洞形成
- B. 肺门淋巴结肿大
- C. 消瘦，盗汗和纳差
- D. 对结核菌高度过敏
- E. 疱疹性结膜炎

正确答案：A 您选择的答案：

第16题 结核性脑膜炎的脑脊液典型改变是

- A. 压力增高
- B. 外观呈毛玻璃样
- C. 白细胞增多，以淋巴细胞为主
- D. 糖及氯化物含量同时降低
- E. 蛋白含量增高

正确答案：D 您选择的答案：

第17题 结核性脑膜炎早期的主要症状是

- A 发热
- B 头痛
- C 性格改变
- D 呕吐
- E 便秘

正确答案：C 您选择的答案：

第18题 患麻疹后，下列那种疾病可加重

- A. 哮喘
- B. 湿疹
- C. 肾病综合征
- D. 过敏性鼻炎
- E. 结核病

正确答案：E 您选择的答案：

第19题 结核性脑膜炎的早期表现是

- A. 喷射性呕吐，视神经乳头水肿
- B. 剧烈头痛，脑膜刺激征阳性
- C. 感觉过敏
- D. 性格改变，低热，消瘦，便秘
- E. 手足徐动，前囟膨隆

正确答案：D 您选择的答案：

第20题 关于OT试验下列哪项正确

- A. OT试验阳性可肯定有结核病

B. 凡是OT试验阴性可除外结核病
C. 卡介苗接种成功者OT试验呈强阳性
D. 粟粒性结核OT试验可呈阴性
E. 初次感染结核菌后2周OT试验呈阳性
正确答案：D 您选择的答案：

第21题 小儿时期患结核病最常见的类型为

- A 原发型肺结核
- B 结核性胸膜炎
- C 粟粒性肺结核
- D 结核性脑膜炎
- E 结核性腹膜炎

正确答案：A 您选择的答案：

第22题 结核病的主要传染途径为

- A 呼吸道
- B 消化道
- C 泌尿道
- D 皮肤
- E 胎盘

正确答案：A 您选择的答案：

第23题 活动性原发型肺结核，用药方案首选

- A. INH+PAS
- B. INH+RFP+PZA
- C. INH+RFP+PZA+SM
- D. INH+RFP+泼尼松
- E. INH+PZA

正确答案：B 您选择的答案：

第24题 确诊结核性脑膜炎最可靠的依据为

- A OT试验阳性
- B 脑膜刺激征阳性
- C 胸部X线有原发结核病灶
- D 脑脊液糖和氯化物含量同时减低
- E 脑脊液中有蜘蛛网薄膜形成取其涂片检菌阳性

正确答案：E 您选择的答案：

第25题 小儿时期结核病，哪一类型最多见

- A. 原发综合征
- B. 肺门淋巴结结核
- C. 粟粒性肺结核
- D. 原发型肺结核
- E. 结核性胸膜炎

正确答案：D 您选择的答案：

第26题 结核性脑膜炎出现颅神经障碍最常见的为

- A 外展神经
- B 面神经
- C 听神经
- D 舌咽神经
- E 迷走神经

正确答案：B 您选择的答案：

第27题 结核性脑膜炎典型的脑脊液改变是

- A 压力增高
- B 外观呈毛玻璃样
- C 白细胞增多，分类以淋巴细胞为主
- D 糖及氯化物含量同时减低
- E 蛋白量增高

正确答案：D 您选择的答案：

第28题 未经及时诊断和治疗的结核性脑膜炎，常见的死亡原因是

- A. 循环衰竭
- B. 水和电解质紊乱
- C. 颅内压急剧增高导致脑疝
- D. 营养耗竭
- E. 颅内出血

正确答案：C 您选择的答案：

第29题 结核性脑膜炎脑膜脑炎型不正确的是

- A. 脑膜和脑实质均受累
- B. 可有局灶性脑症状
- C. 颅高压和脑积水症状显著
- D. 病程长，迁延不愈，预后差
- E. 脑脊液呈典型改变

正确答案：E 您选择的答案：

第30题 结核性脑膜炎的病理改变最明显处在

- A 大脑

- B 小脑
- C 桥脑
- D 脑顶
- E 脑底

正确答案：E 您选择的答案：

第31题 小儿结核病化疗方案中的标准疗法，其疗程应为

- A . 3~4个月
- B . 5~6个月
- C . 7~8个月
- D . 9-12个月
- E . 13~18个月

正确答案：D 您选择的答案：

第32题 关于OT试验下列哪项最准确

- A OT试验阳性可肯定有结核病
- B 凡是OT试验阴性可除外结核病
- C 卡介苗接种成功OT试验呈强阳性
- D 粟粒结核OT试验可呈阴性
- E 初次感染结核菌后2周，OT试验呈阳性

正确答案：D 您选择的答案：

第33题 支气管淋巴结核出现喘鸣是由于

- A 淋巴结压迫气管分叉处
- B 淋巴结压迫支气管使其部分阻塞
- C 淋巴结压迫支气管使其完全阻塞
- D 干酪样物质破入支气管
- E 淋巴结压迫肺动脉

正确答案：B 您选择的答案：

第34题 支气管淋巴结核出现喘鸣是由于

- A . 淋巴结高度肿大压迫气管分叉处
- B . 淋巴结压迫支气管导致部分阻塞
- C . 淋巴结压迫支气管导致完全阻塞
- D . 支气管内膜结核
- E . 淋巴结压迫肺动脉

正确答案：A 您选择的答案：

第35题 以下哪项病史对结核性脑膜炎的诊断无参考意义

- A . 母妊娠史及分娩史
- B . 结核接触史
- C . 卡介苗接种史
- D . 既往结核病史
- E . 近期急性传染病史

正确答案：A 您选择的答案：

第36题 结核菌素试验阴性，下列哪种情况不属于假阴性反应

- A . 初次感染结核杆菌4~8周以内
- B . 使用免疫抑制剂后
- C . 患麻疹时
- D . 粟粒性肺结核
- E . 重度营养不良

正确答案：A 您选择的答案：

第37题 结核性脑膜炎浆液型的特征正确的是

- A . 浆液渗出物不只局限于脑底
- B . 脑膜刺激征明显
- C . 颅神经障碍明显
- D . 脑脊液变化轻微
- E . 多处于疾病的中期

正确答案：D 您选择的答案：

第38题 小儿复种卡介苗，维持机体对结核菌的免疫力，主要是通过

- A . 增强细胞免疫
- B . 增强体液免疫
- C . 促进白细胞的吞噬能力
- D . 提高IgG水平
- E . 促进干扰素的形成

正确答案：A 您选择的答案：

第39题 支气管淋巴结核出现类似百日咳样痉挛性咳嗽是由于

- A 淋巴结压迫肺动脉
- B 淋巴结压迫支气管使其部分阻塞
- C 淋巴结压迫支气管使其完全阻塞
- D 淋巴结压迫气管分叉处
- E 干酪样物质破入支气管

正确答案：D 您选择的答案：

第40题 皮内注入结核菌素后经多长时间观察结果

- A 12~24小时

- B 24~48小时
- C 48~72小时
- D 3~4天
- E 4~5天

正确答案：C 您选择的答案：

第41题 小儿结核病最严重的播散方式是

- A. 支气管播散
- B. 淋巴结播散
- C. 血行播散
- D. 原发病灶浸润扩大
- E. 从原发病灶直接播散到临近器官

正确答案：C 您选择的答案：

第42题 小儿初次感染结核杆菌至产生变态反应的时间是

- A. 48~72/小时
- B. 2~3周
- C. 4~8周
- D. 10~12周
- E. 3~4个月

正确答案：C 您选择的答案：

第43题 结核病患者，出现结节性红斑或疱疹性结膜炎及一过性多发性关节炎，常表示有

- A. 原发性结核
- B. 继发性结核
- C. 皮肤结核
- D. 血行播散性结核
- E. 结核已愈

正确答案：A 您选择的答案：

第44题 结核性脑膜炎最常受累的脑神经是

- A. 视神经
- B. 外展神经
- C. 动眼神经
- D. 听神经
- E. 面神经

正确答案：E 您选择的答案：

第45题 下列哪项不符合结核性脑膜炎的神经系统表现

- A. 脑膜刺激征阳性
- B. 脑神经损害症状
- C. 肢体弛缓性瘫痪
- D. 脑实质损害和脊髓障碍症状
- E. 颅内压增高症状

正确答案：C 您选择的答案：

第46题 结核性脑膜炎中期的主要体征为

- A. 脑膜刺激征
- B. 嗜睡、烦躁不安
- C. 头痛、喷射性呕吐
- D. 前囟膨隆、骨缝裂开
- E. 惊厥

正确答案：A 您选择的答案：

第47题 做结核菌素试验，注射后多长时间看结果

- A. 24小时
- B. 48~72 / 小时
- C. 1周
- D. 4~8周
- E. 20分钟

正确答案：B 您选择的答案：

第48题 关于结核性脑膜炎的病理改变，以下哪项描述是错误的

- A. 软脑膜弥漫充血、红肿、炎性渗出
- B. 蛛网膜下腔大量炎性渗出物积聚
- C. 浆液纤维蛋白渗出物波及脑神经鞘
- D. 脑部血管在早期为急性动脉炎
- E. 炎症主要在脑膜，不会蔓延至脑实质

正确答案：E 您选择的答案：

第49题 关于结核病发病机制错误的是

- A. 机体受结核菌感染后产生免疫力，同时也产生变态反应
- B. 结核的免疫主要是体液免疫
- C. 结核变态反应属 Ⅳ型变态反应
- D. 结核变态反应在一定条件下与免疫是平行一致的
- E. 结核变态反应对免疫的影响有双重作用

正确答案：B 您选择的答案：

第50题 以下哪项不是小儿活动性结核的指标

- A. 结核菌素试验硬结 >20mm

B. 有发热及其他结核中毒症状
C. 排出物找到结核菌
D. 血沉加快, 无其他原因解释
E. 胸部X线检查显示病灶吸收, 钙化
正确答案: E 您选择的答案:

第51题 婴儿结核性脑膜炎中期的主要特征为

A. 嗜睡或惊厥
B. 脑膜刺激征
C. 喷射性呕吐
D. 前囟膨隆
E. 骨缝闭合延迟

正确答案: D 您选择的答案:

第52题 小儿受结核菌感染多长时间后作OT试验即呈现阳性反应

A. 2~4周
B. 4~8周
C. 8~10周
D. 10~12周
E. 12~14周

正确答案: B 您选择的答案:

第53题 确诊结核性脑膜炎最可靠的依据是

A. 脑脊液生化、糖、氯化物降低
B. 脑神经瘫痪+结核接触史
C. 昏迷+结核菌素试验阳性
D. 脑脊液中查见结核菌
E. 脑脊液中IgG和IgA增高

正确答案: D 您选择的答案:

第54题 婴儿不典型结核性脑膜炎首发的症状是

A. 急起高热
B. 嗜睡
C. 惊厥
D. 前囟膨隆
E. 喷射性呕吐

正确答案: C 您选择的答案:

第55题 小儿受结核感染后多长时间作结核菌素试验可呈现阳性反应

A. 1~2周
B. 2~3周
C. 4~8周
D. 8~10周
E. 10~12周

正确答案: C 您选择的答案:

第56题 结核性脑膜炎最常见于下列哪种情况

A. 原发性结核感染
B. 继发性结核感染
C. 全身粟粒性结核
D. 脑结核瘤
E. 有结核接触史

正确答案: C 您选择的答案:

第57题 结核性脑膜炎脑脊液的典型改变是

A. 外观呈毛玻璃样
B. 糖和氯化物同时降低
C. 蛋白升高
D. 白细胞升高
E. 白细胞分类以单核为主

正确答案: B 您选择的答案:

第58题 原发型肺结核的病理改变以下哪项是正确的

A. 肺部原发病灶多位于肺上叶的上部和下叶的底部
B. 左侧较多见
C. 基本病变为坏死
D. 典型的原发综合征呈双极病变
E. 增殖性病变为干酪样坏死

正确答案: D 您选择的答案:

第59题 预防哪种传染病对预防结核病有较大意义

A. 猩红热
B. 肝炎
C. 麻疹
D. 菌痢
E. 流脑

正确答案: C 您选择的答案:

第60题 结核性脑膜炎最常见的类型是

A. 浆液型

- B 脑底脑膜炎型
- C 脑膜脑炎型
- D 脊髓型
- E 高颅压型

正确答案：B 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第61题 患儿，10个月。发热2天，抽搐1次，急诊入院，询问病史，其母患浸润性肺结核，体检：心肺正常，前囟饱满，颈软，肝、脾轻度肿大，脑脊液外观清，细胞数 $100 \times 10^6/L$ ，N 30%，L 70%，糖 $1.1mmol/L$ ，氯化物 $101mmol/L$ ，首先考虑

- A 高热惊厥
- B 中毒性脑病
- C 结核性脑膜炎
- D 化脓性脑膜炎
- E 病毒性脑膜炎

正确答案：C 您选择的答案：

第62题 6岁小儿，结核菌素试验呈强阳性，说明

- A 4周内接种过卡介苗
- B 体内有活动性结核病
- C 3岁时复种过卡介苗
- D 出生时接种过卡介苗
- E 4周内接触过开放性肺结核

正确答案：B 您选择的答案：

第63题 2岁小儿，近3月来低热、纳差、盗汗和消瘦，体检：颈部、颌下淋巴结肿大，PPD试验1:2000(+ +)，胸片诊断为：肺门淋巴结结核，治疗首选

- A 异烟肼+利福平+吡嗪酰胺
- B 利福平+链霉素
- C 利福平+乙胺丁醇
- D 利福平
- E 异烟肼

正确答案：A 您选择的答案：

第64题 1岁小儿，低热7天，时有呕吐、咳嗽、烦躁，家中无结核病人，前囟稍隆起，颈有抵抗，心肺无异常，肝脾轻度肿大，脑脊液微混浊，白细胞 $350 \times 10^6/L$ ，中性0.30，淋巴0.70。蛋白定性阳性，氯化物 $85.5mmol/L$ ，糖 $1.1mmol/L$ ，结核菌素试验阴性。首先考虑为

- A 化脓性脑膜炎
- B 病毒性脑膜炎
- C 结核性脑膜炎
- D 隐球菌性脑膜炎
- E 中毒性脑病

正确答案：C 您选择的答案：

第65题 1岁男孩，阵发性痉挛性咳嗽20余日，出生时接种卡介苗，1:2000 OT试验硬结直径20mm，胸片右肺门淋巴结增大，诊断为

- A 百日咳
- B 百日咳合并肺炎
- C 支气管淋巴结结核
- D 原发综合征
- E 支原体肺炎

正确答案：C 您选择的答案：

第66题 患儿，4岁。其母患浸润性肺结核，该患儿近半个月低热，咳嗽，疑为结核病，做OT试验1:2000，其硬结直径为21mm，结果为

- A "-"
- B "+"
- C "++"
- D "+++"
- E "++++"

正确答案：D 您选择的答案：

第67题 2岁患儿，其父患开放性肺结核，曾接种过卡介苗，因近1个月咳嗽来诊。无发热，结核菌素试验，红肿硬结直径20mm，X线胸片未见异常，血沉15mm/小时。你将如何处理

- A 以往有过结核感染，不需特殊处理
- B 接种卡介苗反应，不需服药
- C 需用SM+INH6~9个月
- D 需用INH6~9个月
- E 需用INH+RFP+SM6~9个月

正确答案：D 您选择的答案：

第68题 患儿4岁，近来低热、乏力，消瘦、夜间盗汗，OT试验1:2000(+ +)，胸片示原发综合征，治疗首选的抗结核药物为

- A 异烟肼+乙胺丁醇
- B 异烟肼+利福平+链霉素
- C 异烟肼+链霉素
- D 异烟肼+利福平

E. 异烟肼

正确答案：B 您选择的答案：

第69题 1岁小儿患麻疹后5周，低热，食欲不振，消瘦，盗汗，体检：两肺无湿啰音，OT试验1:2000浓度结果为阴性，下述哪项检查最重要

A 白细胞计数及分类

B 血培养

C 血沉

D 胸部X线摄片

E 痰培养

正确答案：D 您选择的答案：

第70题 患儿，4岁。因乏力、低热、多汗疑结核病，做“OT”试验1:2000，结果为“+”，其意义恰当的说法是

A 曾接种卡介苗，人工免疫所致

B 表示受过结核菌感染

C 表示体内有新的结核病灶

D 表示体内有活动性结核病

E 表示新近有结核菌感染

正确答案：D 您选择的答案：

第71题 2岁患儿，结核菌素1:2000硬结直径9mm，无临床症状，既往未接种卡介苗，下列哪项处理正确

A 定期复查结核菌素试验

B 定期拍胸部X线片

C 应用异烟肼治疗3~5个月

D 应用异烟肼治疗6~12个月

E 应用异烟肼+利福平治疗6个月

正确答案：D 您选择的答案：

第72题 5岁小儿，结核菌素试验72小时，注射局部出现水疱和坏死，硬结直径为20mm，判断结果为

A. (-)

B. (+)

C. (++)

D. (+++)

E. (++++)

正确答案：E 您选择的答案：

第73题 患儿，4岁。发热，呕吐半月，间断抽搐5天，颈强(+)，克氏征阳性，脑脊液白细胞 $480 \times 10^6/L$ ，淋巴:80%，中性20%，糖 1.2 mmol/L ，氯化物 95 mmol/L ，诊断为结核性脑膜炎，治疗应选

A 异烟肼+利福平+链霉素

B 异烟肼+利福平+强的松

C 异烟肼+利福平+链霉素+强的松

D 异烟肼+利福平+链霉素+乙胺丁醇

E 异烟肼+利福平+链霉素+吡嗪酰胺+强的松

正确答案：E 您选择的答案：

第74题 3岁小儿，出生时接种卡介苗，现结核菌素试验72小时结果，硬结20mm，持续7天后留有色素。最大可能是

A. 接种卡介苗反应

B. 活动性结核病

C. 皮试局部感染

D. 免疫力增强

E. 分枝杆菌交叉感染

正确答案：B 您选择的答案：

第75题 女患，1岁。低热10余日，喜哭易怒，嗜睡，有时便秘，体检：前囟膨隆，心肺正常，肝肋下1.5cm，颈软，克氏征阳性，腹壁反射减弱，脑脊液外观毛玻璃样，蛋白(++)，细胞数 $200 \times 10^6/L$ ，糖 2.4 mmol/L ，氯化物 107 mmol/L ，诊断为

A 结核性脑膜炎

B 化脓性脑膜炎

C 中毒性脑病

D 新型隐球菌脑膜炎

E 病毒性脑膜炎

正确答案：A 您选择的答案：

第76题 8个月患儿，低热15天，消瘦，近3天呕吐频繁，抽搐10余次。体检：嗜睡，颈项强直，Brudzinski征阳性，双侧Barbinski征阳性，脑脊液微混，白细胞 $330 \times 10^6/L$ ，多核<单核，蛋白 1 g/L ，糖 1.36 mmol/L ，氯化物 85.5 mmol/L 。最可能的诊断是

A. 急性化脓性脑膜炎

B. 病毒性脑膜炎

C. 中毒性脑病

D. 结核性脑膜炎

E. 脑脓肿

正确答案：D 您选择的答案：

第77题 男孩，7岁。因其父母正患活动性肺结核，故来体检，体检时发现患疱疹性结膜炎，心肺听诊未见异常，做OT试验，其浓度应从何开始

A 1:100

B 1:2000

C 1:1000

D 1:2000

E 1:10000

正确答案：E 您选择的答案：

第78题 患儿，15个月。哭闹，烦躁半个月，时有喷射性呕吐，体检：体温37.8℃，心肺正常，前囟隆起，克氏征阴性，膝腱反射亢进，脑脊液：白细胞 $250 \times 10^6/L$ ，中性35%，淋巴65%，糖1.5mmol/L，氯化物93mmol/L，OT试验1:2000阴性，胸部X线两肺散在点状阴影，最可能的诊断

- A 病毒性肺炎+病毒性脑膜炎
- B 病毒性肺炎+化脓性脑膜炎
- C 病毒性肺炎+结核性脑膜炎
- D 粟粒性肺结核+结核性脑膜炎
- E 粟粒性肺结核+化脓性脑膜炎

正确答案：D 您选择的答案：

第79题 患儿，4岁。既往接种卡介苗，做“OT”试验1:2000，以下哪项结果不是接种卡介苗后的反应

- A 硬结直径多为5~9mm
- B 硬结质地较软
- C 硬结边缘不整
- D 试验阳性持续时间较短
- E 阳性反应变化少，无减弱倾向，持续终身

正确答案：E 您选择的答案：

第80题 4岁男孩，咳嗽、发热20天，头痛、呕吐5天，曾用多种抗生素治疗无效。查体：体温38℃，体重20kg，神清，左侧鼻唇沟变浅，口角向右歪斜，颈强(+)，心肺正常，克、布氏征(+)，脑脊液：外观微混，WBC $560 \times 10^6/L$ ，NO.3，LO.7，蛋白质800mg/L，氯化物88mmol/L，糖1.18mmol/L。采用下列何种治疗为宜

- A 异烟肼+链霉素
- B 青霉素+氯霉素
- C 异烟肼+利福平
- D 链霉素+青霉素+异烟肼
- E 异烟肼+利福平+链霉素+吡嗪酰胺

正确答案：E 您选择的答案：

第81题 患儿，6岁。低热，乏力半月余，头痛，呕吐1周，体检：精神不振，颈强(+)，克氏征(+)，疑结核性脑膜炎，做脑脊液检查，下列哪项检查最具灵敏性和特异性

- A 抗结核抗体
- B 聚合酶链反应(PCR)
- C 脑脊液糖及氯化物测定
- D 脑脊液细胞数及分类
- E 脑脊液淋巴细胞亚群

正确答案：B 您选择的答案：

第82题 3岁患儿，半月来低热，盗汗，食欲不振，消瘦，胸片诊断为原发综合征，OT试验1:2000(++), 治疗首选的抗结核药物应为

- A 异烟肼+乙胺丁醇
- B 异烟肼+利福平+链霉素
- C 异烟肼+链霉素
- D 异烟肼+利福平
- E 异烟肼

正确答案：B 您选择的答案：

第83题 4岁小儿，近1个月低热，乏力、易怒且消瘦，体检：颈部淋巴结肿大，肺无啰音，肝肋下1.5cm，结核菌素试验(++), 胸片：右肺可见哑铃状阴影，诊断为

- A 支气管肺炎
- B 支气管淋巴结核
- C 原发综合征
- D 浸润性肺结核
- E 颈部淋巴结核+支气管淋巴结核

正确答案：C 您选择的答案：

第84题 5岁患儿，发热5天，头痛，呕吐3天，体检：心肺无异常，脑膜刺激征阳性，脑脊液：外观透明，细胞数 $100 \times 10^6/L$ ，蛋白0.8g/L，糖3.0mmol/L，氯化物122mmol/L，脑脊液留置24小时无薄膜形成，诊断为

- A 中毒性脑病
- B 病毒性脑膜炎
- C 结核性脑膜炎
- D 化脓性脑膜炎
- E 新型隐球菌脑膜炎

正确答案：B 您选择的答案：

第85题 4岁患儿，近3个月低热，乏力，OT试验1:2000(++), 胸片显示：有肺门淋巴结增大，治疗首选

- A 异烟肼
- B 异烟肼+利福平
- C 利福平+链霉素
- D 链霉素+乙胺丁醇
- E 利福平

正确答案：B 您选择的答案：

第86题 2岁小儿麻疹后4周，低热、食欲不振，盗汗、咳嗽，体检两肺未闻及湿啰音，PPD试验1:2000(-)，下列哪项检查最重要

- A 血常规
- B 血培养
- C 血沉
- D 胸部X片

E. 痰培养

正确答案：D 您选择的答案：

第87题 患儿，2岁。百日咳后持续发热半月余，体温在38℃左右，易倦纳差，消瘦，近1周头痛，烦躁，时有呕吐，体检：心肺听诊无异常，肝肋下1.0cm，颈强(±)，脑脊液：外观清，蛋白(+)，细胞数： $80 \times 10^6/L$ ，糖： 2.5 mmol/L ，氯化物 115 mmol/L ，诊断为

- A 百日咳合并脑炎
- B 中毒性脑病
- C 结核性脑膜炎
- D 病毒性脑膜炎
- E 化脓性脑膜炎

正确答案：C 您选择的答案：

第88题 患儿，2岁。近20天低热，咳嗽，盗汗，乏力，双肺呼吸音粗，胸部X线见左肺哑铃“双极影”，下列哪项不是判断活动性肺结核的主要指征

- A 未接种卡介苗“OT”试验 20mm
- B 结核中毒症状
- C 血沉增快，无其他原因解释
- D 痰液中找到C杆菌
- E 纤维支气管镜检查有明显支气管结核病变

正确答案：D 您选择的答案：

第89题 1岁半，男孩。1个月来痉挛性阵发性咳嗽，伴低热来诊。双肺呼吸音粗，未闻及啰音。结核菌素试验，红肿硬结直径18mm。X线胸透：右肺门阴影增大模糊，右中叶不张。接种过卡介苗，用过青霉素和先锋霉素V等，效果不好。血白细胞 $9.5 \times 10^9/L$ ，中性0.40，淋巴0.60。初步诊断是

- A 肺炎合并肺不张
- B 百日咳合并肺炎
- C 支气管淋巴结核
- D 肺原发综合征
- E 支气管异物

正确答案：C 您选择的答案：

第90题 4岁小儿，近3月低热、乏力、消瘦、纳差，咳嗽，体检全身浅表淋巴结黄豆大小，肺部无啰音，OT试验(+)，胸片右肺可见哑铃状阴影，诊断为

- A 支气管肺炎
- B 支气管淋巴结核
- C 原发综合征
- D 浸润型肺结核
- E 支气管炎

正确答案：C 您选择的答案：

第91题 男孩，8岁。反复发热10余天，以发热待查收住院。其祖父患肺结核。该患儿因发热在院外每天用地塞米松5mg。体检：无明显阳性体征，结核菌素试验阴性。说明

- A 未受过结核感染
- B 已感染结核，但尚未产生变态反应
- C 机体免疫反应受到抑制
- D 重症结核病人假阴性
- E 未接种过卡介苗

正确答案：C 您选择的答案：

三、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第92-94题

患儿，6个月。高热10余日，咳嗽，气促，其母患肺结核，体检：精神萎靡，面色苍白，双肺呼吸音粗，肝肋下2.5cm，脾触及边缘，前囟膨隆，颈强(±)，OT试验阴性，胸片：双肺中外带均有粟粒状阴影

1. 为进一步确诊需做以下何检查

- A 血常规
- B 血培养
- C 痰液查找结核菌
- D 脑脊液检查
- E 支气管镜检查

2. 患儿OT试验出现阴性反应，最可能的原因为

- A 没有受过结核菌感染
- B 初次感染尚未产生变态反应
- C 机体免疫反应受到抑制
- D 技术误差
- E 试剂失效

3. 该患儿最可能的诊断为

- A 粟粒性肺结核
- B 结核性脑膜炎
- C 结核性脑膜炎+肺炎
- D 全身血行播散性结核病
- E 肺含铁血黄素沉着症

正确答案：DCD 您选择的答案：

第95-97题

患儿，2岁。低热，盗汗，乏力半个月余，头痛，间断抽搐5天，体检精神萎靡，颈强，克氏征阳性，胸片正常，OT试验(+++)，脑脊液细胞数 $320 \times 10^6/L$ 中性0.4，淋巴0.6，蛋白(+)，诊断为结核性脑膜炎

1. 该患儿强化治疗应选择
 - A 异烟肼+利福平+链霉素+强的松
 - B 异烟肼+利福平+乙胺丁醇+强的松
 - C 异烟肼+利福平+吡嗪酰胺+强的松
 - D 异烟肼+链霉素+吡嗪酰胺+强的松
 - E 异烟肼+利福平+链霉素+川比嗪酰胺+强的松
 2. 该患儿应用强的松的总疗程是
 - A 4~6周
 - B 4~8周
 - C 6~8周
 - D 8~12周
 - E 12~16周
 3. 应用强的松的目的不是为了
 - A 抑制炎症渗出
 - B 减轻脑水肿
 - C 降低颅内压
 - D 防止脑室孔道及颅底部纤维粘连
 - E 减轻症状, 缩短病程
- 正确答案：EDE 您选择的答案：

第98-100题

6岁女孩, 因间断低热伴痉挛性咳嗽半月余来诊。体检: 体温37.6, 神志清楚, 慢性病容, 左眼结膜充血, 内眦部有一疱疹, 咽部轻度充血, 右颈侧可触及2~3个2cm×2cm大小淋巴结, 无明显压痛, 心肺无异常, 肝在肋下1cm。胸透; 右肺门可见3cm×3cm大小圆形阴影。末梢血象白细胞 $6.5 \times 10^9/L$, 淋巴0.70。

1. 最可能的诊断是
 - A 百日咳合并肺部感染
 - B 支原体肺炎
 - C 支气管淋巴结结核
 - D 霉菌性肺炎
 - E 肺门淋巴肉瘤
 2. 最佳治疗方案应首选
 - A 红霉素口服
 - B 红霉素+氨苄青霉素
 - C 链霉素+异烟肼+利福平
 - D 异烟肼+PAS
 - E 长春新碱+环磷酰胺+泼尼松
 3. 该患儿有一2岁胞弟, 此时对其胞弟应采取哪项最佳预防措施
 - A 呼吸道隔离
 - B 口服红霉素7~10天
 - C 口服异烟肼6个月
 - D 定期体检, 尽早发现病情
 - E 尽快接种百白破疫苗
- 正确答案：CCC 您选择的答案：

第101-103题

患儿, 3岁。发热半月余, 咳嗽、乏力, 消瘦, 盗汗。体检: 双肺呼吸音粗, X线检查为原发综合征, "OT"试验"++"

1. 该病基本病理改变为
 - A 肿胀、渗出、增殖
 - B 肿胀、渗出、坏死
 - C 肿胀、增殖、坏死
 - D 渗出、增殖、坏死
 - E 渗出、增殖、硬化
 2. 该患强化阶段治疗选择
 - A 异烟肼+利福平
 - B 异烟肼+链霉素
 - C 异烟肼+利福平+链霉素
 - D 异烟肼+利福平+乙胺丁醇
 - E 异烟肼+链霉素+乙胺丁醇
 3. 该患应用异烟肼疗程是
 - A 3~6个月
 - B 6~9个月
 - C 9~12个月
 - D 12~18个月
 - E 18~24个月
- 正确答案：DCD 您选择的答案：

第104-106题

女孩5岁, 其母患结核性胸膜炎, 故来体检, 双肺听诊呼吸音粗, 胸部透视未见异常, 欲做"OT"试验

1. 1:20000OT稀释液0.1ml内含结素单位为
 - A 0.1单位
 - B 1单位
 - C 2单位
 - D 5单位
 - E 10单位
2. 观测反应结果应在
 - A 15分钟
 - B 30分钟
 - C 12~24小时
 - D 24~48小时
 - E 48~72小时

3. 该患儿OT试验1:2000结果,硬结直径15mm,为

- A "—"
- B "+"
- C "++"
- D "+++"
- E "++++"

正确答案:DEC 您选择的答案:

第107-108题

患儿2岁,低热2月余,咳嗽、消瘦、食欲不振,夜间汗多,体检双肺呼吸音粗,未闻及湿啰音,OT试验(+ +),胸片检查为原发综合征。

1. 该病的基本病理改变为

- A. 渗出、增殖和坏死
- B. 渗出和肿胀
- C. 渗出和增殖
- D. 坏死和增殖
- E. 坏死

2. 该病强化阶段的治疗选择

- A. 异烟肼+利福平
- B. 异烟肼+链霉素
- C. 异烟肼+利福平+链霉素
- D. 异烟肼+利福平+乙胺丁醇
- E. 异烟肼+链霉素+吡嗪酰胺

正确答案:AC 您选择的答案:

四、A4型题:以下提供若干个案例,每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息,在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第109-111题

患儿3岁,因发热,头痛,呕吐3天伴强直性抽搐2次入院。体检:意识模糊,营养差,颈抵抗阳性,右侧鼻唇沟较浅,右眼闭合不全,心肺腹未见异常,Kerning征、Barbinski征阳性,脑脊液蛋白0.8g/L,糖2.24mmol/L(40mg%),氯化物100mmol/L(585mg/dl),白细胞 $60 \times 10^6/L$ (60/mm³),多核45%,单核55%。

1. 最可能的诊断是

- A. 化脓性脑膜炎
- B. 病毒性脑膜脑炎
- C. 结核性脑膜炎
- D. 中毒性脑病
- E. 隐球菌性脑膜炎

2. 为进一步明确诊断,最有价值的检查是

- A. 做结核菌素试验
- B. 做血培养
- C. 脑脊液乳酸盐测定
- D. 脑脊液免疫球蛋白测定
- E. 脑脊液找菌

3. 该患儿治疗的最佳方案是

- A. 青霉素+氯霉素
- B. 对症处理+中药
- C. INH+RFP
- D. INH+RFP+SM+PZA+泼尼松
- E. 青霉素+庆大霉素

正确答案:CED 您选择的答案:

第112-114题

患儿3岁,因发热,头痛,呕吐3天伴强直性抽搐2次入院。体检:意识模糊,营养差,颈抵抗阳性,右侧鼻唇沟较浅,右眼闭合不全,心肺腹未见异常,Kerning征、Barbinski征阳性,脑脊液蛋白0.8g/L,糖2.24mmol/L(40mg%),氯化物100mmol/L(585mg/dl),白细胞 $60 \times 10^6/L$ (60/mm³),多核45%,单核55%。

1. 若该患儿入院后反复惊厥,尿少,尿渗透压增加,此时应考虑发生了

- A. 尿毒症
- B. 急性肾功能衰竭
- C. 稀释性低钠血症
- D. 脑性失盐综合征
- E. 低钙惊厥

2. 为进一步证实诊断,应考虑首先查

- A. 血钙
- A. 血钠
- C. 血镁
- D. 血糖
- E. 肾功能

3. 治疗宜采取

- A. 3%氯化钠静滴
- B. 10%葡萄糖酸钙静滴
- C. 25%硫酸镁深部肌注
- D. 10%葡萄糖静滴
- E. 限制水、钠入量

正确答案:CBA 您选择的答案:

五、B1型题:以下提供若干组考题,每组考题共用在前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第115-118题

- A 异烟肼
- B 利福平
- C 乙胺丁醇
- D 链霉素
- E 吡嗪酰胺

- 1. 大剂量可致神经兴奋、多发性神经炎
- 2. 副作用为肝损害，关节痛
- 3. 副作用为球后视神经炎
- 4. 听神经损害，婴儿慎用

正确答案：AECD 您选择的答案：

第119-120题

- A 利福平
- B 异烟肼
- C 链霉素
- D 吡嗪酰胺
- E 乙胺乙醇

- 1. 半效杀菌药，能杀死在碱性环境中生长、分裂、繁殖活跃的细胞外的结核菌
- 2. 半效杀菌药，能杀灭在酸性环境中细胞内结核菌及干酪病灶内代谢缓慢的结核菌

正确答案：CD 您选择的答案：

第121-122题

- A. 性情改变、嗜睡、呕吐
- B. 烦躁不安，昏睡、剧吐
- C. 意识朦胧、半昏迷、惊厥
- D. 病初腹壁反射及膝反射消失
- E. 颅神经中最常见视神经受损

- 1. 结核性脑膜炎早期是
- 2. 结核性脑膜炎晚期是

正确答案：AC 您选择的答案：

习题集 儿科学 呼吸系统疾病

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 支气管肺炎一般用鼻前庭导管氧流量为

- A 0.25~0.5L/min
- B 0.5~1L/min
- C 1~2L/min
- D 2~3L/min
- E 3~4L/min

正确答案：B 您选择的答案：

第2题 治疗小儿支气管肺炎首选的抗生素是

- A. 青霉素
- B. 复方新诺明
- C. 红霉素
- D. 氨苄西林
- E. 阿莫西林

正确答案：A 您选择的答案：

第3题 婴幼儿易患上呼吸道感染主要是由以下原因所致，但应除外

- A. 鼻和鼻腔相对短小
- B. 鼻道无鼻毛
- C. 鼻道黏膜柔嫩
- D. 喉呈漏斗形较成人宽
- E. 4~10岁咽扁桃体发育达高峰

正确答案：D 您选择的答案：

第4题 哪一项不是肺炎的病因分类

- A. 病毒性肺炎
- B. 细菌性肺炎
- C. 衣原体肺炎
- D. 真菌性肺炎
- E. 间质性肺炎

正确答案：E 您选择的答案：

第5题 小儿上呼吸道感染的病因错误的是

- A. 各种病毒和细菌均可引起
- B. 以病毒为多见，占60%
- C. 可继发细菌感染，最常见为溶血性链球菌、肺炎链球菌等
- D. 肺炎支原体也可引起
- E. 佝偻病、营养不良的小儿易患本病

正确答案：B 您选择的答案：

第6题 婴幼儿呼吸类型是

- A. 胸式呼吸
- B. 腹式呼吸
- C. 腹膈式呼吸
- D. 胸膈式呼吸
- E. 主动呼吸

正确答案：C 您选择的答案：

第7题 冷凝集试验用于诊断

- A. 结核感染
- B. 呼吸道合胞病毒肺炎
- C. 巨细胞病毒感染
- D. 支原体肺炎
- E. 链球菌感染

正确答案：D 您选择的答案：

第8题 支气管肺炎合并心力衰竭时，应立即给予何种处理

- A 立即口服地高辛
- B 立即静脉给予心肌营养剂
- C 立即静脉给予酚妥拉明
- D 立即静脉给予地塞米松
- E 立即静脉给予毒毛K制剂

正确答案：E 您选择的答案：

第9题 肺炎时应用激素的适应证应除外

- A. 中毒症状明显
- B. 严重喘憋
- C. 剧烈的咳嗽
- D. 中毒性脑病
- E. 感染性休克

正确答案：C 您选择的答案：

第10题 对于患支原体肺炎的患儿，首选抗生素是

- A 红霉素

- B 青霉素
- C 氨苄青霉素
- D 先锋霉素
- E 庆大霉素

正确答案：A 您选择的答案：

第11题 以下哪项不符合毛细支气管炎的特征

- A. 2~6个月婴儿多见
- B. 呼吸困难，喘憋为突出表现
- C. 病原体多为呼吸道合胞病毒感染
- D. 可有梗阻性肺气肿体征
- E. 红霉素治疗有效

正确答案：E 您选择的答案：

第12题 发生高热惊厥的常见年龄是

- A. 新生儿
- B. 1~6个月
- C. 6个月~5岁
- D. 3~7岁
- E. 7~14岁

正确答案：C 您选择的答案：

第13题 支气管肺炎缺氧明显时，氧浓度为

- A 40%~50%
- B 50%~60%
- C 60%~70%
- D 70%~80%
- E 30%~40%

正确答案：B 您选择的答案：

第14题 关于腺病毒肺炎的临床特点，以下哪项是错误的

- A. 多见于6个月以下小婴儿
- B. 急起稽留高热
- C. 咳嗽重，有喘憋及呼吸困难
- D. 肺部体征出现晚，X线改变出现早
- E. 病灶吸收缓慢

正确答案：A 您选择的答案：

第15题 引起病毒性肺炎占首位的是

- A 腺病毒
- B 流感病毒
- C 合胞病毒
- D 副流感病毒
- E 肠道病毒

正确答案：C 您选择的答案：

第16题 支气管肺炎缺氧明显者，宜用面罩给氧，氧流量为

- A 1~2L/min
- B 2~4L/min
- C 4~5L/min
- D 5~6L/min
- E 6~7L/min

正确答案：B 您选择的答案：

第17题 下列哪一项是重症肺炎的主要确定依据

- A. 高热
- B. 剧烈咳嗽
- C. 喘息
- D. 全身多系统损害
- E. X线见融合病灶

正确答案：D 您选择的答案：

第18题 关于小儿呼吸系统的生理特点，以下哪项不正确

- A. 年龄越小，呼吸频率越快
- B. 婴幼儿呈腹式呼吸
- C. 婴幼儿呼吸潜在力较年长儿大
- D. 小儿气体弥散量较成人小
- E. 小儿气道阻力较成人大

正确答案：C 您选择的答案：

第19题 关于金黄色葡萄球菌肺炎的临床特点，以下哪项是错误的

- A. 起病急，病情重
- B. 弛张高热
- C. 中毒症状明显
- D. 肺部体征出现较晚
- E. 合并脓胸、肺大疱

正确答案：D 您选择的答案：

第20题 支气管肺炎合并心力衰竭的表现，以下哪项是错误的

- A. 心率突然>180次/分

B. 呼吸突然加快>60次 / 分
C. 极度烦躁不安
D. 突然高热达40.0
E. 肝脏迅速增大
正确答案：D 您选择的答案：

第21题 急性肺炎病程为
A 1个月内
B 2个月内
C 3个月内
D 4个月内
E 5个月内
正确答案：A 您选择的答案：

第22题 支气管肺炎合并呼吸性酸中毒的原因有
A CO₂潴留
B 需氧代谢障碍
C 高热
D 饥饿
E 吐泻
正确答案：A 您选择的答案：

第23题 支气管肺炎与支气管炎的主要鉴别点是
A. 发热的高低
B. 咳嗽的轻重
C. 食欲的好坏
D. 肺部是否有固定的中小水泡音
E. 血白细胞数的高低
正确答案：D 您选择的答案：

第24题 迁延性肺炎的病程为
A. <1月
B. 1~2月
C. 1~3月
D. 2~3月
E. 2.5~3月
正确答案：C 您选择的答案：

第25题 小儿上呼吸道感染常见的病原体是
A. 病毒
B. 肺炎链球菌
C. 链球菌
D. 真菌
E. 支原体
正确答案：A 您选择的答案：

第26题 小儿重症肺炎，最常见的酸碱平衡紊乱是
A. 呼吸性酸中毒
B. 代谢性酸中毒
C. 呼吸性碱中毒
D. 代谢性碱中毒
E. 混合性酸中毒
正确答案：E 您选择的答案：

第27题 最易合并脓胸的肺炎是
A 合胞病毒肺炎
B 金黄色葡萄球菌肺炎
C 支原体肺炎
D 腺病毒肺炎
E 间质性肺炎
正确答案：B 您选择的答案：

第28题 小儿上呼吸道感染的临床表现下正确的是
A. 婴儿局部症状重而全身症状轻
B. 小婴儿主要表现为发热、咳嗽、食欲差、呕吐腹泻等
C. 年长儿主要表现为鼻塞、流涕、咳嗽、咽痛及发热等
D. 咽部充血，有的可有扁桃体肿大
E. 并发症在婴幼儿多见
正确答案：A 您选择的答案：

第29题 小儿肺炎合并脓胸时应给予的最佳治疗
A 大剂量有效抗生素治疗
B 胸腔闭式引流
C 胸腔穿刺排脓
D 胸廓成形术治疗
E 中成药治疗
正确答案：B 您选择的答案：

第30题 金黄色葡萄球菌肺炎，首选的抗生素是
A 青霉素

- B 红霉素
- C 氨卡青霉素
- D 耐青霉素酶青霉素
- E 先锋霉素

正确答案：D 您选择的答案：

第31题 关于婴幼儿呼吸道免疫特点，以下哪项是错误的

- A．气道纤毛运动功能差
- B．血清免疫球蛋白含量低
- C．气道局部SIgA含量低
- D．肺泡巨噬细胞功能不足
- E．咳嗽反射和气管平滑肌收缩功能尚可

正确答案：E 您选择的答案：

第32题 金黄色葡萄球菌肺炎的特点不正确的是

- A．起病急剧，中毒症状严重
- B．咳嗽和呼吸困难
- C．肺部体征出现较晚
- D．易合并神经、循环及胃肠功能障碍
- E．易并发脓胸及脓气胸

正确答案：C 您选择的答案：

第33题 对于病毒性肺炎早期快速的病原学检查法是

- A 病毒分离及鉴定
- B 冷凝集试验
- C 双份血清抗体测定
- D 免疫荧光法
- E 抗原检测

正确答案：D 您选择的答案：

第34题 支气管肺炎诱发心力衰竭的主要原因是

- A 肺动脉高压，中毒性心肌炎
- B 肺动脉高压，微循环障碍
- C 中毒性心肌炎，代谢性酸中毒
- D 肺动脉高压，代谢性酸中毒
- E 肺动脉高压，呼吸性酸中毒

正确答案：A 您选择的答案：

第35题 支气管肺炎重症往往出现

- A 代谢性酸中毒
- B 代谢性碱中毒
- C 混合性酸中毒
- D 呼吸性碱中毒
- E 呼吸性酸中毒

正确答案：C 您选择的答案：

第36题 支气管肺炎肾上腺皮质激素常用

- A 氢化考的松
- B 泼尼松
- C 强的松龙
- D 甲基强的松龙
- E 地塞米松

正确答案：E 您选择的答案：

第37题 支气管肺炎和支气管炎的鉴别主要是

- A．发热的温度
- B．咳嗽的严重程度
- C．肺部闻及粗湿啰音
- D．肺部闻及固定的细湿啰音
- E．血象的白细胞计数

正确答案：D 您选择的答案：

第38题 引起小儿支气管肺炎脓胸的病原菌主要是

- A 肺炎双球菌
- B 链球菌
- C 葡萄球菌
- D 革兰阴性杆菌
- E 厌氧菌

正确答案：C 您选择的答案：

第39题 引起支气管肺炎最常见的细菌是

- A．金黄色葡萄球菌
- B．流感嗜血杆菌
- C．肺炎链球菌
- D．肺炎支原体
- E．肺炎衣原体

正确答案：C 您选择的答案：

第40题 易并发脓胸、脓气胸的肺炎是

- A．呼吸道合胞病毒肺炎

- B. 腺病毒肺炎
- C. 葡萄球菌肺炎
- D. 支原体肺炎
- E. 衣原体肺炎

正确答案：C 您选择的答案：

第41题 支原体肺炎确诊时，最有参考价值的检验是

- A. 血常规
- B. 血清嗜异凝集反应
- C. 反应蛋白
- D. 冷凝集试验
- E. 血清病毒抗体滴定

正确答案：D 您选择的答案：

第42题 关于急性上呼吸道感染的部位，以下哪项不正确

- A. 鼻
- B. 鼻窦
- C. 咽
- D. 喉
- E. 气道

正确答案：E 您选择的答案：

第43题 关于呼吸道合胞病毒肺炎的发病年龄正确的是

- A. 多见于1岁，尤以6个月以内小儿多见
- B. 多见于2岁以内，尤以6个月以内小儿多见
- C. 多见于3岁以内，尤以6个月以内小儿多见
- D. 多见于1~3岁，尤以2~6个月小儿多见
- E. 多见于4~5岁，尤以6个月以内小儿多见

正确答案：B 您选择的答案：

第44题 6个月以内婴儿无热性支气管肺炎应考虑

- A. 葡萄球菌肺炎
- B. 合胞病毒肺炎
- C. 革兰阴性杆菌肺炎
- D. 肺炎支原体肺炎
- E. 衣原体肺炎

正确答案：E 您选择的答案：

第45题 婴儿气道的解剖生理特点不正确的是

- A. 婴儿的气管、支气管较成人狭窄
- B. 气道粘膜柔嫩、血管丰富
- C. 软骨柔软，缺乏弹力组织，支撑作用薄弱
- D. 粘液腺分泌不足，气道较干燥，纤毛运动差
- E. 左支气管较右侧短而粗

正确答案：E 您选择的答案：

第46题 婴幼儿时期最常见的肺炎是

- A. 支气管肺炎
- B. 大叶性肺炎
- C. 间质性肺炎
- D. 毛细支气管肺炎
- E. 节段性肺炎

正确答案：A 您选择的答案：

第47题 小儿易发生间质性肺炎的原因是

- A. 免疫功能发育不完善
- B. 呼吸中枢发育不健全
- C. 气道黏膜柔嫩，血管丰富
- D. 肺血管丰富，间质发育旺盛
- E. 呼吸肌不发达

正确答案：D 您选择的答案：

第48题 呼吸道合胞病毒肺炎最突出的临床表现是

- A. 干咳
- B. 低-中度发热
- C. 呼吸困难
- D. 喘憋
- E. 严重的中毒症状

正确答案：D 您选择的答案：

第49题 疱疹性咽峡炎引起的病毒为

- A. 合胞病毒
- B. 腺病毒
- C. 柯萨奇病毒A组
- D. 流感病毒
- E. 副流感病毒

正确答案：C 您选择的答案：

第50题 以下是小儿支气管肺炎WHO推荐的第1线抗生素，但应除外

- A. 复方新诺明

- B. 青霉素
- C. 氨苄青霉素
- D. 羟氨苄青霉素
- E. 头孢菌素类抗生素

正确答案：E 您选择的答案：

第51题 婴幼儿呼吸道感染时易发生呼吸困难与下列各项因素有关，但除外

- A. 纵隔相对较大，占胸腔体积较大
- B. 鼻道和鼻咽腔相对短而狭窄，黏膜柔软，血管丰富，感染时极易充血肿胀
- C. 鼻咽部及咽部相对狭小，并有丰富淋巴组织，且咽壁组织疏松，易发生咽后壁或咽旁脓肿
- D. 喉部狭窄呈漏斗状，黏膜柔软，炎症时易发生局部水肿
- E. 气管和支气管腔相对狭窄，黏膜柔软，血管丰富，炎症时易充血水肿阻塞

正确答案：A 您选择的答案：

第52题 支气管肺炎一般用鼻前庭导管氧浓度不超过

- A 10%
- B 20%
- C 40%
- D 50%
- E 60%

正确答案：C 您选择的答案：

第53题 诊断小儿金黄色葡萄球菌肺炎，哪项特点最具价值

- A 起病急，全身中毒症状重
- B 白细胞总数高，出现核左移
- C 有猩红热样皮疹
- D 呈弛张热型，有长达2周
- E 易发生脓胸，肺大泡，脓气胸，多发性脓肿

正确答案：E 您选择的答案：

第54题 急性支气管炎的主要症状

- A 发热
- B 咳嗽
- C 气促
- D 发绀
- E 吐泻

正确答案：B 您选择的答案：

第55题 引起急性上呼吸道感染的主要病原为

- A 细菌
- B 病毒
- C 真菌
- D 原虫
- E 螺旋体

正确答案：B 您选择的答案：

第56题 小儿急性毛细支气管炎的病原体，常常最主要的是

- A 金黄色葡萄球菌
- B 呼吸道合胞病毒
- C 腺病毒
- D 支原体
- E 肺炎双球菌

正确答案：B 您选择的答案：

第57题 在肺炎的分类中，支气管肺炎属下列哪种分类

- A. 病理分类
- B. 病因分类
- C. 病种分类
- D. 病情分类
- E. 以上都不是

正确答案：A 您选择的答案：

第58题 肺炎支原体肺炎最突出的临床症状是

- A. 年长儿多见
- B. 全身中毒症状不重
- C. 肺部体征不明显
- D. 高热
- E. 频繁、剧烈的咳嗽

正确答案：E 您选择的答案：

第59题 咽结合膜热的病原体是

- A. 柯萨奇病毒
- B. 腺病毒
- C. 呼吸道合胞病毒
- D. 流感病毒
- E. 衣原体

正确答案：B 您选择的答案：

第60题 下列哪一项不是呼吸道合胞病毒肺炎的特点

- A. 起病急骤，突然喘憋

- B. 持续高热、稽留不退
- C. 出现呼气性呼吸困难
- D. 两肺有明显的哮鸣音
- E. 易出现呼吸性酸中毒

正确答案：B 您选择的答案：

第61题 小儿肺的呼吸功能，下列哪项不正确

- A. 安静时婴幼儿需用30%肺活量呼吸，呼吸潜在量较年长儿低
- B. 正常婴幼儿每分通气量按体表面积计算与成人相似
- C. 小儿气道阻力较成人小，且随年龄增大而增大
- D. 正常婴幼儿每分CO₂排出量以单位肺容积计算与成人相似
- E. 小儿肺的适应性较成人低，当有呼吸道感染时，易致通气不畅

正确答案：C 您选择的答案：

第62题 支原体肺炎，X线的特点主要是

- A. 内中带，中下野，小点片状阴影
- B. 大小不等片状阴影，融合成大病灶
- C. 肺纹理增强及肺气肿
- D. 肺下部呈云雾状浸润影，有游走性
- E. 多发性脓肿，脓胸，脓气胸

正确答案：D 您选择的答案：

第63题 关于上呼吸道感染的治疗，以下哪项不正确

- A. 口服潘生丁(双嘧达莫)
- B. 肌注三氮唑核苷
- C. 阿昔洛韦滴眼
- D. 布洛芬混悬剂降温
- E. 大剂量抗生素静滴

正确答案：E 您选择的答案：

第64题 关于腺病毒肺炎错误的是

- A. 多见于6个月~2岁的小儿
- B. 稽留高热、萎靡嗜睡，咳嗽剧烈
- C. 喘憋、发绀
- D. 肺部体征出现较早
- E. X线表现片状、大小不等的阴影

正确答案：D 您选择的答案：

第65题 关于金黄色葡萄球菌肺炎的特点不正确的是

- A. 多见于新生儿及婴幼儿
- B. 冬春季节发病较多
- C. 肺组织出血、坏死和多发性小脓肿形成
- D. 中毒症状重
- E. X线的特征较固定

正确答案：E 您选择的答案：

第66题 在小儿下呼吸道解剖组织特点中，以下哪项是错误的

- A. 气管和支气管腔相对狭窄，黏膜血管丰富
- B. 黏膜纤毛运动差，不能很好地排出微生物
- C. 肺脏弹力组织发育差，血管丰富
- D. 肺泡数量少，含气量相对较少
- E. 喉呈漏斗状，喉腔狭窄

正确答案：E 您选择的答案：

第67题 病毒性肺炎目前以下列那种发病率最高

- A. 腺病毒肺炎
- B. 呼吸道合胞病毒肺炎
- C. 巨细胞病毒肺炎
- D. 流感病毒肺炎
- E. 柯萨奇病毒肺炎

正确答案：B 您选择的答案：

第68题 支气管肺炎，患儿停用抗生素的时间是

- A. 抗生素用至体温正常后2~3天
- B. 抗生素用至体温正常后5~7天
- C. 抗生素用至体温正常后7~9天
- D. 抗生素用至体温正常后1~2周
- E. 抗生素用至体温正常后9~11天

正确答案：B 您选择的答案：

第69题 支原体肺炎的临床特点，下列哪项是正确的

- A. 小婴儿多见
- B. 多无发热
- C. 咳嗽突出
- D. 肺部体征明显
- E. 头孢菌素治疗有效

正确答案：C 您选择的答案：

第70题 扁桃体的发育高峰是

- A. 3~6个月

- B. 6个月~1岁
- C. 1~4岁
- D. 4~10岁
- E. 10~15岁

正确答案：D 您选择的答案：

第71题 治疗支气管肺炎抗生素应持续用至

- A. 体温正常后2~3天
- B. 体温正常后2~5天
- C. 体温正常后3~7天
- D. 体温正常后5天
- E. 体温正常后5~7天

正确答案：E 您选择的答案：

第72题 下列那一项提示小气道梗阻

- A. 吸气时出现喘鸣音伴吸气相延长
- B. 呼气时出现喘鸣音伴吸气相延长
- C. 呼气时出现喘鸣音伴呼气相延长
- D. 吸气时肺部是否有固定的湿啰音
- E. 吸气时肺部是否有不固定的中、粗湿啰音

正确答案：C 您选择的答案：

第73题 小儿肺活量为

- A 30~50ml / kg
- B 50~70ml / kg
- C 70~90ml / kg
- D 90~110ml / kg
- E 110~130ml / kg

正确答案：B 您选择的答案：

第74题 腺病毒肺炎最易出现的并发症是

- A 脓气胸，脓胸
- B 肺大泡
- C 张力性气胸
- D 心力衰竭
- E 肺脓肿

正确答案：D 您选择的答案：

第75题 在小儿支气管肺炎，激素应用的适应证中，应除外

- A. 中毒症状明显
- B. 严重喘憋
- C. 伴有中毒性脑病
- D. 严重咳嗽
- E. 胸膜有渗出

正确答案：D 您选择的答案：

第76题 细菌性肺炎最常见的病原体是

- A. 链球菌
- B. 葡萄球菌
- C. 肺炎链球菌
- D. 肺炎支原体
- E. 肺炎杆菌

正确答案：C 您选择的答案：

第77题 关于小儿呼吸系统的解剖特点，以下哪项是错误的

- A. 婴幼儿气道相对狭窄
- B. 肺含血量丰富而含气量相对较少
- C. 咽扁桃体炎多见于婴儿期
- D. 气道黏液腺分泌不足，较干燥
- E. 婴幼儿胸廓呈桶状

正确答案：C 您选择的答案：

第78题 沙眼衣原体肺炎的临床特点，下列哪项是正确的

- A. 6个月以内婴儿多见
- B. 起病急
- C. 高热
- D. 肺实变体征
- E. 青霉素有特效

正确答案：A 您选择的答案：

第79题 由于小儿呼吸道解剖特点，易患下列疾病，但应除外

- A. 耳咽管相对较宽、直、短，呈水平位，易引起中耳炎
- B. 膈肌位置较高，心脏呈横位，气胸时易致纵隔移位
- C. 学龄前期和学龄期儿童呼吸道炎时，常伴扁桃体炎
- D. 小儿右侧支气管腔位置较为垂直，气管异物易进入右侧
- E. 鼻腔黏膜与鼻窦黏膜相连续，且鼻窦口相对较大，急性鼻炎时易致鼻窦炎

正确答案：B 您选择的答案：

第80题 小儿重症肺炎出现腹胀明显，其原因多是

- A 低锌血症

- B 消化不良
- C 中毒性肠麻痹
- D 高钾血症
- E 低钠血症

正确答案：C 您选择的答案：

第81题 支气管肺炎最主要的诊断依据是

- A ．发热
- B ．咳嗽
- C ．气促
- D ．呼吸困难
- E ．肺部有较固定的中细湿啰音

正确答案：E 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第82题 1.5岁男孩，发热咳嗽，气促1周，突然呼吸困难加重，查体：体温39.5℃，心率161次/分，呼吸62次/分，左胸部呼吸运动受限，语颤减弱，叩诊浊音，听诊呼吸音消失，腹部平坦，肝在肋下1.5cm，根据病例诊断最大的可能是

- A 肺炎合并心衰
- B 肺炎合并心肌炎
- C 肺炎合并中毒性脑病
- D 肺炎合并脓胸
- E 肺炎合并脓气胸

正确答案：D 您选择的答案：

第83题 6个月婴儿，发热1天，体温38.0℃，伴咳嗽，喘憋明显。体检：呼吸急促，有呼气性呼吸困难，鼻翼扇动，三凹征阳性，双肺满布哮鸣音，偶闻中小水泡音。胸部X线片：肺纹理增多，双肺可见小点片状阴影，肺气肿明显。最可能的诊断是

- A ．衣原体肺炎
- B ．金葡菌肺炎
- C ．腺病毒肺炎
- D ．呼吸道合胞病毒肺炎
- E ．支原体肺炎

正确答案：D 您选择的答案：

第84题 5个月男孩，发热，咳嗽，喘憋3天，查体：体温37.5℃，呼吸68次/分，呼气性呼吸困难，呼气时有呻吟，伴明显鼻扇及三凹征，满肺喘鸣音，底部有细湿啰音，白细胞 $7.0 \times 10^9/L$ ，淋巴占78%，本病例诊断最大的可能是

- A 呼吸道合胞病毒肺炎
- B 腺病毒肺炎
- C 葡萄球菌肺炎
- D 革兰阳性杆菌肺炎
- E 肺炎支原体肺炎

正确答案：A 您选择的答案：

第85题 8岁女患儿，近一周乏力，身体不适，咳嗽剧烈，微热，近三天胸痛及头痛，咳嗽加重，影响睡眠，肺部听诊仅在肺下部局限性呼吸音减低，X线示：右肺下部呈云雾状，浸润影，此患儿最应考虑的诊断是

- A 急性支气管肺炎
- B 金葡菌肺炎
- C 病毒性肺炎
- D 支原体肺炎
- E 毛细支气管肺炎

正确答案：D 您选择的答案：

第86题 男孩，18个月。咳嗽5天，发热，气喘一天，查体：38℃，咽赤(+)，呼吸急促，唇轻度发绀，诊断为急性支气管肺炎，对于诊断有利的体征是

- A 呼吸急促，口周发绀
- B 肺间不固定的水泡音及哮鸣音
- C 鼻翼扇动及三凹征阳性，肺部固定中小水泡音
- D 呼气性呼吸困难
- E 三凹征阳性

正确答案：C 您选择的答案：

第87题 3月婴儿，因急起高热、咳嗽和呼吸急促2天入院。T39.5℃，呼吸55次/分，P156次/分，精神萎靡，嗜睡状态，面色苍灰，皮肤见较多的猩红热样皮疹，双肺听诊闻及较多的中细湿啰音，腹胀明显，肠鸣音减弱，胸部X线浸润阴影，该病最可能的诊断是

- A ．肺炎球菌肺炎
- B ．肺炎支原体肺炎
- C ．金黄色葡萄球菌肺炎
- D ．流感嗜血杆菌肺炎
- E ．间质性肺炎

正确答案：C 您选择的答案：

第88题 6个月女孩，突然出现极度烦躁不安，呼吸困难加重。查体：心率191次/分，呼吸69次/分，精神不振，唇周明显发绀，面色苍白，心音低钝，双肺叩诊正常，可闻及较密集的细湿啰音，肝肋下3.5cm中度硬，本病例诊断最大的可能是

- A 支气管肺炎合并心肌炎

- B 支气管肺炎合并中毒性脑病
- C 支气管肺炎合并心力衰竭
- D 支气管肺炎合并中毒性肠麻痹
- E 支气管肺炎合并DIC

正确答案：C 您选择的答案：

第89题 患儿，男，1.5岁，咳嗽，发热三天，双肺闻及散在的细湿啰音及广泛呼气时哮鸣音，血常规：白细胞： $15 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞60%，胸部正位片，两下肺散在斑片影，诊断最可能是

- A 合胞病毒肺炎
- B 支气管肺炎
- C 支原体肺炎
- D 腺病毒肺炎
- E 金黄色葡萄球菌肺炎

正确答案：B 您选择的答案：

第90题 5月婴儿，受凉后第2天出现咳嗽，T：38.5，呼吸急促，有喘憋症状，精神较差，食欲下降，大便3~4次/日，黄色稀便，尿量可。体查：神清，R50次/分，P120次/分，鼻扇，唇微发绀，吸气性三凹征(+)，肺部可闻及哮鸣音，心腹(-)，X线有点片状阴影。可能的诊断是

- A. 呼吸道合胞病毒肺炎
- B. 腺病毒肺炎
- C. 金黄色葡萄球菌肺炎
- D. 流感嗜血杆菌肺炎
- E. 肺炎支原体肺炎

正确答案：A 您选择的答案：

第91题 5个月男孩，发热，咳嗽，呼吸困难1周。查体：体温37.4，呼吸56次/分，心率210次/分，精神不振，唇周发绀，三凹征阳性，双肺满布喘鸣音，叩诊清音，肝肋下4cm，中度硬，胸部X线双肺显示散在的小片状阴影及肺气肿，根据病例诊断最大的可能是

- A 呼吸道合胞病毒肺炎合并心力衰竭
- B 腺病毒肺炎合并心力衰竭
- C 葡萄球菌肺炎合并心力衰竭
- D 革兰阴性杆菌肺炎合并心力衰竭
- E 肺炎支原体肺炎合并心力衰竭

正确答案：A 您选择的答案：

第92题 2岁的小儿，因咳嗽、高热、呼吸困难伴呕吐腹泻3天就诊，T40，精神差，烦躁不安，R52次/分，P154次/分，口唇发绀，鼻扇和三凹征明显，肺部听诊无明显的湿啰音，X线检查呈线条状或单条状阴影增生，有的相互交叉成网状，伴有小点状致密影，该病可能为

- A. 间质性肺炎
- B. 毛细支气管炎
- C. 腺病毒肺炎
- D. 金黄色葡萄球菌肺炎
- E. 衣原体肺炎

正确答案：A 您选择的答案：

第93题 1岁男孩，持续发热5天，体温达39.0，伴咳嗽，喘憋，精神差，嗜睡，发病4天后，肺部出现中小水泡音，血白细胞 $7 \times 10^9/L$ ，中性0.40，淋巴0.60。肺部X线片示：左肺散在斑片影，右肺下野见大片密度增高影。最可能的诊断是

- A. 衣原体肺炎
- B. 金葡菌肺炎
- C. 腺病毒肺炎
- D. 呼吸道合胞病毒肺炎
- E. 支原体肺炎

正确答案：C 您选择的答案：

第94题 2.5岁男孩突然起病，高热持续38.5~41.3，面色苍白，咳嗽，气促，给青霉素治疗1周疗效不佳。查体：呼吸56次/分，心率171次/分，胸部X线示右侧肋膈角变钝，呈一片致密阴影，肋间隙增宽，纵隔及心向左侧移位，根据病例诊断最大可能是

- A 金葡萄肺炎合并脓胸
- B 金葡萄肺炎合并脓气胸
- C 金葡萄肺炎合并肺大疱
- D 金葡萄肺炎合并肺气肿
- E 肺不张

正确答案：A 您选择的答案：

第95题 5岁男孩；发热10天，热型不定，伴刺激性咳嗽，咯出少量粘稠痰，查体：精神尚可，双肺呼吸粗糙及少许喘鸣音。X线显示肺门阴影明显的增浓，根据病例诊断最大的可能是

- A 呼吸道合胞病毒肺炎
- B 腺病毒肺炎
- C 葡萄球菌肺炎
- D 支原体肺炎
- E 衣原体肺炎

正确答案：D 您选择的答案：

第96题 2岁，男孩。在以肺炎住院期间，突然自觉呼吸困难，全身中毒症状加重，频繁咳嗽不止，血压正常，此患儿出现了哪个并发症

- A 中毒性脑病
- B 支气管扩张
- C DIC
- D 休克

E 脓胸

正确答案：E 您选择的答案：

第97题 4个月女孩咳嗽，喘憋4天，查体：体温37℃，呼吸70次/分，有明显的鼻扇及三凹征，口唇周围发绀，两肺布满喘鸣音，底部有少许细湿啰音，胸部X线可见肺纹理增强，小片阴影及肺气肿，本病例诊断最大可能是

- A 金葡菌肺炎
- B 革兰阴性杆菌肺炎
- C 肺炎支原体肺炎
- D 腺病毒肺炎
- E 呼吸道合胞病毒肺炎

正确答案：E 您选择的答案：

第98题 患儿，男，1岁。咳嗽持续1个月，近三日突然高热，咳嗽频繁，痰多，患儿按时预防接种，三年前有结核接触史，查体：39℃，R:40次/分，面色苍白，心脏正常，右肺底闻及细小水泡音，肝肋下2cm质软，白细胞： $4.0 \times 10^9/L$ ，淋巴细胞65%，OT试验阴性，最可能诊断

- A 支气管炎
- B 支气管肺炎
- C 原发肺结核
- D 粟粒性肺结核
- E 支气管异物

正确答案：B 您选择的答案：

第99题 1岁男孩，发热2天，咳嗽，喘一日，已诊断支气管肺炎，确诊最主要的体征是

- A 三凹征(+)
- B 双肺闻及细水泡音
- C 呼吸急促
- D 口唇发绀
- E 双肺闻及哮鸣音

正确答案：B 您选择的答案：

第100题 14个月女孩，稽留高热2周。咳嗽较剧，喘憋和发绀明显，左肺下叩之发浊，听诊呼吸音减弱，腹胀明显，肠鸣音消失，胸部X片：左肺下可见大片状阴影。白细胞： $5.3 \times 10^9/L$ ，淋巴77%，根据病例诊断最大可能是

- A 支原体肺炎合并中毒性肠麻痹
- B 革兰阴性杆菌肺炎合并中毒性肠麻痹
- C 葡萄球菌肺炎合并中毒性肠麻痹
- D 革兰阴性杆菌肺炎合并心衰
- E 腺病毒肺炎合并中毒性肠麻痹

正确答案：E 您选择的答案：

第101题 1岁男孩，因发热，咳嗽，气促10天来诊，查体：体温38.5~41.2℃之间，嗜睡，皮肤可见荨麻疹样皮疹，呼吸急促，鼻扇及三凹征阳性，两肺可闻及散在中细湿啰音，化验：白细胞 $27 \times 10^9/L$ ，中性90%。X线检查：两肺可见小片状阴影，根据病例诊断

- A 葡萄球菌肺炎
- B 腺病毒肺炎
- C 肺炎支原体肺炎
- D 革兰阴性杆菌肺炎
- E 呼吸道合胞病毒肺炎

正确答案：A 您选择的答案：

第102题 2岁女孩，发热，咳嗽，气促1周，查体：精神不振，面色苍白，呼吸困难，皮肤可见荨麻疹样皮疹，双肺可闻及细湿啰音，X线检查显示：多发性小脓肿，易变，根据本病例诊断最大可能性是

- A 革兰阴性杆菌肺炎
- B 肺炎支原体肺炎
- C 腺病毒肺炎
- D 呼吸道合胞病毒肺炎
- E 葡萄球菌肺炎

正确答案：E 您选择的答案：

第103题 门诊病人，2岁。发热，咽痛2天，体温38.0~39.0℃，因热不退于第3天来诊。体检：体温38.5℃，精神好，咽充血，肺呼吸音清。白细胞： $5.8 \times 10^9/L$ ，中性0.40。下一步治疗应采取

- A 抗生素、激素、安痛定"三联针"肌注
- B 静脉点滴青霉素，肌注安痛定
- C 服中成药，布洛芬混悬剂，多饮水
- D 肌注青霉素、安痛定
- E 静滴10%葡萄糖注射液500ml，肌注柴胡

正确答案：C 您选择的答案：

第104题 7岁的男孩，1周前受凉后出现鼻塞和流涕、咳嗽，无明显的发热，现鼻塞和流涕消失，但咳嗽渐加重，尤以夜间明显，无呼吸困难，两肺可闻及干湿啰音，X线胸片显示右肺下叶呈浸润性改变，诊断可能为

- A 肺炎球菌肺炎
- B 金黄色葡萄球菌肺炎
- C 流感嗜血杆菌肺炎
- D 腺病毒肺炎
- E 肺炎衣原体肺炎

正确答案：E 您选择的答案：

第105题 患儿，7个月。咳嗽，喘息三天查体：37.0℃，鼻翼扇动，口唇轻度发绀，双肺闻及广泛的哮鸣音及少许中小水泡音，临床初步诊断是毛细支气管炎肺炎，本病最突出的临床特点是

- A 体温一般不超过38℃
- B 有明显的中毒症状

- C 肺部有明显的湿性啰音
D 突发喘憋呼吸困难
E 肺部残留死腔减少

正确答案：D 您选择的答案：

第106题 2岁男孩，发热伴咳嗽4天，呼吸困难1天，T40℃，口周发绀，气管向左侧移位，右侧肺部呼吸运动减弱，叩诊实音，听诊呼吸音减弱，左侧可闻及中细湿啰音诊断可能为

- A．肺炎支原体肺炎合并胸腔积液
B．呼吸道合胞病毒肺炎合并胸腔积液
C．腺病毒肺炎合并胸腔积液
D．金黄色葡萄球菌肺炎合并胸腔积液
E．衣原体肺炎合并胸腔积液

正确答案：D 您选择的答案：

第107题 男孩，6个月。患肺炎入院第二天，突然烦躁不安，面色苍白，呼吸增快，120次/分，心率：180次/分，音纯，双肺闻及密集的小水泡音，肝增大，肋下3cm，心电图：T波低平，考虑患儿出现了哪种并发症

- A 肺不张
B 肺大泡
C 气胸
D 脓胸
E 心力衰竭

正确答案：E 您选择的答案：

第108题 10月女孩，咳嗽5天，喘4天。查体：T37℃，鼻扇(+)，双肺闻及哮鸣音及少许水泡音，肝大，质软，血化验：白细胞 $11 \times 10^9/L$ ，胸部正位片：双肺纹理增强，双肺通过度增加，该患初步诊断

- A 支气管哮喘
B 喘息性支气管炎
C 急性支气管炎
D 急性毛细支气管炎肺炎
E 肺炎伴心力衰竭

正确答案：D 您选择的答案：

第109题 1岁女孩，急起高热1天，伴流涎、厌食。体检：咽部充血，咽腭弓、悬雍垂、软腭等处可见2~4mm大小疱疹，心肺检查无异常，最可能的诊断是

- A．疱疹性咽颊炎
B．鹅口疮
C．咽结合膜热
D．猩红热
E．疱疹性咽颊炎

正确答案：E 您选择的答案：

第110题 6个月女婴，流涕，咳3天，近半天高热，体温39.4℃，抽搐一次约3分钟自行缓解，查体：精神萎靡，前囟平，咽充血，双肺未闻及中小水泡音，脑膜刺激征阴性，血常规，白细胞 $5 \times 10^9/L$ ，该患儿诊断最可能是

- A 肺炎，高热惊厥
B 上感，高热惊厥
C 中毒性脑病
D 手足搐搦症
E 脑炎

正确答案：B 您选择的答案：

第111题 患儿5岁，弛张高热，气促，咳嗽有黄痰，突然出现明显的呼吸困难、烦躁、剧烈咳嗽、面色发绀、不能平卧，查体：胸廓饱满，叩诊上方呈鼓音、下方胸廓叩诊呈实音，听诊呼吸音减弱，心率140次/min，肝大肋下2.0cm，可能合并

- A．心力衰竭
B．气胸
C．脓气胸
D．肺不张
E．中毒性脑病

正确答案：C 您选择的答案：

第112题 女婴，1.5岁。由于皮肤脓疱疹破溃感染后出现咳嗽，弛张热4天，喘息1日，查体：精神状态极差，呼吸快，右上肺闻及细啰音，右肺叩诊浊音，血常规： $28 \times 10^9/L$ ，中性：88%，胸片检查：多发性脓肿，该诊断为

- A 支原体肺炎合并胸腔积液
B 腺病毒肺炎合并胸腔积液
C 金黄色葡萄球菌肺炎合并脓气胸
D 金黄色葡萄球菌肺炎合并脓胸
E 合胞病毒肺炎合并脓胸

正确答案：D 您选择的答案：

第113题 患儿3岁，咳嗽三天，近1天，查：呼吸急促，三凹征阴性，双肺呼吸音粗，闻少许哮鸣音，心脉正常，诊断为急性支气管炎，支气管炎肺炎与本病主要区别是

- A 刺激性咳嗽，频繁
B 喘息
C 肺部固定湿啰音
D 口唇发绀
E 白细胞增高，以中性为主

正确答案：C 您选择的答案：

第114题 门诊就诊，10岁，女患儿。干咳四天，伴胸痛，发热三天，体温37.5℃，双肺未闻及中小水泡音，血常规，白细胞 $9.0 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞65%，X线正位片示：右下肺片状阴影，为诊断应首选哪项检查

- A OT试验
- B ESR
- C 血常规
- D 冷凝集试验
- E 嗜异凝集试验

正确答案：D 您选择的答案：

第115题 1岁男孩，持续高热，咳嗽7天，伴喘憋，嗜睡2天，今日惊厥2次，抽后神志不清。体检：浅昏迷，体温39.5℃，呼吸80次/分，心率180次/分，面色苍白，口周发绀，三凹征明显，两肺呼吸音粗，左背下部叩诊浊音，可闻支气管呼吸音及中细湿啰音，心音低钝，肝肋下4cm，前囟饱满，Kerning征阴性，Barbinski征阳性，血白细胞 $10 \times 10^9/L$ 。脑脊液检查：细胞数 $6 \times 10^6/L$ ，潘氏试验阴性，糖3.6mmol/L，氯化物12mmol/L。最可能的诊断是

- A. 腺病毒肺炎，心力衰竭，中毒性脑病
- B. 粟粒性肺结核，结脑
- C. 呼吸道合胞病毒肺炎，心力衰竭，高热惊厥
- D. 金葡菌肺炎，心力衰竭，高热惊厥
- E. 支原体肺炎，心力衰竭，化脓性脑膜炎

正确答案：A 您选择的答案：

第116题 18个月男孩，高热稽留7天，伴咳嗽，呼吸困难，查体：精神不振，面色苍白，气促，心音低钝，心率171次/分，心律不齐，右肺背部叩诊发浊，呼吸音减低，可闻及散在湿啰音，肝在肋下1.0cm，心电图：显示窦性心动过速，ST段下移1.2，T波平坦。根据以上病例诊断最大的可能是

- A 呼吸道合胞病毒肺炎合并心肌炎
- B 腺病毒肺炎合并心肌炎
- C 金葡萄肺炎合并心肌炎
- D 革兰阴性杆菌肺炎合并心肌炎
- E 肺炎支原体肺炎合并心肌炎

正确答案：B 您选择的答案：

第117题 2岁男孩，发热，咳嗽，气促2周余，近2天呼吸困难突然加重，咳嗽剧烈，查体精神不振，烦躁不安，面色青紫，右肺叩诊上方呈鼓音，下方呈浊音，呼吸音消失，肝肋下1.0cm，根据病例诊断最大的可能是

- A 肺炎合并心肌炎
- B 肺炎合并脓胸
- C 肺炎合并心衰
- D 肺炎合并脓气胸
- E 肺炎合并DIC

正确答案：D 您选择的答案：

第118题 6岁女孩，高热、咽痛、眼部刺痛2天。体检：咽部充血，一侧眼球结膜炎，可能的诊断是

- A. 咽结合膜热
- B. 红眼病
- C. 川崎病
- D. 流行性感冒
- E. 疱疹性咽颊炎

正确答案：A 您选择的答案：

第119题 1.5岁女孩，咳嗽1周，气促，精神正常，食欲尚可，无明显异物史，查体：体温37.8℃，双肺呼吸音粗糙及有不固定的干湿啰音，胸部X线显示，肺纹理增粗，根据病例诊断最大的可能是

- A 支气管异物
- B 肺结核
- C 急性支气管炎
- D 支气管炎
- E 哮喘性支气管炎

正确答案：C 您选择的答案：

第120题 1岁男孩，高热6天，持续38.5~40.7℃之间，伴咳嗽，气促，查体：精神不振，面色苍白，呼吸急促，皮肤可见猩红热样皮疹，双肺闻及细湿啰音，X线胸片，可见多发性肺脓肿，根据病例诊断最大可能是

- A 呼吸道合胞病毒肺炎
- B 腺病毒肺炎
- C 金葡萄肺炎
- D 革兰阳性杆菌肺炎
- E 支原体肺炎

正确答案：C 您选择的答案：

第121题 1岁男孩，发热，咳嗽，气促1周，近一天惊厥4次，意识不清，查体：嗜睡，双眼凝视，球结膜水肿，前囟隆起，双肺散在中细湿啰音，脑膜刺激征阳性，巴氏征阳性，脑脊液除压力增高外，其他均正常，根据病例诊断最大的可能是

- A 肺炎合并轻度缺氧
- B 肺炎合并结脑
- C 肺炎合并化脑
- D 肺炎合并心衰
- E 肺炎合并脑水肿

正确答案：E 您选择的答案：

第122题 3岁女孩，高热3天，T39.5℃，诉咽痛和眼部刺痛，恶心呕吐伴腹泻、腹痛，检查咽充血明显，两眼滤泡性结合膜炎，颈部和耳后淋巴结肿大，心肺腹检查无特殊。可能的诊断为

- A. 流行性感冒
- B. 麻疹早期
- C. 猩红热早期
- D. 咽-结合膜热

E. 急性阑尾炎

正确答案：D 您选择的答案：

第123题 9月男孩，咳嗽，喘息已3天，呼吸增快，心率142次/分，喘憋，闻及两肺广泛哮鸣音，诊断为毛细支气管炎，该患的治疗加用何种药物对缓解喘憋效果好

- A 异丙肾上腺素
- B 肾上腺皮质激素
- C 肾上腺素
- D α -糜蛋白酶雾化吸入
- E 氨茶碱

正确答案：B 您选择的答案：

第124题 小儿，2月。发热一天，咳嗽3天，有痰咳不出，偶有喘息，哺乳时明显，三凹征(-)，双肺未闻及中小湿啰音，心脏听诊正常，最可能诊断是

- A 支气管肺炎
- B 支气管炎
- C 上呼吸道感染
- D 支气管哮喘
- E 支气管扩张

正确答案：B 您选择的答案：

第125题 1岁小儿，发热，咳嗽4天，呼吸困难，精神差，躯干部皮肤见充血性粟粒样丘疹，右肺叩诊浊音，呼吸音低，右上肺闻及细湿啰音，气管左移，白细胞 $28 \times 10^9/L$ ，中性0.88。最可能的诊断是

- A 腺病毒肺炎并胸腔积液
- B 金葡菌肺炎并脓胸
- C 金葡菌肺炎伴气胸
- D 支原体肺炎并胸腔积液
- E 肺结核并结核性胸膜炎

正确答案：B 您选择的答案：

第126题 2岁男孩，急起高热，流涎，厌食。查体：咽部充血，咽腭弓、软腭等处2~4mm大小的疱疹，心、肺未见异常。最可能的诊断是

- A 疱疹性口炎
- B 鹅口疮
- C 疱疹性咽峡炎
- D 猩红热
- E 咽结合膜热

正确答案：C 您选择的答案：

三、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第127-129题

男孩，1.5岁。已发热，咳嗽1周，近三天气促喘息加重，查体：面色苍白，烦躁，双肺听诊闻及中小水泡音，病史中曾有过皮肤脓疱疹，白细胞 $19 \times 10^9/L$ ，分叶90%，淋巴细胞10%

1. 该患儿下述哪项治疗不当

- A 吸氧
- B 用敏感抗生素
- C 支气管解痉剂
- D 保持呼吸道通畅
- E 静点氢化可地松

2. 患儿用抗生素3天后，突然出现烦躁不安，呼吸困难加重，咳嗽频繁，左肺呼吸音减弱，肺底叩诊呈浊音，此时最重要的治疗是

- A 再加一种抗生素
- B 大流量吸氧
- C 用呼吸机进行辅助治疗
- D 给予镇静药
- E 左胸腔穿刺排脓

3. 该患儿最可能的诊断是

- A 金黄色葡萄球菌肺炎
- B 肺炎双球菌肺炎
- C 腺病毒肺炎
- D 呼吸道合胞病毒肺炎
- E 支原体肺炎

正确答案：EEA 您选择的答案：

第130-132题

3岁小儿，高热、咳嗽伴呼吸急促1天入院。T40℃，呼吸54次/分，脉搏168次/分。体查：精神差，面色苍白，烦躁不安，皮肤见猩红热样皮疹，气管右移，左侧胸廓饱满，听诊呼吸音减低，右侧可闻及较多的细湿啰音，心率168次/分，心音低钝，律齐，腹软，肝脏不大。

1. 该患儿最可能的诊断是

- A 呼吸道合胞病毒肺炎
- B 腺病毒肺炎
- C 支原体肺炎
- D 肺炎球菌肺炎
- E 金黄色葡萄球菌肺炎

2. 该患儿的紧急治疗措施应首选

- A 大剂量的抗生素静滴

- B. 加强止咳
 - C. 鼻导管吸氧
 - D. 强心治疗和吸氧
 - E. 胸腔闭式引流
3. 对该病的治疗应选用
- A. 红霉素
 - B. 青霉素
 - C. 青霉素+氨苄青霉素
 - D. 先锋霉素
 - E. 耐青霉素酶的青霉素

正确答案：EEE 您选择的答案：

第133-135题

患儿，男，7岁。咳嗽一周，喘3天，无发热，门诊就诊

1. 为证实患肺炎，下列哪项检查最有价值

- A. 观察一般状态，生命体征
- B. 有无三凹征
- C. 肝是否增大
- D. 心音是否低钝，有无奔马律
- E. 肺部有无水泡音

2. 哪项检查对诊断有帮助

- A. 血常规
- B. 病毒分离
- C. X线正位片
- D. 冷凝集试验
- E. OT试验

3. 患儿治疗，哪项不必要

- A. 止咳祛痰
- B. 平喘
- C. 抗生素
- D. 输血
- E. 适当镇静

正确答案：ECD 您选择的答案：

第136-138题

患儿，1岁。弛张热，发热5天，咳嗽，气喘4天，用青霉素静点4天症状好转不明显，今日突然烦躁，呼吸困难，阵发性咳嗽，查体：体温39℃，R60次/分，心率增快，170次/分，节律整，气管出现右移，胸片示左肺液气胸

1. 该患儿最可能的诊断是

- A. 腺病毒肺炎
- B. 金葡萄菌肺炎
- C. 毛细支气管炎
- D. 支原体肺炎
- E. 肺炎双球菌肺炎

2. 该患紧急急救措施应首选

- A. 吸氧
- B. 解痉剂
- C. 镇咳剂
- D. 强心利尿
- E. 胸腔闭式引流

3. 该病的治疗，应选择何种抗生素

- A. 先锋霉素
- B. 红霉素
- C. 氨苄青霉素
- D. 氨苄青霉素+青霉素
- E. 耐青霉素酶的青霉素

正确答案：BEE 您选择的答案：

第139-141题

1岁男孩，发热、咳嗽5天，精神尚可，食欲不振。体检：体温38.5℃，呼吸50次/分，心率150次/分，口唇略青紫，轻度三凹征，两肺散在中小水泡音，肝肋下2cm，胸片示：两肺散在小点片状阴影。

1. 最可能的诊断是

- A. 毛细支气管炎
- B. 腺病毒肺炎
- C. 支原体肺炎
- D. 金葡萄肺炎
- E. 肺炎链球菌肺炎

2. 治疗首选何种抗生素

- A. 头孢噻肟
- B. 红霉素
- C. 庆大霉素
- D. 青霉素
- E. 氧氟沙星

3. 用药时间应为

- A. 体温正常后5~7天，临床症状消失后3天
- B. 至少2~3周
- C. 体温正常后1天停药
- D. 咳止停药
- E. 体温正常后继续用药2周

正确答案：EDA 您选择的答案：

第142-144题

7个月女孩，以发热，咳嗽，喘憋6天为主诉入院。入院后第二天患儿突然面色灰白，极度烦躁不安，呼吸明显增快，60次/分，听心音低钝，节律整。心率180次/分，呈奔马律，双肺闻及广泛的水泡音，肝肋下3cm，下肢有浮肿，血常规：白细胞 $55 \times 10^9/L$ ，胸片双肺见小片状影，肺纹理增强。肺气肿

1. 该患儿最可能的诊断

- A 支气管肺炎合并心力衰竭
- B 支气管肺炎合并中毒性脑病
- C 支气管肺炎合并休克
- D 支气管肺炎合并肝炎
- E 支气管肺炎合并心肌炎

2. 产生本病并发症的病因是

- A 循环充血和高血压
- B 肺动脉高压合并中毒性心肌炎
- C 心率过快
- D 弥散性血管内凝血
- E 末梢循环衰竭

3. 该并发症的急救措施，首选是

- A 2:1等张含钠液扩容
- B 能量合剂，丹参等营养心肌
- C 静脉给予毒毛K制剂
- D 护肝，保肝
- E 降低脑水肿，营养脑细胞

正确答案：ABC 您选择的答案：

第145-146题

患儿，6月咳喘3天入院，下午突然喘憋加重，口唇发绀，鼻翼扇动，查体：呼吸80次/分，三凹征阳性，两肺闻及广泛哮鸣音，右肺底闻及少许小水泡音，血白细胞 $4.0 \times 10^9/L$ ，淋巴细胞60%，胸部正位片，见少量点片状影及肺气肿

1. 最可能的诊断是

- A 腺病毒肺炎
- B 肺炎双球菌肺炎
- C 合胞病毒肺炎
- D 金葡菌肺炎
- E 哮喘性支气管炎

2. 该患最易出现的并发症是

- A 心力衰竭
- B 脓胸
- C 脓气胸
- D 代谢性酸中毒
- E 中毒性肠麻痹

正确答案：CA 您选择的答案：

第147-149题

7个月小儿，咳嗽流涕2天，发热半天，体温 $39.0^\circ C$ ，惊厥1次，5分钟后自行缓解。体检：神志清，前囟平坦，肺呼吸音清，无脑膜刺激征。白细胞 $6.5 \times 10^9/L$ ，血钙 $2.24mmol/L$ 。

1. 最可能的诊断是

- A 上呼吸道感染，简单型高热惊厥
- B 肺炎，中毒性脑病
- C 肺炎，维生素D缺乏性手足搐搦
- D 化脓性脑膜炎
- E 肺炎，高热惊厥

2. 为进一步明确诊断，最有意义的检查是

- A 血培养
- B 热退1周后做脑电图
- C 脑脊液检查
- D 头颅CT
- E 头颅B超

3. 治疗宜采用

- A 立即止惊
- B 立即降温
- C 大剂量抗生素静滴
- D 大剂量抗病毒药静滴
- E 降温、止惊、抗病毒治疗

正确答案：ABE 您选择的答案：

第150-152题

2岁男孩，持续高热伴咳嗽6天，加重1天，烦躁、气促，青霉素治疗无效。体检：体温 $39.5^\circ C$ ，口唇青紫，三凹征明显，呼吸65次/分，心率160次/分，气管略右移，左背下部呼吸音低，叩诊浊音，肝肋下2cm，X线胸片示：两肺散在斑片状阴影，左肺下部密度均匀升高，可见自外上向内下的反抛物线状边缘。

1. 本病例最可能的诊断为

- A 肺炎链球菌肺炎
- B 金黄色葡萄球菌肺炎
- C 支原体肺炎
- D 腺病毒肺炎
- E 呼吸道合胞病毒肺炎

2. 本例发生的并发症为

- A 败血症
- B 脓胸
- C 脓气胸
- D 肺大疱

- E. 肺脓疡
3. 最主要的治疗措施是
A. 退热
B. 镇静剂
C. 抗生素
D. 强心利尿
E. 雾化吸入

正确答案：BBC 您选择的答案：

第153-154题

患儿9月，咳嗽1周，高热2天伴抽2次由外院转入。查体：T40℃，R53次/分，P150次/分，嗜睡状态，呼吸急促，双上肢不自主的抽动，肺部听诊可闻及较多的细湿啰音，腹软，肝脏肋下1.5厘米，巴氏征阴性；白细胞 $5.0 \times 10^{12}/L$ ，脑脊液检查：压力140cmH₂O，白细胞5个/L，潘氏试验(-)，糖和氯化物正常。

1. 该患儿最可能的诊断应考虑

- A. 病毒性脑炎
B. 细菌性脑炎
C. 高热惊厥
D. 中毒性脑病
E. 瑞氏综合征

2. 首选的紧急措施是

- A. 镇静止惊
B. 退热降温
C. 大剂量的抗生素
D. 强心利尿
E. 补充钙剂

正确答案：DA 您选择的答案：

第155-156题

患儿，男，8个月。咳嗽，发热一周，喘憋3天，逐渐加重，今日开始嗜睡，抽搐2次，体温不退高达39.5℃，查体：呼吸急促，R 56次/分，心率100次/分，双肺广泛的中小水泡音，肝肋下1cm，白细胞 $4 \times 10^9/L$ ，脑脊液检查：压力升高，糖、氯化物正常，细胞数个，蛋白定性阴性

1. 此时最首选的紧急措施是

- A. 镇静止抽
B. 物理降温+退热剂
C. 应用广谱抗生素
D. 给予毒毛K快速洋地黄制剂
E. 静脉给10%葡萄糖酸钙

2. 该患儿最可能的诊断是

- A. 腺病毒肺炎为合并中毒性脑病
B. 瑞氏综合征
C. 病毒性脑炎
D. 肺炎，高热惊厥
E. 金葡萄菌肺炎合并中毒脑病

正确答案：AA 您选择的答案：

四、A4型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第157-160题

4个月男孩，低热伴咳嗽2天，喘憋加重1天，精神、食欲尚可。体检：体温37.8℃，呼吸60次/分，心率150次/分，两肺满布哮鸣音，两背下部可闻及细湿啰音，肝肋下3.5cm。

1. 为尽快明确病原学诊断，应进一步做何种病原学检查

- A. ESR
B. ASO
C. 冷凝集试验
D. ELISA法检测病原体抗原
E. CRP

2. 若上述检查结果为阳性，胸部X线拍片示两肺有不同程度的梗阻性肺气肿和支气管周围炎，考虑最可能的诊断是

- A. 毛细支气管炎
B. 金葡萄肺炎
C. 腺病毒肺炎
D. 肺炎支原体肺炎
E. 哮喘性支气管炎

3. 该病最易发生的并发症为

- A. 心力衰竭
B. 自发性气胸
C. 脓胸
D. 中毒性脑病
E. 以上均不是

4. 按可能的病原体选择药物，以下哪项最合适

- A. 青霉素+氨苄青霉素
B. 头孢菌素类+红霉素
C. 三氮唑核苷
D. 头孢噻肟
E. 氨苄西林

正确答案：DAAC 您选择的答案：

五、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次

或不被选择。

第161-163题

- A 呼吸道合胞病毒肺炎
- B 葡萄球菌肺炎
- C 革兰阴性杆菌肺炎
- D 腺病毒肺炎
- E 肺炎支原体肺炎

1. 体征以喘鸣音为主的肺炎是
2. 体征以实变为主的肺炎是
3. 多伴稽留高热的肺炎是

正确答案：ADD 您选择的答案：

第164-166题

- A 稽留高热
- B 弛张高热
- C 低热
- D 不发热
- E 热型不定

81. 腺病毒肺炎
82. 肺炎支原体肺炎
83. 葡萄球菌肺炎

正确答案：AEB 您选择的答案：

第167-170题

- A. 发热、流涕、鼻塞、咽痛、咽充血
- B. 发热、咽痛、咽充血，咽部有灰白色小丘疹、疱疹或溃疡
- C. 发热、咽痛、颈部、耳后淋巴结可肿大，咽充血、眼结膜充血
- D. 发热、音哑、犬吠样咳嗽，吸气性呼吸困难，咽充血
- E. 发热、咽痛、咽充血，扁桃体肿大，有脓性分泌物

1. 咽结合膜热
2. 疱疹性咽峡炎
3. 化脓性扁桃体炎
4. 急性喉炎

正确答案：CBED 您选择的答案：

第171-174题

- A 喘憋为突出表现
 - B 咳频，喘憋，发绀
 - C 常见猩红热样或荨麻疹样皮疹
 - D 全身中毒症状明显，重者意识障碍甚至休克
 - E 刺激性咳嗽为突出表现
1. 肺炎支原体肺炎
 2. 葡萄球菌肺炎
 3. 腺病毒肺炎
 4. 呼吸道合胞病毒肺炎

正确答案：ECBA 您选择的答案：

第175-176题

- A. 小片状阴影，肺纹理增多，肺气肿多见
 - B. X线早于肺部体征的出现，大小不等的片状阴影或融合成大的病灶
 - C. X线肺浸润或多发性肺脓肿
 - D. 多种多样，基本改变为支气管肺炎
 - E. 以肺门阴影增浓为突出
1. 葡萄球菌肺炎
 2. 腺病毒肺炎

正确答案：CB 您选择的答案：

第177-179题

- A. 支气管肺炎
 - B. 急性支气管炎
 - C. 肺结核
 - D. 支气管异物
 - E. 急性喉炎
1. 犬吠样咳嗽，声嘶、喉鸣
 2. 双肺听诊可闻及固定的中小水泡音
 3. 肺部呼吸音粗，有不固定干啰音

正确答案：EAB 您选择的答案：

第180-183题

- A. 肺炎支原体
- B. 肺炎链球菌
- C. 金黄色葡萄球菌
- D. 呼吸道合胞病毒
- E. 腺病毒

1. 支气管肺炎最常见的病原是
2. 最易合并肺脓肿的病原是
3. 易形成坏死性肺炎的病原体是
4. 最易形成喘憋性肺炎的病原是

正确答案：BCED 您选择的答案：

第184-187题

- A. 小片阴影，肺纹理增多，肺气肿多见
- B. X线早于体征，大小不等的片状阴影或融合成大病灶
- C. 肺浸润，多发性肺脓肿
- D. 多种多样，基本改变为支气管肺炎征象
- E. 以肺门阴影增浓为突出
- 1. 葡萄球菌肺炎
- 2. 腺病毒肺炎
- 3. 呼吸道合胞病毒肺炎
- 4. 肺炎支原体肺炎

正确答案：CBAE 您选择的答案：

第188-190题

- A. 柯萨奇A组病毒
- B. 腺病毒3、7型
- C. 流感、副流感病毒
- D. 呼吸道合胞病毒
- E. 冠状病毒
- 1. 咽结合膜热病原为
- 2. 疱疹性咽峡炎病原为
- 3. 流行性感冒病原为

正确答案：BAC 您选择的答案：

第191-193题

- A. 红霉素
- B. 氯霉素
- C. 庆大霉素
- D. 青霉素
- E. 头孢氨苄
- 1. WHO推荐的一线抗生素, 治疗肺炎的首选药
- 2. 我国卫生部对轻症肺炎推荐用
- 3. 衣原体肺炎选用

正确答案：DEA 您选择的答案：

习题集 儿科学 感染性疾病

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 麻疹具有传染性的时间是

- A. 潜伏期至出疹后5天
- B. 潜伏期至出疹后10天
- C. 出疹前5天至出疹后5天
- D. 接触麻疹后7天至出疹后10天
- E. 接触麻疹后5天至出疹后5天

正确答案：C 您选择的答案：

第2题 典型水痘皮疹的特点中，哪项是错误的

- A. 初起于四肢
- B. 分批出现的红色斑疹或斑丘疹，并迅速发展成为小水痘
- C. 粘膜皮疹可出现在口腔、结膜、生殖器等处
- D. 水痘从中心处开始干瘪，迅速结痂
- E. 在疾病高峰期可见到丘疹、新旧水疱和结痂同时存在

正确答案：A 您选择的答案：

第3题 我国中毒型细菌性痢疾常见的病原体为

- A. 志贺痢疾杆菌
- B. 福氏痢疾杆菌
- C. 鲍氏痢疾杆菌
- D. 宋氏痢疾杆菌
- E. 舒密次痢疾杆菌

正确答案：B 您选择的答案：

第4题 关于中毒性痢疾下述哪项是错误的

- A. 多见于2~7岁体质较好小儿
- B. 本病的发生与患儿特异性体质有关
- C. 由痢疾杆菌裂解后释放出大量外毒素进入血循环所致
- D. 未腹泻前即出现严重的感染中毒症状
- E. 临床分型: 休克型、脑型、混合型

正确答案：C 您选择的答案：

第5题 以下哪项不符合中毒型菌痢的临床表现

- A. 突然高热，体温可高达40.0
- B. 反复惊厥
- C. 面色苍白，四肢厥冷，血压偏低，脉压缩小
- D. 意识由烦躁、谵妄而进入昏迷
- E. 脑膜刺激征阳性

正确答案：E 您选择的答案：

第6题 关于风疹出疹期的临床特点，以下哪项不正确

- A. 发热1~3天，可见皮疹
- B. 耳后、枕部及颈后淋巴结肿大伴触痛
- C. 皮疹始于面部，24小时内遍及全身，历时3天
- D. 皮疹呈多形性，大部分是散在斑丘疹
- E. 疹退后有皮肤脱屑和脱皮

正确答案：E 您选择的答案：

第7题 无并发症的麻疹患儿，从出疹日起计算，应隔离的天数是

- A. 3天
- B. 5天
- C. 7天
- D. 10天
- E. 14天

正确答案：B 您选择的答案：

第8题 麻疹的出疹时间和表现是

- A. 发热2~3日出疹，出疹时仍有中、低度发热
- B. 发热1~2日出疹，出疹后体温升高
- C. 发热3~4日出疹，出疹时体温升高
- D. 发热1~2日出疹，以后热渐退
- E. 发热3~4日出疹，热退疹出

正确答案：C 您选择的答案：

第9题 典型麻疹皮疹的特点是

- A. 皮肤普遍充血，上有鲜红色粟粒疹
- B. 小斑丘疹，疹退后无色素沉着
- C. 大小不等的脓丘疹，无正常皮肤
- D. 红色斑丘疹，疹退后有有色素沉着及脱屑
- E. 红色出血性斑丘疹，疹退后无色素沉着

正确答案：D 您选择的答案：

第10题 猩红热是由产红疹毒素的何种病原菌引起

- A A组α溶血性链球菌
- B A组β溶血性链球菌
- C B组α溶血性链球菌
- D B组β溶血性链球菌
- E 金黄色葡萄球菌

正确答案：B 您选择的答案：

第11题 麻疹最常见的并发症是

- A . 心肌炎
- B . 肺炎
- C . 麻疹脑炎
- D . 亚急性硬化性全脑炎
- E . 球后视神经炎

正确答案：B 您选择的答案：

第12题 对麻疹前驱期诊断极有帮助的是

- A 低中度发热
- B Koplik斑
- C Pastia线
- D 皮疹
- E 草莓舌

正确答案：B 您选择的答案：

第13题 下列哪项是中毒型细菌性痢疾的临床特点

- A . 起病缓慢，低热
- B . 反复惊厥，迅速发生呼吸衰竭、休克或昏迷
- C . 临床上分为脑型、休克型两种
- D . 一般不会发生脑水肿和呼吸衰竭
- E . 抗生素治疗无效

正确答案：B 您选择的答案：

第14题 在猩红热患儿的皮疹特点中，下列哪项不正确

- A . 多在发热的第二天出现
- B . 皮肤弥漫性充血潮红，上有密集的针尖大小皮疹
- C . 出疹时可有高热
- D . 无脱皮和脱屑
- E . 可持续3~5天消退

正确答案：D 您选择的答案：

第15题 麻疹的出疹顺序为

- A 面部 躯干 四肢1日出齐
- B 颈部 四肢 躯干1日出齐
- C 耳后、颈部发际 面部、躯干、上肢 下肢足部3日出齐
- D 耳后、颈部发际 面部、躯干、上肢+下肢足部1日出齐
- E 面部 四肢 躯干3日出齐

正确答案：C 您选择的答案：

第16题 关于麻疹出疹期的临床特点，以下哪项不符合

- A . 发热3~4天出皮疹
- B . 体温可突然升高至40.0~40.5
- C . 典型红色斑丘疹
- D . 皮疹先出现于下肢
- E . 此期肺部可有湿啰音

正确答案：D 您选择的答案：

第17题 关于麻疹的预防中下列哪项错误

- A . 在接触麻疹后5天内立即给予免疫血清球蛋白0.25ml/kg可预防发病
- B . 可接种麻疹减毒活疫苗
- C . 控制传染源
- D . 合并肺炎者应隔离至出疹后5天
- E . 切断传播途径

正确答案：D 您选择的答案：

第18题 关于水痘的皮疹特点，以下哪项是错误的

- A . 潜伏期10~21天
- B . 发热1~2天后出现皮疹
- C . 皮疹一般在3~4天分批出齐
- D . 同一时期内有丘疹、疱疹和结痂
- E . 皮疹最多见于面部与四肢

正确答案：E 您选择的答案：

第19题 一般麻疹病人应隔离至

- A 出疹后3天
- B 出疹后5天
- C 出疹后7天
- D 出疹后10天
- E 出疹后14天

正确答案：B 您选择的答案：

第20题 关于麻疹前驱期的临床特点，以下哪项不符合

- A．中度以上发热
- B．上呼吸道卡他症状
- C．颊黏膜Koplik斑
- D．偶见皮肤典型斑丘疹
- E．精神不振，食欲减退，全身不适

正确答案：D 您选择的答案：

第21题 风疹与麻疹的主要鉴别点是

- A．皮疹为全身性分布
- B．呈充血性斑丘疹
- C．皮疹一日出齐
- D．全身症状轻
- E．外周血白细胞减少

正确答案：C 您选择的答案：

第22题 中毒型细菌性痢疾的休克型主要表现为

- A．高热
- B．脓血便
- C．惊厥
- D．循环衰竭
- E．呼吸衰竭

正确答案：D 您选择的答案：

第23题 风疹的隔离期为

- A 出疹后5天
- B 出疹后10天
- C 出疹后14天
- D 出疹后3周
- E 出疹后4周

正确答案：A 您选择的答案：

第24题 下列哪项不是诊断猩红热的主要临床依据

- A．发热，咽峡炎
- B．全身皮肤呈弥漫性充血性红色皮疹，疹退后有脱皮
- C．杨梅舌
- D．出疹时可于皮肤皱折处见到帕氏线和口周苍白圈
- E．常可发生变态反应性并发症

正确答案：E 您选择的答案：

第25题 脊髓灰质炎脊髓型临床表现不正确的是

- A 弛缓性瘫痪，分布不对称
- B 肌张力减退
- C 腱反射消失
- D 下肢较上肢易受累
- E 小肌群较大肌群易受累

正确答案：E 您选择的答案：

第26题 对猩红热患儿应隔离到何时

- A．体温正常
- B．症状消失
- C．皮疹脱屑干净
- D．青霉素肌注7～10天
- E．咽拭子培养连续2次阴性后

正确答案：E 您选择的答案：

第27题 下列中毒型菌痢的抢救措施中，哪项是不必要的

- A．亚冬眠疗法
- B．甘露醇+地塞米松
- C．扩充血容量+血管活性药物
- D．选用强有力的广谱抗生素
- E．维生素K1静脉注射

正确答案：E 您选择的答案：

第28题 脊髓灰质炎诊断主要表现为

- A 发热、多汗
- B 感觉过敏
- C 颈背部痛
- D 头痛、烦躁
- E 弛缓性、非对称性瘫

正确答案：E 您选择的答案：

第29题 麻疹患儿对症治疗中，以下哪项不正确

- A．苯巴比妥镇静剂
- B．镇咳祛痰剂
- C．大剂量退热剂
- D．抗生素
- E．补充维生素A

正确答案：C 您选择的答案：

第30题 关于脊髓灰质炎的流行病学下述错误的是

- A 隐性感染及轻症瘫痪型病人是主要传染源
- B 经口传播是主要传播途径
- C 不通过呼吸道传播
- D 5岁以下小儿发病率高
- E 4个月以下婴儿很少发病

正确答案：C 您选择的答案：

第31题 脊髓灰质炎病人应自起病日起至少隔离

- A 5天
- B 10天
- C 20天
- D 30天
- E 40天

正确答案：E 您选择的答案：

第32题 最有效预防麻疹的措施是

- A 应用免疫球蛋白
- B 采用麻疹减毒活疫苗
- C 应用胎盘球蛋白
- D 应用成人血浆
- E 应用维生素A

正确答案：B 您选择的答案：

第33题 在麻疹前驱期中最有诊断价值的表现是

- A 红色斑丘疹
- B Koplik斑
- C 发热
- D 鼻炎
- E 咳嗽、流涕、咽充血

正确答案：B 您选择的答案：

第34题 先天性风疹综合征不包括下列哪项表现

- A 小头畸形
- B 先天性心脏病
- C 先天性白内障
- D 肺透明膜病
- E 先天性耳聋

正确答案：D 您选择的答案：

第35题 麻疹病程中常见以下哪种维生素的缺乏

- A 维生素A
- B 维生素B
- C 维生素C
- D 维生素D
- E 维生素E

正确答案：A 您选择的答案：

第36题 典型麻疹首先出现皮疹的部位是

- A 面部、颈部
- B 耳后、颈部发际边缘
- C 躯干
- D 四肢
- E 手、足

正确答案：B 您选择的答案：

第37题 水痘的潜伏期为

- A 2周左右
- B 5~7天
- C 3~5天
- D 1~2天
- E 3周左右

正确答案：A 您选择的答案：

第38题 鉴于近年来痢疾杆菌的耐药菌株日益增多，故在应用抗生素时应考虑选用以下哪种

- A 氨苄青霉素
- B 庆大霉素
- C 磺胺甲基异噁唑
- D 头孢噻肟钠或头孢三嗪
- E 阿奇霉素

正确答案：D 您选择的答案：

第39题 麻疹合并肺炎应隔离至

- A 出疹后3天
- B 出疹后5天
- C 出疹后7天
- D 出疹后10天
- E 出疹后14天

正确答案：D 您选择的答案：

第40题 接触麻疹后多长时间行被动免疫可预防麻疹

- A. 5天内
- B. 7天内
- C. 10天内
- D. 12天内
- E. 14天内

正确答案：A 您选择的答案：

第41题 以下哪项检查最有助于中毒型菌痢的初步诊断

- A. 外周血白细胞检查
- B. 外周血血小板检查
- C. 冷盐水灌肠，取粪便镜检
- D. 大便细菌培养
- E. 脑脊液检查

正确答案：C 您选择的答案：

第42题 典型麻疹的皮疹最先出现的部位是

- A. 受压部位
- B. 耳后
- C. 四肢
- D. 躯干
- E. 面部

正确答案：B 您选择的答案：

第43题 1. 关于麻疹流行病学下述错误的是

- A. 麻疹患者是唯一传染源
- B. 接触后7天至出疹后5天均有传染性
- C. 病毒存在于眼结膜、鼻、口咽和气管等分泌物中
- D. 通过喷嚏、咳嗽等由飞沫传播
- E. 也可通过粪便传播

正确答案：E 您选择的答案：

第44题 脊髓灰质炎患者何时在鼻咽分泌物及粪便内排出病毒

- A. 发病前1~2天至发病后5天
- B. 发病前3~5天至发病后5天
- C. 发病前3~5天至发病后1周
- D. 发病前2~3天至发病后1周
- E. 发病前2~3天至发病后10天

正确答案：C 您选择的答案：

第45题 麻疹早期最有特殊意义的是

- A. 接触麻疹患者10~14天后发热
- B. 发热，流涕，喷嚏，咳嗽，结膜充血和畏光
- C. 颊黏膜Koplik斑
- D. 耳后及枕部出现淋巴结肿大
- E. 发热3~4天时，耳后发际出现斑丘疹

正确答案：C 您选择的答案：

第46题 合并肺炎的麻疹患儿，从出疹日起计算，应隔离天数是

- A. 3天
- B. 5天
- C. 7天
- D. 10天
- E. 14天

正确答案：D 您选择的答案：

第47题 在预防麻疹的被动免疫中，下列哪项正确

- A. 在接触麻疹后10天内立即给予免疫血清球蛋白0.25ml/kg可预防发病
- B. 在接触麻疹后5天内给予免疫血清球蛋白0.25ml/kg可预防发病
- C. 在接触麻疹后5天内给予免疫血清球蛋白0.05ml/kg可预防发病
- D. 在接触麻疹后10天内立即给予免疫血清球蛋白0.05ml/kg可预防发病
- E. 以上都不是

正确答案：B 您选择的答案：

第48题 典型麻疹的出疹顺序是

- A. 先四肢，而颈部，渐至面部、躯干
- B. 先躯干、四肢，后手掌、足跖
- C. 先前胸、上肢，后背部、下肢
- D. 先耳后、发际，渐至面部、躯干、四肢，最后手心足心
- E. 先额部、面部，后四肢、躯干

正确答案：D 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第49题 一2个月婴儿，昨天接触麻疹病人，此时应当立即采取哪项措施

- A. 注射麻疹疫苗
- B. 注射青霉素
- C. 口服维生素C

D. 注射丙种球蛋白

E. 以上都不是

正确答案：E 您选择的答案：

第50题 患儿，1岁。发热3天后右下肢活动障碍，当地农村有类似病史，该患儿生后未接种疫苗，体检：体温38.5℃，神志清，心肺正常，右下肢肌力Ⅰ级，膝反射未引出，病理反射阴性，诊断最大可能为

A 流行性乙型脑炎

B 脊髓灰质炎

C 坐骨神经炎

D 格林-巴利综合征

E 化脓性脑膜炎

正确答案：B 您选择的答案：

第51题 1岁患儿，发热、咳嗽、畏光，第4天起从耳后开始出现红色斑丘疹，发疹5天热仍不退，咳嗽加重，伴喘，口周发绀，鼻翼扇动，肺部有中小水泡音，心率180次/分，肝肋下3.0cm，诊断为

A 麻疹并发肺炎

B 风疹并发肺炎

C 麻疹并发肺炎，心衰

D 风疹并发肺炎，心衰

E 猩红热并发肺炎

正确答案：C 您选择的答案：

第52题 患儿，1岁。发热3天，流涕、咳嗽，咽部及眼结膜充血，在下眼睑边缘见Stimson线，口腔粘膜充血，既往未接种麻疹疫苗，该患儿诊断麻疹，属麻疹病程哪一期

A 潜伏期

B 前驱期

C 卡他期

D 出疹期

E 恢复期

正确答案：B 您选择的答案：

第53题 患儿，6岁。昨日开始发热，咽痛，腹痛，口服速效感冒胶囊，热退，今晨又发热，体检：颜面潮红，口周苍白圈，咽部充血，双扁桃腺肿大，躯干皮肤见红色细小丘疹，压之退色，心肺正常，诊断最可能为

A 麻疹

B 风疹

C 药疹

D 肠道病毒感染

E 猩红热

正确答案：E 您选择的答案：

第54题 1岁患儿，未接种过麻疹疫苗，于半个月前曾接触过麻疹病儿，近4天发热，流涕，打喷嚏，畏光，咳嗽，昨日体温稍降，今日又发热，耳后发际部出现红色斑丘疹，疹间有健康皮肤，周围血白细胞 $4.5 \times 10^9/L$ ，最可能的诊断是

A 猩红热

B 麻疹

C 幼儿急疹

D 风疹

E 荨麻疹

正确答案：B 您选择的答案：

第55题 男孩，3岁，低热，稍咳2天，今全身可见水疱疹，诊断为水痘。去年因患肾病住院治疗至今。有关水痘，以下哪项是错误的

A. 水痘病毒与带状疱疹病毒相同

B. 水痘病毒为RNA病毒

C. 糖皮质激素治疗中的病儿感染水痘时，常转成重症水痘

D. 水痘发生在四肢远端，手掌、足底少

E. 本病发热时尽量避免用含阿司匹林的退热剂

正确答案：B 您选择的答案：

第56题 患儿，1岁半，4天来发热，流涕，咳嗽，今晨发现前额及耳后有浅红色斑丘疹，两眼泪汪汪，眼结膜充血，口腔黏膜红，精神不振，肺呼吸音粗。其诊断最大可能是

A. 风疹

B. 幼儿急疹

C. 猩红热

D. 麻疹

E. 肠道病毒感染

正确答案：D 您选择的答案：

第57题 10个月男婴于4天前发热、流涕、干咳，体温逐渐增高，面、颈部见少许红色斑丘疹，今晨开始四肢厥冷、嗜睡、气促、皮疹消退而来诊。体检：T40℃，P150次/分，皮肤呈花斑状，结膜充血，颊粘膜充血、粗糙，隐约可见白色分泌物，心音较弱，两肺散在性细湿啰音，肝肋下2cm，脑膜刺激征(-)。下列哪种诊断可能性最大

A. 病毒性肺炎并休克

B. 支气管肺炎并休克

C. 麻疹并肺炎、心力衰竭

D. 金葡菌肺炎、败血症

E. 以上都不是

正确答案：C 您选择的答案：

第58题 8个月婴儿发热，体温高达39℃，咽红，精神状态尚好，静点3日头孢唑啉及双黄连，第4天热退，但患儿皮肤出现红色斑丘疹，颈部及躯干明显，既往曾用过头孢唑啉，诊断最可能为

- A 麻疹
- B 药疹
- C 风疹
- D 幼儿急疹
- E 荨麻疹

正确答案：D 您选择的答案：

第59题 2岁麻疹患儿，5天前开始出皮疹，现皮疹已消退，皮肤可见棕色色素沉着，因咳嗽、气促、发热、肺部有水泡音而就诊，下列哪项处理不正确

- A．给氧
- B．收住儿科呼吸病房
- C．抗生素治疗
- D．口服止咳药
- E．病人衣物应在阳光下暴晒

正确答案：B 您选择的答案：

第60题 2岁患儿，发热1天出现皮疹，为红色斑丘疹，由面部开始一日遍及全身，伴枕部、耳后及颈部淋巴结肿大，诊断最可能为

- A 麻疹
- B 风疹
- C 幼儿急疹
- D 猩红热
- E 荨麻疹

正确答案：B 您选择的答案：

第61题 患儿，5岁。高热2小时，反复惊厥3次，于8月20日晚6点就诊，追问病史，该患儿上午曾去公园进食玉米及葡萄等，体检：体温40.5℃，神志不清，呈抽搐状，面色发青，四肢凉，血压8/6kPa，双瞳孔等大，光反应迟钝，心肺正常，腹软，颈强阳性，克氏征阴性，该患儿最可能诊断为

- A 癫痫
- B 中暑
- C 中毒性细菌性痢疾
- D 病毒性脑炎
- E 流行性乙型脑炎

正确答案：C 您选择的答案：

第62题 患儿，6岁。发热2天，伴咽痛，皮疹1日，体检：体温38.7℃，咽部充血，草莓舌，面部潮红，躯干部见细小鲜红色充血性皮疹，诊断为猩红热，治疗首选

- A 红霉素
- B 头孢唑啉
- C 氯霉素
- D 青霉素
- E 磷霉素

正确答案：D 您选择的答案：

第63题 患儿，2岁。未接种任何疫苗，1周前有腹泻病史，近2日肢体疼痛，相继左下肢软弱无力，体检：左下肢肌力Ⅱ级，膝反射消失，脑脊液蛋白(+)，细胞数100×10⁶/L，中性0.6，淋巴0.4，糖及氯化物正常，诊断为

- A 病毒性脑炎
- B 急性感染性多发性神经根神经炎
- C 脊髓灰质炎
- D 结核性脑膜炎早期
- E 化脓性脑膜炎

正确答案：C 您选择的答案：

第64题 男孩8岁，患肾病综合征，用激素治疗已半年，昨日出现水痘，为防止病情发展，在临床采取的措施中，下列哪项是错误的

- A．单独隔离，防止交叉感染
- B．马上停用糖皮质激素
- C．应用青霉素或红霉素，防止继发感染
- D．给予静脉丙种球蛋白
- E．对症治疗给予退热剂

正确答案：B 您选择的答案：

第65题 某幼儿园最近有水痘流行，为了预防水痘，下列预防措施除哪项外均应采取

- A．对接触病儿的易感儿童应检疫3周
- B．隔离病儿至疱疹全部结痂为止
- C．对体弱者可用水痘痊愈期血清
- D．对污染的衣物、房间应暴晒，紫外线照射，通风等方法进行消毒
- E．可对易感者注射丙种球蛋白

正确答案：E 您选择的答案：

第66题 患儿，男，3岁，3天前发热高达41℃，流涕，今晨热退，但发现其颈部和背部出现红色斑丘疹，应考虑

- A．风疹
- B．幼儿急疹
- C．麻疹
- D．药物疹
- E．猩红热

正确答案：B 您选择的答案：

第67题 2岁患儿，4天前发热，流涕、咳嗽，结膜充血，畏光，今晨发现耳后及颈部有淡红色斑丘疹，体温39℃，两颊粘膜充血，最可能的诊断是

- A 风疹
- B 幼儿急疹
- C 猩红热
- D 肠道病毒感染
- E 麻疹

正确答案：E 您选择的答案：

第68题 患儿，5岁。平素体质较差，8个月时曾接种麻疹疫苗，今在幼儿园中接触一麻疹患儿，该小儿应检疫观察多长时间

- A 5天
- B 7天
- C 10天
- D 14天
- E 21天

正确答案：E 您选择的答案：

第69题 男孩，2岁。未接种过麻疹疫苗，今在托儿所中接触麻疹患儿，当即给予注射免疫血清球蛋白，对该小儿应检疫观察多长时间

- A 1周
- B 2周
- C 3周
- D 4周
- E 5周

正确答案：C 您选择的答案：

第70题 男孩，3岁，7月中旬发病，高热6小时，伴畏寒，病后4小时抽搐一次，呕吐三次。查体：139.6℃，意识朦胧，面色苍白，颈软，心肺正常，腹软，肠鸣音活跃，四肢冷，末梢发绀，脉快而弱，末梢血WBC $18 \times 10^9/L$ ，N85%，该患儿最可能的诊断是

- A 乙型脑炎
- B 败血症
- C 脑型疟疾
- D 中毒型菌痢
- E 流行性脑脊髓膜炎

正确答案：D 您选择的答案：

第71题 一1岁小儿，未接受麻疹主动免疫，近2天接触了麻疹患儿，处理应为

- A 立即接种麻疹疫苗
- B 立即于5天内接受被动免疫
- C 可以在5天后再接受被动免疫
- D 以后无需再接受主动免疫
- E 以上都不是

正确答案：B 您选择的答案：

三、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第72-74题

患儿，1.5岁。因发热2天后右下肢不能站立而就诊。追问病史，既往未接种各种疫苗，体检：体温37.6℃，神志清，咽红，心肺正常，腹软，右下肢肌力I级，膝反射未引出，住院后诊断为脊髓灰质炎

1. 脊髓灰质炎临床典型经过是

- A 潜伏期，前驱期，瘫痪期，恢复期，后遗症期
- B 潜伏期，瘫痪前期，瘫痪期，恢复期，后遗症期
- C 潜伏期，前驱期，瘫痪前期，瘫痪期，恢复期
- D 前驱期，瘫痪前期，瘫痪期，恢复期，后遗症期
- E 潜伏期，前驱期，瘫痪前期，瘫痪期，恢复期，后遗症期

2. 脊髓灰质炎瘫痪期脊髓型的，临床特点是

- A 对称性弛缓性瘫，无感觉障碍
- B 对称性弛缓性瘫，有感觉障碍
- C 不对称性弛缓性瘫，有感觉障碍
- D 不对称性弛缓性瘫，无感觉障碍
- E 不对称性痉挛性瘫，无感觉障碍

3. 该患儿治疗不正确的是

- A 卧床时应有正确的姿势
- B 保证营养丰富饮食及水分摄入
- C 给予口服地巴唑
- D 早期给予肌注加兰他敏
- E 疼痛消失后立即作主动和被动锻炼

正确答案：EDD 您选择的答案：

第75-77题

男孩，8岁，发热1天，家长给予口服速效感冒冲剂，次日体温不退，头痛，咽部不适，面红，全身痒，皮肤可见弥漫性、针尖大小的红色皮疹，左拇指甲沟有红肿化脓且剧痛，即送医院就诊。

1. 最可能的诊断是

- A 普通型猩红热
- B 药物疹
- C 风疹
- D 麻疹
- E 外科型猩红热

2. 以下哪项最有助于确诊

- A. 咽试子培养
 - B. 痰培养
 - C. 外周血白细胞检查
 - D. 皮疹涂片检查
 - E. 局部脓液培养
3. 对该患儿应首选下列哪种药物
- A. 青霉素

- B. 磺胺甲基异噁唑
- C. 红霉素
- D. 头孢类
- E. 磷霉素

正确答案：EEA 您选择的答案：

第78-80题

7个月婴儿，发热2天，体温39.0~40.0，稍咳，一般情况好，除流涕及咽部稍充血外，无其他异常，家长给予口服小儿速效感冒灵。

1. 下列哪项考虑是正确的
- A. 如继续发热4~5天后出疹，考虑为麻疹
 - B. 再发热2天左右，热退全身出现红色斑丘疹，则为幼儿急疹
 - C. 若全身出现弥漫性皮疹，应考虑为猩红热
 - D. 为皮肤黏膜淋巴结综合征的前驱症状
 - E. 若皮肤出现荨麻疹样皮疹，则为药物疹
2. 确诊后，其病原体为下列哪一种
- A. 麻疹病毒
 - B. 腺病毒
 - C. 人类疱疹病毒6型
 - D. 支原体
 - E. 溶血性链球菌
3. 对该患儿的治疗，下列哪项是错误的
- A. 物理降温
 - B. 口服布洛芬制剂降温
 - C. 肌注利巴韦林
 - D. 口服止咳糖浆
 - E. 口服头孢拉定糖浆

正确答案：BCE 您选择的答案：

第81-83题

4岁患儿，发热3天伴流涕、咳嗽、流泪就诊。查：T40，结膜充血，心肺检查阴性，耳后发际处可见少许红色斑丘疹。

1. 该患儿应考虑为何病
- A. 麻疹
 - B. 风疹
 - C. 幼儿急疹
 - D. 猩红热
 - E. 水痘
2. 为明确诊断，应立即做哪项检查
- A. 血常规
 - B. 血、尿或鼻咽分泌物检查检出病原体
 - C. 大便常规
 - D. 血清抗体检查
 - E. 皮疹印片
3. 在患儿的处理中，哪项不正确
- A. 烦躁时可用少量镇静剂
 - B. 高热时用少量退热剂
 - C. 大量抗生素治疗
 - D. 剧咳时可用镇咳祛痰剂
 - E. 在维生素A缺乏区的患儿应补充维生素A

正确答案：ABC 您选择的答案：

第84-86题

患儿，2岁。1周前无明显诱因发热，流泪、畏光，当地医院疑“上感”给予口服抗生素，四天后患儿病情加重，咳嗽，出现皮疹，今日来我院。体检见皮肤红色斑丘疹，双肺闻及湿啰音，诊断：麻疹合并肺炎

1. 麻疹出疹的特点是
- A. 自耳后，颈部沿发际边缘出疹渐及躯干、四肢，3日出齐
 - B. 自面部出疹渐及躯干、四肢，1日内遍及全身
 - C. 红色斑丘疹，颈及躯干部多见，1日出齐，次日消退
 - D. 皮疹见于颈、胸、腹部，1日内遍及全身，呈弥漫鲜红色
 - E. 皮疹见于面部、躯干及四肢、形态多样
2. 此患儿应隔离至
- A. 出疹后5天
 - B. 出疹后1周
 - C. 出疹后10天
 - D. 出疹后2周
 - E. 出疹后3周
3. 其表弟未接种麻疹疫苗，与此患有接触史，应采取何措施
- A. 立即接种麻疹疫苗
 - B. 立即注射丙种球蛋白

- C 注射青霉素
- D 口服复方新诺明
- E 口服转移因子

正确答案：ACB 您选择的答案：

第87-88题

患儿，5岁。于8月中旬发病，高热2小时抽搐1次，有进不洁食物史，无呕吐、腹泻，体检：面色苍白，意识蒙眬，四肢凉，血压：9.3/5.3kPa(70/40mmHg)

1. 诊断首先考虑

- A 高热惊厥
- D 中毒性菌痢
- C 乙型脑炎
- D 阿米巴痢疾
- E 病毒性脑炎

2. 为进一步确诊首选做哪项检查

- A 脑脊液检查
- B 血常规
- C 便常规
- D 脑电图
- E 血培养

正确答案：BC 您选择的答案：

第89-91题

在幼儿园里，一男孩2岁，发热伴咳嗽2~3天，初拟诊为上呼吸道感染，次日体温更高，皮肤可见红色斑丘疹，考虑麻疹，即送回家。

1. 麻疹的出疹特点是

- A. 发热1~2天出疹，出疹后体温升高伴呕吐
- B. 发热3~4天，流涕、轻咳，热退后出疹
- C. 发热3-4天出疹，体温更高，咳剧，声音嘶哑，结膜充血，皮疹为红色斑丘疹
- D. 发热1~3天，全身鲜红色皮疹，伴痒且咽痛
- E. 发热5天出疹，伴枕后、耳后淋巴结肿大

2. 在该班里，有2个易感儿，消瘦、平素体质较差，过去经常感冒，患过肺炎，未曾注射麻疹疫苗，目前对他们应立即采取哪项措施

- A. 注射青霉素
- B. 注射麻疹疫苗
- C. 注射免疫血清球蛋白
- D. 注射干扰素
- E. 口服核酪糖浆

3. 在上述幼儿园中，为制止麻疹流行，对其他易感儿应采取的最佳措施为

- A. 全部口服利巴韦林
- B. 全部注射免疫血清球蛋白
- C. 应急接种麻疹疫苗
- D. 分别留在家里，不要上幼儿园
- E. 应用广谱抗生素

正确答案：CCC 您选择的答案：

第92-93题

患儿男，20个月，高热3天，伴有流涕、轻咳、流泪，3天后出现耳后、颈部红色斑丘疹，疹间皮肤正常，随后3天内皮疹逐渐蔓延至全身，在出疹期间持续高热。

1. 该患儿应考虑

- A. 麻疹
- B. 风疹
- C. 幼儿急疹
- D. 猩红热
- E. 水痘

2. 患儿在出疹后3天后热退，皮疹逐渐消退并留有棕色色素沉着。2天后出现呼吸急促，面色发绀，咳嗽，肺部可听到湿啰音，对其的处理方案中哪项不正确

- A. 吸氧
- B. 抗生素治疗
- C. 痰培养
- D. 剧咳时给予镇咳祛痰药物
- E. 不需隔离

正确答案：AE 您选择的答案：

四、A4型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第94-98题

女孩，4岁，因高热2小时，惊厥2次，无吐泻，于8月12日来院急诊。发病前曾去公园玩，吃过苹果、葡萄。体检：体温40.2℃，重病容，神志欠清，面色青灰，四肢凉，血压56/30mmHg(7.5/4kPa)。

1. 该患儿最可能的诊断是

- A. 高热惊厥
- B. 流行性乙型脑炎
- C. 脑型疟疾
- D. 中毒型细菌性痢疾
- E. 中暑

2. 最必要的实验室检查是

- A. 血常规
- B. 大便常规

- C. 血气分析
D. 脑脊液检查
E. 血培养
3. 下列哪项治疗最重要
A. 静脉用肝素
B. 肌注安定(地西洋)
C. 静脉用抗生素
D. 用血管扩张剂
E. 低分子右旋糖酐
4. 若该患儿在住院治疗中, 出现烦躁, 呼吸加速, 出汗, 四肢发冷, 心率加速达160次/分, 心音低钝, 肝脏进行性增大。应考虑为
A. 急性肺水肿
B. 呼吸衰竭
C. 心力衰竭
D. 中毒性脑病
E. 脱水、酸中毒
5. 病人出现上述情况时, 首要的处理是
A. 肌注安定(地西洋)
B. 吸氧
C. 肌注速尿(呋塞米)
D. 肌注654-2
E. 静注西地兰
正确答案: DBECE 您选择的答案:

五、B1型题: 以下提供若干组考题, 每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第99-101题

- A. 黏膜疹
B. 玫瑰疹
C. 红丘疹
D. 水疱疹
E. 荨麻疹
1. 麻疹早期可见
2. 水痘皮疹是
3. 猩红热皮疹是
正确答案: ADC 您选择的答案:

第102-104题

- A. 热退疹出
B. 发热3~4天, 出疹时热度更高
C. 发热后1天出疹, 伴有高热
D. 发热1~2天出疹, 出疹时高热
E. 发热与皮疹同时出现
1. 风疹
2. 麻疹
3. 幼儿急疹
正确答案: CBA 您选择的答案:

第105-108题

- A. 风疹
B. 麻疹
C. 幼儿急疹
D. 猩红热
E. 荨麻疹
1. 患儿, 7个月。发热4天, 体温最高为39.5℃, 当地医院诊断为“上感”, 静点三天头孢唑啉及病毒唑, 今晨热退, 但见面、颈及躯干皮肤有红色斑丘疹
2. 患儿, 2岁。4天前开始发热, 流涕, 打喷嚏, 畏光, 今日体温升高, 且咳嗽, 出现皮疹, 急来就诊, 体检: 体温40.5℃, 口腔粘膜粗糙, 耳后、颈部沿发际边缘见红色斑丘疹, 双肺呼吸音粗
3. 患儿, 9岁。发热, 咽痛1日就诊, 体检: 体温38.9℃, 咽部充血, 双扁桃腺肿大Ⅱ°, 有脓性分泌物, 舌红, 乳头粗, 颈部及躯干见红色鸡皮疹, 压之退血, 腋窝处明显, 心肺正常
4. 患儿, 3岁。上午开始流涕, 发热, 体温最高38.2℃, 在家服用小儿退热药及双黄连口服液, 吃晚饭时发现患儿面部有皮疹, 体检: 精神状态良好, 耳后、枕部触及黄豆及花生大小淋巴结, 有触痛, 面、颈及躯干有红色斑丘疹
正确答案: CBDA 您选择的答案:

第109-110题

- 下列各病例最可能的诊断是
A. 休克型中毒型细菌性痢疾
B. 脑型中毒型细菌性痢疾
C. 混合型中毒型细菌性痢疾
D. 流行性乙型脑炎
E. 高热惊厥
1. 男孩, 2岁。因高热半天, 呕吐4次, 反复抽搐2次于8月15日来诊。体检: 体温40.0℃, 血压100/2mmHg, 心率96次/分, 意识不清, 呼吸节律不齐, 颈软, 心肺无异常, 腹软, Kerning征、Brudzinski征均阴性。肛拭大便常规检查: 红细胞0~3个/高倍, 白细胞30~40个/高倍, 吞噬细胞1~4个/高倍。
2. 女孩, 3岁。因发热半天, 呕吐2次, 半小时前突然面色发灰, 四肢发冷, 于9月12日来院急诊。体检: 体温40.0℃, 神志尚清, 精神萎靡, 重病容, 面色发灰, 口唇轻度发绀, 呼吸速, 四肢冷, 皮肤可见花纹, 血压30/0mmHg, 脉细速, 160次/分, 心音较弱, 腹软, Barbinski征、Brudzinski征均阴性。肛门指诊查大便常规: 白细胞10~20个

/ 高倍，红细胞0~1个 / 高倍，吞噬细胞0~1个 / 高倍。
正确答案：BA 您选择的答案：

习题集 儿科学 营养和营养障碍疾病

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 营养不良测定腹壁皮下脂肪厚度的部位

- A 脐上
- B 脐下
- C 脐旁
- D 肋下
- E 锁中线上平脐处

正确答案：E 您选择的答案：

第2题 佝偻病颅骨软化多发生于

- A 1~3个月
- B 3~6个月
- C 6~9个月
- D 6~12个月
- E 12个月以上

正确答案：B 您选择的答案：

第3题 维生素D缺乏性佝偻病的病因中，下列哪项不正确

- A 肾小管酸中毒
- B 日光照射不足
- C 食物中维生素D含量不足
- D 生长过速
- E 慢性肝肾疾病

正确答案：A 您选择的答案：

第4题 佝偻病性手足搐搦症的治疗步骤应该是

- A 补钙—止惊—维生素D
- B 止惊—补钙—维生素D
- C 维生素D—止惊—补钙
- D 补钙—维生素D—止惊
- E 维生素D—补钙—止惊

正确答案：B 您选择的答案：

第5题 下列哪一项为佝偻病初期临床表现

- A 血钙下降
- B 碱性磷酸酶明显升高
- C 血磷正常
- D 钙磷乘积明显下降
- E 骨骼改变不明显

正确答案：E 您选择的答案：

第6题 关于维生素D缺乏性手足搐搦症的促发因素，以下哪项错误

- A 春末夏初阳光充足时
- B 体重低于1500g的早产儿
- C 母乳喂养儿
- D 长期腹泻的患儿
- E 人工喂养儿食用高磷饮食

正确答案：C 您选择的答案：

第7题 活性最强的维生素D是

- A 25(OH)D
- B 1, 25(OH)₂D
- C αD₃
- D 麦角骨化醇
- E 胆骨化醇

正确答案：B 您选择的答案：

第8题 佝偻病口服维生素D治疗量所需时间为

- A 1个月
- B 3个月
- C 用至症状消失
- D 用至体征消失
- E 用至2~3岁

正确答案：A 您选择的答案：

第9题 佝偻病恢复期长骨X线片改善的特点是

- A 临时钙化带重新出现
- B 临时钙化带消失
- C 干骺端增宽
- D 骨质稀疏，密度减低
- E 干骺端呈毛刷状

正确答案：A 您选择的答案：

第10题 佝偻病枕秃是由

- A 多汗，摇头，擦枕
- B 哭闹
- C 结核
- D 血钙降低
- E 颅骨软化

正确答案：A 您选择的答案：

第11题 小儿特有的对能量的需要是

- A 基础代谢
- B 活动所需
- C 生长所需
- D 食物的特殊动力作用
- E 排泄的消耗

正确答案：C 您选择的答案：

第12题 面神经征检查时叩锤骤击患儿

- A 眼角
- B 颧弓
- C 口角
- D 颧弓与眼角之间面颊部
- E 下颏

正确答案：E 您选择的答案：

第13题 有活性的维生素D为

- A 维生素D₂
- B 维生素D₃
- C 1, 25-(OH)₂D₃
- D 25-(OH)D₃
- E 1-(OH)D₃

正确答案：C 您选择的答案：

第14题 关于维生素D缺乏性佝偻病的预防措施，以下哪项是错误的

- A 充足的日光照射
- B 每日补充生理剂量的维生素D
- C 饮食中含有丰富的维生素D
- D 婴儿应及时添加辅食
- E 婴儿2个月起补充维生素D，每日800U

正确答案：E 您选择的答案：

第15题 3~6个月婴儿患佝偻病，其主要的骨骼症状是

- A 方颅
- B 颅骨软化
- C 肋骨串珠
- D 郝氏沟
- E "O"形腿

正确答案：B 您选择的答案：

第16题 人乳中的蛋白质是以哪种蛋白为主

- A 球蛋白
- B 乳清蛋白
- C 酪蛋白
- D 黏蛋白
- E 糖蛋白

正确答案：B 您选择的答案：

第17题 初期佝偻病的主要表现

- A 骨骼系统改变
- B 运动系统改变
- C 语言发育落后
- D 非特异性神经精神症状
- E 反复感染

正确答案：D 您选择的答案：

第18题 佝偻病的维生素D预防量是每日

- A 100U
- B 200U
- C 300U
- D 400U
- E 600U

正确答案：D 您选择的答案：

第19题 在婴儿喂养中如母乳不足而未及时添加其他乳品，最可能引起的疾病是

- A 消化功能紊乱
- B 蛋白质、热能营养不良
- C 结核病
- D 免疫功能低下
- E 低蛋白血症

正确答案：B 您选择的答案：

第20题 激期佝偻病的血生化变化是

A 血钙稍降低，血磷明显降低，钙磷乘积降低，碱性磷酸酶明显升高
B 血钙升高，血磷降低，钙磷乘积降低，碱性磷酸酶升高
C 血钙降低，血磷升高，钙磷乘积降低，碱性磷酸酶升高
D 血钙降低，血磷降低，钙磷乘积升高，碱性磷酸酶降低
E 血钙降低，血磷降低，钙磷乘积升高，碱性磷酸酶升高
正确答案：A 您选择的答案：

第21题 在注射胰岛素治疗营养不良时，应先服

- A. 钙剂
- B. 锌剂
- C. 葡萄糖
- D. 维生素A
- E. 维生素B族

正确答案：C 您选择的答案：

第22题 10个月婴儿患佝偻病(激期)，其特征性表现是

- A. 易激惹
- B. 烦闹
- C. 睡眠不安
- D. 多汗、枕秃
- E. 方颅

正确答案：E 您选择的答案：

第23题 佝偻病激期的辅助检查中，以下哪项不正确

- A. 血钙稍低
- B. 血磷明显降低
- C. 钙磷乘积低于30
- D. X线示骨骼端钙化预备带消失
- E. 骨干骨质密度尚可

正确答案：E 您选择的答案：

第24题 佝偻病活动早期的临床表现是

- A. 骨骼畸形
- B. 运动机能发育缓慢
- C. 骨骼X线表现
- D. Ca正常、P稍低、AKP升高
- E. 神经兴奋症状

正确答案：E 您选择的答案：

第25题 佝偻病发病机理中下述哪项不正确

- A 甲状旁腺代偿机能增加
- B 骨释放钙磷
- C 促进肾小管对磷的重吸收
- D 局部骨样组织堆积
- E 碱性磷酸酶分泌增多

正确答案：C 您选择的答案：

第26题 佝偻病性手足搐搦症与佝偻病发病机理的不同点在于

- A 钙吸收代谢障碍
- B 磷吸收代谢障碍
- C 甲状旁腺功能不足
- D 维生素D缺乏
- E 神经系统兴奋性增高

正确答案：C 您选择的答案：

第27题 将全脂奶粉配成全牛奶，其奶粉与水的比例应为

- A. 一匙奶粉加三匙水
- B. 一匙奶粉加四匙水
- C. 一匙奶粉加二匙水
- D. 一匙奶粉加一匙水
- E. 一匙奶粉加六匙水

正确答案：B 您选择的答案：

第28题 营养不良时免疫功能低下是

- A. 白细胞吞噬功能下降
- B. 补体功能低下
- C. T细胞亚群改变
- D. 体液免疫功能低下
- E. 免疫功能全面下降

正确答案：E 您选择的答案：

第29题 母乳中糖、脂肪、蛋白质的比例是

- A. 6:3:1
- B. 4:2:1
- C. 2:1:1
- D. 3:2:1
- E. 8:6:2

正确答案：A 您选择的答案：

第30题 以下哪项不是肌肉注射维生素D疗法的适应证

- A. 重度佝偻病
- B. 长期腹泻
- C. 重度营养不良
- D. 急性传染病
- E. 先天性佝偻病

正确答案：C 您选择的答案：

第31题 牛乳与人乳比较最大的缺点是

- A. 牛乳含较多的酪蛋白
- B. 牛乳中缺乏脂肪酶
- C. 牛乳中缺乏各种免疫因子
- D. 牛乳易为细菌污染
- E. 牛乳是以甲型乳糖为主

正确答案：C 您选择的答案：

第32题 母乳喂养儿佝偻病患病率低于人工喂养儿的原因是母乳中

- A. 含钙质丰富
- B. 含磷高
- C. 钙磷比例适宜
- D. 维生素D含量丰富
- E. 乳白蛋白含量高

正确答案：C 您选择的答案：

第33题 小儿的合理膳食中，糖、脂肪、蛋白质的比例应为糖：脂肪：蛋白质

- A. 3：2：1
- B. 4：3：2
- C. 6：3：1
- D. 5：2：3
- E. 8：4：1

正确答案：C 您选择的答案：

第34题 人体维生素D主要来源于

- A. 皮肤合成的内源性D₃
- B. 蛋黄中维生素D
- C. 猪肝中的维生素D
- D. 人乳中的维生素D
- E. 牛奶中的维生素D

正确答案：A 您选择的答案：

第35题 治疗佝偻病激期维生素D口服法剂量是

- A. 1万~2万IU/d
- B. 2万~3万IU/d
- C. 1万~2万IU/d
- D. 3~4万IU/d
- E. 5万IU/d

正确答案：A 您选择的答案：

第36题 蛋白质、热能营养不良最先出现的症状是

- A. 体重不增
- B. 身高低于正常
- C. 皮下脂肪减少
- D. 皮肤干燥
- E. 肌肉萎缩

正确答案：A 您选择的答案：

第37题 营养不良最常见的维生素缺乏的种类是

- A. 维生素B
- B. 维生素C
- C. 维生素D
- D. 维生素K
- E. 维生素A

正确答案：E 您选择的答案：

第38题 下列佝偻病体征中哪项是骨样组织堆积所致

- A. 肋缘外翻
- B. 颅骨软化
- C. 方颅
- D. 膝内翻
- E. 鸡胸

正确答案：C 您选择的答案：

第39题 婴儿每日每公斤体重需要能量为

- A. 250kJ(60kcal)
- B. 419kJ(100kcal)
- C. 460kJ(110kcal)
- D. 502kJ(120kcal)
- E. 205kJ(50kcal)

正确答案：C 您选择的答案：

第40题 佝偻病性手足搐搦症喉痉挛主要见

- A 婴儿
- B 幼儿
- C 学龄前儿童
- D 学龄期儿童
- E 以上都不是

正确答案：A 您选择的答案：

第41题 下列属于脂溶性维生素的是

- A 维生素A
- B 维生素B
- C 维生素C
- D 叶酸
- E 烟酸

正确答案：A 您选择的答案：

第42题 关于维生素D缺乏性手足搐搦症的发病机制，以下哪项不正确

- A 血钙低于 $1.75 \sim 1.88 \text{ mmol/L}$
- B 甲状旁腺反应灵敏
- C 血磷正常或增高
- D 碱性磷酸酶升高
- E 自主神经功能紊乱

正确答案：B 您选择的答案：

第43题 在治疗佝偻病的有效措施中，应除外以下哪项

- A 补充有效剂量的维生素D和钙剂
- B 日光浴
- C 提倡母乳喂养
- D 多吃豆类食品和蔬菜
- E 加强体格锻炼

正确答案：D 您选择的答案：

第44题 母乳具有增进婴儿免疫力的作用，是因为母乳中含有

- A 乳白蛋白
- B 亚油酸
- C 乙型乳糖
- D 分泌型IgA
- E 长链脂肪酸

正确答案：D 您选择的答案：

第45题 佝偻病性手足搐搦症在幼儿及儿童多见的典型表现是

- A 惊厥
- B 手足搐搦
- C 喉痉挛
- D 枕秃
- E 肋骨串珠

正确答案：B 您选择的答案：

第46题 激期佝偻病X线所见为

- A 骨质密度正常
- B 骨骺软骨变窄
- C 临时钙化带模糊
- D 骨骺与干骺端的距离多无变化
- E 骨膜增生

正确答案：C 您选择的答案：

第47题 蛋白质-能量营养不良的好发年龄为

- A 3岁以内
- B 学龄前期
- C 学龄期
- D 青春期
- E 好发于各年龄期儿童

正确答案：A 您选择的答案：

第48题 有关佝偻病发病机制中哪项是正确的

- A PTH分泌不足
- B 肾小管重吸收磷增加
- C 肠道吸收磷增加
- D 骨重吸收减少
- E 钙磷乘积下降

正确答案：E 您选择的答案：

第49题 佝偻病肋骨串珠特点哪项是错误的

- A 好发于1岁左右小儿
- B 部位在肋骨与肋软骨交界处
- C 可看到或触及到钝圆形隆起
- D 骨样组织堆积所致

E 以胸骨旁最明显

正确答案：E 您选择的答案：

第50题 在营养不良的治疗中，应用苯丙酸诺龙时应同时供给充足的

- A. 葡萄糖
- B. 蛋白质
- C. 维生素
- D. 微量元素
- E. 脂肪

正确答案：B 您选择的答案：

第51题 佝偻病初期的主要临床表现是

- A. 多汗、枕秃
- B. 骨骼改变
- C. 非特异性神经精神症状
- D. X线长骨片显示骨骺端钙化预备带消失
- E. 血清钙、磷、碱性磷酸改变

正确答案：C 您选择的答案：

第52题 维生素D在体内活性最强的形式是

- A. 7-脱氢胆固醇
- B. 麦角骨化醇
- C. 维生素D结合蛋白
- D. 25-(OH)2D
- E. 1, 25-(OH)2D

正确答案：E 您选择的答案：

第53题 营养不良出现水肿是由于缺乏

- A. 糖
- B. 蛋白质
- C. 脂肪
- D. 维生素
- E. 微量元素

正确答案：B 您选择的答案：

第54题 人体维生素D的主要来源

- A. 皮肤中的7-脱氢胆固醇
- B. 牛乳中所含的维生素D
- C. 母乳中所含的维生素D
- D. 鱼肝油中所含的维生素D
- E. 蛋白质中所含的维生素D

正确答案：A 您选择的答案：

第55题 佝偻病的初期，以下哪项指标最可靠

- A. 血钙
- B. 血磷
- C. 碱性磷酸酶
- D. X线检查
- E. 血清25-(OH)D测定

正确答案：E 您选择的答案：

第56题 维生素D缺乏性佝偻病激期主要临床表现是

- A. 烦躁、多汗
- B. 肌肉松弛、乏力
- C. 语言发育缓慢
- D. 睡眠不实
- E. 骨骼系统改变

正确答案：E 您选择的答案：

第57题 营养不良皮下脂肪最后消失的部位是

- A. 胸部
- B. 背部
- C. 腹部
- D. 面颊部
- E. 腰部

正确答案：D 您选择的答案：

第58题 婴儿每日每公斤体重需要水量为

- A. 50ml
- B. 60ml
- C. 80ml
- D. 120ml
- E. 150ml

正确答案：E 您选择的答案：

第59题 维生素D缺乏性佝偻病最主要的病因是

- A. 维生素D摄入过少
- B. 生长快，需要量大
- C. 肝肾疾病的影响
- D. 日光照射不足
- E. 遗传因素

正确答案：D 您选择的答案：

第60题 营养不良最先出现的症状是

- A 体重不增
- B 身长低于正常
- C 皮下脂肪减少或消失
- D 皮肤干燥，苍白，失去弹性
- E 肌张力低下，体温偏低，智力迟钝

正确答案：A 您选择的答案：

第61题 人乳中的脂肪易于消化吸收，是因为人乳中含有

- A 蛋白酶
- B 淀粉酶
- C 乙型乳糖
- D 甲型乳糖
- E 脂肪水解酶

正确答案：E 您选择的答案：

第62题 给婴儿添加辅食的主要目的是

- A 补充乳类营养素的不足
- B 改变婴儿的口味
- C 完善消化功能
- D 培养咀嚼、吞咽功能
- E 以上都不是

正确答案：A 您选择的答案：

第63题 维生素D缺乏性佝偻病冬春季多见的病因是

- A 皮肤接触日光中紫外线较少
- B 食物中维生素D含量不足
- C 婴儿食物中钙磷含量少
- D 婴儿生长快，钙磷需要量大
- E 疾病的影响

正确答案：A 您选择的答案：

第64题 重症营养不良体液改变倾向于

- A 总液体量相对增多，细胞外液呈低渗性
- B 总液体量相对减少，细胞外液多呈高渗性
- C 总液量不变，细胞外液多呈等渗性
- D 总液量相对增多，细胞外液多呈等渗性
- E 总液量相对减少，细胞外液多呈高渗性

正确答案：A 您选择的答案：

第65题 佝偻病性手足搐搦在痉挛发作时哪项处理最正确

- A 迅速静推甘露醇
- B 立即注射维生素D
- C 先用镇静剂再用钙剂
- D 先立即静注钙剂
- E 保持安静待其自然缓解

正确答案：C 您选择的答案：

第66题 佝偻病骨样组织堆积的表现，以下哪项是错误的

- A 肋骨串珠
- B 手、脚镯征
- C 方颅
- D "O"形腿
- E 十字形颅

正确答案：D 您选择的答案：

第67题 治疗活动早期佝偻病给予维生素D口服法给药时间

- A 半月后改预防量
- B 1月后改预防量
- C 2月后改预防量
- D 3月后改预防量
- E 4月后改预防量

正确答案：B 您选择的答案：

第68题 营养不良中度腹部皮下脂肪减少到

- A 0.5cm
- B 0.8cm
- C 0.5~0.8cm
- D 0.4cm以下
- E 完全消失

正确答案：D 您选择的答案：

第69题 蛋白质、热能营养不良患儿皮下脂肪消减的顺序是

- A 面颊部 四肢 臀部 腹部
- B 四肢 躯干 腹部 面颊部
- C 臀部 躯干 腹部 面颊部
- D 腹部 躯干、臀部、四肢 面颊部
- E 躯干 臀部 四肢 面颊部

正确答案：D 您选择的答案：

第70题 关于营养不良的病因，以下哪项不正确

- A. 生长发育缓慢
- B. 长期摄入不足
- C. 消化吸收障碍
- D. 需要量增多
- E. 消耗量过大

正确答案：A 您选择的答案：

第71题 治疗佝偻病活动早期口服法，每日给维生素D剂量为

- A 0.2万~0.57YIU
- B 0.5万~1万IU
- C 1万~2万IU
- D 3~4万IU
- E 5~6万IU

正确答案：B 您选择的答案：

第72题 关于维生素D缺乏性手足搐搦症，以下哪项不正确

- A. 多见于<6月婴儿
- B. 维生素D缺乏
- C. 血清总钙 $<1.75 \sim 1.88 \text{ mmol/L}$ ($7 \sim 7.5 \text{ mg\%}$)
- D. 甲状腺代偿功能不足
- E. 神经肌肉兴奋性降低

正确答案：E 您选择的答案：

第73题 营养不良患儿皮下脂肪消减的顺序是

- A 躯干—臀部—四肢—腹部—面颊
- B 面颊部—腹部—躯干—臀部—四肢
- C 腹部—躯干—臀—四肢—面颊
- D 四肢—躯干—腹部—面颊
- E 躯干—臀部—腹部—面颊

正确答案：C 您选择的答案：

第74题 蛋白质-能量营养不良皮下脂肪最先消失的部位是

- A. 面颊部
- B. 躯干
- C. 臀部
- D. 腹部
- E. 四肢

正确答案：D 您选择的答案：

第75题 关于人乳成分正确的是

- A. 人乳含蛋白质多，尤其是酪蛋白明显高于牛乳
- B. 人乳虽不含脂肪酶，但因其脂肪颗粒细小，所以易消化吸收
- C. 人乳中乳糖含量较高，且主要以乙型乳糖为主
- D. 人乳中含丰富的维生素，尤其是维生素K
- E. 人乳中含丰富的矿物质，钙、铁、锌含量明显高于牛乳

正确答案：C 您选择的答案：

第76题 小儿对能量需要的5个方面中，哪项是小儿特需的

- A. 基础代谢所需
- B. 食物的特殊动力作用
- C. 活动所需
- D. 生长所需
- E. 排泄的消耗

正确答案：D 您选择的答案：

第77题 六个月小儿，哪种表现最符合佝偻病性手足搐搦症

- A 抽风后意识障碍
- B 多发生在清晨空腹时的抽搐
- C 发生在春天无热时的抽搐
- D 磕头样发作性痉挛样抽搐
- E 间歇性抽搐伴有痴呆状态

正确答案：C 您选择的答案：

第78题 佝偻病性手足搐搦症钙剂疗法，下述哪项是错误的

- A 10%葡萄糖酸钙5~10ml
- B 用生理盐水或葡萄糖稀释
- C 缓慢静脉注射
- D 重症者每日注射2~3次
- E 连用5天后停用

正确答案：E 您选择的答案：

第79题 在维生素D缺乏性佝偻病的病因中，以下哪项最重要

- A. 食物中摄取维生素D不足
- B. 日光照射不足
- C. 生长过速，需要量增加
- D. 慢性腹泻，吸收减少
- E. 慢性肝、肾疾病使维生素D的代谢障碍

正确答案：B 您选择的答案：

第80题 关于营养不良的治疗原则，以下哪项最重要

- A. 祛除病因，调整饮食
- B. 促进消化，调整饮食
- C. 祛除病因，治疗合并症
- D. 促进消化，治疗合并症
- E. 以上都不是

正确答案：A 您选择的答案：

第81题 血清钙离子低于多少，可引起手足搐搦症发作

- A. $<1.0\text{mmol/L}$ (4mg/dl)
- B. $1.75 \sim 1.88\text{mmol/L}$ ($7 \sim 7.5\text{mg/dl}$)
- C. 2.25mmol/L (9mg/dl)
- D. 1.38mmol/L (5.5mg/dl)
- E. 2.75mmol/L (11mg/dl)

正确答案：A 您选择的答案：

第82题 营养不良可引起的致死并发症是

- A. 营养性贫血
- B. 维生素缺乏
- C. 结核病
- D. 腹泻病
- E. 自发性低血糖

正确答案：E 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第83题 6个月小儿，玩耍中突然出现四肢抖动，双眼上翻，持续约5秒钟后缓解，每天发作2~5次。查体：T36.5摄氏度，枕秃(+)，颅骨软化。应做哪项检查

- A. 脑电图
- B. 血糖
- C. 血Ca、P、AKP
- D. 血镁
- E. 脑脊液

正确答案：C 您选择的答案：

第84题 5个月小儿患肺炎、代谢性酸中毒，予5%NaHCO₃5ml后出现四肢抖动，双眼上翻，持续6秒后缓解，抽后意识清晰。最可能的原因是

- A. 癫痫
- B. 中毒性脑病
- C. 低钙惊厥
- D. 合并脑膜炎
- E. 低血镁

正确答案：C 您选择的答案：

第85题 6个月婴儿，半天来突然抽搐3次，抽时双眼上翻，四肢抖动，持续2分自然缓解，抽后意识清，吃奶，询问病史，生后人工喂养，近日夜惊多汗，查体：营养中等，枕秃明显，囟2.5cm×2.5cm，颈软，患儿再度抽搐，最恰当的处理原则

- A. 先用维生素D，同时补充钙，再吸氧
- B. 先补充钙，同时止惊，吸氧
- C. 先补充钙剂及维生素D，然后吸氧，止惊
- D. 先补钙，同时吸氧，止惊，然后用维生素D
- E. 先止惊及缓慢静脉注射钙剂，后改为口服钙，再用维生素D

正确答案：E 您选择的答案：

第86题 4个月人工喂养儿，体重6kg，每日需8%糖牛乳多少毫升

- A. 1000ml
- B. 900ml
- C. 800ml
- D. 660ml
- E. 580ml

正确答案：D 您选择的答案：

第87题 1岁男婴，2个月来多汗，夜惊，前囟2.5cm×2.5cm，出牙3颗，鸡胸，肋骨串珠，血钙2mmol/L(8mg/dl)，门诊给予肌注维生素D₃ 30万U，并口服钙剂。用药4周后来院复诊，夜间睡眠好，出汗减少，出牙7颗，前囟1.5cm×1.5cm。继之应采用以下哪项治疗措施

- A. 继用钙剂
- B. 停用维生素D₃及钙剂
- C. 再给维生素D₃30万U，肌注，每周1次，共2次，并口服钙剂
- D. 每日口服维生素D₃400U及钙剂
- E. 每日口服维生素D₃800U及钙剂

正确答案：D 您选择的答案：

第88题 2岁小儿，体重12kg，经询问法膳食调查结果如下：每天摄入总能量1300kcal，其中蛋白质供能占15%(优质蛋白质占总蛋白的60%)，脂肪供能占30%，碳水化合物供能占55%。正确的膳食评价是

- A. 总能量摄入严重不足，三大产能营养素供给比例合理
- B. 总能量摄入严重不足，三大产能营养素供给比例不合理
- C. 总能量摄入符合要求，三大产能营养素供给比例合理
- D. 总能量摄入严重超标，三大产能营养素供给比例合理

E. 总能量摄入符合要求, 三大产能营养素供给比例不合理

正确答案: C 您选择的答案:

第89题 小儿8个月, 突然抽搐, 持续2分钟, 发作时意识不清, 自行缓解, 不伴发绀, 3天内抽搐4次, 醒后活泼如常, 血钙为 1.73mmol/L , 血糖 4.0mmol/L , 诊断为

- A 低血糖
- B 化脑
- C 婴儿痉挛症
- D 维生素D缺乏性手足搐搦症
- E 低镁血症

正确答案: D 您选择的答案:

第90题 患儿16个月, 有惊厥史, 血钙为 1.75mmol/L , 以维生素D缺乏性手足搐搦症收入院, 查体可能出现

- A 颈强直
- B 肌肉震颤
- C Trousseau征
- D 脐旁皮下组织 0.4cm
- E 面色苍白

正确答案: C 您选择的答案:

第91题 11个月婴儿, 夜惊, 多汗, 出牙4颗, 方颅, 前囟 $2\text{cm} \times 2\text{cm}$, 肋骨串珠, 血钙 2mmol/L (8mg/dl), 门诊使用维生素D制剂 3000U/d , 口服, 及钙剂治疗, 症状明显好转, 此时患儿腕骨X线片, 出现哪种表现方可采用预防量维生素D

- A. 骨干皮质增厚硬化
- B. 干骺端钙化预备带消失
- C. 钙化预备带重新出现
- D. 干骺端宽度呈喇叭状
- E. 干骺端骨骺预备带增宽大于 1cm

正确答案: C 您选择的答案:

第92题 女婴, 1岁。体重 10kg , 生后母乳喂养, 8月始添加辅食, 因不能站立而就诊, 查体: 精神好, 面稍苍白, 消瘦, 腹部皮下脂肪厚度为 0.3cm , 肌肉松弛, 可能的 诊断为

- A 正常儿
- B Ⅰ度营养不良
- C Ⅱ度营养不良
- D Ⅲ度营养不良
- E 佝偻病

正确答案: C 您选择的答案:

第93题 患儿, 7日。近日经常夜惊多汗, 且抽搐二次, 抽后意识清, 进奶好, 医生诊断为: 佝偻病手足搐搦症, 本病以下哪项不具备

- A 喉痉挛
- B 全身性抽搐
- C 助产式手, 芭蕾舞足
- D 面神经征阳性
- E 婴儿期呈婴儿痉挛性发作

正确答案: E 您选择的答案:

第94题 有婴儿, 11月龄。腕部X线片示骨骺端临时钙化带消失, 呈杯口状, 毛刷状改变, 血清钙 1.85mmol/L (7.4mg/dl), 磷 1.8mmol/L (5.8mg/dl), 碱性磷酸酶 40U (布氏), 哪一点不是骨样组织堆积所致

- A 手镯
- B 脚镯
- C 方颅
- D 肋串珠
- E 肋膈沟

正确答案: E 您选择的答案:

第95题 3个月婴儿, 每日供给的热量为 0.42MJ/kg (100kcal/kg), 需要蛋白质, 脂肪, 碳水化合物分别占总热量为

- A 蛋白质 35% , 脂肪 15% , 碳水化合物 50%
- B 蛋白质 15% , 脂肪 50% , 碳水化合物 35%
- C 蛋白质 15% , 脂肪 35% , 碳水化合物 50%
- D 蛋白质 50% , 脂肪 15% , 碳水化合物 35%
- E 蛋白质 35% , 脂肪 50% , 碳水化合物 15%

正确答案: C 您选择的答案:

第96题 女婴, 1岁半, 因头颅大, 未出牙, 前囟未闭来院门诊。生后人工喂养, 间断服用钙剂和维生素D, 用量不详。体检: 精神可, 易哭, 体重 11kg , 前囟 $2\text{cm} \times 2\text{cm}$, 方颅, 头围 48cm , 胸部有肋骨串珠, 心肺(-), 双腕部呈手镯状, X线长骨示: 骨骺软骨带明显增宽, 干骺端呈杯口状, 毛刷样改变。该患儿诊断应为

- A. 软骨营养不良
- B. 脑积水
- C. 克汀病
- D. 佝偻病激期
- E. 佝偻病恢复期

正确答案: D 您选择的答案:

第97题 男婴, 4个月, 冬季出生, 因夜惊多汗, 烦躁易哭1个月来院门诊, 生后母乳喂养, 未加辅食。体检: 精神尚可, 枕秃, 枕骨按之有乒乓球感。在此患儿可能的致, 病原因中, 以下哪项不正确

- A. 食物中维生素D含量不足

- B. 食物中钙、磷比例适合
C. 日光照射不足
D. 生长发育快
E. 肾小管对钙磷的重吸收不足

正确答案：B 您选择的答案：

第98题 1岁男孩，多汗，夜惊，体检：前囟门 $2\text{cm} \times 2\text{cm}$ ，方颅，出牙2个，串珠明显，血钙 2mmol/L (8mg/dl)， $\text{Ca} \times \text{P} = 28$ ，采用哪项治疗

- A 补充钙剂
B 口服维生素D剂 400IU / 日及钙剂
C 口服维生素D剂 800IU / 日及钙剂
D 注射维生素D 330万IU ，每2周注射一次，共2次，并口服钙剂
E 注射维生素D 330万IU 一次肌注即可

正确答案：D 您选择的答案：

第99题 10月患儿，已在当地医院诊断为佝偻病活动期，给予治疗，效果不好，为进一步判定诊断是否正确，不需要做下列哪些检查

- A 腕部X线摄片
B 测血清，钙，磷
C 血常规
D 体格检查
E 骨密度

正确答案：C 您选择的答案：

第100题 小儿1岁，可见胸骨串珠，膈肋沟，手镯及脚镯，前囟为 $1.5\text{cm} \times 1.5\text{cm}$ ，血钙为 2.25mmol/L ，血磷： 1.0mmol/L ，X线可见干骺端呈杯口改变，临时钙化带消失，诊断为

- A 甲状腺功能低下
B 软骨营养不良
C 低血磷抗D佝偻病
D 维生素D缺乏性佝偻病
E 维生素D依赖性佝偻病

正确答案：D 您选择的答案：

第101题 6个月的健康婴儿体重 7.5kg ，为适应正常的生长发育需要，每日需供给热量

- A. 2095kJ/kg (500kcal/kg)
B. 1676kJ/kg (400kcal/kg)
C. 1257kJ/kg (300kcal/kg)
D. 938kJ/kg (200kcal/kg)
E. 459kJ/kg (110kcal/kg)

正确答案：E 您选择的答案：

第102题 3个月健康婴儿，体重 5.0kg ，每天需要的牛奶量和水量是

- A. 8%糖牛奶 550ml ，水 200ml
B. 8%糖牛奶 660ml ，水 240ml
C. 8%糖牛奶 770ml ，水 300ml
D. 8%糖牛奶 900ml ，不必加水
E. 8%糖牛奶 640ml ，水 110ml

正确答案：A 您选择的答案：

第103题 4个月男婴，母乳不足而未及时添加其他乳品，体重 5.5kg ，身长 62cm ，腹壁皮下脂肪厚度 0.5cm ，不活泼，好哭，皮肤干燥，血钙 $2.5\mu\text{mol/L}$ ，最可能的诊断是

- A. 佝偻病
B. 正常儿
C. 营养不良I度
D. 营养不良II度
E. 营养不良III度

正确答案：C 您选择的答案：

第104题 一患儿8月。诊断为佝偻病活动期，正在治疗时，患儿出现发热，咳嗽，且肺部听诊闻及中小水泡音，此时选择哪种方法治疗佝偻病更好

- A 暂不治疗佝偻病，先治疗肺炎
B 口服大剂量维生素D，每日 2万IU ，一月后改预防量口服
C 肌注维生素D 360万IU ，肌注一次，同时补钙
D 肌注维生素D 330万IU ，二次肌注，相隔2~4周
E 肌注维生素D 380万IU ，二次肌注

正确答案：D 您选择的答案：

第105题 1岁男婴，母乳少，长期以米汤，稀饭喂养，不规律添加辅食，食欲差，精神差，皮下脂肪厚度为 0.5cm ，诊断为：I度营养不良，下面表现哪个最先出现

- A 皮肤干燥
B 肌张力不低，肌肉松弛
C 身高低于正常
D 皮下脂肪减少
E 体重不增或减轻

正确答案：E 您选择的答案：

第106题 人工喂养儿，体重 6kg ，用8%糖牛乳喂养，每日除牛奶外还需喂水多少毫升

- A. 60ml
B. 120ml

- C. 240ml
- D. 300ml
- E. 360ml

正确答案：C 您选择的答案：

第107题 一婴儿突发惊厥，无热，反复发作3次，惊厥后意识清，活泼如常，患儿为人工喂养，极少户外活动，未服鱼肝油，查体：出牙延迟，哈氏沟明显，方颅，血钙1.0mmol/L，最确切的诊断是

- A 佝偻病早期
- B 佝偻病的活动期
- C 维生素D缺乏性手足搐搦症
- D 低血糖症
- E 低血镁症

正确答案：C 您选择的答案：

第108题 冬季出生一男婴，足月顺产，现已4个月，体重5.8kg，只中乳喂养，未添加辅食，近日来，婴儿多烦躁，易激惹，夜惊，多汗，血钙，血磷，碱性磷酸酶正常，最可能的诊断是

- A 惊吓
- B 营养不良
- C 佝偻病活动期
- D 佝偻病早期
- E 先天性佝偻病

正确答案：D 您选择的答案：

第109题 5个月母乳喂养儿，生长发育良好。现母乳量略有不足，正确的做法是

- A. 改为人工喂养
- B. 改为部分母乳喂养
- C. 改为混合喂养
- D. 继续母乳喂养，并开始添加辅食
- E. 改为人工喂养，并开始添加辅食

正确答案：D 您选择的答案：

第110题 3岁小儿体检时发现鸡胸，血Ca、P、AKP正常，你认为最可能的诊断是

- A. 佝偻病初期
- B. 佝偻病激期
- C. 佝偻病活动期
- D. 佝偻病恢复期
- E. 佝偻病后遗症期

正确答案：E 您选择的答案：

第111题 男婴，8个月。自幼人工喂养，未补充维生素D制剂，近来出现多汗，烦躁，夜惊，查体：方颅，出牙延迟，串珠，诊断为佝偻病活动期，发病机制下列哪项是错误的

- A 尿磷排出增加
- B 血中钙，磷乘积降低
- C 维生素D缺乏
- D 钙，磷在肠道吸收减少
- E 甲状腺代偿功能不足

正确答案：E 您选择的答案：

第112题 5个月婴儿，体重6kg，每日需喂1%糖牛奶量及额外供给温水量为

- A 牛奶量为440ml，除牛奶外尚需给水160ml
- B 牛奶量为550ml，水为200ml
- C 牛奶量为660ml，水为240ml
- D 牛奶量为770ml，水为280ml
- E 牛奶量为880ml，水为320ml

正确答案：C 您选择的答案：

第113题 8个月婴儿，人工喂养，经常患腹泻。体检：体重5kg，精神萎靡，食欲差，面色苍白，腹壁皮下脂肪厚度0.2cm，皮肤干燥，考虑为

- A. I度营养不良
- B. II度营养不良
- C. III度营养不良
- D. 维生素A缺乏
- E. 慢性腹泻

正确答案：B 您选择的答案：

第114题 2月男婴，出生体重3000g生后即于进乳，进水后出现呕吐，逐渐加重，而入院治疗，患儿食欲强，大便少，查体：体重3kg，血浆总蛋白降低，最易出现的体征

- A 皮下脂肪0.3cm
- B 皮肤，巩膜黄染
- C "O"型腿
- D 肋串珠及哈氏沟
- E 双足背浮肿

正确答案：A 您选择的答案：

第115题 4个月人工喂养儿，体重6kg，每日需总液体量及能量各多少

- A. 总液体量900ml，能量660kcal
- B. 总液体量1200ml，能量880kcal
- C. 总液体量1200ml，能量660kcal
- D. 总液体量900ml，能量880kcal

E. 总液体量660ml, 能量660kcal
正确答案: A 您选择的答案:

第116题 8个月女婴, 因咳嗽, 低热3~4天入院, 生后人工喂养, 以往曾多次患"肺炎", 常腹泻、便秘交替出现。体检: 体重5.2kg, 身长62cm, 心音低钝, 两肺闻及干啰音及大水泡音, 肌张力较低, 肌肉松弛。下列哪种情况在该患儿中不可能出现

- A. 腹壁皮下脂肪厚度0.2cm
- B. 腹壁皮下脂肪厚度0.5cm
- C. 结膜毕脱斑
- D. 肝脾肿大
- E. 皮肤黏膜苍白

正确答案: B 您选择的答案:

第117题 患儿, 男, 6个月。因阵发性面色青紫伴喉鸣1天来诊。无发热, 不咳嗽。体检: 体温36.8, 神志清, 精神好, 呼吸平稳, 吸气时偶闻喉鸣音, 咽不充血, 心脏检查无异常, 两肺闻及鼾音。最可能的诊断是

- A. 急性喉炎
- B. 先天性喉喘鸣
- C. 支气管炎
- D. 婴儿手足搐搦症, 喉痉挛
- E. 气管异物

正确答案: D 您选择的答案:

第118题 小儿10个月, 方颅, 多汗, 胸骨肋膈沟, 血钙正常, 血磷低, X线可见骨骺软骨增宽, 干骺端临时钙化带模糊, 并呈毛刷状改变, 诊断为

- A. 佝偻病初期
- B. 佝偻病激期
- C. 佝偻病恢复期
- D. 佝偻病后遗症期
- E. 先天性佝偻病

正确答案: B 您选择的答案:

第119题 一女童, 体重按同龄正常儿童低30%, 皮下脂肪为0.5cm, 同时伴有皮肤干燥, 肌张力减低应诊断为

- A. 营养不良轻度
- B. 营养不良中度
- C. 营养不良重度
- D. 属正常儿童范畴
- E. 糖尿病

正确答案: B 您选择的答案:

三、A3型题: 以下提供若干个案例, 每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息, 在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第120-121题

男, 5个月, 反复发作呼吸困难, 伴吸气时喉鸣, 唇紫3~4次, 间歇期一般好, 无青紫, 左枕部颅骨软化, 心肺正常。

1. 诊断首先考虑

- A. 急性喉炎
- B. 气管异物
- C. 法洛三联症
- D. 手足搐搦症
- E. 中毒性脑炎

2. 该患儿突然缺氧发作, 首要的急救措施是

- A. 口对口呼吸
- B. 面罩给氧
- C. 鼻导管给氧
- D. 气管插管
- E. 静注钙剂

正确答案: DA 您选择的答案:

第122-125题

男婴1岁, 人工喂养, 因出牙延迟, 不会走路而来院就诊。平时多汗, 烦躁, 刚会独坐, 前囟3cm×3cm, 方颅, 无乳牙萌出, 肋骨串珠可疑。

1. 此时该患儿的血生化改变应是血钙血磷血碱性磷酸酶

- A.
- B.
- C.
- D. 正常
- E. 正常

2. 其腕部X线摄片表现, 以下哪项是错误的

- A. 干骺端钙化预备带消失, 呈杯口状, 毛刷样改变
- B. 骨骺软骨带明显增宽
- C. 钙化预备带重新出现
- D. 骨干骨质稀疏
- E. 骨皮质变薄

3. 该患儿的诊断应为

- A. 佝偻病初期
- B. 佝偻病激期
- C. 佝偻病恢复期
- D. 佝偻病后遗症期

- E. 先天性甲状腺功能低下
4. 治疗应选择以下哪项
A. 每日口服维生素D3000U, 持续1个月
B. 每日口服维生素D400U, 持续3个月
C. 每日口服维生素D800U, 持续3个月
D. 每日口服维生素D3000U, 持续至2周岁
E. 每日口服维生素D400U, 持续至2周岁
正确答案: CCBA 您选择的答案:

第126-127题

4个月女婴, 突然惊厥发作, 患儿从出生后牛奶喂养, 未加辅食, 近一日流涕, 时有哭闹, 但无发热及咳嗽, 不呕吐, 二便正常, 查体: 体温37.8, 面色灰白, 双眼上翻, 面部肌肉颤动, 四肢抖动, 心肺正常, 前囟平坦, 颈强(-), 枕部有乒乓球感

1. 该患儿诊断是
A. 高热惊厥
B. 癫痫
C. 脑炎
D. 颅内出血
E. 佝偻病手足搐搦症
2. 首选的急救措施为
A. 立即给予10%水合氯醛3ml灌肠, 然后给予葡萄糖酸钙静注
B. 立即给予维生素D330万U(750μg)肌注, 然后给予葡萄糖酸钙
C. 立即给予10%葡萄糖酸钙5~10ml, 加10%的葡萄糖10~20ml静注
D. 立即选择青霉素静点, 同时给予鲁米那肌注
E. 20%甘露醇静注0.5~1g/(kg·次), 同时肌注鲁米那
正确答案: EA 您选择的答案:

第128-130题

9个月婴儿, 近一个月夜惊, 睡眠差, 多汗, 烦躁, 运动发育迟, 刚会坐, 不能爬, 体检: 前囟大, 方颅, 有哈氏沟及串珠

1. 为了确定诊断应作的血化验
A. 血常规
B. 血离子钾, 镁
C. 血糖
D. 血的酸碱度
E. 血钙, 磷及碱性磷酸酶
2. 哪项治疗为首选
A. 每天口服维生素D1万~2万IU(250~500μg), 持续1个月后, 改为预防量400IU~800IU
B. 每天口服维生素D0.5万~1万IU(125~250μg), 连用2~3个月, 改预防量
C. 每天口服维生素D0.5万~1万IU(125~250μg), 连用2个月, 改预防量
D. 每天口服维生素D1万~2万IU(250~500μg), 持续用2~3个月
E. 每天口服维生素D0.5万~1万IU(125~250μg), 连用3~6个月
3. 本病确切的诊断
A. 佝偻病初期
B. 佝偻病活动期
C. 佝偻病后遗症期
D. 佝偻病恢复期
E. 佝偻病手足搐搦症
正确答案: EAB 您选择的答案:

第131-133题

母亲带一体重5.8kg的4个月婴儿来进行营养咨询。

1. 该婴儿目前的饮食除母乳外, 该添加的辅食是
A. 菜泥、面条
B. 肉沫、软饭
C. 粥、饼干
D. 米糊、蛋黄
E. 肉汤、鱼肝油
2. 每日所给奶量应按下列哪项计算
A. 胃容量大小计算
B. 体表面积计算
C. 实际体重计算
D. 所需能量计算
E. 实际体重及所需能量计算
3. 最适当的断奶时间是
A. 9~10个月
B. 10~12个月
C. 12~18个月
D. 19~24个月
E. 6~8个月
正确答案: DEA 您选择的答案:

第134-136题

6个月小儿, 有烦躁不安、多汗、夜惊、枕秃, 前囟3.5×3.5cm大小, 体检未发现明显骨骼畸形。

1. 该患儿诊断为佝偻病初期, 其参考依据是
A. 临床表现
B. 血钙
C. 血碱性磷酸酶

- D. X线骨骼改变
E. 血磷
2. 该患儿的实验室检查可发现
A. 血钙增高
B. 血磷增高
C. 碱性磷酸酶增高或正常
D. PTH降低
E. 以上都不是
3. 在该患儿的治疗中, 下列哪项是正确的
A. 维生素D220~40IU治疗
B. 抗生素治疗
C. 对有并发症的应给予维生素D3肌肉注射
D. 给予维生素D2预防量治疗
E. 外科手术
- 正确答案: ACC 您选择的答案:

第137-138题

1. 5岁男婴, 第一胎第一产, 足月, 出生后母乳喂养, 平时体质弱, 常患病, 如"肺炎""气管炎""腹泻"等, 一直未添加辅食, 近2日呕吐1~2次/日, 为胃内容物, 查体: 精神萎靡, 营养状况差, 体重5kg, 前囟已闭, 心肺无异常, 皮肤弹性差, 皮下脂肪消失, 四肢肌张力低下

1. 该男婴的诊断是
A. 营养不良I度
B. 营养不良II度
C. 营养不良III度
D. 营养不良III度, 伴重度脱水
E. 营养不良I度, 伴重度脱水
2. 开始治疗时, 下列哪项措施不能用
A. 辅助用苯丙氨酸, 促进蛋白合成
B. 必要时可采用鼻饲, 供给足够的热量
C. 10%~15%的葡萄糖每日10ml/kg供给
D. 每日供给热量0.17MJ/kg(40kcal/kg), 然后逐渐增加剂量
E. 口服一些消化酶类制剂
- 正确答案: CC 您选择的答案:

第139-141题

10月男婴, 经常出现夜惊不宁, 近一周加重, 多汗, 烦闹, 该患生后一直母乳不足, 混合喂养, 尚未添加辅食, 此患到门诊就诊时

1. 体格检查最易发现的阳性体征为
A. 皮肤弹性差
B. 皮下脂肪明显减少
C. 体检正常
D. 方颅, 前囟大, 乳牙未萌出
E. 双下肢淤点, 淤斑
2. 该患儿最可能的诊断
A. 佝偻病
B. 营养不良
C. 正常儿
D. 上呼吸道感染
E. 消化不良
3. 本病发生的病因, 哪些不正确
A. 日光照射不足
B. 维生素D摄入不足
C. 维生素D的需要量增加
D. 食物中钙磷含量过低或比例不当
E. 甲状旁腺功能不足
- 正确答案: DAE 您选择的答案:

第142-145题

5个月健康小儿, 体重为6kg, 用牛奶人工喂养

1. 每天需要的总能量应为
A. 450kcal
B. 500kcal
C. 550kcal
D. 600kcal
E. 660kcal
2. 如采用8%的牛奶, 每天应给多少毫升
A. 500ml
B. 550ml
C. 600ml
D. 660ml
E. 700ml
3. 除牛奶外, 还应给予多少毫升水
A. 200ml
B. 240ml
C. 280ml
D. 300ml
E. 350ml
4. 现在该小儿可以添加的辅食, 除了
A. 菠菜泥
B. 白菜泥

- C. 米粉
- D. 肉末
- E. 苹果泥

正确答案：EDBD 您选择的答案：

第146-148题

患儿1岁，因晨起突然神志不清来院。体检：体重5kg，体温不升，老人貌，皮肤干燥无弹性，表情呆滞，面色苍白，脉搏减慢，呼吸浅表，多汗，腹壁皮下脂肪消失，急诊来院。

1. 可能的诊断是
 - A. 中度营养不良，伴低钙惊厥
 - B. 中度营养不良，心力衰竭
 - C. 中度营养不良，自发性低血糖
 - D. 中度营养不良，自发性低血糖
 - E. 轻度营养不良，心力衰竭
2. 首先应采取的紧急措施是
 - A. 静脉注射西地兰
 - B. 静脉注射氯化钾
 - C. 静脉注射多巴胺
 - D. 静脉注射高渗葡萄糖
 - E. 静脉注射5%碳酸氢钠
3. 该患儿在调整饮食时，其热量供给的原则是
 - A. 由少迅速增至正常
 - B. 由少逐渐增至正常
 - C. 由少逐渐增至低于正常
 - D. 由少逐渐增至超过正常
 - E. 由少迅速增至超过正常

正确答案：CDD 您选择的答案：

第149-150题

6个月女婴，4月份入院，发热2天。体温38.0℃，咳嗽有痰，1天来惊厥4~5次，发作时两眼上窜，四肢抽动，持续1~2分钟，抽后神志清。体检：一般情况好，前囟2.5cm×2.5cm，平坦，枕骨按之有乒乓球感，双肺有中、小水泡音。

1. 最可能的诊断是
 - A. 婴儿手足搐搦症，支气管肺炎
 - B. 支气管肺炎并发中毒性脑病
 - C. 化脓性脑膜炎，支气管肺炎
 - D. 急性喉炎
 - E. 婴儿痉挛症
2. 以下哪项化验结果是直接导致患儿惊厥的原因
 - A. 血钙1.87mmol/L(7.5mg/dl)
 - B. 血镁0.80mmol/L(2mg/dl)
 - C. 血磷2.25mmol/L(7mg/dl)
 - D. 碱性磷酸酶200U
 - E. 血清钙离子0.88mmol/L(3.5mg/dl)

正确答案：AE 您选择的答案：

第151-153题

8月女婴，生后一直人工喂养，尚未加辅食，近日时有夜惊多汗，今日突然惊厥发作，四肢抖动，面色苍白，约1分钟自行缓解，抽后玩耍如常，近二日流涕，但无发热及咳嗽，查体：营养发育较差，前囟平坦，方颅，颈强(-)，心肺正常。

1. 该患儿诊断什么
 - A. 高热惊厥
 - B. 病毒性脑炎
 - C. 癫痫
 - D. 低血糖症
 - E. 佝偻病手足搐搦症
2. 若在就诊时再度惊厥发作，急救措施是
 - A. 立即10%水合氯醛0.5~1ml/(kg·次)灌肠，然后给予葡萄糖酸钙静注
 - B. 立即维生素D330万IU肌注一次，然后给予葡萄糖酸钙静注
 - C. 立即10%葡萄糖酸钙5~10ml加入5%葡萄糖10~20ml中静注
 - D. 立即静点抗生素，然后肌注鲁米那
 - E. 20%甘露醇0.5~1g/(kg·次)静注
3. 急需做哪项检查，对诊断最有帮助
 - A. 血Ca，P，AKP
 - B. 血常规
 - C. 脑脊液检查
 - D. 病毒分离
 - E. 脑电图

正确答案：EAA 您选择的答案：

四、A4型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第154-157题

女，10个月，人工喂养。低热咳嗽2天，面及四肢抽搐4~5次，每次20~30秒自止，间歇期吃奶如常。体检：体温38.5℃，前囟2cm×3cm，平坦，咽充血，肋骨串珠，面神经征阳性。血红蛋白8×10⁹/L，中性0.6，血糖4.44mmol/L(80mg/dl)。

1. 该患儿最可能的诊断是
 - A. 婴儿痉挛症

- B. 重症肺炎
 - C. 低血糖症
 - D. 手足搐搦症
 - E. 中枢神经系统感染
2. 若此时立即给患儿抽血查血钙, 结果为 1.55mmol/L 。请问, 引起血钙降低的主要原因是
- A. 血钙迅速向骨转移
 - B. 尿钙排出过多
 - C. 血糖偏低
 - D. 甲状旁腺功能亢进
 - E. 甲状旁腺反应迟钝
3. 惊厥发作时, 应进行下列哪项急救措施
- A. 面罩吸氧
 - B. 静注钙剂
 - C. 先止惊再给钙剂
 - D. 立即肌注D3
 - E. 静注甘露醇
4. 若给该患儿补钙, 以下注意事项哪项不正确
- A. 静脉补钙应给予稀释
 - B. 静推速度应缓慢
 - C. 静注时切勿漏于血管外
 - D. 10%氯化钙可长期口服
 - E. 口服钙剂勿与牛奶混合
- 正确答案: DECD 您选择的答案:

第158-162题

女, 1岁, 咳嗽, 发热伴腹泻2周, 进食少, 每日大便7~8次, 为黄色水样便, 近3日嗜睡、乏力, 头不能竖起。体检: 体重7kg, 表情淡漠, 面色苍白, 下颌呼吸, 30次/分, 不规则, 两肺呼吸音粗糙, 可闻及少量中、小水泡音, 心率92次/分, 心音低钝, 腹胀, 肠鸣音减少, 皮肤干燥, 弹性差, 皮下脂肪厚0.4cm, 膝反射消失。

1. 此时危及生命的紧急情况是
- A. 低血糖
 - B. 低血钠
 - C. 低血钾
 - D. 低血钙
 - E. 酸中毒
2. 首先应给予哪项检查
- A. 动脉血气分析
 - B. 血电解质测定
 - C. 血糖测定
 - D. 心电图检查
 - E. 脑电图检查
3. 若该患儿检查结果为: 血pH7.31, 血钠 130mmol/L , 血钾 1.75mmol/L , 血钙 2.5mmol/L , EKG示T波低平。此时

最佳治疗措施是

- A. 口服氯化钾
 - B. 静注葡萄糖酸钙
 - C. 静滴碳酸氢钠
 - D. 静注高渗葡萄糖
 - E. 静滴0.3%氯化钾
4. 该患儿诊断应为
- A. 支气管肺炎, 中度营养不良, 低血钾
 - B. 支气管肺炎, 小儿腹泻, 低血钾
 - C. 小儿腹泻, 酸中毒低血钾
 - D. 中度营养不良, 佝偻病, 低血钙
 - E. 小儿腹泻, 脱水, 酸中毒
5. 出院时最重要的口头医嘱是
- A. 预防各种传染病
 - B. 口服广谱抗生素
 - C. 口服多种维生素
 - D. 科学育儿, 合理喂养
 - E. 定期肌注苯丙酸诺龙

正确答案: CBEAD 您选择的答案:

五、B1型题: 以下提供若干组考题, 每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第163-165题

- A. 产能占总能量的10%~15%
 - B. 产能占总能量的25%~30%
 - C. 产能占总能量的30%~45%
 - D. 产能占总能量的50%~60%
 - E. 产能占总能量的55%~70%
1. 某幼儿园给入园的孩子制定营养食谱, 碳水化合物的合理供给量是
2. 某幼儿园给入园的孩子制定营养食谱, 脂肪的合理供给量是
3. 某幼儿园给入园的孩子制定营养食谱, 蛋白质的合理供给量是

正确答案: DBA 您选择的答案:

第166-168题

- A. 初乳
- B. 过渡乳

- C. 成熟乳
 - D. 晚乳
 - E. 全程乳
 - 1. 人乳中免疫球蛋白含量最丰富的是
 - 2. 人乳乳汁量最多的是
 - 3. 人乳中含脂肪最多的是
- 正确答案：ACB 您选择的答案：

第169-171题

- A. 母乳
 - B. 鲜牛奶
 - C. 全脂奶粉
 - D. 羊奶
 - E. 炼乳
 - 1. 含酪蛋白多，凝块大，难于消化
 - 2. 含叶酸量极低，易患营养性巨幼细胞贫血
 - 3. 钙磷比例为2:1，佝偻病患病率低
- 正确答案：BDA 您选择的答案：

第172-174题

- A. 生后2周
 - B. 3个月
 - C. 4个月
 - D. 8个月
 - E. 12个月
 - 1. 婴儿宜添加富含铁质食物的月龄是
 - 2. 生后开始补充维生素D的时间是
 - 3. 从半流质过渡到软食或固体食物的月龄是
- 正确答案：CAE 您选择的答案：

第175-176题

- A. 维生素D400U服
 - B. 维生素D310万~20万U口服
 - C. 维生素D320万~30万U肌注
 - D. 维生素D360万U肌注
 - E. 维生素D390万U肌注
 - 1. 婴幼儿维生素D每日生理需要量
 - 2. 重度佝偻病，或有并发症者维生素D治疗量
- 正确答案：AC 您选择的答案：

第177-180题

- A. 1000ml
 - B. 700ml
 - C. 660ml
 - D. 500ml
 - E. 300ml
 - 婴儿每日所需8%的糖牛奶量为
 - 1. 3个月婴儿
 - 2. 5个月婴儿
 - 3. 1个月新生儿
 - 4. 7个月婴儿
- 正确答案：DCEB 您选择的答案：

第181-184题

- A. 150ml / kg
- B. 125ml / kg
- C. 100ml / kg
- D. 75ml / kg
- E. 40ml / kg
- 每日所需水分

- 1. 婴儿
 - 2. 成人
 - 3. 学龄儿
 - 4. 学龄前儿
- 正确答案：AEDC 您选择的答案：

第185-187题

- A. 16.7kJ(4kcal)
 - B. 37.6kJ(9kcal)
 - C. 18.4kJ(4.4kcal)
 - D. 21kJ(5kcal)
 - E. 31kJ(7.5kcal)
 - 1. 蛋白质每克经氧化后可产生热能
 - 2. 脂肪每克经氧化后可产生热能
 - 3. 碳水化合物每克经氧化后可产生热能
- 正确答案：ABC 您选择的答案：

第188-189题

- A. 手足搐搦
- B. 无热惊厥

- C. 喉痉挛
- D. 面神经征阳性
- E. 腓反射阳性

1. 维生素D缺乏性手足搐搦症，最常见的临床表现是

2. 维生素D缺乏性手足搐搦症，危及生命的临床表现是

正确答案：BC 您选择的答案：