

历年试题3 内科学 第一章 常见症状与体征

一、A1型题：每一道考试题目下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 奇脉见于

- A. 高血压
- B. 右心功能不全
- C. 主动脉瓣关闭不全
- D. 二尖瓣狭窄
- E. 大量心包积液

正确答案：E 您选择的答案：

第2题 一位发热患者，体温在39℃以上，未用任何退热降温措施，24小时内体温波动达2℃以上，最低时体温仍高于正常。这种热型是

- A. 弛张热
- B. 回归热
- C. 稽留热
- D. 波浪热
- E. 间歇热

正确答案：A 您选择的答案：

第3题 右心室肥大心尖搏动的位置为

- A. 向左上移位
- B. 向右移位
- C. 向右上移位
- D. 向左移位
- E. 向左下移位

正确答案：D 您选择的答案：

第4题 对于啰音的描述，不正确的是

- A. 部位较固定
- B. 呼气时更为明显
- C. 吸气时也可听到
- D. 音调较高
- E. 持续时间较长

正确答案：A 您选择的答案：

第5题 提示左心功能不全的脉搏是

- A. 交替脉
- B. 重搏脉
- C. 水冲脉
- D. 奇脉
- E. 迟脉

正确答案：A 您选择的答案：

第6题 正常青年人胸部不会出现的叩诊音是

- A. 清音
- B. 过清音
- C. 鼓音
- D. 浊音
- E. 实音

正确答案：B 您选择的答案：

第7题 判断休克已纠正除血压正常外，尿量每小时至少应稳定在

- A. 40ml 以上
- B. 30ml 以上
- C. 25ml 以上
- D. 60ml 以上
- E. 50ml 以上

正确答案：C 您选择的答案：

第8题 肝硬化门静脉高压症最具诊断价值的表现是

- A. 腹壁静脉曲张
- B. 食管下段、胃底静脉曲张
- C. 腹水
- D. 黄疸
- E. 脾肿大，脾功能亢进

正确答案：B 您选择的答案：

第9题 完全性阻塞性黄疸时，正确的是

- A. 尿胆原(-), 尿胆红素(+)
- B. 尿胆原(+), 尿胆红素(+)
- C. 尿胆原(-), 尿胆红素(-)
- D. 粪胆素(+)
- E. 尿胆原(+), 尿胆红素(-)

正确答案：A 您选择的答案：

第10题 患者男性，12岁，肺动脉瓣区听到3 / 6级收缩期杂音，同时听到不受呼吸影响的明显第二心音分裂。该患者可能是

- A. 肺动脉瓣狭窄
- B. 二尖瓣狭窄
- C. 房间隔缺损
- D. 肺动脉瓣关闭不全
- E. 正常人

正确答案：C 您选择的答案：

第11题 心脏触及震颤多由于

- A. 心脏瓣膜狭窄
- B. 左室增大
- C. 心室颤动
- D. 心房颤动
- E. 心脏瓣膜轻度关闭不全

正确答案：A 您选择的答案：

第12题 高度脾肿大可见于

- A. 慢性溶血性贫血
- B. 骨髓增生异常综合征
- C. 急性白血病
- D. 慢性粒细胞白血病
- E. 结缔组织病

正确答案：D 您选择的答案：

第13题 胸骨左缘第二肋间触及连续性震颤，常见病变为

- A. 室间隔缺损
- B. 主动脉瓣狭窄
- C. 肺动脉瓣狭窄
- D. 房间隔缺损
- E. 动脉导管未闭

正确答案：E 您选择的答案：

第14题 双肺满布湿啰音多见于

- A. 支气管肺炎
- B. 支气管扩张
- C. 急性肺水肿
- D. 肺淤血
- E. 肺结核空洞

正确答案：C 您选择的答案：

第15题 区别血尿与血红蛋白尿的主要方法是

- A. 做尿潜血试验
- B. 做尿三杯试验
- C. 做尿胆原测验
- D. 观察血尿颜色
- E. 做尿沉渣镜检

正确答案：E 您选择的答案：

第16题 男性，25岁，活动时突感右胸部撕裂样痛。查体：大汗淋漓惊恐状，气促，气管左偏，叩诊右胸空瓮音，右侧呼吸音消失。该患者最可能的诊断为

- A. 右侧张力性气胸
- B. 胸腔积液
- C. 肺气肿
- D. 大叶性肺炎
- E. 干性胸膜炎

正确答案：A 您选择的答案：

第17题 引起左心室后负荷增高的主要因素是

- A. 肺循环高压
- B. 血细胞比容增大
- C. 回心血量增加
- D. 主动脉瓣关闭不全
- E. 体循环高压

正确答案：E 您选择的答案：

第18题 双下肢对称性紫癜伴荨麻疹者常见于

- A. 再生障碍性贫血
- B. 血小板减少
- C. 过敏性紫癜
- D. 激素性紫癜
- E. 特发性血小板增多症

正确答案：C 您选择的答案：

第19题 胸膜摩擦音听诊的时相特点为

- A. 吸气初期
- B. 呼气期
- C. 吸气末期
- D. 吸气中期
- E. 呼吸两相

正确答案：E 您选择的答案：

第20题 重度主动脉瓣返流时心尖部可存在

- A. Austin-Flint杂音
- B. DeMusset征
- C. Graham-Steell杂音
- D. Durozier征
- E. Traube征

正确答案：A 您选择的答案：

第21题 心尖区触及舒张期震颤，最可能的是

- A. 室间隔缺损
- B. 二尖瓣狭窄
- C. 主动脉瓣狭窄
- D. 动脉导管未闭
- E. 二尖瓣关闭不全

正确答案：B 您选择的答案：

第22题 门静脉高压症的治疗，错误的是

- A. 下腔静脉与门静脉吻合易造成肝性脑病
- B. 静滴垂体后叶素可以降低门静脉压
- C. 内镜下食管静脉曲张蓝色曲张需紧急手术
- D. 食管胃底静脉曲张破裂出血非手术治疗首选三腔管压迫止血
- E. 食管胃底静脉曲张时可行食管内窥镜注入硬化剂治疗

正确答案：C 您选择的答案：

第23题 奇脉最常见于

- A. 大量心包积液
- B. 急性左心衰竭
- C. 室间隔缺损
- D. 动脉导管未闭
- E. 高血压病

正确答案：A 您选择的答案：

第24题 外源性致热原的特点，正确的是

- A. 能激活血液中的中性粒细胞和单核细胞
- B. 分子量较小
- C. 其致热原性可被蛋白酶类所破坏
- D. 在体内最终由肝、肾灭活和排泄
- E. 直接作用于体温调节中枢

正确答案：A 您选择的答案：

第25题 关于第二心音分裂的描述错误的是

- A. 生理性分裂在青少年中更多见
- B. 肺动脉高压时可出现通常分裂
- C. 固定分裂可见于房间隔缺损
- D. 反常分裂可见于完全性右束支传导阻滞
- E. 逆分裂可见于主动脉瓣狭窄

正确答案：D 您选择的答案：

第26题 导致脉压增大的疾病是

- A. 心力衰竭
- B. 低血压
- C. 主动脉瓣狭窄
- D. 主动脉瓣关闭不全
- E. 缩窄性心包炎

正确答案：D 您选择的答案：

第27题 能直接作用于体温调节中枢的物质是

- A．坏死物质
- B．白细胞致热源
- C．病毒
- D．细菌毒素
- E．抗原抗体复合物

正确答案：B 您选择的答案：

第28题 直接作用于体温调节中枢引起发热的是

- A．病原体产生的外源性致热原
- B．白细胞产生的内源性致热原
- C．病原体产生的内源性致热原
- D．白细胞产生的外源性致热原
- E．白细胞及病原体产生的代谢产物

正确答案：B 您选择的答案：

第29题 吸气性呼吸困难常见于

- A．慢性支气管炎
- B．阻塞性肺气肿
- C．气管异物
- D．肺炎球菌肺炎
- E．支气管哮喘

正确答案：C 您选择的答案：

第30题 胸部触诊语音震颤减弱的是

- A．肺梗死
- B．肺脓肿
- C．空洞型肺结核
- D．支气管肺炎
- E．阻塞性肺气肿

正确答案：E 您选择的答案：

第31题 大叶性肺炎实变期不应出现的体征是

- A．胸膜摩擦音
- B．肺部叩诊浊音
- C．可听到支气管呼吸音
- D．可听到湿啰音
- E．气管向健侧移位

正确答案：E 您选择的答案：

第32题 心脏听诊，听到“大炮音”应考虑

- A．完全性房室传导阻滞
- B．甲状腺功能亢进
- C．P-R间期缩短
- D．运动或发热
- E．二尖瓣狭窄

正确答案：A 您选择的答案：

第33题 触诊时语音震颤增强最常见于

- A．支气管肺炎
- B．胸壁皮下气肿
- C．大叶性肺炎
- D．上腔静脉阻塞综合征
- E．慢性支气管炎

正确答案：C 您选择的答案：

第34题 下列情况可引起语音震颤增强，除了

- A．肺梗死
- B．肺内太空腔
- C．肺脓肿
- D．大叶性肺炎
- E．大量胸腔积液

正确答案：E 您选择的答案：

第35题 某男性患者，13岁。食蚕豆后感畏寒。发热，皮肤发黄。血红蛋白70g/L，网织红细胞0.15，尿胆原阳性，胆红素阴性。对明确诊断最重要的检查是

- A．骨髓检查
- B．血总胆红素测定
- C．高铁血红蛋白还原试验

D. 酸化血清溶血试验

E. 抗人球蛋白试验

正确答案：C 您选择的答案：

第36题 以下哪项应直属食管静脉曲张破裂出血

A. 移动性浊音阳性

B. 上腹痛伴呕吐咖啡样物

C. 有肝炎史10余年

D. 蜘蛛痣

E. 脾大

正确答案：B 您选择的答案：

第37题 下列心脏杂音的产生机制，正确的是

A. 患有瓣膜病变者，当血流速度减慢时也可产生杂音

B. 只要血流速度加快，即使没有血管狭窄也可产生杂音

C. 动脉壁局限性扩张时，血流速度减慢而不产生杂音

D. 瓣膜口狭窄越严重，产生的杂音越强

E. 随着血液粘稠度的增加，不仅产生杂音而且强度增大

正确答案：B 您选择的答案：

第38题 女，7岁，持续发热一周，体温可达39.6~40.2，每天最低温度为37.8左右，此热型属于

A. 间歇热

B. 稽留热

C. 波浪热

D. 弛张热

E. 不规则热

正确答案：D 您选择的答案：

第39题 心尖区闻及隆隆样舒张期杂音，应考虑为

A. 二尖瓣关闭不全

B. 二尖瓣狭窄

C. 主动脉瓣关闭不全

D. 肺动脉瓣狭窄

E. 三尖瓣狭窄

正确答案：B 您选择的答案：

第40题 双肺满布湿啰音见于

A. 支气管哮喘

B. 肺结核

C. 急性肺水肿

D. 支气管扩张

E. 支气管肺炎

正确答案：C 您选择的答案：

第41题 正常肺部叩诊音为

A. 浊音

B. 鼓音

C. 过清音

D. 实音

E. 清音

正确答案：E 您选择的答案：

第42题 体温在39以上，24小时内波动<1，这种型为

A. 弛张热

B. 不规则热

C. 间歇热

D. 波状热

E. 稽留热

正确答案：E 您选择的答案：

第43题 稽留热最常见的疾病是

A. 急性肾盂肾炎

B. 胸膜炎

C. 大叶性肺炎

D. 疟疾

E. 肺结核

正确答案：C 您选择的答案：

第44题 紫癜与充血性皮疹的主要区别是

A. 是否有皮肤脱屑

B. 颜色的不同

C. 形态不同

- D. 是否高起皮肤表面
- E. 按压后是否退色或消失

正确答案：E 您选择的答案：

二、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第45-48题

- A. 食管静脉曲张破裂出血
 - B. 急性胃炎出血
 - C. 反流性食管炎出血
 - D. 食管贲门粘膜撕裂综合征
 - E. 消化性溃疡出血引起下列各例病人消化道出血的病因最可能是
1. 男性，25岁，3年来右上腹部节律性疼痛，进食可缓解，伴有反酸，一周前突然疼痛加重，伴有黑便，每日2~4次。
 2. 女性，64岁，进硬食后，突然呕血800—1000ml。色红，呕血呈喷射状，当时心率100次/分，BPl 3/6. 5kPa(90/50mmHg)，既往有慢性肝病史，平时常有肝区疼痛并伴有腹胀。
 3. 女性，56岁，间断上腹部隐痛或不适10余天。去年发生过脑梗死，左侧偏瘫，一周前服用阿司匹林，左上腹部疼痛加重，昨天黑便两次。
 4. 男性52岁，3年来常有反酸、烧心、胸骨后有烧灼感，近两天症状加重并黑便4次，既往有食道裂孔疝。
- 正确答案：EABC 您选择的答案：

第49-50题

- 男，40岁，因呼吸困难和水肿入院。查体发现颈静脉怒张，肝在右肋缘下4cm，表面光滑，轻度压痛，双下肢压陷性水肿。
1. 检查心脏时可能发现
 - A. 心尖搏动向左下移位
 - B. 心脏形态呈靴形
 - C. 心尖部可听到舒张期杂音
 - D. 主动脉瓣区可听到粗糙的收缩期杂音
 - E. 主动脉瓣第二听诊区可听到叹气样舒张期杂音
2. 该患者心音可有以下变化，除了
- A. 心尖部第二心音增强
 - B. 心尖部第一心音增强
 - C. 肺动脉瓣区第二心音增强
 - D. 肺动脉瓣区第二心音分裂
 - E. 心尖部第一心音可呈拍击性

正确答案：CA 您选择的答案：

三、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第51-52题

- A. 颈部和锁骨上窝
 - B. 左腋下和肩胛下区
 - C. 胸骨左缘和心底部
 - D. 胸骨左缘和心尖部
 - E. 心尖部下列各心脏病变所产生的杂音可以传导至
1. 二尖瓣后叶关闭不全
 2. 主动脉瓣关闭不全

正确答案：CD 您选择的答案：

第53-54题

- A. 第一心音增强
 - B. 心率小于脉率
 - C. 心室律绝对不规则
 - D. 心尖部3/6级收缩期杂音
 - E. 开瓣音
1. 心房颤动
 2. 二尖瓣关闭不全

正确答案：CD 您选择的答案：

历年试题3 内科学 第八章 肺炎

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 咳出由血液和粘液混合的砖红色胶冻状痰为特征的疾病是

- A．支原体肺炎
- B．葡萄球菌肺炎
- C．念珠菌肺炎
- D．肺炎球菌肺炎
- E．克雷白杆菌肺炎

正确答案：E 您选择的答案：

第2题 肺炎伴感染性休克常见于以下肺部炎症，除了

- A．支原体肺炎
- B．克雷白杆菌肺炎
- C．绿脓杆菌肺炎
- D．肺炎球菌肺炎
- E．金黄色葡萄球菌肺炎

正确答案：A 您选择的答案：

第3题 随着抗生素广泛应用，引起细菌性肺炎的病原体最主要的变化是。

- A．支原体肺炎很少发生
- B．葡萄球菌肺炎很少发生
- C．革兰阴性杆菌肺炎不断增加
- D．军团菌肺炎的发病率逐年下降
- E．肺炎球菌肺炎不断增加

正确答案：C 您选择的答案：

第4题 社区获得性肺炎，最为常见的致病菌是

- A．流感嗜血杆菌
- B．肺炎支原体
- C．肺炎链球菌
- D．肺炎克雷白杆菌
- E．葡萄球菌

正确答案：C 您选择的答案：

第5题 肺炎球菌肺炎患者若对青霉素过敏，宜选用的有效抗菌药物是

- A．链霉素
- B．庆大霉素
- C．阿米卡星
- D．阿莫西林
- E．左氧氟沙星

正确答案：E 您选择的答案：

第6题 肺炎链球菌肺炎消散后肺组织结构的变化是

- A．肺泡壁纤维化
- B．细支气管狭窄、
- C．肺大泡形成
- D．支气管扩张
- E．恢复正常

正确答案：E 您选择的答案：

第7题 老年患者突然发生寒颤、高热、咳嗽、咳痰，痰呈砖红色胶冻状，引起肺部感染最可能的病原菌是

- A．铜绿假单胞菌
- B．葡萄球菌
- C．流感嗜血杆菌
- D．克雷白杆菌
- E．嗜肺军团杆菌

正确答案：D 您选择的答案：

第8题 肺癌所致阻塞性肺炎有以下临床征象，除了

- A．短期内同一部位可反复出现炎症
- B．抗生素治疗后炎症很快吸收消散
- C．经抗生素治疗炎症吸收后出现肿块阴影
- D．患者一般不发热或仅有低热
- E．血白细胞计数常不增高

正确答案：B 您选择的答案：

第9题 首选大环内酯类抗生素治疗的是

- A．肺炎支原体肺炎

- B. 肺炎球菌肺炎
- C. 克雷白杆菌肺炎
- D. 葡萄球菌肺炎
- E. 干酪性肺炎

正确答案：A 您选择的答案：

第10题 肺炎球菌肺炎的典型症状是

- A. 寒战和高热
- B. 咳粘液脓性痰
- C. 咳铁锈色痰
- D. 气急和发绀
- E. 患侧胸部疼痛

正确答案：C 您选择的答案：

第11题 对耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)引起的肺炎，首选抗生素是

- A. 头孢呋辛
- B. 苯唑西林
- C. 万古霉素
- D. 青霉素G
- E. 头孢唑啉

正确答案：C 您选择的答案：

第12题 男，52岁，3天前淋雨，次日出现寒颤、高热，咳嗽继之咳嗽，咳少量粘液脓性痰，伴右侧胸痛。查体体温39℃，急性病容，口角和鼻周有疱疹。心率110次/分，律齐。血白细胞 $11 \times 10^9/L$ ，最可能的诊断是

- A. 干酪性肺炎
- B. 急性肺脓肿
- C. 肺炎支原体肺炎
- D. 肺炎链球菌肺炎
- E. 葡萄球菌肺炎

正确答案：D 您选择的答案：

第13题 肺部疾病痊愈时，容易完全恢复组织正常的结构和功能的疾病是

- A. 小叶性肺炎
- B. 大叶性肺炎
- C. 慢性肺气肿
- D. 病毒性肺炎
- E. 慢地轰气皓煲

正确答案：B 您选择的答案：

第14题 患者，男，38岁，因寒颤、高热，继而出现右侧胸痛2天就诊，伴轻咳，无咯血。无咳脓痰现象。胸部：位片显示如图

1. 应考虑的诊断是
- A. 右侧肺癌B右肺结核
 - C. 右侧包裹性胸腔积液
 - D. 右侧大叶性肺炎
 - E. 右侧胸膜炎



正确答案：D 您选择的答案：

第15题 肺炎链球菌可引起

- A. 支气管肺炎
- B. 肺脓肿
- C. 支气管哮喘
- D. 大叶性肺炎(即典型肺炎)
- E. 胸膜炎

正确答案：D 您选择的答案：

第16题 老年患者突然发生寒战、高热、咳嗽、咳痰，痰粘稠，砖红色，胶冻状，引起感染最可能的病原菌是

- A．克雷白杆菌
- B．流感嗜血杆菌
- C．嗜肺军团杆菌
- D．铜绿假单胞菌
- E．葡萄球菌

正确答案：A 您选择的答案：

第17题 患者，男，38岁，因寒颤、高热，继而出现右侧胸12天就诊，伴轻咳，无咯血。无咳嗽痰现象。胸部：位片显示如图1。体格检查时，该患者右肺不会出现的体征是

- A．触觉语颤增强
- B．呼吸音消失
- C．可听到湿啰音
- D．支气管呼吸音
- E．叩诊有浊音区

正确答案：B 您选择的答案：

第18题 在治疗肺炎球菌肺炎使用青霉素时，错误的方法是

- A．一般患者每次肌注80万单位，每8小时1次
- B．每日剂量800万单位，加在500毫升输液中缓慢静滴
- C．对青霉素过敏者不可使用此药
- D．静脉滴药时每次用量应在1小时内清完
- E．每日剂量800万单位，分3次静脉滴注

正确答案：B 您选择的答案：

第19题 克雷白杆菌肺炎的X线表现出现叶间隙下坠，其原因是

- A．病变中的炎性渗出液粘稠而重
- B．肺泡内的渗出液由Cohn氏孔向周围肺泡蔓延所致
- C．肺泡内的渗出含有较多的红、白细胞
- D．细菌在细胞内生长繁殖，引起组织坏死、液化形成
- E．肺泡内的纤维蛋白渗出较多

正确答案：A 您选择的答案：

第20题 成人呼吸窘迫综合征(ARDS)的最重要的诊断依据是

- A．血气分析显示为低氧伴轻度二氧化碳潴留
- B．氧合指数(PaO₂ / FiO₂) < 300
- C．呼吸频率增加，每分钟大于28次
- D．肺内分流量减少
- E．肺泡气—动脉血氧分压差(PA-aDO₂)降低

正确答案：E 您选择的答案：

第21题 血源性肺脓肿最常见的病原菌是

- A．溶血链球菌
- B．金黄色葡萄球菌
- C．铜绿假单胞菌
- D．流感嗜血杆菌
- E．厌氧菌

正确答案：B 您选择的答案：

第22题 男性，25岁，2周前感冒后畏寒、发热、咳嗽，1周前咳大量黄色脓性痰，痰中带血，经青霉素、头孢噻肟等治疗无效。体检：体温40℃，呼吸急促，双肺中下闻及湿啰音。血白细胞计数25 × 10⁹ / L，中性粒细胞0.90。X线胸片显示双肺中下斑片状实变阴影。并有多发脓肿和肺气肿。本例诊断首先考虑为

- A．肺炎球菌肺炎
- B．葡萄球菌肺炎
- C．克雷白杆菌肺炎
- D．支原体肺炎
- E．干酪性肺炎

正确答案：B 您选择的答案：

第23题 肺炎链球菌肺炎治疗的首选抗生素是

- A．庆大霉素
- B．红霉素
- C．林可霉素
- D．氧氟沙星
- E．青霉素

正确答案：D 您选择的答案：

第24题 在整个病变过程中没有肺泡壁和其他结构损坏的肺炎是

- A．肺炎链球菌肺炎
- B．克雷白杆菌肺炎

- C. 干酪性肺炎
- D. 金黄色葡萄球菌肺炎
- E. 绿脓杆菌肺炎

正确答案：A 您选择的答案：

第25题 肺炎球菌肺炎可出现以下体征，除了

- A. 皮肤和黏膜出血点
- B. 口角或鼻周单纯性疱疹
- C. 病变部位湿啰音
- D. 病变部位支气管呼吸音
- E. 肋间带状疱疹

正确答案：E 您选择的答案：

第26题 5. 岁男性，咳嗽伴声音嘶哑3个月，右锁骨上窝触及一个肿大的淋巴结，质硬无压痛，提示该患者的诊断是

- A. 肺癌
- B. 胃癌
- C. 喉炎
- D. 肺结核
- E. 鼻咽癌

正确答案：A 您选择的答案：

第27题 社区获得性肺炎最常见的致病菌是

- A. 肺炎链球菌
- B. 肺炎军团菌
- C. 流感嗜血杆菌
- D. 肺炎克雷白杆菌
- E. 肺炎支原体

正确答案：A 您选择的答案：

第28题 对输液的要求是

- A. 不限制胶体溶液
- B. 入量>出量(>500ml)
- C. 入量>出量(>600~1000ml)
- D. 入量=出量
- E. 入量<出量(<500~1000ml)

正确答案：E 您选择的答案：

第29题 最能反映小叶性肺炎的病变特征的是

- A. 支气管化脓性炎
- B. 病变累及肺小叶范围
- C. 细支气管及周围肺泡化脓性炎
- D. 病灶相互融合或累及全叶
- E. 病灶多位于背侧和下叶

正确答案：C 您选择的答案：

二、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第30-31题

男，×岁，受凉后咳嗽，咳少量粘液脓痰，伴发热，右侧胸痛并右肩及右上腹痛；查体：体温39.1℃，脉搏96次/分，呼吸24次/分；右侧胸廓呼吸动度减弱，舌颤增强，右肺下叩诊浊音，可听到支气管呼吸音并响亮的中等湿啰音；血常规化验：白细胞 $15 \times 10^9/L$ ，中性0.90

1. 对该患者诊断最有意义的检查是：

- A. 痰培养加药敏试验
- B. 心电图检查
- C. 腹部超声波检查
- D. 血沉、肝功能检查
- E. 胸部X线正侧位摄片

2. 该患者的中等湿啰音产生原理是

- A. 气体通过气管、支气管内的液体，形成水泡随即破裂而产生的声音
- B. 气体通过狭窄的气管、支气管腔产生震动引起的声音
- C. 炎症侵入胸膜，引起脏、壁层胸膜粗糙、摩擦而产生的声音
- D. 是肺部炎症时，实变部分传音良好，支气管呼吸音经肺实变部分传到胸壁的声音
- E. 是病人无力排痰，气体通过分泌物积聚的大气道所产生的声音

正确答案：EA 您选择的答案：

第32-34题

6. 岁男性患者。反复咳嗽、咯痰，痰中带血2周。体温38.3℃，WBC $12 \times 10^9/L$ ，胸片右肺门肿块影，伴远端大片状阴影，抗炎治疗阴影不吸收。

1. 有助于尽快明确诊断的检查首选

- A. CT
- B. 磁共振

- C. 胸腔镜
- D. 纤支镜
- E. 核素扫描
- 2. 最有可能的诊断是
- A. 肺炎
- B. 肺化脓症
- C. 肺癌
- D. 肺结核
- E. 支气管扩张
- 3. 首先考虑的治疗方案是
- A. 抗炎治疗
- B. 抗炎止血治疗
- C. 手术治疗
- D. 抗结核治疗
- E. 门诊随访

正确答案：DCC 您选择的答案：

第35-36题

男性，20岁，平素健康，淋雨后，突发寒战、高热、头痛，第2天出现右侧胸痛、咳嗽、咳痰。胸片：右上肺大片实变影。

- 1. 体检不会出现的体征是
- A. 右上肺叩诊浊音
- B. 气管向左侧偏移
- C. 右上肺语颤增强
- D. 急性病容
- E. 脉率增快
- 2. 最可能诊断为
- A. 胸膜增厚
- B. 肺脓肿
- C. 肺结核
- D. 大叶性肺炎
- E. 肺梗死

正确答案：BD 您选择的答案：

第37-38题

3. 岁，男，因发热、右侧胸痛、咳嗽3天人院。3天来每日体温最低为39.2，最高39.8。入院后查体：T39.5，右锁骨下可闻及支气管呼吸音。

- 1. 最可能的诊断是
- A. 肺结核
- B. 肺癌
- C. 胸膜炎
- D. 大叶性肺炎
- E. 自发性气胸合并感染
- 2. 该患者右上肺叩诊音可能出现
- A. 清音
- B. 浊音
- C. 实音
- D. 鼓音
- E. 过清音

正确答案：DC 您选择的答案：

第39-40题

男，51岁，重症肺炎患者，入院后次日病情加重，突发持续性呼吸急促，发绀，伴烦躁，呼吸频率38次/分，心率108次/分，律齐，两肺可闻及湿啰音。血气分析：pH7.34，PaCO₂250mmHg，PaCO₂230mmHg。胸片示两中下肺纹理增多模糊，斑片状阴影，心胸比例正常。

- 1. 最可能的诊断是
- A. 肺梗死
- B. 急性左心衰竭
- C. 自发性气胸
- D. 肺不张
- E. 成人呼吸窘迫综合征(ARDS)
- 2. 为缓解病人的呼吸困难，最好采用
- A. 高频通气
- B. 持续气道正压通气(CaPA)
- C. 呼气末正压通气(PEEP)
- D. 高浓度吸氧
- E. 双气道正压通气(Bi-PAP)

正确答案：EC 您选择的答案：

第41-43题

男，36岁，平素体健，淋雨后发热，咳嗽2天，右上腹痛伴气急、恶心1天。

- 1. 除考虑急腹症外，重点鉴别的疾病是
- A. 自发性气胸
- B. 肺梗死
- C. 肺炎链球菌肺炎
- D. 肺结核
- E. 膈神经麻痹

2. 体检应注意有无
 - A. 右上腹肌紧张
 - B. 上腹部压痛
 - C. 肺肝境界
 - D. 肺部呼吸音
 - E. 肠鸣音
3. 首选的治疗药物是
 - A. 解热镇痛药
 - B. 庆大霉素
 - C. 卡星青霉素
 - D. 头孢他啶
 - E. 胃肠道解痉剂

正确答案：CDC 您选择的答案：

第44-46题

男。10岁，发热10天，体温38-39℃，刺激性咳嗽明显，胸痛。查体：双肺散在干啰音，胸片：左肺下野淡薄片状阴影。

1. 最可能的诊断为
 - A. 腺病毒肺炎
 - B. 呼吸道合胞病毒肺炎
 - C. 肺炎支原体肺炎
 - D. 金黄色葡萄球菌肺炎
 - E. 肺炎链球菌肺炎
2. 为确诊，首选的检查是
 - A. 血培养
 - B. 结核菌素试验
 - C. 冷凝集试验
 - D. 血肥达氏反应
 - E. 痰液病毒分离
3. 首选的药物为
 - A. 青霉素
 - B. 头孢菌素
 - C. 链霉素
 - D. 红霉素

正确答案：CCD 您选择的答案：

三、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第47-48题

- A. 毛细支气管炎
- B. 腺病毒肺炎
- C. 金黄色葡萄球菌肺炎
- D. 肺炎链球菌肺炎
- E. 肺炎支原体肺炎

以下病例中最可能的诊断是

1. 胸部X线常有不同程度梗阻性肺气肿和支气管周围炎，或肺不张
2. 胸部线常见肺浸润，多发生肺囊肿，肺大泡和脓胸、脓气胸

正确答案：BC 您选择的答案：

第49-50题

- A. 腺病毒
- B. 金黄色葡萄球菌
- C. 呼吸道合胞病毒
- D. 肺炎链球菌
- E. 肺炎支原体

1. 喘憋性肺炎常见的病原体是
2. 肺脓肿的常见病原体是

正确答案：AB 您选择的答案：

第51-52题

- A. 青霉素G
- B. 磺胺类药物
- C. 大环内酯类药物
- D. 头孢菌素类药物
- E. 万古霉素

1. 治疗葡萄球菌肺炎最有效的药物为
2. 治疗支原体肺炎应选用

正确答案：EC 您选择的答案：

第53-54题

- A. 支气管哮喘
- B. 喘息型慢性支气管炎
- C. 支气管肺癌

D．肺炎支原体肺炎

E．克雷白杆菌肺炎

1．刺激性咳嗽，伴气急、痰中带血，支气管解痉药效果欠佳、

2．常于秋季发病，儿童和青年人多见，起病缓慢，阵发性干咳、发热、肌痛，胸片示下叶间质性肺炎改变

正确答案：CD 您选择的答案：

历年试题3 内科学 第二十八章 肾小球疾病

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 链球菌感染后急性肾小球肾炎必有的临床表现是

- A. 肉眼血尿
- B. 水肿
- C. 肾功能异常
- D. 高血压
- E. 镜下血尿

正确答案：E 您选择的答案：

第2题 急性肾小球肾炎的严重病例常发生在起病的

- A. 5~6周内
- B. 3~4周内
- C. 1~2周内
- D. 9~10周内
- E. 7~8周内

正确答案：C 您选择的答案：

第3题 男，20岁。感冒后7天出现颜面及双下肢浮肿，尿少。查体：血压160/100mmHg，尿蛋白++，尿沉渣：红细胞++，SCr130 μ mol/L。2周后少尿。BUN28mmol/L，SCr620 μ mol/L，哪种疾病可能性大

- A. 高血压肾病
- B. 急进性肾小球肾炎
- C. 肾病综合征
- D. 慢性肾炎
- E. 急性肾小球肾炎

正确答案：B 您选择的答案：

第4题 关于血管紧张素对肾小球入球及出球小动脉的收缩作用，正确的是

- A. 对入球小动脉的收缩作用等于出球小动脉
- B. 对入球小动脉的收缩作用大于出球小动脉
- C. 对入球小动脉的收缩作用小于出球小动脉
- D. 对出球小动脉无收缩作用
- E. 对入球小动脉无收缩作用

正确答案：C 您选择的答案：

第5题 急进性肾小球肾炎I型患者血浓度常升高的抗体是

- A. 抗双链DNA抗体
- B. 抗核抗体
- C. 抗中性粒细胞胞浆抗体
- D. 抗平滑肌抗体
- E. 抗肾小球基底膜抗体

正确答案：E 您选择的答案：

第6题 在我国成年人中引起原发性肾病综合征最常见的病理类型是

- A. 膜性肾病
- B. 系膜毛细血管性肾炎
- C. 微小病变病
- D. 系膜增生性肾炎
- E. 局灶性节段性肾小球硬化

正确答案：D 您选择的答案：

第7题 原发性肾小球疾病的病理分型不包括

- A. 轻微病变型肾小球肾炎
- B. 肾病综合征
- C. 硬化性肾小球肾炎
- D. 系膜增生性肾小球肾炎
- E. 膜性肾病

正确答案：B 您选择的答案：

第8题 引起慢性肾功能不全的最常见疾患是

- A. 糖尿病肾病
- B. 系统性红斑狼疮
- C. 慢性肾小球肾炎
- D. 高血压肾动脉硬化
- E. 慢性肾盂肾炎

正确答案：C 您选择的答案：

第9题 下列哪项检查对诊断肾病综合征最重要

- A. 血浆白蛋白 $<30\text{g/L}$
- B. 胆固醇及甘油三酯升高
- C. 24小时尿蛋白 $>3.5\text{g}$
- D. 双下肢凹陷性浮肿
- E. 大量血尿

正确答案：C 您选择的答案：

第10题 不属于洛汀新(苯那普利)发挥肾保护作用主要机制的是+

- A. 减轻血尿
- B. 抑制肾脏纤维化
- C. 减少蛋白尿
- D. 减轻肾脏炎症反应
- E. 降低血压

正确答案：A 您选择的答案：

第11题 女，36岁，已诊断肾病综合征，近两日右下肢疼、凉，右足背动脉搏动触不清，趾指皮肤发绀，应首先考虑的合并症是

- A. 右下肢动脉栓塞
- B. 心源性休克
- C. 急性肾衰
- D. 下尿路感染
- E. 右下肢静脉血栓

正确答案：A 您选择的答案：

第12题 诊断急进性肾小球肾炎最有价值的指标是

- A. 血清抗中性粒细胞胞浆抗体阳性
- B. BUN、Scr迅速升高
- C. 影像学检查显示双肾增大
- D. 50%以上肾小球囊内有大新月体形成
- E. 尿量减少但蛋白排泄量增加

正确答案：D 您选择的答案：

第13题 急性肾炎最主要的治疗措施是

- A. 血肌酐、尿素氮(BUN)升高时予以透析
- B. 激素及免疫抑制剂
- C. 利尿剂消除浮肿
- D. 不需要治疗，因为大部分可自愈
- E. 休息与控制病灶感染

正确答案：E 您选择的答案：

第14题 关于难治性肾病综合征的治疗，不予考虑的药物是

- A. 硫唑嘌呤
- B. 甲泼尼龙(甲基强的松龙)
- C. 环孢素A
- D. 氟尿嘧啶(5-Fu)
- E. 环磷酰胺

正确答案：B 您选择的答案：

第15题 关于原发性肾小球疾病的病理特点，错误的是

- A. 膜性肾病是光镜下主要为不伴细胞增生的弥漫性肾小球毛细血管基底膜增厚
- B. 系膜增生性肾炎主要是系膜细胞及系膜基质不同程度的弥漫增生
- C. 微小病变病是光镜下无明显异常，电镜下可见上皮细胞肿胀、足突广泛融合
- D. 急进性肾炎主要是光镜下20%以上肾小球的肾小囊中有大新月体形成
- E. 急性链球菌感染后肾小球肾炎主要是弥漫增生性肾小球肾炎(内皮与系膜细胞增生)

正确答案：C 您选择的答案：

第16题 慢性肾小球肾炎患者，当蛋白尿大于 1g/d 时，血压控制的理想水平是

- A. $120/80\text{mmHg}$ 以下
- B. $125/75\text{mmHg}$ 以下
- C. $135/85\text{mmHg}$ 以下
- D. $130/80\text{mmHg}$ 以下
- E. $140/90\text{mmHg}$ 以下

正确答案：B 您选择的答案：

第17题 女性，47岁，慢性肾炎病史多年，近2年经常出现双下肢浮肿，一直服潘生丁及氢氯噻嗪。近一周感觉腰痛，乏力，双下肢无力。首先必须考虑的是

- A. 肾盂肾炎
- B. 低钾血症
- C. 潘生丁中毒
- D. 氢氯噻嗪中毒
- E. 肾功能严重减退

正确答案：B 您选择的答案：

第18题 不属于促进慢性肾炎恶化因素的是

- A. 高脂血症
- B. 遗传因素
- C. 高血压
- D. 高蛋白饮食
- E. 肾脏基础病变活动

正确答案：B 您选择的答案：

第19题 男性，20岁，原发性肾病综合征患者，首次治疗，每日用泼尼松60mg。3周后尿蛋白仍为(+)，此时应

- A. 用原量继续观察
- B. 改用环磷酰胺
- C. 改为地塞米松
- D. 将泼尼松加量到80mg / d
- E. 减少泼尼松量到40mg / d，加用免疫抑制剂

正确答案：A 您选择的答案：

第20题 急进性肾炎与急性肾炎的最主要鉴别点为

- A. 有无高血压及心脏并发症
- B. 浮肿的严重程度
- C. 肾功能下降的速度及严重程度
- D. 有无前驱链球菌感染的证据
- E. 蛋白尿及血尿的严重程度

正确答案：C 您选择的答案：

第21题 肾病综合征最常见的并发症为

- A. 低钠、低钾、低钙血症
- B. 急性肾功能不全
- C. 高凝状态及血栓形成
- D. 低血容量性休克
- E. 呼吸道感染

正确答案：E 您选择的答案：

第22题 肾病综合征最基本的表现是

- A. 血浆白蛋白<35g / L
- B. 尿蛋白定量>3.5g / 24小时
- C. 尿颗粒管型
- D. 高脂血症
- E. 高度浮肿

正确答案：B 您选择的答案：

第23题 男，40岁，因大量蛋白尿，高度浮肿，诊断肾病综合征入院。肾穿活检病理为：微小病变型。即予泼尼松60mg / 日口服，症状有所控制。治疗3周后，又出现大量蛋白尿，双下肢浮肿加重，肾功能减退。此时首先应考虑

- A. 肾静脉血栓形成
- B. 急性肾衰竭
- C. 感染
- D. 加用细胞毒药物
- E. 糖皮质激素冲击

正确答案：C 您选择的答案：

第24题 原发性肾小球疾病的病理分型不包括

- A. 膜性肾病
- B. 肾病综合征
- C. 轻微肾小球病变
- D. 局灶性节段性病变
- E. 增生性肾炎

正确答案：B 您选择的答案：

第25题 慢性肾炎治疗主要目的不包括

- A. 防止肾功能进行性恶化
- B. 延缓肾功能进行性恶化
- C. 消除尿蛋白及尿红细胞
- D. 防治严重并发症
- E. 改善或缓解临床症状

正确答案：C 您选择的答案：

第26题 肾病综合征患者发生血栓并发症，最常见于

- A. 肾静脉
- B. 肺静脉
- C. 下腔静脉
- D. 冠状血管

E. 下肢静脉

正确答案：A 您选择的答案：

第27题 急性肾小球肾炎与急性肾盂肾炎临床相似之处为

- A. 早期出现急性肾衰竭
- B. 以急性肾炎综合征起病
- C. 肾功能急剧恶化
- D. 中度贫血、
- E. 预后不佳

正确答案：B 您选择的答案：

第28题 关于急性肾炎的治疗，错误的是

- A. 需应用抗生素控制感染
- B. 应常规应用糖皮质激素治疗
- C. 一般有自愈倾向可不治疗
- D. 应低盐饮食
- E. 有时需急诊透析治疗

正确答案：B 您选择的答案：

第29题 男性，50岁，因肾病综合症入院作肾活检，病理显示膜性肾病。治疗过程中突然出现双侧肾区疼痛，尿量减少。低热，蛋白尿显著增多伴肉眼血尿，下肢浮肿加重，肾功能较前稍有减退。B超示双肾大小较前有所增大。此时最可

- A. 泌尿系结核病
- B. 原有膜性肾病加重
- C. 伴发泌尿系肿瘤
- D. 肾静脉血栓形成
- E. 伴发肾结石

正确答案：D 您选择的答案：

第30题 对诊断慢性肾盂肾炎最有意义的是

- A. 尿亚硝酸盐还原试验阳性
- B. 肾小管功能持续性损害
- C. 尿频、尿急、尿痛反复发作
- D. 畏寒发热，尿白细胞数增高
- E. 清洁中段尿细菌培养计数 $>10^5$ / ml

正确答案：E 您选择的答案：

第31题 在原发性肾病综合征中，关于微小病变型肾病的特点，叙述不正确的是

- A. 免疫荧光检查阴性
- B. 电镜下于系膜区可见电子致密物。
- C. 对激素治疗敏感
- D. 镜下血尿发生率低，一般不出现肉眼血尿
- E. 光镜下肾小球基本正常，可见近曲小管上皮细胞脂肪变性

正确答案：B 您选择的答案：

二、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第32-34题

男，30岁。咽疼、咳嗽、发热，2周后发现尿色红，眼睑浮肿，尿量1000ml / 24h。体检：全身皮肤未见皮疹，血压150 / 100mmHg。化验：尿蛋白++，红细胞50 ~ 60 / HP，血红蛋白32g / L。血肌酐123 μ mol / L。

1. 上述临床表现最可能的诊断是

- A. 急性链球菌感染后肾炎
- B. 急性肾盂肾炎
- C. 过敏性紫癜
- D. 系统性红斑狼疮
- E. 急性肾小管坏死

2. 该患者的治疗，下列不妥的是

- A. 控制血压
- D. 消肿
- C. 低盐饮食
- D. 抗生素
- E. 补充白蛋白

3. 按上述治疗2个月后，病情无好转，血肌酐300.1mol / L，对诊断最有价值的进一步检查是

- A. 清洁中段尿培养
- B. 肾穿刺活检
- C. 肾脏ECT
- D. 肾脏B型超声
- E. 静脉肾盂造影

正确答案：AEB 您选择的答案：

第35-37题

男，38岁，间歇性浮肿10余年，伴恶心、呕吐1周。查血红蛋白80g/L，血压20.7/14.7kPa(155/110mmHg)。尿蛋白++，颗粒管型2~3个/HP，尿比重1.010~1.012

1. 可能的诊断是

- A. 肝炎后肝硬化
- B. 原发性高血压
- C. 慢性肾盂肾炎
- D. 慢性肾小球肾炎
- E. 肾病综合征

2. 上例病人还应立即作的检查项目是

- A. 24小时尿蛋白定量
- B. 乙肝病毒全套
- C. 肝功能全套
- D. 血肌酐、尿素氮
- E. 血胆固醇

3. 为了解该患者双侧肾脏是否已缩小，应首选的检查是

- A. 静脉肾盂造影
- B. ECT
- C. CT
- D. 同位素肾图
- E. B超

正确答案：EDE 您选择的答案：

历年试题3 内科学 第二十二章 肝脏疾病

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 最能说明肝硬化病人已存在门脉高压的表现是

- A. 脾大
- B. 腹水
- C. 痔核形成
- D. 门静脉增宽
- E. 食道静脉曲张

正确答案：D 您选择的答案：

第2题 反映肝纤维化的血清学指标是

- A. 透明质酸(HA)
- B. 胆汁酸
- C. 胆固醇
- D. 乳酸脱氢酶(LDH)
- E. γ -谷氨酰转肽酶(γ -GT, GGT)

正确答案：A 您选择的答案：

第3题 男性，53岁，肝硬化病史6年，近日前出现腹痛、腹胀和低热，表情淡漠，嗜睡。诊断考虑为肝性脑病，对诊断帮助最大的体征是

- A. 肌腱阵挛
- B. Babinski征阳性
- C. 腹壁反射消失
- D. 扑翼样震颤
- E. 腱反射亢进

正确答案：D 您选择的答案：

第4题 对判断肝硬化患者预后意义不大的指标是

- A. 血清电解质
- B. 凝血酶原时间
- C. 腹水
- D. 肝性脑病
- E. 白蛋白

正确答案：A 您选择的答案：

第5题 男，50岁，慢性肝炎史20年，5年前出现食管粘膜下静脉曲张，3个月前发现肝右叶拳头大肿物，甲胎蛋白阳性患者的正确诊断是

- A. 慢性肝炎伴肝硬化
- B. 慢性肝炎伴食管静脉曲张
- C. 慢性肝炎
- D. 慢性肝炎伴胆管上皮癌
- E. 肝硬化伴肝细胞性肝癌

正确答案：E 您选择的答案：

第6题 男，35岁，诊断为肝炎肝硬化失代偿期，一周来出现轻微腹痛，腹水增多。查体：T38.5℃，腹水常规：淡黄色，比重为1.016，蛋白25g/L，白细胞 $500 \times 10^6/L$ ，中性粒细胞0.85，最可能的并发症是

- A. 结核性腹膜炎
- B. 门静脉血栓形成
- C. 脾栓塞
- D. 自发性腹膜炎
- E. 原发性肝癌

正确答案：D 您选择的答案：

第7题 慢性肝病患者，血氨升高导致肝性脑病发生的机制，是干扰了大脑的

- A. 微量元素代谢
- B. 水盐代谢
- C. 脂肪代谢
- D. 能量代谢
- E. 蛋白质代谢

正确答案：D 您选择的答案：

第8题 男，58岁，患肝炎已10余年，因无力、纳差、腹胀20天诊断为肝炎后肝硬化(失代偿期)入院。肝功能试验显著异常，其中白蛋白降低，球蛋白增高，白蛋白/球蛋白比率倒置。为治疗低蛋白血症，首选的血液制品是

- A. 普通冰冻血浆
- B. 新鲜冰冻血浆
- C. 冷沉淀
- D. 全血
- E. 白蛋白

正确答案：E 您选择的答案：

第9题 对肝癌的临床诊断最具特异性的是

- A. 肝区疼痛
- B. 进行性肝大，质硬
- C. 肺部转移病灶
- D. 恶病质
- E. 梗阻性黄疸

正确答案：B 您选择的答案：

第10题 男，43岁，肝炎肝硬化病史5年，出现腹水1年，1周来低热伴轻度腹痛，腹水明显增多。腹水检查：淡黄色，比重1.017，蛋白26g/L，白细胞数 500×10^6 /L，中性粒细胞0.80。最可能的诊断是肝硬化合并

- A. 自发性腹膜炎
- B. 门静脉血栓形成
- C. 肝肾综合征
- D. 结核性腹膜炎
- E. 原发性肝癌

正确答案：A 您选择的答案：

第11题 男，30岁，肝区钝痛、低热、乏力3个月，有血吸虫疫水接触史，偶饮酒。查体：肝肋下2cm，质硬。HBsAg(+)，ALT60U，A/G3.1/3.0，AFP先后检测二次，结果分别为200ng/ml和400ng/ml。诊断首先应考虑

- A. 肝炎肝硬化合并原发性肝癌
- B. 血吸虫病性肝纤维化
- C. 肝炎肝硬化
- D. 酒精性肝硬化
- E. 慢性活动性肝炎

正确答案：A 您选择的答案：

第12题 关于肝硬化自发性腹膜炎，正确的描述是

- A. 一般起病急，伴高热、寒战，剧烈腹痛，出现板状腹、反跳痛
- B. 致病菌多为金黄色葡萄球菌
- C. 应进行腹水培养，待培养结果出来后有针对性应用抗生素治疗
- D. 治疗时应加强利尿治疗
- E. 易出现顽固性腹水

正确答案：E 您选择的答案：

第13题 用于肝细胞癌病人普查、诊断、判断疗效和预测复发的检验项目应首选

- A. γ -谷氨酰转肽酶
- B. α -L岩藻糖苷酶
- C. 碱性磷酸酶
- D. 甲胎蛋白
- E. 异常凝血酶原

正确答案：D 您选择的答案：

第14题 自发性细菌性腹膜炎常见致病菌应是

- A. 溶血链球菌和肺炎双球菌
- B. 绿脓杆菌和葡萄球菌
- C. 大肠杆菌和厌氧菌
- D. 厌氧菌和链球菌
- E. 大肠杆菌和副大肠杆菌

正确答案：E 您选择的答案：

第15题 有关肝性脑病，正确的治疗是

- A. 病人烦躁不安时使用水合氯醛灌肠
- B. 静脉使用甲硝唑抑制肠道细菌生长
- C. 口服乳果糖
- D. 低蛋白饮食
- E. 肥皂水灌肠清除肠腔积血

正确答案：C 您选择的答案：

第16题 关于肝硬化的叙述中正确的是

- A. 病变特点是肝细胞坏死、纤维组织增生和假小叶形成
- B. 肝硬化不发生癌变
- C. 门脉高压症可表现为出血倾向
- D. 肝功能不全可表现为脾肿大
- E. 亚急性重型病毒性肝炎多发展为门脉性肝硬化

正确答案：A 您选择的答案：

第17题 肝硬化特征性病理表现是

- A. 炎细胞浸润
- B. 肝细胞浊肿变性

- C. 肝细胞坏死
- D. 肝细胞脂肪变性
- E. 假小叶形成

正确答案：E 您选择的答案：

第18题 肝性脑病患者可采取下列何种溶液灌肠

- A. 谷氨酸钾
- B. 肥皂水
- C. 地塞米松
- D. 精氨酸
- E. 醋酸

正确答案：E 您选择的答案：

第19题 原发性肝癌最主要的转移部位是

- A. 肝内播散
- B. 肺
- C. 左锁骨上淋巴结
- D. 骨
- E. 脑

正确答案：A 您选择的答案：

第20题 肝硬化消化道出血。伴高血压冠心病患者，下列止血措施中最不恰当的是

- A. 6-氨基己酸静脉滴注
- B. 去甲肾上腺素胃管滴注
- C. 垂体后叶素静脉滴注
- D. 三腔二囊管压迫
- E. 冰生理盐水洗胃

正确答案：C 您选择的答案：

第21题 对肝硬化有确诊价值的是

- A. γ 球蛋白升高
- B. 肝肿大质地偏硬
- C. 脾肿大
- D. 肝穿刺活检有假小叶形成
- E. 食道吞钡X线检查有虫蚀样充盈缺损

正确答案：D 您选择的答案：

第22题 男性，53岁，肝硬化病史6年，近日前出现腹痛、腹胀和低热，表情淡漠，嗜睡。诊断考虑为肝性脑病，对诊断帮助最大的体征是

- A. 腹壁反射消失
- B. Babinski征阳性
- C. 扑翼样震颤
- D. 腱反射亢进
- E. 肌腱阵挛

正确答案：C 您选择的答案：

第23题 肝性脑病前驱期的主要表现是

- A. 生理反射亢进
- B. 定向力减退
- C. 巴宾斯基(Babinski)征阳性
- D. 性格改变
- E. 计算能力减退

正确答案：D 您选择的答案：

第24题 对原发性肝癌早期诊断最有价值的是

- A. CT检查
- B. 腹部平片
- C. 癌胚抗原测定
- D. B超检查
- E. 甲胎蛋白测定

正确答案：E 您选择的答案：

第25题 肝癌的临床表现中。最具提示意义的是

- A. 肝区肿块
- B. 食欲不振
- C. 肝区疼痛
- D. 体重下降
- E. 腹胀、乏力

正确答案：A 您选择的答案：

第26题 男性。45岁，因患肝硬化腹水用速尿后尿量每日超过2000ml，近日出现四肢肌肉软弱无力。伴恶心呕吐，心电图出现传导和节律异常，其原因最可能是

- A．高钾血症
- B．低钠血症
- C．低钾血症
- D．低镁血症
- E．高钠血症

正确答案：C 您选择的答案：

第27题 乳果糖治疗肝性脑病的作用机制是

- A．吸附肠内毒素
- B．抑制肠道细菌增殖
- C．供给糖，以提供热量
- D．促进肝细胞再生
- E．减少肠内氨的形成和吸收

正确答案：E 您选择的答案：

第28题 肝硬化患者肝功能减退的临床表现不包括

- A．黄疸
- B．浮肿
- C．齿龈出血
- D．肝掌
- E．脾大

正确答案：E 您选择的答案：

第29题 有关肝性脑病，正确的治疗是

- A．口服乳果糖
- B．低蛋白饮食
- C．静脉使用甲硝唑抑制肠道细菌生长
- D．肥皂水灌肠清除肠腔积血
- E．病人烦躁不安时使用水合氯醛灌肠

正确答案：A 您选择的答案：

第30题 关于肝硬化腹水形成的因素，不正确的是

- A．肝淋巴液生成过多
- B．抗利尿激素分泌过多
- C．低白蛋白血症
- D．原发性醛固酮增多
- E．门静脉压力增高

正确答案：D 您选择的答案：

第31题 男性，38岁，患肝硬化3年，一周来畏寒发热，体温38℃左右，全腹痛，腹部明显膨胀，尿量500ml/d。住院后经检查有以下体征：对目前病情判断最有意义的是

- A．腹部移动性浊音阳性
- B．脾肿大
- C．腹壁静脉曲张呈海蛇头样
- D．全腹压痛及反跳痛
- E．蜘蛛痣及肝掌

正确答案：D 您选择的答案：

第32题 男，70岁，20年前有黄疸、纳差，诊断为肝炎。近二月来纳差、消瘦，肝区疼痛。查体：轻度黄疸，面部有蜘蛛痣，腹膨隆，肝肋下2cm、剑下4cm。质硬、压痛。脾肋下3cm，移动性浊音阳性。临床上应首先考虑的是

- A．原发性肝癌
- B．慢性肝炎
- C．结核性腹膜炎
- D．肝硬化
- E．继发性肝癌

正确答案：A 您选择的答案：

二、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第33-36题

男性，45岁，查体发现肝硬化5年。3天前与朋友聚餐时出现呕血。鲜红色，量约1000ml。患者出现头晕、心慌、出冷汗等。经输血、补液和应用止血药物治疗后病情好转，血压和心率恢复正常。1天前出现睡眠障碍。并出现幻听和言语不清。化验检查示：血氨130μg/dl，血糖5.6mmol/L，尿素氮7.2mmol/L。

1．患者最可能的诊断是

- A．尿毒症
- B．脑血管意外
- C．乙型脑炎

- D. 糖尿病酮症酸中毒
- E. 肝性脑病
- 2. 首先考虑的治疗方案是
- A. 抗生素治疗
- B. 应用降氨药物
- C. 胰岛素治疗
- D. 血液透析治疗
- E. 应用镇静药物
- 3. 消化道出血的原因最可能是
- A. 胃癌
- B. 胃溃疡
- C. 十二指肠溃疡
- D. 食管静脉曲张破裂
- E. 胃黏膜病变
- 4. 为明确出血原因，待病情稳定后，最好行下列哪项检查
- A. 钡餐透视
- B. 吞线试验
- C. 胃镜检查
- D. 腹部B超
- E. 腹部CT

正确答案：EBDC 您选择的答案：

第37-40题

男，42岁，呕吐、腹泻2天，意识模糊、烦躁不安半天急诊入院。查体：BP110 / 70mmHg，神志恍惚，巩膜中度黄染，颈部可见数枚蜘蛛痣。心肺未见异常，腹软，肝肋下未触及，脾肋下3cm。双上肢散在出血点，Hb90g / L，WBC3 .

22 × 10⁹ / L，血糖

7.0mmol / L，尿糖(+)，尿酮(-)，尿镜检(-)。

- 1. 最可能的诊断是
- A. 肝性脑病
- B. 糖尿病酮症酸中毒
- C. 高渗性非酮症糖尿病昏迷
- D. 尿毒症
- E. 脑血管病
- 2. 对确诊最有价值的辅助检查是
- A. 血气分析
- B. 腹部CT
- C. 肾功能
- D. 肝功能
- E. 血氨
- 3. 如果患者躁动不安，不宜选用
- A. 东莨菪碱
- B. 地西洋
- C. 水合氯醛
- D. 扑尔敏
- E. 异丙嗪
- 4. 对此患者的治疗，下列各项中不正确的是
- A. 禁食蛋白质
- B. 口服乳果糖
- C. 静滴精氨酸
- D. 肥皂水灌肠
- E. 补充支链氨基酸

正确答案：AECD 您选择的答案：

第41-43题

48岁，男性，肝硬化患者，有腹水。不规律服用利尿剂治疗，二天来出现嗜睡。体检：轻度黄疸，测血钠120mmol / L，血钾2.6mmol / L，氯化物92mmol / L，BUN10mmol / L，血pH7.5

- 1. 患者肝昏迷的诱因是
- A. 黄疸
- B. 低血钠
- C. 低血钾
- D. 酸中毒
- E. 氮质血症
- 2. 此时最好的治疗是静脉滴注
- A. 谷氨酸钠
- B. 谷氨酸钠+谷氨酸钾
- C. 谷氨酸钠+左旋多巴
- D. 谷氨酸钠+精氨酸+10%氯化钾
- E. 谷氨酸钠+精氨酸+10%氯化钾
- 3. 下列哪项体征对该例诊断有特征性意义
- A. 肌张力增强
- B. 腱反射亢进
- C. 扑翼震颤阳性
- D. 腹壁反射消失
- E. 嗜睡

正确答案：CEC 您选择的答案：

三、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次

或不被选择。

第44-45题

- A. 减少肠道内氨的形成和吸收
- B. 纠正氨基酸不平衡
- C. 降低门静脉压力
- D. 纠正电解质紊乱
- E. 纠正酸碱平衡紊乱
- 1. 肝性脑病口服乳果糖的主要作用是
- 2. 肝性脑病注射支链氨基酸的主要作用是

正确答案：AB 您选择的答案：

第46-47题

- A. 腹水比重 <1.016 ，蛋白 $=20\text{g/L}$
- B. 腹水比重 >1.018 ，李凡他(Rivalta)试验阳性
- C. 乳糜样腹水
- D. 腹水细胞总数 $>109/\text{L}$ ，分类以中性粒细胞为主
- E. 腹水细胞总数为 $108/\text{L}$ ，分类以间皮细胞为主
- 1. 最可能为肝硬化腹水的是
- 2. 最可能为结核性腹膜炎腹水的是

正确答案：AB 您选择的答案：

第48-51题

- A. 男性乳腺发育
- B. 食管静脉曲张
- C. 氨中毒
- D. 凝血因子减少
- E. 黄疸
- 1. 肝硬变时，门静脉高压可引起
- 2. 肝硬变时，肝脏解毒功能下降表现为
- 3. 肝硬变时，肝脏激素灭活功能下降表现为
- 4. 肝硬变时。肝脏合成功能下降表现为

正确答案：BCAD 您选择的答案：

历年试题3 内科学 第二十九章 尿路感染

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 慢性肾盂肾炎的易感因素有

- A. 糖尿病
- B. 胃炎
- C. 药物性皮炎
- D. 胸膜炎
- E. 甲状腺机能亢进

正确答案：A 您选择的答案：

第2题 鉴别上、下尿路感染的依据是

- A. 中段尿细菌培养
- B. 尿蛋白定量
- C. 尿抗体包裹细菌检查
- D. 3小时尿白细胞计数
- E. 尿中脓细胞检查

正确答案：A 您选择的答案：

第3题 最常见的肾盂肾炎病原菌是

- A. 变形杆菌
- B. 白色念珠菌
- C. 粪肠球菌
- D. 大肠杆菌
- E. 葡萄球菌

正确答案：D 您选择的答案：

第4题 关于急性肾盂肾炎的抗菌药物治疗，下列哪项正确

- A. 根据血白细胞计数及分类立即给予抗生素治疗
- B. 接诊后立即给予抗生素治疗
- C. 做血培养，待结果报告后选用抗生素
- D. 先作尿培养及细菌敏感试验，根据报告选用敏感抗生素
- E. 留尿培养标本后，立即根据经验给予抗生素治疗

正确答案：E 您选择的答案：

第5题 慢性肾盂肾炎是

- A. 肾小管和肾间质的慢性化脓性炎症
- B. 一种以增生为主的炎症
- C. 肾小球肾炎的一种特殊类型
- D. 一种肾小球免疫复合物性肾炎
- E. 一种以变质为主的炎症

正确答案：A 您选择的答案：

第6题 女性，30岁，腰痛、尿频、尿急、血压21.3/13.3kPa(160/100mmHg)，尿蛋白(+)，沉渣红细胞8~10/HP，白细胞15~20/HP。肾盂造影示右肾缩小，肾盏扩张，最可能诊断是

- A. 多囊肾
- B. 肾结核
- C. 慢性肾盂肾炎
- D. 肾盂积液
- E. 慢性肾炎

正确答案：C 您选择的答案：

第7题 导致尿路感染最常见的致病菌是

- A. 沙雷杆菌
- B. 变形杆菌
- C. 金黄色葡萄球菌
- D. 大肠杆菌
- E. 粪链球菌

正确答案：D 您选择的答案：

第8题 诊断慢性肾盂肾炎的可靠依据是、

- A. 静脉肾盂造影、肾盂、肾盏变形或双肾大小不一
- B. 临床症状迁延不愈超过半年
- C. 尿常规中有蛋白及红、白细胞
- D. 反复发作超过半年
- E. 中段尿细菌培养多次阳性

正确答案：A 您选择的答案：

第9题 下列有关肾盂肾炎的叙述，哪项是错误的

- A. 表现为化脓性间质性肾炎
- B. 大肠杆菌感染最为常见
- C. 可分为上行性感染和血源性感染
- D. 由细菌感染引起
- E. 男性发病率稍高

正确答案：E 您选择的答案：

第10题 静脉肾盂造影，有诊断价值的疾病是

- A. 慢性肾小球肾炎
- B. 肾病综合征
- C. 慢性肾盂肾炎
- D. 急性肾盂肾炎
- E. 急性肾小球肾炎

正确答案：C 您选择的答案：

第11题 鉴别肾盂肾炎和下尿路感染最有意义的是

- A. 尿频、尿急、尿痛、
- B. 高热、腰痛
- C. 尿细菌培养阳性
- D. 血尿
- E. 尿中白细胞管型

正确答案：E 您选择的答案：

第12题 对鉴别上、下尿路感染最有意义的是

- A. 尿路刺激症状
- B. 肾小管浓缩功能正常
- C. 畏寒、发热、腰痛
- D. 中段尿细菌培养阳性
- E. 尿中白细胞管型

正确答案：E 您选择的答案：

第13题 下列哪项最符合急性肾盂肾炎的诊断

- A. 发热、浮肿、尿频、尿痛及尿沉渣白细胞增多
- B. 发热、浮肿、尿频、尿急、尿痛及白尿
- C. 发热、尿频、尿急、尿痛及蛋白尿
- D. 高血压、浮肿、尿频、尿痛、及尿沉渣检查白细胞成堆
- E. 高热、尿频、尿急、尿痛、肾区叩痛及尿中白细胞增多

正确答案：E 您选择的答案：

第14题 女，57岁，寒战、发热(最高体温达38.7℃)，全身不适。恶心呕吐2天。体检：血压145/85mmHg，肾区有叩击痛。尿常规：蛋白(++)，白细胞满视野，红细胞8~10/HP。中段尿细菌培养为阳性。查双肾B超、肾功能均无异常。5年来有多次类似发作，近2年来夜尿明显增多。此患者最可能的诊断为慢性肾盂肾炎

- A. 低热型
- B. 复发型
- C. 血尿型
- D. 隐匿型
- E. 高血压型

正确答案：B 您选择的答案：

第15题 女，32岁，发热、腰痛、尿频、尿急一个月，近3天全身关节酸痛、尿频、尿急加重。体检：体温39.5℃，白细胞 $13 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞86%，尿培养大肠杆菌阳性，诊断为大肠杆菌性尿路感染。应首选

- A. 头孢曲松、
- B. 灰黄霉素
- C. 红霉素
- D. 青霉素
- E. 林可霉素

正确答案：A 您选择的答案：

第16题 女，30岁，寒颤、发热、腰痛伴尿频、尿急3天。体温39℃，心肺无异常。肝脾肋下未触及。两侧肋脊角有叩击痛。尿液检查：蛋白(+)，镜检红细胞2-5/HP、白细胞10-15/HP，诊断应首先考虑

- A. 急性膀胱炎
- B. 肾结石
- C. 肾结核
- D. 急性肾小球肾炎
- E. 急性肾盂肾炎

正确答案：E 您选择的答案：

二、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第17-18题

女性，32岁，进行性膀胱刺激症状。经抗生素治疗不见好转，且伴有右侧腰部胀痛及午后潮热。

1. 尿液检查对诊断有决定性意义的是

- A. 血尿
- B. 脓尿
- C. 尿普通细菌培养
- D. 尿沉渣找结核杆菌
- E. 尿细胞学检查

2. 为了解患者肾功能及形态的病理改变，最有价值的检查是

- A. B超
- B. 静脉尿路造影
- C. 逆行肾盂造影
- D. CT
- E. MRI

正确答案：DB 您选择的答案：

三、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第19-20题

- A. 敏感抗生素分组轮流使用
 - B. 用药后症状消失即停药
 - C. 用药72小时无效应换药，疗程2周
 - D. 用糖皮质激素
 - E. 应用消炎痛
1. 急性肾盂肾炎的治疗应是
2. 慢性肾盂肾炎的治疗应是

正确答案：CA 您选择的答案：

历年试题3 内科学 第二十六章 上消化道大量出血

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 以下哪项不支持食管静脉曲张破裂出血

- A．有肝炎史10余年
- B．上腹痛伴呕吐咖啡样物
- C．蜘蛛痣
- D．脾大
- E．移动性浊音阳性

正确答案：B 您选择的答案：

第2题 女，85岁，因大量呕血、黑便送来急诊。既往有冠心病，肾动脉硬化。立即给予输血、补液及相应的止血措施。对此患者指导液体摄入量及输入速度最有意义的参考指标是

- A．中心静脉压
- B．肘静脉压
- C．血压
- D．心率
- E．尿量

正确答案：A 您选择的答案：

第3题 男，65岁，上腹部无规律性隐痛2个月，因饮酒后呕咖啡样物150ml，柏油便300ml来诊，无肝病史。查体：血压90/60mmHg。脉搏100次/分，血红蛋白90g/L，上腹部轻度压痛，肝脾肋下未触及，其止血措施最好选择

- A．维生素K1静滴
- B．奥美拉唑静注
- C．垂体后叶素静滴
- D．三腔双囊管压迫
- E．6-氨基己酸静滴

正确答案：B 您选择的答案：

第4题 女，22岁，因服吲哚美辛数片后觉上腹痛，今晨呕咖啡样胃内容物400ml来诊。既往无胃病史。首选的检查是

- A．B型超声检查
- B．急诊胃镜检查
- C．胃液分析
- D．X线胃肠钡餐检查
- E．血清胃泌素测定

正确答案：B 您选择的答案：

第5题 对鉴别上下消化道出血可能有帮助的是

- A．血色素下降
- B．血尿素氮升高
- C．血氨升高
- D．大便潜血阳性
- E．血肌酐升高

正确答案：B 您选择的答案：

第6题 上消化道出血范围是

- A．贲门以上出血
- B．空回肠交界处以上出血
- C．Treitz韧带以上出血
- D．回盲部以上出血
- E．幽门以上出血

正确答案：C 您选择的答案：

第7题 在确定急性上消化道出血的原因时不合适的检查是

- A．肝、肾功能检查
- B．急诊X线钡剂造影检查
- C．腹部B超
- D．血常规
- E．急诊胃镜

正确答案：B 您选择的答案：

第8题 男，35岁，2小时前突然呕鲜血约1000ml来院。2年前诊断为慢性乙型肝炎。查体：贫血貌，BP90/60mmHg，P120次/分，肝肋下未触及。脾肋下3cm，血红蛋白60g/L，红细胞 $2.6 \times 10^{12}/L$ ，血小板 $60 \times 10^9/L$ 。最有效的紧急止血措施是

- A．口服止血药
- B．冷盐水洗胃
- C．三腔双囊管压迫
- D．静脉注射生长抑素制剂
- E．补充凝血因子

正确答案：C 您选择的答案：

第9题 明确上消化道大出血原因的有效、可靠方法是

- A. 三腔管压迫试验
- B. 纤维内窥镜检查
- C. X线钡餐造影检查
- D. 选择性腹腔动脉造影检查
- E. B型超声检查

正确答案：B 您选择的答案：

第10题 上消化道出血表现为呕血或黑便，主要取决于

- A. 凝血机制
- B. 病变的性质
- C. 胃肠蠕动情况
- D. 出血部位的高低
- E. 出血的速度和量

正确答案：E 您选择的答案：

二、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第11-14题

- A. 食管静脉曲张破裂出血
- B. 急性胃炎出血
- C. 反流性食管炎出血
- D. 食管贲门粘膜撕裂综合征
- E. 消化性溃疡出血引起下列各例病人消化道出血的病因最可能是男性，25岁，3年来右上腹部节律性疼痛，进食可缓解，伴有反酸，一周前突然疼痛加重，伴有黑便，每日2~4次。
- 2. 女性，64岁，进硬食后，突然呕血约800~10ml，色红，呕血呈喷射状，当时心率110次/分，BP13/6.5kPa(90/50mmHg)，既往有慢性肝病史，平时常有肝区疼痛并伴有腹胀。
- 3. 女性，56岁。间断上腹部隐痛或不适10余天。去年发生过脑梗死，左侧偏瘫，一周前服用阿司匹林。左上腹部疼痛加重，昨天黑便两次。
- 4. 男性，52岁，3年来常有反酸、烧心、胸骨后有烧灼感，近两天症状加重并黑便4次，既往有食道裂孔疝。

正确答案：EABC 您选择的答案：

第15-16题

男，22岁，因呕吐咖啡色液体及黑便来诊。既往无胃病及肝病史。查体：面色稍苍白，血压100/60mmHg，心率92次/分，腹软，肝脾未触及，肠鸣音活跃。

- 1. 最可能的诊断是
- A. 食管静脉曲张破裂出血
- B. 十二指肠溃疡并发出血
- C. 胃癌出血
- D. 卓一艾(Zollinger-Ellison)综合征并发出血
- E. 食管贲门撕裂综合征
- 2. 药物治疗首选
- A. 质子泵抑制剂
- B. 硫糖铝
- C. 生长抑素制剂
- D. 胶体次枸橼酸铋
- E. 米索前列醇

正确答案：BA 您选择的答案：

历年试题3 内科学 第二十七章 尿液检查

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 不出现管型尿的疾病是

- A. 肾病综合征
- B. 急性膀胱炎
- C. 急性肾盂肾炎
- D. 急性肾小球肾炎
- E. 急进性肾小球肾炎

正确答案：B 您选择的答案：

第2题 选择性蛋白尿的特点是以

- A. β_2 -微球蛋白为主
- B. 本周蛋白为主
- C. IgA为主
- D. 白蛋白为主
- E. 溶菌酶为主

正确答案：D 您选择的答案：

第3题 区别血尿与血红蛋白尿的主要方法是

- A. 观察血尿颜色
- B. 做尿胆原测验
- C. 做尿沉渣镜检
- D. 做尿三杯试验
- E. 做尿潜血试验

正确答案：C 您选择的答案：

第4题 关于蛋白尿的描述，下列哪项不正确

- A. 间质性肾炎的蛋白尿以小管性为主
- B. 狼疮性肾炎所致的蛋白尿为混合性
- C. 糖尿病肾病的蛋白尿主要为小球性
- D. 高蛋白饮食后出现的蛋白尿为生理性
- E. 多发性骨髓瘤所致的蛋白尿为溢出性

正确答案：D 您选择的答案：

第5题 关于管型的叙述，正确的是

- A. 蜡样管型，常见于慢性肾炎晚期
- B. 脂肪管型，常见于急性肾衰竭
- C. 红细胞管型，常见于肾盂肾炎
- D. 白细胞管型，常见于急性肾炎
- E. 粗大上皮细胞管型，常见于肾病综合征

正确答案：A 您选择的答案：

第6题 健康成人24小时尿中排出蛋白总量为

- A. 201~250mg
- B. 151~200mg
- C. 0~150mg
- D. 251~300mg
- E. 301~350mg

正确答案：C 您选择的答案：

第7题 尿中发现大量透明管型时，提示病变在

- A. 肾小管和肾盏
- B. 肾小管和输尿管
- C. 肾小管和肾小球
- D. 肾小管和肾盂
- E. 肾小管和膀胱

正确答案：C 您选择的答案：

历年试题3 内科学 第二十三章 胰腺炎

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 下列有关急性胰腺炎的各项检查中，最早出现异常的是

- A．血清淀粉酶
- B．血清正铁血白蛋白
- C．血清脂肪酶
- D．血清乳酸脱氢酶
- E．尿淀粉酶

正确答案：A 您选择的答案：

第2题 男性，35岁，上腹痛2天，呕吐，腹胀，血淀粉酶750U / L(Somogyi)，血压80 / 50mmHg，脉搏120次 / 分。最可能的诊断为

- A．急性心肌梗死
- B．急性肝炎
- C．急性胃炎
- D．急性肾功能衰竭
- E．急性胰腺炎

正确答案：E 您选择的答案：

第3题 以下哪项提法是正确的

- A．淀粉酶的高低并不一定反映病情的严重程度
- B．尿淀粉酶增高可持续2~4周
- C．只有血、尿淀粉酶增高才能诊断急性胰腺炎
- D．血清淀粉酶在8小时达峰值
- E．血清淀粉酶超过正常2倍可确诊急性胰腺炎

正确答案：A 您选择的答案：

第4题 下列各项中最能支持慢性胰腺炎诊断的是

- A．血糖增高
- B．粪苏丹 染色镜下有脂肪滴
- C．反复发作上腹痛
- D．B超检查胰腺增大
- E．CT检查胰腺增大、有钙化影

正确答案：E 您选择的答案：

第5题 男性，40岁，反复上腹疼痛5年余，平卧时加重，弯腰可减轻。查体：上腹部轻压痛，X线腹部摄片左上腹部钙化，可能的诊断为

- A．慢性十二指肠球炎
- B．慢性胰腺炎
- C．慢性胃炎
- D．慢性肝炎
- E．慢性胆囊炎

正确答案：B 您选择的答案：

第6题 鉴别水肿型和出血坏死型急性胰腺炎，下列哪项意义不大

- A．血清正铁血红蛋白阳性
- B．血清淀粉酶增高
- C．发病后很快出现休克
- D．血钙降低
- E．胁腹部及脐周皮肤出现紫色瘀斑

正确答案：B 您选择的答案：

第7题 急性胰腺炎一般治疗原则中，哪一项未被包括在内

- A．生长抑素类似物八肽静脉滴注
- B．解痉止痛
- C．水电解质平衡与支持治疗
- D．抑制胰腺分泌
- E．防治感染

正确答案：A 您选择的答案：

第8题 女性，45岁，餐后2小时突然腹痛、恶心、呕吐，伴发热，次日出现黄疸，查血淀粉酶及胆红素明显增高，其发生黄疸的最可能原因是

- A．胆总管下端狭窄
- B．胆结石并胰腺炎
- C．胆囊炎所致
- D．肿大的胰腺压迫胆管所致
- E．肝细胞性黄疸

正确答案：B 您选择的答案：

第9题 鉴别水肿型和出血坏死型胰腺炎最有价值的是

- A. 呕吐
- B. 上腹剧痛向左腰背部放射
- C. Cullen征
- D. 黄疸
- E. 发热

正确答案：C 您选择的答案：

第10题 女，40岁，确诊为急性胰腺炎，内科正规治疗2周后体温仍在38 - 39℃，左上腹部压痛明显。尿淀粉酶256U(Winslow法)，血白细胞 $16 \times 10^9 / L$ ，可能性最大的是

- A. 并发胰腺假性囊肿
- B. 败血症
- C. 病情迁延未愈
- D. 并发胰腺脓肿
- E. 合并急性胆囊炎

正确答案：D 您选择的答案：

第11题 对出血坏死型胰腺炎最具诊断价值的是

- A. 血脂肪酶增高
- B. 血淀粉酶增高
- C. B超检查胰腺增大
- D. 血胆红素增高
- E. 血钙降低

正确答案：E 您选择的答案：

第12题 男性，62岁，急性重症胰腺炎患者。于保守治疗中，尿量逐渐减少，无尿2天，出现气促、全身水肿。血压180 / 92mmHg，心率120次 / 分，听诊闻及两下肺布满细湿啰音，查血钾 $6.9 \text{ mmol} / L$ ，BUN $25.2 \text{ mmol} / L$ 。肌酐 $577 \mu \text{mol} / L$ ，目前应采取的最有效治疗手段是

- A. 袢利尿剂静脉注射
- B. 口服甘露醇或硫酸镁导泻
- C. 控制入液量，停止补钾
- D. 静滴甘露醇利尿
- E. 及时紧急透析

正确答案：E 您选择的答案：

第13题 预防急性胰腺炎的措施中，哪项不正确

- A. 避免暴饮暴食
- B. 常用抑制胰酶活性的药物
- C. 避免服用引起急性胰腺炎的药物
- D. 积极治疗胆道疾病
- E. 戒酒

正确答案：B 您选择的答案：

二、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第14-17题

男性，45岁，酗酒8小时后出现中上腹疼痛，放射至两侧腰部，伴恶心、呕吐。体检：腹部有压痛、肌紧张及两侧腰腹部出现蓝棕色斑，血压75 / 55mm-Hg，脉搏110次 / 分

1. 最可能的诊断是

- A. 急性胆囊炎
- B. 急性胃炎
- C. 急性肠梗阻
- D. 急性胰腺炎
- E. 急性胆管炎

2. 下列检查应首先选择

- A. 血、尿常规
- B. 尿淀粉酶测定
- C. 胸腹部X线平片
- D. 血清淀粉酶测定
- E. 腹部B型超声检查

3. 对诊断困难者应进一步采取

- A. 剖腹探查
- B. ERCP检查
- C. 抗感染治疗下严密观察
- D. 抗休克治疗
- E. 腹腔穿刺

4. 在诊断尚未确立之前，不应采用的是

- A. 禁食、胃肠减压
- B. 吗啡类止痛药
- C. 胰酶抑制剂
- D. 体液补充
- E. 营养支持

正确答案：DDEB 您选择的答案：

第18-19题

女，42岁，参加宴会后突发中上腹持续性疼痛伴恶心、呕吐8小时来诊，既往无胃病史。查体：T138℃，巩膜无黄染，上腹偏左有压痛及轻度肌紧张，肝浊音界正常，Murphy征阴性，肠鸣音正常。

1. 最可能的诊断是

A. 急性肠梗阻

B. 急性阑尾炎

C. 急性胆囊炎

D. 急性胰腺炎

E. 消化性溃疡穿孔

2. 为明确诊断，首选的检查是

A. 尿淀粉酶

B. 血淀粉酶

C. 血脂肪酶

D. 腹部超声

E. 腹部平片

正确答案：DB 您选择的答案：

历年试题3 内科学 第二十四章 腹腔结核

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 结核性腹膜炎治疗中最重要的措施是

- A．营养和休息
- B．全身联合强化抗结核药物治疗
- C．腹腔内注射糖皮质激素，防止腹膜粘连
- D．手术清除腹腔淋巴结核及干酪样病变
- E．大量抽腹水

正确答案：B 您选择的答案：

第2题 女性，20岁，因低热，腹痛诊断为结核性腹膜炎。近日来呕吐，腹胀，未解大便。查体：肠鸣音亢进。最可能的并发症是

- A．中毒性肠麻痹
- B．肠梗阻
- C．肠出血
- D．肠穿孔

正确答案：B 您选择的答案：

第3题 肠结核最好发的部位是

- A．横结肠
- B．升结肠
- C．直肠、乙状结肠
- D．回盲部
- E．降结肠

正确答案：D 您选择的答案：

第4题 对肠结核最有诊断价值的检查是

- A．结核菌素试验强阳性
- B．结肠镜检查示回盲部炎症
- C．大便中查到结核杆菌
- D．X线钡餐检查发现肠腔狭窄
- E．结肠镜下活检找到干酪性上皮肉芽肿

正确答案：E 您选择的答案：

第5题 渗出性结核性腹膜炎的最佳的强化治疗方案是

- A．异烟肼、链霉素、对氨基水杨酸、糖皮质激素
- B．异烟肼、链霉素、对氨基水杨酸加手术腹腔引流
- C．异烟肼、链霉素、对氨基水杨酸
- D．异烟肼、利福平
- E．异烟肼、利福平、吡嗪酰胺、链霉素

正确答案：E 您选择的答案：

第6题 女，37岁，腹胀、腹泻与便秘交替半年，常有午后低热，夜间盗汗。体检：腹壁柔韧感，轻度压痛，肝脾未触及，腹水征(+)。腹水检验：比重1.018，蛋白25g/L，白细胞 $0.7 \times 10^9/L$ ，中性0.30，淋巴0.70，红细胞 $0.3 \times 10^9/L$ ，本例最可能诊断是

- A．巨大卵巢囊肿
- B．癌性腹膜炎
- C．原发性腹膜炎
- D．结核性腹膜炎
- E．肝静脉阻塞综合征

正确答案：D 您选择的答案：

第7题 用抗酸染色法染色后，结核杆菌在光学显微镜下的典型形态是

- A．为紫色的略带弯曲的细长杆菌
- B．为红色的竹节状排列杆菌
- C．为紫色的栅栏状排列杆菌
- D．为红色的略带弯曲的细长杆菌
- E．为红色的粗大杆菌

正确答案：D 您选择的答案：

第8题 对结核性腹膜炎最有诊断价值的检查是

- A．结肠镜检查
- B．腹水常规
- C．PPD试验
- D．腹腔镜检查+腹膜活检
- E．血沉

正确答案：D 您选择的答案：

第9题 为主，符合结核性腹膜炎表现。7.女，18岁，低热、腹痛、腹泻伴腹胀2个月。查体：腹壁揉面感，腹部移动性浊音阳性。腹水为渗出液。为明确诊断，下列哪项检查最有价值

- A. 腹水细菌培养
- B. 结核菌素试验
- C. 血沉
- D. 腹膜活检
- E. 血培养

正确答案：D 您选择的答案：

二、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第10-11题

女性，25岁，低热，便秘腹泻交替3年。查体：右下腹5cm×5cm肿块，质中等，较固定，轻压痛。

1. 最具诊断意义的检查是

- A. 血沉
 - B. 血常规
 - C. 结肠镜检查
 - D. X线钡剂透视
 - E. 诊断性腹腔穿刺
2. 最有可能的诊断是
- A. 结肠癌
 - B. 肠结核
 - C. 克罗恩病
 - D. 溃疡性结肠炎
 - E. 肠血吸虫病

正确答案：CB 您选择的答案：

三、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第12-13题

- A. 经口
 - B. 经淋巴管道
 - C. 腹腔病变直接蔓延
 - D. 经血液循环
 - E. 腰椎病变直接蔓延
1. 结核性腹膜炎的主要感染途径是
2. 肠结核的主要感染途径是

正确答案：CA 您选择的答案：

历年试题3 内科学 第二十五章 肠道疾病

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 肠易激综合征的症状特点是

- A．腹痛腹胀等症状与排便无关
- B．精神紧张可使症状加重
- C．夜间入睡后仍会出现腹泻
- D．常有便失禁
- E．病史较长者会出现营养不良

正确答案：B 您选择的答案：

第2题 女，36岁，反复腹泻2年，间有脓血便，粪培养阴性，多种抗生素治疗无效，为明确诊断，首选的检查是

- A．腹部CT
- B．X线胃肠钡餐检查
- C．腹部平片
- D．钡剂灌肠造影
- E．结肠镜检查

正确答案：E 您选择的答案：

第3题 对Crohn病最有诊断意义的病理改变是

- A．肠壁非干酪性上皮样肉芽肿
- B．炎性息肉
- C．肠系膜淋巴结肿大
- D．肠腺隐窝脓肿
- E．肠瘘形成

正确答案：A 您选择的答案：

第4题 溃疡性结肠炎患者容易并发中毒性巨结肠的情况是

- A．重症患者接受激素治疗时
- B．重症患者接受抗生素治疗时
- C．重症患者接受胆碱能受体拮抗剂时
- D．重症患者接受全胃肠道外营养治疗时
- E．重症患者接受水杨酸柳氮磺胺吡啶治疗时

正确答案：C 您选择的答案：

第5题 溃疡性结肠炎的大便最具特征的是

- A．粘液脓血便
- B．黄色稀糊样便
- C．便秘
- D．大便变细
- E．水样便

正确答案：A 您选择的答案：

第6题 有关糖皮质激素治疗溃疡性结肠炎的说法中，正确的是

- A．特别适合于重型活动性溃疡性结肠炎
- B．可以作为试验性治疗用于溃疡性结肠炎的鉴别诊断
- C．不可与柳氮磺胺吡啶联合治疗
- D．不可用于灌肠治疗
- E．柳氮磺胺吡啶治疗无效时应用激素治疗效果亦差

正确答案：A 您选择的答案：

第7题 女，10岁，腹泻1年，体检发现一肛瘘，结肠镜示回盲部铺路石样改变，最可能的诊断是

- A．肠结核
- B．溃疡性结肠炎
- C．克罗恩病
- D．细菌性痢疾
- E．结肠癌

正确答案：C 您选择的答案：

第8题 溃疡性结肠炎的临床表现下列哪项是错误的

- A．腹痛一便意一便后缓解
- B．左下腹有压痛
- C．可有发热
- D．常有腹胀
- E．易形成肠瘘

正确答案：E 您选择的答案：

第9题 典型溃疡性结肠炎患者大便的特点是

- A．蛋花汤样便

- B. 糊状便
- C. 稀水样便
- D. 粘液脓血便
- E. 粘液便

正确答案：D 您选择的答案：

第10题 以下是慢性腹泻的病生理类型，除了

- A. 医源性腹泻
- B. 运动功能异常性腹泻
- C. 渗出性腹泻
- D. 渗透性腹泻
- E. 分泌性腹泻

正确答案：A 您选择的答案：

第11题 水杨酸类制剂在溃疡性结肠炎治疗中，主要适用于

- A. 激素治疗无效者
- B. 轻、中度病例
- C. 中毒性巨结肠
- D. 顽固病例
- E. 重度病例

正确答案：B 您选择的答案：

第12题 男，23岁，间断脓血便2年，大便成形或糊状，每日1~3次，有时里急后重，抗生素治疗无效。最可能的诊断是

- A. Crohn病
- B. 慢性细菌性痢疾
- C. 阿米巴肠炎
- D. 溃疡性结肠炎
- E. 肠结核

正确答案：D 您选择的答案：

第13题 下述哪项不是溃疡性结肠炎的常见并发症。

- A. 中毒性巨结肠
- B. 直肠结肠出血
- C. 急性肠穿孔
- D. 多发性瘻管
- E. 癌变

正确答案：D 您选择的答案：

第14题 女，37岁，慢性腹泻2年，大便每天2~3次，常带少量粘液，反复粪便致病菌培养阴性，结肠镜检查见为直肠、降结肠和横结肠充血、水肿，有少数散在浅溃疡，拟诊为溃疡性结肠炎。首选的治疗方案是

- A. 氟哌酸口服
- B. 泼尼松口服
- C. 5-氨基水杨酸口服
- D. 氢化可的松保留灌肠
- E. 甲硝唑保留灌肠

正确答案：C 您选择的答案：

二、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第15-16题

男，30岁，黏液脓血便伴里急后重2年。近1周腹痛加重，高热。体检：体温39.2℃，心率110次/分，贫血貌，腹部膨隆，全腹有压痛，肠鸣音消失。

1. 该病人最可能的诊断是
 - A. 肠结核并发肠穿孔
 - B. 溃疡性结肠炎并发中毒性巨结肠
 - C. 结肠癌并发肠梗阻
 - D. 肠易激综合征
 - E. 克罗恩病
2. 该患者不宜选做的检查是
 - A. 血常规
 - B. 血沉
 - C. 免疫指标测定
 - D. 钡剂灌肠
 - E. 腹部B超

正确答案：BD 您选择的答案：

三、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第17-18题

- A. 病变主要位于回盲部
 - B. 病变主要位于直肠和乙状结肠
 - C. 病变多位于回肠远段
 - D. 病变以全结肠弥漫性改变为主
 - E. 病变不可能位于空肠
1. 肠结核
 2. 克罗恩病

正确答案：AC 您选择的答案：

第19-20题

- A. 无明显规律性
 - B. 疼痛一排便加重
 - C. 进食 - 疼痛 - 缓解
 - D. 疼痛进食 - 缓解
 - E. 疼痛 - 排便缓解
1. 胃溃疡腹痛的规律是
 2. 十二指肠溃疡腹痛的规律是

正确答案：CE 您选择的答案：

第21-22题

- A. 空肠
 - B. 末段回肠
 - C. 回盲部
 - D. 全结肠
 - E. 直肠、乙状结肠
1. 溃疡性结肠炎的病变大多位于
 2. Crohn病的病变大多位于

正确答案：ED 您选择的答案：

第23-24题

- A. 溃疡呈环形与肠的长轴垂直
 - B. 溃疡呈长椭圆形与肠的长轴平行
 - C. 溃疡呈烧瓶状口小底大
 - D. 溃疡边缘呈堤状隆起
 - E. 溃疡表浅呈地图状
1. 肠伤寒的肠溃疡特征
 2. 细菌性痢疾的肠溃疡特征

正确答案：DE 您选择的答案：

历年试题3 内科学 第二十一章 食管、胃、十二指肠疾病

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 女性，32岁，阵发性上腹痛2年，夜间加重。疼痛有季节性，冬季明显，有反酸，为进一步确诊。首选的检查方法是

- A．胃液细胞学检查
- B．胃液分析
- C．X线钡餐检查
- D．B超
- E．胃镜

正确答案：E 您选择的答案：

第2题 急性糜烂性胃炎的确诊应依据

- A．上消化道出血的临床表现
- B．腹部B超
- C．急诊胃镜检查
- D．胃液分析
- E．X线胃肠钡餐检查

正确答案：C 您选择的答案：

第3题 关于消化性溃疡的治疗，正确的说法是

- A．需长期应用粘膜保护剂以降低溃疡复发率
- B．为降低复发率，需长期服用质子泵抑制剂
- C．只要内镜证实溃疡已经愈合，溃疡就不会复发
- D．有消化道出血的溃疡患者必须长期维持治疗
- E．根除幽门螺杆菌可以降低溃疡复发率

正确答案：E 您选择的答案：

第4题 男，38岁，上腹疼痛6年。餐前痛、伴反酸。近日疼痛加重，且呈持续性向腰背部放射，有时低热。胃肠钡餐示：十二指肠球部变形，血白细胞 $11 \times 10^9/L$ ，中性0.78。诊断首先考虑为

- A．胃黏膜脱垂
- B．胃溃疡
- C．十二指肠穿透性溃疡
- D．胃癌
- E．慢性胃炎

正确答案：C 您选择的答案：

第5题 慢性萎缩性胃炎的病理改变中属癌前病变的是

- A．中度以上不典型增生
- B．胃小凹上皮增生
- C．假幽门腺化生伴肠上皮化生
- D．假幽门腺化生
- E．明显肠上皮化生

正确答案：A 您选择的答案：

第6题 关于应激性溃疡不正确的是

- A．多发生于胃，也可累及食管
- B．最明显的症状是呕血、柏油样便
- C．可发生大出血
- D．不会穿透胃壁全层
- E．可发生于十二指肠

正确答案：D 您选择的答案：

第7题 非甾体抗炎药引起急性胃炎的主要机制是

- A．抑制前列腺素合成
- B．促进胃泌素合成
- C．抑制脂肪酶
- D．抑制前弹性蛋白酶
- E．激活磷脂酶A

正确答案：A 您选择的答案：

第8题 胃溃疡最常见的位置是

- A．胃前壁
- B．胃后壁
- C．胃大弯及胃底
- D．胃窦小弯侧
- E．胃小弯近贲门处

正确答案：D 您选择的答案：

第9题 男，25岁，反复上腹部疼痛5年-反酸、暖气，最具诊断意义的检查项目是

- A．胃镜检查
- B．胃液分析
- C．消化道钡餐
- D．腹部B超
- E．大便隐血试验

正确答案：A 您选择的答案：

第10题 男，35岁，因服吲哚美辛数片后觉胃痛，今晨呕咖啡样胃内容物400ml来诊。既往无胃病史。首选的检查是

- A．急诊胃镜检查
- B．X线胃肠钡餐
- C．胃液分析
- D．血清胃泌素测定
- E．B型超声检查

正确答案：A 您选择的答案：

第11题 下列慢性胃炎的病理改变，属于癌前病变的是

- A．假幽门腺化生
- B．淋巴滤泡增生
- C．肠上皮化生
- D．重度不典型增生
- E．粘膜重度萎缩，腺体减少

正确答案：D 您选择的答案：

第12题 对球后溃疡的正确描述是

- A．内科治疗效果不好
- B．多发生在距幽门2~3cm以内
- C．多为十二指肠球后壁溃疡
- D．易并发出血
- E．临床症状多不明显

正确答案：D 您选择的答案：

第13题 女性，51岁，间断上腹疼痛2年，疼痛发作与情绪、饮食有关。查体：上腹部轻压痛。胃镜：胃窦皱襞平坦，粘膜粗糙无光泽，粘膜下血管透见。此病例考虑诊断为

- A．慢性浅表性胃炎
- B．消化性溃疡
- C．胃癌
- D．急性胃炎
- E．慢性萎缩性胃炎

正确答案：E 您选择的答案：

第14题 在我国，对于大多数慢性胃炎，主要病因为

- A．食物
- B．胆汁反流
- C．幽门螺杆菌
- D．药物
- E．物理因素

正确答案：C 您选择的答案：

第15题 消化性溃疡最常见的并发症为

- A．幽门梗阻
- B．瘻管形成
- C．穿孔
- D．癌变
- E．出血

正确答案：E 您选择的答案：

第16题 男，56岁，突发性右侧肢体无力，伴头痛、呕吐。排黑便2次。有高血压和糖尿病史5年。黑便原因很可能是

- A．胃癌
- B．急性胃黏膜病变
- C．胃溃疡
- D．食管癌
- E．胃底静脉曲张破裂出血

正确答案：B 您选择的答案：

第17题 下列各项中不能作为幽门梗阻诊断依据的是

- A．胃型和蠕动波
- B．上腹部胀痛
- C．代谢性酸中毒
- D．呕吐大量宿食
- E．空腹振水音

正确答案：C 您选择的答案：

第18题 消化性溃疡治疗中以下所选药物中哪种是错误的

- A. 阿托品
- B. 丙谷胺
- C. 氢氧化铝
- D. 奥美拉唑
- E. 雷尼替丁

正确答案：A 您选择的答案：

第19题 不能作为判断幽门螺杆菌根除的检验方法是

- A. C尿素酶呼气试验
- B. 活组织幽门螺杆菌培养
- C. 组织学检查找幽门螺杆菌
- D. 快速尿素酶试验
- E. 血清抗幽门螺杆菌抗体检测

正确答案：E 您选择的答案：

第20题 男性，34岁，上腹灼痛3个月，柏油样便2日，为了确诊，首选检查是

- A. B超
- B. X线钡餐透视
- C. 血常规
- D. 胃镜
- E. 大便隐血试验

正确答案：D 您选择的答案：

第21题 与慢性胃炎和消化性溃疡有密切关系的病原菌为

- A. 鼠伤寒沙门菌
- B. 胎儿弯曲菌
- C. 空肠弯曲菌
- D. 副溶血性弧菌
- E. 幽门螺杆菌

正确答案：E 您选择的答案：

第22题 治疗消化性溃疡患者上腹部疼痛效果最好的药物是

- A. H₂受体拮抗剂
- B. 质子泵抑制剂
- C. 抗酸药
- D. 粘膜保护剂
- E. 促动力剂

正确答案：B 您选择的答案：

第23题 男性，45岁，间断上腹痛3年，加重2个月，胃镜检查发现胃角切迹溃疡，幽门螺杆菌阳性。其治疗方案首选

- A. 粘膜保护剂治疗，6周复查胃镜
- B. 抗幽门螺杆菌治疗+质子泵抑制剂治疗，6周复查胃镜
- C. H₂受体拮抗剂治疗，6周复查胃镜
- D. 抗幽门螺杆菌治疗，2周复查胃镜
- E. 质子泵抑制剂+粘膜保护剂治疗，4周复查胃镜

正确答案：B 您选择的答案：

第24题 男，25岁，反复上腹痛、反酸5年，进食后加重，空腹减轻。可诊断为

- A. 胃粘膜脱垂
- B. 十二指肠球后溃疡
- C. 胃溃疡
- D. 十二指肠炎
- E. 十二指肠球部溃疡

正确答案：C 您选择的答案：

第25题 下列哪个部位的溃疡应特别注意 Zollinger-Ellison 综合征的可能性

- A. 十二指肠球部
- B. 回肠远端
- C. 十二指肠降部
- D. 幽门管
- E. 胃窦部

正确答案：C 您选择的答案：

第26题 Beck三联征是指

- A. 血压突然下降，颈静脉显著怒张，心音增强
- B. 血压突然下降，颈静脉显著塌陷，心音增强
- C. 血压突然下降，颈静脉显著塌陷，心音低钝遥远
- D. 血压突然升高，颈静脉显著怒张，心音低钝遥远
- E. 血压突然下降，颈静脉显著怒张，心音低钝遥远

正确答案：E 您选择的答案：

第27题 下列治疗消化性溃疡的药物中，抑酸最强、疗效最佳的是

- A．胶体次枸橼酸铋
- B．阿托品
- C．奥美拉唑
- D．西咪替丁
- E．硫糖铝

正确答案：C 您选择的答案：

第28题 男性，40岁，胸痛、反酸、烧心、暖气2个月，胃镜检查食管粘膜未见明显异常，最有助于明确诊断的检查是

- A．C13尿素呼气试验
- B．24小时胃食管PH监测
- C．24小时心电图监测
- D．上消化道气钡双重造影
- E．腹部B超

正确答案：B 您选择的答案：

第29题 I．胃食管反流病的主要发病机制不包括

- A．夜间胃酸分泌过多
- B．食管酸廓清能力下降
- C．下食管括约肌压力降低
- D．胃排空异常
- E．异常的下食管括约肌一过性松弛

正确答案：A 您选择的答案：

第30题 降低胃内酸度最有效的药物是

- A．H2受体拮抗剂
- B．胃泌素受体拮抗剂
- C．含铝抗酸剂
- D．质子泵抑制剂
- E．抗胆碱能药物

正确答案：D 您选择的答案：

第31题 下列各项中不能作为幽门梗阻诊断依据的是

- A．上腹部胀痛
- B．代谢性酸中毒
- C．呕吐大量宿食
- D．空腹振水音
- E．胃型和蠕动波

正确答案：B 您选择的答案：

第32题 消化性溃疡致瘢痕性幽门梗阻最典型的临床表现是

- A．呕吐
- B．贫血
- C．腹胀
- D．脱水
- E．消瘦

正确答案：A 您选择的答案：

二、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第33-34题

男性，55岁，反复不规律上腹部胀痛3年，胃镜诊断为萎缩性胃炎。

1．判断该患者炎症活动的客观依据是

- A．胃粘膜肠上皮化生
- B．胃粘膜出血
- C．胃粘膜内中性粒细胞增多
- D．胃粘膜中增多的主要是淋巴细胞

E．胃粘膜纤维组织增生

2．该患者如考虑为A型胃炎，正确的是

- A．壁细胞抗体阴性
- B．胃酸升高
- C．不出现厌食，体重下降
- D．不出现恶性贫血
- E．主要位于胃体部

正确答案：CE 您选择的答案：

三、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次

或不被选择。

第35-37题

- A. 癌前病变
- B. 交界性肿瘤
- C. 癌肉瘤
- D. 原位癌
- E. 非肿瘤性病变
- 1. 胃窦部粘膜重度不典型性增生
- 2. 肉芽肿是
- 3. 结肠多发性腺瘤性息肉是

正确答案：AEA 您选择的答案：

第38-39题

- A. 胃酸明显减少
- B. 胃酸明显增高
- C. 胃酸轻度升高
- D. 胃酸轻度减少
- E. 胃酸正常或减少
- 1. 重度萎缩性胃体胃炎患者表现为
- 2. 萎缩性胃窦胃炎患者表现为

正确答案：AE 您选择的答案：

第40-41题

- A. 无明显规律性
- B. 疼痛 - 排便加重
- C. 进食 - 疼痛 - 缓解
- D. 疼痛进食 - 缓解
- E. 疼痛排便缓解
- 1. 胃溃疡腹痛的规律是
- 2. 肠易激综合征腹痛的规律是

正确答案：CE 您选择的答案：

历年试题3 内科学 第二十章 心包疾病

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 Beck三联征是指

- A. 血压突然下降，颈静脉显著怒张，心音增强
- B. 血压突然下降，颈静脉显著塌陷，心音增强
- C. 血压突然升高，颈静脉显著怒张，心音低钝遥远
- D. 血压突然下降，颈静脉显著塌陷，心音低钝遥远
- E. 血压突然下降，颈静脉显著怒张，心音低钝遥远

正确答案：E 您选择的答案：

第2题 急性心包炎心包积液时最突出的症状是

- A. 呼吸困难
- B. 发热
- C. 声音嘶哑
- D. 心前区疼痛
- E. 吞咽困难

正确答案：A 您选择的答案：

第3题 男性，24岁，因气促1周就诊，查体颈静脉怒张，血压90 / 75mmHg，心界向两侧扩大，心率120次 / 分，律齐，心音遥远，肝肋下3指，移动性浊音(-)，最可能的诊断为

- A. 急性渗出性心包炎
- B. 急性纤维蛋白性心包炎
- C. 冠心病
- D. 肝硬化
- E. 肺栓塞

正确答案：A 您选择的答案：

第4题 下列哪项不是风湿性心包炎的表现

- A. 有心包摩擦音
- B. 呼吸困难
- C. 心前区疼痛
- D. 颈静脉怒张
- E. 心音增强

正确答案：E 您选择的答案：

第5题 男，34岁，发热1周伴胸痛，用硝酸甘油无效。体检：心音低沉，有舒张期附加音，血压110 / 80mmHg(14 . 7 / 10 . 7kPa)，肘部静脉压180mmH₂O。心电图：ST段抬高，弓背向下，未见病理性Q波，诊断可能为

- A. 变异性心绞痛
- B. 急性心肌梗死
- C. 缩窄性心包炎
- D. 稳定型心绞痛
- E. 急性渗出性心包炎

正确答案：E 您选择的答案：

第6题 心包填塞时最快最有效的缓解症状方法为

- A. 心包切除术
- B. 使用抗生素
- C. 心包穿刺抽液
- D. 使用镇静剂
- E. 病因治疗

正确答案：C 您选择的答案：

第7题 心包填塞时不出现

- A. 肝颈静脉返流征阳性
- B. 心音低钝
- C. 声音嘶哑
- D. 双肺满布干湿性啰音
- E. 奇脉

正确答案：D 您选择的答案：

第8题 下列不属于心包穿刺的指征是

- A. 为证实心包积液的存在
- B. 心脏压塞
- C. 心包积液
- D. 为明确心包积液的性质
- E. 心包内药物治疗

正确答案：A 您选择的答案：

二、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第9-11题

男，44岁，因发热、胸痛伴心包摩擦音，曾用非激素类抗炎药。2周后，呼吸困难加重，心率110次/分，律齐，心音遥远，血压90/70mmHg。肝脏肿大，下肢浮肿。

1. 患者近2周出现的病情变化，提示

- A. 肾功能不全
- B. 心脏压塞
- C. 右心功能不全
- D. 肝硬化
- E. 粘液性水肿

2. 病人还存在具有诊断价值的体征是

- A. 水冲脉
- B. 交替脉
- C. 奇脉
- D. 重搏脉
- E. 短绌脉

3. 首选的治疗措施是

- A. 毛花甙丙(西地兰)
- B. 呋塞米(速尿)
- C. 抗生素
- D. 心包穿刺
- E. 体外反搏

正确答案：BCD 您选择的答案：

历年试题3 内科学 第二章 常见心电图与胸片的异常

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 骨折X线检查的重要意义是

- A. 明确骨折的诊断
- B. 判断骨折的预后
- C. 了解骨折的发生机制
- D. 了解组织的损伤情况
- E. 了解骨质密度

正确答案：A 您选择的答案：

第2题 洋地黄中毒的心电图变化最常表现为

- A. 心房颤动
- B. ST-T呈鱼钩样改变
- C. 室性期前收缩
- D. Q-T间期缩短
- E. 房室传导阻滞

正确答案：C 您选择的答案：

第3题 二度I型房室传导阻滞的心电图特征是

- A. P-R间期 >0.20 秒，P波无受阻
- B. P-R间期进行性缩短，直至一个P波受阻不能下传到心室
- C. P-R间期固定，P波间断受阻不能下传到心室
- D. P-R间期进行性延长，直至一个P波受阻不能下传到心室
- E. 相邻P-R间距进行性延长，直至一个P波受阻不能下传到心室

正确答案：D 您选择的答案：

第4题 洋地黄中毒最常见的心电图表现是

- A. 心房颤动
- B. 房室传导阻滞
- C. ST-T缺血性改变
- D. 房性期前收缩
- E. 室性期前收缩

正确答案：E 您选择的答案：

第5题 心动周期中。室内压升高速率最快的时相是

- A. 快速充盈期
- B. 等容收缩期
- C. 减慢射血期
- D. 心房收缩期
- E. 快速射血期

正确答案：B 您选择的答案：

第6题 早期食管癌的X线表现是

- A. 长的不规则线状狭窄
- B. 贲门部呈光滑鸟嘴状狭窄
- C. 食管粘膜呈珠状改变
- D. 粘膜呈局限性管壁僵硬
- E. 外压狭窄，粘膜光滑完整

正确答案：D 您选择的答案：

第7题 一风湿性心脏病二尖瓣狭窄患者。突然出现心悸、脉搏短绌，立即行心电图描记。显示如图。该患者的心律是



- A. 正常心律
- B. 心房颤动
- C. 心房扑动
- D. 心室颤动
- E. 房性过早搏动

正确答案：B 您选择的答案：

第8题 梨型心脏见于

- A. 二尖瓣狭窄
- B. 肺动脉瓣狭窄
- C. 动脉导管未闭
- D. 主动脉瓣狭窄
- E. 三尖瓣狭窄

正确答案：A 您选择的答案：

第9题 Q波型急性心肌梗死心电图特征为

- A. 浅而宽的Q波，ST段降低，T波抬高
- B. 宽而深的Q波，ST段降低，T波倒置
- C. 浅而宽的Q波，ST段抬高，T波倒置
- D. 宽而深的Q波，ST段呈弓背向上抬高，T波倒置
- E. 宽而深的Q波，ST段降低，T波抬高

正确答案：D 您选择的答案：

二、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第10-12题

- A. 第一度房室传导阻滞
- B. 第二度I型房室传导阻滞
- C. 第二度型房室传导阻滞
- D. 第三度房室传导阻滞
- E. 高度房室传导阻滞
- 1. F波与QRS波群完全无关
- 2. PR间期固定，P波后均有QRS波群，PR间期>0.20秒
- 3. PR间期固定，但部分P波后无QRS波群

正确答案：DAC 您选择的答案：

第13-14题

- A. 窦房结
- B. 心房肌
- C. 房室交界
- D. 浦肯野纤维
- E. 心室肌
- 1. 心脏内传导速度最快的部位是
- 2. 心肌自律性最高的部位是

正确答案：DA 您选择的答案：

第15-16题

- A. X线示肋膈角变钝
- B. X线示大片状、边缘模糊阴影
- C. X线示斑片状、边缘模糊阴影
- D. X线示凸面指向肺内呈“D”字征阴影
- E. X线示上缘呈向外侧升高的反抛物线阴影
- 1. 胸腔积液量约400ml
- 2. 包裹性积液

正确答案：AD 您选择的答案：

历年试题3 内科学 第九章 肺脓肿

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 患者女，56岁，10天来咳嗽、发烧38'E，自服感冒药不见好转，黄痰逐渐增多，30~50ml /天，偶尔有脓血痰。白细胞 $19 \times 10^9 / L$ 。胸片见右肺有大片模糊阴影，其中有一带液平面的薄壁空洞，门诊首先考虑

- A. 支气管肺炎
- B. 肺结核
- C. 周围型肺癌
- D. 肺脓肿
- E. 中央型肺癌

正确答案：D 您选择的答案：

第2题 男，38岁，醉酒受凉后，次日高热、寒战、胸痛、咳嗽、咳粘液痰。量渐增多，并有脓性痰，有臭味，可能的诊断是

- A. 血源性肺脓肿
- B. 原发性肺脓肿
- C. 干酪性肺炎
- D. 急性脓气胸
- E. 金黄色葡萄球菌肺炎

正确答案：B 您选择的答案：

第3题 急性肺脓肿最具特征的症状是

- A. 呼吸困难
- B. 畏寒高热
- C. 咳嗽伴咯血
- D. 咳嗽伴胸痛
- E. 咳大量脓臭痰

正确答案：E 您选择的答案：

第4题 急性肺脓肿抗菌治疗的疗程是

- A. 8~12周
- B. 12~16周
- C. 4~6周
- D. 16~20周
- E. 6~8周

正确答案：E 您选择的答案：

第5题 女性，50岁，发热咳嗽、咳痰3周，近1周来咳大量脓性臭痰，量约300mL/日。右下肺叩呈浊音，可闻及湿啰音，杵状指(+)应考虑的诊断

- A. 肺炎球菌肺炎
- B. 急性肺脓肿
- C. 葡萄球菌肺炎
- D. 支气管炎
- E. 克雷白杆菌肺炎

正确答案：B 您选择的答案：

第6题 男，40岁，半月前开始畏寒、发热，每天体温高达39，40t，咳嗽、咳少量脓性痰，近4天来突然咳大量臭脓痰，每日约300ml，并有痰中带血。体检右下肺叩浊，闻及支气管呼吸音，血白细胞 $20 \times 10^9 / L$ ，中性粒细胞0.90，最可能的诊断为

- A. 急性肺脓肿
- B. 肺结核
- C. 克雷白杆菌肺炎
- D. 葡萄球菌肺炎
- E. 阻塞性肺炎

正确答案：A 您选择的答案：

第7题 原发性肺脓肿最常见感染的细菌是

- A. 大肠杆菌
- B. 葡萄球菌
- C. 粪球菌
- D. 星形诺卡菌
- E. 厌氧菌

正确答案：B 您选择的答案：

历年试题3 内科学 第六章 支气管扩张症

一、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1-3题

1. 较常出现杵状指(趾)的呼吸系统疾病是

- A. 慢性支气管炎
- B. 阻塞性肺气肿
- C. 支气管哮喘
- D. 支气管扩张症
- E. 支原体肺炎

2. 支气管-肺感染和阻塞是主要发病因素的疾病是

- A. 支气管扩张症
- B. 支气管肺癌
- C. 慢性支气管炎
- D. 支气管哮喘
- E. 阻塞性肺气肿

3. 男，54岁。幼年患麻疹后反复咳嗽，迁延不愈，常咳脓痰伴咯血。近2周咳嗽加重，咳大量脓性臭痰，伴高热、气急

就诊。痰涂片见革兰阳性菌和阴性菌，痰培养有需氧革兰阴性杆菌生长。感染的病原体最可能是

- A. 需氧革兰阴性杆菌
- B. 革兰阳性菌
- C. 厌氧菌
- D. 需氧革兰阴性杆菌+厌氧菌
- E. 革兰阴性杆菌+真菌

正确答案：DAD 您选择的答案：

历年试题3 内科学 第七章 呼吸衰竭

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 诊断慢性呼吸衰竭最重要的依据是

- A. 有呼吸困难、发绀等症状
- B. $\text{PaO}_2 < 60 \text{ mmHg}$ ，或伴有 $\text{PaCO}_2 > 50 \text{ mmHg}$
- C. $\text{PaO}_2 < 80 \text{ mmHg}$ ， $\text{PaCO}_2 > 50 \text{ mmHg}$
- D. 意识障碍伴球结膜水肿
- E. $\text{SaO}_2 < 90\%$

正确答案：B 您选择的答案：

第2题 男，68岁，既往有慢性支气管炎病史10年，一周前因感冒后咳嗽加重来诊。查体：神志模糊，两肺哮鸣音，心率110次/分，血气分析 $\text{pH} 7.30$ ， $\text{PaO}_2 50 \text{ mmHg}$ ， $\text{PaCO}_2 80 \text{ mmHg}$ 。下列治疗措施正确的是

- A. 静脉滴注4%碳酸氢钠
- B. 静脉滴注尼可刹米
- C. 人工机械通气
- D. 静脉注射呋塞米(速尿)
- E. 静脉注射毛花甙丙

正确答案：C 您选择的答案：

第3题 Ⅱ型呼吸衰竭的血气诊断标准是

- A. $\text{PaO}_2 < 50 \text{ mmHg}$ ， $\text{PaCO}_2 > 45 \text{ mmHg}$
- B. $\text{PaO}_2 < 40 \text{ mmHg}$ ， $\text{PaCO}_2 > 40 \text{ mmHg}$
- C. $\text{PaO}_2 < 70 \text{ mmHg}$ ， $\text{PaCO}_2 > 55 \text{ mmHg}$
- D. $\text{PaO}_2 < 50 \text{ mmHg}$ ， $\text{PaCO}_2 > 60 \text{ mmHg}$
- E. $\text{PaO}_2 < 60 \text{ mmHg}$ ， $\text{PaCO}_2 > 50 \text{ mmHg}$

正确答案：E 您选择的答案：

第4题 呼吸衰竭最主要的临床表现是

- A. 双肺有大量湿啰音
- B. 呼吸困难与发绀
- C. 神经精神症状
- D. 呼吸费力伴呼气延长
- E. 呼吸频率增快

正确答案：B 您选择的答案：

第5题 肺心病慢性呼吸衰竭患者，血气分析结果： $\text{pH} 7.188$ ， $\text{PaCO}_2 75 \text{ mmHg}$ ， $\text{PaO}_2 50 \text{ mmHg}$ ， $\text{HCO}_3^- 27.6 \text{ mmol/L}$ ， $\text{BE} - 5 \text{ mmol/L}$ ，其酸碱失衡类型是

- A. 呼吸性酸中毒合并代谢性酸中毒
- B. 呼吸性酸中毒合并代谢性碱中毒
- C. 代谢性碱中毒
- D. 呼吸性酸中毒
- E. 代谢性酸中毒

正确答案：A 您选择的答案：

第6题 男性，67岁，肺源性心脏病急性加重期患者。血气分析： $\text{pH} 7.25$ ， $\text{PaCO}_2 9.3 \text{ kPa}$ (70 mmHg)， $\text{HCO}_3^- 30 \text{ mmol/L}$ ；对其酸碱失衡的治疗措施应为

- A. 静脉滴注盐酸精氨酸
- B. 改善通气功能
- C. 静脉滴注5%碳酸氢钠
- D. 补充氯化钾
- E. 给予利尿剂

正确答案：B 您选择的答案：

第7题 ARDS共同性病理变化有

- A. 肺不张
- B. 肺血管内皮和肺泡损害，肺间质水肿
- C. 急性心力衰竭
- D. 气道阻塞
- E. 肺部感染

正确答案：B 您选择的答案：

第8题 引起Ⅰ型呼吸衰竭的常见病因是

- A. 上呼吸道阻塞
- B. 慢性阻塞性肺疾病
- C. 肺部广泛炎症
- D. 肺源性心脏病
- E. 慢性支气管炎

正确答案：C 您选择的答案：

第9题 型呼吸衰竭的呼吸功能改变为

- A. 肺动-静脉样分流增加
- B. 肺泡通气不足
- C. 通气/血流比例失调
- D. 机体氧耗量增加
- E. 肺弥散功能障碍

正确答案：B 您选择的答案：

第10题 治疗成人呼吸窘迫综合征最有效的措施为

- A. 低浓度持续吸氧
- B. 高浓度吸氧
- C. 应用糖皮质激素
- D. 呼气末正压通气
- E. 正压机械通气

正确答案：D 您选择的答案：

第11题 下列各项组合中，能准确判断酸中毒性质严重程度和代偿情况的是

- A. 动脉血和静脉血pH值
- B. 静脉血和尿的pH值
- C. 动脉血和尿的pH值
- D. 动脉血和静脉血PaCO₂
- E. 动脉血pH值和HCO₃⁻

正确答案：E 您选择的答案：

第12题 缺O₂和CO₂潴留对中枢神经系统可产生的影响，不包括

- A. 出现烦躁不安、谵妄
- B. 导致脑组织碱中毒
- C. 出现神志不清、昏迷
- D. 导致脑细胞内水肿
- E. 导致脑间质水肿

正确答案：B 您选择的答案：

第13题 呼吸衰竭的血气诊断标准是

- A. 动脉血氧分压(PaO₂)低于60mmHg
- B. pH值<7.35
- C. 动脉血二氧化碳分压(PaCO₂)高于50mmHg
- D. 动脉血氧饱和度(SaO₂)低于90%
- E. 动脉血氧含量低于9mmol/L

正确答案：A 您选择的答案：

第14题 对I型呼吸衰竭患者若给予高浓度氧疗仍无，其原因很可能为人工机械通气

- A. 耗氧量增加
- B. 严重肺动-静脉样分流
- C. 通气/血流比例增大
- D. 肺弥散功能障碍
- E. 重肺通气功能障碍

正确答案：B 您选择的答案：

第15题 不引起缺氧性肺血管收缩的体液因素是

- A. 前列腺素P₂增加
- B. 血栓素增加
- C. 内皮素释放增加
- D. 一氧化氮生成增加
- E. 白三烯增加

正确答案：D 您选择的答案：

第16题 体内CO₂分压最高的部位是

- A. 毛细血管血液
- B. 动脉血液
- C. 静脉血液
- D. 组织液
- E. 细胞内液

正确答案：D 您选择的答案：

二、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第17-18题

- A. PaO₂为50mmHg，PaCO₂为40mmHg
- B. PaO₂为55mmHg，PaCO₂为50mmHg

- C. PaO₂为65mmHg, PaCO₂为40mmHg
D. PaO₂为70mmHg, PaCO₂为40mmHg
E. PaO₂为70mmHg, PaCO₂为45mmHg
1. 符合I型呼吸衰竭的动脉血气标准是
2. 符合II型呼吸衰竭的动脉血气标准是

正确答案：AB 您选择的答案：

第19-21题

- A. pH7.38, PaO₂50mmHg, PaCO₂40mmHg
B. pH7.30, PaO₂50mmHg, PaCO₂80mmHg
C. pH7.40, PaO₂60mmHg, PaCO₂65mmHg
D. pH7.35, PaO₂80, PaCO₂20mmHg
E. pH7.25, PaO₂70mmHg, PaCO₂30mmHg
上述血气分析结果符合
1. 代偿性呼吸性酸中毒
2. 代偿性代谢性酸中毒
3. 失代偿性呼吸性酸中毒

正确答案：CDB 您选择的答案：

第22-24题

- A. 呼吸性酸中毒
B. 代谢性酸中毒
C. 呼吸性碱中毒
D. 代谢性碱中毒
E. 呼吸性酸中毒合并代谢性碱中毒
2. . 幽门梗阻病人可发生
2. . 重度肺气肿病人可发生
2. . 外科临床上最常见的酸碱失衡是

正确答案：DAB 您选择的答案：

历年试题3 内科学 第三十八章 内分泌及代谢疾病概述

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 甲状腺滤泡旁细胞(又称C细胞)分泌的降钙素的作用

- A．保持机体各系统、器官的生理功能
- B．抑制骨骼的吸收
- C．促进细胞内的氧化作用
- D．促进机体的正常生长发育
- E．维持糖、蛋白、脂肪正常的代谢

正确答案：B 您选择的答案：

第2题 高泌乳素血症的药物治疗首选

- A．奥曲肽
- B．酮康唑
- C．溴隐亭
- D．赛庚啶
- E．黄体酮

正确答案：C 您选择的答案：

第3题 神经垂体贮存的激素是

- A．促性腺激素
- B．促肾上腺皮质激素
- C．抗利尿激素
- D．促甲状腺激素
- E．生长激素

正确答案：C 您选择的答案：

第4题 I．内分泌功能减退性疾病目前较普遍使用的替代治疗方法是给予

- A．调节神经递质或受体的药物
- B．药理剂量的促垂体激素
- C．药理剂量的靶腺激素
- D．生理剂量的靶腺激素
- E．药理剂量的垂体激素

正确答案：D 您选择的答案：

二、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第5-8题

- A．内分泌功能亢进
- B．内分泌功能减退
- C．内分泌功能正常
- D．激素受体不敏感
- E．下丘脑 - 垂体 - 靶腺轴的反馈抑制所致功能减退
- 1．甲状腺功能亢进症
- 2．地方性甲状腺肿为
- 3．Cushing综合征伴双侧肾上腺皮质萎缩是
- 4．1型糖尿病是

正确答案：ACEB 您选择的答案：

历年试题3 内科学 第三十二章 白血病

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 治疗脑膜白血病首选药物是

- A. 6-巯基嘌呤
- B. 环磷酰胺
- C. 长春新碱
- D. 三尖杉酯碱
- E. 甲氨蝶呤

正确答案：E 您选择的答案：

第2题 女，36岁，发热、面色苍白伴牙龈出血一周入院。入院次日起出现皮肤多处片状瘀斑、血尿。血红蛋白80g/L，白细胞 $2.0 \times 10^9/L$ ，血小板 $50 \times 10^9/L$ ，血浆纤维蛋白原0.8g/L。骨髓检查：有核细胞增生极度活跃，细胞浆颗粒粗大的早幼粒细胞占85%。患者出血的首要原因是

- A. DIC
- B. 异常早幼粒细胞浸润血管壁
- C. 血小板减少伴功能异常
- D. 凝血因子、 V 、 X 缺乏
- E. 血小板减少

正确答案：A 您选择的答案：

第3题 男性，40岁，发热伴鼻出血1周。检查牙龈肿胀，肝脾轻度肿大；血红蛋白40g/L，白细胞 $6.0 \times 10^9/L$ 。血小板 $15 \times 10^9/L$ ，骨髓象原始细胞占60%，过氧化酶染色阳性，非特异性酯酶阳性，阳性反应可被氟化钠抑制，应诊断

- A. 急性红白血病
- B. 急性淋巴细胞性白血病
- C. 急性早幼粒细胞白血病
- D. 急性单核细胞性白血病
- E. 急性粒细胞性白血病

正确答案：D 您选择的答案：

第4题 Auer小体不见于

- A. M3型白血病
- B. 急性淋巴细胞白血病
- C. M2型白血病
- D. M1型白血病
- E. 急性单核细胞白血病

正确答案：B 您选择的答案：

第5题 慢性粒细胞白血病与类白血病反应最主要的区别是

- A. 骨髓检查：粒细胞增生活跃
- B. 外周血可见中幼粒、晚幼粒细胞
- C. Ph染色体阳性
- D. 脾大
- E. 外周血白细胞计数高

正确答案：C 您选择的答案：

第6题 脾肿大最显著的疾病是

- A. 急性单核细胞白血病
- B. 慢性淋巴细胞白血病
- C. 慢性粒细胞白血病
- D. 急性淋巴细胞白血病
- E. 急性粒细胞白血病

正确答案：C 您选择的答案：

第7题 女性。30岁，发热伴牙龈出血三周。查体：贫血貌，脾肋下3cm，胸骨压痛(+)。血红蛋白70g/L，白细胞 $14.0 \times 10^9/L$ 。血小板 $35 \times 10^9/L$ ，骨髓增生明显活跃，原始细胞占0.62，为进一步诊断，应首选哪项检查

- A. 抗血小板抗体检测
- B. 细胞化学染色
- C. 染色体核型分析
- D. 血清铁测定
- E. 细菌培养

正确答案：B 您选择的答案：

第8题 急性白血病骨髓移植治疗，哪项是错误的

- A. 应在第一次化疗缓解后进行
- B. 异基因骨髓移植可能治愈急性白血病
- C. 应采用HLA匹配的同胞异基因骨髓
- D. 可选择自体干细胞移植
- E. 应及早进行，与年龄、性别无关

正确答案：E 您选择的答案：

第9题 中性粒细胞碱性磷酸酶活性明显增高见于

- A. 急性淋巴细胞白血病
- B. 慢性粒细胞白血病
- C. 急性粒细胞白血病
- D. 淋巴瘤
- E. 类白血病反应

正确答案：E 您选择的答案：

第10题 男性，28岁，因左上腹肿块进行性肿大就诊。体检：肝肋下2cm。脾肋下4cm。血红蛋白140g/L，白细胞 $120 \times 10^9/L$ ，血小板 $200 \times 10^9/L$ 。本例最可能诊断为

- A. 骨髓纤维化
- B. 慢性粒细胞白血病
- C. 急性粒细胞白血病
- D. 肝硬化脾功能亢进
- E. 类白血病反应

正确答案：B 您选择的答案：

第11题 治疗慢性粒细胞性白血病，首选

- A. 羟基脲
- B. 靛玉红
- C. 二溴甘露醇
- D. 环磷酰胺
- E. 长春新碱

正确答案：A 您选择的答案：

第12题 急性白血病诊断的主要依据是

- A. 骨髓增生极度活跃
- B. 发热、贫血、出血
- C. 白细胞计数 $>50 \times 10^9/L$
- D. 胸骨压痛(+)
- E. 骨髓中原始细胞明显增高

正确答案：E 您选择的答案：

第13题 本患者治疗首选

- A. 骨髓移植
- B. DA方案
- C. 全反式维A酸
- D. 羟基脲
- E. VP方案

正确答案：C 您选择的答案：

第14题 男性，30岁，全身乏力，低热、伴左上腹肿块半年。肝肋下2cm，脾肋下7cm，化验：血红蛋白80g/L，自细胞 $140 \times 10^9/L$ ，血小板 $100 \times 10^9/L$ ，骨髓象原始粒细胞0.02，pH1染色体阳性。正确的治疗为

- A. 脾切除
- B. 大剂量抗生素抗感染
- C. HOAP方案化疗
- D. VAP方案化疗
- E. 羟基脲口服

正确答案：E 您选择的答案：

第15题 骨髓细胞内出现Auer小体常见于

- A. 急性淋巴细胞白血病
- B. 慢性粒细胞白血病
- C. 急性粒细胞白血病
- D. 溶血性贫血
- E. 系统性红斑性狼疮

正确答案：C 您选择的答案：

第16题 使慢性粒细胞白血病达到血液学缓解的首选药物是

- A. α 干扰素
- B. 白消安
- C. 环磷酰胺
- D. 羟基脲
- E. 靛玉红

正确答案：D 您选择的答案：

第17题 当前治疗慢性粒细胞白血病慢性期首选的化疗药物是

- A. 靛玉红
- B. 羟基脲
- C. 马利兰

- D. 美法仑
- E. 高三尖杉酯碱

正确答案：B 您选择的答案：

第18题 男性，38岁。1个月来乏力，食欲差，左上腹胀痛。查体：肝肋下3cm，脾肋下10cm，血红蛋白70g/L，白细胞 $260 \times 10^9/L$ ，血小板 $210 \times 10^9/L$ ，白细胞分类：中幼粒及晚幼粒细胞为主，中性粒细胞碱性磷酸酶活性减低，首选治疗

- A. 保肝治疗
- B. 三代头孢
- C. 羟基脲
- D. 脾切除
- E. DA方案

正确答案：C 您选择的答案：

第19题 急性白血病引起贫血量重要的原因是

- A. 造血原料缺乏
- B. 红细胞寿命缩短
- C. 出血
- D. 无效红细胞形成
- E. 红系增殖受白血病细胞干扰

正确答案：E 您选择的答案：

第20题 易侵犯中枢神经系统的白血病是

- A. 慢性粒细胞性白血病
- B. 急性单核细胞性白血病
- C. 急性淋巴细胞性白血病
- D. 急性早幼粒细胞性白血病
- E. 急性粒细胞性白血病

正确答案：C 您选择的答案：

二、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第21-23题

男，36岁。5天前发热、咽疼，应用抗生素治疗无效，颈部浅表淋巴结肿大，咽部充血。扁桃体。肿大，下肢少许瘀斑。白细胞 $16.6 \times 10^9/L$ ，原始细胞0.60，血红蛋白80/L。血小板 $34 \times 10^9/L$ 。

1. 最可能的诊断是
 - A. 特发性血小板减少性紫癜
 - B. 缺铁性贫血
 - C. 再生障碍性贫血
 - D. 溶血性贫血
 - E. 急性白血病
2. 体检中应特别注意的体征是
 - A. 睑结膜苍白
 - B. 胸骨压痛
 - C. 浅表淋巴结肿大
 - D. 皮肤出血点
 - E. 心脏杂音
3. 为明确诊断应做的检查是
 - A. 血小板抗体
 - B. 血清铁蛋白
 - C. 骨髓扫描
 - D. 淋巴结活检
 - E. 骨髓涂片细胞学检查

正确答案：EBE 您选择的答案：

第24-25题

男性，26岁，5天来鼻及牙龈出血，皮肤瘀斑。血红蛋白55g/L，白细胞 $100 \times 10^9/L$ ，血小板 $16 \times 10^9/L$ 。骨髓增生活跃，幼稚细胞占80%，胞浆有大小不等颗粒及成堆棒状小体，过氧化酶染色强阳性。

1. 诊断考虑
 - A. 急性早幼粒细胞性白血病
 - B. 急性淋巴细胞性白血病
 - C. 急性粒细胞性白血病
 - D. 慢性粒细胞性白血病急变
 - E. 急性单核细胞性白血病
2. 本患者临床容易出现
 - A. 巨脾
 - B. DIC
 - C. 严重感染
 - D. 中枢神经系统受侵犯
 - E. 牙龈肿胀

正确答案：AB 您选择的答案：

第26-28题

男性，20岁，发热2周，体温38~39℃，检查皮肤散在紫癜。颈部及腋下可触及0.5cm×1.5cm大小淋巴结5~6个，脾肋下3cm，血红蛋白85g/L，白细胞 $10 \times 10^9/L$ ，血小板 $25 \times 10^9/L$ 。

1. 对诊断帮助最大的检查

- A. 血细菌培养
- B. 白细胞分类
- C. 胸部X线片
- D. 骨髓像检查
- E. 血小板抗体测定

2. 此患者在治疗3周后，出现高热，头痛、呕吐、Kernig征(+)，应采取治疗方案

- A. 应用广谱抗生素
- B. 链霉素、雷米封、利福平联合治疗
- C. 化疗+鞘内注射MTX
- D. 肾上腺糖皮质激素+先锋霉素
- E. 输血小板

3. 此病人在发热、头痛、呕吐第2日做脑脊液检查，最可能的发现为

- A. 脑脊液中中性粒细胞增高
- B. 细菌培养阳性
- C. 脑脊液发现结核杆菌
- D. 脑脊液蛋白量显著增高、糖定量减低
- E. 脑脊液白血细胞增多

正确答案：DCE 您选择的答案：

三、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第29-31题

1. 男，20岁，苍白、乏力一周。淋巴结及脾大，白细胞计数 $32.0 \times 10^9/L$ ，骨髓中原始细胞占83%，过氧化物酶染色阴性。

1. 最可能的诊断是

- A. 急性早幼粒细胞白血病
- B. 急性粒细胞白血病
- C. 急性红白血病
- D. 急性单核细胞白血病
- E. 急性淋巴细胞白血病

2. 最适宜的化疗方案是

- A. DA方案
- B. HA方案
- C. HOAP方案
- D. VDP方案
- E. CHOP方案

3. 如果出现头痛，时有呕吐，脑脊液压力增高，脑脊液可见少量幼稚细胞，应加用的治疗是

- A. 脾切除术
- B. 输血小板悬液
- C. 控制感染
- D. 白细胞去除术
- E. 鞘内注射甲氨蝶呤

正确答案：EDE 您选择的答案：

第32-33题

- A. 氨甲蝶呤
- B. 阿霉素
- C. DA方案
- D. 环磷酰胺
- E. VP方案

1. 急性粒细胞白血病

2. 急性淋巴细胞白血病

正确答案：CE 您选择的答案：

第34-35题

- A. 骨髓细胞内可见Auer小体
- B. 中性粒细胞碱性磷酸酶积分增高
- C. Ph1染色体阳性
- D. 糖原染色阳性
- E. 非特异性酯酶(+)，阳性可被氟化钠抑制

1. 慢性粒细胞性白血病

2. 类白血病样反应

正确答案：CB 您选择的答案：

历年试题3 内科学 第三十九章 下丘脑-垂体病

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 中枢性尿崩症患者控制多尿最适宜的药物是

- A. 双氢克尿塞
- B. 氯磺丙脲
- C. 去氨加压素(弥凝)
- D. 垂体后叶素水剂
- E. 油剂鞣酸加压素(长效尿崩停)

正确答案：C 您选择的答案：

第2题 有功能的垂体腺瘤最常见的是

- A. ACTH瘤
- B. FSH/LH瘤
- C. GH瘤
- D. TSH瘤
- E. PRL瘤

正确答案：E 您选择的答案：

第3题 偏盲型视野缺损最常见于

- A. 嗜铬细胞瘤阵发高血压眼底出血
- B. Graves病浸润性突眼
- C. 垂体腺瘤鞍上发展
- D. 希恩(Sheehan)综合征垂体梗塞
- E. 糖尿病性视神经乳头水肿

正确答案：C 您选择的答案：

第4题 尿渗透压降低常见于

- A. 甲状腺功能亢进症
- B. 中枢性尿崩症
- C. 原发性醛固酮增多症
- D. 糖尿病
- E. 甲状旁腺功能亢进症

正确答案：B 您选择的答案：

第5题 女，38岁，10年前分娩后出现无乳，闭经，食欲减退，怕冷，面色苍白，毛发脱落。最可能的诊断是

- A. 神经性厌食症
- B. 原发性甲状腺功能减退症
- C. 肾上腺皮质功能减退症
- D. 腺垂体功能减退症
- E. 卵巢功能早衰症

正确答案：D 您选择的答案：

第6题 严重的腺垂体功能减退症易发生低血糖主要是缺乏

- A. PRL及LH
- B. GH及ACTH
- C. GH及TSH
- D. PRL及TSH
- E. PRL及ACTH

正确答案：B 您选择的答案：

第7题 腺垂体功能减退症最常见原因是

- A. 原发性空蝶鞍症
- B. 各种垂体肿瘤
- C. 糖尿病血管病变
- D. 希恩(Sheehan)综合征
- E. 颅内感染后遗症

正确答案：B 您选择的答案：

第8题 中枢性尿崩症减少尿量的首选治疗是

- A. 每天肌肉注射油剂鞣酸加压素
- B. 加压素水剂与双氢克尿噻合用
- C. 非激素类抗利尿药物
- D. 口服去氨加压素替代
- E. 加压素水剂长期替代

正确答案：D 您选择的答案：

历年试题3 内科学 第三十六章 免疫球蛋白增多

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 有关免疫球蛋白和抗体的说法，哪种是正确的

- A．免疫球蛋白与抗体不同。二者也不相关
- B．抗体和免疫球蛋白只存在于血液和体液中。二者均具有免疫功能
- C．抗体均为免疫球蛋白，而免疫球蛋白并不一定都是抗体
- D．免疫球蛋白均为抗体，抗体不一定是免疫球蛋白
- E．免疫球蛋白就是抗体，二者具有相同的含义

正确答案：C 您选择的答案：

第2题 男。70岁，发现大量蛋白尿2周入院。入院后查本周蛋白尿阳性。为明确诊断，检查意义最大的是

- A．全身X线骨摄片
- B．肾活检
- C．核素骨扫描
- D．血清蛋白电泳
- E．骨髓穿刺

正确答案：E 您选择的答案：

第3题 下列疾病是单克隆免疫球蛋白增高的常见原因，除了

- A．孤立性骨髓瘤
- B．类风湿关节炎
- C．多发性骨髓瘤
- D．浆细胞白血病
- E．重链病

正确答案：B 您选择的答案：

历年试题3 内科学 第三十七章 骨髓穿刺和骨髓涂片细胞学检查

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 关于骨髓的描述正确的是

- A．成为黄骨髓后，不能再转变为红骨髓
- B．位于长骨的骨髓腔内
- C．在成年人骨内是黄骨髓
- D．变为黄骨髓后仍具有造血功能
- E．在胎儿和幼儿骨内是红骨髓

正确答案：E 您选择的答案：

第2题 骨髓检查巨核细胞明显减少最常见于

- A．特发性血小板减少性紫癜
- B．巨幼细胞性贫血
- C．溶血性贫血
- D．再生障碍性贫血
- E．缺铁性贫血

正确答案：D 您选择的答案：

历年试题3 内科学 第三十三章 淋巴瘤

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 对于恶性淋巴瘤，最有意义的临床表现是

- A. 恶病质
- B. 贫血
- C. 发热
- D. 肝脾大
- E. 无痛性淋巴结肿大

正确答案：E 您选择的答案：

第2题 男，14岁，颈淋巴结肿大2周，活检示淋巴结结构破坏。可见里-斯细胞。可诊断为

- A. 传染性单核细胞增多症
- B. 霍奇金病
- C. 非霍奇金淋巴瘤
- D. 淋巴结结核
- E. 淋巴结反应性增生

正确答案：B 您选择的答案：

第3题 诊断霍奇金病最主要的形态学依据是

- A. R-S细胞
- B. 免疫母细胞
- C. T淋巴细胞
- D. B淋巴细胞
- E. 巨噬细胞

正确答案：A 您选择的答案：

第4题 女，60岁，右颈淋巴结肿大3月，蚕豆大小，其可能性最小的病变是

- A. 恶性淋巴瘤
- B. 转移性肉瘤
- C. 淋巴结结核
- D. 淋巴结反应性增生
- E. 转移癌

正确答案：B 您选择的答案：

第5题 淋巴瘤最有诊断意义的临床表现

- A. 盗汗、体重减轻
- B. 长期周期性发热
- C. 局限性淋巴结肿大并有粘连
- D. 肝脾肿大
- E. 无痛性淋巴结肿大

正确答案：E 您选择的答案：

第6题 霍奇金病的最有诊断意义的细胞是

- A. 多形性瘤细胞
- B. 陷窝细胞
- C. 霍奇金细胞
- D. 嗜酸性细胞
- E. R-S细胞

正确答案：E 您选择的答案：

第7题 恶性淋巴瘤累及颈、腹股沟淋巴结、肝及肺、并伴有发热、盗汗及体重减轻，临床分期属

- A. A
- B. B
- C. B
- D. A
- E. B

正确答案：C 您选择的答案：

第8题 骨髓中找到里-斯细胞，能帮助诊断的疾病是

- A. 急性淋巴细胞白血病
- B. 急性粒细胞白血病
- C. 急性单核细胞白血病
- D. 非霍奇金淋巴瘤
- E. 霍奇金病

正确答案：E 您选择的答案：

第9题 男，46岁，右颈部无痛性淋巴结肿大4个月。伴上腹疼痛，食欲不佳，发热、盗汗、体重减轻。行剖腹探查见胃与胰头及腹膜有粘连，周围有多个肿大的淋巴结，病理检查为非霍奇金淋巴瘤，T细胞来源。临床分期属

- A . mA
- B . B
- C . A
- D . B
- E . mB

正确答案：B 您选择的答案：

第10题 霍奇金病特征性的热型是

- A . 周期性发热
- B . 间歇热
- C . 稽留热
- D . 弛张热
- E . 不规则热

正确答案：D 您选择的答案：

二、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第11-12题

- A . 小无裂细胞型
 - B . 滤泡性小裂细胞型
 - C . 弥漫性小裂细胞型
 - D . 滤泡性大细胞型
 - E . 弥漫性大细胞型
- 1 . 属于低度恶性淋巴瘤的是
 - 2 . 属于高度恶性淋巴瘤的是

正确答案：BA 您选择的答案：

历年试题3 内科学 第三十四章 出血性疾病

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 慢性特发性血小板减少性紫癜合并贫血最适宜的检查是

- A．血红蛋白电泳
- B．酸溶血试验
- C．血清叶酸测定
- D．血清铁蛋白测定
- E．红细胞渗透脆性试验

正确答案：D 您选择的答案：

第2题 14岁男孩，因腹痛来院就诊。查体：双下肢出现对称性成片状小出血点，尿常规发现血尿+++。该患者最可能的诊断是

- A．过敏性紫癜肾炎
- B．肾下垂
- C．肾绞痛
- D．急性肾盂肾炎
- E．肾血管畸形

正确答案：A 您选择的答案：

第3题 下列不符合关节型过敏性紫癜临床表现的是

- A．不遗留关节畸形
- B．多发生于大关节
- C．呈反复性发作
- D．关节肿胀
- E．部位固定，非游走性

正确答案：E 您选择的答案：

第4题 紫癜与充血性皮疹的主要区别是

- A．是否有皮肤脱屑
- B．是否高起皮肤表面
- C．颜色的不同
- D．形态不同
- E．按压后是否退色或消失

正确答案：E 您选择的答案：

第5题 治疗弥散性血管内凝血时，监测肝素用量的试验是

- A．APTT(激活的部分凝血活酶时间)
- B．纤维蛋白原定量
- C．出血时间
- D．3P试验
- E．血小板计数

正确答案：D 您选择的答案：

第6题 急性型DIC高凝期患者的治疗原则，除消除病因、治疗原发病外，应首先考虑

- A．积极抗纤溶治疗
- B．输注全血或血浆
- C．及早应用肝素
- D．补充水与电解质
- E．应用抗血小板药物

正确答案：C 您选择的答案：

第7题 5．关于特发性血小板减少性紫癜(ITP)的概念，哪一种描述是错误的

- A．骨髓巨核细胞总数减少
- B．临床上是较常见的一种出血性疾病
- C．急性型ITP与感染因素有关
- D．急性型ITP多见于儿童
- E．血小板寿命缩短

正确答案：A 您选择的答案：

第8题 凝血酶原时间(PT)正常见于

- A．口服双香豆素
- B．维生素K缺乏
- C．先天性V因子缺乏
- D．血友病
- E．慢性肝病肝功能失代偿

正确答案：D 您选择的答案：

第9题 特发性血小板减少性紫癜较少出现

- A. 皮肤瘀点
- B. 肌肉血肿
- C. 口腔粘膜出血
- D. 月经过多
- E. 鼻衄

正确答案：B 您选择的答案：

第10题 男，18岁，自幼有出血倾向。出血时间延长。凝血时间正常，血小板 $150 \times 10^9 / L$ ，血小板粘附率降低，部分凝血活酶时间延长，凝血酶原时间正常。父亲也有类似病史，考虑的诊断是

- A. 血友病
- B. 遗传性出血性毛细血管扩张症
- C. 过敏性紫癜
- D. 维生素K缺乏
- E. 血管性血友病

正确答案：E 您选择的答案：

二、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第11-12题

- A. 出血时间
 - B. 纤维蛋白原定量
 - C. 血块收缩试验
 - D. 3P试验
 - E. 血小板计数
1. 检查凝血功能的化验是
 2. 检查纤溶异常的化验是

正确答案：BD 您选择的答案：

历年试题3 内科学 第三十五章 血细胞数量的改变

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 外周血反映骨髓幼红细胞增生程度的最可靠指标是

- A．红细胞内出现Howell-Jolly小体
- B．出现有核红细胞
- C．网织红细胞百分率
- D．网织红细胞绝对值
- E．血红蛋白及红细胞计数

正确答案：A 您选择的答案：

第2题 下列由于免疫因素引起中性粒细胞减少的是

- A．假性粒细胞减少
- B．脾功能亢进所致中性粒细胞减少
- C．Felty综合征
- D．病毒感染或败血症时的粒细胞减少
- E．周期性中性粒细胞减少症

正确答案：C 您选择的答案：

历年试题3 内科学 第三十一章 贫血

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 下列实验室检查结果中，支持再生障碍性贫血的是

- A. 骨髓中非造血细胞减低
- B. 外周血淋巴细胞比例减低
- C. 外周血出现有核红细胞
- D. 骨髓中巨核细胞减低
- E. 中性粒细胞碱性磷酸酶积分减低

正确答案：D 您选择的答案：

第2题 缺铁性贫血最常见的病因是

- A. 慢性失血
- B. 慢性胃炎
- C. 慢性溶血
- D. 慢性肝炎
- E. 慢性感染

正确答案：A 您选择的答案：

第3题 阵发性睡眠性血红蛋白尿特异性的诊断依据为

- A. Ham试验(+)
- B. Coombs试验(+)
- C. 网织红细胞增高
- D. HbE(+)
- E. 红细胞寿命缩短

正确答案：A 您选择的答案：

第4题 男，44岁，头晕、乏力、面色苍白3年，巩膜轻度黄染，脾下2cm。血红蛋白56g/L，红细胞 $1.8 \times 10^{12}/L$ ，白细胞 $2.2 \times 10^9/L$ ，血小板 $32 \times 10^9/L$ 。骨髓增生减低，但红系增生，以中、晚幼红为主，尿Rous试验(+)，Ham试验(+)。

- A. 自身免疫性溶血性贫血
- B. 阵发性睡眠性血红蛋白尿
- C. 巨幼细胞贫血
- D. 缺铁性贫血
- E. 再生障碍性贫血

正确答案：C 您选择的答案：

第5题 慢性再障的治疗首选

- A. 造血干细胞移植
- B. 维生素B₁₂肌注
- C. 肾上腺糖皮质激素口服
- D. 抗胸腺球蛋白
- E. 丙酸睾酮肌肉注射

正确答案：E 您选择的答案：

第6题 缺铁性贫血最可靠的诊断依据是

- A. MCV降低
- B. 骨髓中铁粒幼红细胞减少
- C. 网织红细胞减少
- D. 血清铁降低
- E. 骨髓象和红细胞系增生低下

正确答案：D 您选择的答案：

第7题 诊断成年女性贫血的标准为血红蛋白浓度低于。

- A. 140g/L
- B. 100g/L
- C. 120g/L
- D. 110g/L
- E. 130g/L

正确答案：D 您选择的答案：

第8题 在下列缺铁性贫血的临床表现中，属于组织缺铁表现的是

- A. 头晕
- B. 气短
- C. 异食癖
- D. 心悸
- E. 眼花

正确答案：C 您选择的答案：

第9题 不属于小细胞性贫血的是

- A. 铁粒幼细胞性贫血
- B. 慢性感染性贫血
- C. 再生障碍性贫血
- D. 缺铁性贫血
- E. 海洋性贫血

正确答案：C 您选择的答案：

第10题 某男性患者，13岁，食蚕豆后突感畏寒，发热，皮肤发黄。血红蛋白70g/L，网织红细胞0.15，尿胆原阳性，胆红素阴性。对明确诊断最重要的检查是

- A. 酸化血清溶血试验
- B. 血总胆红素测定
- C. 抗人球蛋白试验
- D. 骨髓检查
- E. 高铁血红蛋白还原试验

正确答案：E 您选择的答案：

第11题 诊断温抗体型溶血性贫血最重要的实验室检查是

- A. Ham试验
- B. 免疫球蛋白测定
- C. 红细胞渗透性脆性试验
- D. 血红蛋白电泳
- E. Coombs试验

正确答案：E 您选择的答案：

第12题 缺铁性贫血的实验室检查结果应是

- A. 血清铁降低、总铁结合力降低、转铁蛋白饱和度降低
- B. 血清铁降低、总铁结合力升高、转铁蛋白饱和度降低
- C. 血清铁降低、总铁结合力升高、转铁蛋白饱和度正常
- D. 血清铁降低、总铁结合力正常、转铁蛋白饱和度降低
- E. 血清铁正常、总铁结合力升高、转铁蛋白饱和度降低

正确答案：B 您选择的答案：

第13题 诊断缺铁最肯定的依据是

- A. 骨髓小粒可染铁消失
- B. 小细胞低色素性贫血
- C. 血清铁降低
- D. 慢性失血史
- E. 转铁蛋白饱和度降低

正确答案：A 您选择的答案：

第14题 再生障碍性贫血的主要原因是

- A. 造血原料缺乏
- B. 红细胞内在缺陷
- C. 红细胞寿命缩短
- D. 骨髓造血功能衰竭
- E. 红细胞破坏过多

正确答案：D 您选择的答案：

第15题 女性，30岁，月经量多已2年。近3个月来感乏力、头晕、心悸，查血红蛋白65g/L，白细胞 $6.0 \times 10^9/L$ ，血小板 $140 \times 10^9/L$ ，骨髓象：粒比红为1:1，红细胞增生活跃，中晚幼红细胞45%，体积小，胞浆偏蓝，治疗首选

- A. 输血
- B. 口服叶酸
- C. 肌注维生素B12
- D. 脾切除
- E. 口服铁剂

正确答案：E 您选择的答案：

第16题 营养性缺铁性贫血的血象特点是

- A. 红细胞中央淡染区大
- B. RBC减少比Hb减少明显
- C. 粒细胞左移
- D. MCH=32pg
- E. 粒细胞分叶多

正确答案：A 您选择的答案：

第17题 引起继发性再生障碍性贫血较常见的病因是

- A. 细菌感染
- B. 病毒感染
- C. 物理因素
- D. 营养因素
- E. 药物及化学物质

正确答案：E 您选择的答案：

第18题 引起继发性再生障碍性贫血最常见的病因是

- A. 病毒感染
- B. 细菌感染
- C. 物理因素
- D. 营养因素
- E. 药物及化学物质

正确答案：E 您选择的答案：

第19题 下列属于贮存铁的是

- A. 含铁血黄素
- B. 转铁蛋白结合的铁
- C. 乳铁蛋白结合的铁
- D. 肌红蛋白铁
- E. 血红蛋白铁

正确答案：A 您选择的答案：

第20题 下列属于正常细胞性贫血的是

- A. 缺铁性贫血
- B. 慢性失血性贫血
- C. 铁粒幼细胞性贫血
- D. 急性失血性贫血
- E. 骨髓增生异常综合征

正确答案：D 您选择的答案：

第21题 下列哪项是诊断缺铁最肯定的依据

- A. 转铁蛋白饱和度降低
- B. 血涂片见典型小细胞低色素性红细胞
- C. 血清铁降低
- D. 有慢性失血史
- E. 骨髓小粒可染铁消失

正确答案：E 您选择的答案：

第22题 原位溶血见于

- A. 遗传性球形细胞增多症
- B. 自身免疫性溶血性贫血
- C. 阵发性睡眠性血红蛋白尿
- D. 血型不合输血
- E. 巨幼细胞贫血

正确答案：E 您选择的答案：

第23题 铁剂治疗营养性缺铁性贫血，血红蛋白访正常后继续用药的时间是

- A. 8月
- B. 2周
- C. 6月
- D. 1周
- E. 4周

正确答案：C 您选择的答案：

第24题 慢性再生障碍性贫血患者出现酱油色尿，最特异的诊断性检查是

- A. 荧光斑点试验
- B. 抗人球蛋白试验
- C. 热溶血试验
- D. 蔗糖溶血试验
- E. 酸溶血试验

正确答案：E 您选择的答案：

第25题 可进行骨髓移植治疗的贫血是

- A. 巨幼细胞性贫血
- B. 缺铁性贫血
- C. 自身免疫性溶血性贫血
- D. 慢性病贫血
- E. 再生障碍性贫血

正确答案：E 您选择的答案：

第26题 诊断缺铁性贫血早期的实验室依据是

- A. 血清总铁结合力增高
- B. 血清铁降低
- C. 骨髓象红细胞浆成熟落后于胞核
- D. 外周血呈小细胞低色素性贫血。
- E. 血清铁蛋白降低

正确答案：E 您选择的答案：

二、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第27-29题

女性，15岁，发现贫血、黄疸5年。脾肋下随器哩原阳性，胆红素阴性。对明确诊断最重要的检一至2.5cm，质中。血红蛋白90g/L，网织红细胞0.05，白细胞和血小板数均正常。红细胞渗透脆性试验：0.7%盐水溶液开始溶血。其父也有轻度黄疸

1. 下列哪种贫血最有可能

- A. 缺铁性贫血
- B. 海洋性贫血
- C. 遗传性球形红细胞增多症
- D. 遗传性铁粒幼细胞贫血
- E. 巨幼细胞性贫血

2. 要明确诊断，最有价值的实验室检查是

- A. 周围血片
- B. 骨髓象
- C. 血清铁总铁结合力
- D. 血红蛋白电泳
- E. 肝功能试验

3. 考虑治疗措施时应首选

- A. 输血
- B. 肾上腺皮质激素
- C. 脾切除
- D. 叶酸
- E. 维生素B12

正确答案：CAC 您选择的答案：

三、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第30-31题

- A. 骨髓巨核细胞增多，大多为颗粒型巨核细胞
- B. 骨髓巨核细胞数量显著减少
- C. 骨髓巨核细胞增多，原始巨核细胞显著增多
- D. 骨髓巨核细胞增多，小巨核细胞增多
- E. 骨髓巨核细胞增多，病态巨核细胞增多

1. 符合再生障碍性贫血的表现是

2. 符合特发性血小板减少性紫癜的表现是

正确答案：BC 您选择的答案：

历年试题3 内科学 第三十章 肾功能不全

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 我国现在引起慢性肾功能不全的病因最常见的是

- A．慢性肾小球肾炎
- B．慢性肾盂肾炎
- C．肾结核
- D．肾小动脉硬化
- E．肾结石

正确答案：A 您选择的答案：

第2题 慢性肾功能不全，血钾高于 6.5mmol/L ，时，最佳的治疗措施是

- A．静注碳酸氢钠
- B．静推10%葡萄糖酸钙
- C．限制钾盐的摄入
- D．口服降钾树脂
- E．血液透析或腹膜透析

正确答案：E 您选择的答案：

第3题 肾性贫血最主要的原因是

- A．蛋白质摄入量不足
- B．红细胞寿命缩短
- C．铁及叶酸摄入不足
- D．消化道失血
- E．红细胞生成素合成不足

正确答案：E 您选择的答案：

第4题 在我国引起慢性肾衰的首位病因是

- A．糖尿病肾病
- B．慢性肾盂肾炎
- C．高血压病
- D．急性肾小球肾炎
- E．慢性肾小球肾炎

正确答案：E 您选择的答案：

第5题 急性肾衰少尿或无尿期常见的致死原因是

- A．低氯血症
- B．高磷血症与低钙血症
- C．低钠血症
- D．高镁血症
- E．高钾血症

正确答案：E 您选择的答案：

第6题 典型慢性肾功能不全时的水电解质紊乱是

- A．代谢性酸中毒、低血钙、高血磷、高血钾
- B．代谢性酸中毒、低血钙、低血磷、低血钠
- C．代谢性酸中毒、低血钙、低血磷、高血钠
- D．代谢性碱中毒、低血钙、高血磷、高血钾
- E．代谢性酸中毒、低血钙、低血磷、高血钾

正确答案：A 您选择的答案：

第7题 对控制慢性肾脏病变肾功能进行性减退无明确作用的措施是

- A．消除浮肿
- B．纠正血脂异常
- C．限制蛋白质的摄入
- D．减少蛋白尿
- E．控制血压

正确答案：B 您选择的答案：

第8题 尿毒症患者血液系统的临床表现为

- A．白细胞出现中性粒细胞增加
- B．促红细胞生成素增加
- C．血小板异常增多
- D．低色素、小细胞性贫血
- E．贫血常为中、重度

正确答案：E 您选择的答案：

第9题 禁用于肾功能不全患者的抗菌药物是

- A．阿米卡星

- B. 头孢曲松
- C. 青霉素G
- D. 阿奇霉素
- E. 阿莫西林

正确答案：A 您选择的答案：

第10题 慢性肾功能不全恶化的常见诱因，应除外的是

- A. 外伤、失血
- B. 感染、发热
- C. 心力衰竭
- D. 血尿酸或血钙过低
- E. 呕吐伴腹泻

正确答案：D 您选择的答案：

第11题 终末期慢性肾衰竭的最主要死亡原因是

- A. 消化道大出血
- B. 尿毒症脑病
- C. 心脑血管并发症
- D. 严重感染
- E. 严重电解质紊乱

正确答案：C 您选择的答案：

第12题 尿毒症病人高血压最主要的原因是

- A. 血管加压素增多
- B. 肾素增多
- C. 交感神经兴奋
- D. 水钠潴留
- E. 促红素减少

正确答案：D 您选择的答案：

第13题 尿毒症患者发生纤维性骨炎的主要原因是

- A. 营养不良和低蛋白血症
- B. 尿磷排泄减少
- C. 继发性甲状旁腺功能亢进
- D. 活性维生素D合成障碍
- E. 尿钙排泄增多

正确答案：C 您选择的答案：

第14题 早期慢性肾功能不全最主要的治疗目的是

- A. 减少蛋白尿
- B. 减轻水肿
- C. 降低血压
- D. 延缓肾功能减退
- E. 改善营养状况

正确答案：D 您选择的答案：

第15题 男，28岁，查血压160/95mmHg(21.3/12.6kPa)，Hb85g/L，蛋白+，颗粒管型2~3个/HP。BUN10mmol/L，Cr220μmol/L。对该患者不宜采取

- A. 低蛋白饮食
- B. 低磷饮食
- C. 低钠饮食
- D. 根据尿量多少适当限水
- E. 高蛋白饮食

正确答案：E 您选择的答案：

二、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第16-18题

男。33岁，15年前曾发现蛋白尿，一直未检查和治疗。三周前出现恶心、呕吐，查体：血压190/120mmHg，轻度浮肿，血肌酐360μmol/L，B超双肾缩小。

1. 下列哪项检查不应进行

- A. 血常规
- B. 内生肌酐清除率
- C. 血电解质
- D. 静脉肾盂造影
- E. 心电图检查

2. 下列哪项生化异常不应出现

- A. 高血钾
- B. 低血钙
- C. 低血钠
- D. 低血镁

- E. 酸中毒
3. 该患者最可能的原发病是
A. 慢性肾小球肾炎
B. 慢性肾盂肾炎
C. 慢性间质性肾炎
D. 糖尿病肾病
E. 高血压肾病

正确答案：DDA 您选择的答案：

第19-21题

女性，50岁，因呕吐、腹泻、低热于门诊应用庆大霉素32万U/d，共5天，近日来觉尿量有所减少约700~800ml/d，伴乏力、头晕，实验室检查尿蛋白(+)，Hb100g/L，血清钾6.5mmol/L，BUN33.5mmol/L。血肌酐884μmol/L。

1. 该例最可能的诊断是
A. 庆大霉素导致急性肾衰竭
B. 庆大霉素过敏
C. 急性胃肠炎致肾损害
D. 腹泻脱水致急性肾功能异常
E. 急性间质性肾炎
2. 最有助于诊断的进一步检查是
A. 肾脏B超
B. 静脉肾盂造影
C. 同位素肾图
D. 肾活检
E. 血气分析
3. 最应采取的治疗手段是
A. 口服离子交换树脂
B. 大剂量呋塞米静脉注射
C. 按3~6g葡萄糖：1U胰岛素比例静滴补液
D. 限制入水量，透析治疗
E. 口服甲醛氧化淀粉

正确答案：ABD 您选择的答案：

第22-24题

男性。30岁，头昏，乏力2年，血压21.3/13.3kPa(：L60/ ' 100mmHg)，血红蛋白80g/L，尿比重1.014。尿蛋白(++)，颗粒管型0~2/HP，BUN16.4mmol/L(46mg/dl)，血肌酐309.4μmol/L(3.5mg/dl)。眼底视网膜动脉细窄迂曲。

1. 可能性最大的诊断是
A. 高血压病 期
B. 肾性高血压
C. 慢性肾小球肾炎尿毒症晚期
D. 慢性肾小球肾炎氮质血症期
E. 慢性肾盂肾炎
2. 最佳治疗方案是
A. 血液透析
B. 腹膜透析
C. 应用降血压药物
D. 应用促红细胞生成素
E. 饮食和对症治疗等非透析综合治疗
3. 慢性肾炎引起高血压肾功能不全与高血压病引起肾功能不全的最重要的鉴别资料是
A. 血压增高程度
B. 肾功能损害程度
C. 眼底改变
D. 高血压与肾炎的发病史
E. 心功能改变

正确答案：DED 您选择的答案：

第25-27题

男，35岁，头痛、头晕1年，1周来加重伴心悸、乏力、鼻出血及牙龈出血来诊。查体：血压170/110mmHg。皮肤粘膜苍白，Hb65g/L，PLT148×10⁹/L。尿蛋白(+++)，尿红细胞3~5/HP，BUN38mmol/L，SCr887μmol/L，CCr10ml/min，肾脏B超左肾8.9cm×4.6cm×4.1cm，右肾8.7cm×4.4cm×4.1cm，双肾皮质变薄。

1. 该患者诊断可能为
A. 急性肾功能衰竭
B. 慢性肾功能衰竭氮质血症期
C. 慢性肾功能衰竭尿毒症期
D. 轻度高血压脑病
E. 急进性肾小球肾炎
2. 该患者不应该出现的电解质和酸碱平衡失调是
A. 低钙血症
B. 高镁血症
C. 低钠血症
D. 低镁血症
E. 代谢性酸中毒
3. 该患者最佳的治疗措施是
A. 纠正贫血
B. 控制高血压
C. 积极止血

D. 胃肠透析

E. 血液净化

正确答案：CDE 您选择的答案：

三、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第28-29题

A. 糖皮质激素

B. 磷结合剂

C. 促红细胞生成素

D. 血管紧张素转换酶抑制剂

E. 碳酸氢钠

1. 慢性肾功能不全继发性甲旁亢患者应给予

2. 糖尿病肾病大量蛋白尿患者应给予

正确答案：BD 您选择的答案：

历年试题3 内科学 第三章 慢性支气管炎和阻塞性肺气肿

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 慢性支气管炎急性发作伴细菌感染时，最主要的临床表现是

- A．咳嗽加重
- B．咳白色泡沫痰与粘液痰
- C．肺底部有细湿啰音
- D．肺部有哮鸣音
- E．咳脓性痰且痰量增加

正确答案：E 您选择的答案：

第2题 慢性支气管炎发展成阻塞性肺气肿的过程中最先发生的病理改变是

- A．肺泡膨胀
- B．肺小动脉痉挛
- C．肺纤维化
- D．肺泡壁弹性减退
- E．细支气管不完全阻塞

正确答案：D 您选择的答案：

第3题 不属于阻塞性肺气肿的体征是

- A．桶状胸
- B．肺泡呼吸音降低，呼气明显延长
- C．肺下界和肝浊音界下降
- D．叩诊呈过清音、心浊音界缩小或不易叩出
- E．触觉语颤增强

正确答案：E 您选择的答案：

第4题 慢性支气管炎急性发作期的主要治疗措施为

- A．应用解痉平喘药
- B．给予止咳药物
- C．给予祛痰药物
- D．吸入糖皮质激素
- E．控制呼吸道感染

正确答案：E 您选择的答案：

第5题 慢性支气管炎急性发作患者，伴发热。使用头孢他啶两周后，体温曾一度降至正常，症状缓解。后再次出现发热，经检查，口腔粘膜有白色念珠菌感染，此时抗生素拟改用

- A．青霉素
- B．红霉素
- C．环丙沙星
- D．氟康唑
- E．两性霉素B

正确答案：E 您选择的答案：

第6题 男性，62岁。慢性咳嗽10年，近半月来出现阵发性干咳，持续痰中带血。X线胸片显示左肺下叶不张。为明确诊断最有意义的检查方法为

- A．痰细菌培养
- B．肺功能测定
- C．血清癌胚抗原测定
- D．纤维支气管镜检查
- E．结核菌素试验

正确答案：D 您选择的答案：

第7题 对年老体弱、痰量较多且无力咳痰的慢性支气管炎患者，不宜使用的药物为

- A．溴己新
- B．可待因
- C．羧甲司坦
- D．氨溴索
- E．氧氟沙星，

正确答案：B 您选择的答案：

第8题 慢性阻塞性肺气肿最主要的并发症是

- A．肺源性心脏病
- B．纤维素性肺炎
- C．肺脓肿
- D．肺萎陷
- E．肺肉质变

正确答案：A 您选择的答案：

第9题 有关慢性支气管炎(慢支)发病的外因，错误的是

- A．理化因素的慢性刺激为慢支的诱因
- B．气候寒冷为慢支发作的重要诱因
- C．感染是慢支发生与发展的重要因素
- D．慢支的发病与过敏因素无关
- E．长期吸烟与慢支发生有密切关系

正确答案：D 您选择的答案：

第10题 慢性支气管炎患者呼吸道感染时，最常致病的革兰阴性杆菌为

- A．流感嗜血杆菌
- B．大肠杆菌
- C．肺炎克雷白杆菌
- D．绿脓杆菌
- E．变形杆菌

正确答案：A 您选择的答案：

第11题 慢性支气管炎有小气道阻塞时，最敏感的肺功能检查指标是

- A．呼吸道阻力增加
- B．频率依赖性肺顺应性降低
- C．闭合容量减少
- D．第一秒用力呼气量占用力肺活量的比值减少
- E．残气容积明显增加

正确答案：B 您选择的答案：

第12题 诊断阻塞性肺气肿，最有价值的是

- A．残气量 / 肺总量 $>40\%$
- B． PaO_2 低于正常
- C．最大通气量低于预计值的80%
- D．第一秒用力呼气量 / 用力肺活量 $<60\%$
- E．潮气量低于预计值的80%

正确答案：A 您选择的答案：

第13题 女，60岁。慢性咳嗽20年，剧烈咳嗽3天，无咳痰、咯血及发热，半小时前突发胸痛，呼吸困难，不能平卧，伴发绀。体检：血压150 / 100mmHg，呼吸40次 / 分。右胸语颤减弱，呼吸音减低。心率110次 / 分。以上表现符合

- A．急性心肌梗死
- B．自发性气胸
- C．急性左心衰竭
- D．阻塞性肺气肿
- E．肺梗死

正确答案：B 您选择的答案：

第14题 男性，50岁。反复咳嗽、咳痰4年，近半年来发作时常伴呼吸困难。体检：双肺散在哮鸣音，肺底部有湿啰音。肺功能测定：一秒钟用力呼气容积 / 用力肺活量为55%，残气容积 / 肺总量为35%。诊断应考虑为

- A．支气管哮喘
- B．慢性支气管炎合并肺气肿
- C．慢性喘息型支气管炎
- D．支气管哮喘合并肺气肿
- E．慢性单纯型支气管炎

正确答案：C 您选择的答案：

第15题 男性，65岁，吸烟40余年，慢性咳嗽，咳痰20余年。近2年来劳累时有气急。查体：两肺呼吸音减弱，肺下界下移，两肺底有细小湿啰音。最可能的诊断是

- A．胸腔积液
- B．肺气肿
- C．气胸
- D．支气管哮喘
- E．大叶性肺炎

正确答案：B 您选择的答案：

第16题 肺气肿患者为改善其呼吸功能，主要措施为

- A．长期吸入糖皮质激素
- B．进行呼吸肌功能锻炼
- C．长期应用解痉平喘药
- D．应用抗生素预防感染
- E．长期服用祛痰止咳药

正确答案：B 您选择的答案：

第17题 细支气管不完全阻塞所致的阻塞性通气障碍可造成

- A．肺不张
- B．气胸
- C．支气管扩张
- D．肺纤维化
- E．肺气肿

正确答案：E 您选择的答案：

二、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第18-20题

- A．呼吸性酸中毒
 - B．代谢性酸中毒
 - C．呼吸性碱中毒
 - D．代谢性碱中毒
 - E．呼吸性酸中毒合并代谢性碱中毒
- 1．幽门梗阻病人可发生
 - 2．重度肺气肿病人可发生
 - 3．外科临床上最常见的酸碱失衡是

正确答案：DAB 您选择的答案：

第21-22题

女性，55岁，为慢性阻塞性肺疾病(COPD)气肿型患者，近年来轻微活动即感气急，咳嗽轻，咳痰少。血气分析：

- PaO₂29．3kPa(70mmHg)，PaCO₂4．8kPa(36mmHg)。
- 1．该COPD患者病情发展已出现
 - 2．根据血气分析结果，该患者的呼吸功能障碍为
- A．I型呼吸衰竭
 - B．Ⅱ型呼吸衰竭
 - C．低氧血症
 - D．高碳酸血症
 - E．以上都不是
- A．通气功能障碍
 - B．换气功能障碍
 - C．通气和换气功能障碍并存
 - D．肺泡膜增厚所致弥散功能降低
 - E．通气／血流比例降低

正确答案：EB 您选择的答案：

历年试题3 内科学 第十八章 感染性心内膜炎

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 女，28岁，发热半月，弛张热型，伴恶寒、关节痛。体检：皮肤瘀点、Osier结节，心脏有杂音，考虑为感染性心内膜炎。确诊的直接证据来自

- A．细菌学检查
- B．血液学检查
- C．超声心动图
- D．免疫学检查
- E．心电图检查

正确答案：A 您选择的答案：

第2题 确诊感染性心内膜炎除血培养多次阳性外，还应有

- A．Roth斑
- B．转移性脓肿
- C．新出现的心脏病理性杂音
- D．指甲下裂片状出血
- E．Janeway损害

正确答案：C 您选择的答案：

第3题 诊断感染性心内膜炎的最重要方法是

- A．X线检查
- B．血培养
- C．心电图检查
- D．免疫学检查
- E．常规生化检查

正确答案：B 您选择的答案：

第4题 女，28岁，发热半月，弛张热型，伴恶寒、关节痛。体检：皮肤淤点、Osier结节，心脏有杂音，考虑为感染性心内膜炎。确诊的直接证据来自

- A．免疫学检查
- B．X线和心电图检查
- C．血液学检查
- D．超声心动图
- E．组织学和细菌学检查

正确答案：E 您选择的答案：

第5题 急性感染性心内膜炎最常见的致病菌是

- A．肺炎球菌
- B．淋球菌
- C．草绿色链球菌
- D．金黄色葡萄球菌
- E．肠球菌

正确答案：D 您选择的答案：

第6题 一位28岁的男性风湿性心脏病患者，近半月来发热， $T38.3^{\circ}\text{C}$ ，右下睑结膜见一出血点，双肺无I岁音，脾肋下可扪及边缘，双下肢皮肤少数紫癜。血红蛋白 100g/L ，白细胞 $12\times 10^9/\text{L}$ ，中性粒白细胞75%，血小板 $150\times 10^9/\text{L}$

- A．亚急性感染性心内膜炎
- B．过敏性紫癜
- C．再生障碍性贫血
- D．急性白血病
- E．脾功能亢进

正确答案：A 您选择的答案：

第7题 女，30岁，持续发热2周，有先天性心脏病病史。入院查体：贫血貌，胸骨左缘3~4肋间4/6级粗糙收缩期杂音伴震颤，脾肋下2cm，血培养两次阳性。入院后3天突感呼吸困难、胸痛，咯血多次，可能性最大的诊断是

- A．室间隔缺损合并急性心衰
- B．感染性心内膜炎合并急性肺栓塞
- C．感染性心内膜炎合并肺部感染
- D．室间隔缺损合并肺部感染
- E．室间隔缺损合并支气管扩张症

正确答案：B 您选择的答案：

历年试题3 内科学 第十二章 心力衰竭

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 男，42岁，劳累时心悸、气短2年，腹胀、尿少3天。心电图示心房颤动，心室率110次/分；胸部X线示心胸比值65%，肺瘀血。有助于该患者诊断的辅助检查是

- A．心脏核素检查
- B．心导管检查
- C．超声心动图
- D．心电图运动负荷试验
- E．心电向量图

正确答案：C 您选择的答案：

第2题 哌唑嗪的不良反应可表现为

- A．低血钾
- B．体位性低血压
- C．粒细胞减少
- D．消化性溃疡
- E．水钠潴留

正确答案：B 您选择的答案：

第3题 心力衰竭患者水肿通常首先出现在

- A．腹部
- B．双手
- C．颜面
- D．眼睑
- E．身体最低部位

正确答案：E 您选择的答案：

第4题 提示左心功能不全的脉搏是

- A．迟脉
- B．交替脉
- C．重搏脉
- D．水冲脉
- E．奇脉

正确答案：B 您选择的答案：

第5题 不是由于容量负荷过重所致心力衰竭的疾病是

- A．甲状腺功能亢进症
- B．主动脉瓣关闭不全
- C．动静脉瘘
- D．室间隔缺损
- E．二尖瓣关闭不全

正确答案：C 您选择的答案：

第6题 改善急性左心衰竭症状最有效的药物是

- A．钙离子拮抗剂
- B．β肾上腺素能受体阻滞剂
- C．血管紧张素转换酶抑制剂
- D．洋地黄
- E．利尿剂

正确答案：E 您选择的答案：

第7题 治疗慢性心功能不全和逆转心肌肥厚并能降低病死率的药物是

- A．强心甙
- B．卡托普利
- C．酚妥拉明
- D．哌唑嗪
- E．硝酸甘油

正确答案：B 您选择的答案：

第8题 下列能使心输出量增加的因素是

- A．心迷走中枢紧张性增高
- B．心交感中枢紧张性增高
- C．颈动脉窦内压力增高
- D．静脉回心血量减少
- E．心室舒张末期容积减小

正确答案：B 您选择的答案：

第9题 引起左室后负荷增高的主要因素是

- A. 红细胞压积增大
- B. 主动脉瓣关闭不全
- C. 体循环高压
- D. 肺循环高压
- E. 回心血量增加

正确答案：C 您选择的答案：

第10题 某心性水肿患者，用地高辛和氢氯噻嗪治疗，2周后患者出现多源性室性早搏，其主要原因是

- A. 高血镁
- B. 低血钙
- C. 低氯碱血症
- D. 低血钾
- E. 低血钠

正确答案：D 您选择的答案：

第11题 右心衰竭患者最有诊断意义的体征是

- A. 心率明显增快
- B. 肺动脉瓣区第2心音明显亢进
- C. 胸骨左缘3~4肋间闻及收缩期杂音
- D. 胸骨左缘3~4肋间闻及舒张期奔马律
- E. 心律显著不齐

正确答案：D 您选择的答案：

第12题 右心衰竭的病人常因组织液生成过多而致下肢浮肿，其主要原因是

- A. 血浆胶体渗透压降低
- B. 毛细血管血压增高
- C. 淋巴回流受阻
- D. 组织液胶体渗透压升高
- E. 组织液静水压降低，

正确答案：B 您选择的答案：

第13题 单纯左心衰竭的典型体征是

- A. 颈静脉怒张
- B. 双肺底闻及湿啰音
- C. 肝颈静脉回流征阳性
- D. 下垂性对称性水肿
- E. 胸腔积液

正确答案：B 您选择的答案：

第14题 男，50岁，突起呼吸困难，咯粉红色泡沫痰，血压25.3 / 13.3 kPa(190 / 100 mmHg)。该患者的最佳治疗药物是

- A. 多巴酚丁胺
- B. 硝酸甘油
- C. 西地兰
- D. 氨茶碱
- E. 硝普钠

正确答案：E 您选择的答案：

第15题 治疗心力衰竭时硝普钠的最大用量是

- A. 10 $\mu\text{g} / (\text{kg} \cdot \text{min})$
- B. 0.3 $\mu\text{g} / (\text{kg} \cdot \text{min})$
- C. 0.5 $\mu\text{g} / (\text{kg} \cdot \text{min})$
- D. 5 $\mu\text{g} / (\text{kg} \cdot \text{min})$
- E. 20 $\mu\text{g} / (\text{kg} \cdot \text{min})$

正确答案：D 您选择的答案：

第16题 对心力衰竭病人进行择期手术，至少待心衰控制以后

- A. 5~6周
- B. 1~2周
- C. <1周
- D. 3~4周
- E. >6周

正确答案：D 您选择的答案：

第17题 对未经治疗的患者，以下检查项目，哪项结果正常时最有助于排除心力衰竭

- A. 冠状动脉造影
- B. 血浆利钠肽水平
- C. 心电图
- D. 胸部X线检查
- E. 血浆肌钙蛋白水平

正确答案：B 您选择的答案：

第18题 右心衰竭体循环瘀血的表现是

- A. 肝颈返流征阳性
- B. 阵发性夜间呼吸困难
- C. 心源性哮喘
- D. 端坐呼吸
- E. 劳力性呼吸困难

正确答案：A 您选择的答案：

第19题 氨苯蝶啶作用的特点是

- A. 产生低血钠症
- B. 产生高血钾症
- C. 具有抗醛固酮作用
- D. 产生高血糖反应
- E. 产生低氯碱血症

正确答案：B 您选择的答案：

第20题 右心衰竭时产生水肿的始动因素是

- A. 毛细血管滤过压增高
- B. 淋巴液回流障碍
- C. 毛细血管通透性增加
- D. 肾小球滤过率下降
- E. 血浆胶体渗透压降低

正确答案：A 您选择的答案：

第21题 慢性心力衰竭时推荐使用的β受体阻断剂是

- A. 美托洛尔
- B. 普萘洛尔
- C. 呋咪洛尔
- D. 阿替洛尔
- E. 所有已上市的β受体阻断剂

正确答案：A 您选择的答案：

第22题 老年心力衰竭患者症状加重的最常见诱因是

- A. 室性期前收缩
- B. 摄入液体过多
- C. 呼吸道感染
- D. 心肌缺血
- E. 过度劳累

正确答案：C 您选择的答案：

二、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第23-24题

男，40岁，因呼吸困难和水肿入院。查体发现颈静脉怒张，肝在右肋缘下4cm，表面光滑，轻度压痛，双下肢压陷性水肿。

1. 检查心脏时可能发现
 - A. 心尖搏动向左下移位
 - B. 心脏形态呈靴形
 - C. 心尖部可听到舒张期杂音
 - D. 主动脉瓣区可听到粗糙的收缩期杂音
 - E. 主动脉瓣第二听诊区可听到叹气样舒张期杂音
2. 该患者心音可有以下变化，除了
 - A. 心尖部第二心音增强
 - B. 心尖部第一心音增强
 - C. 肺动脉瓣区第二心音增强
 - D. 肺动脉瓣区第二心音分裂
 - E. 心尖部第一心音可呈拍击性

正确答案：CA 您选择的答案：

三、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第25-27题

- A. 肺气肿
- B. 肺不张
- C. 肺水肿
- D. 肺脓肿
- E. 肺褐色硬化

1. 慢性左心衰竭导致
2. 肺末梢组织充气过度导致
3. 急性左心衰竭导致

正确答案：EAC 您选择的答案：

第28-29题

- A. 卡托普利
 - B. 双嘧达莫(潘生丁)
 - C. 低分子肝素
 - D. 甲泼尼龙(甲基强的松龙)
 - E. 呋塞米(速尿)
1. 有可能引起高钾血症
 2. 必须监测出凝血状况

正确答案：AC 您选择的答案：

历年试题3 内科学 第十九章 心肌疾病

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 可使肥厚型梗阻性心肌病的心脏杂音减弱的药物是

- A. 地高辛
- B. 普萘洛尔
- C. 亚硝酸异戊酯
- D. 硝酸甘油
- E. 异丙肾上腺素

正确答案：B 您选择的答案：

第2题 对诊断肥厚型梗阻性心肌病最有意义的是

- A. 超声心动图发现舒张期室间隔左室后壁的厚度之比 1.3，伴二尖瓣前叶收缩期向前运动
- B. 用力时心前区闷痛及晕厥史
- C. 可闻第三心音及第四心音
- D. 心电图出现深而宽的病理性Q波
- E. 胸骨左缘第三、四肋间有响亮的收缩期杂音

正确答案：A 您选择的答案：

第3题 对肥厚型梗阻性心肌病的诊断最有意义的是

- A. 可闻第三心音及第四心音
- B. 心电图出现深而不宽的病理性Q波
- C. 超声心动图发现舒张期室间隔与左室后壁厚度之比>1.3
- D. 胸骨左缘第三、四肋间有响亮的收缩期杂音
- E. 用力后心前区闷痛及晕厥史

正确答案：C 您选择的答案：

第4题 男性，32岁，劳累后心悸、气促、下肢水肿6个月。查体：心界向两侧扩大，心尖区闻及2/6级收缩期杂音，两肺底有小水泡音，超声心动图示左室腔增大，心电图提示完全性左束支阻滞。该患者应诊断为

- A. 二尖瓣狭窄
- B. 心包炎
- C. 急性病毒性心肌炎
- D. 扩张型心肌病
- E. 肺心病

正确答案：D 您选择的答案：

第5题 男，46岁，因心悸、胸痛、劳力性呼吸困难数日就诊。心电图示左室肥大，、
波。心导管检查示左室腔与流出道间压差>20mmHg，Brockenbrough现象阳性。诊断是

- A. 扩张型心肌病
- B. 特异性心肌病
- C. 肥厚型心肌病
- D. 未定型心肌病
- E. 限制型心肌病

正确答案：C 您选择的答案：

第6题 女，16岁，活动后心慌、气短、胸痛两周，两周前曾患“感冒”，持续发热一周。查体：面色苍白，心界向左下扩大，心率120次/分，频发早搏。第一心音减弱。心尖区闻及奔马律及3/6级全收缩期杂音。心肌酶谱检查CK-MB80IU/L。最有可能的诊断是

- A. 急性风湿热
- B. 急性心肌梗死
- C. 风湿性二尖瓣关闭不全
- D. 急性病毒性心肌炎
- E. 扩张型心肌病

正确答案：D 您选择的答案：

第7题 下列不属于急性病毒性心肌炎常见临床表现的是

- A. 心动过速与发热程度平行
- B. 可合并各种心律失常
- C. 先有发热，然后出现心悸、胸闷
- D. 恶心、呕吐等消化道症状
- E. 常出现器质性心脏杂音

正确答案：E 您选择的答案：

第8题 扩张型心肌病最主要的临床表现为

- A. 肺部感染
- B. 栓塞
- C. 食欲不振
- D. 充血性心力衰竭
- E. 猝死

正确答案：D 您选择的答案：

第9题 扩张型心肌病左、右心室同时衰竭时，与临床症状和体征最有关的因素是

- A. 心排量减少
- B. 心律失常
- C. 肺淤血
- D. 静脉回流增加
- E. 心肌缺血

正确答案：B 您选择的答案：

第10题 扩张型心肌病患者的最主要的临床表现是

- A. 心力衰竭
- B. 呼吸道感染
- C. 房室传导阻滞
- D. 晕厥
- E. 室性心律失常

正确答案：A 您选择的答案：

第11题 男，35岁，入院诊断为扩张型心肌病，心功能 级。心电图示心率96次/分，心房颤动。血清钾6.5mmol/L，血清钠130mmol/L。该患者不宜应用

- A. 螺内酯(安体舒通)
- B. 地高辛
- C. 呋塞米(速尿)
- D. 阿司匹林
- E. 硝普钠

正确答案：A 您选择的答案：

二、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第12-13题

女性，19岁，近2周来发热38℃左右，伴恶心、呕吐、腹泻。遂出现心悸、胸痛、呼吸困难。晕厥发作。体检发现：面色苍白，精神萎靡。心率40次/分。律齐，心尖部第一心音低钝，且可闻及大炮音，临床诊断病毒性心肌炎。

- 1. 心电图表现最可能是
- A. 窦性心动过缓
- B. 第一度房室传导阻滞
- C. 第二度房室传导阻滞
- D. 第三度房室传导阻滞
- E. 室内传导阻滞
- 2. 最适宜的治疗措施为
- A. 静脉注射阿托品
- B. 静脉滴注硝酸甘油
- C. 皮下注射肾上腺素
- D. 临时植入心脏起搏器
- E. 心脏复律

正确答案：DD 您选择的答案：

第14-16题

男性，21岁，近半年来反复心悸、胸痛、劳力性呼吸困难，时有头晕或短暂神志丧失。体检发现：心脏轻度增大，心尖部有2级收缩期杂音和第4心音，胸骨左缘第3~4肋间闻及较粗糙的喷射性收缩期杂音。

- 1. 最可能的诊断是
- A. 冠心病心绞痛
- B. 二尖瓣关闭不全
- C. 主动脉瓣狭窄
- D. 肥厚型梗阻性心肌病
- E. 病毒性心肌炎
- 2. 最有价值的诊断方法是
- A. 胸部X线摄片
- B. 心电图
- C. 超声心动图
- D. 心脏核素检查
- E. 冠状动脉造影
- 3. 应选用的药物是
- A. 地高辛
- B. 硝酸甘油
- C. 心得安(替萘洛尔)
- D. 卡托普利
- E. 双氢克尿噻

正确答案：DCC 您选择的答案：

三、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第17-19题

- A. 左室扩大，流出道增宽，室间隔及左室后壁运动减弱
B. 室间隔非对称性肥厚，舒张期室间隔厚度与左室后壁之比 1.3:1
C. 心前壁之前和心后壁之后有液性暗区
D. 瓣叶有赘生物及瓣叶穿孔
E. 舒张期二尖瓣前叶呈圆拱状，后叶活动度减弱，交界处融合，瓣叶增厚和瓣口面积减小
- 下列各种心脏病超声心动图检查显示
1. 扩张型心肌病
 2. 肥厚型心肌病
 3. 心包积液

正确答案：ABC 您选择的答案：

历年试题3 内科学 第十六章 冠状动脉粥样硬化性心脏病

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 急性心肌梗死时不宜溶栓治疗的情况是指同时伴有。

- A. 萎缩性胃炎1年
- B. 6个月前腔隙性脑梗塞
- C. 血压160 / 100mmHg
- D. 主动脉夹层
- E. 2周前曾行桡动脉穿刺

正确答案：D 您选择的答案：

第2题 急性心肌梗死时梗死时，特异性最高的血清标志物是

- A. LDH
- B. TnI
- C. α -HBDH
- D. CK-MB
- E. SCOT

正确答案：B 您选择的答案：

第3题 导致急性心肌梗死患者早期(24小时内)死亡的主要原因为

- A. 心脏破裂
- B. 心律失常
- C. 心源性休克
- D. 肺栓塞
- E. 心力衰竭

正确答案：B 您选择的答案：

第4题 心肌梗死最常发生的部位在

- A. 左心室前壁
- B. 右心室后壁
- C. 左心室侧壁
- D. 右心室前壁
- E. 左心室后壁

正确答案：A 您选择的答案：

第5题 急性下壁心肌梗死最易合并

- A. 心房颤动
- B. 右束支传导阻滞
- C. 房室传导阻滞
- D. 室性早搏
- E. 房性心动过速

正确答案：C 您选择的答案：

第6题 诊断冠心病最常用的非创伤性检查方法是

- A. 超声心动图
- B. 休息时心电图
- C. 心脏CT检查
- D. 24小时动态心电图
- E. 心电图运动负荷试验

正确答案：E 您选择的答案：

第7题 最易引起房室传导阻滞的是

- A. 前壁心肌梗死
- B. 后壁心肌梗死
- C. 侧壁心肌梗死
- D. 广泛前壁心肌梗死
- E. 下壁心肌梗死

正确答案：E 您选择的答案：

第8题 男；48岁，发作性胸痛一个月，每次发作含硝酸甘油后缓解，考虑冠心病心绞痛。最常用的检查方法是

- A. 动态心电图
- B. 放射性核素检查
- C. 心电图运动负荷试验
- D. 心脏K线摄片
- E. 超声心动图

正确答案：C 您选择的答案：

第9题 急性心肌梗死早期最重要的治疗措施是

- A. 抗心绞痛
- B. 补充血量
- C. 心肌再灌注
- D. 消除心律失常
- E. 增加心肌营养

正确答案：C 您选择的答案：

第10题 运动负荷试验阳性的心电图标准是：

- A. ST段水平型压低 0.1mV(从J点后0.08秒)
- B. ST段上斜型压低 0.1mV(从J点后0.08秒)
- C. ST段弓背向上抬高>0.1mV(从J点后0.08秒)
- D. ST段水平型压低 0.05mV(从J点后0.08秒)
- E. ST段上斜型压低 0.05mV(从J点后0.08秒)

正确答案：A 您选择的答案：

第11题 心肌梗死最常发生的部位在

- A. 左心室侧壁
- B. 右心室前壁
- C. 左心室后壁
- D. 室间隔后1/3
- E. 左心室前壁

正确答案：E 您选择的答案：

第12题 心肌坏死的心电图特征性表现是

- A. 病理性Q波
- B. ST段抬高呈弓背向上型
- C. 冠状T波
- D. ST段水平型下降
- E. T波低平

正确答案：A 您选择的答案：

第13题 急性心肌梗死后窦速伴有室性期前收缩。优先使用的抗心律失常药物是

- A. 普鲁帕酮(心律平)
- B. 奎尼丁
- C. 维拉帕米
- D. 美西律(慢心律)
- E. 普萘洛尔(心得安)

正确答案：A 您选择的答案：

第14题 Kinip分级，心功能Ⅲ级指

- A. 肺部有啰音，但啰音的范围小于1/2肺野
- B. 肺部可闻及散在的哮鸣音
- C. 血压<70/40mmHg
- D. 未闻及肺部啰音和第三心音
- E. 肺部有啰音，且啰音的范围大于1/2肺野(肺水肿)

正确答案：E 您选择的答案：

第15题 急性心肌梗死发生心源性休克的主要机理是

- A. 迷走神经张力过高
- B. 心排血量急剧下降
- C. 周围血管扩张
- D. 血容量不足
- E. 快速性心律失常

正确答案：B 您选择的答案：

第16题 不能用于判断急性心肌梗死后溶栓成功的临床指标为

- A. 心电图示ST段下降
- B. CK-MB峰值前移
- C. 窦性心动过速
- D. 胸痛缓解
- E. 频发的室性早搏

正确答案：C 您选择的答案：

第17题 男，40岁，半年来剧烈活动时诱发胸骨后疼痛，休息数分钟可自行缓解。近3天来发作频繁，且于上楼或步行时均可诱发，夜间也有发作。BP：17.3/10.6kPa(130/80mmHg)，P：60次/分，该患者的最佳治疗方案是

- A. 硝酸甘油静脉点滴+肝素静脉点滴
- B. 尿激酶溶栓治疗
- C. 主动脉内球囊反搏泵
- D. 消心痛+倍他乐克+阿司匹林口服
- E. 消心痛+硝苯地平口服

正确答案：D 您选择的答案：

第18题 硝酸甘油为临床常用抗心绞痛药物，常与β受体阻断剂合用，其重要理由为

- A．二者均可使心率减慢
- B．二者均可使心室容积减小
- C．二者均可使心肌收缩减弱
- D．二者均可使心肌耗氧量下降有协同作用
- E．在心室压力改变方面可相互拮抗

正确答案：D 您选择的答案：

第19题 急性心肌梗死时，以下哪一种血清酶特异性最高

- A．LDH
- B．CPK
- C．α-HBDH
- D．CK-MB
- E．GOT

正确答案：D 您选择的答案：

第20题 下列临床表现中最不支持心绞痛的诊断是

- A．疼痛在休息时发生，持续1～10分钟
- B．含服硝酸甘油，疼痛在3～5分钟内缓解
- C．反复出现的局限性心前区刺痛，每次持续仅2～3秒
- D．疼痛易被运动和情绪激动诱发
- E．疼痛可在睡眠中发生

正确答案：C 您选择的答案：

第21题 冠心病心绞痛与心肌梗死时胸痛的主要鉴别点是

- A．疼痛的持续时间及对含服硝酸甘油的反应不同
- B．疼痛的放射部位不同
- C．疼痛性质不同
- D．疼痛的部位不同
- E．疼痛时是否伴发恶心

正确答案：A 您选择的答案：

第22题 急性心肌梗死溶栓治疗中最常用的溶栓剂是

- A．肝素
- B．尿激酶
- C．阿司匹林
- D．去纤酶
- E．蝮蛇抗栓酶

正确答案：B 您选择的答案：

第23题 不属于冠心病主要危险因素的是

- A．酗酒
- B．高血压
- C．年龄
- D．吸烟
- E．高胆固醇血症

正确答案：A 您选择的答案：

第24题 下列哪种情况为洋地黄的禁忌证

- A．急性心肌炎
- B．风湿性心脏病
- C．缺血性心肌病
- D．扩张型心肌病
- E．肥厚梗阻型心肌病

正确答案：E 您选择的答案：

第25题 男性，72岁，因持续性胸痛6小时入院，查体双肺底有少量湿啰音，诊断为急性心肌梗死。该患者心功能分级为

- A．Killip分级 Ⅰ级
- B．Killip分级 Ⅱ级
- C．NYHA分级 Ⅰ级
- D．NYHA分级 Ⅱ级
- E．NYHA分级 Ⅲ级

正确答案：B 您选择的答案：

第26题 不属于风湿热的主要表现的是

- A．发热
- B．环形红斑
- C．心脏炎
- D．舞蹈病
- E．关节炎

正确答案：C 您选择的答案：

第27题 男，40岁，因心前区剧痛12小时诊为急性前壁心肌梗死住院。心电监护示频发室性早搏和短阵室性心动过速。首选的抗心律失常药物是

- A．溴苄胺
- B．慢心律
- C．乙胺碘呋酮
- D．利多卡因
- E．倍他乐克

正确答案：D 您选择的答案：

第28题 急性心肌梗死发生后，最早升高的血清心肌酶是

- A．天冬氨酸氨基转移酶
- B．肌酸磷酸激酶同工酶
- C．肌酸磷酸激酶
- D．肌钙蛋白I
- E．乳酸脱氢酶

正确答案：B 您选择的答案：

第29题 心肌梗死24小时内并发急性左心衰竭时，最不宜应用

- A．利尿剂
- B．吗啡
- C．洋地黄
- D．硝酸甘油
- E．多巴酚丁胺

正确答案：C 您选择的答案：

第30题 严重冠状动脉狭窄是指冠脉狭窄程度达

- A．90%以上
- B．70%以上
- C．50%以上
- D．80%以上
- E．95%以上

正确答案：B 您选择的答案：

第31题 冠心病心绞痛发作的典型部位是

- A．心前区
- B．胸骨体下段之后
- C．胸骨体中、上段之后
- D．剑突下
- E．心尖部

正确答案：C 您选择的答案：

第32题 合并冠状动脉痉挛性心绞痛的高血压患者宜首选

- A．钙通道阻滞剂
- B．血管紧张素转换酶抑制剂
- C．利尿剂
- D．β受体阻滞剂
- E．α受体阻滞剂

正确答案：A 您选择的答案：

第33题 心绞痛与急性心肌梗死临床表现的主要鉴别点是

- A．疼痛性质
- B．疼痛放射部位
- C．疼痛持续时间
- D．疼痛部位
- E．疼痛程度

正确答案：C 您选择的答案：

第34题 近3个月同等程度劳累所诱发的胸痛资料、程度及持续时间均增加，应诊断为

- A．初发劳力性心绞痛
- B．变异性心绞痛
- C．恶化型劳力性心绞痛
- D．稳定型劳力性心绞痛
- E．自发性心绞痛

正确答案：C 您选择的答案：

第35题 男性，54岁，1年前日常活动后出现胸骨后疼痛，每日2～3次，近2月发作次数增多，每日5～6次，轻微活动也能诱发。发作的心电图ST段呈一过性水平压低，应诊断为

- A．稳定性心绞痛

- B. 变异型心绞痛
- C. 心内膜下心肌梗死
- D. 中间综合征
- E. 不稳定性心绞痛

正确答案：E 您选择的答案：

第36题 男性，60岁，心前区阵发性疼痛1个月，多在夜间发作。与活动无关。每次发作15分钟，发作时心电图、AVF导联ST段抬高。首选治疗的药物是

- A. 钙离子拮抗剂
- B. 硝酸酯类
- C. β 受体阻滞剂
- D. 乙胺碘呋酮
- E. 洋地黄类

正确答案：A 您选择的答案：

第37题 下列各项临床表现中最不支持心绞痛诊断的是

- A. 含服硝酸甘油，疼痛在3~5分钟内缓解
- B. 疼痛常在休息时发生，持续可达30分钟以上
- C. 疼痛在劳累时发生，运动、情绪激动可诱发
- D. 疼痛多在睡眠中发生
- E. 反复出现的局限性心前区刺痛，每次持续仅2~3秒

正确答案：E 您选择的答案：

二、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第38-41题

男，48岁，一年来每于剧烈活动时或饱餐后发作剑突下疼痛，向咽部放射，持续数分钟可自行缓解。2周来发作频繁且有夜间睡眠中发作。2小时来疼痛剧烈，不能缓解，向胸部及后背部放射。伴憋闷，大汗。

1. 该病人首先考虑的诊断是

- A. 主动脉夹层分离
- B. 自发性气胸
- C. 急性胰腺炎
- D. 急性肺动脉栓塞
- E. 急性心肌梗死

2. 此时最有助诊断的辅助检查是

- A. 超声心动图
- B. 胸部X线
- C. 心电图
- D. 心肌酶谱
- E. CT

3. 首选的治疗方法是

- A. 硝酸甘油静脉点滴
- B. 溶栓治疗
- C. 吗啡皮下注射
- D. 肝素静脉点滴
- E. 卡托普利口服

4. [假设信息]该病人在心肌梗塞后4周，心电图ST段仍持续升高，未回到等电位线，应考虑并发症是

- A. 再发心肌梗塞
- B. 梗塞面积扩大
- C. 急性心包炎
- D. 室壁瘤形成
- E. 梗塞后再发心肌缺血

正确答案：EDDD 您选择的答案：

第42-43题

男，74岁，突发剧烈心前区疼痛，胸闷，气憋，心界向左扩大，心尖区 级吹风样收缩期杂音，心率96次/分，心律不齐，双肺底湿性啰音。心电图示：I、aVL、V5、V6导联ST段抬高，I、aVL导联有异常Q波，室性期前收缩。血清CK-MB200U。

1. 诊断为

- A. 急性心包炎、肺部感染
- B. 急性前侧壁心肌梗死
- C. 扩张型心肌病、心力衰竭
- D. 风心病二尖瓣关闭不全
- E. 风心病二尖瓣狭窄

2. 对此病人心律失常的治疗应首选

- A. 普罗帕酮
- B. 维拉帕米
- C. 毛花甙丙
- D. 利多卡因
- E. 苯妥英钠

正确答案：BD 您选择的答案：

第44-48题

女性，65岁，冠心病心绞痛史8年，无高血压史，夜间突发心前区疼痛8小时入院。入院时血压为150/90mmHg(20/

12kPa)，经心电图检查，诊断急性前壁心肌梗死

1. 最可能的心电图表现为

- A. I、II、aVF出现异常Q波，伴ST段弓背向上抬高
- B. V1~V4出现异常Q波伴ST段弓背向上抬高
- C. V1~V4真出现冠状T波
- D. 频发室性早搏
- E. 一度房室传导阻滞

2. 此时最具特征性的实验室改变是

- A. 血清LDH水平增高
- B. 血清GOT (AST)水平增高
- C. 血清GPI (ALT)水平增高
- D. 血清CK - MB水平增高
- E. 血清肌红蛋白下降

3. 上述患者出现频发室性早搏，有时呈短阵室速，最恰当的处理是

- A. 静滴维拉帕米
- B. 口服美西律
- C. 静脉使用利多卡因
- D. 口服普鲁卡因酰胺
- E. 静点硝酸酯类药物

4. 第2日患者出现胸闷、大汗、面色苍白，体检心率126次/分，律齐，血压80/50mmHg，双肺满布中小水泡音。此时患者的心功能分级为

- A. Killip分级 Ⅰ级
- B. Killip分级 Ⅱ级
- C. 纽约心脏病协会(NYHA)分级 Ⅱ级
- D. 纽约心脏病协会(NYHA)分级 Ⅲ级
- E. 全心衰竭

5. 起病4周后，病人反复低热，左肺底部有湿性啰音，心前区闻及心包摩擦音，此时应考虑并发

- A. 肺部感染
- B. 急性心包炎
- C. 感染性心内膜炎
- D. 心肌梗死后综合征
- E. 肺栓塞

正确答案：BDCAD 您选择的答案：

第49-53题

患者，女性。65岁，因阵发性胸闷8年，持续胸痛8小时收入院。入院时血压为150/90mmHg，诊断急性前壁心肌梗死。

1. 支持诊断的心电图改变为

- A. I、II、aVF出现异常Q波，伴ST段弓背向上抬高
- B. V1~V4出现异常Q波伴ST段弓背向上抬高
- C. I、aVL出现肺性P波
- D. 频发室性早搏
- E. 三度房室传导阻滞

2. 此时最具特征性的实验室改变是

- A. 血清LDH上升
- B. 血清GOT上升
- C. 血清GIT上升
- D. 血清CK-MB上升
- E. 血清肌红蛋白下降

3. 上述患者出现频发室性早搏，伴短阵室性心动过速，此时最恰当的处理是

- A. 静推西地兰
- B. 口服美西律
- C. 静脉注射利多卡因
- D. 口服普鲁卡因胺
- E. 口服妥卡尼

4. 住院第2日患者出现胸闷、大汗、面色苍白，体检心率126次/分，律齐，双肺未闻及干湿性啰音，血压90/60mmHg，考虑合并心源性休克。此时不宜使用

- A. 主动脉内气囊反搏术
- B. 静注速尿
- C. 静滴多巴胺
- D. 静滴多巴酚丁胺
- E. 皮下注射低分子肝素

5. 起病4周后，病人反复低热，左肺底有湿性啰音，心前区闻及心包摩擦音，此时应考虑并发

- A. 肺结核
- B. 尿毒症
- C. 感染性心内膜炎
- D. 心肌梗死后综合征
- E. 肺栓塞

正确答案：BDCBD 您选择的答案：

第54-56题

男，68岁，2周来反复胸痛，发作与劳累及情绪有关，休息可以缓解。3小时前出现持续性疼痛，进行性加剧，并气促，不能平卧，血压110/70mmHg，心率120次/分，律齐心尖部可闻及Ⅱ级收缩期杂音，双肺散在哮鸣音及湿啰音。

1. 根据上述临床表现，该病人的诊断最可能是

- A. 冠心病二尖瓣关闭不全
- B. 扩张型心肌病
- C. 支气管哮喘
- D. 支气管肺炎
- E. 急性心肌梗死并发左心衰竭

2. 应首选检查

- A. X线胸片

- B. 心电图
 - C. 超声心动图
 - D. 血清心肌酶
 - E. 心肌核素扫描
3. 下列何种治疗方案应首选
- A. β -受体阻滞剂预防室性心律失常
 - B. 抗生素控制感染
 - C. 洋地黄类药物
 - D. 肾上腺皮质激素减轻支气管痉挛
 - E. 吗啡和利尿剂治疗
- 正确答案：EBE 您选择的答案：

第57-59题

男，68岁，2周来反复脚痛，发作与劳累及情绪有关，休息可以缓解。3小时前出现持续性疼痛，进行性加剧，并气促，不能平卧，血压110/70mmHg，心率120次/分，律齐，心尖部可闻及3/6级收缩期杂音

1. 根据上述临床表现，该病人的诊断最可能是

- A. 风湿病二尖瓣关闭不全
- B. 扩张型心肌病
- C. 支气管哮喘
- D. 支气管肺炎
- E. 急性心肌梗死并发左心衰竭

2. 首选检查为

- A. X线胸片
- B. 心电图
- C. 超声心动图
- D. 血清心肌酶
- E. 心肌核素扫描

3. 首选治疗方案应为

- A. β -受体阻滞剂预防室性心律失常
- B. 抗生素控制感染
- C. 洋地黄类药物
- D. 肾上腺皮质激素减轻支气管痉挛
- E. 吗啡和利尿剂

正确答案：EEE 您选择的答案：

三、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第60-62题

男，51岁，胸骨后剧烈疼痛4小时，伴大汗淋漓，血压10.7/8.0kPa(80/60mmHg)，心率134次/分。面色苍白，四肢冰冷。心电图示急性广泛前壁心肌梗塞。

1. 该患者血压低的原因是

- A. 血容量不足
- B. 合并右室梗塞
- C. 舒张期充盈不足
- D. 心源性休克
- E. 疼痛性休克

2. 对指导治疗最有帮助的辅助检查是

- A. 心电图和血压监测
- B. 心肌酶谱监测
- C. 漂浮导管血流动力学监测
- D. 超声心动图
- E. 胸部X线片

3. 对该患者最理想有效的治疗措施是

- A. 毛花甙丙强心
- B. 多巴胺升压
- C. 尿激酶溶栓
- D. 主动脉内球囊反搏泵
- E. 直接PTCA术

正确答案：DCE 您选择的答案：

第63-65题

- A. 异搏定
- B. 洋地黄
- C. 阿托品
- D. 利多卡因
- E. 胺碘酮

下列疾病时宜选择的治疗药物为

- 1. 急性心肌梗死并发室性心动过速
- 2. 急性前壁心肌梗死并发加速性室性自主律
- 3. 预激综合征合并快速心房颤动

正确答案：DCE 您选择的答案：

第66-67题

- A. 近3个月内劳力诱发的心绞痛的频率和程度加重，对硝酸甘油的需求增加
- B. 心绞痛发作与体力活动无关，可出现短暂ST段抬高
- C. 心绞痛的发作与劳累有关，其性质在1~3个月内无改变

- D. 既往无心绞痛或心肌梗死病史，近1~2个月内劳累时出现心绞痛
- E. 劳累和休息时均可出现的心绞痛
- 1. 稳定型心绞痛
- 2. 恶化型劳力性心绞痛

正确答案：CA 您选择的答案：

第68-71题

下列疾病时宜选择的治疗药物为

- A. 地尔硫卓(硫氮革酮)
- B. 洋地黄
- C. 阿托品
- D. 利多卡因
- E. 胺碘酮
- 1. 急性前壁心肌梗死并发加速性室性自主律
- 2. 预激综合征合并快速心房颤动
- 3. 肥厚型梗阻性心肌病
- 4. 前壁心肌梗死并发短阵室速

正确答案：CADE 您选择的答案：

历年试题3 内科学 第十七章 心脏瓣膜病

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 二尖瓣狭窄患者最常见的早期症状为

- A. 阵发性夜间呼吸困难
- B. 劳力性呼吸困难
- C. 端坐呼吸
- D. 声音嘶哑
- E. 咯血

正确答案：B 您选择的答案：

第2题 重度主动脉瓣返流时心尖部可存在

- A. Austin-Flint杂音
- B. DeMusset征
- C. Durozier征
- D. GrahamSteell杂音
- E. Traube征

正确答案：A 您选择的答案：

第3题 老年男性，因咳嗽，咳黄痰3天就诊，查体发现主动脉瓣区粗糙的收缩期杂音。超声心动图示主动脉瓣狭窄，左室射血分数0.55，心电图检查正常。请问对该患者哪一项处置方法不恰当

- A. 定期做超声心动图
- B. 血管紧张素转换酶抑制剂
- C. 抗菌素
- D. 化痰药物
- E. 胸部X线检查

正确答案：B 您选择的答案：

第4题 患者，女性，心脏联合瓣膜病10年。发热1月，体温为 $37.2 \sim 37.6$ ，厌食，消瘦，贫血貌。确诊手段首选

- A. 测定血沉
- B. 血培养
- C. 测定血红蛋白
- D. 胸部X线
- E. 心肌酶检查

正确答案：B 您选择的答案：

第5题 劳累时有心绞痛及晕厥发作的主动脉瓣狭窄患者首选治疗为

- A. 强心
- B. 利尿
- C. 主动脉瓣球囊成型术
- D. 静点硝酸甘油
- E. 主动脉瓣瓣膜置换术

正确答案：E 您选择的答案：

第6题 单纯性二尖瓣狭窄的病变不伴有

- A. 左心房扩张
- B. 右心室肥厚
- C. 心脏呈梨形
- D. 左心室肥厚
- E. 左心房肥厚

正确答案：D 您选择的答案：

第7题 风湿性心脏病二尖瓣狭窄最具诊断价值的检查是

- A. 抗O检查
- B. 心电图检查
- C. 心脏听诊
- D. 血沉检查
- E. 胸部X线摄片

正确答案：A 您选择的答案：

第8题 患者。男性，27岁，劳累时心悸，胸骨后疼痛1年，查体可闻及主动脉瓣区收缩期粗糙的喷射性杂音，主动脉瓣区第二心音减弱。X线检查示：左室扩大和升主动脉扩张，可能的诊断是

- A. 冠心病心绞痛
- B. 非梗阻性肥厚型心肌病
- C. 高血压性心脏病
- D. 主动脉瓣关闭不全
- E. 主动脉瓣狭窄

正确答案：E 您选择的答案：

第9题 主动脉瓣中度狭窄时瓣口面积为

- A. 2.1~4.0cm²
- B. 1.1~1.75cm²
- C. <0.75cm²
- D. 1.76~2.0cm²
- E. 0.75~1.0cm²

正确答案：E 您选择的答案：

第10题 当风湿性心脏病二尖瓣狭窄程度加重时

- A. 心尖部舒张期滚筒样杂音减低，肺动脉第二音增强
- B. 心尖部舒张期滚筒样杂音增强，肺动脉第二音增强
- C. 心尖部舒张期滚筒样杂音增强，肺动脉第二音减低
- D. 心尖部收缩期吹风样杂音和舒张期滚筒样杂音增强
- E. 心尖部舒张期滚筒样杂音减低，肺动脉第二音减低

正确答案：B 您选择的答案：

第11题 下列哪种脉搏提示主动脉瓣关闭不全

- A. 交替脉
- B. 短绌脉
- C. 水冲脉
- D. 奇脉
- E. 脱落脉

正确答案：C 您选择的答案：

第12题 心尖区收缩中期附加音并有收缩中晚期杂音者最可能的诊断为

- A. 扩张型心肌病
- B. 风心病二尖瓣关闭不全
- C. 冠心病劳力型心绞痛
- D. 乳头肌功能不全
- E. 二尖瓣脱垂

正确答案：E 您选择的答案：

第13题 在发达国家，慢性二尖瓣关闭不全的最常见病因是

- A. 二尖瓣粘液样变性
- B. 感染性心内膜炎
- C. 风湿性心脏病
- D. 结缔组织病
- E. 二尖瓣先天异常

正确答案：A 您选择的答案：

第14题 风心病患者，突发呼吸困难，咳粉红色泡沫痰，血压120 / 80mmHg，心率140次 / 分，心律绝对不齐。首选药物是

- A. 毛花甙丙(西地兰)，
- B. 普罗帕酮(心律平)
- C. 利多卡因
- D. 可拉明
- E. 胺碘酮

正确答案：A 您选择的答案：

第15题 患者，女，20岁，心尖部听到一个舒张中期出现的先递减后递增型的隆隆样杂音，伴有第一心音增强；心律表现为节律不规则，第一心音强弱不一致，心率大于脉率现象。提示该患者的风湿性心脏瓣膜病是

- A. 二尖瓣狭窄并关闭不全
- B. 二尖瓣狭窄并心房颤动
- C. 二尖瓣狭窄
- D. 二尖瓣关闭不全并心房颤动
- E. 二尖瓣关闭不全

正确答案：B 您选择的答案：

第16题 易导致主动脉瓣狭窄患者晕厥的情况为

- A. 剧烈运动
- B. 服用硫氮革酮
- C. 睡眠
- D. 静坐休息
- E. 窦性心律，心率70次 / 分

正确答案：A 您选择的答案：

第17题 风湿病二尖瓣狭窄病人经常出现呼吸困难、咳嗽和咯血等症状，随病程延长，上述症状减轻，但出现腹胀、肝大，提示

- A. 进入右心功能不全期
- B. 发生二尖瓣关闭不全
- C. 合并主动脉瓣关闭不全
- D. 合并主动脉瓣狭窄
- E. 二尖瓣狭窄程度减轻

正确答案：A 您选择的答案：

第18题 重度主动脉瓣狭窄的跨主动脉瓣平均压力阶差至少应大于

- A . 45mmHg
- B . 55mmHg
- C . 50mmHg
- D . 35mmHg
- E . 40mmHg

正确答案：C 您选择的答案：

第19题 38岁女性，活动后心悸、气喘1年余，查体轻度贫血，心率快，律整，胸骨右缘第2肋间闻及响亮而粗糙的收缩期杂音(3 / 6级)，首先应想到的疾病为

- A . 室间隔缺损
- B . 动脉导管未闭
- C . 二尖瓣关闭不全
- D . 主动脉瓣关闭不全
- E . 主动脉瓣狭窄

正确答案：E 您选择的答案：

第20题 风湿性二尖瓣狭窄最典型的体征是

- A . 心尖部收缩期吹风样杂音
- B . 胸骨右缘第二肋间舒张期叹气样杂音
- C . 胸骨左缘第三肋间舒张期叹气样杂音
- D . 胸骨左缘第二肋间舒张期隆隆样杂音
- E . 心尖部舒张期隆隆样杂音

正确答案：E 您选择的答案：

第21题 患者，男性，64岁，头晕、心悸4-5年，心尖搏动向左下移位，呈抬举性搏动，于胸骨左缘第3、4肋间闻及叹气样舒张期杂音，为递减型，向心尖传导，在心尖区闻及隆隆样舒张早期杂音，股动脉可闻及射枪音，首先应想到的诊

- A . 二尖瓣狭窄
- B . 主动脉瓣狭窄
- C . 室间隔缺损
- D . 主动脉瓣关闭不全
- E . 二尖瓣关闭不全

正确答案：D 您选择的答案：

第22题 不是由主动脉瓣病变引起主动脉瓣关闭不全的疾病是

- A . 风湿性心脏病
- B . 主动脉瓣粘液样变性
- C . 先天性二叶主动脉瓣
- D . 感染性心内膜炎
- E . 梅毒性主动脉炎

正确答案：E 您选择的答案：

第23题 风湿性心脏病严重二尖瓣狭窄突发大咯血是由于

- A . 合并肺结核
- B . 合并支气管扩张
- C . 急性肺水肿
- D . 支气管静脉破裂
- E . 肺毛细血管破裂

正确答案：D 您选择的答案：

第24题 单纯二尖瓣狭窄患者可有

- A . 左房扩大，右房缩小
- B . 左房扩大，左室扩大
- C . 左室缩小或正常，左房扩大
- D . 右房扩大，左房缩小
- E . 右室缩小，左房扩大

正确答案：C 您选择的答案：

二、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第25-27题

男性，50岁，近几年来逐渐出现心悸、乏力、活动后气急。体检发现：心脏向左下扩大。心尖部有舒张期滚筒样杂音，主动脉听诊区闻及舒张期泼水样杂音。

1. 可能的诊断是

- A . 二尖瓣关闭不全
- B . 二尖瓣狭窄
- C . 主动脉瓣狭窄
- D . 肥厚型梗阻性心肌病
- E . 主动脉瓣关闭不全

2. 最有价值的诊断方法是

- A. 胸部X线摄片
- B. 心电图
- C. 超声心动图
- D. 心脏核素检查
- E. 冠状动脉造影

3. 应选用的药物是

- A. 地高辛
- B. 硝酸甘油
- C. 心得安(普萘洛尔)
- D. 卡托普利
- E. 双氢克尿噻

正确答案：ECD 您选择的答案：

历年试题3 内科学 第十三章 心律失常

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 洋地黄中毒所致的室性心动过速忌用

- A. 氯化钾
- B. 苯妥英钠
- C. 普罗帕酮
- D. 利多卡因
- E. 直流电复律

正确答案：E 您选择的答案：

第2题 属于IC类的抗心律失常药物是

- A. 普罗帕酮
- B. 利多卡因
- C. 维拉帕米
- D. 奎尼丁
- E. 胺碘酮

正确答案：A 您选择的答案：

第3题 心房颤动最常见于

- A. 甲亢性心脏病
- B. 高血压病
- C. 冠心病
- D. 风心病二尖瓣狭窄
- E. 缩窄性心包炎

正确答案：D 您选择的答案：

第4题 阵发性室上性心动过速的发生机制主要是

- A. 折返机制
- B. 洋地黄中毒
- C. 高血压病
- D. 心肌缺血
- E. 感染性心内膜炎

正确答案：A 您选择的答案：

第5题 室性心动过速伴严重血液动力学障碍时，终止发作的首选方法是

- A. 同步电复律
- B. 人工起搏超速抑制
- C. 压迫颈动脉窦
- D. 利多卡因
- E. 胺碘酮

正确答案：A 您选择的答案：

第6题 陈旧性心肌梗死患者，心电图示频发室性期前收缩，首选药物是

- A. 奎尼丁
- B. β受体阻滞剂
- C. 钙拮抗剂
- D. 普罗帕酮(心律平)
- E. 慢心律

正确答案：B 您选择的答案：

第7题 慢性心房纤颤是指心房纤颤病史

- A. 大于24小时
- B. 大于1个月
- C. 大于3个月
- D. 大于48小时
- E. 大于3天

正确答案：C 您选择的答案：

第8题 对药物治疗无效的反复发作室性心动过速/心室颤动的心力衰竭患者，最适宜的治疗为

- A. 静脉维拉帕米
- B. 服用阿托晶
- C. 植入型心脏转复除颤器
- D. 安置房室顺序起搏器
- E. 服用奎尼丁

正确答案：C 您选择的答案：

第9题 阵发性室上性心动过速不伴有心力衰竭者首选

- A. 静注维拉帕米

- B. 静滴利多卡因
- C. 静滴10%氯化钾
- D. 口服美西律
- E. 口服苯妥英钠

正确答案：A 您选择的答案：

第10题 室性心动过速心电图诊断的最主要依据是

- A. 房室分离，房率>室率
- B. 心室率100~200次/分
- C. 心室夺获和室性融合波
- D. 心室律稍微不规则
- E. QRS波群形态宽大畸形

正确答案：C 您选择的答案：

第11题 为根治由旁路引发的折返性室上性心动过速，应首选

- A. 射频消融治疗
- B. 自动心脏复律除颤器
- C. 外科手术
- D. 长期服用有效药物
- E. 抗心动过速起搏器

正确答案：A 您选择的答案：

第12题 强心甙治疗心房纤颤的机制主要是

- A. 直接抑制心房纤颤
- B. 缩短心房有效不应期
- C. 减慢房室传导
- D. 抑制窦房结
- E. 延长心房不应期

正确答案：C 您选择的答案：

第13题 适宜使用洋地黄类药物的情况是

- A. 病态窦房结综合征
- B. 快速心房颤动
- C. 二度型房室传导阻滞
- D. 三度房室传导阻滞
- E. 预激综合征伴心房颤动

正确答案：B 您选择的答案：

第14题 阵发性房颤的治疗原则是

- A. 预防复发，发作时控制室率
- B. 抗凝治疗，发作时控制室率
- C. 转复窦律，发作时控制室率
- D. 抗凝治疗，发作时转复窦律
- E. 预防复发，发作时转复窦律。

正确答案：A 您选择的答案：

第15题 男，45岁，有高血压史。因阵发性心悸2天来诊，体检：血压120/70mmHg，心率180次/分，律齐，心音正常，无杂音。1分钟后心率降至80次/分，律齐。30秒后又回复至180次/分。最可能的诊断为

- A. 阵发性心房扑动
- B. 阵发性室上性心动过速
- C. 窦性心动过速
- D. 阵发性心房颤动
- E. 第三度房室传导阻滞

正确答案：B 您选择的答案：

第16题 心房颤动患者服用华法林，凝血酶原时间的国际标准化率(INR)应控制在

- A. 3.6~4.0
- B. 2.0~3.0
- C. 1.0~1.9
- D. >4.0
- E. 3.1~3.5

正确答案：B 您选择的答案：

二、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第17-18题

女性，32岁，有心脏病4年，最近感到心悸，听诊发现心率100次/分，律不齐，第一心音强弱不等，心尖部有舒张期隆隆样杂音。

1. 听诊的发现最可能是

- A. 房性早搏

- B. 室性早搏
- C. 房性心律失常
- D. 心房颤动
- E. 窦性心动过速
- 2. 为进一步检查心律失常性质应首选
- A. 心电图检查
- B. 超声心动图
- C. X线胸片
- D. 嘱病人左侧卧位听诊
- E. 嘱病人屏气后听诊

正确答案：DA 您选择的答案：

第19-21题

男，56岁，心房颤动患者，突然发一过性黑朦。二周来共发生过5次，每次持续2~15s。查体无神经系统异常。脑CT无异常。

- 1. 可能的诊断是
- A. 脑动脉瘤
- B. 脑血栓形成
- C. 脑出血
- D. 脑血管畸形
- E. 短暂性脑缺血发作
- 2. 主要累及的血管是
- A. 基底动脉系
- B. 椎动脉系
- C. 颈内动脉系
- D. 大脑后动脉
- E. 大脑前动脉
- 3. 最适宜的预防治疗是
- A. 阿司匹林
- B. 低分子右旋糖酐
- C. 丙戊酸钠
- D. 胞二磷胆碱
- E. 降纤酶

正确答案：ECA 您选择的答案：

三、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第22-24题

- A. 异搏定
- B. 洋地黄
- C. 阿托品
- D. 利多卡因
- E. 胺碘酮
- 下列疾病时宜选择的治疗药物为
- 1. 急性心肌梗死并发室性心动过速
- 2. 急性前壁心肌梗死并发加速性室性自主律
- 3. 预激综合征合并快速心房颤动

正确答案：DCE 您选择的答案：

第25-28题

下列疾病时宜选择的治疗药物为

- A. 地尔硫革(硫氮卓酮)
- B. 洋地黄
- C. 阿托品
- D. 利多卡因
- E. 胺碘酮
- 1. 急性前壁心肌梗死并发加速性室性自主律
- 2. 预激综合征合并快速心房颤动
- 3. 肥厚型梗阻性心肌病
- 4. 前壁心肌梗死并发短阵室速

正确答案：CEAD 您选择的答案：

第29-30题

- A. 心房扑动
- B. 心房颤动
- C. 窦性心动过速
- D. 阵发性室上性心动过速
- E. 持续性室性心动过速
- 1. 突然发作突然终止，按摩颈动脉窦可终止发作，最可能的是
- 2. 最易引起血流动力学异常的是

正确答案：DE 您选择的答案：

第31-34题

- A. 临时心脏起搏器植入
- B. 肾上腺素

C. 直流电复律

D. 毛花甙丙(西地兰)

E. 阿托品下列各例治疗应首选

1. 男, 45岁, 风湿性心脏瓣膜病史20年, 心房颤动5年。就诊时, 心率160次/分, 心房颤动, 血压100/70mmHg
2. 男, 65岁, 急性下壁心肌梗死第2天, 心电监测示二度I型房室传导阻滞, 心室率50次/分, 血压110/70mmHg
3. 男, 50岁, 不明原因晕厥, 心电图示宽QRS波型心动过速, 心室率150次/分, 血压60/45mmHg
4. 女, 30岁, 发热3天, 晕厥1次, 心电图显示第三度房室传导阻滞, 心室率40次/分

正确答案: DACA 您选择的答案:

历年试题3 内科学 第十四章 心脏骤停和心脏性猝死

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 引起心脏性猝死最主要病因是

- A. 冠心病
- B. 二尖瓣脱垂
- C. 主动脉瓣严重狭窄
- D. 预激综合征
- E. 心肌疾病

正确答案：A 您选择的答案：

第2题 男，47岁，突然神志丧失，呼吸不规则，即刻进行心脏按压，判断其是否有效的主要方法是

- A. 呼喊病人看其是否清醒
- B. 摸股动脉搏动
- C. 摸桡动脉搏动
- D. 观察末梢循环状况
- E. 测血压

正确答案：B 您选择的答案：

第3题 女，36岁，患风心病10年，近来心悸、胸闷痛、气短、下肢浮肿、尿少。数分钟前突然till，意识丧失，皮肤苍白，唇绀，大动脉搏动扪不到，呼吸停止，其原因是

- A. 心脏性猝死
- B. 急性右心衰竭
- C. 急性左心衰竭
- D. 癫痫大发作
- E. 脑栓塞

正确答案：A 您选择的答案：

第4题 复苏后治疗，保证一切复苏措施奏效最重要的是

- A. 防治肾功能衰竭
- B. 确保循环功能的稳定
- C. 脑复苏
- D. 防治感染
- E. 维持良好的呼吸功能

正确答案：C 您选择的答案：

第5题 男性，40岁，因创伤致心跳呼吸停止，经复苏后恢复，继而出现体温升高、抽搐、惊厥，病人可能并发

- A. 心力衰竭
- B. 肾衰竭
- C. 脑水肿
- D. 肺水肿
- E. 脑死亡

正确答案：C 您选择的答案：

第6题 心脏骤停的病理生理机制最常见的是

- A. 室性心动过速
- B. 心室停顿
- C. 电机械分离
- D. 心室颤动
- E. 第三度房室传导阻滞

正确答案：D 您选择的答案：

第7题 心脏骤停一旦确诊，应立即

- A. 气管内插管
- B. 口对口呼吸
- C. 心脏按压
- D. 尝试捶击复律及清理呼吸道
- E. 人工呼吸

正确答案：D 您选择的答案：

第8题 心脏性猝死最主要的病因是

- A. 心肌病
- B. 二尖瓣脱垂
- C. 冠心病及其并发症
- D. 急性心肌炎
- E. 主动脉瓣狭窄

正确答案：C 您选择的答案：

第9题 抢救由心室颤动引起的心脏骤停时，最有效的方法是

- A . 非同步电击复律
- B . 静脉注射利多卡因
- C . 口对口人工呼吸
- D . 植入心脏起搏器
- E . 皮下注射肾上腺素

正确答案：A 您选择的答案：

历年试题3 内科学 第十五章 高血压

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 下列降压药物中便秘发生串最高的药物是

- A. 卡托普利
- B. 普萘洛尔
- C. 氯沙坦
- D. 硝苯地平
- E. 维拉帕米

正确答案：E 您选择的答案：

第2题 对脑血管具有较强扩张作用的钙拮抗药是

- A. 维拉帕米
- B. 加洛帕米
- C. 地尔硫革
- D. 硝苯地平
- E. 尼莫地平

正确答案：E 您选择的答案：

第3题 关于原发性高血压的治疗，下列哪项是错误的

- A. 老年人高血压，可将血压降至18.6 / 12.0kPa(140 / 90mmHg)以下
- B. 对于血压控制不理想者，可采用2种类别降压药物联合应用
- C. 根据高血压病人的血压情况，调整降压药物的剂量
- D. 老年人纯收缩期高血压，将血压控制在20.0kPa(160mmHg)左右
- E. 年轻人高血压，将血压控制在17.3 / 1.7kP(130 / 80mmHg)以内

正确答案：D 您选择的答案：

第4题 高血压病脑出血最常见的部位是

- A. 大脑髓质
- B. 蛛网膜下腔
- C. 内囊和基底节
- D. 侧脑室
- E. 豆状核和丘脑

正确答案：C 您选择的答案：

第5题 某钙拮抗剂可抑制房室结传导，大剂量可致窦房结、房室结电活动消失，还可舒张冠状血管及外周血管，并可降低血压，在下列最可能的药物是

- A. 地尔硫革
- B. 硝苯地平
- C. 维拉帕米
- D. 氟桂嗪
- E. 尼卡地平

正确答案：A 您选择的答案：

第6题 男，67岁，患高血压18年，2年前患急性前壁心肌梗死，门诊测血压22.7 / 13.3kPa(170 / 100mmHg)，心率96次 / 分，该患者的最佳药物选择是

- A. 美托洛尔
- B. 维拉帕米
- C. 哌唑嗪
- D. 卡托普利
- E. 呋达帕胺

正确答案：A 您选择的答案：

第7题 对于高血压病人的降压治疗，下述哪项是不对的

- A. 绝大多数病人需要长期用药
- B. 血压降至正常时，即可停药
- C. 除危重病例外，降压药物从小剂量开始
- D. 根据个体化原则选用降压药物
- E. 首选第一线降压药物

正确答案：B 您选择的答案：

第8题 慢性肾炎引起高血压肾功能不全与高血压病引起肾功能不全的最重要的鉴别资料是

- A. 血压增高程度
- B. 肾功能损害程度
- C. 眼底改变
- D. 高血压与肾炎的发病史
- E. 心功能改变

正确答案：D 您选择的答案：

第9题 男性，61岁，患有高血压，同时伴有2型糖尿病，尿蛋白(+)。选择最佳降压药物为

- A. β 受体阻滞剂
- B. ACEI
- C. 钙拮抗剂
- D. α 受体阻滞剂
- E. 利尿剂

正确答案：B 您选择的答案：

第10题 男，28岁，查血压160 / 95mmHg(21.3 / 12.6kPa)，Hb85g / L，蛋白+，颗粒管型2~3个 / HP，BUN10mmol / L，Cr220 μ mol / L，对该患者不宜采取

- A. 低钠饮食
- B. 高蛋白饮食
- C. 低磷饮食
- D. 低蛋白饮食
- E. 根据尿量多少适当限水

正确答案：B 您选择的答案：

第11题 男，26岁，上肢血压180~200 / 100~110mmHg，下肢血压140 / 80mmHg，体检：肩胛间区可闻及血管杂音，伴震颤，尿17-酮，17-羟类固醇正常，尿苦杏仁酸正常。其高血压原因应考虑为继发于

- A. 嗜铬细胞瘤
- B. 皮质醇增多症
- C. 原发性醛固酮增多症
- D. 单侧肾动脉狭窄
- E. 主动脉缩窄

正确答案：E 您选择的答案：

第12题 高血压防治中健康教育的对象是

- A. 高血压病高危人群
- B. 全人群
- C. 学龄期儿童
- D. 中老年人
- E. 高血压病人

正确答案：B 您选择的答案：

第13题 恶性高血压与急进型高血压的区别要点是

- A. 有无心功能不全
- B. 有无肾功能不全
- C. 眼底有无视乳头水肿
- D. 有无脑功能障碍
- E. 舒张压的高低程度

正确答案：B 您选择的答案：

第14题 高血压伴心绞痛及哮喘患者，出现肾功能不全时，下列最适合治疗药是

- A. 哌唑嗪
- B. 普萘洛尔
- C. 氢氯噻嗪
- D. 硝苯地平
- E. 卡托普利

正确答案：D 您选择的答案：

第15题 高血压伴有低血钾应首先考虑

- A. 嗜铬细胞瘤
- B. 继发于慢性肾炎的高血压
- C. 肾动脉狭窄
- D. 主动脉缩窄
- E. 原发性醛固酮增多症

正确答案：E 您选择的答案：

第16题 合并双侧肾动脉狭窄的高血压患者降压不宜首选

- A. 利尿剂
- B. β 受体阻滞剂
- C. 钙通道阻滞剂
- D. 血管紧张素转换酶抑制剂
- E. α 受体阻滞剂

正确答案：D 您选择的答案：

第17题 高血压病脑出血破裂的血管多为

- A. 大脑中动脉
- B. 豆纹动脉
- C. 内囊动脉
- D. 大脑基底动脉
- E. 大脑前动脉

正确答案：B 您选择的答案：

第18题 高血压病最严重的病变是

- A. 脑出血
- B. 左心室肥大
- C. 颗粒性固缩肾
- D. 视网膜出血
- E. 脑软化

正确答案：A 您选择的答案：

第19题 某一高血压伴充血性心力衰竭患者，同时患有肾上腺嗜铬细胞瘤和外周血管痉挛性疾病，应选用治疗的药物是

- A. 强心苷
- B. 哌唑嗪
- C. 酚妥拉明
- D. 血管紧张素转换酶抑制剂(ACEI)
- E. 糖皮质激素

正确答案：B 您选择的答案：

二、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第20-21题

男性，30岁，头昏，乏力2年，血压21.3/13.3kPa(160/100mmHg)，血红蛋白80g/L，尿比重1.014，尿蛋白(+)，颗粒管型0~2/HP，BUN16.4mmol/L(46mg/dl)，血肌酐309.4μmol/L，L(3.5mg/dl)，眼底视网膜动脉细窄迂曲。

1. 可能性最大的诊断是
 - A. 高血压病 期
 - B. 肾性高血压
 - C. 慢性肾小球肾炎尿毒症晚期
 - D. 慢性肾小球肾炎氮质血症期
 - E. 慢性肾盂肾炎
2. 最佳治疗方案是
 - A. 血液透析
 - B. 腹膜透析
 - C. 应用降血压药物
 - D. 应用促红细胞生成素
 - E. 饮食和对症治疗等非透析综合治疗

正确答案：DE 您选择的答案：

三、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第22-23题

- A. 肾动脉狭窄
 - B. 主动脉缩窄
 - C. 嗜铬细胞瘤
 - D. 原发性醛固酮增多症
 - E. 库欣综合征
1. 血压增高，向心性肥胖，满月脸，皮肤紫纹，最可能的诊断是压升高。
 2. 上肢血压增高，且明显高于下肢血压，胸骨旁可闻及杂音，最可能的诊断是

正确答案：EB 您选择的答案：

第24-25题

- A. 二氢吡啶类钙通道阻滞剂
 - B. β受体阻滞剂
 - C. α受体阻滞剂
 - D. 血管紧张素转换酶抑制剂
 - E. 中枢交感神经抑制剂
1. 无合并症的老年收缩期高血压患者降压宜首选
 2. 合并糖尿病、尿蛋白阳性的高血压患者降压宜首选

正确答案：AD 您选择的答案：

第26-29题

- A. 患者血压明显升高，体检：血压200/130mmHg(26.6/16.9kPa)，眼底出血渗出、视乳头水肿。实验室报告：肾功能不全
 - B. 患者血压明显升高，伴有剧烈头痛、呕吐、抽搐
 - C. 患者平日有心悸、胸痛、劳力时气促、起立或运动时眩晕。体检：胸骨左缘第3-4肋间可闻较粗糙的喷射性收缩期杂音，屏气时杂音增强
 - D. 患者一周前出现发热，全身无力，现自觉心悸。胸闷，体检：心率120次/分，偶闻室性早搏，实验室回报CPK、COT、LDH增高
 - E. 患者气急，端坐呼吸。体检：心脏扩大，听诊可闻及第四心音奔马律，双下肢浮肿，超声心动图报告：左心室腔明显扩大
1. 扩张型心肌病

- 2. 有左室流出道梗阻的肥厚型心肌病
- 3. 病毒性心肌炎
- 4. 恶性高血压

正确答案：ECDA 您选择的答案：

历年试题3 内科学 第十一章 胸腔积液

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 对胸腔积液患者，胸穿抽出有臭味混浊液体，此时应该对胸液作何检查以明了病因

- A. 找寄生虫卵
- B. 厌氧菌培养
- C. 需氧菌和真菌培养
- D. 涂片革兰染色和抗酸染色检菌
- E. 查瘤细胞

正确答案：B 您选择的答案：

第2题 血胸活动性出血的征象不包括

- A. 穿刺液涂片红细胞与白细胞之比为100m：1
- B. 闭式gl流量连续3小时，每小时超过200ml
- C. 胸片阴影逐渐增大
- D. 脉快、血压下降，补液后血压不升或回升后又下降
- E. 血红蛋白、血球压积持续降低

正确答案：A 您选择的答案：

第3题 男性，52岁患者，阻咳嗽、胸闷、气短1周收入院。查体：T37.5℃，R24次/分，口唇发绀，左锁骨上可触及一花生米大之淋巴结，质硬、固定、无压痛，气管向左侧移位，右肺叩诊呈浊音、语颤明显减弱、呼吸音消失。胸液常规示蛋白含量35g/L。WBC850×10⁶/L，N20%，L80%，细胞学见大量淋巴细胞。LDH800U/L，PPD(+)。最可能的诊断是

- A. 右侧大叶性肺炎
- B. 右侧结核性胸膜炎
- C. 右侧恶性胸腔积液
- D. 右侧化脓性胸腔积液
- E. 右侧漏出性胸腔积液

正确答案：C 您选择的答案：

第4题 女性。58岁患者。因发热、咳嗽、胸闷、气短1周收入住院。查体：T37.5℃，R24次/分，口唇发绀。双下肺叩诊呈浊音、语颤明显减弱、呼吸音消失。腹部隆起，叩诊移动性浊音(+)。双侧胸液、腹液呈乳糜样，苏丹染色阴性，胸液、腹液常规均示渗出液，淋巴细胞为主，LDH1200U/L，CEA明显增高。PPD(+)。最可能的诊断是

- A. 化脓性胸膜炎
- B. 结核性胸膜炎
- C. 恶性胸腔积液
- D. 乳糜样胸腔积液
- E. 结缔组织疾病

正确答案：C 您选择的答案：

第5题 根据症状和体征提示有胸腔积液时，需确定是否有胸腔积液应首选的检查是

- A. 超声波
- B. 胸部MRI
- C. 胸片
- D. 胸部CT
- E. 血常规

正确答案：C 您选择的答案：

二、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第6-7题

- A. 每次抽液量<1000ml
- B. 加大抗结核药物剂量
- C. 每次抽液量以抽尽为止
- D. 合理化疗同时合并用泼尼松
- E. 抗结核治疗的同时加用抗菌药
- 1. 结核性大量胸腔积液患者伴有毒血症症状重时应
- 2. 结核性大量胸腔积液患者抽液的原则是

正确答案：DC 您选择的答案：

第8-12题

各种不同性质的胸腔积液化验特点是

- A. 乳样，乙醚试验苏丹 染成红色
- B. 草黄微浊。细胞数>500×10⁶/L、蛋白30g/L、LDH300IU/L
- C. LDH>500IU/L、LZM(溶菌酶)与ADA(腺苷脱氨酶)正常
- D. 胸液蛋白/血清蛋白<0.5、LDH<200IU/L、胸液LDH/血LDH<0.6
- E. RBC>5×10⁹/L、细胞数<400×10⁶/L
- 1. 漏出性胸液
- 2. 乳糜性胸液
- 3. 血性胸液
- 4. 渗出性胸液

5. 恶性胸液

正确答案：DAEBC 您选择的答案：

第13-16题

A. 漏出液

B. 渗出液

C. 脓性胸液

D. 血性胸液

E. 乳糜性胸液

1. 充血性心力衰竭所产生的胸腔积液为

2. 系统性红斑狼疮所产生的胸腔积液为

3. 金黄色葡萄球菌肺炎并发的胸腔积液最常为

4. 胸导管阻塞或破裂所致的胸腔积液为

正确答案：ABCE 您选择的答案：

历年试题3 内科学 第十章 肺结核

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 抑制结核菌DNA与细胞壁合成的抗结核药物是

- A. 链霉素
- B. 吡嗪酰胺
- C. 乙胺丁醇
- D. 异烟肼
- E. 利福平

正确答案：D 您选择的答案：

第2题 胸片可见环形透亮区：肺门上提、肺纹呈垂柳状改变的多为

- A. I型肺结核
- B. IV型肺结核
- C. V型肺结核
- D. 型肺结核
- E. 型肺结核

正确答案：B 您选择的答案：

第3题 确定肺结核是否为传染源的最主要依据是

- A. 结核菌素试验
- B. 血沉检查
- C. X线检查
- D. 血结核抗体检查
- E. 痰结核菌检查

正确答案：E 您选择的答案：

第4题 肺结核病人在接受抗结核治疗时，对疗效的

- A. 血清结核抗体阴性
- B. 症状消失
- C. 痰菌阴转
- D. X线空洞闭合，炎性阴影消失
- E. 血沉正常

正确答案：C 您选择的答案：

第5题 预防肺结核流行的根本措施是

- A. 合理化疗治愈排菌病人
- B. 对病人咳出的痰消毒焚烧
- C. 异烟肼化学预防
- D. 严格管理、隔离病人
- E. 卡介苗接种

正确答案：A 您选择的答案：

第6题 男，30岁，乏力、咳嗽1月余，伴低热、盗汗，痰中带血1周。胸片示：右肺上叶尖段炎症，伴有空洞形成。最可能的诊断是

- A. 金黄色葡萄球菌肺炎
- B. 肺囊肿继发感染
- C. 浸润型肺结核
- D. 癌性空洞伴感染
- E. 慢性肺脓肿

正确答案：C 您选择的答案：

第7题 结核病的细胞免疫反应中起主要作用的细胞为

- A. NK细胞
- B. T细胞
- C. 嗜中性粒细胞
- D. 巨噬细胞
- E. B细胞

正确答案：B 您选择的答案：

第8题 早期发现肺结核的最主要方法是

- A. 结核变态反应
- B. 血沉检查
- C. X线检查
- D. 询问病史
- E. 痰菌检查

正确答案：C 您选择的答案：

第9题 男，46岁，吸烟史20年，发热2周(37.5-38)，右胸痛，近4天胸痛减轻，感胸闷、气促。查体：右下胸语音震颤减弱，叩浊，呼吸音降低。诊断最可能是

- A. 结核性胸膜炎
- B. 肺炎链球菌肺炎
- C. 浸润型肺结核
- D. 支原体肺炎
- E. 支气管肺癌

正确答案：A 您选择的答案：

第10题 以下除了哪一项外，均提示有肺结核病情活

- A. 病灶密度高，边界清楚
- B. X线胸片病灶扩大
- C. 病灶边缘模糊
- D. 痰涂片找到抗酸杆菌
- E. 空洞形成

正确答案：A 您选择的答案：

第11题 女，62岁，发现肺结核20年，未曾正规治疗，X线胸片示：右上肺4cm大小的球型病灶，其内有15~2cm的空洞。右肺内见纤维索条状阴影，纵隔右移，右侧胸膜肥厚，左下肺可见散在钙化灶，该病人的诊断是

- A. 浸润型肺结核
- B. 慢性纤维空洞型肺结核
- C. 结核性胸膜炎
- D. 结核球
- E. 慢性血行播散型肺结核

正确答案：B 您选择的答案：

第12题 结核病最重要的社会传染源是

- A. 急性粟粒型肺结核
- B. 原发性肺结核
- C. 浸润型肺结核
- D. 慢性纤维空洞型肺结核
- E. 慢性血行播散型肺结核

正确答案：D 您选择的答案：

第13题 因肺结核引起的支气管扩张，湿啰音最常见的部位是

- A. 双肺弥漫
- B. 腋窝部
- C. 肺底部
- D. 肩胛间区
- E. 肺尖部

正确答案：E 您选择的答案：

第14题 男性，25岁学生，近2周来因“备考”较劳累后感觉乏力、今日突发寒战、发热，咯血数口而就诊。查体：T39℃，右上肺可闻及少许湿啰音。WBC $10.8 \times 10^9/L$ ，0.85，胸片见右上肺大片状浓淡不均、密度增高阴影。最可能的

- A. 右上肺肺炎球菌肺炎
- B. 右上肺过敏性肺炎
- C. 右上肺干酪性肺炎
- D. 右上肺癌
- E. 右上肺支原体肺炎

正确答案：C 您选择的答案：

第15题 男，34岁，因反复干咳、咯血2月、发热1周来院门诊。查体：T39.2℃，消瘦，左上肺语颤增强、叩诊呈实音、呼吸音减弱。WBC $7.8 \times 10^9/L$ ，PPD(1结素单位)强阳性，X线胸片示左上肺大片云雾状、密度较低、边缘模糊之阴影。最可能的诊断是

- A. 支气管扩张症
- B. 克雷白杆菌肺炎
- C. 支原体肺炎
- D. 肺炎球菌肺炎
- E. 干酪性肺炎

正确答案：E 您选择的答案：

第16题 女性，21岁患者。因发热、干咳、乏力20天，咯血2天人院。查体：T38.5℃，消瘦，右上肺触觉语颤增强、叩诊浊音、可闻及支气管呼吸音。PPD(1单位)硬结20mm，表面有水泡。X线胸片于右上2-4前肋处见密度高，浓淡不均阴影

- A. 右上包裹性积液
- B. 右上肺结核
- C. 右上支气管扩张症
- D. 右上肺癌
- E. 右上大叶性肺炎

正确答案：B 您选择的答案：

第17题 男。加岁。低热、盗汗、咳嗽、血痰一月。胸片示右上肺小片状浸润影，密度不均。确诊应选择的检查是

- A. 血清中结核抗体
- B. 血沉
- C. 痰检抗酸杆菌
- D. PPD试验

E. 痰TB-DNA

正确答案：C 您选择的答案：

第18题 卡介苗接种后所致结核菌素阳性反应是指硬结直径

- A. <5mm
- B. 15~20mm
- C. >20mm
- D. 5~9mm, 3~5天后反应消失
- E. 10~15mm, 1周后留有色素

正确答案：D 您选择的答案：

第19题 关于结核性胸膜炎特点的描述错误的是

- A. 多见于中青年
- B. X线胸片除胸液影外, 还应有肺内结核灶
- C. 可有结核中毒症状
- D. 起病多缓慢
- E. X线胸片可呈肋膈角消失或外高内低影

正确答案：B 您选择的答案：

第20题 结核结节中最具有诊断意义的细胞成分是

- A. 郎罕巨细胞和上皮样细胞
- B. 上皮样细胞和异物巨细胞
- C. 异物巨细胞和纤维母细胞
- D. 淋巴细胞和上皮样细胞
- E. 郎罕巨细胞和淋巴细胞

正确答案：A 您选择的答案：

第21题 对结核性腹膜炎最有诊断价值的检查是

- A. PPD试验
- B. 血沉
- C. 腹水常规
- D. 腹腔镜检查+腹膜活检
- E. 结肠镜检查

正确答案：D 您选择的答案：

二、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第22-24题

男，35岁，低热月余咳痰带血三天，两年前患过胸膜炎，X线胸片左肺尖密度不均阴影；ESR30mm/h。WBC $80 \times 10^9/L$

1. 为明确诊断，下列哪项检查最重要

- A. PPD试验
- B. 痰检抗酸杆菌
- C. 痰检瘤细胞
- D. 痰细菌培养
- E. 肺CT

2. 需了解下列哪项病史、有助于制定正确治疗方案

- A. 胸膜炎治疗用药情况
- B. 此次病后诊断经过
- C. 此前健康体检情况
- D. 青霉素过敏史
- E. 家庭有无类似病人

3. 如前述各项有关检查，均无异常，采取哪项治疗为宜

- A. 肌注青、链霉素与维生素K
- B. 静滴红霉素
- C. 静滴头孢氨噻肟钠
- D. SM+INH+PAS
- E. INH+RFP+EMB

正确答案：BAE 您选择的答案：

第25-27题

1. 不符合肺结核活动期特点的是

- A. 痰涂片找到抗酸杆菌
- B. X线胸片病灶扩大
- C. 病灶边缘模糊
- D. 空洞形成
- E. 病灶密度高，边界清楚

2. 属抑菌作用的抗结核药物是

- A. 异烟肼(INH)
- B. 利福(RFP)
- C. 链霉素(SM)
- D. 乙胺丁醇(EMB)
- E. 吡嗪酰胺(PZA)

3. 女，35岁。肺结核患者，肺内有空洞性病变。最符合的X线表现是

- A. 上叶尖后段空洞，壁光滑，周围卫星灶
- B. 下叶空洞周围大片炎性浸润
- C. 空洞内壁不规则，凹凸不平
- D. 厚壁空洞、偏心
- E. 厚壁空洞伴有液平面

正确答案：EDA 您选择的答案：

历年试题3 内科学 第四十八章 传染病概论

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 构成传染病流行过程的三个基本条件是

- A. 病原体，环境，宿主
- B. 病原体数量，致病力，定位
- C. 病原体，人体，他们所处的环境
- D. 传染源，传播途径，易感人群
- E. 微生物，宿主，媒介

正确答案：D 您选择的答案：

第2题 李某，女性，患慢性乙型肝炎10年，血化验：HBsAg(+)、HBeAg(+)、抗-HBcIgG(+)。其12岁女儿体检时血清抗-HBs(+)，追问病史，无任何临床症状，未注射乙肝疫苗。李某女儿属于

- A. 潜伏性感染
- B. 病毒携带状态
- C. 垂直感染
- D. 隐性感染
- E. 显性感染

正确答案：D 您选择的答案：

第3题 下列五种感染过程中最常见的是

- A. 潜伏性感染
- B. 显性感染
- C. 病原体被清除
- D. 病原携带状态
- E. 隐性感染

正确答案：E 您选择的答案：

第4题 病原体侵入人体后，临床上不显示出任何症状、体征，但可产生特异性免疫，被称为

- A. 病原携带状态
- B. 潜伏性感染
- C. 显性感染
- D. 隐性感染
- E. 病原体被清除

正确答案：D 您选择的答案：

第5题 外源性致热原的特点，正确的是

- A. 其致热原性可被蛋白酶类所破坏
- B. 在体内最终由肝、肾灭活和排泄
- C. 能激活血液中的中性粒细胞和单核细胞
- D. 直接作用于体温调节中枢
- E. 分子量较小

正确答案：C 您选择的答案：

第6题 在感染过程的五种表现中，所占比例最低，但最易识别的是

- A. 潜伏性感染
- B. 病原体被清除
- C. 病原携带状态
- D. 隐性感染
- E. 显性感染

正确答案：E 您选择的答案：

第7题 某人在参加一次聚餐3天后，突然出现发热、腹痛和腹泻，腹泻开始为水样便，1天后转变为粘液脓血便，并有里急后重感。根据以上症状应考虑的疾病和检查方法是

- A. 沙门菌食物中毒；取剩余食物分离致病菌
- B. 伤寒；取脓血便进行免疫荧光检测
- C. 细菌性痢疾；取脓血便分离肠道致病菌
- D. 霍乱；取脓血便直接镜检
- E. 葡萄球菌食物中毒；取剩余食物分离致病菌

正确答案：A 您选择的答案：

二、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第8-10题

- A. 人虱
- B. 鼠蚤
- C. 恙螨
- D. 蜱

E. 蚊

1. 流行性乙型脑炎的传播媒介是
2. 地方性斑疹伤寒的传播媒介是
3. 流行性斑疹伤寒的传播媒介是

正确答案：EBA 您选择的答案：

第11-12题

A. EBV

B. HILV

C. HBV

D. VZV

E. HPV

1. 与白血病有关的病毒是
2. 可引起潜伏感染的病毒是

正确答案：BD 您选择的答案：

第13-14题

A. 玫瑰疹

B. 皮肤瘀点、瘀斑

C. 淋巴结肿大

D. 关节痛

E. 少尿

1. 流行性脑脊髓膜炎可有
2. 伤寒病可有

正确答案：BA 您选择的答案：

第15-17题

A. 消化道传播

B. 输血传播

C. 虫媒传播

D. 呼吸道传播

E. 直接接触传播

1. 戊型肝炎病毒(HEV)的主要传播途径是
2. 丙型肝炎病毒(HCV)的主要传播途径是
3. 乙型肝炎病毒的主要传播途径是

正确答案：ABC 您选择的答案：

历年试题3 内科学 第四十二章 糖尿病与血糖低

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 以下对糖尿病检验结果的解释正确的是

- A．尿糖阴性可以排除糖尿病
- B．空腹血糖正常可以排除糖尿病
- C．尿酮阳性仅见于糖尿病
- D．餐后2小时血糖正常可以是糖尿病
- E．尿糖阳性可以诊断为糖尿病

正确答案：D 您选择的答案：

第2题 有关高渗性非酮症性糖尿病昏迷的论述，正确的是

- A．多见于1型糖尿病
- B．一定有重症糖尿病病史
- C．多见于老年轻型糖尿病
- D．治疗必须用低渗盐水
- E．常有明显酸中毒

正确答案：C 您选择的答案：

第3题 男。35岁，三年来多次昏迷，多在饭前发作，发作前伴恐惧感及心悸发汗。发病以来食欲好，体重增加。但记忆力差，患者发觉昏迷发作前及时进食可预防或缩短昏迷时间。应考虑

- A．胰岛素瘤
- B．脑血管疾病
- C．胃泌素瘤
- D．癫痫
- E．心血管疾病

正确答案：A 您选择的答案：

第4题 关于糖尿病的胰岛素治疗。正确的是

- A．肥胖的糖尿病人较适宜于胰岛素治疗
- B．经一段时间的胰岛素治疗后，可产生胰岛素抗体
- C．因感染发热而厌食的糖尿病人应将胰岛素剂量加倍
- D．1型糖尿病人可不用胰岛素治疗
- E．清晨高血糖而半夜有饥饿感、出冷汗的糖尿病人应增加胰岛素剂量

正确答案：B 您选择的答案：

第5题 磺酰脲类药物可用于治疗

- A．重症糖尿病
- B．胰岛功能尚存的非胰岛素依赖型糖尿病
- C．糖尿病合并高热
- D．糖尿病并发酮症酸中毒
- E．胰岛素依赖型糖尿病

正确答案：B 您选择的答案：

第6题 属于糖尿病微血管病变的是

- A．糖尿病肾病
- B．肾动脉狭窄
- C．冠心病
- D．下肢坏疽
- E．脑血管意外

正确答案：A 您选择的答案：

第7题 女，45岁，轻度肥胖，无明显口渴、多饮和多尿现象，空腹血糖6.8mmol / L。为确定是否有糖尿病，应检查

- A．糖基化血红蛋白
- B．复查空腹血糖
- C．口服葡萄糖耐量试验
- D．餐后2小时血糖
- E．24小时尿糖定量

正确答案：C 您选择的答案：

第8题 糖尿病病人最基础的治疗措施是

- A．适当体育锻炼
- B．胰岛素
- C．双胍类降血糖药
- D．磺脲类降血糖药
- E．饮食治疗

正确答案：E 您选择的答案：

第9题 糖尿病的诊断是糖尿病症状加上随机血糖

- A. 11.1mmol / L
- B. 12.1mmol / L
- C. 9.1mmol / L
- D. 10.1mmol / L
- E. 71mmol / L

正确答案：A 您选择的答案：

第10题 55岁，女，体重76kg，身高160cm。因多饮，多尿确诊为2型糖尿病。经饮食治疗和运动锻炼，2个月后空腹血糖为8.8mmol / L，餐后2小时血糖130mmol / L。进一步治疗应选择

- A. 加磺脲类降血糖药物
- B. 加口服降血糖药和胰岛素
- C. 维持原饮食治疗和运动
- D. 加双胍类降血糖药物
- E. 加胰岛素治疗

正确答案：D 您选择的答案：

第11题 糖尿病患者胰岛素治疗最主要的不良反应是

- A. 荨麻疹样皮疹
- B. 注射处红肿疼痛
- C. 过敏性休克
- D. 注射处脂肪萎缩
- E. 发生低血糖

正确答案：E 您选择的答案：

第12题 女，31岁，妊娠5个月。发现尿糖+，口服葡萄糖耐量试验结果：空腹血糖6.6mmol / L，2小时血糖10.6mmol / L。既往无糖尿病史。最可能的诊断是

- A. 糖尿病合并妊娠
- B. 肾性糖尿
- C. 其他特殊类型糖尿病
- D. 继发性糖尿病
- E. 妊娠期糖尿病

正确答案：E 您选择的答案：

第13题 诊断早期糖尿病肾病较有意义的检查是

- A. 尿常规检查
- B. 双肾B超
- C. 肌酐清除率
- D. 尿微量白蛋白测定
- E. 尿渗透压测定

正确答案：D 您选择的答案：

第14题 男性，66岁，昏迷一天入院。既往无糖尿病史。BP(21.3 / 11.3kPa)160 / 85mmHg，血糖38.9mmol / L，血钠150mmol / L，血pH7.35，血酮体弱阳性，可能诊断是

- A. 高渗性非酮症性糖尿病昏迷
- B. 饥饿性酮症酸中毒
- C. 脑血管意外
- D. 乳酸性酸中毒
- E. 糖尿病酮症酸中毒昏迷

正确答案：A 您选择的答案：

第15题 男，45岁，身高171cm，体重85kg，口服葡萄糖耐量试验血糖结果：空腹67mmol / L，1小时9.8mmol / L，2小时7.0mmol / L。结果符合

- A. 正常曲线
- B. 糖耐量减低
- C. 1型糖尿病
- D. 2型糖尿病
- E. 空腹血糖受损

正确答案：E 您选择的答案：

第16题 男，42岁，患糖尿病10年，尿蛋白阴性，近1个月感下腹部胀，排尿不畅伴尿失禁。B超声显示“膀胱扩大，尿潴留”。其原因应考虑

- A. 糖尿病合并泌尿系结石
- B. 糖尿病合并泌尿系感染
- C. 糖尿病合并慢性前列腺炎
- D. 糖尿病肾病
- E. 糖尿病自主(植物)神经病变

正确答案：E 您选择的答案：

第17题 男，40岁，患糖尿病10余年，尿蛋白阴性，1个月感下腹部胀，排尿不畅伴尿失禁。B超声示：膀胱扩大，尿潴留。其原因应考虑

- A. 糖尿病合并泌尿系结石
- B. 糖尿病合并泌尿系感染

- C. 糖尿病自主(植物)神经病变
 - D. 糖尿病合并慢性前列腺炎
 - E. 糖尿病肾病
- 正确答案：C 您选择的答案：

- 第18题 2型糖尿病的特点是
- A. 空腹尿糖均呈阳性
 - B. 患者空腹血糖都增高
 - C. 少数以酮症酸中毒为首发表现
 - D. 患者体型均较肥胖
 - E. 都有“三多一少”表现

正确答案：C 您选择的答案：

二、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

- 第19-21题
女，48岁，近1个月感口渴，饮水量增至每天2000ml。身高156cm，体重71kg，空腹血糖180mg/dl (10.0mmol/L)，餐后血糖252mg/dl (14.0mmol/L)，系初次发现血糖高，过去无糖尿病史。
1. 给患者的治疗建议是
 - A. 饮食及运动治疗
 - B. 双胍类降血糖药
 - C. 磺脲类降血糖药
 - D. α -葡萄糖苷酶抑制剂
 - E. 胰岛素
 2. 按以上建议治疗3个月后空腹血糖163mg/dl (8.6mmol/L)，餐后血糖225mg/dl (12.5mmol/L)。进一步治疗建议
 - A. 氯磺丙脲
 - B. 格列齐特
 - C. 二甲双胍
 - D. 阿卡波糖
 - E. 正规胰岛素
 3. 4年后该患者被发现有浸润型肺结核，降血糖治疗宜
 - A. 原降血糖药增加剂量
 - B. 改用降血糖作用更强的口服降血糖药
 - C. 增加一种口服降血糖药
 - D. 双胍类、磺脲类、 α -葡萄糖苷酶抑制剂联合使用
 - E. 胰岛素治疗

正确答案：ACE 您选择的答案：

- 第22-24题
男，70岁，软弱无力，进食减少，口渴、多尿2周，近2天嗜睡。急诊检查：BP70/50mmHg，神志朦胧，皮肤干燥失水，呼吸34次/分，心率108次/分，尿糖(++++)，尿酮(±)。既往无糖尿病史。
1. 最可能的诊断是
 - A. 糖尿病肾病
 - B. 糖尿病性神经病变
 - C. 糖尿病酮症酸中毒
 - D. 糖尿病乳酸性酸中毒
 - E. 高渗性非酮症糖尿病昏迷
 2. 为明确诊断，除血糖测定外，首选的检查是
 - A. 血电解质+BuN、Cr
 - B. 糖基化血红蛋白+BUN、Cr
 - C. 血气分析+BUN、Q
 - D. 血酮体+血气分析
 - E. 血乳酸+血气分析
 3. 最主要的治疗措施是
 - A. 抗感染
 - B. 肾上腺皮质激素
 - C. 口服降血糖药
 - D. 小剂量胰岛素及补液
 - E. 补充碱性药物
- 正确答案：EAD 您选择的答案：

- 第25-27题
男，20岁，神志不清2小时入院，既往患1型糖尿病5年，长期皮下注射胰岛素。近3天因腹泻而停用。体检：血压70/50mmHg，皮肤中度失水征，呼吸深大，有烂苹果味，心率130次/分。
1. 最可能的诊断是
 - A. 高渗性非酮症性糖尿病昏迷
 - B. 糖尿病酮症酸中毒
 - C. 糖尿病乳酸性酸中毒
 - D. 低血糖昏迷
 - E. 感染性休克
 2. 最可能与诊断无关的检查是
 - A. 血气分析
 - B. 血电解质测定
 - C. 血糖
 - D. 尿糖、尿酮

- E. 血培养
- 3. 需立即采取的治疗措施是
 - A. 静脉滴注5%碳酸氢钠
 - B. 纠正电解质紊乱
 - C. 补液并恢复皮下注射胰岛素
 - D. 补液加有效的抗生素
 - E. 补液同时静脉滴注胰岛素

正确答案：BEE 您选择的答案：

第28-30题

男性，40岁，因易乏力、间歇头晕3个月就诊，伴肢端麻木，无多尿、1:3渴。体检：身高165cm，体重75kg，BP：18.7/123kPa(140/92mmHg)，心肺无异常。双膝反射减弱，化验空腹血糖(FPG)6.5mmol/L(117mg/dl)。餐后2小时血糖(2HPG)12mmol/L(216mg/dl)

1. 为明确诊断，下一次最需要做的检查是

- A. EKG，以确定有无冠心病
- B. 头部CT，以确定有无脑梗死
- C. 肾功能
- D. 再验血糖，或考虑作OGTT
- E. 检查下肢神经传导速度

2. 本例最适宜考虑用的药物是

- A. 甲磺丁脲
- B. 格列本脲
- C. 格列喹酮
- D. 二甲双胍
- E. 卡托普利

3. 半个月后病人来复诊，并诉说曾到附近诊所诊治，给加用每日一片(2.5mg)格列本脲。服药后常有心跳、出汗，四肢软弱，复查空腹血糖为7.2mmol/L(130mg/dl)，餐后血糖11.1mmol/L(200mg/dl)。下一步最适宜的处理措施是

- A. 加用另一种降血糖药物
- B. 加大用药剂量至每日2片(5mg)
- C. 停药观察
- D. 改用胰岛素
- E. 停用格列本脲，改用拜糖平或二甲双胍治疗

正确答案：EDC 您选择的答案：

第31-32题

女性，38岁，糖尿病12年，每日皮下注射人混合胰岛素治疗，早餐前30单位，晚餐前24单位，每日进餐规律，主食量300g。近来查空腹血糖12.5mmol/L，餐后血糖7.6~9.0mmol/L。

1. 为确定空腹高血糖的原因最有意义的检查是

- A. 多次测定空腹血糖
- B. 多次测定餐后血糖
- C. 测定糖化血红蛋白
- D. 夜间血糖监测
- E. 口服葡萄糖耐量试验

2. 较为合适的处理是

- A. 调整进餐量
- B. 胰岛素调整剂量
- C. 加磺脲类降糖药物
- D. 加双胍类降糖药物
- E. 改用口服降糖药

正确答案：DB 您选择的答案：

历年试题3 内科学 第四十九章 病毒感染

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 儿童感染戊肝病毒后，常表现为

- A．潜伏性感染
- B．显性感染
- C．病毒携带者
- D．病毒清除
- E．隐性感染

正确答案：E 您选择的答案：

第2题 Dane颗粒是

- A．丁型肝炎病毒-
- B．乙型肝炎病毒
- C．丙型肝炎病毒
- D．戊型肝炎病毒
- E．甲型肝炎病毒

正确答案：B 您选择的答案：

第3题 下列关于流行性乙型脑炎的病理改变的叙述，错误的是

- A．血管套形成
- B．蛛网膜下腔有脓性渗出物
- C．胶质细胞增生
- D．软化灶
- E．神经细胞变性，坏死

正确答案：B 您选择的答案：

第4题 艾滋病患者肺部机会性感染最常见的病原体是

- A．疱疹病毒
- B．白色念珠菌
- C．结核杆菌
- D．巨细胞病毒
- E．肺孢子虫

正确答案：E 您选择的答案：

第5题 人类免疫缺陷病毒(HIV)在人体内作用的靶细胞是

- A．NK细胞
- B．CTL细胞
- C．CD8 + T淋巴细胞
- D．B淋巴细胞
- E．CD4 + T淋巴细胞

正确答案：E 您选择的答案：

第6题 男，28岁，突起寒颤，高热，恶心，呕吐、腰痛已5天。体检：重病容，眼睑浮肿，球结膜及胸部皮肤充血，腋下见少许点状出血点，血压70 / 50mmHg，怀疑流行性出血热。本例必须首先考虑的治疗措施是

- A．小剂量肝素抗DIC
- B．补充血容量
- C．选用抗病毒治疗
- D．慎用升压药
- E．纠正酸中毒

正确答案：B 您选择的答案：

第7题 可通过母婴传播的传染病是

- A．霍乱
- B．甲型病毒性肝炎
- C．细菌性痢疾
- D．流行性脑脊髓膜炎
- E．艾滋病

正确答案：E 您选择的答案：

第8题 下列肝炎病毒基因组归类于DNA病毒的是

- A．丁型肝炎
- B．戊型肝炎
- C．甲型肝炎
- D．丙型肝炎
- E．乙型肝炎

正确答案：E 您选择的答案：

第9题 某患者，于1月3日起发病，三天来发热，恶心、呕吐，食欲减退，头痛，四肢酸痛，腰痛。体检：危重病

容，球结膜充血，无水肿，咽充血，腋下可见点状抓痕样出血点，肝脾未及。血常规检查：WBC $12 \times 10^9 / L$ ，N72%，L28%，可见异型淋巴细胞。尿常规：尿蛋白(+++)，RBC $2 \sim 5$ 个/HP，该患者首先考虑的诊断为

- A. 钩端螺旋体病
- B. 败血症
- C. 流行性出血热
- D. 流行性脑脊髓膜炎
- E. 结核性脑膜炎

正确答案：C 您选择的答案：

第10题 下列乙肝病毒标记物中反映HBV有活动性复制和传染性的是

- A. e抗体(抗-HBe)
- B. 核心抗体(抗-HBc)
- C. 表面抗原(HBsAg)
- D. e抗原(HBeAg)
- E. 表面抗体(抗-HBs)

正确答案：D 您选择的答案：

第11题 可用于流行性乙型脑炎早期诊断的实验室检查是

- A. 血凝抑制试验
- B. 病毒分离
- C. 补体结合试验
- D. 中和试验
- E. 特异性IgM抗体检测

正确答案：E 您选择的答案：

第12题 男，40岁，因反复机会性感染入院，检查发现患者伴发卡波济肉瘤。诊断应首先考虑

- A. 先天性胸腺发育不全
- B. X-性连锁低丙球蛋白血症
- C. 艾滋病
- D. 腺苷脱氨酶缺乏症
- E. 选择性IgA缺乏症

正确答案：C 您选择的答案：

第13题 甲型肝炎病程中，传染性最强的阶段是

- A. 慢性期
- B. 潜伏期
- C. 恢复期
- D. 黄疸期
- E. 黄疸前期

正确答案：E 您选择的答案：

第14题 HIV与感染细胞膜上CD4分子结合的病毒刺突是

- A. gp120
- B. gp41
- C. P24
- D. P17
- E. gp160

正确答案：A 您选择的答案：

第15题 感染病原体后，仅引起机体发生特异性免疫应答而临床上不出现特异性的症状和体征，称为

- A. 病原携带状态
- B. 病原体被清除
- C. 显性感染
- D. 隐性感染
- E. 潜伏性感染

正确答案：D 您选择的答案：

第16题 在乙型肝炎患者血清中，不能检测到的乙肝病毒标记物是

- A. HBeAg
- B. HBcAg
- C. 抗-HBs
- D. HBsAg
- E. 抗-HBc

正确答案：B 您选择的答案：

第17题 HBV感染后产生的保护性抗体是

- A. 抗HBcIgM
- B. 抗-HBs
- C. 抗前s
- D. 抗HBcIgG
- E. 抗HBe

正确答案：B 您选择的答案：

第18题 流行性出血热早期休克的原因是

- A. 心源性
- B. 感染性
- C. 失血浆性
- D. 过敏性
- E. 出血性

正确答案：C 您选择的答案：

第19题 女，19岁，农民，12月在水利工地上突起发热，伴头痛，眼眶痛，腰痛。病程第四日就诊时热已退，血压偏低，球结膜水肿，出血，胸背部见条索点状瘀点。前一日24小时尿量340ml，该病例最可能的诊断是

- A. 败血症
- B. 钩体病
- C. 血小板减少性紫癜
- D. 流行性出血热
- E. 急性肾小球肾炎

正确答案：D 您选择的答案：

第20题 男性，44岁，发现HBsAg阳性9年，ALT时有增高。近3周来食欲下降，尿黄，明显乏力，齿龈出血，近2周尿少。查体：神清，扑翼样震颤(+)，化验：A 176U/L，TBIL432μmol/L，PT38秒(对照13秒)。该患者应诊断为

- A. 病毒性肝炎乙型慢性重度
- B. 乙肝后肝硬化
- C. 病毒性肝炎乙型慢性重型
- D. 病毒性肝炎乙型亚急性重型
- E. 病毒性肝炎乙型慢性中度

正确答案：C 您选择的答案：

第21题 男，20岁，在一次体检中发现HBsAg阳性，当时无自觉症状及体征，肝功能正常。次年5月，因突然乏力、恶心、厌食、尿黄而入院。化验：A 500u，血清总胆红素85μmol/L，抗-HAVIgM(+)。该患者的诊断可能为

- A. 急性黄疸型肝炎，甲、乙型肝炎病毒混合感染
- B. 急性甲型肝炎，乙型肝炎病毒携带者
- C. 急性乙型肝炎，合并甲型肝炎
- D. 乙型肝炎，慢性活动型，既往感染过甲型肝炎
- E. 乙型肝炎，慢性迁延型，既往感染过甲型肝炎

正确答案：B 您选择的答案：

第22题 某护士在给一位乙型肝炎病毒(HBV)携带者注射时，不慎被病人用过的针头刺伤手指。为预防乙型肝炎病毒感染，应首先采取的措施是

- A. 注射丙种球蛋白
- B. 注射α干扰素
- C. 注射乙型肝炎疫苗
- D. 注射HBVlg
- E. 注射抗生素

正确答案：D 您选择的答案：

第23题 流行性乙型脑炎不具有的改变是

- A. 血管周围淋巴细胞浸润和血管套形成
- B. 胶质结节形成
- C. 神经细胞变性、坏死，出现噬神经细胞和卫星现象
- D. 筛网状软化灶和脑水肿
- E. 蛛网膜下腔以中性粒细胞为主的炎性渗出

正确答案：E 您选择的答案：

第24题 10岁男孩，近8天来食欲不振，恶心、呕吐、乏力、尿色黄来院就诊。病前两周曾注射丙种球蛋白一支。检查：巩膜黄染，肝肋下3cm、脾未触及，化验：ALT500u，胆红素85.5μmol/L，抗HAV-IgM(+)，抗HAV-IgG(+)，HBsAg(+)，HBeAg(+)，抗HBe-IgM(+)，应诊断为

- A. 急性甲型肝炎，乙肝病毒携带者
- B. 被动获得甲肝抗体，急性甲型肝炎，乙肝病毒携带者
- C. 急性乙型肝炎，既往感染过甲型肝炎
- D. 被动获得甲肝抗体，急性乙型肝炎
- E. 急性甲型肝炎、乙型肝炎

正确答案：E 您选择的答案：

第25题 血清中常规检查检测不到的HBV标志物是

- A. 抗-HBe
- B. HBeAg
- C. HBsAg
- D. 抗-HBe
- E. HBeAg

正确答案：E 您选择的答案：

历年试题3 内科学 第四十六章 骨性关节炎

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 以软骨变性破坏为主要病理改变的风湿病是

- A．类风湿关节炎
- B．强直性脊柱炎
- C．痛风性关节炎
- D．风湿热关节受累
- E．骨性关节炎

正确答案：E 您选择的答案：

历年试题3 内科学 第四十七章 中毒

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 有机磷酸酯类急性中毒表现为

- A. 神经节兴奋、心血管作用复杂
- B. 腺体分泌减少、胃肠平滑肌兴奋
- C. 膀胱逼尿肌松弛、呼吸肌麻痹
- D. 支气管平滑肌松弛、唾液腺分泌增加
- E. 脑内乙酰胆碱水平下降、瞳孔扩大

正确答案：A 您选择的答案：

第2题 18岁，晨卧床不起，人事不省，多汗，流涎，呼吸困难。体检：神志不清，双瞳孔缩小如针尖，双肺布满湿啰音，心率60次/分，肌束震颤，抽搐，最可能的诊断是

- A. 急性氯丙嗪中毒
- B. 急性一氧化碳中毒
- C. 急性安定中毒
- D. 急性巴比妥中毒
- E. 急性有机磷中毒

正确答案：E 您选择的答案：

第3题 女性，24岁，误服敌敌畏10ml 半小时后昏迷来院，诊断急性有机磷中毒。下列哪一项属烟碱样症状

- A. 肌纤维束颤动
- B. 瞳孔缩小
- C. 肺水肿
- D. 多汗
- E. 流涎

正确答案：A 您选择的答案：

第4题 氰化物中毒时，病人的呼吸气味可呈

- A. 烂苹果味
- B. 苦杏仁味
- C. 蒜臭味
- D. 腥臭味
- E. 酒味

正确答案：B 您选择的答案：

第5题 碳酸锂中毒的早期症状为

- A. 震颤、共济失调
- B. 发热、定向障碍
- C. 下肢水肿、多尿
- D. 癫痫大发作
- E. 厌食、恶心、呕吐等胃肠道反应

正确答案：A 您选择的答案：

第6题 男性，32岁，因口服敌敌畏重度中毒1小时入院，经阿托品、氯磷定等各项治疗3天后神志清醒，中毒症状缓解，体征消失。再用阿托品口服维持6天后，查全血胆碱酯酶活力仍处于80%左右，究其原因，最可能是

- A. 红细胞再生尚不足
- B. 用解毒药剂量不足
- C. 肝脏解毒功能差
- D. 胃、肠、胆道内仍有残毒在吸收
- E. 系高毒类毒物中毒

正确答案：A 您选择的答案：

第7题 有机磷农药中毒的发病机制主要是有机磷抑制

- A. 6-磷酸葡萄糖脱氢酶
- B. 糜蛋白酶
- C. 乳酸脱氢酶
- D. 胆碱酯酶
- E. 细胞色素氧化酶

正确答案：D 您选择的答案：

第8题 抢救经呼吸道吸入的急性中毒，首要采取的措施是

- A. 清除尚未吸收的毒物
- B. 对症治疗
- C. 使用解毒剂
- D. 排出已吸收的毒物
- E. 立即脱离现场及急救

正确答案：E 您选择的答案：

第9题 治疗重度一氧化碳中毒首选的氧疗是

- A. 人工呼吸
- B. 高压氧舱
- C. 呼吸新鲜空气
- D. 面罩吸氧
- E. 鼻导管吸氧

正确答案：B 您选择的答案：

第10题 患者男性，32岁。因头昏、头痛、多汗、呕吐、腹痛、腹泻半小时来诊。半小时前午餐曾吃青菜和肉类。查体：呼吸18次/分，脉搏100次/分。血压120/70mmHg，多汗，瞳孔缩小，肺部偶有湿啰音，心脏无杂音，心律规则。最可能的诊断是

- A. 中暑
- B. 有机磷杀虫剂中毒
- C. 细菌性食物中毒
- D. 菌痢
- E. 可溶性钡盐中毒

正确答案：B 您选择的答案：

第11题 某一急性药物中毒病人，表现为昏迷、瞳孔极度缩小，呼吸深度抑制，血压降低，易出现上述中毒症状的药物是

- A. 氯丙嗪
- B. 苯巴比妥
- C. 地西洋
- D. 苯妥英钠
- E. 吗啡

正确答案：E 您选择的答案：

第12题 女，35岁，误服有机磷农药50ml，立即被其家人送往医院。该病人抢救成功的关键是

- A. 彻底洗胃
- B. 早期应用阿托品
- C. 早期应用解磷定
- D. 解磷定与阿托品合用
- E. 静脉注射西地兰

正确答案：A 您选择的答案：

第13题 下列临床表现最有利于有机磷农药中毒诊断的是

- A. 腹泻
- B. 气急
- C. 紫绀
- D. 蒜臭
- E. 昏迷

正确答案：D 您选择的答案：

第14题 男，50岁。被发现昏倒在煤气热水器浴室内。查体：浅昏迷，血压：160/90mmHg，口唇樱红色，四肢无瘫痪，尿糖(++)，尿酮体(-)，最可能的诊断是

- A. 急性心肌梗死
- B. 糖尿病酮症酸中毒
- C. 脑出血
- D. 急性一氧化碳中毒
- E. 脑梗塞

正确答案：D 您选择的答案：

第15题 呼吸呈蒜味的毒物是

- A. 有机磷农药
- B. 亚硝酸盐
- C. 酒精
- D. 安定
- E. 阿托品

正确答案：A 您选择的答案：

二、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第16-17题

某医院门诊在较短的时间内相继接诊了50余名患者，其主要临床表现是上腹部阵发性绞痛，继之腹泻，呈血水样，一日10余次，少数人有脓血便，里急后重不明显。除恶心呕吐外，少数人有畏寒、发热(37.5~40)、乏力、脱水等现象，所有患者均在同一宾馆就餐，初步诊断为食物中毒

1. 患者共同的食物最有可能的是

- A. 肉类食品
- B. 海产品
- C. 凉拌菜
- D. 罐头食品
- E. 米饭

2. 调查处理过程中, 首先应
- A. 将患者的排泄物送检
 - B. 迅速向防疫站报告, 并查封可疑食物
 - C. 了解中毒的原因和污染源
 - D. 对剩余的可疑食品进行消毒或销毁
 - E. 检查该宾馆食堂的卫生状况、操作规程等
- 正确答案: AB 您选择的答案:

第18-19题

某蓄电池厂, 男工, 工龄8年, 主诉头昏、头痛、乏力、记忆减退、睡眠障碍、纳差、脐周隐痛。经检验, 尿中和8-ALA为28.6 $\mu\text{mol/L}$ 。

1. 最可能的诊断为
- A. 慢性铅中毒
 - B. 慢性苯中毒
 - C. 慢性汞中毒
 - D. 慢性氰化物中毒
 - E. 慢性硫化氢中毒
2. 对病人治疗首选药物是
- A. 二巯基丙磺酸钠
 - B. 补血合剂
 - C. 依地酸二钠钙
 - D. 阿托品
 - E. 葡萄糖酸钙

正确答案: AC 您选择的答案:

三、B1型题: 以下提供若干组考题, 每组考题共用在前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第20-21题

- A. 该气体与细胞色素氧化酶中三价铁和谷胱甘肽结合抑制细胞呼吸酶
 - B. 该气体与氧化型细胞色素氧化酶中的二价铁结合, 引起细胞内窒息
 - C. 使血氧饱和度增加, 组织不能利用氧
 - D. 引起氧分压增加, 导致组织供氧不足, 引起缺氧
 - E. 影响血液中氧的释放和传递, 导致低氧血症和组织缺氧
1. 硫化氢中毒的机制是
2. 一氧化碳中毒的机制是

正确答案: AE 您选择的答案:

历年试题3 内科学 第四十三章 风湿性疾病概论

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 下列不属于弥漫性结缔组织病的是

- A. 类风湿关节炎
- B. 硬皮病
- C. Reiter综合征
- D. 系统性红斑狼疮
- E. 干燥综合征

正确答案：C 您选择的答案：

第2题 提示与习惯性流产有相关性的检查是

- A. 抗中性粒细胞胞浆抗体
- B. 抗RNF₁抗体
- C. 抗磷脂抗体
- D. 抗着丝点抗体
- E. 抗组蛋白抗体

正确答案：C 您选择的答案：

第3题 关于风湿性疾病的临床特点，下列哪项不正确

- A. 反复发作与缓解交替出现
- B. 对治疗反应的个体差异不大
- C. 临床表现差异很大
- D. 病程多呈慢性经过
- E. 免疫学异常表现复杂

正确答案：B 您选择的答案：

第4题 风湿热最常见的皮肤表现是

- A. 多形红斑
- B. 荨麻疹
- C. 皮下小结
- D. 结节性红斑
- E. 猩红热样皮疹

正确答案：C 您选择的答案：

第5题 不属于风湿热的主要表现的是

- A. 环形红斑
- B. 发热
- C. 关节炎
- D. 心脏炎
- E. 舞蹈病

正确答案：E 您选择的答案：

第6题 风湿活动的正确判断指标是

- A. 血沉慢
- B. 血小板减少
- C. 粘蛋白降低
- D. 血浆白蛋白增高
- E. C-反应蛋白增多

正确答案：E 您选择的答案：

第7题 下列有关风湿病的描述，哪项是错误的

- A. 属于变态反应性疾病
- B. 可累及全身结缔组织
- C. 与溶血性链球菌感染有关
- D. 风湿性关节炎常导致关节畸形
- E. 心脏病变的后果最为严重

正确答案：D 您选择的答案：

历年试题3 内科学 第四十四章 类风湿关节炎

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 除了关节肿痛之外，对类风湿关节炎的诊断最有意义的临床表现是

- A. 小腿发现紫红色痛性皮下结节
- B. 肘膝部肌腱附着端痛与足跟、脚掌痛
- C. 关节隆起与受压部位有无痛性皮下结节
- D. 弥漫性肺间质改变伴肺内结节
- E. 双侧渗出性胸腔积液，其糖定量正常

正确答案：C 您选择的答案：

第2题 使用非甾体抗炎药治疗类风湿性关节炎时，为预防其胃肠副作用常并用

- A. H₂受体拮抗剂
- B. 钙剂
- C. 羟氨苄青霉素
- D. 碱性药
- E. 维生素K

正确答案：A 您选择的答案：

第3题 以滑膜炎为基本病理改变的风湿病是

- A. 痛风性关节炎
- B. 骨性关节炎
- C. 类风湿关节炎
- D. 强直性脊柱炎
- E. 风湿性关节炎

正确答案：E 您选择的答案：

第4题 女，50岁，反复低热1年，伴四肢大小关节肿痛。WBC $8.0 \times 10^9 / L$ ，Hb $100 g / L$ ，ANA(—)，RF(+)。经多种抗生素正规治疗无效。可能的诊断是

- A. 结核菌感染引起的关节炎
- B. 骨关节炎
- C. 类风湿关节炎
- D. 风湿性关节炎
- E. 系统性红斑狼疮

正确答案：C 您选择的答案：

第5题 按诊断标准，下列哪项不是诊断类风湿性关节炎的必备关节表现

- A. 晨僵
- B. 关节肿痛 6周
- C. 腕、掌指、指间关节肿
- D. 关节畸形
- E. 对称性关节肿

正确答案：D 您选择的答案：

第6题 女性，48岁，发热伴对称性多关节肿痛，晨僵3个月，查ANA低滴度阳性，RF(+)，IgG和补体升高，最可能的诊断是

- A. 干燥综合征
- B. 系统性红斑狼疮
- C. 混合性结缔组织病
- D. 类风湿关节炎
- E. 多肌炎

正确答案：D 您选择的答案：

二、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第7-8题

女性，45岁。双手和膝关节肿痛伴晨僵1年。体检：肘部可及皮下结节，质硬，无触痛。

1. 诊断首先考虑
 - A. 系统性硬化症
 - B. 骨关节炎
 - C. 痛风
 - D. 类风湿关节炎
 - E. 风湿性关节炎
2. 最有助于确定诊断的是
 - A. 关节影像检查
 - B. 滑液检查
 - C. 抗核抗体
 - D. ESR
 - E. CRP

正确答案：DA 您选择的答案：

第9-10题

女，40岁，反复手关节痛1年，曾诊断为类风湿关节炎，间断使用理疗和非甾体抗炎药，症状有缓解。近月来低热，关节痛加重。肘后出现多个皮下结节，检查ESR40mm/h，心脏彩超发现少量心包积液。考虑为类风湿关节炎活动

1. 对疾病活动诊断最有意义的检查

- A. C反应蛋白
- B. 心包积液病理
- C. 类风湿因子滴度
- D. 关节影像学
- E. 补体

2. 最适宜的治疗措施是

- A. 维持原治疗方案
- B. 改用皮质激素
- C. 加用青霉素
- D. 选用慢作用抗风湿药
- E. 应用皮质激素加慢作用抗风湿药

正确答案：CE 您选择的答案：

历年试题3 内科学 第四十五章 系统性红斑狼疮

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 对系统性红斑狼疮的诊断常用而有价值的病理检查是

- A. 淋巴结活检
- B. 肺穿刺
- C. 肾穿刺
- D. 骨髓穿刺
- E. 皮肤狼疮带试验

正确答案：E 您选择的答案：

第2题 在系统性红斑狼疮的下列临床表现中主要的是

- A. 育龄女性多发
- B. 浆膜炎
- C. 肾炎
- D. 皮肤粘膜与关节表现
- E. 贫血

正确答案：D 您选择的答案：

第3题 女，38岁，四肢无力，双下肢浮肿及皮下出血点2月，查尿蛋白(++)，红细胞(++)，ANA(+)，有光过敏。最大的可能诊断是

- A. 系统性红斑狼疮
- B. 急性肾小球肾炎
- C. 多发性肌炎
- D. 过敏性紫癜
- E. 慢性肾小球肾炎

正确答案：A 您选择的答案：

第4题 女，32岁，双腕和膝关节疼痛，伴高热2个月。曾有癫痫样发作一次。心脏超声检查示中等量心包积液，X线胸片示右侧少量胸腔积液。血常规检查：Hb、WBC和血小板下降。尿蛋白(+++)，多种抗生素治疗无效，最可能诊断

- A. 系统性红斑狼疮
- B. 再生障碍性贫血
- C. 恶性肿瘤颅内转移
- D. 结核性胸膜炎和心包炎
- E. 肾小球肾炎急性发作

正确答案：A 您选择的答案：

第5题 应用大量环磷酰胺间歇静脉冲击治疗系统性红斑狼疮的主要作用是

- A. 增加血小板，防止溶血
- B. 防止肾纤维化与肾功能恶化
- C. 防止中枢神经系统损害
- D. 减轻血管炎性损害
- E. 减轻心肌损害

正确答案：B 您选择的答案：

第6题 目前治疗系统性红斑狼疮的主药为

- A. 磷酸氯喹
- B. 非甾体抗炎药
- C. 雷公藤多甙
- D. 环磷酰胺
- E. 泼尼松

正确答案：E 您选择的答案：

第7题 女，18岁。发热一月，近一周来两面颊出现对称性红斑、手指关节红肿，化验：血红蛋白90g/L，白细胞 $3.0 \times 10^9/L$ ，尿蛋白+++，抗ds-DNA抗体阳性，应首先考虑诊断

- A. 缺铁性贫血
- B. 慢性肾炎
- C. 风湿热
- D. 类风湿关节炎
- E. 系统性红斑狼疮

正确答案：E 您选择的答案：

第8题 下列在系统性红斑狼疮中最具有该病标记性意义的抗体是

- A. 抗Jo-1
- B. 抗Scl-70
- C. 抗双链DNA
- D. 抗RNP
- E. 抗Sm

正确答案：E 您选择的答案：

二、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第9-11题

女，30岁，近2个月中度发热，全身肌痛，四肢关节肿痛，口腔溃疡。尿常规示红细胞+，蛋白++。

1. 免疫学检查最可能出现的抗体是

- A. 抗核抗体
- B. 抗JO-1抗体
- C. 抗Scl-70抗体
- D. 类风湿因子
- E. 抗中性粒细胞胞浆抗体

2. 最可能的诊断是

- A. 类风湿关节炎
- B. 败血症
- C. 皮炎
- D. 系统性红斑狼疮
- E. 急性肾小球肾炎

3. 为缓解病情，首选的药物是

- A. 抗生素
- B. 糖皮质激素
- C. 非甾体抗炎药
- D. 镇痛药
- E. 抗疟药

正确答案：ADB 您选择的答案：

第12-13题

女性，32岁，发热、多关节疼痛、双侧胸腔积液、尿蛋白(+)半年，实验室检查发现ANA(+)，抗SSA(+)，抗Scl-70(+)。

1. 最可能的诊断是

- A. 原发性干燥综合征
- B. 系统性红斑狼疮
- C. 原发性血管炎
- D. 类风湿关节炎
- E. 结核性胸膜炎

2. 首选治疗的药物

- A. 非甾体抗炎药
- B. 镇痛剂，如：扑热息痛
- C. 小剂量糖皮质激素
- D. 免疫抑制剂
- E. 糖皮质激素联合免疫抑制剂

正确答案：BC 您选择的答案：

历年试题3 内科学 第四十一章 肾上腺疾病

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 原发性慢性肾上腺皮质功能减退症典型体征是

- A．轻度肥胖
- B．皮肤多汗及低热
- C．皮肤紫纹
- D．皮肤粘膜色素沉着
- E．脉率增快

正确答案：D 您选择的答案：

第2题 女，45岁，肢体软弱无力、夜尿多2年余，今晨起双下肢不能活动。查体：血压170 / 100mmHg，均匀性轻度肥胖，双下肢松弛性瘫痪，血钾2.4mmol / L。最可能的诊断为

- A．原发性高血压
- B．嗜铬细胞瘤
- C．库欣病
- D．原发性醛固酮增多症
- E．肾性高血压

正确答案：D 您选择的答案：

第3题 原发性醛固酮增多症患者出现肌无力的原因是

- A．持续性高血压
- B．血钠潴留过多
- C．持久尿量过多
- D．血钾浓度降低
- E．尿钾排出增多

正确答案：D 您选择的答案：

第4题 皮质醇增多症(库欣综合征)最常见的病因是

- A．肾上腺皮质腺瘤
- B．医源性皮质醇增多症
- C．垂体ACTH分泌过多
- D．肾上腺皮质腺癌
- E．异位ACTH综合征

正确答案：C 您选择的答案：

第5题 诊断库欣综合征最有意义的检查是

- A．螺内酯试验
- B．甲吡酮试验
- C．赛庚啶试验
- D．地塞米松抑制试验
- E．ACTH兴奋性试验

正确答案：D 您选择的答案：

第6题 女性，26岁，肥胖、头痛伴闭经1年半。查体：BP180 / 110mmHg，向心性肥胖，满月脸，皮肤薄，有痤疮，腹壁有宽大紫纹，下肢胫前可凹性浮肿。为明确库欣综合征，拟检查

- A．小剂量地塞米松抑制试验
- B．尿游离皮质醇
- C．血浆皮质醇
- D．大剂量地塞米松抑制试验
- E．血皮质醇昼夜节律

正确答案：C 您选择的答案：

第7题 男，42岁，2年前诊断为原发性慢性肾上腺皮质功能减退症，长期口服氢化可的松(30ms / 日)替代治疗。近2天发热38℃，咽痛。目前氢化可的松应

- A．改用等效量的地塞米松
- B．剂量维持不变
- C．剂量增加为2~3倍
- D．剂量减少1 / 2
- E．因有感染而暂时停用

正确答案：C 您选择的答案：

第8题 肾上腺皮质肿瘤引起的Cushing综合征与Cushing病的鉴别，最有意义的试验检查是

- A．大剂量地塞米松抑制试验
- B．小剂量地塞米松抑制试验
- C．血皮质醇昼夜节律消失
- D．测试24小时尿17-羟类固醇
- E．葡萄糖耐量试验

正确答案：A 您选择的答案：

第9题 伴有低血钾的高血压，其病因应首先考虑

- A．皮质醇增多症
- B．原发性醛固酮增多症
- C．嗜铬细胞瘤
- D．肾动脉狭窄
- E．慢性肾炎

正确答案：B 您选择的答案：

第10题 对原发性慢性肾上腺皮质功能减退症的诊断量有意义的血检结果是

- A．ACTH
- B．皮质醇
- C．醛固酮
- D．血钠
- E．血糖

正确答案：B 您选择的答案：

历年试题3 内科学 第四十章 甲状腺疾病

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 女，28岁，21岁时因心慌、怕热、多汗、消瘦就诊，确诊Graves病，他巴唑规则治疗2年。25岁时甲亢复发。再次他巴唑治疗，2个月后甲状腺功能正常，继续治疗一年半停药。最近2个月甲亢的症状、体征再现，查血T₃、T₄及TSH确认为甲亢第2次复发。患者结婚5年，尚未生育，希望治疗甲亢后怀孕，甲亢的治疗拟

- A. 大剂量碘剂
- B. 再次他巴唑治疗，疗程延长至3~4年
- C. 用他巴唑，甲功正常后加用¹³¹I治疗
- D. 用他巴唑，甲功正常后行甲状腺大部切除手术
- E. 直接行甲状腺大部切除术

正确答案：D 您选择的答案：

第2题 甲状腺功能亢进时，腹泻的主要发生机制是

- A. 肠腔内渗出物增加
- B. 肠液分泌增多
- C. 肠内容物渗透压增高
- D. 肠蠕动增强
- E. VIP的作用

正确答案：D 您选择的答案：

第3题 诊断自主性功能亢进性甲状腺腺瘤最佳的甲状腺检查是

- A. B超
- B. CT
- C. MRI
- D. 放射性核素扫描
- E. ¹³¹I摄取率

正确答案：D 您选择的答案：

第4题 诊断甲亢(Graves病)最有价值的体征是

- A. 甲状腺肿大伴震颤和血管杂音
- B. 收缩压升高，舒张压降低，脉压增大
- C. 阵发性心房纤颤
- D. 窦性心动过速
- E. 皮肤湿润多汗、手颤

正确答案：A 您选择的答案：

第5题 Graves病最重要的体征是

- A. 收缩压升高，舒张压降低
- B. 心脏扩大，心律不齐
- C. 眼裂增大，眼球突出
- D. 弥漫性甲状腺肿大伴血管杂音
- E. 皮肤湿润多汗，手颤

正确答案：D 您选择的答案：

第6题 甲亢性心脏病的老年患者，甲状腺功能亢进症的根治

- A. 立即行甲状腺手术
- B. 核素¹³¹I治疗
- C. 抗甲状腺药物
- D. 复方碘溶液
- E. 大剂量心得安

正确答案：B 您选择的答案：

第7题 44岁男性，Graves病病史11年，因抗甲状腺药物治疗不规则。病情长期未获满意控制。近1个月来出现心慌、气短、多汗而入院检查。诊断为Graves病，甲状腺功能亢进、甲状腺功能亢进性心脏病(房颤)。其心脏病治疗的关键措

- A. 大剂量心得安
- B. 电转复
- C. 毛花甙丙治疗
- D. 卧床休息，镇静剂
- E. 正规的抗甲状腺药物治疗控制甲状腺功能亢进

正确答案：E 您选择的答案：

第8题 丙基硫氧嘧啶治疗甲亢过程中，需停药处理的为

- A. 血中性粒细胞 $<1.5 \times 10^9 / L$
- B. T₃、T₄恢复正常
- C. 甲状腺较治疗前明显增大
- D. 规则用药已6个月，甲亢仍未控制
- E. 突眼情况加重

正确答案：A 您选择的答案：

第9题 女性，44岁，健康体检发现甲状腺肿大就诊，查体甲状腺对称性 度肿大，表面不平，中等硬度，无触痛，无血管杂音，心率78次/分钟。拟诊慢性淋巴细胞性甲状腺炎。有助于确诊的首选检查是

- A. TSH、FT3、FT4
- B. 甲状腺吸¹³¹I率
- C. 抗甲状腺抗体
- D. 甲状腺CT
- E. 甲状腺B超声

正确答案：C 您选择的答案：

第10题 男，30岁，患甲状腺功能亢进症。突然出现双下肢不能动。检查：双下肢膝腱反射减退，无肌萎缩。血钾测定 2.3mmol/L ，你认为最可能是下列哪种情况

- A. 癔症
- B. 重症肌无力
- C. 慢性甲亢性肌病
- D. 周围神经炎
- E. 周期性麻痹

正确答案：E 您选择的答案：

第11题 慢性淋巴细胞性甲状腺炎引起原发性甲状腺功能减退症替代治疗的原则

- A. 由大剂量开始，逐渐递减到合适剂量
- B. 间断用药有利于预防心绞痛
- C. 甲减越严重，起始剂量应越大
- D. 待甲状腺功能正常后可停用
- E. 从小剂量开始，逐渐递增到合适剂量

正确答案：E 您选择的答案：

第12题 下列指标中用于鉴别原发性与继发性甲状腺功能减退症的是

- A. FT4
- B. FT3
- C. TSH
- D. TT4
- E. TT3

正确答案：C 您选择的答案：

第13题 女，40岁，发现颈部肿大6年，近半年来常感心悸，多汗，食量加大。检查：无突眼、甲状腺 肿大、结节状，脉搏116次/分，心、肺、腹无异常发现，其诊断可能是

- A. 结节性甲状腺肿
- B. 甲状腺腺瘤
- C. 继发性甲状腺功能亢进
- D. 高功能甲状腺腺瘤
- E. 原发性甲状腺功能亢进

正确答案：C 您选择的答案：

第14题 硫脲类抗甲状腺药可引起的严重不良反应是

- A. 再生障碍性贫血
- B. 粘液性水肿
- C. 粒细胞缺乏症
- D. 心动过缓
- E. 低蛋白血症

正确答案：C 您选择的答案：

第15题 女，22岁，心慌，多汗、低热1周。查体：甲状腺左叶肿大、触痛、质硬。血FT4及FT3升高，血沉 80mm/h 应首先考虑

- A. 桥本甲状腺炎
- B. 甲状腺左叶出血
- C. 自主性功能亢进性甲状腺腺瘤
- D. Graves病
- E. 亚急性甲状腺炎

正确答案：E 您选择的答案：

第16题 女，16岁，心慌，多汗，手颤2个月。无明显突眼。甲状腺I°弥漫性肿大。血游离T3、T4增高，TSH降低。肝、肾功能正常，血WBC $6.8 \times 10^9/\text{L}$ 。诊为甲亢。既往无甲亢病史。治疗选择

- A. 核素¹³¹I治疗
- B. 甲状腺部分切除术
- C. 抗甲状腺药物治疗后核素¹³¹I治疗
- D. 抗甲状腺药物治疗后手术治疗
- E. 抗甲状腺药物治疗

正确答案：E 您选择的答案：

第17题 预测Graves病停用抗甲状腺药物是否易复发的指标是

- A. 抗甲状腺抗体
- B. TSH
- C. T3、T4、及r T3
- D. 甲状腺摄¹³¹I率

E. 甲状腺刺激免疫球蛋白

正确答案：A 您选择的答案：

第18题 14岁初中二年级女学生，患Graves病。治疗宜选用

- A. 镇静剂
- B. 抗甲状腺药物
- C. 立即手术治疗
- D. 鼓励多食海带
- E. ¹³¹I治疗

正确答案：B 您选择的答案：

第19题 原发性甲状腺功能减退症最早出现异常的是

- A. 血TSH
- B. 血总T₄
- C. 血游离T₄
- D. 血游离T₃
- E. 血总T₃

正确答案：A 您选择的答案：

第20题 造成先天性甲状腺功能低下的最主要的原因是

- A. 甲状腺不发育或发育不全
- B. 甲状腺或靶器官反应性低下
- C. 促甲状腺激素缺乏
- D. 碘缺乏
- E. 甲状腺合成过程中酶的缺乏

正确答案：A 您选择的答案：

第21题 引起Graves病基本的原因是

- A. 长期碘摄入不足
- B. 遗传易感性和自身免疫功能异常
- C. 长期碘摄入过多
- D. 各种因素致下丘脑分泌TRH过多
- E. 各种原因致垂体分泌TSH过多

正确答案：B 您选择的答案：

第22题 早期确诊甲状腺功能减低症的实验室检查是

- A. 甲状腺抗体的测定
- B. 骨龄测定
- C. 甲状腺扫描
- D. TRH兴奋实验
- E. 血清T₃、T₄、TRH测定

正确答案：E 您选择的答案：

第23题 诊断甲状腺高功能腺瘤最佳的检查是

- A. 甲状腺B超
- B. 甲状腺摄¹³¹I率
- C. 甲状腺核素扫描
- D. 甲状腺CT
- E. 甲状腺MII

正确答案：B 您选择的答案：

第24题 男性，28岁，心慌、怕热、多汗、消瘦、易饿4个月，甲状腺弥漫性I度肿大，血TSH降低、B和L增高，诊为甲亢。他巴唑每天30mg，20天后血白细胞 $2.2 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞 $1.0 \times 10^9/L$ 。甲亢的下一步治疗宜选

- A. 他巴唑与升白细胞药合用
- B. 改用丙基硫氧嘧啶
- C. 白细胞恢复正常后立即手术治疗
- D. 核素¹³¹I治疗
- E. 他巴唑剂量减半再用

正确答案：C 您选择的答案：

二、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第25-27题

男。35岁，消瘦、乏力、怕热、手颤2个月，夜间突然出现双下肢软瘫。急诊查：神志清，血压140/80mmHg。心率：108次/分，律齐，甲状腺轻度增大、无血管杂音。

1. 导致病人双下肢软瘫的直接原因可能是

- A. 脑栓塞
- B. 运动神经元病
- C. 重症肌无力
- D. 呼吸性碱中毒

- E. 血钾异常
2. 为明确诊断，应首先进行的检查项目是
A. 头颅CT、血糖测定
B. 肌电图及血电解质测定
C. 胸部CT及血抗乙酰胆碱受体抗体测定
D. 血气分析及血电解质测定
E. 血电解质测定及甲状腺功能测定
3. 此病人的急诊处理应
A. 螺内酯(安体舒通)治疗
B. 纠正电解质紊乱
C. 静脉滴注氯化钾及胰岛素
D. 吡啶斯的明和皮质激素治疗
E. 脱水降颅压治疗
正确答案：EEB 您选择的答案：

第28-30题

女性，35岁，颈前区肿块10年，近年来易出汗、心悸，渐感呼吸困难。体检：晨起心率104次/分，BP[20 / 60mmHg；无突眼，甲状腺 度肿大，结节状，心电图示：窦性心律不齐。

1. 初步诊断最可能是
A. 原发性甲亢
B. 单纯性甲状腺肿
C. 继发性甲亢
D. 桥本甲状腺炎
E. 亚急性甲状腺炎
2. 确诊主要根据
A. 颈部CT
B. 血T3、T4值
C. 甲状腺B超
D. 颈部X线检查
E. MRI
3. 最佳的治疗方法是
A. 内科药物治疗
B. 甲状腺大部切除术
C. 甲状腺全切术
D. 同位素治疗
E. 外放射治疗

正确答案：ABB 您选择的答案：

历年试题3 内科学 第四章 慢性肺源性心脏病

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 女性，60岁，反复咳嗽、咳痰25年，心悸、气促、下肢间歇性水肿3年，病情加重伴畏寒发热1周入院。体检：T38℃，呼吸急促，口唇发绀，双肺叩诊过清音，中下肺有湿啰音，心率110次/分，心律齐，无杂音，双下肢重度水肿。7. 假设病情仍继续恶化，出现昏睡或昏迷，血气分析 $P_{aO_2} 6.7 \text{ kPa (50 mmHg)}$ ， $P_{aCO_2} 10.7 \text{ kPa (80 mmHg)}$ 。此时首先考虑的合并症为

- A. ARDS
- B. 脑出血
- C. 肺性脑病
- D. 感染中毒性脑病
- E. 脑栓塞

正确答案：C 您选择的答案：

第2题 男性，67岁，肺源性心脏病急性加重期患者。血气分析： $pH 7.25$ ， $P_{aCO_2} 9.3 \text{ kPa (70 mmHg)}$ ， $HC0_3^- 30 \text{ mmol/L}$ ；对其酸碱失衡的治疗措施应为

- A. 静脉滴注盐酸精氨酸
- B. 静脉滴注5%碳酸氢钠
- C. 改善通气功能
- D. 补充氯化钾
- E. 给予利尿剂

正确答案：C 您选择的答案：

第3题 肺心病患者出现心室颤动、心脏骤停以致突

- A. 合并脑血管意外
- B. 急性广泛心肌梗死
- C. 急性严重心肌缺氧
- D. 右心功能不全
- E. 左心功能不全

正确答案：C 您选择的答案：

第4题 男性，58岁，反复咳嗽、咳痰15年，心悸、气急3年。体检：双肺叩诊呈过清音，呼吸音减弱，肺底部有湿啰音，剑突下心脏搏动明显，该处可闻及3/6级收缩期杂音，肺动脉瓣区第二音亢进。该例最可能的诊断为

- A. 慢支+肺气肿
- B. 慢支+风湿性心瓣膜病
- C. 慢支+冠心病
- D. 慢支+肺气肿+肺心病
- E. 慢性支气管炎(慢支)

正确答案：D 您选择的答案：

第5题 男性，65岁，反复咳嗽、咳痰20年，1周前受凉后畏寒、发热、咳脓痰、气急。体检：体温37.5℃，呼吸急促，双肺呼吸音减弱，有较多湿啰音，下肢轻度水肿。最主要的治疗措施是

- A. 给予止咳祛痰药
- B. 控制肺部感染
- C. 应用利尿剂消肿
- D. 低浓度持续吸氧
- E. 给予解痉平喘药

正确答案：B 您选择的答案：

第6题 治疗肺心病心力衰竭的首要措施是

- A. 使用小剂量强心剂
- B. 卧床休息、低盐饮食
- C. 使用小剂量作用缓和的利尿剂
- D. 应用血管扩张剂减轻心脏负荷
- E. 积极控制感染和改善呼吸功能

正确答案：E 您选择的答案：

第7题 慢性肺心病患者提示右心功能不全的主要体征是

- A. 肺动脉瓣区第二心音(P2)亢进
- B. 肝颈静脉回流征阳性
- C. 心脏向左扩大
- D. 双下肢水肿
- E. 肝大，触痛阳性

正确答案：B 您选择的答案：

第8题 女性，55岁，为慢性阻塞性肺疾病(COPD)气肿型患者。近年来轻微活动即感气急，咳嗽轻，咳痰少。血气分析： $P_{aO_2} 9.3 \text{ kPa (70 mmHg)}$ ， $P_{aCO_2} 4.8 \text{ kPa (36 mmHg)}$ 。7. 该COPD患者病情发展已出现

- A. Ⅰ型呼吸衰竭
- B. Ⅱ型呼吸衰竭
- C. 低氧血症
- D. 高碳酸血症
- E. 以上都不是

正确答案：@ 您选择的答案：

第9题 女性，55岁，为慢性阻塞性肺疾病(COPD)气肿型患者。近年来轻微活动即感气急，咳嗽轻，咳痰少。血气分析：PaO₂9.3kPa(70mmHg)PaCO₂4.8kPa(36mmHg)。2. 根据血气分析结果，该患者的呼吸功能障碍为

- A. 通气和换气功能障碍并存
- B. 肺泡膜增厚所致弥散功能降低
- C. 通气/血流比例降低
- D. 换气功能障碍
- E. 通气功能障碍

正确答案：D 您选择的答案：

二、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第10-13题

女性，60岁，反复咳嗽、咳痰25年，心悸、气促、下肢间歇性水肿3年，病情加重伴畏寒发热1周入院。体检：T38℃，呼吸急促，口唇发绀，双肺叩诊过清音，中下肺有湿啰音，心率110次/分，心律齐，无杂音，双下肢重度水肿。

1. 该病例最适当的诊断应为
- A. 慢性支气管炎(慢支)
 - B. 慢支+肺气肿
 - C. 慢支+肺气肿+肺心病
 - D. 慢性阻塞性肺疾病
 - E. 慢支+肺气肿+心肌病

2. 为明确诊断首选的检查是

- A. 胸部X线检查
 - B. 心电图检查
 - C. 动脉血气分析
 - D. 痰培养及药敏试验
 - E. 血胆固醇和甘油三酯测定
3. 主要治疗措施成为
- A. 控制感染与改善呼吸功能
 - B. 祛痰与止咳
 - C. 解痉与平喘
 - D. 低浓度持续吸氧
 - E. 给予利尿剂和强心剂

4. 假设该病例呼吸困难突然进一步加重，右肺呼吸音明显较前减弱，应立即进行的检查是

- A. 胸部X线
- B. 心电图
- C. 动脉血气分析
- D. 肺功能
- E. 胸腔B超

正确答案：CAAA 您选择的答案：

第14-16题

- A. 肺泡毛细血管急性损伤
 - B. 支气管肺感染和阻塞
 - C. 肺弥散功能障碍
 - D. 肺动脉高压
 - E. 肺性脑病
7. 肺心病发病的主要机制是
8. 肺心病出现精神障碍主要见于
9. 慢性肺心病引起肺动脉高压最主要的原因是
- A. 血液粘稠度增加
 - B. 血容量增加
 - C. 慢性炎症所致的肺动脉狭窄
 - D. 高碳酸血症
 - E. 缺氧性肺血管收缩

正确答案：DEE 您选择的答案：

历年试题3 内科学 第五十二章 原虫感染

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 男，32岁，10天来腹痛、腹泻，每日大便4~6次，呈暗红色果酱样。体检右下腹压痛。粪便镜检红细胞(+++)，白细胞(+)，白细胞为 $9.1 \times 10^9/L$ ，红细胞 $3.7 \times 10^2/L$ 。对本例诊断最有参考价值的实验室检查是

- A. 粪便涂片检菌
- B. 粪便镜检溶组织内阿米巴滋养体
- C. 粪便培养致病菌
- D. 粪便镜检溶组织内阿米巴包囊
- E. 粪便镜检寄生虫卵

正确答案：B 您选择的答案：

第2题 用于防止疟疾复发及传播的药物是

- A. 奎宁
- B. 氯喹
- C. 伯氨喹
- D. 乙胺嘧啶
- E. 青蒿素

正确答案：C 您选择的答案：

第3题 30岁男性农民，腹痛、腹泻半个月，大便4~8次/天，便量多，为暗红色，有腥臭味，肉眼可见血液及粘液，患者无发热，右下腹隐痛。粪便镜检：WBC10~15个/HP，RBC满视野，该患者最可能的诊断是

- A. 细菌性痢疾
- B. 伤寒合并肠出血
- C. 血吸虫病
- D. 溃疡性结肠炎
- E. 阿米巴痢疾

正确答案：E 您选择的答案：

第4题 疟疾病人的周围血液检查显示

- A. 血小板增多
- B. 网织红细胞减少
- C. 白细胞总数明显升高
- D. 大单核细胞减少
- E. 红细胞减少

正确答案：E 您选择的答案：

第5题 溶组织内阿米巴的特点是

- A. 在病变组织中可发现包囊
- B. 可在组织中形成小滋养体
- C. 包囊可传染他人
- D. 滋养体抵抗力强
- E. 各期溶组织内阿米巴都可致病

正确答案：C 您选择的答案：

第6题 26岁男患者，家住沈阳，于12月突然发病，表现为发冷、寒战、高热、大汗后而缓解，隔日发作一次，已10天。体检：脾肋下1cm，余未见异常，末梢血化验：WBC $5.0 \times 10^9/L$ ，N0.68，L0.32， $100 \times 10^9/L$ ，血培养(一)。患者同年8月曾去海南旅游半个月。该患者发热最可能的原因是

- A. 伤寒
- B. 急性血吸虫病
- C. 败血症
- D. 急性粒细胞型白血病
- E. 疟疾

正确答案：E 您选择的答案：

第7题 引起恶性疟疾发作不规则的主要原因是

- A. 粘附在血管内的疟原虫再度侵犯新的红细胞
- B. 疟原虫释放毒素
- C. 潜伏在肝脏中的裂殖子侵犯红细胞
- D. 恶性疟原虫在红细胞内发育时间不一致
- E. 恶性疟原虫侵犯各期红细胞

正确答案：D 您选择的答案：

第8题 治疗肠内外各型阿米巴病首选药物是

- A. 吐根碱
- B. 喹碘仿
- C. 卡巴砷
- D. 灭滴灵
- E. 氯喹

正确答案：D 您选择的答案：

第9题 间日疟的典型发作中，不存在

- A．大汗期
- B．间歇期
- C．寒战期
- D．前驱期
- E．高热期

正确答案：B 您选择的答案：

第10题 主要用于预防疟疾的药物是

- A．青蒿素
- B．伯氨喹
- C．奎宁
- D．氯喹
- E．乙胺嘧啶

正确答案：D 您选择的答案：

第11题 临床上最简便的用于确诊疟疾的实验室检查方法是

- A．聚合酶链反应测定血中疟原虫DNA
- B．外周血液检查发现贫血和嗜酸性粒细胞增多
- C．血或骨髓涂片检查疟原虫
- D．间接红细胞凝集试验
- E．间接荧光抗体测定

正确答案：C 您选择的答案：

第12题 溶组织内阿米巴滋养体的特征是

- A．大滋养体可形成包囊
- B．大滋养体具有感染性
- C．对外界抵抗力强
- D．小滋养体有致病力
- E．可吞噬红细胞

正确答案：E 您选择的答案：

第13题 溶组织内阿米巴的致病型是

- A．大滋养体
- B．裂殖体
- C．小滋养体
- D．包囊
- E．配子体

正确答案：A 您选择的答案：

历年试题3 内科学 第五十三章 蠕虫感染

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 下列均是皮下及肌肉囊虫病的特点，除了
A．数量由数个至数百个不等
B．多在躯干及四肢
C．皮下可扪及直径约0.5~1.0cm大小椭圆形结节
D．皮下小结与周围组织有明显粘连
E．结节可先后分批出现

正确答案：D 您选择的答案：

第2题 脑猪囊尾蚴病的临床表现复杂多样，但最常见的临床类型是
A．混合型
B．脊髓型
C．脑实质型
D．软脑膜型
E．脑室型

正确答案：C 您选择的答案：

第3题 男性，30岁，因反复出现癫痫大发作半年余，近一月来智力有所下降，经CT检查诊断为脑囊虫病。应首先考虑的临床类型是
A．脊髓型
B．软脑膜型
C．脑实质型
D．脑室型
E．混合型

正确答案：C 您选择的答案：

第4题 晚期血吸虫病中，最常见的临床类型是
A．侏儒型
B．脑型
C．肺型
D．巨脾型
E．腹水型

正确答案：D 您选择的答案：

第5题 血吸虫虫卵引起的病变主要发生在
A．肺和肠
B．大肠壁和肝脏
C．肠系膜静脉
D．肝和脾
E．门静脉

正确答案：B 您选择的答案：

第6题 对眼猪囊尾蚴病患者首选的治疗是
A．伯氨喹
B．氯喹
C．阿苯达唑
D．吡喹酮
E．手术

正确答案：E 您选择的答案：

历年试题3 内科学 第五十章 细菌感染

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 中毒型细菌性痢疾多见于

- A. 8~10岁营养状况较差的儿童
- B. 12~14岁青春期儿童
- C. 低出生体重儿
- D. 3-6个月体格健壮的婴幼儿
- E. 2-7岁体格健壮的小儿

正确答案：E 您选择的答案：

第2题 流行性脑脊髓膜炎时的脓液主要聚集于

- A. 软脑膜本身的疏松纤维组织间
- B. 蛛网膜与硬脑膜之间的腔隙
- C. 软脑膜与脑皮质之间的腔隙
- D. 蛛网膜本身的疏松纤维组织间
- E. 蛛网膜与软脑膜之间的腔隙

正确答案：E 您选择的答案：

第3题 患者张某，疑似伤寒入院，两次取血做肥达反应的结果如下：入院后第四天结果，TH1：80，TO1：80，TA、TB、TC140；入院后第十二天，TH、TO1：320，TA、TB、TC1：40，可诊断为

- A. 甲型副伤寒
- B. 回忆反应
- C. 乙型副伤寒
- D. 沙门菌早期感染
- E. 伤寒

正确答案：E 您选择的答案：

第4题 5岁男孩，发热1天，腹泻6~7次，为黏液性脓血便，腹痛伴里急后重，病前吃过未洗的黄瓜，大便常规检查：黏液便，红白细胞满视野。诊断为细菌性痢疾。其类型属于

- A. 中毒型
- B. 普通型
- C. 轻型
- D. 重型
- E. 慢性型

正确答案：B 您选择的答案：

第5题 伤寒患者最具有特征性的病理改变部位是在

- A. 乙状结肠
- B. 心、脑
- C. 回肠末端
- D. 升结肠
- E. 肝、脾

正确答案：C 您选择的答案：

第6题 男，22岁，民工，近4天来发热、头晕、头痛、食欲减退。体检皮肤有少量散在淡红色斑丘疹，脾于侧位肋下1cm。外斐反应，变形杆菌OX19集试验阳性。本例的诊断为

- A. 伤寒
- B. 流行性出血热
- C. 感冒
- D. 猩红热
- E. 地方性斑疹伤寒

正确答案：E 您选择的答案：

第7题 21岁，男性，持续发热，腹泻一周，2~3次/日，便中有粘液。右下腹隐痛，头疼、恶心，吐一次，伴食欲不振。体检：T39℃，神志清，表情淡漠，肝肋下2cm脾肋下1cm，末梢血WBC2.9×10⁹/L，N1080，L0.20，粪便常规检查WBC(+)，RBC少许，未见虫卵，粪便培养无致病菌生长，此阶段该病例确诊最关键的检查为

- A. 骨髓穿刺常规检查
- B. 血培养致病菌
- C. 肥达反应
- D. 粪便检查阿米巴原虫
- E. 粪便细菌培养

正确答案：B 您选择的答案：

第8题 目前国内最常见的细菌性痢疾病原菌是

- A. 福氏痢疾杆菌
- B. 舒氏痢疾杆菌
- C. 鲍氏痢疾杆菌
- D. 志贺氏痢疾杆菌
- E. 宋内氏痢疾杆菌

正确答案：A 您选择的答案：

第9题 急性细菌性痢疾病变最显著的部位是

- A. 回肠末端
- B. 整个结肠
- C. 升结肠
- D. 直肠与乙状结肠
- E. 降结肠

正确答案：D 您选择的答案：

第10题 细菌性痢疾病理改变的部位是

- A. 直肠和乙状结肠
- B. 升结肠
- C. 回肠末端
- D. 盲肠
- E. 降结肠

正确答案：A 您选择的答案：

第11题 细菌性痢疾病理改变最主要的部位是

- A. 直肠和乙状结肠
- B. 降结肠
- C. 盲肠
- D. 升结肠
- E. 回肠末端

正确答案：A 您选择的答案：

第12题 霍乱弧菌的主要致病物质是

- A. 透明质酸酶
- B. 霍乱内毒素
- C. 霍乱肠毒素
- D. 腺苷酸环化酶
- E. 蛋白水解酶

正确答案：B 您选择的答案：

第13题 一伤寒患者经治疗后体温渐降，但未降至正常，此后体温再次升高，血培养阳性，属于

- A. 再感染
- B. 再燃
- C. 重复感染
- D. 复发
- E. 混合感染

正确答案：B 您选择的答案：

第14题 5岁男孩，高热1天，腹泻6~7次，为粘液性脓血便，腹痛伴里急后重，反复惊厥，逐渐出现昏睡、神志不清，病前吃过未洗的黄瓜，诊断为细菌性痢疾。其临床类型属于

- A. 中毒型
- B. 重型
- C. 普通型
- D. 轻型
- E. 慢性型

正确答案：A 您选择的答案：

第15题 典型霍乱患者，发病后最先出现的常见症状是

- A. 腹部绞痛
- B. 声音嘶哑
- C. 畏寒、发热
- D. 剧烈腹泻，继之呕吐
- E. 腓肠肌痉挛

正确答案：D 您选择的答案：

第16题 诊断钩端螺旋体病的血清学检查方法为

- A. 红细胞溶解试验
- B. 肥达试验
- C. 外斐试验
- D. 显微镜凝集溶解试验
- E. 补体结合试验

正确答案：D 您选择的答案：

第17题 除哪项外均是霍乱患者泻吐期的临床特点

- A. 粪便以黄水便或清水便为多
- B. 大便每日数次至10数次或无法计数
- C. 多数腹泻伴有里急后重
- D. 粪便有鱼腥味，镜检无脓细胞
- E. 多数以剧烈腹泻开始，继以呕吐

正确答案：C 您选择的答案：

第18题 用青霉素G治疗钩端螺旋体病时，应注意

- A. 疗程10天以上
- B. 首次给予小剂量
- C. 与链霉素联合应用
- D. 与磺胺嘧啶联合应用
- E. 首次给予大剂量

正确答案：B 您选择的答案：

第19题 9岁，学生，1月底因突起高热、剧烈头痛、恶心伴非喷射性呕吐1次入院。体检：神清，全身皮肤散在瘀点、瘀斑，颈项抵抗，心率120次/分，两肺无异常，腹软无压痛。化验检查：血白细胞计数 $20 \times 10^9/L$ 。中性粒细胞0.89

- A. 伤寒
- B. 结核性脑膜炎
- C. 流行性脑脊髓膜炎
- D. 流行性乙型脑炎
- E. 病毒性脑炎

正确答案：C 您选择的答案：

第20题 男性，5岁，持续发热15天，体温 $39-39.5$ ，伴腹泻每日3~5次。体检：神萎，心率72次/分，肝右肋下2cm，脾肋下1.5cm，血常规检查：WBC $3.0 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞60%，淋巴细胞40%，嗜酸粒细胞0，ALT200U/L，血清抗-HBs阳性。该病例最可能的诊断是

- A. 急性细菌性痢疾
- B. 钩端螺旋体病
- C. 急性乙型肝炎
- D. 急性血吸虫病
- E. 伤寒

正确答案：E 您选择的答案：

第21题 23岁，农民，因发热、头痛、全身酸痛、软弱无力一周于9月4日入院。当天起出现心慌、气促，体温 39.6 。体检：面色苍白，腓肠肌压痛，心率124次/分，呼吸36次/分。肺部散在湿性啰音。血象：血白细胞计数 $9.0 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞0.76，淋巴细胞0.24。X线摄片示：两肺纹理增多，有散在性点状阴影。本病例最可能的诊断是

- A. 粟粒性肺结核
- B. 支气管肺炎
- C. 流行性出血热
- D. 钩端螺旋体病
- E. 急性血吸虫病

正确答案：D 您选择的答案：

第22题 流行性脑脊髓膜炎败血症期患者皮肤瘀点的主要病理基础是

- A. 小血管炎致局部坏死及栓塞
- B. 播散性血管内凝血(DIC)
- C. 血管脆性增强
- D. 凝血功能障碍
- E. 血小板减少

正确答案：A 您选择的答案：

第23题 男，28岁。船民，昨晚进食海蟹一只，晨起腹泻稀水便，10小时内排便20余次，量多。水样，无臭味，中午呕吐3~4次，初起水样，后为米泔水样，发病后无排尿。就诊时呈重度脱水征，神志淡漠，BP80/50mmHg。下列检查均有

- A. 大便涂片革兰染色镜检
- B. 血培养
- C. 血清凝集试验
- D. 大便悬滴镜检
- E. 大便碱性蛋白胨增菌培养

正确答案：B 您选择的答案：

第24题 男，柏岁，4个月前发热、腹痛、腹泻，服药1天好转，此后腹泻反复发作，多于劳累及进食生冷食物后，大便5~6次/日，稀便有粘液，有腹痛、里急后重。体检：左下腹压痛。大便镜检WBC20~30/HP、RBC5~10/HP。发现有

- A. 急性菌痢
- B. 阿米巴痢疾
- C. 肠结核
- D. 慢性血吸虫病
- E. 慢性菌痢

正确答案：E 您选择的答案：

第25题 男。25岁，持续发热10天，开始为 38 左右，5天后持续高热 $39-40$ ，伴腹胀和轻度腹泻。体检：体温 40 ，呼吸26次/分，脉搏86次/分，精神淡漠。两肺无异常。心率86次/分，律齐，第一心音偏低。腹胀、无压痛，肝右肋下2cm，软，脾左肋下1cm。血白细胞 $3.0 \times 10^9/L$ ，中性75%，嗜酸粒细胞0%，单核5%，淋巴20%。最

可能的诊断是

- A. 菌痢
- B. 伤寒、副伤寒
- C. 结缔组织病
- D. 结核病
- E. 风湿热

正确答案：B 您选择的答案：

第26题 霍乱弧菌的致病因素不包括

- A. 肠毒素
- B. 鞭毛
- C. 菌毛
- D. 内毒素
- E. 荚膜

正确答案：E 您选择的答案：

第27题 男性，16岁，发热10天伴食欲减退，软弱。体检，体温39.6℃，脉搏74次/分，肝肋下2.0cm，脾肋下1.0cm。WBC2.6×10⁹/L；N0.85，L0.14，嗜酸粒细胞0.01，临床上拟诊为伤寒，为确定诊断对该患者应首选下列哪一种

- A. 尿液培养
- B. 肥达氏反应
- C. 粪便培养
- D. 胆汁培养
- E. 血培养

正确答案：E 您选择的答案：

第28题 用青霉素治疗下列疾病的过程中，首剂肌注后可出现赫氏反应的是

- A. 钩体病
- B. 白喉
- C. 猩红热
- D. 流脑
- E. 败血症

正确答案：A 您选择的答案：

二、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第29-30题

23岁男性农民，11月份因发热、头痛、呕吐三天为主诉入院。体检：面颈部潮红，双腋下少许出血点。化验：尿常规蛋白(++)，红细胞3~10个/HP，末梢血象：WBC23.0×10⁹/L，异型淋巴10%，PLT48×10⁹/L

1. 该患者的诊断可能为

- A. 流行性脑脊髓膜炎
- B. 斑疹伤寒
- C. 流行性出血热
- D. 钩端螺旋体病
- E. 败血症

2. 住院两天后，热退但症状加重，出血点增加，四肢厥冷，脉搏细弱，血压，80/60mmHg，此时对该患者的治疗原则是

- A. 以扩容为主
- B. 以应用血管活性药物为主
- C. 以应用激素为主
- D. 以纠正酸中毒为主
- E. 以输入胶体液为主

正确答案：CA 您选择的答案：

第31-32题

女性，30岁，持续发热10天，体温呈稽留热。体检：精神萎靡，反应淡漠，体温39.5℃，心率76次/分，脉率70次/分，肝肋下1.5cm，脾肋下2cm，WBC1.4×10⁹/L，N0.40，L0.60，肥达反应01:80(+)，HI:160(+)，ALT180U/L，总胆红素22.2μmol/L，HBsAg阴性。

1. 该病例最可能的诊断是

- A. 急性黄疸性肝炎
- B. 钩端螺旋体病
- C. 伤寒合并中毒性肝炎
- D. 病毒性肝炎合并胆道感染
- E. 伤寒

2. 为确定诊断应进行检查的项目是

- A. 血培养
- B. 甲肝病毒抗体
- C. 戊肝病毒抗体
- D. 丙肝病毒抗体
- E. 粪便培养

正确答案：CA 您选择的答案：

第33-35题

男，29岁，3天来发热、头痛、乏力、食欲减退，行走时小腿疼痛，伴有咳嗽。体检：体温39.8℃，面色潮红，结膜充血，视力正常，双侧腹股沟淋巴结肿大，腓肠肌压痛明显，无脑膜刺激征及病理反射。肝肋下1.5cm。白细胞 $12.7 \times 10^9/L$ ， $NO.74$ ， $LO.21$ ， $EO.03$ ， $MO.02$ 。发病前常参加水田劳动

1. 对确诊有意义的实验室检查是

- A. 肥达反应
- B. 外斐反应
- C. 钩端螺旋体凝集溶解试验
- D. 血清出血热IgM抗体
- E. 胸部X线检查

2. 首选的治疗药物是

- A. 青霉素G
 - B. 磺胺嘧啶
 - C. 吡喹酮
 - D. 阿苯达唑
 - E. 氟康唑
3. 病原治疗药物的应用原则是
- A. 静脉滴注大剂量
 - B. 开始时肌注小剂量
 - C. 疗程2周以上
 - D. 每日1只需用药1次
 - E. 退热后即可停药

正确答案：CAB 您选择的答案：

第36-39题

男性，22岁，既往有HBsAg阳性史。10天前无诱因发烧，体温逐渐上升，波动于37.5~39℃，近3天体温持续在38.5℃

395 不降，伴有食欲不振、乏力、腹胀及尿黄。查体：T39.5℃，P88次/分，BP：110/70mmHg，神清，表情淡漠，未见皮疹，巩膜轻度黄染，双肺未见异常，腹软，右下腹压痛(+)，肝右肋下2cm，脾未触及，肝浊音区不小，移动性浊音阴性，双下肢无浮肿。化验：WBC $3.5 \times 10^9/L$ ， $N60\%$ ， $L40\%$ ，血HBsAg(+)，抗HAV-IgG(+)。

1. 该患者最可能的诊断是

- A. 病毒性肝炎，乙型，慢性轻度
- B. 病毒性肝炎，甲型，急性黄疸型，乙肝表面抗原携带者
- C. 伤寒，病毒性肝炎，乙型，急性黄疸型
- D. 伤寒，病毒性肝炎，甲型，亚急性重型
- E. 伤寒，乙肝表面抗原携带者

2. 为确诊该病例，首选的检查是

- A. 肝功化验
- B. 肝炎病毒血清学
- C. 血培养
- D. 肥达反应
- E. 肝胆脾彩超

3. 病人治疗的首选方案是

- A. 卧床休息，保肝治疗
- B. 卧床休息避免用肝损伤药物，戒酒
- C. 用激素退热，减轻中毒症状
- D. 用喹诺酮类药物进行病原治疗
- E. 用干扰素治疗

4. 该患者可能发生的严重并发症是

- A. 心包炎
- B. 急性胆囊炎
- C. 肠出血、肠穿孔
- D. 支气管肺炎
- E. 肝昏迷

正确答案：ECDC 您选择的答案：

第40-41题

5岁患儿，且1月15日开始发热。伴头痛、恶心、呕吐一次，次日稀便三次。精神不振，抽搐一次。体检：急性热病容，嗜睡状，颈强(+)，克氏征(++)，血常规检查：WBC $15.0 \times 10^9/L$ ，脑脊液为无色透明，白细胞数 $100 \times 10^6/L$ ，中性80%

1. 该患者最可能的诊断是

- A. 中毒性菌痢
- B. 流行性脑脊髓膜炎(脑膜脑炎型)
- C. 结核性脑膜炎
- D. 流行性乙型脑炎
- E. 化脓性脑膜炎

2. 该患儿住院二天后，高热不退，反复抽搐，意识不清，呼吸节律不规律，双侧瞳孔不等大，此时重要的抢救措施是

- A. 立即应用脱水剂
- B. 立即应用呼吸兴奋剂
- C. 立即应用地塞米松
- D. 立即应用退热剂
- E. 立即应用镇静剂

正确答案：DA 您选择的答案：

第42-43题

男性，18岁，2天来发热伴腹痛、腹泻，每日10余次，初为稀便，后为粘液脓血便，伴里急后重，粪便常规检查WBC $15 \sim 20$ 个/HP，RBC $5 \sim 10$ 个/HP

1. 该患者诊断急性细菌性痢疾，其发病机理为

- A. 痢疾杆菌毒素对结肠粘膜的直接损害
 - B. 有侵袭力的菌株进入粘膜固有层，繁殖引起炎症溃疡
 - C. 痢疾杆菌在肠腔内大量繁殖引起肠溃疡病变
 - D. 结肠急性弥漫性、纤维蛋白渗出性炎症及溃疡
 - E. 特异性体质对细菌毒素产生强烈过敏反应
2. 该病例用抗生素治疗3天，症状好转即停药，有可能产生什么后果
- A. 病情加重，出现肠穿孔
 - B. 发生肠出血
 - C. 转为慢性菌痢
 - D. 发生癌变
 - E. 合并败血症

正确答案：BC 您选择的答案：

第44-45题

男性，30岁，农民。既往体健。7月2日来诊，腹泻2天，为水样便带少量粘液，量多，日十余次，相继呕吐数次。无发热、无腹痛。腓肠肌痉挛。体检：体温36.8，神志清，皮肤弹性差。脉细速，血压70/30mmHg。化验检查：大便镜检白细胞0~2/HP，血红蛋白160g/L，血白细胞计数 $12 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞0.78，淋巴细胞0.12，单核细胞0.10。

1. 最可能的诊断是

- A. 菌痢
- B. 急性肠炎
- C. 细菌性食物中毒
- D. 霍乱
- E. 轮状病毒感染

2. 本例治疗的关键环节是

- A. 抗菌治疗
- B. 抗病毒治疗
- C. 补充液体和电解质
- D. 低分子右旋糖酐扩容
- E. 首选升压药，纠正低血压

正确答案：DC 您选择的答案：

第46-47题

男性，12岁。昨晚进食海鲜，今晨开始畏寒、发热、腹痛，以左下腹甚，腹泻伴明显里急后重，大便8次，初为稀便，继之为粘液脓血便

1. 此病例的诊断是

- A. 急性细菌性痢疾轻型(不典型)
- B. 急性细菌性痢疾普通型(典型)
- C. 急性细菌性痢疾中毒型
- D. 慢性迁延性细菌性痢疾
- E. 急性胃肠炎

2. 对该病例首先采用的抗菌药物是

- A. 四环素
- B. 喹诺酮类
- C. 氯霉素
- D. 庆大霉素
- E. 呋喃唑酮

正确答案：BB 您选择的答案：

第48-49题

男性，30岁，发热10天，高达39.6，伴头痛，无咳嗽，无呕吐、腹泻，曾按“感冒”治疗，无好转。体检：贫血貌，表情淡漠，脉搏64次/分，双肺未见异常，肝肋下未及，脾肋下刚触及。血白细胞计数 $3.2 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞0.67，淋巴细胞0.33，胸片未见异常。

1. 最可能的诊断是

- A. 系统性红斑狼疮
- B. 淋巴瘤
- C. 恶性组织细胞病
- D. 伤寒
- E. 败血症

2. 对上述病例，首选治疗药物是

- A. 青霉素
- D. 利福平
- C. 喹诺酮类药物
- D. 头孢菌素类药物
- E. 磺胺类药物

正确答案：DC 您选择的答案：

三、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第50-51题

- A. 溃疡呈环形与肠的长轴垂直
- B. 溃疡呈长椭圆形与肠的长轴平行
- C. 溃疡呈烧瓶状口小底大
- D. 溃疡边缘呈堤状隆起
- E. 溃疡表浅呈地图状

1. 肠伤寒的肠溃疡特征

2. 细菌性痢疾的肠溃疡特征

正确答案：BE 您选择的答案：

第52-53题

- A．变质性炎
- B．浆液性炎
- C．纤维素性炎
- D．化脓性炎
- E．增生性炎

- 1．流行性脑脊髓膜炎的病变性质为
- 2．流行性乙型脑炎的病变性质为

正确答案：DA 您选择的答案：

历年试题3 内科学 第五章 支气管哮喘

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 女性，20岁，反复发作喘息、呼吸困难、咳嗽2年。体检：双肺散在哮鸣音，心脏无异常。下列检查结果中有助于明确诊断的是

- A．X线胸片显示肺纹理稍多
- B．最大呼气流量显著降低
- C．最大呼气中段流量降低
- D．一秒钟用力呼气容积降低
- E．支气管舒张试验阳性

正确答案：E 您选择的答案：

第2题 消除支气管哮喘气道炎症最有效的药物是

- A．色甘酸钠
- B．抗组织胺药
- C．抗生素
- D．糖皮质激素
- E．β₂受体激动剂

正确答案：D 您选择的答案：

第3题 女性，25岁。2小时前清扫室内环境时突然出现咳嗽、胸闷、呼吸困难，追问病史近3年来每年秋季常有类似发作。体检：两肺满布哮鸣音，心脏无异常。X线胸片显示心肺无异常。该例应诊断为

- A．混合性支气管哮喘
- B．内源性支气管哮喘
- C．外源性支气管哮喘
- D．慢性喘息型支气管炎
- E．心源性哮喘

正确答案：C 您选择的答案：

第4题 主要用于预防I型变态反应所致哮喘的药物是

- A．肾上腺素
- B．氨茶碱
- C．异丙肾上腺素
- D．特布他林
- E．色甘酸钠

正确答案：E 您选择的答案：

第5题 当支气管哮喘与心源性哮喘一时难以鉴别时，为缓解症状可使用的药物为

- A．氨茶碱
- B．吗啡
- C．呋塞米
- D．毛花甙丙
- E．肾上腺素

正确答案：A 您选择的答案：

第6题 女性，25岁。2小时前打扫室内清洁时突然出现咳嗽、胸闷、呼吸困难。追问病史近3年来每年秋季常有类似发作。体检：两肺满布哮鸣音，心脏无异常。X线胸片显示心肺无异常。该例诊断应为

- A．心源性哮喘
- B．支气管哮喘
- C．慢性阻塞性肺疾病(B型)
- D．慢性阻塞性肺疾病(A型)
- E．慢性喘息型支气管炎

正确答案：B 您选择的答案：

第7题 女性，30岁，喘息、呼吸困难发作1天多，过去有类似发作史。体检：气促、紫绀，双肺满布响亮的哮鸣音，心率120次/分，律齐，无杂音。院外已用过氨茶碱、特布他林治疗无效。对该例除立即吸氧外，首先应给予的治疗措施为

- A．二丙酸倍氯米松气雾吸入
- B．联合应用抗生素静脉滴注
- C．5%碳酸氢钠静脉滴注
- D．联合应用氨茶碱、特布他林静脉滴注
- E．琥珀酸氢化可的松静脉滴注

正确答案：E 您选择的答案：

第8题 支气管哮喘的本质是

- A．气道慢性炎症喘急型支气管炎
- B．一种自身免疫性疾病
- C．支气管平滑肌可逆性痉挛
- D．肥大细胞膜上M胆碱能受体功能亢进

E. 支气管平滑肌内 β_2 受体功能低下

正确答案：C 您选择的答案：

第9题 治疗哮喘持续状态有效的药物是

- A. 阿托品
- B. 地塞米松
- C. 头孢他啶
- D. 右旋糖苷40
- E. 度冷丁

正确答案：B 您选择的答案：

第10题 女性，20岁。反复发作呼吸困难、胸闷、咳嗽3年，每年秋季发作，可自行缓解，此次已发作半天症状仍继续加重而来就诊。体检：双肺满布哮鸣音，心率90次/分，律齐，无杂音。

4. [假设信息]应用足量解痉平喘药和糖皮质激素等治疗均无效，患者呼吸浅快、神志不清， PaO_2 6.7kPa(50mmHg)， Pa

C. $2 > 9.3$ kPa(70mmHg)。此时应采取的救治措施为

- A. 高浓度吸氧
- B. 甲基泼尼松龙静脉滴注
- C. 纠正水电解质和酸碱平衡紊乱
- D. 联合应用广谱抗生素静滴
- E. 气管插管正压机械通气

正确答案：E 您选择的答案：

第11题 主要用于预防支气管哮喘的药物是

- A. 特布他林
- B. 氨茶碱
- C. 色甘酸钠
- D. 肾上腺素
- E. 异丙肾上腺素

正确答案：C 您选择的答案：

第12题 咳嗽变异性哮喘正确诊断的依据是

- A. 咳嗽反复发作>2周
- B. 支气管扩张剂能缓解
- C. 抗生素治疗有效
- D. 无家族过敏史
- E. 中性粒细胞增高

正确答案：B 您选择的答案：

第13题 女，35岁，支气管哮喘重度发作2天，使用氨茶碱，沙丁胺醇，大剂量激素治疗无效。体检：呼吸浅快。口唇发绀，神志不清。双肺哮鸣音较弱，血气分析： PaO_2 50mmHg， PaCO_2 70mmHg，进一步救治措施应为

- A. 气管插管，正压机械通气
- B. 静脉推注地塞米松
- C. 联合应用抗生素静脉滴注
- D. 静脉滴注5%碳酸氢钠
- E. 给予高浓度吸氧

正确答案：A 您选择的答案：

二、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第14-16题

男性，42岁，自幼起咳嗽、咳痰、喘息，多为受凉后发作，静滴“青霉素”可缓解，10~20岁无发作，20岁后又有一次大发作，发作时大汗淋漓、全身发紫、端坐不能平卧，肺部可闻及哮鸣音，静脉推注“氨茶碱、地塞米松”可完全缓解。自后反复出现夜间轻微喘息，每周发作3次以上，不能入睡，PEF变异率为35%。查体：双肺听诊未闻及干湿啰音，心率89次/分。

1. 最可能的诊断是

- A. 支气管哮喘急性发作期
- B. 支气管哮喘非急性发作期
- C. 先天性心脏病急性左心衰竭
- D. 肺源性心脏病心功能不全
- E. 喘息型慢性支气管炎急性发作

2. 根据病情程度选择药物治疗最佳方案是

- A. 每日吸入氨茶碱+静滴 β_2 受体激动剂
- B. 每日雾化吸入 β_2 受体激动剂+静滴氨茶碱
- C. 每日雾化吸入抗胆碱药+口服 β_2 受体激动剂
- D. 每日吸入糖皮质激素+吸入 β_2 受体激动剂
- E. 每日定量吸入糖皮质激素+静滴 β_2 受体激动剂

3. 为了提高疗效，减少复发，教育患者需掌握

- A. 正确使用气雾剂的方法
- B. 哮喘患者不发作可不用药
- C. 抗感染药治疗可根治哮喘

- D. 哮喘患者不发作不能使用激素
E. 哮喘者需长期使用 β 受体激动剂

正确答案：BDA 您选择的答案：

第17-18题

女，30岁。反复发作性呼吸困难、胸闷2年。3天前受凉后咳嗽，咳少量脓痰，接着出现呼吸困难、胸闷，并逐渐加重。体检：无发绀，双肺广泛哮鸣音，肺底部有湿啰音

9. 最可能的诊断为
A. 外源性支气管哮喘
B. 内源性支气管哮喘
C. 慢性喘息性支气管炎
D. 慢性阻塞性肺心病(COPD)
E. 心源性哮喘
1. 表明气道阻塞具有可逆性的是
A. 一秒钟用力呼气容积(FEV₁)<60%
B. 最大呼气流量(PEF)<60%
C. 吸入沙丁胺醇后FEV₁增加率>15%
D. 吸入二丙酸倍氯米松后FEV₁增加率>15%
E. 支气管激发试验阳性

正确答案：AE 您选择的答案：

第19-20题

女性，30岁，反复发作性呼吸困难，胸闷2年，3天前受凉后咳嗽，咳少量脓痰。接着出现呼吸困难、胸闷，并逐渐加重。体检：无发绀，双肺广泛哮鸣音，肺底部少许湿啰音。

4. 该病例最可能的诊断是
A. 支气管哮喘
B. 心源性哮喘
C. 慢性喘息型支气管炎
D. 慢性阻塞性肺疾病(红喘型)
E. 慢性阻塞性肺疾病(紫肿型)
5. 表明气道阻塞具有可逆性的检查结果是
A. 一秒钟用力呼气容积(FEV₁)>60%预计值
B. 最大呼气流量(PEF)60%预计值
C. 吸入沙丁胺醇后FEV₁增加率>15%
D. 吸入倍氯米松后FEV₁增加率>15%
E. 支气管激发试验阳性

正确答案：AC 您选择的答案：

第21-23题

男性，24岁，反复发作性咳嗽、喘息10年余。再发加重3小时。查体见意识模糊，口唇发绀，双肺呼吸音明显减低，未闻及干湿啰音，心率128次/分，可触及奇脉。

6. 最可能的诊断是
A. 支原体肺炎
B. 支气管哮喘
C. 支气管内膜结核
D. 原发性支气管肺癌
E. 喘息型慢性支气管炎
7. 为进一步明确诊断及判断病情程度最有意义的检查是
A. 痰细胞学
B. 胸部CT
C. 动脉血气分析
D. PEF占预计值%
E. 皮肤过敏原试验
8. 诊断及病情程度确定后应采取的最有效措施是
A. 甲基强的松龙静滴+氨茶碱静滴+氧疗
B. 特布他林口服+氨茶碱口服+氧疗
C. 亚胺培南静滴+氨茶碱静滴+氧疗
D. 沙丁胺醇吸入+氨茶碱口服+氧疗
E. 倍氯米松吸入+氨茶碱静滴+氧疗

正确答案：BCA 您选择的答案：

三、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第24-25题

男性，42岁，自幼起咳嗽、咳痰、喘息，多为受凉后发作，静滴“青霉素”可缓解，10~20岁无发作，20岁后又有一次大发作，发作时大汗淋漓、全身发紫、端坐不能平卧，肺部可闻及哮鸣音，静脉推注“氨茶碱、地塞米松”可完全缓解。自后反复出现夜间轻微喘息，每周发作3次以上，不能入睡，PEF变异率为35%。查体：双肺听诊未闻及干湿啰音，心率89次/分。

5. 最可能的诊断是
A. 支气管哮喘急性发作期
B. 支气管哮喘非急性发作期
C. 先天性心脏病急性左心衰竭
D. 肺源性心脏病心功能不全
E. 喘息型慢性支气管炎急性发作
6. 根据病情程度选择药物治疗最佳方案是

- A. 每日吸入氨茶碱+静滴 β_2 受体激动剂
- B. 每日雾化吸入 β_2 受体激动剂+静滴氨茶碱
- C. 每日雾化吸入抗胆碱药+口服 β_2 受体激动剂
- D. 每日吸入糖皮质激素+吸入 β_2 受体激动剂
- E. 每日定量吸入糖皮质激素+静滴 β_2 受体激动剂

正确答案：BD 您选择的答案：

第26-28题

女性，20岁。反复发作呼吸困难、胸闷、咳嗽3年，每年秋季发作，可自行缓解，此次已发作半天症状仍继续加重而来就诊。体检：双肺满布哮鸣音，心率90次/分，律齐，无杂音。

1. 该患者的诊断应首先考虑为

- A. 慢性支气管炎
- B. 阻塞性肺气肿
- C. 慢性支气管炎并肺气肿
- D. 支气管哮喘
- E. 心源性哮喘

2. 对该患者的治疗应选用的药物为

- A. β_2 受体激动剂
- B. β_2 受体阻滞剂
- C. α 受体激动剂
- D. α 受体阻滞剂
- E. 抗生素类药物

3. [假设信息]给予足量特布他林(博利康尼)和氨茶碱治疗1天多病情仍无好转，呼吸困难严重，口唇紫绀。此时应采取

- A. 原有药物加大剂量再用24小时
- B. 应用琥珀酸氢化可的松静脉滴注
- C. 大剂量二丙酸倍氯米松气雾吸入
- D. 静脉滴注第三代头孢菌素
- E. 静脉滴注5%碳酸氢钠

正确答案：DAB 您选择的答案：

第29-30题

- A. 支原体肺炎
- B. 肺炎链球菌肺炎
- C. 慢性支气管炎急性发作期
- D. 支气管哮喘
- E. 支气管扩张症

1. 病变肺部叩诊浊音，语颤增强，闻及支气管呼吸音，常见于

2. 发作时两肺广泛哮鸣音，缓解后哮鸣音消失，常见于

正确答案：BD 您选择的答案：

习题集 内科学 支气管扩张症

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 结核引起的支气管扩张啰音多见于

- A 左肺下部
- B 右肺下部
- C 肩胛间区
- D 右肺中叶区
- E 舌叶区

正确答案：C 您选择的答案：

第2题 支气管扩张最有意义的体征是

- A 局限性哮鸣音
- B 局限性湿啰音
- C 贫血貌
- D 消瘦
- E 杵状指

正确答案：B 您选择的答案：

第3题 对支气管扩张最有确诊价值的检查是

- A 胸透
- B 胸正、侧位片
- C 肺动脉造影术
- D 支气管造影术
- E 肺CT检查

正确答案：D 您选择的答案：

第4题 支气管扩张症最有意义的体征是

- A 贫血貌
- B 杵状指
- C 局限性哮鸣音
- D 局限性湿啰音
- E 消瘦

正确答案：D 您选择的答案：

第5题 支气管扩张最常见的原因是

- A 肺结核
- B 肿瘤压迫
- C 肺囊性纤维化
- D 严重的支气管肺炎感染和支气管阻塞
- E 支气管内结石

正确答案：D 您选择的答案：

第6题 干性支气管扩张是指

- A 干咳为主
- B 仅有早晨咳嗽及咳痰
- C 纤维支气管镜检见支气管黏膜干燥、萎缩
- D 仅有反复咯血，一般无咳嗽、咳脓痰
- E 病变局限于上叶

正确答案：D 您选择的答案：

第7题 下列支气管疾病中，最常并发咯血的是

- A 良性支气管瘤
- B 支气管内异物
- C 支气管扩张
- D 慢性支气管炎
- E 支气管哮喘

正确答案：C 您选择的答案：

第8题 支气管扩张症的治疗下列哪项是错误的

- A 体位引流的作用有时较抗生素治疗尤为重要
- B 有时可考虑环甲膜穿刺，注入抗生素及湿化液
- C 经纤支镜局部灌洗后，注入抗生素也有显著疗效
- D 大咯血者，病变超过二叶肺经药物治疗不易控制，可手术治疗
- E 在引流痰量较多时，应注意将痰液逐渐咳出，以防发生窒息

正确答案：D 您选择的答案：

第9题 支气管肺组织的感染和阻塞所致的支气管扩张症的最常见原因是

- A 肺结核
- B 支气管细菌感染
- C 婴幼儿麻疹，百日咳，支气管肺炎等感染
- D 肿瘤，异物吸入引起的支气管阻塞
- E 有害气体的吸入损害气道

正确答案：C 您选择的答案：

第10题 支气管扩张的主要发病因素是

- A 先天性发育缺损

B 有害气体的吸入(大气污染)
C 长期大量的吸烟
D 支气管肺组织的感染和支气管阻塞
E 遗传因素
正确答案：D 您选择的答案：

第11题 支气管扩张症的治疗主要是
A 手术治疗
B 气功锻炼
C 保持呼吸道通畅和控制感染
D 治疗鼻窦炎和上呼吸道感染
E 预防应用气管炎菌苗
正确答案：C 您选择的答案：

第12题 继发于支气管肺组织炎性病变的支气管扩张多见于
A 右肺下叶
B 左肺下叶
C 右肺中叶
D 左肺上叶
E 右肺上叶
正确答案：B 您选择的答案：

第13题 下列哪项不是“干性支气管扩张”的特点
A 反复咯血
B 平时无咳嗽
C 一般无脓性痰
D 多位于引流不畅的部位
E 不易感染
正确答案：D 您选择的答案：

第14题 支气管扩张合并咯血时治疗一般不主张应用
A. 抗生素
B. 止血药
C. 镇咳药
D. 支气管舒张药
E. 镇静药
正确答案：C 您选择的答案：

第15题 支气管扩张症最常见的病因是
A. 支气管内结石
B. 肺结核
C. 肿瘤压迫
D. 肺囊性纤维化
E. 支气管-肺组织感染和支气管阻塞
正确答案：A 您选择的答案：

第16题 支气管扩张症合并咯血时治疗一般不主张应用
A. 抗生素
B. 止血药
C. 镇咳药
D. 支气管舒张药
E. 镇静药
正确答案：D 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第17题 男性，28岁。近5年反复咳嗽，咳脓性痰，今天突然大咯血来急诊就诊。禁忌进行的检查是
A. 外周血象
B. 心电图
C. 胸部平片
D. 支气管碘油造影
E. 血液生化检查
正确答案：D 您选择的答案：

第18题 女性，20岁自幼咳嗽，经常于感冒后加重，咳大量脓痰，无咯血，考虑诊断为
A 慢性支气管炎
B 慢性肺脓肿
C 支气管扩张症
D 先天性支气管囊肿
E 肺气肿继发感染
正确答案：C 您选择的答案：

第19题 女性，40岁，10多年来经常咳嗽，有时咳黄痰，3天前突然咯血约150ml。查体：心肺无明显阳性体征，胸片：双肺下野纹理略增强，你考虑诊断可能是
A 慢性支气管炎
B 支气管扩张症
C 支气管内膜结核
D 支气管肺癌

E 支气管囊肿继发感染

正确答案：B 您选择的答案：

第20题 男性，24岁，近2个月因劳累出现乏力、盗汗、纳差，无咳嗽、发热等。今天突然大咯血来急诊，哪项检查禁忌

- A．外周血象
- B．心电图
- C．胸部平片
- D．支气管碘油造影
- E．胸部CT

正确答案：D 您选择的答案：

第21题 男患60岁，支扩病史20年，突然咯血2天，总量1000ml左右，胸CT右肺中下叶呈多发成串囊样改变，你认为下列哪种处置不可取

- A 应用垂体后叶素
- B 应用高效广谱抗生素
- C 患侧卧位
- D 纤维支气管镜直视下止血
- E 考虑手术治疗

正确答案：E 您选择的答案：

第22题 女性，38岁，近4年反复痰中带血或大咯血。轻咳，少量黏液痰，无低热。胸片检查示"左下肺纹理增粗、紊乱呈卷发样，余肺清晰"。诊断可能是

- A．慢性支气管炎
- B．风心病
- C．支气管扩张症
- D．支气管内膜结核
- E．肺癌早期

正确答案：C 您选择的答案：

第23题 支扩患者清晨突然咯血200ml，中午T37.4℃，左胸闷，你考虑最可能是以下哪种情况

- A 神经过度紧张
- B 肺内继发感染
- C 潜在结核病变播散
- D 血块阻塞气道
- E 心脏方面可能有问题

正确答案：D 您选择的答案：

第24题 年轻男患者既往健康，突然咯血400～500ml，查体及胸X线片无明显异常，你认为该患最可能的诊断是什么

- A 支气管内膜结核
- B 支气管肺癌
- C 支气管扩张症
- D 急性支气管炎
- E 肺梗死

正确答案：C 您选择的答案：

第25题 女，45岁，反复咳嗽、咳脓痰20余年。支气管造影证实右下、左下叶支气管扩张。近1周发热，痰量增多，下列哪项处理是错误的

- A．应用祛痰药
- B．手术治疗
- C．体位引流
- D．选用敏感抗生素
- E．痰细菌学检查

正确答案：B 您选择的答案：

第26题 男性，62岁。长期吸烟史。反复咳嗽、咳脓痰伴间断少量咯血20余年，大咯血2天来诊。体检：右下肺可闻及固定湿性啰音。胸片示右下肺纹理增重，可见卷发影。最可能的诊断是

- A．支气管扩张症
- B．肺癌
- C．肺炎
- D．肺结核
- E．慢性支气管炎

正确答案：A 您选择的答案：

三、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第27-28题

男，30岁，咳脓痰伴反复咯血10年，经常住院治疗。体检左下肺湿啰音，心率86次/分，律齐。X线胸片见左下肺纹增多，不规则透亮阴影。

1．下列哪项检查对诊断最有价值

- A．胸部CT
- B．胸部X线
- C．肺功能检查
- D．痰细菌学培养
- E．纤维支气管镜检查

2．病人辅助检查发现病变部位位于左下叶，痰培养为绿脓杆菌，肺功能示最大通气量占预计值78%。最佳治疗方案是

- A．体位引流
- B．抗生素

- C. 祛痰药
- D. 免疫治疗
- E. 外科手术

正确答案：AE 您选择的答案：

第29-31题

女性，25岁，既往健康，突然咯血约500ml，查体：心肺未见异常，胸X线片双肺下野纹理增粗

1. 你认为诊断应是

- A 急性支气管炎
- B 支气管扩张症
- C 支气管内膜结核
- D 支气管肺癌
- E 急性肺梗死

2. 为明确诊断可进一步做下列哪项查

- A 胸CT
- B 肺功能测定
- C 痰细菌培养+药敏
- D 痰抗酸杆菌涂片
- E 纤维支气管镜检查

3. 目前治疗的关键是

- A 保持呼吸道通畅
- B 应用垂体后叶素
- C 高效广谱抗生素
- D 尽快做胸CT明确出血部位
- E 纤维支气管镜直视下止血

正确答案：BAA 您选择的答案：

第32-34题

男性，42岁，长期咳嗽，经常咳脓痰15年，发热、咳脓臭痰一周来诊，查体，左肺下背部呼吸音弱，可闻湿啰音

1. 你考虑诊断可能是

- A 急性肺脓肿
- B 支气管扩张症，继发感染
- C 慢性支气管炎，继发感染
- D 支气管囊肿，继发感染
- E 左下肺炎

2. 治疗药物你选择下列哪项

- A 青霉素
- B 青霉素+复方甘草片
- C 丁胺卡那
- D 哌拉西林+甲硝唑
- E 丁胺卡那+甲硝唑

3. 确诊首选下列哪项检查

- A 胸X线片
- B 胸CT
- C 纤维支气管镜
- D 痰细菌培养+药敏
- E 以上都不必做

正确答案：BDA 您选择的答案：

四、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第35-37题

- A. X线胸片为大片阴影，呈肺叶或肺段分布
- B. X线胸片为大片状阴影，其内有空洞液平面
- C. X线可见薄壁空洞，病灶周围可见数个钙化灶
- D. X线为空洞形成，空洞呈偏心性，内壁凹凸不平
- E. X线为肺底有弧形阴影

- 1. 肺脓肿
- 2. 肺结核
- 3. 支气管肺癌

正确答案：BCD 您选择的答案：

第38-40题

- A. 支气管哮喘
 - B. 支气管扩张
 - C. 慢性支气管炎、肺气肿
 - D. 支气管肺炎
 - E. 特发性肺间质纤维化
- 1. 两肺散在湿啰音，伴哮鸣音及呼气相延长
 - 2. 固定性湿啰音
 - 3. 弥漫的哮鸣音，呼气相延长

正确答案：CBA 您选择的答案：

第41-43题

- A 多发生于左下叶支气管
- B 好发部位位于上叶尖后段或下叶背段
- C 可见段支气管近端的扩张
- D 常伴鼻窦炎及内脏转位

E 血清内可含有抑制支气管柱状上皮细胞纤毛活动的物质

1. 婴幼儿支气管肺炎所致的支气管扩张

2. 结核性支气管扩张症

3. 肺囊性纤维化

正确答案：ABE 您选择的答案：