

历年试题1(2000~2003年) 历年试题 A1型题(一)

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 某社区为地方性氟中毒流行区，一般认为氟骨症多见的年龄段为

- A. 幼儿
- B. 学龄期儿童
- C. 青壮年
- D. 新迁入的老年人
- E. 新迁入的成年人

正确答案：C 您选择的答案：

第2题 下列降压药物中便秘发生率最高的药物是

- A. 硝苯地平
- B. 维拉帕米
- C. 氯沙坦
- D. 普萘洛尔
- E. 卡托普利

正确答案：D 您选择的答案：

第3题 子宫内膜异位症病灶最多见的部位是

- A. 卵巢
- B. 输卵管
- C. 子宫后壁下段
- D. 直肠子宫陷凹
- E. 宫骶韧带

正确答案：A 您选择的答案：

第4题 甲亢术后呼吸困难多发生于术后

- A. 6小时以内
- B. 12小时以内
- C. 24小时以内
- D. 48小时以内
- E. 72小时以内

正确答案：D 您选择的答案：

第5题 补钾速度一般每小时不宜超过

- A. 10mmol
- B. 20mmol
- C. 30mmol
- D. 40mmol
- E. 50mmol

正确答案：B 您选择的答案：

第6题 提示左心功能不全的脉搏是

- A. 奇脉
- B. 迟脉
- C. 交替脉
- D. 水冲脉
- E. 重搏脉

正确答案：C 您选择的答案：

第7题 支气管-肺感染和阻塞是主要发病因素的疾病是

- A. 支气管扩张症
- B. 支气管肺癌
- C. 慢性支气管炎
- D. 支气管哮喘
- E. 阻塞性肺气肿

正确答案：A 您选择的答案：

第8题 为将每日代谢所产生的大600mmol / L的溶质(废物)完全溶解排出，需要的尿量至少是

- A. 400ml
- B. 500ml
- C. 600ml
- D. 800ml
- E. 1000ml

正确答案：A 您选择的答案：

第9题 医疗机构施行特殊治疗，无法取得患者意见又无家属或者关系人在场，或者遇到其他特殊情况时，经治医师应当提出医疗处置方案，在取得

- A. 病房负责人同意后实施
- B. 科室负责人同意后实施
- C. 医疗机构质监部门负责人批准后实施
- D. 医疗机构负责人或者被授权负责人员批准后实施
- E. 科室全体医师讨论通过后实施

正确答案：D 您选择的答案：

第10题 我国规定1岁内必须完成的计划免疫是

- A. 麻疹疫苗
- B. 乙脑疫苗
- C. 流脑疫苗
- D. 流感疫苗
- E. 甲型肝炎疫苗

正确答案：A 您选择的答案：

第11题 抗精神病药物的治疗作用与下列通路有关的是

- A. 结节-漏斗系统通路
- B. 黑质-纹状体通路
- C. 中脑-边缘系统通路
- D. 小脑-大脑皮质通路
- E. 小脑-颞叶系统通路

正确答案：C 您选择的答案：

第12题 主要用于预防I型变态反应所致哮喘的药物是

- A. 氨茶碱
- B. 肾上腺素
- C. 特布他林
- D. 色甘酸钠
- E. 异丙肾上腺素

正确答案：D 您选择的答案：

第13题 依赖cAMP的蛋白激酶是

- A. 受体型TPK
- B. 非受体型TPK
- C. PKC
- D. PKA
- E. PKG

正确答案：D 您选择的答案：

第14题 小儿初次感染结核菌至产生变态反应的时间是

- A. 2~3天
- B. 4~6天
- C. 7~12天
- D. 2~3周
- E. 4~8周

正确答案：E 您选择的答案：

第15题 关于女性外生殖器的解剖，不正确的是

- A. 阴阜皮下有丰富的脂肪组织
- B. 大阴唇富含神经末梢
- C. 小阴唇为一对纵形皮肤皱襞，表面湿润
- D. 阴蒂为海绵体相似的组织
- E. 阴道前庭为两侧小阴唇之间的菱形区域

正确答案：D 您选择的答案：

第16题 乳腺癌来源于

- A. 小叶间质
- B. 乳腺囊肿
- C. 导管内乳头状瘤
- D. 乳腺导管上皮及腺泡上皮
- E. 乳腺纤维腺瘤

正确答案：D 您选择的答案：

第17题 月经量多或经期延长但周期基本正常，应首先考虑

- A. 子宫内膜癌
- B. 子宫颈癌
- C. 子宫肌瘤
- D. 无排卵性功能失调性子宫出血
- E. 宫颈息肉

正确答案：C 您选择的答案：

第18题 易位型21-三体综合征最常见的核型是

- A. 46, XY, -13, +t(13q21q)
- B. 46, XY, -21, +t(21q21q)
- C. 46, XY, -22, +t(21q22q)
- D. 46, XY, -14, +t(14q21q)
- E. 46, XY, -15, +t(15q21q)

正确答案：D 您选择的答案：

第19题 献血者为A型血，经交叉配血试验，主侧不凝集而次侧凝集，受血者的血型应为

- A. B型
- B. AB型
- C. A型
- D. O型
- E. A型或B型

正确答案：B 您选择的答案：

第20题 甲型肝炎病程中，传染性最强的阶段是

- A. 潜伏期
- B. 黄疸前期
- C. 黄疸期
- D. 恢复期
- E. 慢性期

正确答案：B 您选择的答案：

第21题 组成核酸分子的碱基主要有

- A. 2种
- B. 3种
- C. 4种
- D. 5种
- E. 6种

正确答案：D 您选择的答案：

第22题 胆固醇不能转化成

- A. 胆汁酸
- B. 维生素D3
- C. 睾丸酮
- D. 雌二醇
- E. 胆红素

正确答案：E 您选择的答案：

第23题 非甾体抗炎药引起急性胃炎的主要机制是

- A. 激活磷脂酶A
- B. 抑制前弹性蛋白酶
- C. 抑制前列腺素合成
- D. 促进胃泌素合成
- E. 抑制脂肪酶

正确答案：C 您选择的答案：

第24题 下列关于胆汁的描述，正确的是

- A. 非消化期无胆汁分泌
- B. 消化期只有胆囊胆汁排入小肠
- C. 胆汁中含有脂肪消化酶
- D. 胆汁中与消化有关的成分是胆盐
- E. 胆盐可促进蛋白的消化和吸收

正确答案：D 您选择的答案：

第25题 与痛经无关的疾病是

- A. 无排卵性功血
- B. 子宫黏膜下肌瘤
- C. 慢性盆腔炎
- D. 子宫内膜异位症
- E. 子宫腺肌病

正确答案：A 您选择的答案：

第26题 呈现圆脸、厚背、躯干发胖而四肢消瘦的"向心性肥胖"的特殊体形，提示

- A. 甲状腺激素分泌过多
- B. 生长素分泌过多
- C. 肾上腺糖皮质激素分泌过多
- D. 肾上腺素分泌过多
- E. 胰岛素分泌不足

正确答案：C 您选择的答案：

第27题 关于医德良心，下述提法中错误的是

- A. 医德良心是对道德情感的深化
- B. 医德良心是对道德责任的自觉认识
- C. 医德良心在行为前具有选择作用
- D. 医德良心在行为中具有监督作用
- E. 医德良心在行为后具有社会评价作用

正确答案：C 您选择的答案：

第28题 腹部闭合性损伤时，不支持腹腔内脏损伤诊断的是

- A. 早期出现休克
- B. 腹膜刺激征
- C. 有气腹征
- D. 移动性浊音(+)
- E. 肠鸣音活跃

正确答案：E 您选择的答案：

第29题 细胞坏死的主要形态学特征是

- A. 核分裂
- B. 细胞核异型
- C. 线粒体肿胀
- D. 细胞核碎裂
- E. 细胞质脂质增多

正确答案：D 您选择的答案：

第30题 疝手术病人入院时血压150 / 96mmHg，针对此血压值正确的处理是

- A. 术前用降压药
- B. 术前不用降压药
- C. 术中用降压药
- D. 术后不用降压药
- E. 术前术后均用降压药

正确答案：A 您选择的答案：

第31题 构成传染病流行过程的三个基本条件是

- A. 微生物，宿主，媒介
- B. 传染源，传播途径，易感人群
- C. 病原体，环境，宿主
- D. 病原体数量，致病力，定位
- E. 病原体，人体，他们所处的环境

正确答案：B 您选择的答案：

第32题 急性胆道感染常见的严重并发症不包括

- A. 急性胰腺炎
- B. 硬化性胆管炎
- C. 胆道出血
- D. 感染性休克
- E. 肝脓肿

正确答案：B 您选择的答案：

第33题 对病毒生物学性状的描述，不正确的是

- A. 测量大小的单位为纳米(nm)
- B. 含有DNA和RNA两种核酸
- C. 以复制方式增殖
- D. 必须寄生于活细胞内
- E. 属于非细胞型微生物

正确答案：B 您选择的答案：

第34题 判断休克已纠正除血压正常外，尿量每小时至少应稳定在

- A. 25ml 以上
- B. 30ml 以上
- C. 40ml 以上
- D. 50ml 以上
- E. 60ml 以上

正确答案：A 您选择的答案：

第35题 原发性醛固酮增多症患者出现肌无力的原因是

- A. 持续性高血压
- B. 血钠潴留过多
- C. 持久尿量过多
- D. 尿钾排出增多
- E. 血钾浓度降低

正确答案：E 您选择的答案：

第36题 从一个呈正态分布的总体中随机抽样， $\bar{x} - \mu$ ，该差别被称为

- A. 系统误差
- B. 个体差异
- C. 过失误差
- D. 抽样误差
- E. 测量误差

正确答案：D 您选择的答案：

第37题 静脉肾盂造影，有诊断价值的疾病是

- A. 急性肾小球肾炎
- B. 急性肾盂肾炎
- C. 慢性肾小球肾炎
- D. 慢性肾盂肾炎
- E. 肾病综合征

正确答案：D 您选择的答案：

第38题 骨折X线检查的重要意义是

- A. 了解骨折的发生机制
- B. 明确骨折的诊断
- C. 判断骨折的预后
- D. 了解组织的损伤情况
- E. 了解骨质密度

正确答案：B 您选择的答案：

第39题 中度缺氧缺血性脑病的临床表现是

- A. 出生24小时内症状最明显
- B. 淡漠与激惹交替
- C. 肌张力增加
- D. 瞳孔扩大
- E. 出现惊厥，肌阵挛

正确答案：E 您选择的答案：

第40题 我国新生儿败血症多见的病菌是

- A. 肠球菌
- B. 链球菌
- C. 葡萄球菌
- D. 大肠杆菌
- E. 绿脓杆菌

正确答案：D 您选择的答案：

第41题 血小板消耗过多导致的血小板减少性疾病

- A. 特发性血小板减少性紫癜
- B. 弥散性血管内凝血
- C. 白血病
- D. 病毒感染
- E. 再生障碍性贫血

正确答案：B 您选择的答案：

第42题 足月儿生后第1小时内呼吸频率是

- A. 20~30次/分
- B. 40~50次/分
- C. 60~80次/分
- D. 90~100次/分
- E. 100~110次/分

正确答案：C 您选择的答案：

第43题 公正不仅指形式上的类似，更强调公正的

- A. 本质
- B. 内容
- C. 基础
- D. 内涵
- E. 意义

正确答案：B 您选择的答案：

第44题 引起牙周脓肿最常见的病原菌是

- A. 甲型溶血性链球菌
- B. 类白喉杆菌
- C. 无芽胞厌氧菌
- D. 绿脓杆菌
- E. 白念珠菌(白假丝酵母菌)

正确答案：A 您选择的答案：

第45题 慢性肾功能不全恶化的常见诱因，应除外的是

- A. 感染、发热
- B. 外伤、失血
- C. 呕吐伴腹泻
- D. 血尿酸或血钙过低
- E. 心力衰竭

正确答案：D 您选择的答案：

第46题 急性心肌梗死早期最重要的治疗措施是

- A. 抗心绞痛
- B. 消除心律失常
- C. 补充血量
- D. 心肌再灌注
- E. 增加心肌营养

正确答案：D 您选择的答案：

第47题 激活糜蛋白酶原的是

- A. 肠致活酶
- B. 胰蛋白酶
- C. 盐酸
- D. 组胺
- E. 辅酯酶

正确答案：B 您选择的答案：

第48题 《临床输血技术规范》的立法宗旨是规范、指导医疗机构

- A. 科学、合理用血
- B. 安全、科学用血
- C. 合理、安全用血
- D. 合理、卫生用血
- E. 科学、卫生用血

正确答案：A 您选择的答案：

第49题 伤寒最严重的并发症是

- A. 中毒性脑病
- B. 肠穿孔
- C. 急性胆囊炎
- D. 肠出血
- E. 肺炎

正确答案：B 您选择的答案：

第50题 执行职务的医疗保健人员，卫生防疫人员发现甲类、乙类和监测区域内的丙类传染病病人、病原携带者或者

疑似传染病病人，必须按照国务院卫生行政部门规定的时限

- A. 向当地人民政府报告疫情
- B. 向当地卫生行政部门报告疫情
- C. 向当地卫生防疫机构报告疫情
- D. 向当地环境保护部门报告疫情
- E. 向本单位负责人报告疫情

正确答案：C 您选择的答案：

第51题 医学史上第一次卫生革命的标志是

- A. 疾病从单纯治疗向群体预防发展
- B. 个体预防向群体预防发展
- C. 个体摄生向治疗与预防相结合发展
- D. 群体预防向社会医学发展
- E. 疾病从单纯治疗向治疗与预防相结合发展

正确答案：E 您选择的答案：

第52题 短暂性脑缺血发作应用阿司匹林治疗的目的是

- A. 改善神经功能的缺失
- B. 保护脑细胞
- C. 增加再灌注
- D. 预防复发
- E. 扩张血管

正确答案：D 您选择的答案：

第53题 对结核性腹膜炎最有诊断价值的检查是

- A. PPD试验
- B. 结肠镜检查
- C. 血沉
- D. 腹水常规
- E. 腹腔镜检查+腹膜活检

正确答案：E 您选择的答案：

第54题 子宫肌瘤患者与临床症状轻重关系密切的是

- A. 肌瘤大小
- B. 肌瘤数目
- C. 肌瘤生长部位
- D. 肌瘤与肌壁关系
- E. 肌瘤有无变性

正确答案：C 您选择的答案：

第55题 膀胱肿瘤在病理上最重要的是

- A. 组织类型
- B. 分化程度
- C. 病变部位
- D. 浸润深度
- E. 生长方式

正确答案：D 您选择的答案：

第56题 属于卵巢性索-间质细胞肿瘤的是

- A. 胚胎癌
- B. 颗粒细胞癌
- C. 绒毛膜癌
- D. 卵巢甲状腺肿
- E. 畸胎瘤

正确答案：B 您选择的答案：

第57题 下述情况能导致肾小球滤过率减少的是

- A. 血浆胶体渗透压下降
- B. 血浆胶体渗透压升高
- C. 血浆晶体渗透压下降
- D. 血浆晶体渗透压升高
- E. 肾小球毛细血管血压升高

正确答案：B 您选择的答案：

第58题 心动周期中，室内压升高速率最快的时相是

- A. 心房收缩期
- B. 等容收缩期
- C. 快速射血期
- D. 减慢射血期
- E. 快速充盈期

正确答案：B 您选择的答案：

第59题 由于存在食物的特殊动力效应，进食时应注意

- A. 增加蛋白质的摄入量
- B. 调整各种营养成分的摄入比例
- C. 适当增加能量摄入总量
- D. 适当减少能量摄入总量
- E. 细嚼慢咽，以减少这种特殊动力效应

正确答案：C 您选择的答案：

第60题 产生IL-2的细胞是

- A. 巨噬细胞
- B. 肥大细胞
- C. T淋巴细胞
- D. B细胞
- E. 嗜酸性粒细胞

正确答案：C 您选择的答案：

第61题 宫内妊娠时孕妇血清绒毛膜促性腺激素高峰出现在

- A. 5~7周
- B. 8~10周
- C. 11-13周
- D. 14~16周
- E. 17~19周

正确答案：B 您选择的答案：

第62题 治疗慢性粒细胞性白血病，首选

- A. 二溴甘露醇
- B. 长春新碱
- C. 靛玉红
- D. 环磷酰胺
- E. 羟基脲

正确答案：E 您选择的答案：

第63题 感染病原体后，仅引起机体发生特异性免疫应答，而临床上不出现特异性的症状和体征，称为

- A. 显性感染
- B. 潜伏性感染
- C. 隐性感染
- D. 病原携带状态
- E. 病原体被清除

正确答案：C 您选择的答案：

第64题 对各型癫痫都有一定疗效的药物是

- A. 乙琥胺
- B. 苯妥英钠
- C. 卡马西平
- D. 丙戊酸钠
- E. 苯巴比妥

正确答案：D 您选择的答案：

第65题 营养不良小儿常并发各种维生素缺乏，其中最常见缺乏是

- A. 维生素A
- B. 维生素B1
- C. 维生素B12
- D. 维生素C
- E. 维生素D

正确答案：E 您选择的答案：

第66题 肾病综合征最基本的表现是

- A. 尿蛋白定量 $>3.5\text{g}/24\text{小时}$
- B. 尿颗粒管型
- C. 血浆白蛋白 $<35\text{g/L}$
- D. 高度浮肿
- E. 高脂血症

正确答案：A 您选择的答案：

第67题 血胸活动性出血的征象不包括

- A. 脉快、血压下降，补液后血压不升或回升后又下降
- B. 血红蛋白、血球压积持续降低
- C. 胸片阴影逐渐增大
- D. 穿刺液涂片红细胞与白细胞之比为100:1
- E. 闭式引流量连续3小时，每小时超过200ml

正确答案：D 您选择的答案：

第68题 骨折血肿机化演进期一般需要

- A. 3天
- B. 5天
- C. 1周
- D. 2周
- E. 3周

正确答案：D 您选择的答案：

第69题 导致阑尾穿孔最主要的因素是

- A. 阑尾腔阻塞
- B. 阑尾壁受粪石压迫缺血
- C. 细菌毒力
- D. 淋巴管阻塞
- E. 免疫力低

正确答案：A 您选择的答案：

第70题 下列对蛋白质变性的描述中合适的是

- A. 变性蛋白质的溶液黏度下降
- B. 变性的蛋白质不易被消化
- C. 蛋白质沉淀不一定是变性
- D. 蛋白质变性后容易形成结晶
- E. 蛋白质变性不涉及二硫键破坏

正确答案：C 您选择的答案：

第71题 普查宫颈癌时最有实用价值的检查方法是

- A. 宫颈刮片细胞学检查
- B. 宫颈碘试验
- C. 妇科三合诊检查
- D. 阴道镜检查
- E. 宫颈活组织检查

正确答案：A 您选择的答案：

第72题 改善急性左心衰竭症状最有效的药物是

- A. 利尿剂
- B. 洋地黄
- C. 钙离子拮抗剂
- D. β 肾上腺素能受体阻滞剂
- E. 血管紧张素转换酶抑制剂

正确答案：A 您选择的答案：

第73题 一建筑工人由高空坠落，左枕着地，伤后出现进行性意识障碍，右侧瞳孔逐渐散大，诊断应首先考虑

- A. 左枕部急性硬脑膜外血肿
- B. 右枕部急性硬脑膜下血肿
- C. 右侧额颞极挫裂伤伴硬脑膜下血肿
- D. 左侧额颞部脑挫裂伤
- E. 小脑血肿

正确答案：A 您选择的答案：

第74题 细菌性痢疾肠道病变最显著的部位是在

- A. 升结肠
- B. 横结肠
- C. 降结肠
- D. 乙状结肠
- E. 乙状结肠和直肠

正确答案：E 您选择的答案：

第75题 双肺满布湿啰音多见于

- A. 肺结核空洞
- B. 支气管扩张
- C. 支气管肺炎
- D. 肺淤血
- E. 急性肺水肿

正确答案：E 您选择的答案：

第76题 下列关于DNA碱基组成的叙述正确的是

- A. DNA分子中A与T的含量不同
- B. 同一个体成年期与少儿期碱基组成不同
- C. 同一个体在不同营养状态下碱基组成不同
- D. 同一个体不同组织碱基组成不同
- E. 不同生物来源的DNA碱基组成不同

正确答案：E 您选择的答案：

第77题 复苏后治疗，保证一切复苏措施奏效最重要的是

- A. 维持良好的呼吸功能
- B. 确保循环功能的稳定
- C. 防治肾功能衰竭
- D. 脑复苏
- E. 防治感染

正确答案：D 您选择的答案：

第78题 在治疗肺炎球菌肺炎使用青霉素时，错误的方法是

- A. 一般患者每次肌注80万单位，每8小时1次
- B. 每日剂量800万单位，加在500毫升输液中缓慢静滴
- C. 每日剂量800万单位，分3次静脉滴注
- D. 静脉滴药时每次用量应在1小时内滴完
- E. 对青霉素过敏者不可使用此药

正确答案：D 您选择的答案：

第79题 我国饮用水的卫生标准(GB5749-85)中规定

- A. 每毫升饮水中细菌总数不超过10个
- B. 每毫升饮水中细菌总数不超过100个
- C. 每毫升饮水中细菌总数不超过1000个
- D. 每100毫升饮水中细菌总数不超过10个
- E. 每500毫升饮水中细菌总数不超过10个

正确答案：B 您选择的答案：

第80题 骨软骨瘤多见于

- A. 长管骨骨端
- B. 长管骨干骺端
- C. 长管骨骨干
- D. 长管骨骨骺
- E. 扁骨骨端

正确答案：B 您选择的答案：

第81题 DNA复制时，以序列5' -TAGA-3' 为模板合成的互补结构是

- A. 5' -TCTA-3'
- B. 5' -TAGA-3'
- C. 5' -ATCT-3'
- D. 5' -AUCU-3'
- E. 5' -UCUA-3'

正确答案：A 您选择的答案：

第82题 鉴别水肿型和出血坏死型胰腺炎最有价值的是

- A. 上腹剧痛向左腰背部放射
- B. 黄疸
- C. 发热
- D. Cullen征
- E. 呕吐

正确答案：D 您选择的答案：

第83题 2型糖尿病的特点是

- A. 都有"三多一少"表现
- B. 患者体型均较肥胖
- C. 患者空腹血糖都增高
- D. 空腹尿糖均呈阳性
- E. 少数以酮症酸中毒为首发表现

正确答案：E 您选择的答案：

第84题 n足够大，P不接近于0或1，样本率与总体率比较，统计量u为

- A. $\frac{p-n}{Sp}$
- B. $\frac{p1-p}{\sigma p}$
- C. $\frac{p1-p2}{Sp}$
- D. $\frac{p-n}{\sigma}$
- E. $\frac{p-n}{\sigma p}$

正确答案：E 您选择的答案：

第85题 结肠癌最早出现的临床症状是

- A. 腹部肿块
- B. 全身症状如贫血、消瘦、低热等
- C. 肠梗阻症状
- D. 排便习惯和粪便性状的变化
- E. 阵发性绞痛

正确答案：D 您选择的答案：

第86题 下列对糖皮质激素作用的错误叙述为

- A. 抗炎作用
- B. 免疫抑制作用
- C. 抗外毒素作用
- D. 抗休克作用
- E. 稳定溶酶体膜作用

正确答案：C 您选择的答案：

第87题 下列情况可引起语音震颤增强，除了

- A. 大叶性肺炎
- B. 肺梗死
- C. 肺内大空腔
- D. 大量胸腔积液
- E. 肺脓肿

正确答案：C 您选择的答案：

第88题 右心衰竭的病人常因组织液生成过多而致下肢浮肿，其主要原因是

- A. 血浆胶体渗透压降低
- B. 毛细血管血压增高
- C. 组织液静水压降低
- D. 组织液胶体渗透压升高
- E. 淋巴回流受阻

正确答案：B 您选择的答案：

第89题 《医疗事故处理条例》规定，造成患者轻度残疾、器官组织损伤导致一般功能障碍的属于

- A. 一级医疗事故
- B. 二级医疗事故
- C. 三级医疗事故
- D. 四级医疗事故
- E. 严重医疗差错

正确答案：C 您选择的答案：

第90题 突发公共卫生事件是指下列哪类突然发生，造成或者可能造成社会公众健康损害的事件

- A. 甲类或乙类传染病流行
- B. 重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大和职业中毒以及其他严重影响公众健康的事件
- C. 环境污染
- D. 寄生虫病疫情
- E. 水灾、地震等严重危害公众生命财产安全的自然灾害

正确答案：B 您选择的答案：

第91题 正常妊娠38周时的羊水量约为

- A. 600ml
- B. 800ml
- C. 1000ml
- D. 1200ml
- E. 1500ml

正确答案：C 您选择的答案：

第92题 不是矽肺诊断主要依据的是

- A. 接触粉尘的职业史
- B. 临床症状
- C. CT检查
- D. 胸片
- E. 肺功能检查

正确答案：B 您选择的答案：

第93题 不协调性子宫收缩乏力的恰当处理应是

- A. 针刺合谷、三阴交穴位
- B. 温肥皂水灌肠
- C. 肌注哌替啶
- D. 人工破膜
- E. 静脉滴注缩宫素

正确答案：C 您选择的答案：

第94题 老年心力衰竭患者症状加重的最常见诱因是

- A. 过度劳累
- B. 摄入液体过多
- C. 心肌缺血
- D. 室性期前收缩
- E. 呼吸道感染

正确答案：E 您选择的答案：

第95题 对精神分裂症有诊断意义的症状是

- A. 被害妄想
- B. 嫉妒妄想
- C. 被控制感
- D. 思维散漫
- E. 夸大妄想

正确答案：D 您选择的答案：

第96题 婴幼儿少尿的标准是昼夜尿量少于

- A. 100ml
- B. 200ml
- C. 300ml
- D. 400ml
- E. 500ml

正确答案：B 您选择的答案：

第97题 扩张型心肌病患者的最主要的临床表现是

- A. 呼吸道感染
- B. 室性心律失常
- C. 心力衰竭
- D. 晕厥
- E. 房室传导阻滞

正确答案：C 您选择的答案：

第98题 可以发生坏疽的器官是

- A. 阑尾
- B. 心
- C. 肝
- D. 脾
- E. 肾

正确答案：A 您选择的答案：

第99题 临床上癫痫发作与假性癫痫发作的主要鉴别为发作时有

- A. 全身抽搐
- B. 突然跌倒
- C. 呼吸急促，喉中发出叫声
- D. 双手紧握，下肢僵直
- E. 伴瞳孔散大，对光反应消失

正确答案：E 您选择的答案：

第100题 外源性凝血系统的作用起始于

A．组织受伤释放组织因子

B．凝血酶的形成

C．第Ⅲ因子被激活

D．血小板第3因子的释放

E．第X因子被激活

正确答案：A 您选择的答案：