

历年试题1(2000~2003年) 历年试题 A1型题(三)

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 决定肾结核的治疗方法，除全身情况外主要依靠

- A. 膀胱刺激症状的程度
- B. 血尿程度
- C. 尿中是否找到结核杆菌
- D. 膀胱镜检查所见
- E. 静脉尿路造影或逆行肾盂造影所见

正确答案：E 您选择的答案：

第2题 肺炎球菌肺炎患者若对青霉素过敏，宜选用的有效抗菌药物是

- A. 庆大霉素
- B. 阿米卡星
- C. 链霉素
- D. 左氧氟沙星
- E. 阿莫西林

正确答案：B 您选择的答案：

第3题 扩张型心肌病左、右心室同时衰竭时，与临床症状和体征最有关的因素是

- A. 静脉回流增加
- B. 肺淤血
- C. 心排量减少
- D. 心律失常
- E. 心肌缺血

正确答案：D 您选择的答案：

第4题 关于精神分裂症偏执型，不正确的说法是

- A. 妄想结构比较松散
- B. 不常伴幻觉
- C. 妄想内容比较荒谬
- D. 缓慢发病者多
- E. 及时治疗效果好

正确答案：B 您选择的答案：

第5题 诊断子宫内膜癌最可靠的方法是

- A. 细胞学检查
- B. B超检查
- C. 宫腔镜检查
- D. 分段诊刮
- E. 淋巴造影

正确答案：D 您选择的答案：

第6题 食物中每克碳水化合物、脂肪和蛋白质可供能量(kcal)分别为

- A. 4, 4, 9
- B. 9, 4, 4
- C. 4, 9, 4
- D. 4, 9, 9
- E. 9, 9, 4

正确答案：C 您选择的答案：

第7题 我国发生的严重急性呼吸综合征(SARS)，很快波及到许多省市，这种发病情况称为

- A. 爆发
- B. 大流行
- C. 季节性升高
- D. 周期性流行
- E. 长期变异

正确答案：A 您选择的答案：

第8题 下列关于己糖激酶叙述正确的是

- A. 己糖激酶又称为葡萄糖激酶
- B. 它催化的反应基本上是可逆的
- C. 使葡萄糖活化以便参加反应
- D. 催化反应生成6-磷酸果酸
- E. 是酵解途径的唯一的酶

正确答案：C 您选择的答案：

第9题 欲行全子宫加双附件切除，不需要切断的韧带是

- A. 圆韧带
- B. 卵巢固有韧带
- C. 卵巢悬韧带
- D. 阔韧带
- E. 主韧带

正确答案：B 您选择的答案：

第10题 细菌性肝脓肿的主要治疗是

- A. 抗生素治疗

B. 穿刺抽脓，脓腔注入抗生素  
C. 切开引流  
D. 理疗  
E. 内引流术  
正确答案：C 您选择的答案：

第11题 一岁以内婴儿总能量约需每日每公斤体重

A. 80kcal  
B. 90kcal  
C. 100kcal  
D. 110kcal  
E. 120kcal  
正确答案：D 您选择的答案：

第12题 胎头于临产后迟迟不入盆，骨盆测量径线最有价值的是

A. 髂棘间径  
B. 髂嵴间径  
C. 骶耻外径  
D. 坐骨棘间径  
E. 对角径  
正确答案：C 您选择的答案：

第13题 小儿急性肾小球肾炎起病前常有皮肤感染，其前驱期多为

A. 1周以内  
B. 1~2周  
C. 2~3周  
D. 3~4周  
E. 4~5周  
正确答案：C 您选择的答案：

第14题 难以鉴别的肾癌和肾囊肿，最可靠的鉴别方法是

A. 排泄性尿路造影  
B. 逆行肾盂造影  
C. B超  
D. 肾动脉造影  
E. CT  
正确答案：D 您选择的答案：

第15题 医务人员共同的首要义务和天职是

A. 维护病人的利益和社会公益  
B. 维护医务人员和医院的声誉  
C. 维护医务人员和医院的经济效益  
D. 维护医务人员和医院的自身利益  
E. 维护医务人员之间、医院间的和谐  
正确答案：A 您选择的答案：

第16题 与甲状腺髓样癌有关的激素是

A. 甲状腺素  
B. 促甲状腺素  
C. 降钙素  
D. 促甲状腺激素释放激素  
E. 胰高血糖素  
正确答案：C 您选择的答案：

第17题 属于肩周炎诊断依据的是

A. 男性多于女性  
B. 右侧多于左侧  
C. 肩部疼痛，与动作无关系  
D. 肩关节外展、外旋、后伸受限  
E. 肩部三角肌无萎缩  
正确答案：D 您选择的答案：

第18题 肺炎伴感染性休克常见于以下肺部炎症，除了

A. 肺炎球菌肺炎  
B. 金黄色葡萄球菌肺炎  
C. 克雷白杆菌肺炎  
D. 绿脓杆菌肺炎  
E. 支原体肺炎  
正确答案：E 您选择的答案：

第19题 下列各项组合中，能准确判断酸中毒性质严重程度和代偿情况的是

A. 动脉血和尿的pH值  
B. 动脉血pH值和HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>  
C. 动脉血和静脉血pH值  
D. 动脉血和静脉血PaCO<sub>2</sub>  
E. 静脉血和尿的pH值  
正确答案：B 您选择的答案：

第20题 现况调查研究的目的不包括

A. 描述疾病和健康状况

- B. 观察某疗法的远期疗效
  - C. 描述疾病的人群分布
  - D. 描述某种因素与疾病之间的关系
  - E. 进行疾病监测，早期发现病人
- 正确答案：B      您选择的答案：

第21题 四肢出血，使用止血带最长不能连续超过

- A. 20分钟
- B. 30分钟
- C. 1小时
- D. 1.5小时
- E. 2小时

正确答案：C      您选择的答案：

第22题 一肝炎患者作肝穿刺活检，镜下见肝细胞点状坏死，汇管区见少量淋巴细胞浸润及轻度纤维组织增生，肝小叶结构完整。上述病变符合

- A. 急性普通型肝炎
- B. 轻度慢性肝炎
- C. 中度慢性肝炎
- D. 重度慢性肝炎
- E. 早期肝硬化

正确答案：B      您选择的答案：

第23题 下列哪项不是风湿性心包炎的表现

- A. 心前区疼痛
- B. 呼吸困难
- C. 有心包摩擦音
- D. 心音增强
- E. 颈静脉怒张

正确答案：D      您选择的答案：

第24题 在免疫应答过程中，巨噬细胞

- A. 产生抗体
- B. 表达TCR
- C. 产生细胞因子
- D. 表达CD3分子
- E. 发生基因重排

正确答案：C      您选择的答案：

第25题 重度主动脉瓣返流时心尖部可存在

- A. Graham-Steel杂音
- B. Austin-Flint杂音
- C. Durozier征
- D. Traube征
- E. DeMusset征

正确答案：B      您选择的答案：

第26题 新生儿各种细胞吞噬功能

- A. 成熟
- B. 增强
- C. 暂时增强
- D. 减低
- E. 暂时减低

正确答案：D      您选择的答案：

第27题 医疗机构发现发生或者可能发生传染病暴发流行时，应当

- A. 在1小时内向所在地县级人民政府卫生行政主管部门报告
- B. 在2小时内向所在地县级人民政府卫生行政主管部门报告
- C. 在4小时内向所在地县级人民政府卫生行政主管部门报告
- D. 在6小时内向所在地县级人民政府卫生行政主管部门报告
- E. 在8小时内向所在地县级人民政府卫生行政主管部门报告

正确答案：D      您选择的答案：

第28题 糖尿病患者胰岛素治疗最主要的不良反应是

- A. 注射处红肿疼痛
- B. 注射处脂肪萎缩
- C. 发生低血糖
- D. 荨麻疹样皮疹
- E. 过敏性休克

正确答案：C      您选择的答案：

第29题 中毒型细菌性痢疾多见于

- A. 低出生体重儿
- B. 3~6个月体格健壮的婴幼儿
- C. 2~7岁体格健壮的小儿
- D. 8~10岁营养状况较差的儿童
- E. 12~14岁儿童

正确答案：C      您选择的答案：

第30题 切除子宫做病理检查，光镜下见子宫壁深肌层内有大量异型的滋养层细胞浸润，并有绒毛结构，应诊断为

- A. 水泡状胎块
- B. 子宫内膜癌
- C. 侵蚀性葡萄胎
- D. 绒毛膜癌
- E. 子宫颈癌

正确答案：C 您选择的答案：

第31题 全血在保存过程中，发生了“保存损害”，丧失了一些有用成分，它们是

- A. 血小板、粒细胞、不稳定的凝血因子
- B. 红细胞、白细胞、血小板
- C. 白细胞、血小板、稳定的凝血因子
- D. 白细胞、血小板、纤维蛋白原
- E. 血小板、淋巴细胞、凝血因子VII

正确答案：C 您选择的答案：

第32题 儿童感染戊肝病毒后，常表现为

- A. 显性感染
- B. 潜伏性感染
- C. 隐性感染
- D. 病毒携带者
- E. 病毒清除

正确答案：C 您选择的答案：

第33题 发现早期直肠癌最有意义的方法是

- A. 直肠镜
- B. 钡灌肠
- C. B超
- D. 大便潜血检查
- E. CT

正确答案：A 您选择的答案：

第34题 胃溃疡最常见的位置是

- A. 胃前壁
- B. 胃后壁
- C. 胃大弯及胃底
- D. 胃小弯近贲门处
- E. 胃窦小弯侧

正确答案：E 您选择的答案：

第35题 剧烈运动时，少尿的主要原因是

- A. 肾小球毛细血管血压增高
- B. 抗利尿激素分泌增多
- C. 肾小动脉收缩，肾血流量减少
- D. 醛固酮分泌增多
- E. 肾小球滤过膜面积减少

正确答案：C 您选择的答案：

第36题 关于急性失血患者的输血，正确提法是

- A. 用等量的全血补充所估计的失血量
- B. 在晶体液、胶体液扩容的基础上，适当输注全血
- C. 在晶体液、胶体液扩容的基础上，合理输血(主要是输红细胞)
- D. 先输注血浆补充血容量，再输注红细胞纠正贫血
- E. 红细胞、新鲜冰冻血浆及血小板三者合理搭配输注

正确答案：C 您选择的答案：

第37题 尿毒症患者发生纤维性骨炎的主要原因是

- A. 尿钙排泄增多
- B. 继发性甲状旁腺功能亢进
- C. 尿磷排泄减少
- D. 营养不良和低蛋白血症
- E. 活性维生素D合成障碍

正确答案：B 您选择的答案：

第38题 洋地黄中毒最常见的心电图表现是

- A. 心房颤动
- B. 室性期前收缩
- C. 房性期前收缩
- D. ST-T缺血性改变
- E. 房室传导阻滞

正确答案：D 您选择的答案：

第39题 成人双手占体表面积的

- A. 3%
- B. 5%
- C. 7%
- D. 9%
- E. 12%

正确答案：B 您选择的答案：

第40题 宫口开全后，开始保护会阴的时机应是

A. 经阴道外口看到胎发时  
B. 胎头开始拨露时  
C. 胎头拨露10分钟时  
D. 胎头拨露阴唇后联合紧张时  
E. 胎头开始着冠时  
正确答案：E 您选择的答案：

第41题 不属于精神分裂症的阳性症状的是  
A. 联想散漫  
B. 妄想  
C. 幻觉  
D. 注意力不集中  
E. 行为紊乱  
正确答案：D 您选择的答案：

第42题 "比奈-西蒙量表"属于一种  
A. 智力测验  
B. 人格测验  
C. 神经心理测验  
D. 评定量表  
E. 投射测验  
正确答案：A 您选择的答案：

第43题 脱敏治疗的最佳适应证为  
A. 精神分裂症  
B. 恐怖症  
C. 躁狂症  
D. 神经衰弱  
E. 强迫症  
正确答案：B 您选择的答案：

第44题 辅酶在酶促反应中的作用是  
A. 起运载体的作用  
B. 维持酶的空间构象  
C. 参加活性中心的组成  
D. 促进中间复合物形成  
E. 提供必需基团  
正确答案：A 您选择的答案：

第45题 腺垂体合成和分泌的促甲状腺激素(TSH)  
A. 分泌释放到血液中分布至全身  
B. 直接分泌到甲状腺中，只在甲状腺内发现  
C. 沿神经轴突纤维移动到甲状腺组织中  
D. 经特定血管系统输送到甲状腺组织中  
E. 为甲状腺组织主动摄取而甲状腺内浓度较高  
正确答案：A 您选择的答案：

第46题 TH1 细胞分泌  
A. IFN $\gamma$   
B. IL-4  
C. IL-5  
D. IL-6  
E. IL-10  
正确答案：A 您选择的答案：

第47题 体温在39℃以上，24小时内波动<1℃，这种热型为  
A. 弛张热  
B. 间歇热  
C. 稽留热  
D. 波状热  
E. 不规则热  
正确答案：C 您选择的答案：

第48题 反应一个测验工具的正确性是指该测验的  
A. 效度  
B. 信度  
C. 样本  
D. 常模  
E. 概念  
正确答案：A 您选择的答案：

第49题 心肌梗死24小时内并发急性左心衰竭时，最不宜应用  
A. 吗啡  
B. 洋地黄  
C. 利尿剂  
D. 硝酸甘油  
E. 多巴酚丁胺  
正确答案：B 您选择的答案：

第50题 关于肾小管HC03-重吸收的叙述，错误的是

A. 主要在近端小管重吸收  
B. 与H<sup>+</sup>的分泌有关  
C. HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>是以CO<sub>2</sub>扩散的形式重吸收  
D. HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>重吸收需碳酸酐酶的帮助  
E. Cl<sup>-</sup>的重吸收优先于HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>的重吸收  
正确答案：E 您选择的答案：

第51题 风疹与麻疹的主要鉴别点是  
A. 全身症状轻  
B. 皮疹为全身性分布  
C. 呈充血性斑丘疹  
D. 皮疹一日内出齐  
E. 外周血白细胞减少  
正确答案：A 您选择的答案：

第52题 造成先天性甲状腺功能低下的最主要的原因是  
A. 碘缺乏  
B. 甲状腺不发育或发育不全  
C. 甲状腺合成过程中酶的缺乏  
D. 促甲状腺激素缺乏  
E. 甲状腺或靶器官反应性低下  
正确答案：B 您选择的答案：

第53题 在一种分析性研究中，计算了RR值，可说明暴露因素与发病的关联程度，该指标为  
A. 发病率  
B. 发病密度  
C. 归因危险度  
D. 患病率  
E. 相对危险度  
正确答案：E 您选择的答案：

第54题 诊断冠心病最常用的非创伤性检查方法是  
A. 休息时心电图  
B. 24小时动态心电图  
C. 心电图运动负荷试验  
D. 超声心动图  
E. 心脏CT检查  
正确答案：C 您选择的答案：

第55题 在突发公共卫生事件应急处理工作中，有关单位和个人不配合有关专业技术人员调查、采样、技术分析和检验的，对有关责任人给予  
A. 警告  
B. 吊销执照  
C. 降级或者撤职的纪律处分  
D. 行政处分或者纪律处分  
E. 追究刑事责任  
正确答案：D 您选择的答案：

第56题 原发性肾小球疾病的发病机制，多数是  
A. 链球菌感染所致  
B. 病毒感染所致  
C. 药物所致  
D. 免疫介导性炎症所致  
E. 遗传变异基因所致  
正确答案：D 您选择的答案：

第57题 下列激素中，属于下丘脑调节肽的是  
A. 促甲状腺激素  
B. 促肾上腺皮质激素  
C. 促性腺激素  
D. 生长抑素  
E. 促黑素细胞激素  
正确答案：E 您选择的答案：

第58题 疾病主要累及的靶器官以非炎症性病理改变为主要特点的风湿病是  
A. 骨性关节炎  
B. 类风湿关节炎  
C. 系统性红斑狼疮  
D. 痛风  
E. 干燥综合征  
正确答案：E 您选择的答案：

第59题 患维生素D缺乏性佝偻病的9~10个月婴儿多见的骨骼改变是  
A. 颅骨软化  
B. 肋骨串珠  
C. 方颅  
D. 鸡胸  
E. 肋膈沟  
正确答案：C 您选择的答案：

第60题 对球后溃疡的正确描述是

- A. 多发生在距幽门2~3cm以内
- B. 指十二指肠球部后壁溃疡
- C. 易并发出血
- D. 临床症状多不明显
- E. 内科治疗效果不好

正确答案：A 您选择的答案：

第61题 医学伦理学中最古老、最有生命力的医德范畴是

- A. 医疗保密
- B. 医疗公正
- C. 医疗权利
- D. 医疗荣誉
- E. 医疗义务

正确答案：E 您选择的答案：

第62题 临终关怀的根本目的在于

- A. 节约卫生资源
- B. 提高临终病人的生存质量
- C. 减轻家庭的经济负担
- D. 防止病人自杀
- E. 缩短病人的生命时限

正确答案：B 您选择的答案：

第63题 推论病因与疾病因果关联的标准错误的是

- A. 关联的强度
- B. 关联的时间性
- C. 关联的特异性
- D. 关联的可重复性
- E. 关联的地区性

正确答案：D 您选择的答案：

第64题 有关痈处理方法错误的是

- A. 中央部坏死组织多，全身症状重者，应手术治疗
- B. 切口应超出炎症范围
- C. 切开至皮肤全层
- D. 尽量剪除坏死组织
- E. 唇痈不宜切开

正确答案：C 您选择的答案：

第65题 呼吸呈蒜味的毒物是

- A. 阿托品
- B. 安定
- C. 酒糟
- D. 有机磷农药
- E. 亚硝酸盐

正确答案：D 您选择的答案：

第66题 急性感染性心内膜炎最常见的致病菌是

- A. 草绿色链球菌
- B. 金黄色葡萄球菌
- C. 淋球菌
- D. 肺炎球菌
- E. 肠球菌

正确答案：B 您选择的答案：

第67题 广场恐怖的共同特征为

- A. 怕接触人
- B. 怕无力帮助
- C. 怕空荡、怕风
- D. 怕无法迅速离开
- E. 怕被人迫害

正确答案：D 您选择的答案：

第68题 在下述各项中，不符合有利原则的是

- A. 医务人员的行动与解除病人的疾苦有关
- B. 医务人员的行动使病人受益而可能给别的病人带来损害
- C. 医务人员的行动使病人受益而会给家庭带来一定的经济负担
- D. 医务人员的行动可能解除病人的痛苦
- E. 受病人或家庭条件的限制，医务人员选择的诊治手段不是最佳的

正确答案：B 您选择的答案：

第69题 去除血液中白细胞可有效预防的输血不良反应是

- A. 非溶血性发热性输血反应
- B. 过敏反应
- C. 细菌污染反应
- D. 急性(即发性)溶血性输血反应
- E. 迟发性溶血性输血反应

正确答案：D 您选择的答案：

第70题 门静脉高压症的治疗，错误的是  
A．下腔静脉与门静脉吻合易造成肝性脑病  
B．食管胃底静脉曲张破裂出血非手术治疗首选三腔管压迫止血  
C．内镜下食管静脉曲张呈蓝色曲张需紧急手术  
D．食管胃底静脉曲张时可行食道内窥镜注入硬化剂治疗  
E．静滴垂体后叶素可以降低门静脉压  
正确答案：C 您选择的答案：

第71题 医疗机构从事药剂技术工作必须配备  
A．保证制剂质量的设施  
B．管理制度  
C．检验仪器  
D．相应的卫生条件  
E．依法经过资格认定的药学技术人员  
正确答案：E 您选择的答案：

第72题 心肌梗死最常发生的部位在  
A．右心室后壁  
B．左心室后壁  
C．右心室前壁  
D．左心室前壁  
E．左心室侧壁  
正确答案：D 您选择的答案：

第73题 苯二氮卓类药物作用特点为  
A．对快动眼睡眠时相影响大  
B．没有抗惊厥作用  
C．没有抗焦虑作用  
D．停药后代偿性反跳较重  
E．可缩短睡眠诱导时间  
正确答案：E 您选择的答案：

第74题 咳嗽变异性哮喘正确诊断的依据是  
A．咳嗽反复发作>2周  
B．抗生素治疗有效  
C．支气管扩张剂能缓解  
D．无家族过敏史  
E．中性粒细胞增高  
正确答案：C 您选择的答案：

第75题 下列能使心输出量增加的因素是  
A．心迷走中枢紧张性增高  
B．心交感中枢紧张性增高  
C．静脉回心血量减少  
D．心室舒张末期容积减小  
E．颈动脉窦内压力增高  
正确答案：B 您选择的答案：

第76题 关于小儿急性阑尾炎，错误的是  
A．病情发展快且重  
B．右下腹体征明显  
C．穿孔率达30%  
D．并发症及死亡率较高  
E．宜早期手术  
正确答案：B 您选择的答案：

第77题 细菌内毒素的特征是  
A．只有革兰阴性细菌产生  
B．少数革兰阳性细菌产生  
C．细菌在生活状态下释放  
D．抗原性强  
E．不耐热  
正确答案：A 您选择的答案：

第78题 细支气管不完全阻塞所致的阻塞性通气障碍可造成  
A．肺不张  
B．肺纤维化  
C．支气管扩张  
D．气胸  
E．肺气肿  
正确答案：E 您选择的答案：

第79题 有关糖皮质激素治疗溃疡性结肠炎的说法中，正确的是  
A．柳氮磺胺吡啶治疗无效时应用激素治疗效果亦差  
B．特别适合于重型活动性溃疡性结肠炎  
C．不可用于灌肠治疗  
D．不可与柳氮磺胺吡啶联合治疗  
E．可以作为试验性治疗用于溃疡性结肠炎的鉴别诊断  
正确答案：B 您选择的答案：



第80题 不属于风湿热的主要表现的是

- A. 发热
- B. 关节炎
- C. 心脏炎
- D. 舞蹈病
- E. 环形红斑

正确答案：C 您选择的答案：

第81题 某地区某种疾病的发病率明显超过历年的散发发病率水平，则认为该病

- A. 大流行
- B. 散发
- C. 有季节性
- D. 爆发
- E. 流行

正确答案：E 您选择的答案：

第82题 随着抗生素广泛应用，引起细菌性肺炎的病原体最主要的变化是

- A. 肺炎球菌肺炎不断增加
- B. 革兰阴性杆菌肺炎不断增加
- C. 军团菌肺炎的发病率逐年下降
- D. 葡萄球菌肺炎很少发生
- E. 支原体肺炎很少发生

正确答案：A 您选择的答案：

第83题 以变质为主的炎症是

- A. 感冒初期鼻黏膜炎
- B. 假膜性炎
- C. 绒毛心
- D. 脓肿
- E. 流行性乙型脑炎

正确答案：E 您选择的答案：

第84题 胎儿娩出后4分钟，产妇出现多量阴道流血，最可能的诊断应是

- A. 宫缩乏力
- B. 阴道静脉破裂
- C. 宫颈裂伤
- D. 胎盘部分剥离
- E. 凝血功能障碍

正确答案：A 您选择的答案：

第85题 惊厥性全身性癫痫持续状态必须从速控制发作，并保持不再复发的时间至少为

- A. 6小时
- B. 12小时
- C. 24小时
- D. 48小时
- E. 72小时

正确答案：C 您选择的答案：

第86题 最常见的卵巢肿瘤并发症是

- A. 感染
- B. 破裂
- C. 出血
- D. 恶变
- E. 蒂扭转

正确答案：E 您选择的答案：

第87题 目前对学习概念的定义是

- A. 通过学校教育以增加自己的理论、知识、技能的过程
- B. 通过实践以增加自己的工作、生活经验和社交经验的过程
- C. 通过观察别人言行而改变自己不良行为、习惯的过程
- D. 通过练习而促使自己行为发生相对持久变化的过程
- E. 通过读书、实践以增加自己适应社会工作、生活能力的过程

正确答案：D 您选择的答案：

第88题 月经周期规则，末次月经2002.1.28，预产期应是

- A. 2002年11月1日
- B. 2002年11月2日
- C. 2002年11月3日
- D. 2002年11月4日
- E. 2002年11月5日

正确答案：D 您选择的答案：

第89题 在上运动神经元和感觉完好情况下，右上腹壁反射消失提示

- A. 右侧胸髓3-4节段病损
- B. 右侧胸髓5-6节段病损
- C. 右侧胸髓7-8节段病损
- D. 右侧胸髓9-10节段病损
- E. 右侧胸髓11-12节段病损

正确答案：C 您选择的答案：

第90题 胃大部切除术后出现贫血主要是由于减少了

- A. 主细胞
- B. 壁细胞
- C. 黏液细胞
- D. G细胞
- E. 嗜银细胞

正确答案：B 您选择的答案：

第91题 各种补体成分浓度达到成人水平的年龄是

- A. 2个月
- B. 3个月
- C. 4个月
- D. 5个月
- E. 6个月

正确答案：E 您选择的答案：

第92题 符合中度昏迷表现的是

- A. 对光反射存在
- B. 角膜反射存在
- C. 眼球无转动
- D. 肌肉松弛
- E. 深反射消失

正确答案：A 您选择的答案：

第93题 磺酰脲类药物可用于治疗

- A. 糖尿病合并高热
- B. 胰岛功能尚存的非胰岛素依赖型糖尿病
- C. 糖尿病并发酮症酸中毒
- D. 胰岛素依赖型糖尿病
- E. 重症糖尿病

正确答案：B 您选择的答案：

第94题 肺炎链球菌可引起

- A. 支气管肺炎
- B. 肺脓肿
- C. 大叶性肺炎(即典型肺炎)
- D. 支气管哮喘
- E. 胸膜炎

正确答案：C 您选择的答案：

第95题 肌肉中最主要的脱氨基方式是

- A. 嘌呤核苷酸循环
- B. 加水脱氨基作用
- C. 氨基移换作用
- D. D-氨基酸氧化脱氨基作用
- E. L-谷氨酸氧化脱氨基作用

正确答案：A 您选择的答案：

第96题 对原发性慢性肾上腺皮质功能减退症的诊断最有意义的血检结果是

- A. 醛固酮
- B. 血糖
- C. 血钠
- D. 皮质醇
- E. ACTH

正确答案：D 您选择的答案：

第97题 下列属于苯烷胺类选择性钙拮抗药是

- A. 硝苯地平
- B. 维拉帕米
- C. 普尼拉明
- D. 派克昔林
- E. 氟桂利嗪

正确答案：B 您选择的答案：

第98题 心脏病孕妇最容易发生心力衰竭的时期是

- A. 妊娠20~22周
- B. 妊娠24~26周
- C. 妊娠28~30周
- D. 妊娠32~34周
- E. 妊娠36~38周

正确答案：D 您选择的答案：

第99题 慢性再障的治疗首选

- A. 丙酸睾酮肌肉注射
- B. 造血干细胞移植
- C. 维生素B12肌注
- D. 抗胸腺球蛋白
- E. 肾上腺糖皮质激素口服

正确答案：A 您选择的答案：

第100题 中枢性尿崩症患者控制多尿最适宜的药物是

- A. 垂体后叶素水剂
- B. 油剂鞣酸加压素(长效尿崩停)
- C. 去氨加压素(弥凝)
- D. 双氢克尿塞
- E. 氯磺丙脲

正确答案：C 您选择的答案：

第101题 腺垂体功能减退症最常见原因是

- A. 希恩(Sheehan)综合征
- B. 各种垂体肿瘤
- C. 原发性空蝶鞍症
- D. 糖尿病血管病变
- E. 颅内感染后遗症

正确答案：B 您选择的答案：

第102题 重型胎盘早剥与先兆子宫破裂共有的临床表现是

- A. 合并妊娠高血压综合征
- B. 剧烈腹痛
- C. 跨耻征阳性
- D. 子宫呈板状硬
- E. 出现病理缩复环

正确答案：B 您选择的答案：

第103题 当风湿性心脏病二尖瓣狭窄程度加重时

- A. 心尖部舒张期滚筒样杂音增强，肺动脉第二音减低
- B. 心尖部舒张期滚筒样杂音减低，肺动脉第二音减低
- C. 心尖部舒张期滚筒样杂音减低，肺动脉第二音增强
- D. 心尖部舒张期滚筒样杂音增强，肺动脉第二音增强
- E. 心尖部收缩期吹风样杂音和舒张期滚筒样杂音增强

正确答案：D 您选择的答案：

第104题 血栓闭塞性脉管炎早期最主要的临床表现是

- A. 患肢萎缩
- B. 足部及小腿酸痛
- C. 间歇性跛行
- D. 持续性静息痛
- E. 肢端青紫

正确答案：C 您选择的答案：

第105题 残胃癌发生在因良性病变施行胃大部切除术后至少

- A. 1年
- B. 2年
- C. 3年
- D. 4年
- E. 5年

正确答案：E 您选择的答案：

第106题 诱发DIC最常见的病因为

- A. 恶性肿瘤
- B. 手术及外伤
- C. 革兰阴性细菌感染
- D. 产科意外
- E. 代谢性酸中毒

正确答案：C 您选择的答案：

第107题 区别血尿与血红蛋白尿的主要方法是

- A. 观察血尿颜色
- B. 做尿胆原测验
- C. 做尿潜血试验
- D. 做尿三杯试验
- E. 做尿沉渣镜检

正确答案：E 您选择的答案：

第108题 碳酸锂中毒的早期症状为

- A. 厌食、恶心、呕吐等胃肠道反应
- B. 震颤、共济失调
- C. 发热、定向障碍
- D. 癫痫大发作
- E. 下肢水肿、多尿

正确答案：B 您选择的答案：

第109题 谵妄综合征的主要特征为

- A. 意识障碍昼轻夜重
- B. 幻觉
- C. 注意涣散
- D. 记忆减退
- E. 错觉

正确答案：E 您选择的答案：

第110题 肱骨外科颈骨折是

- A. 肱骨大、小结节交界处
- B. 肱骨大、小结节移行为肱骨干的交界处
- C. 肱骨头周围的环形沟
- D. 肱骨头与肱骨干的交界处
- E. 肱骨上端干骺端处

正确答案：B 您选择的答案：

第111题 有特异性抗原受体的细胞是

- A. B淋巴细胞
- B. 浆细胞
- C. 巨噬细胞
- D. NK细胞
- E. 单核细胞

正确答案：A 您选择的答案：

第112题 《执业医师法》规定对考核不合格的医师，卫生行政部门可以责令其暂停执业活动，并接受培训和继续医学教育。暂停期限是3个月至

- A. 5个月
- B. 6个月
- C. 7个月
- D. 8个月
- E. 9个月

正确答案：B 您选择的答案：

第113题 胫骨易发生骨折的部位是

- A. 上端干骺端部位
- B. 横切面三棱形部位
- C. 横切面是四边形部位
- D. 横切面三棱与四边形移行部位
- E. 踝上部位

正确答案：D 您选择的答案：

第114题 继发性腹膜炎毒性强的原因主要是因为感染菌为

- A. 金黄色葡萄球菌
- B. 溶血性链球菌
- C. 大肠杆菌
- D. 各种细菌混合
- E. 绿脓杆菌

正确答案：A 您选择的答案：

第115题 缺铁性贫血最常见的病因是

- A. 慢性胃炎
- B. 慢性肝炎
- C. 慢性溶血
- D. 慢性感染
- E. 慢性失血

正确答案：E 您选择的答案：

第116题 肺炎球菌肺炎可出现以下体征，除了

- A. 口角或鼻周单纯性疱疹
- B. 肋间带状疱疹
- C. 皮肤和黏膜出血点
- D. 病变部位湿啰音
- E. 病变部位支气管呼吸音

正确答案：B 您选择的答案：

第117题 确诊肿瘤最可靠的方法是

- A. CT检查
- B. DSA检查
- C. B超检查
- D. 肿瘤标记物检查
- E. 病理学检查

正确答案：E 您选择的答案：

第118题 酶的催化高效性是因为酶

- A. 启动热力学不能发生的反应
- B. 能降低反应的活化能
- C. 能升高反应的活化能
- D. 可改变反应的平衡点
- E. 对作用物(底物)的选择性

正确答案：B 您选择的答案：

第119题 血吸虫虫卵引起的病变主要发生在

- A. 大肠壁和肝脏
- B. 肠系膜静脉
- C. 门静脉
- D. 肺和肠
- E. 肝和脾

正确答案：A 您选择的答案：

第120题 骑跨式外伤最易损伤尿道是

- A. 阴茎部
- B. 球部
- C. 膜部
- D. 前列腺部
- E. 膜上部

正确答案：B 您选择的答案：

第121题 肝癌的临床表现中，提示属晚期的表现是

- A. 腹胀、乏力
- B. 肝区疼痛
- C. 食欲不振
- D. 肝区肿块
- E. 体重下降

正确答案：D 您选择的答案：

第122题 注射MPTP(1-甲基-4-苯基I，2，3，6-四氢吡啶)可造成人和动物的疾病是

- A. 阿尔茨海默病
- B. 癫痫
- C. 帕金森病样症状
- D. 脑畸形
- E. 先天性脑积水

正确答案：C 您选择的答案：

第123题 肺癌所致阻塞性肺炎有以下临床征象，除了

- A. 患者一般不发热或仅有低热
- B. 血白细胞计数常不增高
- C. 抗生素治疗后炎症很快吸收消散
- D. 经抗生素治疗炎症吸收后出现肿块阴影
- E. 短期内同一部位可反复出现炎症

正确答案：C 您选择的答案：

第124题 肘关节脱位的特有体征

- A. 患肘肿痛、不能活动
- B. 以健侧手托患侧前臂
- C. 肘后三角关系正常
- D. 肘后三角关系异常
- E. 肘关节处于半伸直位

正确答案：C 您选择的答案：

第125题 水肿细胞电镜下观察，主要细胞器的病变是

- A. 肿胀的线粒体和扩张的内质网
- B. 发育不良的桥粒
- C. 肿胀的溶酶体
- D. 肿胀的核糖体
- E. 扩张的高尔基器

正确答案：A 您选择的答案：

第126题 小儿体格发育的两个高峰期是

- A. 婴儿期、学龄期
- B. 学龄前期、青春期
- C. 幼儿期、学龄期
- D. 婴儿期、青春期
- E. 新生儿期、学龄期

正确答案：D 您选择的答案：

第127题 短效口服避孕药含

- A. 雌激素
- B. 孕激素
- C. 雌激素+雄性激素
- D. 孕激素+雄性激素
- E. 雌激素+孕激素

正确答案：E 您选择的答案：

第128题 急性肺脓肿抗菌治疗的疗程是

- A. 4~6周
- B. 6~8周
- C. 8~12周
- D. 12~16周
- E. 16~20周

正确答案：B 您选择的答案：

第129题 腹部闭合性损伤X线检查发现右膈肌抬高，活动受限，最可能的损伤是

- A. 胃破裂
- B. 脾破裂
- C. 肝破裂
- D. 十二指肠破裂
- E. 结肠肝曲破裂

正确答案：C 您选择的答案：

第130题 来源于间叶组织的肿瘤是

- A. 癌
- B. 肉瘤
- C. 母细胞瘤
- D. 类癌
- E. 临界肿瘤

正确答案：B 您选择的答案：

第131题 应用全胃肠外营养时，氮和热量之比应为

- A. 1: 50 ~ 80kcal
- B. 1: 100 ~ 120kcal
- C. 1: 150 ~ 200kcal
- D. 1: 210 ~ 240kcal
- E. 1: 250kcal 以上

正确答案：C 您选择的答案：

第132题 口服避孕药后不规则出血，正确的处理方法是

- A. 加服少量雌激素
- B. 需立即停药
- C. 加服少量孕激素
- D. 加服少量雄性激素
- E. 加倍服药

正确答案：A 您选择的答案：

第133题 肛裂"三联征"是指

- A. 内痔，外痔，肛裂
- B. 肛裂，内痔，前哨痔
- C. 内痔，外痔，前哨痔
- D. 肛裂，前哨痔，齿状线上乳头肥大
- E. 肛裂，前哨痔，外痔

正确答案：D 您选择的答案：

第134题 慢性肾盂肾炎是

- A. 肾小管和肾间质的慢性化脓性炎症
- B. 一种肾小球免疫复合物性肾炎
- C. 一种以增生为主的炎症
- D. 一种以变质为主的炎症
- E. 肾小球肾炎的一种特殊类型

正确答案：A 您选择的答案：

第135题 能杀伤细胞的细胞因子是

- A. IL-2
- B. TNFa
- C. 干扰素
- D. IL-4
- E. IL-1

正确答案：B 您选择的答案：

第136题 属于IC类的抗心律失常药物是

- A. 奎尼丁
- B. 利多卡因
- C. 普罗帕酮
- D. 胺碘酮
- E. 维拉帕米

正确答案：C 您选择的答案：

第137题 类风湿关节炎(RA)病人中可以查到类风湿因子(RF)，因此RF

- A. 是诊断RA的必备条件
- B. 一旦出现，将不会发生改变
- C. 可随疾病的变化而变化
- D. 正常人不会出现
- E. 在其他自身免疫病中不会出现

正确答案：C 您选择的答案：

第138题 可引起男子乳房女性化和妇女多毛症的药物是

- A. 甘露醇
- B. 螺内酯
- C. 呋塞米
- D. 糖皮质激素
- E. 氢氯噻嗪

正确答案：B 您选择的答案：

第139题 小儿腹泻的定义是

- A. 多为轮状病毒感染致秋季腹泻
- B. 星状病毒感染致腹泻
- C. 致病性大肠杆菌感染致腹泻
- D. 饥饿性腹泻
- E. 多病原，多因素引起的大便次数增多和性状改变

正确答案：E 您选择的答案：

第140题 下列关于肽键性质和组成的叙述正确的是

- A. 由Ca和C-COOH组成
- B. 由Ca1 和Ca2组成
- C. 由Ca和N组成
- D. 肽键有一定程度双键性质
- E. 肽键可以自由旋转

正确答案：D 您选择的答案：

第141题 早期确诊甲状腺功能减低症的实验室检查是

- A. 甲状腺抗体的测定
- B. TRH兴奋实验
- C. 血清T3、T4、TSH测定
- D. 甲状腺扫描
- E. 骨龄测定

正确答案：C 您选择的答案：

第142题 子宫颈原位癌累及腺体是指

- A. 子宫颈腺体充满癌细胞
- B. 子宫颈表面发生的原位癌影响腺体分泌排出
- C. 子宫颈表面和腺体先后发生了原位癌，并侵犯腺体周围间质
- D. 子宫颈原位癌突破基底膜侵犯腺体
- E. 子宫颈原位癌沿基底膜伸入腺体内致腺管上皮为癌细胞所取代，腺体基底膜完整

正确答案：E 您选择的答案：

第143题 心理障碍患者躯体症状的产生是由于心理必须通过生理的中介才能产生的，持这种观点的学者是

- A. 罗杰斯
- B. 坎农
- C. 巴甫洛夫
- D. 华生
- E. 弗洛伊德

正确答案：B 您选择的答案：

第144题 高血压病脑出血最常见的部位是

- A. 豆状核和丘脑
- B. 内囊和基底节
- C. 蛛网膜下腔
- D. 侧脑室
- E. 大脑髓质

正确答案：B 您选择的答案：

第145题 全身骨与关节结核中发病率最高的是

- A. 髋关节结核
- B. 膝关节结核
- C. 脊柱结核
- D. 肘关节结核
- E. 肩关节结核

正确答案：C 您选择的答案：