

历年试题1(2000~2003年) 历年试题 A2型题

一、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 男，52岁，因患十二指肠球部溃疡合并幽门不全梗阻入院施行胃大部切除术。术中出血约600ml，心率92次/分；呼吸21次/分，血压98/60mmHg(13.1/8.0kPa)；血红蛋白105g/L。在输血问题上，正确做法是

- A. 输注晶体液补充血容量，原则上不输血
- B. 输全血600ml补充丢失的失血量
- C. 输血浆和红细胞各300ml代替丢失的全血
- D. 输红细胞悬液600ml，不必输注全血
- E. 输血浆600ml补充血容量，不必输注红细胞

正确答案：A 您选择的答案：

第2题 5岁小儿按公式计算身高、体重及头围约是

- A. 90cm、12kg、44cm
- B. 95cm、14kg、46cm
- C. 100cm、16kg、48cm
- D. 105cm、18kg、50cm
- E. 110cm、20kg、52cm

正确答案：D 您选择的答案：

第3题 女，35岁。误服有机磷农药50ml，立即被其家人送往医院，该病人抢救成功的关键是

- A. 彻底洗胃
- B. 早期应用解磷定
- C. 早期应用阿托品
- D. 解磷定与阿托品合用
- E. 静脉注射西地兰

正确答案：A 您选择的答案：

第4题 双胎妊娠。第一胎儿自然经阴道娩出后8分钟，第二胎儿娩出，10分钟后娩出胎盘，随即出现阴道多量流血；数分钟内流血达500ml。本例最可能的诊断是

- A. 胎盘残留
- B. 副胎盘残留
- C. 宫缩乏力
- D. 宫颈裂伤
- E. 凝血功能障碍

正确答案：C 您选择的答案：

第5题 1岁患儿，已诊断为“化脓性脑膜炎”，曾用青霉素加氯霉素治疗一周，病情好转，体温正常，近3天来又出现发热、抽搐，查体：前囟紧张，脑脊液检查示：外观清亮，白细胞 $12 \times 10^6/L$ ，蛋白450mg/L；氯化物110mmol/L，糖4.0mmol/L，应首先考虑的诊断是

- A. 脑膜炎复发
- B. 硬脑膜下积液(脓)
- C. 脑水肿
- D. 脑脓肿
- E. 脑膜炎后遗症

正确答案：B 您选择的答案：

第6题 A县张某系艾滋病患者，在B市传染病医院隔离治疗期间，擅自逃出医院回到A县，脱离隔离治疗。为防止艾滋病传播，可以协助传染病医院追回张某采取强制隔离治疗措施的是

- A. 卫生行政部门
- B. 疾病预防控制中心
- C. 民政部门
- D. 司法部门
- E. 公安部门

正确答案：B 您选择的答案：

第7题 女孩，11个月，多汗，烦躁，睡眠不安，可见肋膈沟，下肢轻度“O”形腿，血清钙稍低，血磷降低，碱性磷酸酶增高，其佝偻病应处于

- A. 前驱期
- B. 初期
- C. 激期
- D. 恢复期
- E. 后遗症期

正确答案：C 您选择的答案：

第8题 24岁初产妇，规律宫缩10小时，连续观察2小时，宫口由6cm开大至7cm，胎头+1，胎心140次/分。本例恰当的处置应是

- A. 严密观察产程进展
- B. 肌注哌替啶(杜冷丁)
- C. 静脉滴注缩宫素
- D. 立即行人工破膜
- E. 立即行剖宫产术

正确答案：A 您选择的答案：

第9题 30岁男性农民，腹痛、腹泻半个月，大便4~8次/天，便量多，为暗红色，有腥臭味，肉眼可见血液及黏液，患者无发热，左下腹隐痛，大便镜检：WBC10~15个/HP，RBC满视野，该患者最可能的诊断是

- A. 细菌性痢疾

- B. 肠伤寒合并肠出血
- C. 阿米巴痢疾
- D. 溃疡性结肠炎
- E. 血吸虫病

正确答案：D 您选择的答案：

第10题 女，37岁。查体发现甲状腺 度肿大、质地中等硬度、表面不光滑、无触痛、颈浅表淋巴结不肿大。患者无心慌、怕热、多汗、易饿等症状，也无怕冷、便秘、体重增加等表现，血检T3、T4及TSH正常，TPO-Ab及TG-Ab显著升高。最可能的诊断是

- A. 甲状腺癌
- B. 亚急性甲状腺炎
- C. 慢性淋巴细胞性甲状腺炎
- D. 结节性甲状腺肿
- E. 甲状腺腺瘤

正确答案：C 您选择的答案：

第11题 45岁男性，间歇性肉眼血尿3月余，IVP见左肾盂内有不规则充盈缺损，膀胱镜检见左侧输尿管口喷血，应首先考虑

- A. 肾结核
- B. 肾癌
- C. X线不显影肾结石
- D. 肾盂癌
- E. 肾炎

正确答案：D 您选择的答案：

第12题 33岁经产妇，平时月经周期稍缩短，经量多。检查宫颈糜烂 度，宫口松，最合适的避孕方法应是

- A. 安全期避孕
- B. 阴茎套避孕
- C. 阴道隔膜避孕
- D. 宫内节育器避孕
- E. 口服避孕药避孕

正确答案：E 您选择的答案：

第13题 男性，53岁。肝硬化病史6年，近日前出现腹痛、腹胀和低热，表情淡漠，嗜睡。诊断考虑为肝性脑病，对诊断帮助最大的体征是

- A. 腹壁反射消失
- B. 腱反射亢进
- C. 踝阵挛
- D. 扑翼样震颤
- E. Babinski征阳性

正确答案：D 您选择的答案：

第14题 8岁患儿，浮肿、少尿4天，近1天来诉头痛、头昏、呕吐并抽搐1次，查体，体温37.3℃，血压170/120mmHg，血BUN7.8mmol/L，尿常规示：蛋白++，红细胞>100个/HP，白细胞30个/HP，该患儿准确的诊断为

- A. 急性肾炎
- B. 慢性肾炎急性发作
- C. 肾炎性肾病，高血压脑病
- D. 急性肾炎，高血压脑病
- E. 急性肾炎，颅内出血

正确答案：C 您选择的答案：

第15题 男性，67岁，肺源性心脏病急性加重期患者。血气分析：pH7.25，PaCO₂9.3kPa(70mmHg)，HCO₃⁻30mmol/L；对其酸碱失衡的治疗措施应为

- A. 静脉滴注5%碳酸氢钠
- B. 静脉滴注盐酸精氨酸
- C. 给予利尿剂
- D. 补充氯化钾
- E. 改善通气功能

正确答案：E 您选择的答案：

第16题 55岁女性，右手拇指晨起僵硬伴疼痛半年，近2周出现该处的肿胀及活动受限，被动活动患指可出现伴疼痛的弹响。临床诊断最可能是

- A. 类风湿关节炎
- B. 关节内游离体
- C. 骨关节炎
- D. 风湿性关节炎
- E. 狭窄性腱鞘炎

正确答案：E 您选择的答案：

第17题 4岁男孩，妈妈在给穿衣服时牵拉左腕，患儿突然大哭，左肘功能障碍，左手不肯拿取玩物。其可能的诊断是

- A. 左肘关节脱位
- B. 左肱骨髁上骨折
- C. 左肱骨内髁撕脱骨折
- D. 左肱骨外髁撕脱骨折
- E. 左桡骨头半脱位

正确答案：E 您选择的答案：

第18题 某病人认为幼年时某次呕吐，实际上就是有人在食物中放毒，所以现在有病，是他们还没有放弃迫害，属于

- A. 近事遗忘

- B. 远事遗忘
- C. 错构
- D. 妄想性回忆
- E. 虚构

正确答案：D 您选择的答案：

第19题 男，47岁，突然神志丧失，呼吸不规则，即刻进行心脏按压，判断其是否有效的主要方法是

- A. 测血压
- B. 呼喊病人看其是否清醒
- C. 摸桡动脉搏动
- D. 摸股动脉搏动
- E. 观察末梢循环状况

正确答案：D 您选择的答案：

第20题 某病人，13岁，在生活中养成不良的抽烟习惯，父母非常恼火，心理医生建议其采取的较有效的行为治疗是

- A. 条件刺激和非条件刺激相结合
- B. 环境因素和操作动作相结合
- C. 厌恶刺激与不良行为相结合
- D. 通过对不良行为的认识来矫正
- E. 用转变注意力的方法来矫正

正确答案：C 您选择的答案：

第21题 女性病员王某，55岁。因患乙状结肠癌行肿瘤切除、结肠造瘘术。术中顺利，在关腹前，输A型血约50ml；病员突然出现寒战，伤口渗血，导尿为全程血尿，当即认定系输血引起的溶血反应，立即停止输血、进行抢救；同时复查，病员系O型血，即改输O型血400ml。由于发现及时，抢救得当，病员转危为安。经调查发现，系血库工作人员甲将血样试管搞错，导致定错血型，发生溶血反应。甲的行为违反了《临床输血技术规范》的

- A. 输血申请规定
- B. 受血者血样采集和送检规定
- C. 交叉配血规定
- D. 发血规定
- E. 输血规定

正确答案：C 您选择的答案：

第22题 42岁妇女，患慢性肾炎3年，半年前因早孕行药物流产，现要求避孕指导，本例最恰当酌避孕措施应是

- A. 安全期避孕
- B. 口服短效避孕药
- C. 皮下埋植避孕
- D. 阴茎套避孕
- E. 行输卵管结扎术

正确答案：E 您选择的答案：

第23题 5岁男孩，低热，干咳，皮肤结节性红斑，疱疹性结膜炎，多发性一过性关节炎及颈淋巴结肿大常见于

- A. 风湿热
- B. 传染性单核细胞增多症
- C. 类风湿性关节炎
- D. 原发性肺结核
- E. 川崎病

正确答案：E 您选择的答案：

第24题 男，58岁，患肝炎已10余年，因无力、纳差、腹胀20天诊断为肝炎后肝硬化(失代偿期)入院。肝功能试验显著异常，其中白蛋白降低，球蛋白增高，白蛋白/球蛋白比率倒置。为治疗低蛋白血症，首选的血液制品是

- A. 全血
- B. 新鲜冰冻血浆
- C. 普通冰冻血浆
- D. 冷沉淀
- E. 白蛋白

正确答案：E 您选择的答案：

第25题 中年男性，骑摩托车摔倒，左小腿砸伤10小时后来院。检查见右小腿中段高度肿胀，坚硬并有异常活动，足部皮温较对侧低，感觉明显减退，足背动脉触不到。X线证实左胫腓骨中段骨折。其可能的并发症是

- A. 胫前动脉损伤
- B. 腓总神经损伤
- C. 脂肪栓塞
- D. 感染
- E. 骨筋膜室综合征

正确答案：E 您选择的答案：

第26题 男，28岁，查血压160/95mmHg(21.3/12.6kPa)，Hb85g/L，尿蛋白+，颗粒管型2~3个/HP，BUN10mmol/L，Cr220μmol/L。对该患者不宜采取

- A. 低蛋白饮食
- B. 高蛋白饮食
- C. 低钠饮食
- D. 根据尿量多少适当限水
- E. 低磷饮食

正确答案：B 您选择的答案：

第27题 某生参加高考前数月产生严重焦虑，来到咨询室后，该生讲述了内心的恐惧与担心，治疗师只是认真地倾听，不做指令性指导，这种心理疗法的理论属于

- A. 精神分析理论

- B. 认知理论
- C. 人本主义理论
- D. 心理生理理论
- E. 行为理论

正确答案：C 您选择的答案：

第28题 女，27岁，妊娠分娩胎儿死亡，3天后出现精神异常，并出现黄疸，尿检中有蛋白，下列检查对诊断帮助最大的是

- A. 脑电图
- B. 肾功能
- C. 血胆红素
- D. 血常规
- E. 血清抗核抗体

正确答案：C 您选择的答案：

第29题 无眩晕、无听力障碍和肌力完好的患者，出现右上肢指鼻试验不正确和轮替动作差、右下肢跟膝胫试验差。病损部位在

- A. 小脑蚓部
- B. 右侧小脑半球
- C. 左侧小脑半球
- D. 左侧脑桥前庭神经核
- E. 右侧脑桥前庭神经核

正确答案：B 您选择的答案：

第30题 中年，男性，不慎跌倒摔伤右肩。以左手托右肘部来诊。头向右倾，检体见右肩下沉，右上肢功能障碍。胸骨柄至右肩峰连线中点隆起，并有压痛，其可能的诊断是

- A. 肩关节脱位
- B. 锁骨骨折
- C. 肱骨外科颈骨折
- D. 肩胛骨骨折
- E. 肱骨解剖颈骨折

正确答案：B 您选择的答案：

第31题 25岁初孕妇，妊娠36周，枕右前位，出现少量阴道流血，无宫缩，胎心136次/分。本例最恰当的处理方法应是

- A. 期待疗法
- B. 缩宫素静脉滴注引产
- C. 立即行人工破膜
- D. 立即静脉滴注止血药物
- E. 行剖宫产术

正确答案：A 您选择的答案：

第32题 女，40岁。腹泻1年。体检发现一肛瘘，结肠镜示回盲部铺路石样改变，最可能的诊断是

- A. 结肠癌
- B. 溃疡性结肠炎
- C. 细菌性痢疾
- D. 克罗恩病
- E. 肠结核

正确答案：D 您选择的答案：

第33题 男，4岁，胸骨左缘3~4肋间3/6级收缩期杂音，肺动脉第2音亢进，胸片示左右心室扩大。应诊断为

- A. 室间隔缺损
- B. 房间隔缺损
- C. 动脉导管未闭
- D. 肺动脉狭窄
- E. 法洛四联症

正确答案：A 您选择的答案：

第34题 急性心肌梗死患者，疑有早期心源性休克末梢循环改变，血压90/70mmHg(12/9.3kPa)，尿比重1.016，中心静脉压13cmH₂O。治疗时应首选

- A. 肾上腺素
- B. 低分子右旋糖酐
- C. 西地兰
- D. 硝普钠
- E. 心痛定

正确答案：D 您选择的答案：

第35题 产褥妇，现产后3天，出现急性腹痛伴发热2天，腹部包块增大，曾诊断患“子宫肌瘤”。本例应考虑的诊断是

- A. 产褥感染
- B. 子宫肌瘤囊性变
- C. 子宫肌瘤玻璃样变
- D. 子宫肌瘤红色变
- E. 子宫肌瘤恶性变

正确答案：D 您选择的答案：

第36题 男，56岁。突发性右侧肢体无力，伴头痛、呕吐，排黑便2次。有高血压和糖尿病史5年。黑便原因很可能是

- A. 食管癌
- B. 胃癌
- C. 胃溃疡
- D. 急性胃黏膜病变

E. 胃底静脉曲张破裂出血

正确答案：D 您选择的答案：

第37题 50岁男性，咳嗽伴声音嘶哑3个月，右锁骨上窝触及一个肿大的淋巴结，质硬无压痛。提示该患者的诊断是

- A. 喉炎
- B. 肺癌
- C. 胃癌
- D. 鼻咽癌
- E. 肺结核

正确答案：B 您选择的答案：

第38题 男性，40岁，发热伴鼻出血1周。检查牙龈肿胀，肝脾轻度肿大，血红蛋白40g/L，白细胞 $6.0 \times 10^9/L$ ，血小板 $15 \times 10^9/L$ ，骨髓象原始细胞占60%，过氧化酶染色阳性，非特异性酯酶阳性，阳性反应可被氟化钠抑制，应诊断为

- A. 急性粒细胞性白血病
- B. 急性早幼粒细胞白血病
- C. 急性淋巴细胞性白血病
- D. 急性红白血病
- E. 急性单核细胞性白血病

正确答案：E 您选择的答案：

第39题 男性，50岁。因肾病综合征入院作肾活检，病理显示膜性肾病。治疗过程中突然出现双侧肾区疼痛，尿量减少，低热，蛋白尿显著增多伴肉眼血尿，下肢浮肿加重，肾功能较前稍有减退。

B超示双肾大小较前有所增大。此时最可能的原因是

- A. 伴发肾结石
- B. 原有膜性肾病加重
- C. 伴发泌尿系肿瘤
- D. 肾静脉血栓形成
- E. 泌尿系结核

正确答案：D 您选择的答案：

第40题 男，38岁，上腹疼痛6年。餐前痛、伴反酸，近日疼痛加重，且呈持续性向腰背部放射，有时低热。胃肠钡餐示：十二指肠球部变形。血白细胞 $11 \times 10^9/L$ ，中性0.78。诊断首先考虑为

- A. 慢性胃炎
- B. 胃溃疡
- C. 胃癌
- D. 十二指肠穿透性溃疡
- E. 胃黏膜脱垂

正确答案：D 您选择的答案：

第41题 女，54岁。有胆囊结石病史8年。上腹剧痛2天，向腰部放射，伴恶心、呕吐，血淀粉酶升高2倍，以下最有价值的检查是

- A. 腹部平片
- B. 上消化道钡餐
- C. 心电图
- D. 腹部CT
- E. 胃镜

正确答案：D 您选择的答案：

第42题 女性，58岁患者。因发热、咳嗽、胸闷、气短1周收入住院。查体：T37.5，R24次/分，口唇发绀。双下肺叩诊呈浊音、语颤明显减弱、呼吸音消失。腹部隆起，叩诊移动性浊音(+)。双侧胸液、腹水呈乳糜样，苏丹染色阴性。胸液、腹液常规均示渗出液，淋巴细胞为主，LDH1200U/L，CEA明显增高。PPD(+)。最可能的诊断是

- A. 化脓性胸膜炎
- B. 结核性胸膜炎
- C. 恶性胸腔积液
- D. 乳糜样胸腔积液
- E. 结缔组织疾病

正确答案：C 您选择的答案：

第43题 女性，32岁，阵发性上腹痛2年，夜间加重，疼痛有季节性，冬季明显，有返酸，为进一步确诊，首选的检查方法是

- A. X线钡餐检查
- B. CT检查
- C. 胃液细胞学检查
- D. 胃液分析
- E. B超

正确答案：A 您选择的答案：

第44题 来院就诊的25岁妊娠征初孕妇，对估计病情及决定处理方案最有价值的辅助检查方法是

- A. 全血黏度比值和血浆黏度比值
- B. 测定红细胞比容
- C. 眼底检查
- D. 测定血谷丙转氨酶值
- E. 测定尿雌激素/肌酐值

正确答案：C 您选择的答案：

第45题 女，28岁。21岁时因心慌、怕热、多汗、消瘦就诊，确诊Graves病，他巴唑规则治疗2年。25岁时甲亢复发，再次他巴唑治疗，2个月后甲状腺功能正常，继续治疗一年半停药。最近2个月甲亢的症状、体征再现，查血T₃、T₄及TSH确认为甲亢第2次复发。患者结婚5年，尚未生育，希望治疗甲亢后怀孕，甲亢的治疗拟

- A. 大剂量碘剂

- B. 再次他巴唑治疗，疗程延长至3~4年
C. 用他巴唑，甲功正常后加用¹³¹I治疗
D. 用他巴唑，甲功正常后行甲状腺大部切除手术
E. 直接行甲状腺大部切除术
正确答案：D 您选择的答案：

第46题 女，28岁，妊娠28周，2小时糖耐量试验血糖水平依次为5.0、9.5、10.0及8.5mmol/L，1周后早餐后2小时血糖为8.7mmol/L，患者系初次妊娠，既往无糖尿病史，诊断为

- A. 糖耐量正常
B. 妊娠期糖耐量减低
C. 妊娠期糖尿病
D. 糖尿病合并妊娠
E. 特殊类型糖尿病
正确答案：B 您选择的答案：

第47题 肝硬化患者，近1周来发热、腹痛，腹水明显增加。腹水检查：淡黄，比重1.017，蛋白35g/L，白细胞 $0.5 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞为主。最可能并发

- A. 结核性腹膜炎
B. 自发性腹膜炎
C. 门静脉血栓形成
D. 原发性肝癌
E. 肝肾综合征
正确答案：B 您选择的答案：

第48题 男性，68岁。肝右叶巨大肿瘤，腹水征阳性。血清生化检查：白蛋白20g/L，总胆红素60μmol/L。血管造影示：门静脉右支闭塞。最适合的治疗方法为

- A. 扩大肝右叶切除术
B. 肝动脉结扎术
C. 全身化疗
D. 肝动脉内抗癌药持续注入法
E. 放射疗法
正确答案：D 您选择的答案：

第49题 30岁已婚妇女，停经48天，剧烈腹痛2天，阴道不规则流血1天，今晨从阴道排出三角形膜样组织，检查：贫血外貌，下腹部压痛、反跳痛明显。正确治疗措施应选择

- A. 立即行刮宫术
B. 静脉滴注缩宫素
C. 肌注麦角新碱
D. 行剖腹探查术
E. 应用止血药
正确答案：D 您选择的答案：

第50题 7岁男孩，突发寒战、高热($T_{39.8}$)，烦躁不安；诉右膝下方剧痛，膝关节呈半屈曲状，拒动。查体：右小腿近端皮温高，压痛，病变区域穿刺抽出混浊液体，送细菌培养，最可能的结果是

- A. 乙型链球菌
B. 金黄色葡萄球菌
C. 大肠杆菌
D. 链球菌
E. 无细菌生长
正确答案：A 您选择的答案：

第51题 女性，50岁，左侧腹胀、腹痛，大便不成形，每日3~4次，有脓血。查体：左下腹似可扪及包块，边界不清，明确诊断首选的检查是

- A. B超
B. CT
C. CEA
D. 直肠指诊、结肠镜
E. 大便潜血试验
正确答案：D 您选择的答案：

第52题 男性，52岁患者，因咳嗽、胸闷、气短1周收入院。查体： $T_{37.5}$ ， R_{24} 次/分，口唇发绀，左锁骨上可触及一花生米大之淋巴结，质硬、固定、无压痛，气管向左侧移位，右肺叩诊呈浊音、语颤明显减弱、呼吸音消失。胸液常规示蛋白含量35g/L， $WBC_{850} \times 10^6/L$ ， $N_{20\%}$ ， $L_{80\%}$ ，细胞学见大量淋巴细胞。LDH800U/L，PPD(+)。最可能的诊断是

- A. 右侧大叶性肺炎
B. 右侧结核性胸膜炎
C. 右侧恶性胸腔积液
D. 右侧化脓性胸腔积液
E. 右侧漏出性胸腔积液
正确答案：C 您选择的答案：

第53题 孕40周新生儿，出生时由口鼻排出部分肺内液体，其余经血管及淋巴管吸收的肺液约占

- A. 1/4
B. 1/3
C. 1/2
D. 2/3
E. 3/4
正确答案：D 您选择的答案：

第54题 46岁妇女，月经周期延长，经量增多及经期延长，此次月经量多且持续12天，妇科检查子宫稍大稍软。本例有效的止血措施选择

- A．静脉注射立止血(或6-氨基己酸)
- B．口服大剂量雌激素
- C．口服大量安宫黄体酮
- D．口服甲基睾丸素
- E．行刮宫术

正确答案：E 您选择的答案：

第55题 病人外阴痒1周，查阴道黏膜覆以膜状物，擦除后露出红肿黏膜面，正确的处理应是

- A．局部用克林霉素软膏
- B．阴道内放置达克宁栓
- C．阴道内放置甲硝唑片
- D．阴道内放置尼尔雌醇片
- E．外阴部用0.5%醋酸液洗涤

正确答案：C 您选择的答案：

第56题 男性，28岁吸烟患者，因低热、咳嗽2个月，痰中带血1周来院门诊。查体，T37.5，双侧颈后可触及多个可活动之淋巴结，右上肺可闻及支气管肺泡音。胸片示右上肺云雾状阴影。最可能的诊断是

- A．原发型肺结核
- B．血行播散型肺结核
- C．浸润型肺结核
- D．支气管肺癌
- E．慢性纤维空洞型肺结核

正确答案：D 您选择的答案：

第57题 男，25岁。反复上腹部疼痛5年。反酸嗝气，最具诊断意义的检查项目是

- A．腹部B超
- B．消化道钡餐
- C．胃镜检查
- D．大便隐血试验
- E．胃液分析

正确答案：C 您选择的答案：

第58题 52岁妇女，绝经6年，阴道淋漓流血10天。查右附件区扪及手拳大肿物，阴道脱落细胞提示雌激素高度影响。本例最可能的诊断应是右侧卵巢

- A．纤维瘤
- B．浆液性囊腺瘤
- C．良性囊性畸胎瘤
- D．黏液性囊腺瘤
- E．卵泡膜细胞瘤

正确答案：E 您选择的答案：

第59题 男性，61岁，患有高血压，同时伴有2型糖尿病，尿蛋白(+)，选择最佳降压药物为

- A．利尿剂
- B．钙拮抗剂
- C．ACE-I
- D．α受体阻滞剂
- E．β受体阻滞剂

正确答案：B 您选择的答案：

第60题 男，59岁。2型糖尿病史16年。二甲双胍0.25g及格列齐特80mg每日3次，糖尿病控制良好。近2个月感乏力，体重下降4~5kg。肠镜检查发现乙状结肠癌拟行手术治疗。围手术期糖尿病处理

- A．停口服降糖药、减少饮食量
- B．改用长效胰岛素
- C．改用短效胰岛素
- D．胰岛素及胰岛素增敏剂联合治疗
- E．改用α-葡萄糖苷酶抑制剂

正确答案：C 您选择的答案：

第61题 男性，20岁，右大腿刀刺伤18小时，刀口处红肿，有渗出液，目前最适当的治疗措施是

- A．清创缝合
- B．抗生素治疗
- C．理疗
- D．清理伤口后换药
- E．局部固定

正确答案：A 您选择的答案：

第62题 36岁已婚妇女，闭经8个月。查子宫稍小。肌注黄体酮20mg连用3日，未见撤药性流血，再给予己烯雌酚1mg连服20日后3天加用安宫黄体酮10mg，出现撤药性流血。本例应诊断为

- A．子宫性闭经
- B．第一度闭经
- C．第二度闭经
- D．垂体性闭经
- E．下丘脑性闭经

正确答案：C 您选择的答案：

第63题 男性，59岁，因右腹股沟斜疝行手术治疗。术中发现疝囊壁的一部分由盲肠组成，此时的诊断为

- A．Richter疝

- B. Littre疝
- C. 滑动疝
- D. 难复性疝
- E. 易复性疝

正确答案：C 您选择的答案：

第64题 男性，32岁，3小时前从5米高处跌下，左腰部撞到石块上，当时无昏迷，现血压正常，感左腰部疼。痛伴轻压痛，尿常规RBC+ / HP，最可能的诊断是

- A. 肾挫伤
- B. 肾部分裂伤
- C. 肾全层裂伤
- D. 肾蒂断裂
- E. 肾蒂伤伴输尿管损伤

正确答案：A 您选择的答案：

第65题 病人男性，21岁，右侧肢体抽搐2年，突然昏迷1小时。查体：神志浅昏迷，左侧肢体偏瘫。CT显示右额叶脑内血肿，临床诊断最可能是

- A. 原发性癫痫
- B. 脑动脉硬化
- C. 脑动脉瘤
- D. 脑血管畸形
- E. 高血压脑出血

正确答案：D 您选择的答案：

第66题 女性，20岁，因十二指肠溃疡所致幽门梗阻引起反复呕吐15天入院，测得血钾值为3mmol / L，动脉血pH7.5，首选补液种类应为

- A. 乳酸、氯化钾溶液
- B. 氯化钾溶液
- C. 等渗盐水
- D. 葡萄糖盐水
- E. 葡萄糖盐水、氯化钾溶液

正确答案：E 您选择的答案：

第67题 34岁男性，上腹灼痛3个月，柏油样便，2日，为了确诊，首选检查是

- A. X线钡餐透视
- B. 大便隐血试验
- C. 血常规
- D. 胃镜
- E. B超

正确答案：A 您选择的答案：

第68题 5岁男孩，突发寒战，体温39℃，右膝部疼痛剧烈，不敢活动，局部无明显肿胀。应首先考虑的是

- A. 慢性骨髓炎
- B. 化脓性关节炎
- C. 类风湿性关节炎
- D. 急性血源性骨髓炎
- E. 胫骨结节骨软骨病

正确答案：B 您选择的答案：

第69题 男，38岁。性欲减退、阳痿3年，近1年轻度头痛。头颅磁共振(MRI)检查发现高2.8cm垂体大腺瘤、压迫视神经交叉、浸润左侧海绵窦。第二天晨取血查垂体及其靶腺功能后接受了7-73垂体外照射放射治疗。5天后化验报告血睾酮水平0.7mmol / L，FSH及LH均<2mU / L(垂体-性腺轴功能减低)，血PRL、GH、ACTH及TSH、T3、T4水平均无特殊。符合垂体无功能性大腺瘤。本例垂体腺瘤治疗

- A. 采用广刀放射治疗是合理的选择
- B. 用睾酮类药物替代治疗后再放射治疗
- C. 首选溴隐亭等多巴胺激动剂治疗
- D. 手术治疗、术后加用放射治疗
- E. 无功能性垂体腺瘤可暂不处理，观察1~2年

正确答案：D 您选择的答案：

第70题 男，50岁，1周前心前区剧烈疼痛，随后心悸、气促，怀疑急性心肌梗死。为确诊最有帮助的酶学检查是

- A. LDH
- B. GOT
- C. CPK
- D. 肌钙蛋白T
- E. CPK同工酶

正确答案：A 您选择的答案：

第71题 5岁男孩，发热1天，腹泻6~7次，为黏液性脓血便，腹痛伴里急后重，病前吃过未洗的黄瓜，大便常规检查：黏液便，红白细胞满视野，诊断为细菌性痢疾。其类型属于

- A. 普通型
- B. 轻型
- C. 重型
- D. 中毒型
- E. 慢性型

正确答案：A 您选择的答案：

第72题 女性，45岁，幽门梗阻行持续胃肠减压半月余，每日补10%葡萄糖2500ml，5%葡萄糖盐水1000ml，10%氯化钾30ml。2天前开始出现全腹胀，无压痛及反跳痛，肠鸣音消失，每日尿量1500ml左右，最可能的原因是

- A. 低钾血症

- B. 低钠血症
- C. 高钾血症
- D. 高钠血症
- E. 低钙血症

正确答案：A 您选择的答案：

第73题 女性，21岁患者，因发热、干咳、乏力20天，咯血2天入院。查体：T38.5℃，消瘦，右上肺触觉语颤增强、叩诊浊音、可闻及支气管呼吸音。PPD(1单位)硬结20mm，表面有水泡。X线胸片于右上2~4前肋处见密度高，浓淡不均阴影。最可能的诊断是

- A. 右上肺癌
- B. 右上肺结核
- C. 右上包裹性积液
- D. 右上大叶性肺炎
- E. 右上支气管扩张症

正确答案：B 您选择的答案：

第74题 24岁初孕妇。妊娠33周，头痛6天，经检查血压160/110mmHg，治疗3天无显效。今晨5时突然出现剧烈腹痛。检查子宫板状硬。最可能的诊断是

- A. 妊娠合并急性阑尾炎
- B. 胎盘早剥
- C. 前置胎盘
- D. 先兆子宫破裂
- E. 先兆早产

正确答案：B 您选择的答案：

第75题 26岁男患者，家住沈阳。于12月突然发病，表现为发冷、寒战、高热、大汗后而缓解，隔日发作一次，已10天。体检：脾肋下1cm，余未见异常，末梢血化验：WBC $5.0 \times 10^9/L$ ，N0.68，L0.32，Hb100g/L，血培养(-)。患者同年8月曾去海南旅游半个月。该患者发热最可能的原因是

- A. 伤寒
- B. 疟疾
- C. 败血症
- D. 急性血吸虫病
- E. 急性粒细胞型白血病

正确答案：B 您选择的答案：

第76题 一位医生在为其患者进行角膜移植手术的前一夜，发现备用的眼球已经失效，于是到太平间看是否有尸体能供角膜移植之用，恰巧有一尸体。考虑到征求死者家属意见很可能会遭到拒绝，而B.时间也紧迫，于是便取出了死者的一侧眼球，然后用义眼代替。尸体火化前，死者家属发现此事，便把医生告上法庭。经调查，医生完全是为了患者的利益，并没有任何与治疗无关的动机，对此案例的分析，哪个是最恰当的

- A. 此案例说明我国器官来源的缺乏
- B. 此案例说明我国在器官捐赠上观念陈旧
- C. 此案例说明医生为了患者的利益而摘取眼球在伦理学上是可以得到辩护的
- D. 此案例说明首先征得家属的知情同意是一个最基本的伦理原则
- E. 此案例说明医院对尸体的管理有问题

正确答案：D 您选择的答案：

第77题 男性，34岁，腹部砸伤4小时，查体见四肢湿冷，腹肌紧张，全腹压痛反跳痛，有移动性浊音，肠鸣音消失，该病人目前应进行的处理不包括

- A. 诊断性腹腔穿刺
- B. 密切监测基本生命征
- C. 补充血容量，抗休克治疗
- D. 给予止痛和镇静剂
- E. 抗感染治疗

正确答案：D 您选择的答案：

第78题 6个月女婴，发热3天，体温39℃。查体：一般情况良好，咽充血，耳后淋巴结肿大，心肺无异常，肝脾未触及。若患儿热退后，伴皮疹出现，可能的诊断是

- A. 风疹
- B. 麻疹
- C. 水痘
- D. 猩红热
- E. 幼儿急疹

正确答案：E 您选择的答案：

第79题 男性，16岁，发热10天伴食欲减退，软弱。体检：体温39.6℃，脉搏4次/分，肝肋下2.0cm，脾肋下1.0cm。WBC $2.6 \times 10^9/L$ ；N0.85，L0.14，嗜酸粒细胞0.01，临床上拟诊为伤寒，为确定诊断对该患者应选用下列哪一种培养

- A. 粪便培养
- B. 血培养
- C. 尿液培养
- D. 胆汁培养
- E. 玫瑰疹刮取物培养

正确答案：B 您选择的答案：

第80题 32岁，女性，妊娠31周，少量阴道流血，以往曾有3次早产史。主要处理应是

- A. 抑制宫缩，促进胎儿肺成熟
- B. 左侧卧位
- C. 注意休息，给以镇静剂
- D. 任其自然
- E. 氧气吸入，给予止血剂

正确答案：A 您选择的答案：

第81题 40岁，女性，3年来劳累后气促，曾诊为哮喘，X线片示前上纵隔类圆阴影压迫气管，最可能的诊断

- A. 淋巴瘤
- B. 神经源性肿瘤
- C. 肺癌
- D. 胸骨后甲状腺肿
- E. 心包囊肿

正确答案：D 您选择的答案：

第82题 李某女性，患慢性乙型肝炎10年，血化验：HB-sag(+)、HBeAg(+)、抗-HBcIgG(+)。其3岁女儿体检时血清抗-HBs(+)，追问病史，无任何临床症状，未注射乙肝疫苗，李某女儿属于

- A. 隐性感染
- B. 潜伏性感染
- C. 显性感染
- D. 病毒携带状态
- E. 垂直感染

正确答案：E 您选择的答案：

第83题 女性，34岁，因原发性甲亢行甲状腺双侧次全切除术。有关术中操作，正确的是

- A. 结扎切断甲状腺上动脉要远离甲状腺上极
- B. 结扎切断甲状腺下动脉要靠近甲状腺背面
- C. 切除腺体的70%~80%
- D. 止血后不必放引流
- E. 须保留腺体的背面部分

正确答案：E 您选择的答案：

第84题 患者男性，64岁，头晕、心悸4~5年，心尖搏动向左下移位，呈抬举性搏动，于胸骨左缘第3、4肋间闻及叹气样舒张期杂音，为递减型，向心尖传导，在心尖区闻及隆隆样舒张早期杂音，股动脉可闻及射枪音，首先应想到的诊断为

- A. 二尖瓣狭窄
- B. 主动脉瓣关闭不全
- C. 二尖瓣关闭不全
- D. 主动脉瓣狭窄
- E. 室间隔缺损

正确答案：B 您选择的答案：

第85题 3月小儿按公式计算其身高、头围约是

- A. 55cm，38cm
- B. 60cm，40cm
- C. 65cm，42cm
- D. 70cm，44cm
- E. 75cm，46cm

正确答案：B 您选择的答案：

第86题 14岁女性，中学生，外出旅游，夜间出室外解便时突感恐惧紧张，跑步回室途中，不慎跌倒，双手着地。站立起来时，发现双目失明。最可能的诊断是

- A. 恐怖性神经症
- B. 焦虑性神经症
- C. 疑病性神经症
- D. 癔症
- E. 双目外伤失明

正确答案：A 您选择的答案：

第87题 女性，25岁，妊娠5个月，因转移性右下腹痛2小时就诊。诊断为急性阑尾炎，不宜采用的治疗措施是

- A. 行阑尾切除术
- B. 围手术期加用黄体酮
- C. 手术切口应偏低
- D. 尽量不用腹腔引流
- E. 可应．用广谱抗生素

正确答案：C 您选择的答案：

第88题 病人男性，21岁，车祸头部外伤，昏迷30分钟后清醒，查体神志清楚，右颞头皮血肿，神经系统检查无阳性发现。入院观察，5小时后又转入昏迷，伴右侧瞳孔逐渐散大，左侧肢体瘫痪。临床诊断首先考虑是

- A. 脑挫伤
- B. 脑内血肿
- C. 脑水肿
- D. 急性硬脑膜下积液
- E. 急性硬脑膜外血肿

正确答案：E 您选择的答案：

第89题 男，18岁，因急性阑尾炎穿孔行阑尾切除术，术后3天切口红肿，有脓性分泌物，将缝线拆除后引出20ml脓液，10天后再次缝合而愈合，该病人切口愈合类型应记为

- A. /乙
- B. /丙
- C. /甲
- D. /乙
- E. /丙

正确答案：C 您选择的答案：

第90题 女性，45岁，胆囊结石5年，曾胆绞痛发作3次，B超示胆囊结石5枚，直径1~2cm，首选的治疗方法是

- A. 胆囊切除
- B. 溶石治疗
- C. 体外震波碎石治疗
- D. 抗感染治疗
- E. 排石治疗

正确答案：A 您选择的答案：

第91题 F药厂销售代表和某医院多名医师约定，医师在开处方时使用F药厂生产的药品，并按使用量的多少给予提成。事情曝光以后，按《药品管理法》的规定，对F药厂可以作出行政处罚的部门是

- A. 药品监督管理部门
- B. 工商行政管理部门
- C. 税务管理部门
- D. 医疗保险部门
- E. 卫生行政部门

正确答案：A 您选择的答案：

第92题 男，60岁，食管癌术后行放射治疗，血小板 $90 \times 10^9/L$ ，此时决定治疗是否停止的指标是白细胞计数低于

- A. $1 \times 10^9/L$
- B. $2 \times 10^9/L$
- C. $3 \times 10^9/L$
- D. $4 \times 10^9/L$
- E. $5 \times 10^9/L$

正确答案：C 您选择的答案：

第93题 女性，38岁，左乳房无痛性肿物2月余。查体：左乳外上象限有一1.5cm×1.0cm×1.0cm肿块，表面不光滑，界限不清，活动度尚可。明确性质最确切的检查是

- A. CT
- B. 乳腺B超
- C. 钼靶X线检查
- D. 红外线扫描
- E. 肿物完整切除病理检查

正确答案：E 您选择的答案：

第94题 急性心梗第3周出现发热和心包摩擦音，血沉30mm/小时，血白细胞 $6.1 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞55%，可能是

- A. 急性心梗的反应性心包炎
- B. 心脏破裂
- C. 急性心梗后综合征
- D. 伴发病毒性心包炎
- E. 室壁瘤

正确答案：C 您选择的答案：

第95题 一小儿体重9kg，身高75cm，头围46cm，此小儿的年龄是

- A. 9个月
- B. 1岁
- C. 2岁
- D. 2岁半
- E. 3岁

正确答案：B 您选择的答案：

第96题 45岁，女性，反复腹痛、发热、黄疸1年，近3天上述症状加重，高热黄疸不退。入院体温40℃，脉搏120次/分，血压70/50mmHg，该病人首选的治疗为

- A. 大剂量抗生素治疗感染后择期手术
- B. 全胃肠外营养后手术
- C. 立即手术
- D. 积极抗休克同时及早手术
- E. 应用血管收缩剂，血压升至正常后及早手术

正确答案：D 您选择的答案：

第97题 10岁男孩，1年来时有尿频、尿急、尿痛和排尿困难、尿流中断，改变体位后又能继续排尿，首先应考虑

- A. 急性膀胱炎
- B. 前列腺炎
- C. 尿道狭窄
- D. 膀胱结石
- E. 输尿管结石

正确答案：D 您选择的答案：

第98题 男，18岁，右足和右小腿被开水烫伤，有水疱伴剧痛。创面基底部肿胀发红，该病人烧伤面积和深度的诊断为

- A. 5%浅二度
- B. 5%深二度
- C. 10%浅二度
- D. 10%深二度
- E. 15%浅二度

正确答案：C 您选择的答案：

第99题 对10名25岁以上的山区健康男子测量脉搏次数(次/分)，用t检验与全国正常男子资料进行比较，按 $\alpha=0.05$

05的检验水准，自由度为

- A. $V=9$
- B. $V=19$
- C. $V=8$
- D. $V=20$
- E. $v=18$

正确答案：B 您选择的答案：

第100题 10岁男孩，因发热，关节肿痛，皮肤出现环形红斑，心率增快出现奔马律，血沉增快，经治疗上述症状、体征消失后，需继发性预防的方法是

- A. 避免关节损伤
- B. 忌海鲜
- C. 减少体育运动
- D. 长效青霉素肌注
- E. 激素吸入维持

正确答案：D 您选择的答案：

第101题 女性，30岁。月经量多已2年，近3个月来感乏力、头晕、心悸，查血红蛋白 65g/L ，白细胞 $6.0 \times 10^9/\text{L}$ ，血小板 $140 \times 10^9/\text{L}$ ，骨髓象：粒比红为1:1，红细胞增生活跃，中晚幼红细胞45%，体积小，胞浆偏蓝，治疗首选

- A. 肌注维生素B₁₂
- B. 口服铁剂
- C. 输血
- D. 脾切除
- E. 口服叶酸

正确答案：B 您选择的答案：

第102题 36周产女婴，出生后反应好，体检其指甲外观特点是

- A. 指甲硬
- B. 反甲
- C. 甲面多白纹
- D. 指甲未达指尖
- E. 指甲超过指尖

正确答案：D 您选择的答案：

第103题 黄某2001年10月因医疗事故受到吊销医师执业证书的行政处罚，2002年9月向当地卫生行政部门申请重新注册。卫生行政部门经过审查决定对黄某不予注册，理由是黄某的行政处罚自处罚决定之日起至申请注册之日止不满

- A. 1年
- B. 2年
- C. 3年
- D. 4年
- E. 5年

正确答案：B 您选择的答案：

第104题 38岁女性，活动后心悸、气喘1年余，查体轻度贫血，心率快，律整，胸骨右缘第2肋间闻及响亮而粗糙的收缩期杂音(3/6级)，首先应想到的疾病为

- A. 动脉导管未闭
- B. 主动脉瓣关闭不全
- C. 二尖瓣关闭不全
- D. 室间隔缺损
- E. 主动脉瓣狭窄

正确答案：E 您选择的答案：

第105题 4岁男孩，右侧阴囊包块，质软，透光试验阳性，平卧后可消失，应考虑的疾病是

- A. 右侧睾丸鞘膜积液
- B. 右侧交通性鞘膜积液
- C. 右侧斜疝
- D. 右侧睾丸肿瘤
- E. 右侧附睾结核

正确答案：B 您选择的答案：

第106题 男性，31岁，有胃溃疡穿孔手术史，3天前出现腹胀、腹痛伴呕吐、肛门停止排便排气，经检查诊断为肠梗阻，目前最为重要的是了解梗阻的

- A. 原因
- B. 部位
- C. 程度
- D. 发生速度
- E. 是否绞窄

正确答案：E 您选择的答案：

第107题 男性，60岁。心前区阵发性疼痛1个月，多在夜间发作，与活动无关。每次发作15分钟，发作时心电图、aVF导联ST段抬高。首选治疗的药物是

- A. 硝酸酯类
- B. β 受体阻滞剂
- C. 钙离子拮抗剂
- D. 洋地黄类
- E. 乙胺碘呋酮

正确答案：C 您选择的答案：

第108题 某建筑工人，从高处坠落，腰背挫伤，双下肢弛缓瘫痪，来院急诊。检查见腰椎不能活动，双侧腹股沟以下感觉、运动及反射消失。X线显示胸12椎体压缩性骨折。入院后2小时其双下肢功能逐渐恢复。该患者的脊髓伤可能是

- A．脊髓震荡
- B．脊髓出血
- C．脊髓水肿
- D．脊髓受压
- E．马尾损伤

正确答案：A

您选择的答案：