

历年试题1(2000~2003年) 历年试题 A3型题

一、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1-3题

成年男性，3个月来双下肢无力，双下肢麻木逐渐发展到腰部，背后疼痛且咳嗽时加剧。查体左半侧T<sub>12</sub>。下痛温觉消失；右下肢肌力4度，腱反射亢进，Babinski征阳性，右下肢足趾振动觉、位置觉消失。

1. 可能的诊断为

- A. T<sub>8</sub>附近脊髓髓内病变
- B. 左T<sub>8</sub>附近脊髓髓外病变
- C. 右T<sub>8</sub>附近脊髓髓外病变
- D. T<sub>8</sub>附近脊髓髓内病变
- E. 右T<sub>8</sub>附近脊髓髓内病变

2. 病变脊髓处，MRI表现为

- A. 脊髓呈梭形膨大，广泛低信号
- B. 正常脊髓
- C. 脊髓不膨大，髓内广泛点状高信号
- D. 脊髓外高信号肿块
- E. 中央管扩大呈空腔

3. 该脊髓损害为

- A. 脊髓半切综合征
- B. 脊髓横贯性损害
- C. 脊髓后角损害
- D. 脊神经根损害
- E. 脊髓后索和侧索联合损害

正确答案：ECA 您选择的答案：

第4-5题

22岁女性，停经49天，诊断为早期妊娠。在行人工流产负压吸宫术时，突然出现面色苍白、出汗、头晕、胸闷，体检发现：T<sub>36</sub> 36.6℃，血压80/50mmHg，心率56次/分。

1. 最可能的诊断是

- A. 漏吸
- B. 人工流产综合反应
- C. 子宫穿孔
- D. 羊水栓塞
- E. 仰卧位低血压综合征

2. 最合适的处理是

- A. 超声监护下继续人工流产
- B. 改行钳刮术
- C. 静脉注射阿托品0.5mg
- D. 肌内注射催产素(缩宫素)20U
- E. 立刻行剖腹探查术

正确答案：BC 您选择的答案：

第6-8题

患儿3岁，近1年多，哭甚时出现青紫，查体：心前区隆起，胸骨左缘第3~4肋间可闻及IV级收缩期杂音，可触及震颤，X线检查示：左右心室及左房增大，肺血管影增多，肺动脉段凸出。

1. 此患儿最可能的诊断是

- A. 房间隔缺损
- B. 室间隔缺损
- C. 肺动脉狭窄
- D. 动脉导管未闭
- E. 法洛四联症

2. 此患儿如决定手术必须做的检查是

- A. 心电图
- B. 磁共振成像
- C. 心功能检查
- D. 心导管检查
- E. 超声心动图

3. 此患儿如出现了永久性青紫，说明

- A. 动脉系统淤血
- B. 形成艾森曼格综合征
- C. 合并了肺水肿
- D. 静脉系统淤血
- E. 合并了心力衰竭

正确答案：BEB 您选择的答案：

第9-11题

男性，58岁，进行性贫血，消瘦、乏力半年，有时右腹隐痛，无腹泻。查体：右中腹部扪及肿块，肠鸣音活跃。

1. 下列各项检查可明确诊断的是

- A. 纤维结肠镜
- B. CEA
- C. CT
- D. B超因私护照
- E. X线钡餐检查

2. 如果需要手术治疗，术前准备最重要的是

- A. 纠正营养
- B. 肠道准备

- C. 心肺功能检查
- D. 肝肾功能检查
- E. 心理准备
- 3. 行标准根治术后病理结果为DukesB期, 其5年生存率为
- A. 25%
- B. 35%
- C. 45%
- D. 55%
- E. 65%

正确答案: ABE 您选择的答案:

#### 第12-14题

男性, 60岁, 因胃溃疡合并多次大出血, 行胃大部切除术。

- 1. 该病人术后5天出现黑便, 最可能的原因是
- A. 术中止血不确切
- B. 吻合口缝线感染
- C. 吻合口部分粘膜坏死脱落
- D. 应激性溃疡
- E. 术后胃内残余血
- 2. 术后10天, 已进流质饮食, 突然出现呕吐, 禁食后症状好转, 钡餐检查见吻合口延及输出段有较长狭窄, 形似漏斗和一细线形的漏斗尾, 该病人可选择的治疗措施不包括
- A. 胃肠减压
- B. 输血
- C. 应用皮质激素
- D. 胃肠外营养
- E. 立即手术
- 3. 该病人术后可能出现的营养性并发症不包括
- A. 体重减轻
- B. 低血糖综合征
- C. 缺铁性贫血
- D. 骨质疏松
- E. 隐性骨质软化

正确答案: CBB 您选择的答案:

#### 第15-17题

男性, 20岁, 发热2周, 体温38~39℃, 检查皮肤散在紫癜, 颈部及腋下可触及0.5cm×1.5cm大小淋巴结5~6个, 脾肋下3cm, 血红蛋白85g/L, 白细胞 $10 \times 10^9/L$ , 血小板 $25 \times 10^9/L$ 。

- 1. 对诊断帮助最大的检查
- A. 血细菌培养
- B. 白细胞分类
- C. 胸部X线片
- D. 骨髓像检查
- E. 血小板抗体测定
- 2. 此患者在治疗3周后, 出现高热, 头痛、呕吐、Kernig征(+), 应采取治疗方案
- A. 应用广谱抗生素
- B. 链霉素、雷米封、利福平联合治疗
- C. 化疗+鞘内注射MTX
- D. 肾上腺糖皮质激素+先锋霉素
- E. 输血小板
- 3. 此病人在发热、头痛、呕吐第2日做脑脊液检查, 最可能的发现为
- A. 脑脊液中性粒细胞增高
- B. 细菌培养阳性
- C. 脑脊液发现结核杆菌
- D. 脑脊液蛋白量显著增高、糖定量减低
- E. 脑脊液白血细胞增多

正确答案: DCE 您选择的答案:

#### 第18-20题

45岁男性, 经理, 送来急诊, 自述半小时前突然感到气紧、胸闷、心悸、头晕、出汗, 认为生命垂危, 要求紧急处理。近1个月来, 这种情况发生过3次, 每次持续约0.5~1小时, 发病间隙期一切正常, 发病与饮食无明显关系。

- 1. 最大可能的诊断是
- A. 癔症发作
- B. 低血钾症
- C. 惊恐发作
- D. 心肌梗死
- E. 内脏性癫痫
- 2. 最有助于鉴别诊断的项目是
- A. 追问起病诱因
- B. 心电图
- C. 脑电图
- D. 血钾测定
- E. 脑CT
- 3. 最适宜的急诊处理是
- A. 输入葡萄糖
- B. 输入氧气
- C. 暗示治疗
- D. 抗癫痫药
- E. 安定注射

正确答案: CAE 您选择的答案:

第21-22题

男，30岁。黏液脓血便伴里急后重2年。近1周腹痛加重，高热。体检：体温39.2℃，心率110次/分，贫血貌，腹部膨隆，全腹有压痛，肠鸣音消失。

1. 该病人最可能的诊断是

- A. 肠结核并发肠穿孔
- B. 溃疡性结肠炎并发中毒性巨结肠
- C. 结肠癌并发肠梗阻
- D. 肠易激综合征
- E. 克罗恩病

2. 该患者不宜选做的检查是

- A. 血常规
- B. 血沉
- C. 免疫指标测定
- D. 钡剂灌肠
- E. 腹部B超

正确答案：BD 您选择的答案：

第23-24题

23岁男性农民，11月份因发热、头痛、呕吐3天为主诉入院。体检：面颈部潮红，双腋下少许出血点，化验：尿常规蛋白(++)，红细胞3~10个/HP，末梢血象：WBC23.0×10<sup>9</sup>/L，异型淋巴10%，PLT48×10<sup>9</sup>/L。

1. 该患者的诊断可能为

- A. 流行性脑脊髓膜炎
- B. 斑疹伤寒
- C. 流行性出血热
- D. 钩端螺旋体病
- E. 败血症

2. 住院2天后，热退但症状加重，出血点增加，四肢厥冷，脉搏细弱，血压：80/60mmHg，此时对该患者的治疗原则是

- A. 以扩容为主
- B. 以应用血管活性药物为主
- C. 以应用激素为主
- D. 以纠正酸中毒为主
- E. 以输入胶体液为主

正确答案：AC 您选择的答案：

第25-26题

女性，30岁，持续发热10天，体温呈稽留热。体检：精神萎靡，反应淡漠，体温39.5℃，心率76次/分，肝肋下1.5cm，脾肋下2cm。WBC1.4×10<sup>9</sup>/L，N0.40，L0.60，肥达反应O 1:80(+)，H1:160(+)，AL-T180U/L，总胆红素22.2μmol/L，HBsAg阴性。

1. 该病例最可能的诊断是

- A. 急性黄疸性肝炎
- B. 钩端螺旋体病
- C. 伤寒合并中毒性肝炎
- D. 急性血吸虫病
- E. 病毒性肝炎合并胆道感染

2. 为确定诊断应进行检查的项目是

- A. 血培养
- B. 甲肝病毒抗体
- C. 戊肝病毒抗体
- D. 丙肝病毒抗体
- E. 粪便培养

正确答案：CA 您选择的答案：

第27-28题

女性，19岁。近2周来发热38℃左右，伴恶心、呕吐、腹泻。遂出现心悸、胸痛、呼吸困难，晕厥发作。体检发现：面色苍白，精神萎靡。心率40次/分，律齐，心尖部第一心音低钝，且可闻及大炮音。临床诊断病毒性心肌炎。

1. 心电图表现最可能是

- A. 窦性心动过缓
- B. 第一度房室传导阻滞
- C. 第二度房室传导阻滞
- D. 第三度房室传导阻滞
- E. 室内传导阻滞

2. 最适宜的治疗措施为

- A. 静脉注射阿托品
- B. 静脉滴注硝酸甘油
- C. 皮下注射肾上腺素
- D. 临时植入心脏起搏器
- E. 心脏复律

正确答案：DD 您选择的答案：

第29-31题

男孩，3岁，出生时正常，母乳喂养，5个月后智能渐落后，头发变黄，肤色变白，有时发生抽搐，肌张力较高。

1. 临床上应首先考虑的诊断是

- A. 21-三体综合征
- B. 维生素D缺乏性手足抽搐症
- C. 苯丙酮尿症
- D. 先天性甲状腺功能减低症
- E. 癫痫

2. 为协助诊断应选择的检查是

- A. 血钙、磷测定
  - B. 染色体核型分析
  - C. 血T3、T4、TSH测定
  - D. 脑电图检查
  - E. 尿三氯化铁试验
3. 假如该患儿刚出生不久，为早期诊断，应选择的检查项目是
- A. 尿2, 4-二硝基苯胍试验
  - B. 尿三氯化铁试验
  - C. Guthrie二细菌生长抑制试验
  - D. 血T3、T4、TSH测定
  - E. 染色体核型分析

正确答案：CEC 您选择的答案：

#### 第32-35题

40岁男性，腰痛伴右下肢放射痛2个月，反复发作，与劳累有关，咳嗽、用力排便时可加重疼痛。查体右直腿抬高试验40°阳性，加强试验阳性，X线片示：L4~5椎间隙变窄。

1. 其最可能的诊断为

  - A. 急性腰扭伤
  - B. 腰3横突综合征
  - C. 腰椎管狭窄症
  - D. 腰椎间盘突出症
  - E. 梨状肌综合征

2. 可完全排除的诊断是

  - A. 腰椎结核
  - B. 腰肌劳损
  - C. 腰椎肿瘤
  - D. 脊椎滑脱症
  - E. 腰椎管狭窄症

3. 其右下肢麻木的区域可能为

  - A. 小腿外侧或足背
  - B. 大腿前侧
  - C. 小腿前内侧
  - D. 小腿后侧及足底
  - E. 臀部及大腿后侧

4. 对诊断有定位定性意义的检查方法是

  - A. X线片
  - B. CT
  - C. ECT
  - D. 肌电图
  - E. 化验检查

正确答案：DBAB 您选择的答案：

#### 第36-37题

女，20岁，反复高热伴游走性关节炎，口腔干燥、溃疡，脱发月余，化验尿蛋白++，颗粒管型5个/HP，间断有血尿，类风湿因子1:20(+)，抗SSA抗体阳性，抗双链DNA抗体阳性。

1. 诊断首先考虑

  - A. 风湿性关节炎
  - B. 类风湿关节炎
  - C. 系统性红斑狼疮
  - D. 慢性肾小球肾炎急性发作
  - E. 干燥综合征

2. 首选治疗药物的最佳组合为

  - A. 抗疟药+双氯芬酸
  - B. 非甾体抗炎药+小剂量糖皮质激素
  - C. 糖皮质激素+甲氨蝶呤
  - D. 雷公藤+柳氮磺胺吡啶
  - E. 糖皮质激素+环磷酰胺

正确答案：EE 您选择的答案：

#### 第38-39题

18岁女孩，2小时前左下腹部剧烈疼痛，恶心呕吐2次，体温37.5。肛查子宫右侧触及活动良好、触痛明显、手拳大肿物。

1. 本例最可能的诊断是

  - A. 盆腔炎性包块
  - B. 输卵管结核
  - C. 卵巢子宫内异位囊肿破裂
  - D. 子宫浆膜下肌瘤扭转
  - E. 卵巢肿瘤蒂扭转

2. 本例应采取的处理措施是

  - A. 给予抗生素、止痛药，观察病情进展
  - B. 抗结核药物治疗
  - C. 进行腹部穿刺明确诊断
  - D. 进行腹腔镜检查明确诊断
  - E. 行剖腹探查

正确答案：EE 您选择的答案：

#### 第40-41题

男，40岁。饮酒后持续性上腹疼痛10小时，向腰背部放射，伴恶心，呕吐，发热，无血尿。

1. 最可能的诊断为

  - A. 急性胰腺炎

- B. 胆囊炎
  - C. 消化性溃疡
  - D. 肠梗阻
  - E. 肾结石
2. 对明确诊断最有意义的检查是
- A. 血淀粉酶
  - B. 血常规
  - C. 血清脂肪酶
  - D. 尿淀粉酶
  - E. 腹部X线平片
- 正确答案：AA 您选择的答案：

#### 第42-44题

28岁初产妇，妊娠39周，规律宫缩2小时，枕右前位，胎心良好。骨盆外测量正常，B超测胎头双顶径9.3cm，羊水平段3.8cm。

1. 此时最恰当的处理应是
- A. 行剖宫产术
  - B. 静脉滴注缩宫素
  - C. 缓慢静注能量合剂
  - D. 肌内注射维生素K
  - E. 严密观察产程进展
2. 若产妇宫缩正常，胎头降至+3，宫口开大4cm，此时最恰当的处理应是
- A. 人工破膜
  - B. 静脉滴注缩宫素
  - C. 让产妇于宫缩时加腹压
  - D. 行温肥皂水灌肠
  - E. 行剖宫产术
3. 若宫口开全，宫缩减弱，肛查发现盆腔后部空虚，S = +4，阴道检查胎头前凶在骨盆左前方，此时的处理方法应是
- A. 行剖宫产术
  - B. 会阴侧切，转正胎头，产钳助娩
  - C. 静脉滴注缩宫素加速产程进展，经阴道自娩
  - D. 吸氧同时，静注地西泮(安定)
  - E. 静注葡萄糖液内加维生素C，同时肌注哌替啶(杜冷丁)
- 正确答案：EAB 您选择的答案：

#### 第45-47题

女婴，5天，出生时正常，不吃，不哭及体温不升1天，查体：反应差，皮肤轻度黄染并有花纹，呼吸急促。

1. 该婴的可能诊断是
- A. 新生儿寒冷损伤综合征
  - B. 新生儿溶血病
  - C. 新生儿败血症
  - D. 新生儿窒息
  - E. 新生儿缺氧缺血性脑病
2. 该患婴需作的重要检查是
- A. 血常规
  - B. 血培养
  - C. 免疫球蛋白测定
  - D. 血胆红素测定
  - E. 脑CT
3. 患婴非特异性免疫功能低下的可能原因是
- A. 皮肤表面脂肪少
  - B. 黏膜较干燥
  - C. 单核细胞杀菌功能低于成人
  - D. 白介素2低下
  - E.  $\gamma$ -干扰素低下
- 正确答案：CBC 您选择的答案：

#### 第48-51题

男性，37岁，急刹车致使方向盘挤压上腹部16小时，上腹部、腰部及右肩疼痛，持续性，伴恶心、呕吐。查体：体温38.4℃，上腹部肌紧张明显，有压痛，反跳痛不明显，无移动性浊音，肠鸣音存在，怀疑胰腺损伤。

1. 对明确诊断帮助不大的是
- A. B超
  - B. CT
  - C. 红细胞压积
  - D. 尿淀粉酶
  - E. 血淀粉酶
2. 如果行剖腹探查术，术中最有可能发现合并损伤的脏器是
- A. 十二指肠
  - B. 胆总管
  - C. 横结肠
  - D. 右肾
  - E. 脾
3. 胰腺损伤在各种腹部损伤中所占比例为
- A. 1% ~ 2%
  - B. 5% ~ 10%
  - C. 16% ~ 20%
  - D. 25% ~ 35%
  - E. 40% ~ 50%

4. 如果处理不当, 最可能的远期并发症是

- A. 胆总管狭窄
- B. 胰腺真性囊肿
- C. 脂肪泻
- D. 胰腺假性囊肿
- E. 横结肠梗阻

正确答案: CBAD 您选择的答案:

#### 第52-54题

女, 48岁。近1个月感口渴, 饮水量增至每天2000ml。身高156cm, 体重71kg。空腹血糖180mg/dl (10.0mmol/L), 餐后血糖252mg/dl (14.0mmol/L)。系初次发现血糖高, 过去无糖尿病史。

1. 给患者的治疗建议是

- A. 饮食及运动治疗
- B. 双胍类降血糖药
- C. 磺脲类降血糖药
- D.  $\alpha$ -葡萄糖苷酶抑制剂
- E. 胰岛素

2. 按以上建议治疗3个月后空腹血糖153mg/dl (8.5mmol/L), 餐后血糖225mg/dl (12.5mmol/L), 进一步治疗建议

- A. 氯磺丙脲
- B. 格列齐特
- C. 二甲双胍
- D. 阿卡波糖
- E. 正规胰岛素

3. 4年后该患者被发现有浸润型肺结核, 降血糖治疗宜

- A. 原降血糖药增加剂量
- B. 改用降血糖作用更强的口服降血糖药
- C. 增加一种口服降血糖药
- D. 双胍类、磺脲类、 $\alpha$ -葡萄糖苷酶抑制剂联合使用
- E. 胰岛素治疗

正确答案: ACE 您选择的答案:

#### 第55-57题

男, 38岁, 间歇性浮肿10余年, 伴恶心、呕吐1周。查血红蛋白80g/L, 血压20.7/14.7kPa (155/110mmHg), 尿蛋白++, 颗粒管型2~3个/HP, 尿比重1.010~1.012。

1. 可能的诊断是

- A. 肝炎后肝硬化
- B. 原发性高血压
- C. 慢性肾盂肾炎
- D. 慢性肾小球肾炎
- E. 肾病综合征

2. 上例病人还应立即作的检查项目是

- A. 24小时尿蛋白定量
- B. 乙肝病毒全套
- C. 肝功能全套
- D. 血肌酐、尿素氮
- E. 血胆固醇

3. 为了解该患者双侧肾脏是否已缩小, 应首选的检查是

- A. 静脉肾盂造影
- B. ECT
- C. CT
- D. 同位素肾图
- E. B超

正确答案: EDE 您选择的答案:

#### 第58-59题

男, 6岁, 身高80cm, 智能落后, 仅能数1~20个数。体检: 皮肤粗糙, 眼距宽, 鼻梁宽平, 舌宽厚, 常伸于口外, 毛发枯干, 发际低, 骨龄摄片仅有4枚骨化核。

1. 为确诊应作的检查是

- A. 智能测定
- B. 尿三氯化铁实验
- C. 尿粘多糖分析
- D. 血清T3、T4、TSH测定
- E. 生长激素测定

2. 患儿确诊后治疗应选用

- A. 低苯丙氨酸饮食
- B. 甲状腺素
- C. 生长激素
- D. 低铜饮食
- E. 脑活素、脑复康

正确答案: DB 您选择的答案:

#### 第60-61题

男, 40岁, 因呼吸困难和水肿入院。查体发现颈静脉怒张, 肝在右肋缘下4cm, 表面光滑, 轻度压痛, 双下肢压陷性水肿。

1. 检查心脏时可能发现

- A. 心尖搏动向左下移位
- B. 心脏形态呈靴形
- C. 心尖部可听到舒张期杂音
- D. 主动脉瓣区可听到粗糙的收缩期杂音

- E. 主动脉瓣第二听诊区可听到叹气样舒张期杂音  
 2. 该患者心音可有以下变化,除了  
 A. 心尖部第二心音增强  
 B. 心尖部第一心音增强  
 C. 肺动脉瓣区第二心音增强  
 D. 肺动脉瓣区第二心音分裂  
 E. 心尖部第一心音可呈拍击性  
 正确答案: CA 您选择的答案:

第62-64题

1. 统计学检验的无效假设应是  
 A.  $H_0: P_1 = P_2 = P_3 = P_4 = P_5$   
 B.  $H_0: P_1 = P_2 = P_3 = P_4 > P_5$   
 C.  $H_0: n_1 = n_2 = n_3 = n_4 = n_5$   
 D.  $H_0: n_1 \quad n_2 \quad n_3 \quad n_4 \quad n_5$   
 E.  $H_0: n_1 = n_2 \quad n_3 = n_4 = n_5$   
 2. 图示对比不同职业人群的冠心病患病率的高低,应绘制  
 A. 普通线图  
 B. 直条图  
 C. 直方图  
 D. 圆图  
 E. 散点图  
 3. 比较不同职业人群的冠心病患病率的假设检验,应计算的统计量为  
 A.  $t$   
 B.  $X^2$   
 C.  $F$   
 D.  $x$   
 E.  $P$

正确答案: CBB 您选择的答案:

第65-67题

64岁男性患者,反复咳嗽、咯痰,痰中带血2周。体温 $38.3^{\circ}\text{C}$ , WBC $12 \times 10^9/\text{L}$ ,胸片右肺门肿块影,伴远端大片状阴影,抗炎治疗阴影不吸收。

1. 有助于尽快明确诊断的检查首选  
 A. CT  
 B. 磁共振  
 C. 胸腔镜  
 D. 纤支镜  
 E. 核素扫描  
 2. 最有可能的诊断是  
 A. 肺炎  
 B. 肺化脓症  
 C. 肺癌  
 D. 肺结核  
 E. 支气管扩张  
 3. 首先考虑的治疗方案是  
 A. 抗炎治疗  
 B. 抗炎止血治疗  
 C. 手术治疗  
 D. 抗结核治疗  
 E. 门诊随访

正确答案: DCC 您选择的答案:

第68-70题

病人男性,58岁,突然头疼呕吐,伴意识丧失30分钟。查体神志清楚,颈部抵抗,克氏征阳性。右侧眼睑下垂,右侧瞳孔4mm,光反应消失。

1. 最可能的诊断是  
 A. 脑梗死  
 B. 蛛网膜下腔出血  
 C. 高血压脑出血  
 D. 脑动静脉畸形出血  
 E. 颅脑肿瘤  
 2. 最好的诊断措施是  
 A. 腰椎穿刺  
 B. 脑电图  
 C. 视力检查  
 D. 头颅CT  
 E. 视神经孔像  
 3. 引起病人右侧眼睑下垂,右侧瞳孔散大的最可能原因是  
 A. 面神经麻痹  
 B. 动眼神经麻痹  
 C. 小脑幕切迹疝  
 D. 糖尿病眼底病  
 E. 右侧视神经损害

正确答案: BDB 您选择的答案:

第71-73题

男性,24岁。反复发作性咳嗽、喘息10年余,再发加重3小时。查体见意识模糊,口唇发绀,双肺呼吸音明显减低,未闻及干湿啰音,心率128次/分,可触及奇脉。

1. 最可能的诊断是
    - A. 支原体肺炎
    - B. 支气管哮喘
    - C. 支气管内膜结核
    - D. 原发性支气管肺癌
    - E. 喘息型慢性支气管炎
  2. 为进一步明确诊断及判断病情程度最有意义的检查是
    - A. 痰细胞学
    - B. 胸部CT
    - C. 动脉血气分析
    - D. PEF占预计值%
    - E. 皮肤过敏源试验
  3. 诊断及病情程度确定后应采取的最有效措施是
    - A. 甲基强的松龙静滴+氨茶碱静滴+氧疗
    - B. 特布他林口服+氨茶碱口服+氧疗
    - C. 亚胺培南静滴+氨茶碱静滴+氧疗
    - D. 沙丁胺醇吸入+氨茶碱口服+氧疗
    - E. 倍氯米松吸入+氨茶碱静滴+氧疗
- 正确答案：BCA 您选择的答案：

#### 第74-76题

男性，21岁。近半年来反复心悸、胸痛、劳力性呼吸困难。时有头晕或短暂神志丧失。体检发现：心脏轻度增大，心尖部有2级收缩期杂音和第4心音，胸骨左缘第3～4肋间闻及较粗糙的喷射性收缩期杂音。

1. 最可能的诊断是
    - A. 冠心病心绞痛
    - B. 二尖瓣关闭不全
    - C. 主动脉瓣狭窄
    - D. 肥厚型梗阻性心肌病
    - E. 病毒性心肌炎
  2. 最有价值的诊断方法是
    - A. 胸部X线摄片
    - B. 心电图
    - C. 超声心动图
    - D. 心脏核素检查
    - E. 冠状动脉造影
  3. 应选用的药物是
    - A. 地高辛
    - B. 硝酸甘油
    - C. 心得安(普萘洛尔)
    - D. 卡托普利
    - E. 双氢克尿噻
- 正确答案：DCC 您选择的答案：

#### 第77-79题

27岁初产妇，妊娠40周，阵发性腹痛10小时，宫缩10～15分钟一次，持续30秒，宫口开大2cm。

1. 出现上述临床表现的原因是
    - A. 子宫收缩节律性异常
    - B. 子宫收缩对称性异常
    - C. 子宫收缩极性异常
    - D. 子宫收缩缩复作用异常
    - E. 腹肌和膈肌收缩力异常
  2. 此时的处理原则应是
    - A. 静脉滴注缩宫素
    - B. 静脉滴注麦角新碱
    - C. 肌肉注射哌替啶(杜冷丁)
    - D. 人工破膜
    - E. 立即行剖宫产术
  3. 若已进入第二产程，胎头+4，胎心102次/分，此时的处理应是
    - A. 立即行剖宫产术
    - B. 等待自然分娩
    - C. 行产钳术助娩
    - D. 静脉滴注缩宫素加强宫缩
    - E. 静注地西洋(安定)加速产程进展
- 正确答案：ACA 您选择的答案：

#### 第80-82题

男性，50岁。近几年来逐渐出现心悸、乏力、活动后气急。体检发现心脏向左下扩大，心尖部有舒张期滚筒样杂音，主动脉听诊区闻及舒张期泼水样杂音。

1. 可能的诊断是
  - A. 二尖瓣关闭不全
  - B. 二尖瓣狭窄
  - C. 主动脉瓣狭窄
  - D. 肥厚型梗阻性心肌病
  - E. 主动脉瓣关闭不全
2. 最有价值的诊断方法是
  - A. 胸部X线摄片
  - B. 心电图
  - C. 超声心动图
  - D. 心脏核素检查
  - E. 冠状动脉造影



3. 应选用的药物是  
A. 地高辛  
B. 硝酸甘油  
C. 心得安(普萘洛尔)  
D. 卡托普利  
E. 双氢克尿噻

正确答案：ECB 您选择的答案：

第83-84题

女性，55岁，为慢性阻塞性肺疾病(COPD)气肿型患者。近年来轻微活动即感气急，咳嗽轻，咳痰少。血气分析：PaO<sub>2</sub> 9.3kPa(70mmHg)，PaCO<sub>2</sub> 4.8kPa(36mmHg)。

1. 该COPD患者病情发展已出现  
A. I型呼吸衰竭  
B. II型呼吸衰竭  
C. 低氧血症  
D. 高碳酸血症  
E. 以上都不是
2. 根据血气分析结果，该患者的呼吸功能障碍为  
A. 通气功能障碍  
B. 换气功能障碍  
C. 通气和换气功能障碍并存  
D. 肺泡膜增厚所致弥散功能降低  
E. 通气/血流比例降低

正确答案：EB 您选择的答案：

第85-86题

30岁，男性，因发热、右侧胸痛、咳嗽3天入院。3天来每日体温最低为39.2，最高39.8。入院后查体：T39.5，右锁骨下可闻及支气管呼吸音。

1. 最可能的诊断是  
A. 肺结核  
B. 肺癌  
C. 胸膜炎  
D. 大叶性肺炎  
E. 自发性气胸合并感染
2. 该患者右上肺叩诊音可能出现  
A. 清音  
B. 浊音  
C. 实音  
D. 鼓音  
E. 过清音

正确答案：DC 您选择的答案：

第87-89题

男性，30岁，从三楼跌下左腹部跌伤，左6、7、8肋骨骨折，脾破裂、肠破裂。入院时精神紧张，T38.5，面色苍白，肢端冰冷，脉搏细速，110次/分，血压130/100mmHg，尿量减少。

1. 该病人的休克状态应属于  
A. 休克前期  
B. 中度休克  
C. 重度休克  
D. 暖休克  
E. 冷休克
2. 目前不宜马上进行的检查是  
A. 血常规  
B. 腹腔穿刺  
C. 静脉肾盂造影  
D. 中心静脉压测定  
E. 测定二氧化碳结合力
3. 首先考虑的治疗措施为  
A. 静脉输注血管收缩药物  
B. 立即剖腹探查  
C. 迅速补充血容量  
D. 大剂量应用抗生素  
E. 滴注利尿剂改善肾功能

正确答案：ACC 您选择的答案：

第90-91题

女孩，2岁，母有哮喘史，患儿幼时对花粉过敏，反复发作喘息4次以上，昨又突然发作喘息，查两肺满布哮鸣音，皮下注射肾上腺素后，哮鸣音明显减少。

1. 患儿哮喘诊断的评分是  
A. 12分  
B. 10分  
C. 8分  
D. 6分  
E. 4分
2. 患儿如呈哮喘持续状态，有效的紧急处理是  
A. 气管切开  
B. 平卧位  
C. 西地兰注射  
D. 甘露醇注射  
E. 氢化可的松注射

正确答案：BC 您选择的答案：

第92-93题

小儿身高80cm，前囟门已闭，头围48cm，乳牙20枚，会跳并能用简单的语言表达自己的需要，对人、事有喜乐之分。

1. 此小儿的年龄是

- A. 10个月
- B. 1岁
- C. 2岁
- D. 3岁
- E. 4岁

2. 按公式计算此小儿的体重约是

- A. 8kg
- B. 9kg
- C. 10kg
- D. 12kg
- E. 14kg

正确答案：CD 您选择的答案：

第94-96题

男性，10岁，右足底被铁锈钉刺伤10天，突然出现张口困难，继之出现苦笑面容，角弓反张，声响及触碰病人可诱发上述症状，病人神志清楚，不发热。

1. 该病致病菌属于

- A. 革兰染色阴性大肠杆菌
- B. 革兰染色阴性厌氧拟杆菌
- C. 革兰染色阴性变形杆菌
- D. 革兰染色阳性梭形芽孢杆菌
- E. 革兰染色阳性厌氧芽孢杆菌

2. 该病属于

- A. 毒血症
- B. 菌血症
- C. 败血症
- D. 脓血症
- E. 脓毒血症

3. 对机体威胁最大的是

- A. 肌肉断裂
- B. 骨折
- C. 尿潴留
- D. 持续的呼吸肌痉挛
- E. 营养障碍

正确答案：EAD 您选择的答案：

第97-98题

27岁初产妇，妊娠39周，规律宫缩6小时，枕左前位，估计胎儿体重2700g，胎心142次/分。阴道检查：宫口开大3cm，未破膜，S = +1，骨盆外测量未见异常。

1. 此时恰当处理应是

- A. 抑制宫缩，使其维持至妊娠40周
- B. 等待自然分娩
- C. 人工破膜加速产程进展
- D. 静脉滴注缩宫素
- E. 行剖宫产术

2. 若此后宫缩逐渐减弱，产程已18小时，胎膜已破，宫口开大8cm，此时恰当处理应是

- A. 静注地西洋加速产程进展
- B. 静脉滴注缩宫素
- C. 肌肉注射缩宫素
- D. 静脉注射麦角新碱
- E. 立即行剖宫产术

正确答案：BB 您选择的答案：

第99-100题

女性，32岁，进行性膀胱刺激症状，经抗生素治疗不见好转，且伴有右侧腰部胀痛及午后潮热。

1. 尿液检查对诊断有决定性意义的是

- A. 血尿
- B. 脓尿
- C. 尿普通细菌培养
- D. 尿沉渣找结核杆菌
- E. 尿细胞学检查

2. 为了解患者肾功能及形态的病理改变，最有价值的检查是

- A. B超
- B. 静脉尿路造影
- C. 逆行肾盂造影
- D. CT
- E. MRI

正确答案：BB 您选择的答案：

第101-104题

女，38岁，接触性出血1个月余，白带有恶臭，妇科检查，宫颈糜烂，前唇有5cm3的质地脆赘生物，易出血。子宫正常大，三合诊(-)。

1. 最可能的诊断是

- A. 子宫颈息肉
- B. 子宫颈结核

- C. 子宫颈癌
  - D. 子宫内膜异位症
  - E. 宫颈绒癌
  - 2. 为确定诊断，最可靠的诊断方法为
  - A. 宫颈刮片细胞学检查
  - B. 碘试验
  - C. 阴道镜检查
  - D. 氮激光肿瘤固有荧光诊断法
  - E. 宫颈活检
  - 3. 确诊后，其临床期别为
  - A. Ia期
  - B. Ib1期
  - C. Ib2期
  - D. a期
  - E. b期
  - 4. 最恰当的治疗方法为
  - A. 宫颈锥切术
  - B. 放射治疗
  - C. 全子宫切除术
  - D. 次广泛性子宫切除术加盆腔淋巴结切除术
  - E. 广泛性子宫切除术加盆腔淋巴结切除术
- 正确答案：CECE 您选择的答案：