

历年试题1(2000~2003年) 历年试题 B1型题

一、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第1-2题

- A. 无明显规律性
- B. 疼痛-排便-加重
- C. 进食-疼痛-缓解
- D. 疼痛-进食-缓解
- E. 疼痛-排便-缓解

- 1. 胃溃疡腹痛的规律是
 - 2. 肠易激综合征腹痛的规律是
- 正确答案：CE 您选择的答案：

第3-6题

下列疾病时宜选择的治疗药物为

- A. 地尔硫革(硫氮草酮)
- B. 洋地黄
- C. 阿托品
- D. 利多卡因
- E. 胺碘酮

- 1. 急性前壁心肌梗死并发加速性室性自主律
 - 2. 预激综合征合并快速心房颤动
 - 3. 肥厚型梗阻性心脏病
 - 4. 前壁心肌梗死并发短阵室速
- 正确答案：CEED 您选择的答案：

第7-9题

- A. 细胞水肿
- B. 脂质沉积
- C. 结缔组织玻璃样变
- D. 血管壁玻璃样变
- E. 细胞内玻璃样变

- 1. 肝细胞气球样变
- 2. 肝细胞胞浆内嗜酸性小体
- 3. 瘢痕组织

正确答案：AEC 您选择的答案：

第10-12题

- A. 呼吸性酸中毒
- B. 代谢性酸中毒
- C. 呼吸性碱中毒
- D. 代谢性碱中毒
- E. 呼吸性酸中毒合并代谢性碱中毒

- 1. 幽门梗阻病人可发生
- 2. 重度肺气肿病人可发生
- 3. 外科临床上最常见的酸碱失衡是

正确答案：DAB 您选择的答案：

第13-15题

- A. 以健康人或病人作为受试对象
- B. 实验时使用对照和双盲法
- C. 不选择弱势人群作为受试者
- D. 实验中受试者得到专家的允许后可自由决定是否退出
- E. 弱势人群若参加实验，需要监护人的签字

- 1. 能体现人体实验知情同意的是
- 2. 不能体现知情同意的是
- 3. 能体现人体实验科学原则的是

正确答案：DBB 您选择的答案：

第16-17题

- A. PaO₂为50mmHg, PaCO₂为40mmHg
- B. PaO₂为55mmHg, PaCO₂为50mmHg
- C. PaO₂为65mmHg, PaCO₂为40mmHg
- D. PaO₂为70mmHg, PaCO₂为40mmHg
- E. PaO₂为70mmHg, PaCO₂为45mmHg

- 1. 符合I型呼吸衰竭的动脉血气标准是
- 2. 符合II型呼吸衰竭的动脉血气标准是

正确答案：AB 您选择的答案：

第18-19题

- A. 腺癌
- B. 鳞状细胞癌
- C. 印戒细胞癌
- D. 黏液腺癌
- E. 小细胞未分化癌

- 1. 女性的肺癌大多是
- 2. 食管癌大多是

正确答案：AB 您选择的答案：

第20-21题

- A. $\alpha 1$ 受体
- B. $\alpha 2$ 受体
- C. $\beta 1$ 受体
- D. $\beta 2$ 受体
- E. $\beta 3$ 受体
- 1. 激活后能促进糖酵解代谢的主要受体是
- 2. 激活后能促进脂肪分解代谢的受体是

正确答案：DE 您选择的答案：

第22-23题

- A. 每次抽液量<1000ml
- B. 加大抗结核药物剂量
- C. 每次抽液量以抽尽为止
- D. 合理化疗同时合并用泼尼松
- E. 抗结核治疗的同时加用抗菌药
- 1. 结核性大量胸腔积液患者伴有毒血症症状重时
- 2. 结核性大量胸腔积液患者抽液的原则是

正确答案：DC 您选择的答案：

第24-26题

- A. NK细胞
- B. B细胞
- C. 肥大细胞
- D. 细胞毒性T淋巴细胞
- E. 浆细胞
- 1. 特异性细胞毒
- 2. 分泌抗体
- 3. 提呈抗原

正确答案：DEB 您选择的答案：

第27-28题

- A. 窦房结
- B. 心房肌
- C. 房室交界
- D. 浦肯野纤维
- E. 心室肌
- 1. 心脏内传导速度最快的部位是
- 2. 心肌自律性最高的部位是

正确答案：EA 您选择的答案：

第29-30题

- A. 易发生肱动脉损伤
- B. 易发生腓动脉损伤
- C. 易发生缺血性骨坏死
- D. 易发生桡神经损伤
- E. 易发生坐骨神经损伤
- 1. 股骨颈骨折
- 2. 髌关节后脱位

正确答案：CE 您选择的答案：

第31-32题

- A. 中央前回
- B. 黑质-纹状体
- C. 颞叶
- D. 枕叶
- E. 小脑
- 1. 复杂部分性发作的病损在
- 2. 帕金森病病损在

正确答案：CB 您选择的答案：

第33-34题

- A. 5年
- B. 10年
- C. 15年
- D. 20年
- E. 30年
- 1. 《医疗事故处理条例》规定，残疾生活补助费应根据伤残等级，自定残之月起最长赔偿
- 2. 《医疗事故处理条例》规定，对60周岁以上的患者因医疗事故致残的，赔偿其残疾生活补助费的时间不超过

正确答案：DC 您选择的答案：

第35-36题

- 检查羊水，结果是
- A. 卵磷脂/鞘磷脂比值为2.3
- B. 淀粉酶值为500U/L
- C. 胆红素类物质值为0.01
- D. 含脂肪细胞出现率为23%

E. 肌酐值为2.3mg%

1. 提示胎儿肺成熟

2. 提示胎儿肾成熟

正确答案：AE 您选择的答案：

第37-38题

A. 半胱氨酸

B. 丝氨酸

C. 蛋氨酸

D. 脯氨酸

E. 鸟氨酸

1. 含巯基的氨基酸是

2. 天然蛋白质中不含有的氨基酸是

正确答案：AB 您选择的答案：

第39-40题

A. 乙肝疫苗

B. 流感疫苗

C. 麻疹疫苗

D. 脊髓灰质炎疫苗

E. 白、百、破疫苗

1. 新生儿期接种的疫苗应是

2. 生后2个月时应接种的疫苗是

正确答案：AC 您选择的答案：

第41-42题

A. 肺泡毛细血管急性损伤

B. 支气管肺感染和阻塞

C. 肺弥散功能障碍

D. 肺动脉高压

E. 肺性脑病

1. 肺心病发病的主要机制是

2. 肺心病出现精神障碍主要见于

正确答案：DE 您选择的答案：

第43-44题

A. 25周

B. 28周

C. 30周

D. 35周

E. 40周

1. 羊水内出现肺表面活性物质的时间是

2. 羊水内肺表面活性物质迅速增加的时间是

正确答案：AD 您选择的答案：

第45-46题

A. 经口

B. 经淋巴管道

C. 腹腔病变直接蔓延

D. 经血液循环

E. 腰椎病变直接蔓延

1. 结核性腹膜炎的主要感染途径是

2. 肠结核的主要感染途径是

正确答案：DA 您选择的答案：

第47-48题

A. 疼痛

B. 发热

C. 恶心、呕吐

D. 腹胀

E. 呃逆

1. 外科术后最常见的是

2. 术后麻醉反应的是

正确答案：AC 您选择的答案：

第49-52题

A. 疝内容物易回纳入腹腔

B. 疝内容物不能完全回纳入腹腔

C. 疝内容物有动脉性血液循环障碍

D. 疝内容物被疝环卡住不能还纳，但无动脉性循环障碍

E. 疝内容为部分肠壁不能还纳时

1. 绞窄性疝

2. 易复性疝

3. 嵌顿性疝

4. 难复性疝

正确答案：CADB 您选择的答案：

第53-54题

A. 抗结核治疗

B. 病灶清除术

- C. 肾部分切除术
 - D. 肾切除术
 - E. 肾造瘘
 - 1. 一侧肾结核, 上肾盏有虫蚀样改变, 应采用
 - 2. 一侧肾结核无功能, 对侧肾正常, 应做
- 正确答案: CD 您选择的答案:

第55-56题

- A. 一级结构破坏
 - B. 二级结构破坏
 - C. 三级结构破坏
 - D. 四级结构破坏
 - E. 空间结构破坏
 - 1. 亚基解聚时
 - 2. 蛋白酶水解时
- 正确答案: DA 您选择的答案:

第57-59题

- A. 四环素
 - B. 利巴韦林
 - C. 妥布霉素
 - D. 氟康唑
 - E. 林可霉素
 - 1. 对立克次体感染最有效的药物是
 - 2. 能有效控制绿脓杆菌感染的药物是
 - 3. 能抑制DNA病毒的药物是
- 正确答案: ACB 您选择的答案:

第60-62题

- A. 人虱
 - B. 鼠蚤
 - C. 羌螨
 - D. 蜱
 - E. 蚊
 - 1. 流行性乙型脑炎的传播媒介是
 - 2. 地方性斑疹伤寒的传播媒介是
 - 3. 流行性斑疹伤寒的传播媒介是
- 正确答案: EBA 您选择的答案:

第63-64题

- A. 玉米
 - B. 鸡蛋
 - C. 黄豆
 - D. 鱼
 - E. 大米
 - 1. 食物蛋白质的生物学价值最高的是
 - 2. 食物蛋白质的生物学价值最低的是
- 正确答案: BA 您选择的答案:

第65-67题

- A. 异搏定
 - B. 洋地黄
 - C. 阿托品
 - D. 利多卡因
 - E. 胺碘酮
 - 下列疾病时宜选择的治疗药物为
 - 1. 急性心肌梗死并发室性心动过速
 - 2. 急性前壁心肌梗死并发加速性室性自主律
 - 3. 预激综合征合并快速心房颤动
- 正确答案: DCE 您选择的答案:

第68-69题

- A. 阵发性睡眠性血红蛋白尿
 - B. 缺铁性贫血
 - C. 再生障碍性贫血
 - D. 巨幼细胞性贫血
 - E. 自身免疫性溶血性贫血
 - 1. 外周血中全血细胞减少, Ham试验阴性
 - 2. 血红蛋白50g/L, 血小板 $100 \times 10^9/L$, Coombs试验阳性
- 正确答案: CE 您选择的答案:

第70-71题

- A. 孕母有菌血症
 - B. 阴道细菌上行
 - C. 脐部感染
 - D. 消化道入侵
 - E. 粘膜破损
 - 1. 新生儿败血症的产前感染的途径是
 - 2. 新生儿败血症的产时感染的途径是
- 正确答案: BE 您选择的答案:

第72-73题

- A. 卡介苗
- B. 流感疫苗
- C. 麻疹疫苗
- D. 脊髓灰质炎疫苗
- E. 白、百、破疫苗

1. 新生儿期接种的疫苗应是
2. 生后8个月时应接种的疫苗是

正确答案：AC 您选择的答案：

第74-75题

- A. 硫酸镁静脉滴注
- B. 哌替啶肌内注射
- C. 胍苯达嗪静脉滴注
- D. 甘露醇快速静滴
- E. 阿托品静脉推注

1. 妊高征孕妇血压180 / 116mmHg时首选药物是
2. 妊高征孕妇头痛剧烈伴呕吐时首选药物是

正确答案：AD 您选择的答案：

第76-77题

- A. 月经第5~6日刮宫见于宫分泌反应内膜
- B. 经前2日刮宫见于宫内膜分泌反应不良
- C. 经前3日刮宫见子宫内膜增生期改变
- D. 经前2日刮宫见子宫内膜分泌期改变
- E. 刮宫为蜕膜

1. 子宫内膜不规则脱落时，应为
2. 无排卵性功能失调性子宫出血时，应为

正确答案：DC 您选择的答案：

第78-79题

- A. 强迫性思维
- B. 思维奔逸
- C. 联想散漫
- D. 强制性思维
- E. 思维插入

1. 病人反复出现一些想法，明知不必要或不合理，但无法控制。该症状为
2. 病人体验到脑内概念不断涌现，一个意念接着一个意念。该症状为

正确答案：EB 您选择的答案：

第80-81题

- A. 清洁中段尿培养，菌落计数为<1000个 / ml
- B. 清洁中段尿培养，菌落计数为1000个 / ml
- C. 清洁中段尿培养，菌落计数为1万个 / ml
- D. 清洁中段尿培养，菌落计数为5万个 / ml
- E. 清洁中段尿培养，菌落计数为10万个 / ml

1. 链球菌引起的尿路感染，有临床诊断意义的最低菌落计数为
2. 克雷白杆菌引起的尿路感染，有临床诊断意义的最低菌落计数为

正确答案：EA 您选择的答案：