

习题集 外科学 水、电解质代谢和酸、碱平衡失调

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 施行结肠瘘口关闭手术，手术区消毒应为

- A 由手术区中心向四周进行
- B 由手术区外周向瘘口周围进行
- C 由手术区上方向下方进行
- D 由手术区一侧向另一侧进行
- E 无需考虑方向

正确答案：B 您选择的答案：

第2题 等渗性缺水多发生在

- A 胃肠液急性丧失
- B 吞咽困难
- C 大量出汗
- D 慢性肠梗阻
- E 低位小肠瘘

正确答案：A 您选择的答案：

第3题 等渗性脱水多发生于

- A 水分摄入不足
- B 水分丧失过多
- C 渗透性利尿
- D 消化液急性丧失
- E 消化液长期慢性丧失

正确答案：D 您选择的答案：

第4题 等渗性脱水的常见病因是

- A 急性肠梗阻
- B 感染性休克
- C 肺炎高热
- D 慢性十二指肠瘘
- E 挤压综合征

正确答案：A 您选择的答案：

第5题 正常血钾值的范围

- A 2.5~2.8mmol/L
- B 3.0~5.0mmol/L
- C 3.5~5.5mmol/L
- D 5.5~6.5mmol/L
- E 6.5~7.5mmol/L

正确答案：C 您选择的答案：

第6题 正常人血中 HCO_3^- 与 H_2CO_3 之比为

- A 10:1
- B 15:1
- C 20:1
- D 25:1
- E 30:1

正确答案：C 您选择的答案：

第7题 体液平衡中，细胞外液里最重要的阴离子是

- A HCO_3^-
- B HPO_4
- C SO_4^{2-}
- D Cl^-
- E 蛋白质

正确答案：D 您选择的答案：

第8题 高渗脱水患者，其缺水程度为中度，患者缺水量为体重的

- A 2%~4%
- B 3%~5%
- C 4%~6%
- D 5%~7%
- E 6%~8%

正确答案：C 您选择的答案：

第9题 有关代谢性酸中毒的描述，以下哪项是错误的

- A 代谢性酸中毒指血液中 HCO_3^- 浓度原发性减少
- B 代谢性酸中毒常伴有高血钾
- C 代谢性酸中毒时 PCO_2 可下降
- D 高渗脱水酸中毒，纠正酸中毒应先给予 NaHCO_3
- E 代谢性酸中毒多发生在脱水、休克等情况下

正确答案：D 您选择的答案：

第10题 用5%碳酸氢钠溶液处理高钾血症不是因为

- A. 增加血容量以稀释血钾浓度
- B. 促使 K^+ 移入细胞内
- C. 碱化尿时 K^+ 从尿中排出增多
- D. Na^+ 可对抗 K^+ 对心肌毒性作用
- E. 有效而长期降低血钾浓度

正确答案：E 您选择的答案：

第11题 低渗性缺水，血清钠往往低于

- A. 155mmol / L
- B. 150mmol / L
- C. 145mmol / L
- D. 135mmol / L
- E. 110mmol / L

正确答案：D 您选择的答案：

第12题 高渗性脱水时，下列哪种情况不会出现

- A. 口渴
- B. 血清钠大于150mmol / L
- C. 尿比重升高
- D. 恶心、呕吐
- E. 红细胞比容大于48%

正确答案：D 您选择的答案：

第13题 高渗性脱水时，血清 Na^+ 至少高于

- A. 150mmol / L
- B. 155mmol / L
- C. 160mmol / L
- D. 165mmol / L
- E. 170mmol / L

正确答案：A 您选择的答案：

第14题 下列哪种心电图改变有助于确诊低钾血症

- A. T波低平、倒置
- B. U波
- C. ST段压低
- D. T波双向
- E. QT间期延长

正确答案：B 您选择的答案：

第15题 低渗性缺水时，一般不出现下列哪项改变

- A. 口渴明显
- B. 恶心、呕吐、肌肉痉挛
- C. 尿比重低
- D. 尿内 Cl^- 很少
- E. 血清 Na^+ 降低

正确答案：A 您选择的答案：

第16题 等渗性缺水短期内出现血容量明显不足时，揭示体液丧失达体重的

- A. 3%
- B. 3.5%
- C. 4%
- D. 4.5%
- E. 5%

正确答案：E 您选择的答案：

第17题 体液平衡中、细胞外液，最重要的阴离子是

- A. HCO_3^-
- B. HPO_4^{2-}
- C. SO_4^{2-}
- D. Cl^-
- E. 蛋白质

正确答案：D 您选择的答案：

第18题 反复呕吐可导致电解质紊乱，损失最多的是

- A. Na^+
- B. Cl^-
- C. H^+
- D. K^+
- E. Ca^{2+}

正确答案：A 您选择的答案：

第19题 下列哪项不是代谢性酸中毒的临床表现

- A. 心率加快
- B. 血压偏低
- C. 耳前叩击试验阳性
- D. 呼吸深快
- E. 呼吸中有酮味

正确答案：C 您选择的答案：

第20题 下列叙述正确的是
A. 高渗性脱水常有细胞内水肿
B. 等渗性脱水主要是细胞脱水
C. 低渗性脱水易发生休克
D. 重度低渗性脱水口渴极明显
E. 重度高渗性脱水易出现神经系统症状
正确答案：E 您选择的答案：

第21题 外科病人最常发生的脱水为
A. 慢性脱水
B. 高渗性脱水
C. 低渗性脱水
D. 原发性脱水
E. 等渗性脱水
正确答案：E 您选择的答案：

第22题 关于水、电解质和酸碱平衡失调的治疗，下列正确的是
A. 5%碳酸氢钠是临床上最常用的等渗碱性溶液
B. 10%葡萄糖酸钙不能直接静脉注射
C. 即使是重度脱水，也不必补充胶体溶液
D. 低钾血症难以纠正时，应考虑在补钾的基础上补镁
E. 纠正呼吸性酸中毒的主要措施是补充THAM
正确答案：D 您选择的答案：

第23题 高渗性脱水，其体液变化之最终表现是
A. 细胞外液缺水
B. 细胞内液缺水
C. 细胞内液缺水超过细胞外液缺水
D. 细胞内外液等量缺水
E. 细胞外液缺水超过细胞内液缺水
正确答案：C 您选择的答案：

第24题 常用的平衡盐溶液为
A. 5%葡萄糖氯化钠溶液
B. 复方氯化钠溶液
C. 乳酸钠林格液
D. 1.25%碳酸氢钠1/3和等渗盐水2/3
E. 5%碳酸氢钠1/3和等渗盐水2/3
正确答案：D 您选择的答案：

第25题 关于高渗性脱水，下列错误的是
A. 缺水多于缺钠
B. 血清钠155mmol/L
C. 缺水量超过体重的6%，可发生谵妄、昏迷、休克
D. 缺水量大于体重的4%，患者烦躁、尿量显著减少
E. 缺水量为体重的2%时，尿少、尿比重偏低
正确答案：E 您选择的答案：

第26题 病人头晕、乏力、恶心呕吐、血清Na⁺ 130mmol/L、血清K⁺ 4.5mmol/L、尿比重1.010，是哪种电解质失调
A. 高渗性缺水
B. 等渗性缺水
C. 低渗性缺水
D. 低钾血症
E. 高钾血症
正确答案：C 您选择的答案：

第27题 最常引起代谢性碱中毒的电解质紊乱是
A. 低钾血症
B. 高钾血症
C. 低镁血症
D. 低钙血症
E. 高钠血症
正确答案：A 您选择的答案：

第28题 高渗性缺水，其体液变化之最终表现是
A. 细胞外液缺水
B. 细胞内液缺水
C. 细胞内液缺水超过细胞外液缺水
D. 细胞内外液等量缺水
E. 细胞外液缺水超过细胞内液缺水
正确答案：C 您选择的答案：

第29题 正常人血中HCO₃⁻，与H₂CO₃之比为
A. 10:1
B. 15:1
C. 20:1
D. 25:1
E. 30:1
正确答案：C 您选择的答案：

第30题 代谢性酸中毒可引起血钾增高，但在纠正酸中毒后需及时补钾，理由是

- A. 钾从细胞内转移至细胞外，部分从尿中排除
- B. 酸中毒纠正后，细胞内、外液 H^+-K^+ 交换停止，而尿排钾仍在继续
- C. 钾从细胞外进入细胞内，钾从尿中排出，细胞外钾被稀释
- D. 酸中毒时体内总钾实际上并不增高，而是减少
- E. 为了防止发生代谢性碱中毒

正确答案：C 您选择的答案：

第31题 低渗性脱水引起体液容量的变化为

- A. 血浆、组织间液都减少，以血浆减少为主
- B. 只有血浆减少
- C. 血浆、组织间液都减少，以组织间液减少为主
- D. 只有组织间液减少
- E. 以血液浓缩为主

正确答案：C 您选择的答案：

第32题 细胞外液占成人体重的

- A. 20%
- B. 25%
- C. 40%
- D. 60%
- E. 30%

正确答案：A 您选择的答案：

第33题 高渗性缺水时，血清 Na^+ 至少高于

- A. 150mmol / L
- B. 155mmol / L
- C. 160mmol / L
- D. 165mmol / L
- E. 170mmol / L

正确答案：A 您选择的答案：

第34题 高渗性脱水的早期主要症状是

- A. 幻觉
- B. 谵妄
- C. 恶心
- D. 口渴
- E. 心悸

正确答案：D 您选择的答案：

第35题 病人头晕，乏力，恶心呕吐，血清 $Na^+130mmol / L$ 、血清 $K^+4.5mmol / L$ ，尿比重1.010，为下列哪种情况

- A. 高渗性脱水
- B. 等渗性脱水
- C. 低渗性脱水
- D. 低钾血症
- E. 高钾血症

正确答案：C 您选择的答案：

第36题 低血钾影响神经，肌肉系统时，最突出的部位是

- A. 呼吸肌
- B. 腹肌
- C. 四肢肌
- D. 膈肌
- E. 背部肌

正确答案：C 您选择的答案：

第37题 低钾血症最初的表现

- A. 肌无力
- B. 呕吐
- C. 多尿
- D. 心脏传导失常
- E. 心律失常

正确答案：A 您选择的答案：

第38题 关于机体水钠代谢失调，下列叙述正确的是

- A. 脱水就是指水分的减少
- B. 低渗性脱水时尿钠可以消失
- C. 高渗性脱水的治疗应以补盐为主
- D. 各种原因引起的脱水都使体重减轻
- E. 重度等渗性脱水需大量补液时以生理盐水为宜

正确答案：B 您选择的答案：

第39题 一肠梗阻术后患者，血清 $Na^+130mmol / L$ ， K^+3mmol / L ， $Cl^-98mmol / L$ ， $BUN8mmol / L$ 。应考虑与下列因素有关

- A. 补充了大量等渗盐水
- B. 水分补充不足
- C. 补充了大量等渗糖水
- D. 补充了足量的钾盐
- E. 肾功能不全

正确答案：C 您选择的答案：

第40题 下列低血钾的临床表现中，错误的是

- A. 肌肉软弱无力，甚至四肢软瘫
- B. 腹胀、肠麻痹
- C. 心悸、心率快或心律失常
- D. 尿量明显减少
- E. 神志淡漠，疲乏

正确答案：D 您选择的答案：

第41题 高钾血症伴发心律失常时，应

- A. 静脉注射碳酸氢钠
- B. 静脉注射胰岛素 + 葡萄糖
- C. 静脉注射乳酸钠
- D. 静脉注射葡萄糖酸钙
- E. 以上都不是

正确答案：D 您选择的答案：

第42题 幽门梗阻引起反复呕吐，最可能引起

- A. 低氯高钾碱中毒
- B. 低氯低钾酸中毒
- C. 高钾酸中毒
- D. 低氯低钾碱中毒
- E. 低氯高钠碱中毒

正确答案：D 您选择的答案：

第43题 高钾血症时，血清钾高于

- A. 5mmol / L
- B. 4.5mmol / L
- C. 4mmol / L
- D. 5.5mmol / L
- E. 3.5mmol / L

正确答案：D 您选择的答案：

第44题 低钾血症病人，经补充钾治疗后，病情仍无改善时，应考虑有

- A. 低钠血症
- B. 低镁血症
- C. 高钙血症
- D. 代谢性酸中毒
- E. 低氯血症

正确答案：B 您选择的答案：

第45题 关于静脉补液，下列哪项是错误的

- A. 低渗性缺水应补等渗或高渗盐水
- B. 等渗性缺水最好用平衡盐溶液
- C. 高渗性缺水最好补等渗盐水
- D. 等渗性缺水用等渗盐水补充可致高氯血症
- E. 估计缺水量后，先补计算量之1/2，加上当天生理需要量和继续丢失量

正确答案：C 您选择的答案：

第46题 幽门梗阻可发生哪项代谢改变

- A. 呼吸性碱中毒
- B. 呼吸性酸中毒
- C. 代谢性碱中毒
- D. 代谢性酸中毒
- E. 低氯高钾碱中毒

正确答案：C 您选择的答案：

第47题 等渗性缺水病人，大量输入生理盐水治疗可导致

- A. 高钾血症
- B. 低钾血症
- C. 低氯血症
- D. 高钙血症
- E. 高氯血症

正确答案：E 您选择的答案：

第48题 下列哪项不是等渗性缺水酸中毒纠正后易出现低钾血症的原因

- A. 尿量增多，肾排钾增多
- B. 血清K⁺大量移入组织间液
- C. 由于细胞外液增多，血K⁺浓度稀释
- D. 补充碱液使大量K⁺转移入细胞内
- E. 细胞内K⁺外移动态停止

正确答案：B 您选择的答案：

第49题 幽门梗阻所致持续呕吐可造成

- A. 低氯高钾性碱中毒
- B. 缺钾性酸中毒
- C. 低氯低钾性酸中毒
- D. 低氯高钠性碱中毒
- E. 低氯低钾性碱中毒

正确答案：E 您选择的答案：

第50题 容易伴发代谢性酸中毒的病是

- A. 长期静脉滴注葡萄糖
- B. 食管梗阻
- C. 幽门梗阻
- D. 急性阑尾炎
- E. 弥漫性腹膜炎

正确答案：E 您选择的答案：

第51题 高渗性缺水的早期主要症状是

- A. 幻觉
- B. 谵妄
- C. 恶心
- D. 口渴
- E. 心悸

正确答案：D 您选择的答案：

第52题 低血钾影响神经肌肉系统时，最突出的部位是

- A. 呼吸肌
- B. 腹肌
- C. 四肢肌
- D. 膈肌
- E. 背部肌

正确答案：C 您选择的答案：

第53题 下列最易致低钾血症的是

- A. 大量出汗
- B. 严重肠瘘
- C. 大面积烧伤
- D. 感染性休克
- E. 大量输血

正确答案：B 您选择的答案：

第54题 中度缺钠时，病人每公斤体重缺氯化钠

- A. 0.25g
- B. 0.25~0.5g
- C. 0.5g
- D. 0.5~0.75g
- E. 0.75~1.25g

正确答案：D 您选择的答案：

第55题 诊断代谢性酸中毒的主要依据是

- A. 呼吸浅而慢，血浆二氧化碳结合力下降
- B. 呼吸深而快，血浆二氧化碳结合力上升
- C. 呼吸深而快，有酮味，血浆碳酸氢根值下降
- D. 呼吸困难，血浆碳酸氢根值上升
- E. 呼吸慢，心律慢，血压高，神志不清

正确答案：C 您选择的答案：

第56题 高渗性脱水的常见病因是

- A. 急性胃肠炎
- B. 感染性休克
- C. 大面积烧伤
- D. 尿崩症
- E. 甲状腺功能亢进

正确答案：D 您选择的答案：

第57题 下列防治低钾血症的措施，错误的是

- A. 禁食的成年患者一般应每日从静脉内补充3g氯化钾
- B. 补钾常用10%氯化钾加入500ml溶液中静滴
- C. 用排钾类利尿剂的患者，宜适当补钾
- D. 对代谢性碱中毒的患者应检查血清钾
- E. 输注10%葡萄糖溶液时常规加入胰岛素

正确答案：E 您选择的答案：

第58题 低渗性脱水时，一般不出现下列哪项改变

- A. 口渴明显
- B. 恶心、呕吐、肌肉痉挛
- C. 尿比重低
- D. 尿内C1-很少
- E. 血清Na⁺降低

正确答案：A 您选择的答案：

第59题 低渗性缺水引起体液容量的变化为

- A. 血浆、组织间液都减少，以血浆减少为主
- B. 只有血浆减少
- C. 血浆、组织间液都减少，以组织间液减少为主
- D. 只有组织间液减少
- E. 以血液浓缩为主

正确答案：C 您选择的答案：

第60题 下列情况，哪一项不是造成高钾血症的原因

- A．服用含钾药物
- B．注射精氨酸
- C．输入大量库存血
- D．糖皮质激素分泌不足
- E．急性肾衰

正确答案：D 您选择的答案：

第61题 低渗性脱水重度缺钠出现周围循环衰竭，应立即

- A．输5%高渗盐水200～300ml
- B．按每公斤体重缺NaCl 0.5g计算，快速输生理盐水
- C．按血清钠下降值×体重×0.6计算，快速输生理盐水
- D．快速输入胶体液及晶体液，以补充血容量
- E．输高渗葡萄糖及升压药物使血压上升

正确答案：D 您选择的答案：

第62题 低钾血症是

- A．临床上常表现为精神亢奋、肢体抽搐
- B．严重时可能发生室性心动过速，甚至室颤
- C．心电图表现为T波高尖、呈帐篷样
- D．常伴有代谢性酸中毒
- E．机体总钾量总是减少的

正确答案：B 您选择的答案：

第63题 低渗性缺水，血清尚未出现缺钠之前，尿中氯化钠

- A．正常
- B．略高
- C．时高时低
- D．减少或缺乏
- E．由低升高

正确答案：D 您选择的答案：

第64题 等渗性脱水的常见病因为

- A．慢性肠梗阻
- B．肺炎高热
- C．糖尿病昏迷
- D．十二指肠瘘
- E．食管癌吞咽困难

正确答案：D 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第65题 女，36岁，腹痛伴频繁呕吐2天。查体：脉搏120次/分，呼吸32次/分，血压90/60mmHg，呼吸深，似可闻及烂苹果气味。最好应进行下列哪种检查

- A．血清钙测定
- B．血清钾测定
- C．血气分析
- D．血清钠测定
- E．血CO₂CP测定

正确答案：C 您选择的答案：

第66题 女性，67岁，1个月来反复呕吐、腹胀、腹痛，不进食，肛门停止排气排便。体检：腹部膨隆，可肠型，肠鸣音亢进，可闻及气过水声。辅助检查：血红蛋白120g/L，血浆清蛋白32g/L，血清，134mmol/L，钾6.0mmol/L，动脉血pH值7.20。该患者的典型心电图改变为

- A．T波变宽
- B．出现U波
- C．高而尖的T波
- D．T波双向
- E．QT间期延长

正确答案：C 您选择的答案：

第67题 男，30岁，因心跳骤停经抢救后心跳恢复，而后出现呼吸困难，换气无力。下列哪项患者不会出现

- A．肺换气功能不足
- B．血pH低于7.35
- C．血HCO₃⁻下降
- D．血PCO₂增高
- E．血HCO₃⁻正常

正确答案：C 您选择的答案：

第68题 男性，38岁，2天来阵发性脐周疼痛，恶心，呕吐频繁，量较大，尿量少，无口渴。体检：腹胀不明显，偶见肠型，肠鸣音亢进。辅助检查：血红蛋白12×10⁹/L，中性粒细胞80%，PaCO₂39mmHg，此患者可能出现哪种代谢紊乱

- A．低渗性脱水，代谢性碱中毒
- B．代谢性酸中毒，高渗性脱水
- C．代谢性酸中毒，低渗性脱水
- D．呼吸性酸中毒，低渗性脱水

E. 呼吸性酸中毒，高渗性脱水
正确答案：C 您选择的答案：

第69题 男，20岁，急性阑尾炎术后第一天禁食，下列哪项每天不应静脉补充？

- A. 水分2000~2500ml
- B. 4%碳酸氢钠1000ml
- C. 氯化钾3~4g
- D. 氯化钠4~5g
- E. 葡萄糖150g

正确答案：B 您选择的答案：

第70题 女性，36岁。腹痛伴频繁呕吐2天。体检：血压90/60mmHg(12.0/8.0kPa)，脉搏111次/分，呼吸32次/分。呼吸深，似可闻及烂苹果气味。最好应进行下列哪种检查

- A. 血清钙测定
- B. 血清钾测定
- C. 血气分析
- D. 血清钠测定
- E. 血CO₂CP测定

正确答案：C 您选择的答案：

第71题 男性，50岁，体重50kg，上腹隐痛不适，并不思进食已3个月，胃，镜检查证实为胃体癌，辅助检查：血红蛋白80g/L，血浆清蛋白30g/L，血清钠130mmol/L，钾4.5mmol/L，动脉血pH值为7.35。该病人可能存在

- A. 高渗性脱水
- B. 等渗性脱水
- C. 低渗性脱水
- D. 高钾血症
- E. 稀释性低血钠症

正确答案：C 您选择的答案：

第72题 男，26岁，十二指肠残端瘘20天，目前进食少，全身乏力，直立时晕倒。血清K⁺3mmol/L，Na⁺125mmol/L。其水盐代谢失调应为

- A. 低钾血症，高渗性缺水
- B. 高钾血症，重度低渗性缺水
- C. 低钾血症，等渗性缺水
- D. 低钾血症，中度低渗性缺水
- E. 低渗性缺水

正确答案：D 您选择的答案：

第73题 男，40岁，因等渗性缺水、低钾综合征经快速大量补液、补钾盐后，感全身感觉异常及心跳不整齐，查血压90/60mmHg，脉搏50次/分，神志淡漠，ECG示T波高尖。其紧急治疗措施不应包括

- A. 停止所有钾盐的摄入
- B. 静脉补充5%碳酸氢钠
- C. 给予镁剂
- D. 静推10%葡萄糖酸钙
- E. 静脉补充高渗糖水和胰岛素

正确答案：C 您选择的答案：

第74题 女性，30岁。体重60kg。疲乏、头晕、手足麻木，口渴不明显。体检：血压90/70mmHg(12.0/9.3kPa)，脉搏111次/分。辅助检查：血清钠130mmol/L，钾3.8mmol/L，动脉血pH值为7.4。该病人诊断为

- A. 轻度低渗性失水
- B. 中度低渗性失水
- C. 重度低渗性失水
- D. 低钾血症
- E. 碱中毒

正确答案：B 您选择的答案：

第75题 男性，20岁。肠梗阻3天入院。体检：血压75/60mmHg(10.0/8.0kPa)，呼吸28次/分。辅助检查：血清钠130mmol/L，钾3.0mmol/L，CO₂C.P19mmol/L。下列哪项诊断目前不应考虑

- A. 休克
- B. 低钠血症
- C. 低钾血症
- D. 代谢性碱中毒
- E. 呼吸性碱中毒

正确答案：D 您选择的答案：

第76题 女，40岁，肠梗阻3天，尿少，入院时血压100/60mmHg，脉搏100次/分，血清K⁺4mmol/L，Na⁺132mmol/L，Cl⁻96mmol/L，HCO₃⁻14mmol/L，体重50kg。应先给哪项液体为佳？

- A. 10%葡萄糖溶液500ml
- B. 5%葡萄糖盐水500ml
- C. 乳酸林格液500ml+10%氯化钾10ml
- D. 11.2%乳酸钠溶液250ml
- E. 4%碳酸氢钠溶液250ml

正确答案：E 您选择的答案：

第77题 男，46岁，因急性肠梗阻3天入院，患者诉口渴，全身乏力，不能坐起。查：脉搏120次/分，血压75/60mmHg，眼窝凹陷，皮肤弹性差，尿比重1.025，血清Na⁺134mmol/L。最可能的诊断是：

- A. 高渗性缺水
- B. 等渗性缺水
- C. 低渗性缺水
- D. 缺钠性休克

E. 继发性缺水

正确答案：B 您选择的答案：

三、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第78-79题

男性，20岁，肠梗阻3天入院。查：呼吸28次/分，血压75/60mmHg，血清钠130mmol/L，钾3mmol/L，CO₂CP19mmol/L。

1. 目前诊断中不应包括

- A. 休克
- B. 低钠血症
- C. 低钾血症
- D. 代谢性碱中毒
- E. 呼吸性碱中毒

2. 治疗程序应首先

- A. 输全血
- B. 纠正酸中毒
- C. 补钾
- D. 急诊手术，解除肠梗阻
- E. 抗休克，补充血容量

正确答案：EB 您选择的答案：

第80-82题

男性，50岁，体重50kg，上腹隐痛不适，并不思进食已3月，胃镜检查证实为胃体癌，化验：血红蛋白80g/L，血浆清蛋白30g/L，血清钠130mmol/L，钾4.5mmol/L，动脉血pH值为7.35

1. 该病人可能存在

- A. 高渗性脱水
- B. 等渗性脱水
- C. 低渗性脱水
- D. 高钾血症
- E. 稀释性低血钠症

2. 患者在水、电解质和酸碱平衡方面的主要病理、生理变化为

- A. 血浆容量减少超过组织间液的减少
- B. 组织间液减少超过血浆容量的减少
- C. 细胞内液减少
- D. 细胞内、外液等量减少
- E. 细胞内液移向细胞外间隙

3. 按血清钠浓度和公式计算需补充的钠盐量为

- A. $12 \times 50 \times 0.4$ mmol/L
- B. $12 \times 50 \times 0.5$ mmol/L
- C. $12 \times 50 \times 0.6$ mmol/L
- D. $12 \times 50 \times 0.7$ mmol/L
- E. $12 \times 50 \times 0.8$ mmol/L

正确答案：CBC 您选择的答案：

第83-84题

女，24岁，体重50kg，反复大量呕吐胃肠液3天，尿少，恶心，乏力，四肢发冷。查：脉搏120次/分，血压75/60mmHg，唇干燥，眼窝下陷，皮肤弹性差，尿比重1.013，血清钠135mmol/L，红细胞比容55%

1. 该患者目前存在哪种水、电解质失衡

- A. 中度高渗性脱水
- B. 中度低渗性脱水
- C. 重度等渗性脱水
- D. 轻度混合性脱水
- E. 不存在脱水

2. 当日补液总量中已经丢失量部分应给

- A. 5%葡萄糖溶液3000ml
- B. 生理盐水溶液3000ml
- C. 10%葡萄糖溶液1500ml
- D. 平衡盐溶液1500ml
- E. 10%葡萄糖溶液和生理盐水各1500ml

正确答案：DE 您选择的答案：

第85-86题

男性，50岁。小肠破裂修补术后5天发生肠痿，呼吸深快。体检：面部潮红，心率110次/分，血压90/60mmHg(12.0/8.0kPa)，腱反射减弱。辅助检查：动脉血pH值为7.20，血浆HCO₃⁻15mmol/L。

1. 该病人的酸碱失衡诊断为

- A. 呼吸性酸中毒
- B. 代谢性酸中毒
- C. 呼吸性碱中毒
- D. 代谢性碱中毒
- E. 呼吸性酸中毒合并代谢性酸中毒

2. 首选治疗措施是

- A. 辅助呼吸，加速CO₂排出
- B. 静滴生理盐水
- C. 静滴5%碳酸氢钠
- D. 快速输入高渗葡萄糖
- E. 静滴5%葡萄糖盐水

正确答案：BC 您选择的答案：

第87-89题

男性，40岁，体重60kg，因食管癌进食困难1月余，主诉：乏力、极度口渴、尿少而色深。检查：血压、体温均正常，眼窝凹陷、唇、舌干燥、皮肤弹性差

1. 该病人的水、电解质失衡诊断为

- A 轻度高渗性脱水
- B 中度高渗性脱水
- C 重度高渗性脱水
- D 等渗性脱水
- E 低渗性脱水

2. 该病人当天补充液量约为(不包括当天生理需水量)

- A 500ml
- B 1000ml
- C 3000ml
- D 4000ml
- E 4500ml

3. 补液后口渴减轻，尿量增多，测血清钾浓度为 3.1mmol/L ，应在尿量达下列哪项指标时补给钾盐

- A 20ml/h
- B 25ml/h
- C 30ml/h
- D 35ml/h
- E 40ml/h

正确答案：BCE 您选择的答案：

第90-92题

男性，40岁，体重60kg，因食管癌进食困难1个月余，主诉：乏力，极度口渴，尿少而色深。体检：血压、体温均正常，眼窝凹陷，唇、舌干燥，皮肤弹性差。辅助检查：血红蛋白 102g/L ，血浆清蛋白 30g/L ，血清钠 134mmol/L ，钾 3.1mmol/L 。

1. 该病人诊断为

- A 轻度高渗性脱水
- B 中度高渗性脱水
- C 重度高渗性脱水
- D 等渗性脱水
- E 低渗性脱水

2. 该病人当天补充液体量约为(不包括当天生理需要量)

- A 500ml
- B 1000ml
- C 3000ml
- D 4000ml
- E 4500ml

3. 该患者应在尿量达下列哪项指标时补给钾盐

- A 20ml/小时
- B 25ml/小时
- C 30ml/小时
- D 35ml/小时
- E 40ml/小时

正确答案：BCE 您选择的答案：

四、A4型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第93-97题

女性，40岁。幽门梗阻致反复呕吐15天入院，呼吸浅慢，血压 $90/70\text{mmHg}$ ($12.0/9.3\text{kPa}$)。实验室检查：血清钾 3.0mmol/L ，钠 130mmol/L ， $\text{pH}7.5$ ，血浆 HCO_3^- 35mmol/L 。

1. 该病人酸碱失衡诊断为

- A 呼吸性酸中毒
- B 代谢性酸中毒
- C 呼吸性碱中毒
- D 代谢性碱中毒
- E 代谢性酸中毒合并呼吸性酸中毒

2. 该病人电解质失衡诊断为

- A 低钾血症、低钠血症
- B 高钾血症、低钠血症
- C 高钾血症、高钠血症
- D 高钾血症
- E 高钠血症

3. 该病人典型EKG早期改变是

- A T波降低，Q-T间期延长
- B QRS波增宽
- C P-R间期延长
- D U波
- E T波降低、变平或倒置

4. 若病人体重60kg，第1天应补给氯化钠

- A 4.5g
- B 15g
- C 21g
- D 25.5g
- E 36g

5. 如果在补液过程中尿量小于 30ml/小时 ，不应补给

- A 10% 葡萄糖

- B. 10%氯化钾
- C. 0.9%氯化钠
- D. 5%葡萄糖
- E. 5%葡萄糖盐水

正确答案：DAEBB 您选择的答案：

第98-99题

男性，46岁，体重60kg。因急性肠梗阻3天入院，诉口渴，全身乏力，不能起坐。体检：脉搏100次/分，血压100/60mmHg(13.3/8.0kPa)，眼窝凹陷，皮肤弹性差。发病后未进食，24小时尿量1000ml。

1. 可能的诊断是

- A. 高渗性脱水
- B. 等渗性脱水
- C. 低渗性脱水
- D. 继发性脱水
- E. 缺钠性休克

2. 若入院后查：血红蛋白170g/L，红细胞比容53%，血清钠134mmol/L，血清钾3.6mmol/L，尿比重1.025，动脉血气分析：pH7.166，PaCO₂3.33kPa，HCO₃-8.7mmol/L。当日液体治疗宜用

- A. 平衡液1500ml，5%葡萄糖2000ml，10%氯化钾40ml，5%碳酸氢钠150ml
- B. 平衡液1500ml，5%葡萄糖2000ml，10%氯化钾30ml，5%碳酸氢钠500ml
- C. 平衡液2000ml，5%葡萄糖2000ml，10%氯化钾40ml，5%糖盐水500ml
- D. 平衡液1000ml，5%葡萄糖3000ml，5%糖盐水500ml，5%碳酸氢钠150ml
- E. 生理盐水1500ml，5%葡萄糖2000ml，10%氯化钾40ml，5%碳酸氢钠150ml

正确答案：BB 您选择的答案：

五、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第100-102题

- A. 急性肠梗阻
- B. 感染性休克
- C. 肺炎高热
- D. 慢性十二指肠瘘
- E. 挤压综合征

1. 低渗性脱水的常见病因是

2. 代谢性酸中毒最易发生于

3. 高钾血症的常见病因是

正确答案：DBE 您选择的答案：

第103-104题

- A. 低渗性缺水
- B. 等渗性缺水
- C. 高渗性缺水
- D. 低钾血症
- E. 高钾血症

1. 急性大量丧失消化液后，脉搏细速，肢端湿冷，血压下降

2. 高热大汗，病人诉口渴，烦躁

正确答案：BC 您选择的答案：

第105-107题

- A. 细胞内、外液等量减少
- B. 细胞内液显著减少，细胞外液正常
- C. 细胞外液显著减少，细胞内液正常
- D. 细胞内液显著减少，细胞外液轻度减少
- E. 细胞外液显著减少，细胞内液轻度减少

1. 低渗性脱水时体液容量的变化特点

2. 等渗性脱水时体液容量的变化特点

3. 高渗性脱水时体液容量的变化特点

正确答案：ECD 您选择的答案：

第108-110题

- A. HCO₃-，pH，PCO₂正常
- B. HCO₃-，pH，PCO₂正常
- C. HCO₃-正常，pH，PCO₂
- D. HCO₃-正常，pH，PCO₂
- E. HCO₃-，pH，PCO₂

1. 代谢性酸中毒

2. 呼吸性碱中毒

3. 代谢性碱中毒

正确答案：AEB 您选择的答案：

第111-113题

- A. 急性肠梗阻
- B. 感染性休克
- C. 肺炎高热
- D. 慢性十二指肠瘘
- E. 挤压综合征

1. 低渗性脱水的常见病因是

2. 代谢性酸中毒最易发生于

3. 高钾血症的常见病因是

正确答案：DBE 您选择的答案：

第114-116题

A. HCO_3^- , pH , PCO_2 正常

B. HCO_3^- , pH , PCO_2 正常

C. HCO_3^- 正常, pH , PCO_2

D. HCO_3^- 正常, pH , PCO_2

E. HCO_3^- , pH , PCO_2

1. 代谢性酸中毒

2. 呼吸性碱中毒

3. 代谢性碱中毒

正确答案：AEB 您选择的答案：

习题集 外科学 颅内和椎管内血管性疾病

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 诊断颅内动脉瘤，主要依靠

- A 自发性蛛网膜下腔出血史
- B CT增强扫描
- C 全脑血管造影
- D 克氏征(+), 腰穿血性脑脊液
- E 单侧动眼神经麻痹

正确答案：C 您选择的答案：

第2题 高血压脑出血，下述哪种情况最应积极采取手术治疗

- A 出血后病情进展迅猛，短时间内即陷入深昏迷，生命体征不稳定
- B 经保守治疗，病情稳定
- C 经保守治疗，病情趋于好转
- D 经保守治疗，病情仍逐渐加重，但脑疝表现不明显
- E 以上都不是

正确答案：D 您选择的答案：

第3题 高血压脑出血最常见的部位是

- A 小脑
- B 脑干
- C 脑叶
- D 丘脑
- E 基底节

正确答案：E 您选择的答案：

第4题 蛛网膜下腔出血的典型表现为

- A 动眼神经麻痹
- B 偏瘫
- C 视力视野障碍
- D 颅内杂音
- E 突发剧烈头痛、恶心、呕吐，脑膜刺激征(+)

正确答案：E 您选择的答案：

第5题 确定AVM治疗方法及大小、部位、最有用方法是

- A 腰穿为血性脑脊液
- B CT扫描示高密度畸形血管团
- C MRI示T1, T2加权象均呈黑影
- D 全脑血管造影显示
- E γ刀

正确答案：D 您选择的答案：

第6题 引起成人自发性颅内蛛网膜下腔出血最常见的原因

- A 脑动静脉畸形破裂
- B 颅内动脉瘤破裂
- C 脑瘤卒中
- D 抗凝治疗
- E 血质不调

正确答案：B 您选择的答案：

第7题 自发性蛛网膜下腔出血最常见的原因是

- A 脑动静脉畸形
- B 动脉硬化
- C 烟雾病
- D 脑动脉瘤
- E 颅内肿瘤卒中

正确答案：D 您选择的答案：

第8题 诊断颅内血管疾病最有价值的检查是

- A CT
- B MRI
- C 脑血管造影
- D 头部X线摄片
- E MRA

正确答案：C 您选择的答案：

第9题 高度怀疑自发性SAH，而CT检查为阴性时应选择

- A MRI
- B MRA
- C 腰穿
- D 核素扫描
- E 头部X线摄片

正确答案：C 您选择的答案：

第10题 诊断颈动脉海绵窦漏，最有用特征为

- A 突眼伴颅内杂音
- B 突眼伴眼结膜充血水肿
- C 突眼伴视力障碍
- D 突眼伴眼球运动障碍
- E 突眼伴鼻出血

正确答案：A 您选择的答案：

第11题 有关高血压脑出血的手术治疗，下述哪项是不正确的

- A. 有心、肺、肝、肾等严重疾患者多不宜手术
- B. 浅部出血应优先考虑手术
- C. 动脉血压 200 / 120mmHg(26.6 / 16kPa)，眼底出血者多不宜手术
- D. 大脑半球出血量>30ml，小脑出血>10ml 者多不宜手术
- E. 急性脑干出血手术很少成功

正确答案：D 您选择的答案：

第12题 脑出血的手术治疗指征，哪一项不正确

- A 壳核区，血肿量 30ml
- B 皮质下，血肿量 30ml
- C 小脑内，血肿量 30ml
- D 脑干内，血肿量 30ml
- E 脑室内，血肿量 30ml

正确答案：D 您选择的答案：

第13题 引起儿童自发性颅内蛛网膜下腔出血最常见的原因

- A. 脑动静脉畸形破裂
- B. 颅内动脉瘤破裂
- C. 脑瘤卒中
- D. 抗凝治疗
- E. 血质不调

正确答案：A 您选择的答案：

第14题 下列哪一项不是自发性蛛网膜下腔出血的原因

- A. 颅内动脉瘤
- B. 动静脉畸形
- C. 烟雾病
- D. 动脉硬化
- E. 抗纤溶治疗

正确答案：E 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第15题 有一名蛛网膜下腔出血病人，哪项检查对其无帮助

- A 头颅CT
- B ECT
- C MRI
- D 核磁共振成像
- E 全脑血管造影

正确答案：B 您选择的答案：

第16题 有一自发性蛛网膜下腔出血病人，其最常见的病因是

- A 颅内动脉瘤
- B 脑血管畸形
- C 脑动脉硬化
- D 烟雾病
- E 肿瘤卒中

正确答案：A 您选择的答案：

第17题 有一名蛛网膜下腔出血病人，哪项处置是错误的

- A 绝对卧床休息
- B 给镇静药物
- C 给予止血药物
- D 给予抗生素预防感染
- E 便秘者给予肥皂水灌肠

正确答案：E 您选择的答案：

第18题 有一名颅内动脉瘤病人，哪项措施是错误的

- A 手术夹闭动脉瘤
- B 手术加固动脉瘤
- C 介入治疗
- D 放射治疗
- E 不需要治疗

正确答案：E 您选择的答案：

三、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第19-21题

有一名53岁男患，入院前3小时突然头痛呕吐，CT检查后入院，入院检查意识清，痛苦病容，四肢肌张力肌力改变不明显，项强(-)，头CT左侧裂池有高密度影像

1. 诊断是

- A 脑出血
- B 脑梗死
- C 蛛网膜下腔出血
- D 脑供血不全
- E 脑膜炎

2. 最多的出血来源是

- A 脑动脉硬化
- B 脑血管畸形
- C 颅内动脉瘤
- D 烟雾病
- E 肿瘤中

3. 最根本治疗方案是

- A 冬眠物理降温
- B 脱水治疗
- C 止血治疗
- D 绝对卧床休息
- E 动脉瘤夹闭术

正确答案：CCE 您选择的答案：

第22-25题

患者，男，45岁，无高血压病史，与他人争执后突发剧烈头痛，呕吐伴烦躁不安5天，入院查体：BP140/90mmHg，P100次/分，R20次/分，T37℃，神志淡漠，烦躁、四肢活动正常，颈抗(+)，余神经系统检查(-)

1. 最可能的诊断是

- A 蛛网膜下腔出血(SAH)
- B 脑出血
- C 脑梗塞
- D 脑瘤卒中
- E TIA

2. 首选的检查

- A MRI
- B MRA
- C CT
- D 腰穿
- E 核素扫描

3. 若CT为阴性应进一步行

- A MRI
- B MRA
- C 核素扫描
- D 腰穿
- E 头部X线平片

4. 对SAH的处理，下列哪一项除外

- A 绝对卧床
- B 应用抗纤溶药物
- C 镇静、止痛
- D 提高血压、增加脑灌注量
- E 积极查找病因

正确答案：ACDD 您选择的答案：

第26-30题

女性，52岁。晨起大便时突然出现剧烈头痛、恶心呕吐、低、热及畏光症状，2小时后右侧上睑下垂，意识朦胧，急诊来院。

1. 采集病史时应特别注意询问

- A 头痛的部位
- B 家人有无类似发作
- C 有无高血压、动脉硬化史
- D 有无慢性颅内压增高如头痛、恶心呕吐以及视力减退史
- E 有无全身慢性感染病灶

2. 确诊最有价值、最安全、快捷的辅助检查是

- A 头颅X线平片
- B 头颅B超
- C 腰穿
- D 颅脑CT扫描
- E TCD(经颅多普勒超声)

3. 最可能的诊断是

- A 脑瘤
- B 蛛网膜下腔出血
- C 脑积水
- D 脑脓肿
- E 脑梗死

4. 如需做出病因诊断，下述哪项辅助检查最有帮助

- A 颅脑CT增强扫描
- B 颅脑MRI 检查
- C 脑电图检查
- D SPECT检查(单光子发射计算机断层扫描)
- E 脑血管造影

5. 最可能的病因诊断是

- A 脑瘤

- B. 颅内动脉瘤
- C. 颅内动静脉畸形
- D. 脑梗死
- E. 蛛网膜囊肿

正确答案：CDBEB 您选择的答案：

习题集 外科学 颅脑损伤

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 头皮血肿的处理原则是

- A. 均需穿刺抽吸
- B. 均需切开引流
- C. 局部适当加压
- D. 降颅压治疗
- E. 抗感染治疗

正确答案：C 您选择的答案：

第2题 头皮血肿的处理原则，正确的是

- A. 均需用切开引流
- B. 均需用穿刺抽除积血加压包扎
- C. 采用局部适当加压包扎
- D. 巨大头皮血肿易引起中线移位故脱水治疗
- E. 均需静脉输血抢救休克

正确答案：C 您选择的答案：

第3题 开放性颅脑损伤清创中，最主要的处置原则是

- A. 清除污染物及异物
- B. 充分修剪创缘皮肤
- C. 严密缝合或修补硬膜
- D. 及时使用广谱抗生素
- E. 皮下放置引流

正确答案：A 您选择的答案：

第4题 以下是伴有开放性颅脑损伤的凹陷骨折的处理原则，除了

- A. 尽早尽量施行颅脑清创缝合术，变开放伤为闭合
- B. 术前常规X线平片检查，了解骨折情况
- C. 防止感染，合理使用抗生素
- D. 术前常规X线平片检查，了解陷入脑内的骨折片的位置、数目等
- E. 一定要悉数摘除陷入颅内骨折片或异物

正确答案：E 您选择的答案：

第5题 下列颅脑损伤最急需处理的是

- A. 脑震荡
- B. 顶部的凹陷骨折，深度达1.5cm
- C. 颅底骨折引起外耳道出血
- D. 开放性颅脑损伤，脑组织外溢
- E. 颅内血肿并脑疝形成

正确答案：E 您选择的答案：

第6题 颅骨线形骨折下列哪项不正确

- A. 主要依靠颅骨X线摄片确诊
- B. 单纯线形骨折本身不需特殊处理
- C. 骨折线通过硬脑膜血管沟可能形成硬膜下血肿
- D. 骨折线通过静脉窦可能形成硬膜外血肿
- E. 骨折线通过气窦可导致颅内积气

正确答案：C 您选择的答案：

第7题 急性颅脑损伤的临床分型为中型的GCS评分为

- A. 3~5分
- B. 6~9分
- C. 6~12分
- D. 9~12分
- E. 13~15分

正确答案：D 您选择的答案：

第8题 急性硬膜外血肿的出血来源包括以下各项，除了

- A. 脑膜中动脉及其分支损伤
- B. 矢状窦或横窦损伤
- C. 筛前动脉损伤
- D. 桥静脉损伤
- E. 脑膜前动脉损伤

正确答案：D 您选择的答案：

第9题 诊断颅底骨折通常依据是

- A. 头颅X线摄片
- B. 受伤机制
- C. 剧烈头痛伴呕吐
- D. 临床体征
- E. 意识障碍

正确答案：D 您选择的答案：

第10题 急性硬膜外血肿，最具特征性的表现是

- A. 中间清醒期

B 两侧瞳孔不对称
C 颅骨骨折线跨过脑膜中动脉沟
D 进行性意识障碍
E 对侧肢体瘫痪或锥体束征阳性
正确答案：A 您选择的答案：

第11题 慢性硬膜下血肿指伤后多长时间出现症状

A. 1周内
B. 2周内
C. 3周内
D. 3周后
E. 3个月后

正确答案：D 您选择的答案：

第12题 关于弥漫性轴索损伤，下列哪项是错误的

A 受伤当时立即出现的昏迷时间较长
B 神志好转后，可因继发脑损伤而再次昏迷
C 造成广泛的脑皮层损伤
D 昏迷原因主要是皮层与皮层下中枢失去联系
E CT可见皮髓质交界处，胼胝体等区域有多个点状出血灶

正确答案：C 您选择的答案：

第13题 急性硬膜外血肿意识障碍最典型的特征是

A. 清醒-昏迷
B. 昏迷-清醒
C. 昏迷-清醒-昏迷
D. 昏迷-好转-昏迷
E. 昏迷-昏迷

正确答案：C 您选择的答案：

第14题 关于脑震荡下列哪项不正确

A. 伤后短暂意识障碍
B. 逆行性遗忘
C. 神经系统检查无阳性体征
D. 腰穿无红细胞
E. CT检查可见点状出血

正确答案：E 您选择的答案：

第15题 关于慢性硬膜下血肿，下列哪种说法是错误的

A 可有精神症状
B 可有肢体偏瘫
C 一定有外伤史
D 多见于中老年
E 可有颅内压增高症状

正确答案：C 您选择的答案：

第16题 关于颅底骨折，下列哪项是错误的

A 形态多为线形骨折
B 根据部位可分为三型
C 若伤及颈动脉，形成海绵窦瘘
D 可表现为中枢性面瘫
E X线片仅显示30~50%的骨折线

正确答案：D 您选择的答案：

第17题 颅前窝骨折最易损伤的颅神经是

A 嗅神经
B 面神经
C 三叉神经
D 外展神经
E 滑车神经

正确答案：A 您选择的答案：

第18题 根据伤后出现症状的时间分为急性、亚急性、慢性颅内血肿的标准是

A. 1天以内、1天~1周、1周以上
B. 2天以内、2天~2周、2周以上
C. 3天以内、3天~3周、3周以上
D. 3天以内、3天~2周、2周以上
E. 3天以内、3天~4周、4周以上

正确答案：C 您选择的答案：

第19题 下列哪项不是诊断脑震荡的依据

A 伤后立即出现意识障碍
B 伤后逆行性遗忘
C 意识障碍期间可有皮肤苍白，血压下降，呼吸浅慢
D 清醒后头痛，恶心，呕吐
E 脑脊液红细胞阳性

正确答案：E 您选择的答案：

第20题 关于头皮裂伤，下列哪项是错误的

A 创口有脑组织外溢，须立即缝合头皮，变开放为闭合损伤

B 处置时着重检查有无颅骨和脑损伤
C 尽早清创缝合
D 清创时限放宽至24小时
E 即使创口不大，出血也较多
正确答案：A 您选择的答案：

第21题 抢救颅内血肿病人，最根本措施是
A 20%甘露醇250ml快速静点
B 气管切开，减轻脑水肿
C 清除血肿
D 人工冬眠及物理降温
E 去骨瓣减压
正确答案：C 您选择的答案：

第22题 头皮裂伤的最长清创时间，是
A 4小时
B 8小时
C 12小时
D 24小时
E 在应用抗生素情况下可延至72小时
正确答案：E 您选择的答案：

第23题 头皮裂伤的处理原则是
A 均需输血抗休克治疗
B 不需特别处理
C 妥善止血、清创、抗感染
D 降颅压治疗
E 加压包扎
正确答案：C 您选择的答案：

第24题 关于凹陷骨折下列哪一项正确
A 均需手术
B 均属开放性骨折
C 均引起颅内压增高
D 压迫脑重要部位引起症状需手术
E 非功能区、小面积不考虑手术
正确答案：D 您选择的答案：

第25题 关于头皮裂伤，错误的是
A 钝性撞击不会发生裂伤
B 急救时应立即包扎止血
C 24小时的裂伤清创后可一期缝合
D 清创后，采用分层缝合为好
E 头皮缺损应予修补
正确答案：A 您选择的答案：

第26题 头皮裂伤的处理原则哪项正确
A 干净的伤口应急诊清创缝合，局部有泥沙等污物时可用油纱填塞，延迟缝合
B 由于头皮容易隐藏污垢、细菌，一般先用油纱填塞，待伤口干净后延迟缝合
C 单纯裂伤一期缝合，复杂伤口延迟缝合
D 只要没有脑脊液漏，所有头皮裂伤都应尽量一期缝合
E 伤口逾时24小时，有明显感染征象，仍应一期清创缝合
正确答案：E 您选择的答案：

第27题 外伤性颅内血肿形成后，其严重性在于
A 由对冲性脑损伤所致广泛的额颞部受累
B 血肿位于白质深部
C 脑膜中动脉受损，出血速度快
D 引起颅内压增高而导致脑疝
E 伴发脑水肿程度
正确答案：D 您选择的答案：

第28题 发现颅骨线形骨折时，应特别注意
A 线形骨折常合并对冲部位血肿
B 线形骨折常合并硬膜下血肿
C 线形骨折常合并骨膜下血肿
D 线形骨折常合并严重脑挫裂伤
E 骨折线通过脑膜血管沟或静脉窦时，应注意有无颅内血肿发生
正确答案：E 您选择的答案：

第29题 下列哪项不是中颅底骨折的表现
A CT示脑室受压、中线结构移位
B 脑脊液鼻漏
C 脑脊液耳漏
D 视神经损伤
E 面、听神经损伤
正确答案：A 您选择的答案：

第30题 外伤后急性脑受压，最可靠的早期临床表现是
A 血压升高，呼吸脉搏变慢

B 头痛，呕吐，视乳头水肿
C 头痛，呕吐，进行性意识障碍
D Cushing反应
E 瞳孔由正常变为不等大
正确答案：C 您选择的答案：

第31题 下列哪项属于原发性脑损伤

A．开放性颅骨骨折
B．脑水肿
C．脑内血肿
D．脑挫裂伤
E．脑疝
正确答案：D 您选择的答案：

第32题 脑干损伤的诊断依据下列哪项不妥

A．昏迷持续超过12小时
B．瞳孔不等大、缩小或多变眼球位置不正或同向凝视
C．脑神经损害加交叉性麻痹或双侧锥体束征或伴有去大脑强直
D．生命体征变化：心血管功能紊乱多在呼吸改变或停止以后出现
E．影像检查多有阳性发现，确诊需要CT检查
正确答案：E 您选择的答案：

第33题 按照Glasgow昏迷分级计分法，重型颅脑损伤为

A．13～15分
B．9～12分
C．3～8分
D．1～2分
E．3～5分
正确答案：C 您选择的答案：

第34题 急性小脑幕上硬膜外血肿，最常见的出血来源是

A 脑膜中静脉
B 脑膜中动脉
C 静脉窦
D 骨折的板障静脉
E 脑表面桥静脉
正确答案：B 您选择的答案：

第35题 脑挫裂伤的临床表现中，下列哪项不符合

A 伤后昏迷持续数小时到数周以上
B 迟发性瞳孔散大而无脑疝表现
C 常有生命体征改变
D 可有肢体瘫痪，失语等
E 腰椎穿刺脑脊液有血液
正确答案：B 您选择的答案：

第36题 有关脑挫裂伤，下列论述哪项正确

A．脑挫裂伤是比脑震荡更严重的原发性脑损伤，伤后均有意识障碍，时间超过30分钟
B．意识障碍可出现中间清醒或好转期
C．只有腰穿证实蛛网膜下腔出血时才能确诊，测压高于正常
D．影像检查多有阳性表现，MRI优于CT，适用于所有情况
E．由于存在脑组织损伤，伤后都有局灶性神经系统症状和体征
正确答案：B 您选择的答案：

第37题 急性硬膜外血肿最常见的出血来源是

A．板障静脉
B．脑膜中动脉
C．脑膜前动脉
D．静脉窦
E．脑膜静脉
正确答案：B 您选择的答案：

第38题 颅底骨折的诊断主要依靠

A．CT的骨窗像
B．MRI的T2加权像
C．临床表现
D．颅底X线平片
E．耳、鼻、喉科检查
正确答案：C 您选择的答案：

第39题 幕上急性硬膜外血肿多见于

A．颞区
B．额顶区
C．顶枕区
D．额极区
E．矢状窦区
正确答案：A 您选择的答案：

第40题 颅底骨折引起的脑脊液漏的手术指征是

A．经久不愈长达2个月以上者

B. 经久不愈长达2周以上者
C. 出现低颅压综合征者
D. 经久不愈长达4周以上者
E. 经久不愈长达4个月以上者
正确答案：D 您选择的答案：

第41题 开放性颅脑损伤最重要的处理措施是

A. 清创
B. 止血
C. 缝合修补硬膜损伤
D. 切除碎骨片
E. 分层缝合头皮
正确答案：C 您选择的答案：

第42题 对慢性硬膜下血肿的处理，下列叙述哪项不对；

A. 钻颅导管闭式引流是一种安全的方法
B. 缓慢、持续引流以便脑膨起
C. 需要开颅切除血肿被膜以利于脑组织膨胀复位
D. 影像学表现与手术治疗病例的临床改善表现可能不一致
E. 某些病例未经手术治疗可自愈
正确答案：C 您选择的答案：

第43题 关于外伤性下视丘损伤，下列哪样是错误的

A. 早期意识障碍
B. 早期锥体束征
C. 高热或低温
D. 消化道出血或穿孔
E. 尿崩症
正确答案：B 您选择的答案：

第44题 诊断颅盖骨折通常依据是

A. 头颅X线摄片
B. 头皮伤痕
C. 局部触诊闻及骨擦音
D. 剧烈头痛伴呕吐
E. 对侧肢体偏瘫
正确答案：A 您选择的答案：

第45题 外伤性颅内血肿的致命因素，是

A. 急性脑受压--脑疝
B. 脑脊液循环梗阻
C. 弥漫性脑水肿
D. 蛛网膜下腔出血
E. 昏迷-肺感染
正确答案：A 您选择的答案：

第46题 颅内血肿量达到下列哪项时即可引起颅内压增高症状

A. 幕上血肿超过40ml，幕下血肿超过10ml
B. 幕上血肿超过35ml，幕下血肿超过10ml
C. 幕上血肿超过20ml，幕下血肿超过15ml
D. 幕上血肿超过10ml，幕下血肿超过30ml
E. 幕上血肿超过20ml，幕下血肿超过10ml
正确答案：E 您选择的答案：

第47题 脑震荡的治疗

A. 不需治疗
B. 脱水治疗
C. 止血治疗
D. 激素治疗
E. 对症治疗
正确答案：E 您选择的答案：

第48题 颅底骨折引起的脑脊液漏时，应禁忌

A. 鼻腔和外耳道清洁护理
B. 无菌棉球填塞鼻腔或外耳道
C. 使用醋氮酰胺
D. 限制液体入量
E. 头高30°卧向患侧
正确答案：B 您选择的答案：

第49题 脑挫裂伤意识障碍下列哪项不正确

A. 伤后立即出现
B. 多在半小时以上
C. 程度和持续时间与脑挫裂伤程度相关
D. 程度和持续时间与脑挫裂伤部位相关
E. 中间清醒期是其特点
正确答案：E 您选择的答案：

第50题 全层头皮撕脱伤下列哪项处理不正确

A. 妥善止血

- B. 尽早清创
- C. 防治休克
- D. 抗感染
- E. 中厚皮片植皮

正确答案：E 您选择的答案：

第51题 下列哪项不属于原发性脑损伤

- A. 脑震荡
- B. 弥漫性轴索损伤
- C. 脑挫裂伤
- D. 脑干损伤
- E. 脑内血肿

正确答案：E 您选择的答案：

第52题 下列哪一项可引起海绵窦症状

- A. 颅盖骨骨折
- B. 前颅底骨折
- C. 中颅底骨折
- D. 后颅窝骨折
- E. 开放性骨折

正确答案：C 您选择的答案：

第53题 诊断颅底骨折最确切的依据是

- A. 头面部受暴力史
- B. 眼睑青紫
- C. X线片示额骨线形骨折
- D. 鼻出血
- E. 脑脊液鼻漏

正确答案：E 您选择的答案：

第54题 颅中窝骨折最易损伤的颅神经是

- A. 嗅神经
- B. 外展神经
- C. 动眼神经
- D. 迷走神经
- E. 面神经

正确答案：E 您选择的答案：

第55题 颅脑损伤伴视神经损伤下列哪项不正确

- A. 伤后立即出现瞳孔散大
- B. 常为前颅窝骨折所致
- C. 直接光反应消失
- D. 间接光反应消失
- E. 间接光反应存在

正确答案：D 您选择的答案：

第56题 急性硬膜下血肿

- A. 病情一般多较重
- B. 好发于额极、颞极及其底面
- C. 可由脑内血肿破至硬脑膜下
- D. 中间清醒期是其特点
- E. 大多由对冲性脑挫裂伤所致

正确答案：D 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第57题 有一名65岁病人，2个月前有头外伤史，现头痛，CT示右额颞顶新月状低密度影像，诊断是

- A. 急性硬膜外血肿
- B. 急性硬膜下血肿
- C. 慢性硬膜下血肿
- D. 脑内血肿
- E. 高血压脑出血

正确答案：C 您选择的答案：

第58题 有一外伤后4小时病人，头痛呕吐，哪项肯定血肿存在

- A. 颞部外伤局部有头皮血肿
- B. 枕部受伤，有软组织肿胀
- C. 伤后立即出现神经功能障碍
- D. 意识障碍进行性加深
- E. 头颅CT检查结果

正确答案：E 您选择的答案：

第59题 有一名30岁车祸头部受伤病人，深昏迷，刺激有去脑强直发作，CT未见颅内血肿及脑挫伤，环池未受压，诊断是

- A. 脑震荡
- B. 脑挫伤
- C. 轴索损伤
- D. 脑干损伤

E 颅底骨折

正确答案：D 您选择的答案：

第60题 对开放性颅脑损伤病人，预防创口和颅内感染的首要措施是

- A 严密观察病情变化
- B 应用广谱抗生素
- C 理疗，改善局部血液循环
- D 加强营养，增强创口愈合能力
- E 早期施清创术

正确答案：E 您选择的答案：

第61题 一颅脑外伤病人，可正确回答问题，可自动睁眼，右侧肢体偏瘫，刺痛可回缩，左侧肢体可随意运动。GCS评分为

- A . 15分
- B . 14分
- C . 13分
- D . 12分
- E . 11分

正确答案：A 您选择的答案：

第62题 男，40岁。汽车上跌下，左枕部着地，出现进行性意识障碍，继以右侧瞳孔散大，诊断是

- A 左枕顶部硬膜外血肿
- B 左额颞硬膜外血肿
- C 左额颞硬膜下血肿
- D 右额颞硬膜外血肿
- E 右额颞硬膜下血肿

正确答案：E 您选择的答案：

第63题 急性硬膜外血肿患者，中间清醒期的长短，主要取决于

- A 原发脑损伤的程度
- B 出血的来源
- C 血肿的部位
- D 血肿形成的速度
- E 血肿的大小

正确答案：D 您选择的答案：

第64题 有一名12岁男孩，患全头型帽状筋膜下血肿，首选的治疗措施是

- A 加压包扎，静点止血药物
- B 穿刺抽血，静点止血药物
- C 待其自行吸收，静点止血药物
- D 穿刺抽血+加压包扎
- E 切开引流+加压包扎

正确答案：D 您选择的答案：

第65题 有一名20岁女性病人，外伤后有血性脑脊液自鼻腔溢出，应采取处置是

- A 鼻腔填塞压迫止血
- B 鼻腔冲洗
- C 给予抗生素治疗
- D 腰穿放血性脑脊液
- E 头低位以利引流

正确答案：C 您选择的答案：

第66题 有一名脑外伤病人，CT示右额颞顶部新月状高密度影像，其诊断为

- A 急性硬膜外血肿
- B 急性硬膜下血肿
- C 慢性硬膜下血肿
- D 脑内血肿
- E 高血压脑出血

正确答案：B 您选择的答案：

第67题 男患，27岁。头部受伤后立即昏迷，五分钟后清醒，三小时后再度昏迷，x线发现颅骨线状骨折，且骨折线越过脑膜中动脉沟，提示为

- A 脑挫伤
- B 急性硬膜外血肿
- C 急性硬膜下血肿
- D 外伤性脑内血肿
- E 脑水肿

正确答案：B 您选择的答案：

第68题 女，50岁。头部棍击伤，无昏迷史及意识障碍，无颅骨骨折，一个月后出现颅内压增高症状，最可能为

- A 慢性硬膜外血肿
- B 多发颅内血肿
- C 慢性硬膜下血肿
- D 急性颅内血肿
- E 脑震荡后遗症

正确答案：C 您选择的答案：

第69题 一病员从汽车上摔下8小时，左枕部着力，昏迷，右侧瞳孔散大，光反射(-)，左侧肢体偏瘫，左侧病理征(+)。诊断首先考虑

- A 左枕部急性硬膜外血肿伴脑疝

B. 左枕部急性硬膜下血肿伴脑疝
C. 左枕部脑挫裂伤伴脑疝
D. 右额颞急性硬膜下血肿伴脑疝
E. 右额颞急性硬膜外血肿伴脑疝
正确答案：D 您选择的答案：

第70题 有一名右顶枕部着地摔伤病人，伤后2小时，左侧瞳孔散大，血肿部位是

- A 右顶枕部
- B 右额颞部
- C 左顶枕部
- D 左额颞部
- E 后颅凹

正确答案：D 您选择的答案：

第71题 有一病人，颅底骨折，合并脑脊液鼻漏，其错误的治疗方法是

- A 肾上腺素纱布填塞鼻腔
- B 抗生素治疗
- C 安静卧床
- D 防止便秘及上呼吸道感染
- E 禁止腰穿

正确答案：A 您选择的答案：

第72题 一病人摔伤头部，左颞部着力，昏迷，左瞳孔散大，X线摄片示左颞骨折线跨过脑膜中动脉。诊断首先考虑

- A. 急性硬膜外血肿
- B. 急性硬膜下血肿
- C. 原发性脑干损伤
- D. 左颞脑挫裂伤
- E. 弥漫性轴索损伤

正确答案：A 您选择的答案：

第73题 重度颅脑损伤深昏迷病人，维持呼吸道通畅，防止缺氧的最有效方法是

- A 维持吸氧
- B 放置通气道
- C 彻底吸痰
- D 气管切开
- E 给予呼吸兴奋剂

正确答案：D 您选择的答案：

第74题 有一名颅底骨折病人，哪项是正确的

- A 血性脑脊液病人，腰穿放脑脊液
- B 脑脊液耳漏，需尽早修补硬膜漏口
- C 伤后视力减退，超过一个月可手术减压
- D 颅底骨折，需手术治疗，以便神经减压
- E 着重观察有无脑损伤，并处理脑脊液漏，神经损伤等

正确答案：E 您选择的答案：

第75题 有一名病人，脑损伤后6小时，意识清，头痛，下列哪项处理原则不可取

- A 意识清，故回家观察
- B 观察意识，瞳孔，生命征等变化
- C 作头颅CT检查
- D 对症处置
- E 向家属交待有迟发性颅内血肿可能

正确答案：A 您选择的答案：

第76题 枕下棒击伤，当即昏迷，双侧瞳孔不等大，双侧肢体肌张力增高，双侧病理征阳性，头颅CT未见明显血肿，最可能的诊断

- A. 脑震荡
- B. 脑挫裂伤
- C. 弥散性轴索损伤
- D. 原发性脑干损伤
- E. 小脑幕切迹疝

正确答案：D 您选择的答案：

第77题 男，47岁，3天前因车祸受伤，3小时前出现右侧肢体活动不利。受伤当日在县医院行CT检查未见异常。此时，最大的可能是

- A. 出现亚急性硬膜下血肿
- B. 迟发性外伤性脑挫裂伤
- C. 因CT质量问题而误诊
- D. 迟发性外伤性脑内血肿
- E. 出现亚急性硬膜外血肿

正确答案：D 您选择的答案：

第78题 女性病人，入院三天，头部受伤后立即昏迷，10分钟后清醒，有呕吐，对受伤情况不能回忆，诊断是

- A 脑震荡
- B 脑挫裂伤
- C 颅内血肿
- D 脑干损伤
- E 脑供血不全

正确答案：A 您选择的答案：

第79题 女，30岁。头部受伤后昏迷半小时，清醒后左侧肢体无力，腰穿血性脑脊液，以后逐渐好转，最可能为

- A 脑震荡
- B 脑挫伤
- C 急性硬膜外血肿
- D 急性硬膜下血肿
- E 脑内血肿

正确答案：B 您选择的答案：

第80题 某男，24岁，因车祸受伤2小时入院。体检：嗜睡，呼唤能睁眼；回答问题有错误，对疼痛刺激能定位。其Glasgow昏迷分级计分应为

- A 12分
- B 15分
- C 10分
- D 9分
- E 5分

正确答案：A 您选择的答案：

第81题 有一名外伤性颅内血肿病人，右侧瞳孔散大，紧急处置首选

- A 头颅CT扫描，明确血肿部位
- B 快速静点甘露醇
- C 尽快钻孔探查血肿
- D 气管切开防止脑缺氧
- E 脑室穿刺放脑脊液

正确答案：B 您选择的答案：

第82题 有一名病人，确诊为脑挫裂伤，哪项不是诊断脑挫裂伤的依据

- A 脑脊液含红细胞
- B 意识障碍超过30分钟
- C 可表现局灶脑损伤体征
- D 脑脊液鼻漏
- E CT有额部点状高密度灶

正确答案：D 您选择的答案：

第83题 有一名脑外伤病人，CT示右额部梭形高密度影像，脑室中线受压移位，其诊断是

- A 脑挫伤
- B 硬膜下血肿
- C 硬膜外血肿
- D 脑内血肿
- E 高血压脑出血

正确答案：C 您选择的答案：

第84题 男患，50岁。2小时前木棒击伤左额部，伤后头痛，呕吐，1小时前意识不清，查体中度昏迷，左瞳散大，右侧肢体病理征(+)，诊断考虑为

- A 颅骨凹陷骨折伴脑疝
- B 硬膜下血肿伴脑疝
- C 硬膜外血肿伴脑疝
- D 脑损伤伴脑疝
- E 原发性脑干损伤

正确答案：C 您选择的答案：

三、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第85-89题

男性患者，头部外伤15小时，当时有昏迷20分钟，3小时前开始神志渐差。查体：刺痛可以睁眼，语言含糊不清，双瞳孔等大、等圆，光反应(+)，刺痛可以定位但左侧肢体无力，左侧病理征(+)。

1. 此患者Glasgow昏迷评分为

- A 12分
- B 10分
- C 8分
- D 6分
- E 4分

2. 最可能的诊断是

- A 脑震荡
- B 脑干损伤
- C 左侧硬膜下血肿
- D 左侧硬膜外血肿
- E 右侧硬膜外血肿

3. 确诊的最佳检查是

- A 头颅CT
- B 头颅X线摄片
- C 头颅MRA
- D 腰穿
- E 脑电图

4. 下列哪项措施不可取

- A 快速静点甘露醇
- B 小壶加速尿
- C 吸氧
- D 腰穿

- E. 保持呼吸道通畅
- 5. 明确血肿后应该采取的治疗是
- A. 保守治疗
- B. 观察
- C. 腰穿
- D. 手术
- E. 输血

正确答案：BEADD 您选择的答案：

第90-92题

有一名45岁女性患者，3小时前车祸头部受伤，伤后立即昏迷，做CT后入院，入院检查中度昏迷，右瞳散大，光反射消失，左上下肢肌张力增高，病理征(+)，左顶枕有直径4.0cm头皮下血肿，CT示右额颞部高密度新月影像

1. 诊断是
- A 右额颞脑挫伤，脑疝
- B 右额颞急性硬膜下血肿，脑疝
- C 右额颞急性硬膜外血肿，脑疝
- D 右额颞急性硬膜下积液，脑疝
- E 右额颞脑内血肿，脑疝
2. 出血来源为
- A 脑膜中动脉
- B 脑表面挫伤小动脉
- C 桥静脉
- D 矢状窦
- E 蛛网膜颗粒
3. 最重要治疗是
- A 冬眠物理降温
- B 气管切开
- C 脱水治疗
- D 止血，预防感染治疗
- E 血肿清除术

正确答案：BBE 您选择的答案：

第93-95题

有一名60岁女性患者，2个半月前有车祸头受伤史，当时有过一过性意识障碍，伤后头痛，逐渐好转，近半个月又出现头痛，越来越重，头颅CT示右额颞顶低密度新月状影像，脑室中线受压移位

1. 诊断是
- A 右额颞顶急性硬膜下血肿
- B 右额颞顶慢性硬膜下血肿
- C 右额颞顶急性硬膜外血肿
- D 右额颞顶慢性硬膜外血肿
- E 右额颞顶硬膜下积液
2. 根本治疗是
- A 冬眠物理降温
- B 止血治疗
- C 预防感染
- D 钻孔冲洗引流术
- E 血肿清除术
3. 术后哪项处理是错误的
- A 0.4g止血芳酸静点
- B 20%甘露醇250ml静点
- C 给予抗生素预防感染
- D 支持疗法
- E 头痛可给予镇痛药物

正确答案：BDB 您选择的答案：

第96-97题

有一名30岁女性患者，2小时前车祸左顶枕部着地，当时有约10分钟意识不清，醒后头痛，左耳流血性脑脊液，四肢活动好，病理征(-)，头颅CT示左顶枕部头皮软组织肿胀

1. 诊断是
- A 脑震荡
- B 脑挫伤，脑脊液耳漏
- C 颅底骨折，脑脊液耳漏
- D 颅骨骨折，脑脊液耳漏
- E 脑干损伤
2. 下列哪项处置是错误的
- A 卧床休息
- B 观察病情
- C 给予止血药物
- D 给予广谱抗生素
- E 左外耳道冲洗

正确答案：CE 您选择的答案：

第98-99题

有一名6岁男孩，3天前右额碰在桌子角上，当时能哭，现右额颞部头皮隆起，局部触之有12cm×12cm波动区，无神经系统定位症状，头颅X片示右额颞头皮肿胀

1. 诊断是
- A 头皮挫伤
- B 皮下血肿
- C 骨膜下血肿
- D 帽状筋膜下血肿

- E 头皮下积液
- 2. 处置应该是
- A 加压包扎
- B 局部不作处置
- C 理疗, 促其吸收
- D 穿刺抽血+加压包扎
- E 切开引流+加压包扎

正确答案: DD 您选择的答案:

第100-102题

男性, 65岁, 6周前曾有轻微头部外伤, 近1周头痛伴渐进性右侧肢体无力

- 1. 最可能的诊断是
- A. 亚急性硬膜下血肿
- B. 亚急性硬膜外血肿
- C. 慢性硬膜下血肿
- D. 慢性硬膜外血肿
- E. 急性硬膜下血肿
- 2. 为确定诊断首选哪项检查
- A. 头颅X线检查
- B. 眼底
- C. 神经系统检查
- D. 头颅CT
- E. 腰穿
- 3. 若确定为颅内血肿, 最适合的治疗方法是
- A. 脱水降颅压
- B. 神经营养治疗
- C. 功能锻炼
- D. 观察生命体征、神志、瞳孔变化
- E. 手术治疗

正确答案: CDE 您选择的答案:

第103-105题

有一名30岁男性患者, 车祸右额颞部着地, 伤后意识不清, 约半小时后清醒, 醒后头痛, 有呕吐, 3小时后又出现意识障碍, 正侧位颅片示右颞线状骨折, 骨折线跨过脑膜中动脉沟, CT示右颞梭形高密度形, 脑室中线受压移位, 入院时右瞳孔散大

- 1. 诊断是
- A 右颞硬膜下血肿, 脑疝
- B 右颞硬膜外血肿, 脑疝
- C 右颞脑挫伤, 脑疝
- D 右颞脑内血肿, 脑疝
- E 蛛网膜下腔出血, 脑疝
- 2. 首先应采取措施是
- A 0. 4g止血芳酸静点
- B 20%甘露醇静点(250ml)
- C 冬眠物理降温
- D 气管切开
- E 血肿清除术
- 3. 治疗的根本措施是
- A 0. 4g止血芳酸静点
- B 20%甘露醇250ml 静点
- C 冬眠物理降温
- D 气管切开
- E 血肿清除术

正确答案: BBE 您选择的答案:

第106-108题

成年男性, 车祸外伤1小时, 左颞部着力, 当时有短暂昏迷, 对受伤情况不能回忆。查体: 神志清楚, 神经系统无阳性体征。

- 1. 初步诊断
- A. 脑震荡
- B. 脑挫裂伤
- C. 脑供血不足
- D. 脑水肿
- E. 脑疝
- 2. 若X线摄片提示左颞骨折线通过脑膜中动脉沟, 应警惕
- A. 硬膜外血肿
- B. 硬膜下血肿
- C. 头皮血肿
- D. 脑室内血肿
- E. 脑内血肿
- 3. 若伤后5小时出现渐进性意识障碍, 应首选检查
- A. 脑血管造影
- B. 腰穿
- C. 头颅X线摄片
- D. 头颅CT
- E. 放射性核素扫描

正确答案: AAD 您选择的答案:

第109-111题

有一名16岁男孩, 2小时前3楼掉下一花盆击伤左顶部, 当时有短暂意识障碍, 左顶部有1. 5cm长头皮不全裂伤, 局部

头皮肿胀，正侧切位颅片示左顶1.0cm凹陷骨折，头颅CT示左顶凹陷骨折，局部头皮肿胀

1. 诊断是

- A 脑震荡
- B 头皮裂伤
- C 开放凹陷性颅骨骨折
- D 闭合性凹陷性颅骨骨折
- E 头皮血肿

2. 下列哪项处理是错误的

- A 不全裂伤头皮有活动出血应止血
- B 应行凹陷骨折整复
- C 给予抗生素
- D 观察后无颅内血肿形成
- E 加压包扎

3. 凹陷骨折的整复指征，哪项是错误的

- A 前额部深0.6cm
- B 左额后深0.7cm
- C 左顶部深0.6cm
- D 右顶部深1.0cm
- E 左顶部深1.0cm

正确答案：DEC 您选择的答案：

四、A4型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第112-116题

男性，24岁，施工时因塌方受伤，被同事从土堆中救出后送入医院。

1. 接诊早期应特别注意

- A. 不要遗忘神经系统检查项目
- D. 有无抽风病史
- C. 首先行胸部平片检查
- D. 口腔内有无异物影响呼吸
- E. 头部平片除外颅骨骨折

2. 如清除口腔异物后，病人仍有呼吸困难。发现病人处于浅昏迷状态，以下哪项检查应稍后再做

- A. 测血压、脉搏
- B. 胸部望诊，观察呼吸节律及胸廓运动
- C. CT扫描除外颅内血肿
- D. 检查病人的两侧瞳孔大小及对光反应
- E. 胸部叩诊及呼吸音的双侧比较

3. 若入院第2天，病人的意识状况恶化，呈深昏迷状态。双侧眼球分离；双侧瞳孔直径<2mm，对光反射迟钝；压眶时可

见双上肢内旋伸直及双下肢强直反应；双足Babinski征阳性。矛盾呼吸仍然存在。肺部听诊可闻及痰鸣音。决定行气管

切开术和呼吸机辅助呼吸，其目的与下述哪项无关

- A. 保持呼吸道通畅，利于吸痰
- B. 有利于减轻脑干的继发损伤
- C. 可用于固定多发多根肋骨骨折，纠正矛盾呼吸
- D. 有利于酸碱平衡
- E. 增强呼吸道对感染的抵抗力
- 4. 有关此病人脑干损伤诊断是否成立的论述哪项正确
- B. 压眶时可见四肢运动，说明对意识状态的判断不对
- C. 缺乏MRI检查，目前诊断脑干损伤的证据不充分
- D. 呈去大脑强直状态，已用呼吸机辅助呼吸，应诊断为脑死亡
- E. 根据现有临床表现，脑干损伤的诊断成立
- 5. 目前病人的临床表现可能与使用镇静剂有关

若治疗2个月后，病人的血压、脉搏、呼吸稳定，已脱离呼吸机。鼻饲饮食。偶有自动睁眼，但无视反射。双侧瞳

孔直径3~5mm，对光反射存在，双足Babinski征阳性。按照Glasgow结果分级，此病人应为

- A. V级
- B. 级
- C. 级
- D. 级
- E. 以上都不是

正确答案：DCEDE 您选择的答案：

五、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第117-118题

- A. 快速静点甘露醇
- B. 手术清除血肿
- C. 气管切开
- D. CT检查
- E. 腰穿

1. 颅内血肿脑疝病人的急救措施

2. 颅内血肿脑疝病人的根本治疗

正确答案：AB 您选择的答案：

第119-122题

- A. 搏动性突眼
 - B. 中间清醒期
 - C. 视神经乳头水肿
 - D. 腰穿呈血性脑脊液
 - E. 两侧瞳孔不等大
 - 1. 硬膜外血肿特征
 - 2. 颅内压增高的客观体征
 - 3. 颈内动脉海绵窦瘘的典型症状
 - 4. 可作为脑挫裂伤的诊断依据
- 正确答案：BCAD 您选择的答案：

第123-126题

- A. 伤后无昏迷，3小时后意识障碍
 - B. 伤后啼哭，抽搐
 - C. 伤后立即昏迷，伴去脑强直发作
 - D. 伤后昏迷，片刻后清醒
 - E. 伤后浅昏迷，脑脊液血性
 - 1. 脑震荡
 - 2. 原发性脑干损伤
 - 3. 脑挫伤
 - 4. 急性硬膜外血肿
- 正确答案：DCEA 您选择的答案：

第127-129题

- A. 颅前窝骨折
 - B. 开放性骨折
 - C. 线形骨折
 - D. 生长性骨折
 - E. 颅中窝骨折
 - 1. 发生于小儿的是
 - 2. Battle征是
 - 3. "熊猫眼"征是
- 正确答案：DEA 您选择的答案：

第130-132题

- A. X线颅片
 - B. 脑电图
 - C. 脑血管造影
 - D. CT
 - E. MRI
 - 1. 确定有无颅骨骨折
 - 2. 蛛网膜下腔出血病因诊断
 - 3. 颅内肿瘤的诊断
- 正确答案：ACD 您选择的答案：

第133-136题

- A. 熊猫眼征
 - B. 乳突部皮下瘀血
 - C. 面神经损伤
 - D. 腰穿脑脊液呈血性
 - E. 逆行性遗忘
 - 1. 前颅窝骨折常出现
 - 2. 后颅窝骨折常出现
 - 3. 脑挫裂伤常出现
 - 4. 脑震荡常出现
- 正确答案：ABDE 您选择的答案：

第137-139题

- A. 鼻流血
 - B. 双眼睑皮下青紫，逐渐加重
 - C. 乳突下或咽后壁粘膜下瘀血
 - D. 脑脊液耳漏
 - E. 颞部头皮肿胀瘀血
 - 1. 前颅凹骨折
 - 2. 中颅凹骨折
 - 3. 后颅凹骨折
- 正确答案：BDC 您选择的答案：

第140-142题

- A. 伤后3小时内出现症状
 - B. 伤后3天内出现症状
 - C. 伤后3天~3周内出现症状
 - D. 伤后3周后出现症状
 - E. 伤后3个月后出现症状
 - 1. 急性颅内血肿指
 - 2. 亚急性颅内血肿指
 - 3. 慢性颅内血肿指
- 正确答案：BCD 您选择的答案：

习题集 外科学 脑疝

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 枕骨大孔疝病人呼吸衰竭时抢救措施首先应

- A. 气管插管
- B. 气管切开
- C. 脱水降颅压
- D. 明确脑疝的原因
- E. 手术切除病灶

正确答案：A 您选择的答案：

第2题 脑疝病人最有效的脱水药是

- A. 20%甘露醇
- B. 静脉用速尿(呋塞夫)
- C. 激素
- D. 固利压
- E. 山梨醇

正确答案：A 您选择的答案：

第3题 抢救幕上脑疝时应首选(成人)

- A. 气管切开
- B. 20%甘露醇250ml快速静点
- C. 尽快行疝侧去骨瓣减压
- D. 快速行脑室穿刺外引流
- E. 以上全不是

正确答案：B 您选择的答案：

第4题 脑疝确诊后最先采取的治疗措施应是

- A. 立即钻孔探查
- B. 立即静脉输给降颅压药物
- C. 立即行CT检查
- D. 立即行MRI检查
- E. 立即行脑室穿刺引流脑脊液

正确答案：B 您选择的答案：

第5题 脑疝发生的原因是

- A. 眼压增高
- B. 颅内压增高的中期
- C. 颅内压增高的晚期
- D. 腰穿诱发
- E. 排便困难诱发

正确答案：C 您选择的答案：

第6题 枕骨大孔疝与小脑幕裂孔疝主要临床表现差别在于

- A. 剧烈头痛
- B. 频繁呕吐
- C. 烦躁不安
- D. 血压升高
- E. 早期发生呼吸骤停

正确答案：E 您选择的答案：

第7题 小脑幕切迹疝同侧瞳孔散大是因为

- A. 同侧动眼神经受压
- B. 对侧动眼神经受压
- C. 双侧动眼神经受压
- D. 原发病灶侵犯动眼神经
- E. 视神经受压

正确答案：A 您选择的答案：

第8题 脑疝抢救措施首先是

- A. 吸氧
- B. 向家属交代病情
- C. 脱水降颅压(静脉推注高渗脱水剂)
- D. 明确脑疝的原因
- E. 手术切除病灶

正确答案：C 您选择的答案：

第9题 脑疝发生后下列哪项措施是禁忌的

- A. 立即静滴甘露醇
- B. 保持呼吸道通畅
- C. 积极明确病因，尽早去除病因
- D. 脑室穿刺引流脑脊液
- E. 腰椎穿刺引流脑脊液

正确答案：E 您选择的答案：

第10题 哪一项不是枕大孔疝的常见病变

- A. 大脑半球肿瘤

- B 小脑半球星形细胞瘤
- C 四脑室室管膜瘤
- D 听神经瘤
- E 脑干胶质瘤

正确答案：A 您选择的答案：

第11题 哪一项不是小脑幕裂孔疝常见的症状

- A 意识障碍
- B 一侧面神经麻痹
- C 一侧动眼神经麻痹
- D 剧烈头痛，频繁呕吐
- E 血压增高

正确答案：B 您选择的答案：

第12题 幕上急性硬膜外血肿引起再次昏迷的主要原因是

- A 脑水肿
- B 脑血管痉挛
- C 脑干挫裂伤
- D 小脑幕切迹疝
- E 枕大孔疝

正确答案：D 您选择的答案：

第13题 小脑幕裂孔疝时，疝入小脑幕裂孔的组织是

- A 额叶内侧
- B 颞叶沟回
- C 顶下小叶
- D 枕叶
- E 小脑扁桃体

正确答案：B 您选择的答案：

第14题 枕骨大孔疝内容物是

- A 海马钩
- B 扣带回
- C 脑干
- D 小脑扁桃体
- E 舌下神经

正确答案：D 您选择的答案：

第15题 形成脑疝的根本条件是

- A 剧烈头痛，频繁呕吐
- B 过量过快补液
- C 腰椎穿刺放脑脊液
- D 高压灌肠
- E 颅内各分腔压力不均衡

正确答案：E 您选择的答案：

第16题 小脑幕裂孔疝致一侧瞳孔散大的原因是

- A 动眼神经核受压
- B 动眼神经受压
- C 疝侧中脑受压
- D 疝侧桥脑受压
- E 疝侧延髓受压

正确答案：B 您选择的答案：

第17题 枕骨大孔疝的临床表现是

- A 意识丧失
- B 中枢性呼吸衰竭
- C 同侧瞳孔散大
- D 双侧瞳孔缩小
- E 癫痫发作

正确答案：B 您选择的答案：

第18题 枕大孔疝与小脑幕切迹疝的主要鉴别点是

- A 剧烈头痛
- B 早期发生呼吸骤停
- C 频繁呕吐
- D 烦躁不安
- E 血压下降

正确答案：B 您选择的答案：

第19题 抢救枕骨大孔疝(脑室系统扩大者)最有效的急救措施是

- A 20%甘露醇250ml 快速静点
- B 尽快行开颅减压术
- C 快速颅内钻孔穿刺脑室额角，行脑脊液外引流术
- D 快速静点地塞米松20mg
- E 高压氧仓治疗

正确答案：C 您选择的答案：

第20题 最易形成小脑幕裂孔疝的是

- A 额叶肿瘤

- B 颞叶肿瘤
- C 顶叶肿瘤
- D 枕叶肿瘤
- E 小脑肿瘤

正确答案：B 您选择的答案：

第21题 小脑幕切迹疝致对侧锥体束征是因为

- A．疝内容物压迫脑干
- B．疝内容物压迫大脑脚
- C．病灶压迫大脑皮层
- D．病变压迫导水管
- E．病变压迫小脑半球

正确答案：B 您选择的答案：

第22题 小脑幕裂孔疝与枕骨大孔疝根本区别是

- A 剧烈头痛
- B 频繁呕吐
- C 意识障碍发生较早
- D 呼吸骤停发生较早
- E 血压、脉搏、呼吸改变

正确答案：C 您选择的答案：

第23题 哪一面不是枕大孔疝的常见症状

- A 剧烈头痛，频繁呕吐
- B 颈强
- C 早期出现一侧瞳孔散大
- D 意识障碍
- E 呼吸骤停发生早

正确答案：C 您选择的答案：

第24题 小脑幕切迹中通过的是

- A．小脑
- B．中脑
- C．延髓
- D．脑桥
- E．丘脑

正确答案：B 您选择的答案：

第25题 小脑幕切迹疝常见原因

- A．幕上一侧占位性病变
- B．小脑幕下占位性病变
- C．脑室内占位性病变
- D．脑积水
- E．广泛脑水肿

正确答案：A 您选择的答案：

第26题 小脑幕切迹疝疝内容物是

- A．海马钩
- B．扣带回
- C．大脑脚
- D．动眼神经
- E．脑干

正确答案：A 您选择的答案：

第27题 枕骨大孔疝，常常是由于下列脑组织的哪一部分疝出枕大孔

- A 小脑蚓部
- B 大脑扣带回
- C 顶下小叶
- D 颞叶沟回
- E 小脑扁桃体

正确答案：E 您选择的答案：

第28题 脑疝常见的类型是

- A．枕骨大孔疝
- B．小脑幕切迹疝
- C．小脑幕切迹上疝
- D．大脑镰下疝
- E．穿颅疝

正确答案：A 您选择的答案：

第29题 小脑幕切迹疝的典型临床表现是

- A．头痛、呕吐、突然呼吸衰竭
- B．昏迷、病变对侧瞳孔扩大、对侧偏瘫
- C．昏迷、病变对侧瞳孔扩大、同侧偏瘫
- D．昏迷、病变同侧瞳孔扩大、对侧偏瘫
- E．昏迷、病变对侧瞳孔先小后大、同侧偏瘫

正确答案：D 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第30题 有一耳源性脑脓肿病人，CT证实为右颞脓肿，脓肿腔直径5.5cm，出现昏迷，右瞳散大，采取最佳措施是

- A 快速静点甘露醇
- B 快速静点甘露醇，并行右颞肌下减压术
- C 快速静点甘露醇，并行右颞脓肿穿刺抽脓
- D 快速静点甘露醇，并行双侧颞肌下减压术
- E 立即行脓肿切除术

正确答案：C 您选择的答案：

第31题 有一名病人，患脑肿瘤，已形成枕骨大孔疝，可能是什么肿瘤

- A 额叶肿瘤
- B 颞叶肿瘤
- C 顶叶肿瘤
- D 枕叶肿瘤
- E 小脑肿瘤

正确答案：E 您选择的答案：

第32题 有一名确诊为小脑扁桃体疝的病人，下列哪些症状不是常见症状

- A 剧烈头痛，频繁呕吐
- B 颈强
- C 早期出现一侧瞳孔散大
- D 意识障碍
- E 呼吸骤停发生早

正确答案：C 您选择的答案：

第33题 颅内压增高病人，腰穿放脑脊液后，突然呼吸停止，其原因是

- A 小脑扁桃体疝
- B 颞叶海马钩回疝
- C 脑室系统出血
- D 颅内压过低
- E 脑血管意外

正确答案：A 您选择的答案：

第34题 后颅凹占位病人，发生脑危象时，最快而有效的急救措施是

- A 静脉快速静点甘露醇
- B 尽快切除后颅凹占位病变
- C 立即行后颅凹减压术
- D 快速行脑室穿刺，脑脊液引流术
- E 立即行冬眠物理降温治疗

正确答案：D 您选择的答案：

第35题 患儿因脑积水颅内压增高，入院后，突然出现剧烈头痛，呕吐后昏迷，此时最有效的措施是

- A 快速静点甘露醇
- B 急行气管切开术
- C 立即行侧脑室穿刺引流术
- D 高压氧舱治疗
- E 急行开颅去骨瓣减压术

正确答案：C 您选择的答案：

第36题 有一名患者，已发生小脑幕切迹疝，颅压急剧增高，病情急转直下，其主要原因是

- A 中脑受压，脑脊液循环受阻
- B 严重脑缺氧
- C 严重脑水肿
- D 呼吸循环紊乱
- E 延髓受压

正确答案：A 您选择的答案：

第37题 有一名枕骨大孔疝病人，其诊断要点是

- A 昏迷，患侧瞳孔散大，对侧肢体偏瘫
- B 四肢共济障碍
- C 四肢瘫痪
- D 去脑强直发作
- E 呼吸功能障碍早于意识障碍

正确答案：E 您选择的答案：

三、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第38-40题

有一名45岁女患，车祸头部受伤，伤后即昏迷，1小时后入院时，中度昏迷，右侧瞳孔散大，光反射消失，左上肢病理征(+)。

1. 首先采取措施是

- A 给予止血药物
- B 20%甘露醇250ml静点
- C 给予抗生素预防感染
- D 地塞米松20mg静点
- E 给予呼吸兴奋剂

2. 采取检查为

- A X线颅片
 - B 脑电图
 - C 脑血管造影
 - D CT
 - E ECT
3. 根本治疗措施为
- A 冬眠物理降温
 - B 脱水治疗
 - C 止血，预防感染治疗
 - D 气管切开
 - E 血肿清除术

正确答案：BDE 您选择的答案：

第41-43题

一头部外伤1天的病人，在住院观察期间，出现剧烈头痛，伴呕吐，并进行性加重，查体：面色苍白，躁动，意识朦胧，颈抗(+)，左瞳孔直径0.5cm右瞳孔直径0.3cm，左瞳孔光反射(-)，右瞳孔光反射(+ +)，右侧肢体少动，右Babinski's sign(+)，X线平片左颞有线形骨折

1. 首先应考虑的诊断是
- A. 外伤性颅内血肿致小脑幕切迹疝
 - B. 蛛网膜下腔出血
 - C. 高血压脑出血
 - D. 脑梗塞
 - E. 原发性脑干损伤
2. 紧急采取的措施，除外哪一项
- A. 保持呼吸道通畅
 - B. 迅速静滴20%甘露醇降颅压
 - C. 急诊CT检查明确诊断
 - D. 腰穿明确颅压
 - E. 积极行开颅术前准备
3. 首选的辅助检查
- A. MRI
 - B. CT
 - C. MBA
 - D. 核素扫描
 - E. B超

正确答案：ADB 您选择的答案：

四、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第44-47题

- A 头痛，呕吐，视乳头水肿
 - B 呼吸骤停
 - C 昏迷，患侧瞳孔散大，对侧肢体偏瘫
 - D 血压升高，脉搏变慢，出现潮式呼吸
 - E 烦躁，高热，去脑强直发作
1. 枕骨大孔疝
2. 小脑幕裂孔疝
3. 库欣反应
4. 颅压高三主征

正确答案：BCDA 您选择的答案：

习题集 外科学 颅内压增高

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 颅内压增高“三主症”包括

- A 偏瘫，偏盲，偏身感觉障碍
- B 头痛，呕吐，偏瘫
- C 头痛，抽搐，意识障碍
- D 头痛，呕吐，视乳头水肿
- E 头痛，呕吐，血压增高

正确答案：D 您选择的答案：

第2题 视乳头水肿在临床诊断颅内病变的意义是

- A 出现视乳头水肿，可肯定颅内占位病变
- B 无视乳头水肿，可排除颅内占位病变
- C 视乳头水肿，对颅内占位病变性质有鉴别价值
- D 无视乳头水肿，可排除颅内压增高
- E 视乳头水肿，是颅内压增高的重要体征之一

正确答案：E 您选择的答案：

第3题 颅内压增高病人的一般处理，下列哪项是错误的

- A 抬高床头
- B 保持呼吸道通畅
- C 高位灌肠以疏通大便
- D 吸氧
- E 观察生命体征变化

正确答案：C 您选择的答案：

第4题 诊断颅内压增高可靠依据是

- A 视乳头水肿
- B 剧烈头痛
- C 频繁呕吐
- D 癫痫发作
- E 外展神经麻痹

正确答案：A 您选择的答案：

第5题 颅内压增高的三主征是

- A 头昏、呕吐、偏瘫
- B 头痛、呕吐、头昏
- C 头痛、呕吐、视乳头水肿
- D 恶心、呕吐、视乳头水肿
- E 头昏、呕吐、视乳头水肿

正确答案：C 您选择的答案：

第6题 下列疾病均可导致颅内压增高，除了

- A 脑肿瘤
- B 狭颅症
- C 颅脑外伤
- D 脑积水
- E 动脉硬化性脑萎缩

正确答案：E 您选择的答案：

第7题 关于颅内压增高，下列哪项是错误的

- A 喷射性呕吐多见
- B 后期常伴视力障碍
- C 阵发性头痛是主要症状之一
- D 某些病例可始终不出现“三主症”
- E 在婴幼儿头痛出现较早且较重

正确答案：E 您选择的答案：

第8题 哪一项不是颅内压增高所致头颅X线平片特点

- A 颅缝裂开
- B 枕大孔扩大
- C 脑回压迹加深
- D 蝶鞍扩大，前后床突骨质吸收
- E 蛛网膜颗粒加深

正确答案：B 您选择的答案：

第9题 慢性颅内压增高的主要临床表现是

- A 头痛，呕吐，肢体运动障碍
- B 头痛，瞳孔异常和肢体运动障碍
- C 血压，呼吸和脉搏改变
- D 头痛，呕吐，视乳头水肿
- E 进行性意识障碍

正确答案：D 您选择的答案：

第10题 降低颅内压增高的最有效易行的方法是

- A 腰穿大量引流脑脊液

B 施行人工冬眠物理降温
C 进行控制性过度换气
D 使用脱水剂或利尿剂
E 将病员置于高压氧仓内
正确答案：D 您选择的答案：

第11题 用20%甘露醇降低颅内压的正确方法是

A . 快速静推
B . 快速静滴
C . 中速静滴
D . 缓慢静滴
E . 肌肉注射
正确答案：B 您选择的答案：

第12题 颅内压增高的容积代偿(即空间代偿)主要依靠

A 脑组织的压缩
B 颅腔的扩大
C 脑脊液被排出颅外
D 血压的下降
E 脑血流量减少
正确答案：C 您选择的答案：

第13题 除哪项外均为腰椎穿刺的禁忌证

A . 后颅窝占位性病变
B . 腰椎穿刺处局部感染或脊柱结核
C . 蛛网膜下腔出血
D . 休克
E . 败血症
正确答案：C 您选择的答案：

第14题 颅内压增高的重要的客观体征是

A . 层神经麻痹
B . 视力减退
C . 视野缩小
D . 双侧视乳头水肿
E . 头皮静脉怒张
正确答案：D 您选择的答案：

第15题 排除颅内占位病变，哪一项是准确的

A 无视乳头水肿
B 颅平片无颅内压增高表现
C 叩诊小儿头颅无破壶音
D 脑超声中线波无移位
E CT扫描无异常改变
正确答案：E 您选择的答案：

第16题 对于严重颅内压增高病人，首选的降颅压药物是

A . 50%甘油盐水溶液
B . 地塞米松
C . 乙酰唑胺
D . 20%甘露醇
E . 双氢克尿噻
正确答案：D 您选择的答案：

第17题 易早期出现颅压高症状的是

A 额叶肿瘤
B 颞叶肿瘤
C 顶叶肿瘤
D 枕叶肿瘤
E 第四脑肿瘤
正确答案：E 您选择的答案：

第18题 颅内压增高引起最严重的后果是

A . 血管源性脑水肿
B . 胃肠功能紊乱
C . Cushing反应
D . 脑疝
E . 细胞毒性脑水肿
正确答案：D 您选择的答案：

第19题 正常成人颅内压增高是指颅内压持续超过

A . 2 . 5kPa(250mmH2O)
B . 1 . 5kPa(150mmH2O)
C . 3 . 0kPa(300mmH2O)
D . 1 . 9kPa(190mmH2O)
E . 2 . 0kPa(200mmH2O)
正确答案：E 您选择的答案：

第20题 急性颅内压增高的典型表现是

A 剧烈头痛，频繁呕吐

B Cushing征
C 意识障碍加深
D 去大脑强直发作
E X线片示脑回压迹加深
正确答案：B 您选择的答案：

第21题 正常成人的颅内压为：
A . 0 . 5 ~ 1 . 0kPa (50 ~ 100mmH2O)
B . 0 . 7 ~ 2 . 0kPa (70 ~ 200mmH2O)
C . 1 . 0 ~ 1 . 5kPa (100 ~ 150mmH2O)
D . 0 . 8 ~ 2 . 1kPa (80 ~ 210mmH2O)
E . 1 . 0 ~ 2 . 5kPa (100 ~ 250mmH2O)
正确答案：B 您选择的答案：

第22题 治疗脑水肿，下列药物哪一种效果较好，最常用
A 50%葡萄糖
B 30%尿素
C 25%山梨醇
D 20%甘露醇
E 浓缩血清白蛋白
正确答案：D 您选择的答案：

第23题 颅压高所致颅神经麻痹容易出现的是
A 动眼N
B 滑车N
C 外展N
D 面N
E 听N
正确答案：C 您选择的答案：

第24题 慢性颅内压增高的眼底改变是
A . 视神经萎缩
B . 视乳头炎
C . 视乳头水肿
D . 视网膜静脉迂曲
E . 视网膜动脉反光增强
正确答案：C 您选择的答案：

第25题 有明显颅内压增高症状和体征的病人哪项检查应慎重
A . 头颅X线摄片
B . 腰穿
C . 头颅CT扫描
D . MRI
E . 放射性核素扫描
正确答案：B 您选择的答案：

第26题 急性颅内压增高病人的生命体征变化是
A . 血压下降、脉搏变快、呼吸浅快
B . 血压下降、脉搏变慢、呼吸深慢
C . 血压升高、脉搏变慢、呼吸深慢
D . 血压升高、脉搏变快、呼吸浅快
E . 以上均不对
正确答案：C 您选择的答案：

第27题 下列哪项不是腰椎穿刺术的适应证
A . 脑疝
B . 区别阻塞性和非阻塞性脊髓病变
C . 做脑或脊髓造影
D . 测定颅内压力
E . 鞘内注射药物
正确答案：A 您选择的答案：

第28题 处理颅内压增高，哪一项是错误的
A 频繁呕吐时宜禁食
B 限制输液量及速度
C 便秘4天以上给予高位，高压灌肠
D 静点地塞米松
E 早期行病因治疗
正确答案：C 您选择的答案：

第29题 诊断颅内占位病变，无痛、安全、准确的方法是
A 头颅CT
B 头颅X线平片
C 脑电图
D 脑血管造影
E 正气脑造影
正确答案：A 您选择的答案：

第30题 降低颅压的最有效药物是
A . 25%山梨醇

- B. 20%甘露醇
- C. 复方甘油盐水
- D. 速尿
- E. 10%葡萄糖液

正确答案：B 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第31题 有一名颅内压增高病人，持续颅内压增高导致病理生理紊乱，但应除外

- A 脑血管自动调节功能失调
- B 胃肠道出血，溃疡
- C 脑疝形成
- D 肺水肿
- E 早期血压下降，脉搏变快，呼吸增快

正确答案：E 您选择的答案：

第32题 颅内压增高病人昏迷，治疗呼吸道梗阻最有效措施是

- A 通过鼻腔口腔导管吸痰
- B 气管插管，呼吸机辅助呼吸
- C 环甲膜穿刺
- D 气管切开
- E 用开口器侧卧位引流

正确答案：D 您选择的答案：

第33题 有一颅内压增高病人，其原理是

- A 颅内新生物生长
- B 脑积水
- C 颅腔内有出血
- D 颅腔内有感染
- E 颅内压的生理调节功能失调

正确答案：E 您选择的答案：

第34题 有一名颅内压增高病人，哪项不是其头颅x线平片的改变

- A 颅缝增宽
- B 脑回压迹增多
- C 蝶鞍扩大，前后床突骨质吸收
- D 蛛网膜颗粒压迹扩大
- E 一侧或双侧内听道扩大

正确答案：E 您选择的答案：

第35题 颅内压增高病人的一般处理中，下列哪项是不正确的

- A 注意观察意识，瞳孔及生命体征的变化
- B 频繁呕吐时，予以禁食，用脱水剂
- C 意识不清痰多者作气管切开吸痰
- D 作高位灌肠以疏通大便
- E 静脉补液以保持尿量

正确答案：D 您选择的答案：

第36题 有一名颅内压增高病人，病情有加剧表现，处理的关键措施是

- A 头颅CT，明确病变的性质和部位
- B 安静卧床，头高30度
- C 保持便通
- D 20%甘露醇250ml，一日二次，静点
- E 限制水，盐入量

正确答案：A 您选择的答案：

三、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第37-38题

有一名40岁男患，病程4个月，右侧肢体无力发病，逐渐出现头痛和语言笨拙，入院检查眼底视乳头水肿，不全运动失语，右上下肢肌力 级，右下肢病理征(+)

1. 考虑病变部位是

- A 右额部
- B 左额部
- C 右顶部
- D 左顶部
- E 右小脑

2. 采用的辅助检查是

- A X线颅平
- B 脑电图
- C 脑血管造影
- D CT
- E ECT

正确答案：BD 您选择的答案：

第39-41题

有一名30岁男患，病程4个月，头痛发病，入院前出现左侧肢体无力和呕吐，入院检查，意识清，眼底视乳头水肿，左上下肢肌力 级，腱反射活跃，病理征(+)

1. 诊断是

- A 脑梗死
- B 脑出血
- C 蛛网膜下腔出血
- D 脑水肿
- E 颅内压增高

2. 应采用的检查，是

- A X线颅片
- B 脑电图
- C 脑血管造影
- D CT
- E ECT

3. 根本治疗原则，是

- A 脱水治疗
- B 给予镇痛剂
- C 冬眠物理降温
- D 去病因治疗
- E 去骨开减压

正确答案：EDD 您选择的答案：

第42-45题

男性，27岁，头痛2个月，加重伴呕吐及左侧肢体无力1周。体检：双侧视乳头水肿，左侧鼻唇沟变浅，左侧肢体肌力 级，左下肢可引出Babinski 征。

1. 首选的检查项目是

- A. 头颅X线片
- B. 头颅CT扫描
- C. 脑电图
- D. 经颅多普勒超声
- E. 脑血管造影

2. 最可能的定位诊断是

- A. 大脑半球
- B. 小脑半球
- C. 脑室系统
- D. 脑干
- E. 蝶鞍区

3. 最可能的定性诊断是

- A. 脑脓肿
- B. 脑动脉瘤
- C. 脑囊虫
- D. 脑肿瘤
- E. 脑积水

4. 降低颅压的措施中，哪项是错误的

- A. 腰穿大量放液
- B. 静点甘露醇
- C. 静点地塞米松
- D. 吸氧
- E. 限制入量

正确答案：BADA 您选择的答案：

第46-49题

男，40岁，间断头痛1年，有时呕吐，伴双眼视力下降，查体发现双眼视乳头边缘模糊、隆起，且有散在点状出血，余(-)。

1. 对此病人的初步印象是

- A. 视神经炎
- B. 垂体瘤
- C. 颅内压增高
- D. 重症高血压
- E. 神经性头痛

2. 为查找病因，首选的辅助检查是

- A. 头颅CT扫描
- B. MRI
- C. 头颅X线摄片
- D. 腰穿
- E. 脑血管造影

3. 若影像检查未发现异常应采取的措施是

- A. 观察对症
- B. 去骨瓣减压
- C. 腰穿采取CSF化验并测压
- D. 定期复查CT
- E. 定期复查MRI

4. 影像检查未发现异常时，如腰穿CSF化验正常，而颅压为3.9kPa(400mmH₂O)，应诊断为

- A. 脑血管痉挛
- B. 梗阻性脑积水
- C. 良性高颅压
- D. 脑膜炎
- E. 脑水肿

正确答案：CACC 您选择的答案：

四、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第50-54题

A．血管源性脑水肿

B．细胞毒性脑水肿

C．低渗性脑水肿

D．间质性脑水肿

E．脑肿胀

1．严重脑缺血、脑缺氧

2．脑积水

3．脑肿瘤

4．丘脑下部损伤致脑血管自动调节功能障碍

5．低钠血症

正确答案：BDAEC 您选择的答案：

习题集 外科学 泌尿、男生殖系统先天性畸形及其他疾病

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 关于精索静脉曲张导致睾丸功能受损，下列哪项是错误的

- A．使睾丸周围温度升高，曲细精管发生变性
 - B．左肾上腺静脉血反流睾丸，生精组织接触高浓度皮质醇、儿茶酚胺和前列腺素
 - C．睾丸血流量减少，含氧量降低
 - D．静脉扩张淤血，睾丸组织内CO₂蓄积
 - E．健侧睾丸的生精功能不受影响
- 正确答案：E 您选择的答案：

第2题 下列哪项不是青春期后隐睾的后果

- A．位置异常睾丸的生精上皮萎缩
 - B．位置异常睾丸的间质组织萎缩
 - C．位置异常睾丸发生恶变
 - D．影响生育能力
 - E．造成心理上的不良影响
- 正确答案：B 您选择的答案：

第3题 精索静脉曲张多见于左侧原因应除外

- A 左侧垂直进入肾静脉
 - B 左侧受乙状结肠压迫
 - C 肠系膜上动脉和主动脉，在搏动时压迫左肾静脉，影响左精索静脉
 - D 精索静脉周围的结缔组织薄弱，瓣膜功能不全，左侧影响大
 - E 下尿路梗阻时，可发生左精索静脉曲张
- 正确答案：E 您选择的答案：

第4题 左侧继发性精索静脉曲张，应考虑的疾病是

- A．睾丸肿瘤
 - B．左肾肿瘤
 - C．膀胱肿瘤
 - D．前列腺癌
 - E．阴茎癌
- 正确答案：B 您选择的答案：

第5题 关于精索静脉曲张的治疗方法，下列哪项是错误的

- A．无症状或症状较轻者，可穿弹力裤或用阴囊拖带
 - B．高位结扎和切断精索内静脉
 - C．精索内静脉与腹壁深静脉吻合
 - D．精索内静脉栓塞
 - E．切除阴囊内的扩张静脉
- 正确答案：E 您选择的答案：

第6题 隐睾恶变最常见什么肿瘤

- A．精原细胞瘤
 - B．胚胎癌
 - C．畸胎瘤
 - D．绒毛膜癌
 - E．卵黄囊肿瘤
- 正确答案：A 您选择的答案：

第7题 精索静脉曲张伴有精液常规异常者的治疗应是

- A．补充维生素E
 - B．中草药
 - C．观察
 - D．精索静脉高位结扎
 - E．人工受精
- 正确答案：D 您选择的答案：

第8题 有关隐睾的治疗，下列哪项是错误的

- A 内分泌治疗
 - B 隐睾手术一般2岁内进行
 - C 合并斜疝者同时疝修补术
 - D 如睾丸萎缩或疑有恶变，应予以切除
 - E 隐睾松解牵引固定，可以防止睾丸恶性变
- 正确答案：E 您选择的答案：

第9题 下列哪项不是导致睾丸下降的异常因素

- A．睾丸引带异常
 - B．睾丸引带缺如
 - C．睾丸对促性腺激素不敏感
 - D．母体缺乏足够的促性腺激素
 - E．腹股沟斜疝挤压
- 正确答案：E 您选择的答案：

第10题 睾丸下降固定术的最佳手术时机是

- A．-0.5岁

- B. 1岁
- C. 2岁
- D. 3岁
- E. 5岁

正确答案：C 您选择的答案：

第11题 男性最常见的尿道和外生殖器畸形是

- A. 尿道上裂
- B. 尿道下裂
- C. 隐匿阴茎
- D. 阴茎短小
- E. 包茎

正确答案：B 您选择的答案：

第12题 关于隐睾的危害，下列哪项是罕见

- A. 造成不育
- B. 隐睾恶变
- C. 睾丸扭转
- D. 造成心理上不良影响
- E. 造成两性畸形

正确答案：E 您选择的答案：

第13题 隐睾患者在几岁以内睾丸仍有自行下降的可能

- A. 1岁
- B. 2岁
- C. 2.5岁
- D. 3岁
- E. 5岁

正确答案：A 您选择的答案：

第14题 有关隐睾的并发症下列哪项是罕见的

- A. 造成不育
- B. 隐睾恶变
- C. 睾丸扭转
- D. 造成两性畸形
- E. 造成心理不良影响

正确答案：D 您选择的答案：

第15题 精索内静脉高位结扎的部位是

- A. 阴囊根部
- B. 外环下方
- C. 外环上方
- D. 内环下方
- E. 内环上方

正确答案：E 您选择的答案：

第16题 最多见的鞘膜积液是

- A. 睾丸鞘膜积液
- B. 精索鞘膜积液
- C. 睾丸、精索鞘膜积液
- D. 交通性鞘膜积液
- E. 睾丸鞘膜积液和精索鞘膜积液并存

正确答案：A 您选择的答案：

第17题 关于鞘膜积液的治疗，下列哪项措施疗效最差

- A. 婴儿鞘膜积液不手术治疗
- B. 成人中等量睾丸鞘膜积液穿刺抽液
- C. 鞘膜翻转术
- D. 交通性鞘膜积液在内环处高位结扎鞘状突
- E. 精索鞘膜积液将积液囊全部切除

正确答案：B 您选择的答案：

第18题 隐睾时，位置异常的睾丸在几岁开始即可出现生精上皮的超微结构改变

- A. 0.5岁
- B. 1岁
- C. 2岁
- D. 6岁
- E. 10岁

正确答案：B 您选择的答案：

第19题 根据尿道口位置，尿道下裂分为以下类型，除了

- A. 阴茎头型
- B. 冠状沟型
- C. 阴茎型
- D. 阴囊型
- E. 会阴型

正确答案：B 您选择的答案：

第20题 下列哪种情况可出现睾丸鞘膜积液

- A. 睾丸肿瘤

- B 附睾炎
- C 先天性睾丸发育不全
- D 睾丸外伤
- E 以上都不对

正确答案：E 您选择的答案：

第21题 关于精索静脉曲张，下列哪项是错误的

- A 是指精索内静脉的迂曲和扩张
- B 多见于青壮年
- C 发病率占男性人群的10%~15%
- D 常见于左侧
- E 根据发病机制不同分原发性和继发性

正确答案：A 您选择的答案：

第22题 手术时需将积液的鞘膜囊全部切除的是

- A 睾丸鞘膜积液
- B 精索鞘膜积液
- C 鞘膜积血
- D 睾丸精索鞘膜积液
- E 交通性鞘膜积液

正确答案：B 您选择的答案：

第23题 睾丸下降固定术应将睾丸固定于

- A 腹股沟管外环处
- B 阴囊根部
- C 阴囊底部
- D 腹股沟管内环处
- E 阴茎根部

正确答案：C 您选择的答案：

第24题 关于睾丸鞘膜积液的病因，下列哪项是错误的

- A 睾丸肿瘤
- B 附睾炎
- C 睾丸外伤
- D 原发病因不明
- E 以上都不是

正确答案：E 您选择的答案：

第25题 关于精索静脉及其曲张，下列哪项是错误的

- A 精索静脉曲张常见于左侧
- B 精索静脉曲张是由于血液回流阻力增大所致，与静脉瓣和平滑肌病变无关
- C 左肾癌可能出现左侧精索静脉曲张
- D 精索静脉曲张的常见症状是阴囊坠胀感
- E 精索静脉曲张平卧后可能消失

正确答案：B 您选择的答案：

第26题 在腹股沟内环处结扎鞘膜突的手术方式适用于

- A 睾丸鞘膜积液
- B 精索鞘膜积液
- C 鞘膜积血
- D 睾丸精索鞘膜积液
- E 交通性鞘膜积液

正确答案：E 您选择的答案：

第27题 继发性精索静脉曲张最常见于

- A 结肠癌
- B 肾癌
- C 前列腺癌
- D 睾丸癌
- E 输尿管肿瘤

正确答案：B 您选择的答案：

第28题 关于尿道下裂，下列哪项是错误的

- A 是尿道外口向阴茎腹侧和近端移位
- B 阴茎屈曲畸形是向腹侧弯曲
- C 阴茎弯曲是尿道口远端尿道海绵体形成纤维索带所致
- D 勃起时阴茎弯曲尤甚
- E 尿道口越靠近远端，屈曲畸形越明显

正确答案：E 您选择的答案：

第29题 腹股沟部隐睾最常见的并发症是

- A 恶变
- B 腹股沟斜疝
- C 疼痛
- D 静脉曲张
- E 腹膜积液

正确答案：B 您选择的答案：

第30题 精索静脉曲张多见于左侧的原因应除外

- A 左精索内静脉呈直角注入左肾静脉

- B. 左精索内静脉下段位于乙状结肠后面
 - C. 左精索内静脉在肠系膜上动脉和主动脉间通过
 - D. 左侧精索内静脉容易发生瓣膜功能不全
 - E. 左侧尿路容易发生梗阻，压迫左精索内静脉
- 正确答案：E 您选择的答案：

第31题 关于睾丸鞘膜积液，下列哪项是错误的

- A. 是最常见的鞘膜积液
 - B. 鞘状突闭合正常
 - C. 体检时常能触及睾丸
 - D. 可分为原发性和继发性
 - E. 积液可为混浊、血性或乳糜状
- 正确答案：C 您选择的答案：

第32题 隐睾最常见的部位是

- A. 腹膜后
 - B. 腹股沟管
 - C. 阴囊上部
 - D. 腹腔
 - E. 盆腔
- 正确答案：B 您选择的答案：

第33题 左侧继发性精索静脉曲张，应考虑的疾病是

- A. 胰腺囊肿
 - B. 左肾肿瘤
 - C. 左肾囊肿
 - D. 嗜铬细胞瘤
 - E. 睾丸肿瘤
- 正确答案：B 您选择的答案：

第34题 关于尿道下裂的治疗，下列哪项是错误的

- A. 尿道下裂需手术治疗
 - B. 近来更多采用一期手术
 - C. 手术宜在青春期前施行
 - D. 治疗的原则是矫正阴茎弯曲和尿道成形
 - E. 矫正满意的标准是能性交、能使患者站立排尿和外观满意
- 正确答案：C 您选择的答案：

第35题 隐睾精子生成障碍的最常见原因是

- A. 局部温度调节差
 - B. 垂体功能不足
 - C. 促性腺激素不足
 - D. 输精管梗阻
 - E. 隐睾恶变
- 正确答案：A 您选择的答案：

第36题 左侧精索静脉回流入

- A. 肾静脉
 - B. 下腔静脉
 - C. 上腔静脉
 - D. 肠系膜静脉
 - E. 股静脉
- 正确答案：A 您选择的答案：

第37题 隐睾最常见的部位是

- A. 腹膜后
 - B. 腹股沟管
 - C. 阴囊入口
 - D. 腹腔
 - E. 盆腔
- 正确答案：B 您选择的答案：

第38题 精索蔓状静脉丛在下列何处汇合成精索内静脉

- A. 阴囊部
 - B. 盆腔
 - C. 腹膜后
 - D. 腹股沟管外环
 - E. 腹股沟管内环
- 正确答案：E 您选择的答案：

第39题 精索静脉曲张的后果是

- A. 睾丸发硬
 - B. 睾丸肿胀
 - C. 精索水肿
 - D. 精索粘连输精管不通
 - E. 影响睾丸生精能力
- 正确答案：E 您选择的答案：

第40题 精索静脉曲张伴有精子异常的不育者，最佳治疗为

- A. 补充维生素

- B. 精索静脉高位结扎术
C. 中草药
D. 人工授精
E. 观察

正确答案：B 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第41题 男，28岁。左阴囊内肿块半年，时有挤压痛，无热，不影响活动，查：左阴囊肿大，触之睾丸上部有一鹅卵大小囊性肿块，牵拉睾丸可随之活动，挤压不变小，睾丸可触之正常大小，透光试验阳性，应诊断

- A. 睾丸鞘膜积液
B. 精索鞘膜积液
C. 交通性鞘膜积液
D. 左斜疝
E. 精液囊肿

正确答案：B 您选择的答案：

第42题 男，1岁，右侧阴囊隐睾，最佳治疗方案是

- A. 观察
B. 内分泌治疗
C. 手术治疗
D. 理疗
E. 中药治疗

正确答案：B 您选择的答案：

第43题 男性，3岁，双侧隐睾，最好治疗方案是

- A. 绒毛膜促性腺激素治疗
B. 睾丸酮治疗
C. 先给绒毛膜促性腺激素，无效时等到青春期前做睾丸下降固定术
D. 先试用绒毛膜促性腺激素治疗，无效时做睾丸固定下降术
E. 等待自发下降

正确答案：D 您选择的答案：

第44题 男，47岁，右阴囊有坠胀感2年。体检：右阴囊下坠松弛，其内可触及蚯蚓状团块，平卧后无变化，最可能的病因是

- A. 肾盂肿瘤
B. 斜疝
C. 输尿管肿瘤
D. 肾癌
E. 结肠癌

正确答案：D 您选择的答案：

第45题 男性，60岁，发现左侧阴囊肿大1年余。体检：右阴囊肿大呈卵圆形，光滑无压痛，囊性感，睾丸不能触及。最可能的诊断是

- A. 睾丸肿瘤
B. 附睾结核
C. 睾丸鞘膜积液
D. 斜疝
E. 睾丸炎

正确答案：C 您选择的答案：

第46题 男，2岁。左侧阴囊出生后空虚至今。查：患儿发育正常，左侧阴囊发育欠佳，左阴囊内未触及睾丸，左腹股沟管内可触及花生米大小活动肿物，以下哪种方法治疗最佳

- A. 左睾丸牵引固定术
B. 左睾丸切除术
C. 左睾丸牵引固定术，如有斜疝行左斜疝修补术
D. 继续观察
E. 药物治疗

正确答案：C 您选择的答案：

第47题 男性，6岁，右阴囊发育较左侧小，体检：未查到右侧睾丸，腹压增加时可在右腹股沟上方膨出枣大包块轻推即消失，消失时常闻咕噜声。最可能的诊断是

- A. 右侧精索鞘膜积液
B. 右侧精索静脉曲张
C. 右侧隐睾
D. 右腹股沟脂肪瘤
E. 右腹股沟慢性淋巴结炎

正确答案：C 您选择的答案：

第48题 男，60岁，左侧阴囊肿大1年余，检查阴囊肿大呈卵圆形，表面光滑无压痛，囊性感，睾丸触不清，透光试验阳性。最可能的诊断是

- A. 睾丸肿瘤
B. 附睾结核
C. 睾丸鞘膜积液
D. 斜疝
E. 睾丸炎

正确答案：C 您选择的答案：

第49题 男，2岁。左侧阴囊生后空虚至今。查：患儿发育正常，左侧阴囊发育不佳，左阴囊内未触及睾丸，左腹股沟管内可触到睾丸发育不佳，如小指尖大小，应采取什么方法手术

- A 左睾丸牵引固定术
- B 右睾丸切除术
- C 左睾丸牵引固定术，如有斜疝行，左斜疝修补术
- D 等待6~7岁仍不下，降至阴囊内再行手术
- E 药物绒毛膜促性腺激素治疗

正确答案：C 您选择的答案：

第50题 男，2岁，左侧阴囊较对侧小，体检左阴囊内无睾丸

- A 在腹股沟区可触及一活动的包块。最佳治疗是
- B 观察
- B 内分泌治疗
- C 手术治疗
- D 理疗
- E 中药治疗

正确答案：C 您选择的答案：

第51题 男29岁。结婚4年不育来就诊，查：左侧阴囊下垂，左睾丸较右侧小，质地较右侧软，左精索可触及团状肿块，该患诊断为

- A 左精索静脉曲张
- B 左睾丸炎
- C 左睾丸萎缩
- D 左精索静脉炎
- E 左斜疝

正确答案：A 您选择的答案：

第52题 男，3岁，左侧阴囊发育不良，其内未触及睾丸，在左腹股沟区可触及一活动的包块。最佳的治疗为

- A 观察
- B 内分泌治疗
- C 化疗
- D 理疗
- E 手术治疗

正确答案：E 您选择的答案：

第53题 男性，23岁，左阴囊坠胀1年。体检：左阴囊内可及蚯蚓状曲张静脉，平卧后仍然明显，最佳治疗方案是

- A 阴囊托
- B 精索静脉切除
- C 精索静脉高位结扎
- D 药物治疗
- E 理疗

正确答案：B 您选择的答案：

第54题 男，28岁。十岁时因右侧隐睾行右睾丸牵引固定术，现右侧阴囊肿大，痛半月，查：右侧阴囊下垂触之睾丸肿大如鹅卵，沉重感透光试验阴性，应诊为

- A 右睾丸炎
- B 右附睾炎
- C 右睾丸鞘膜积液
- D 右睾丸结核
- E 隐睾癌变

正确答案：E 您选择的答案：

第55题 男，12岁。右阴囊肿大3年，晨起变小，活动后增大。查：右阴囊肿大，可触及囊性感挤压时缩小，缩小时可触到睾丸，应诊断为

- A 右斜疝
- B 右睾丸鞘膜积液
- C 右精索鞘膜积液
- D 右睾丸交通性鞘膜积液
- E 右精索静脉曲张

正确答案：D 您选择的答案：

第56题 男，21岁。右阴囊生后空虚，右腹股沟部有时挤压痛，查：右阴囊内无睾丸，腹股沟管内可触及睾丸，小如小指头大小，活动不好，腹股沟管内触之肿块，挤压消失，该隐睾怎样治疗

- A 药物绒毛膜促性腺激素治疗
- B 右睾丸牵引固定术
- C 右睾丸切除
- D 右睾丸牵引同时行左斜疝修补术
- E 对症治疗

正确答案：D 您选择的答案：

三、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第57-59题

患儿，6个月。右睾丸未下降至阴囊内，查右阴囊空虚未触及睾丸，左侧发育正常。

- 1. 该患儿应采取何种治疗
- A 右睾丸牵引固定
- B 睾酮治疗
- C 右睾丸切除

- D. 药物绒毛膜促性腺激素治疗
 - E. 等到1岁仍不下降用绒毛膜促性腺激素治疗
 - 2. 若患儿2岁隐睾仍未下降应采取的治疗是
 - A. 右睾丸牵引固定
 - B. 睾酮治疗
 - C. 右睾丸切除
 - D. 药物绒毛膜促性腺激素治疗
 - E. 等到6岁仍不下降行右睾丸牵引固定术
 - 3. 该患儿手术中发现右睾丸发育极差，应采取的治疗是
 - A. 右睾丸牵引固定+绒毛膜促性腺激素治疗
 - B. 右睾丸切除+睾酮治疗
 - C. 右睾丸切除，如有斜疝行修补术
 - D. 右睾丸牵引固定
 - E. 右睾丸牵引固定+睾酮治疗
- 正确答案：EAC 您选择的答案：

第60-62题

男，65岁。进行性右侧阴囊肿大6个月，无外伤史。查体右侧阴囊肿大、卵圆形，囊性感，表面光滑无压痛，睾丸未触及。

- 1. 进一步检查需作
- A. CT
- B. 阴囊透光试验
- C. 穿刺抽液
- D. MRI
- E. X线片
- 2. 首选的治疗方法为
- A. 穿刺抽液
- B. 睾丸鞘膜翻转术
- C. 中草药
- D. 理疗
- E. 睾丸切除术
- 3. 术中见积液为乳糜状，最可能的病因为
- A. 睾丸肿瘤
- B. 丝虫病
- C. 睾丸炎
- D. 附睾静脉炎
- E. 附睾肿瘤

正确答案：BBB 您选择的答案：

第63-64题

男，25岁，查体发现右侧阴囊及其内容物正常，左侧阴囊小，其内空虚未及睾丸。

- 1. 左睾丸最可能位于
- A. 腹膜后
- B. 阴茎根部
- C. 腹股沟区
- D. 盆腔
- E. 腹腔
- 2. CT发现左腹膜后2cm×1cm的包块，密度不均，最佳治疗为
- A. 内分泌治疗
- B. 中药
- C. 理疗
- D. 观察
- E. 手术治疗

正确答案：CE 您选择的答案：

第65-67题

男，29岁，左侧阴囊不适，久立后有下坠、胀痛感。检查：阴囊皮肤松弛，并可触及蚯蚓状团块，平卧消失。患者婚后4年未育。

- 1. 最可能的诊断是
- A. 腹股沟斜疝
- B. 精索静脉曲张
- C. 附睾炎
- D. 睾丸鞘膜积液
- E. 阴囊橡皮肿
- 2. 最先考虑的检查应是
- A. 精液分析检查
- B. Valsalva试验
- C. 多普勒超声
- D. 放射性核素扫描
- E. CT
- 3. 该患者的治疗应是
- A. 鞘膜翻转术
- B. 疝修补术
- C. 阴囊拖带
- D. 精索内静脉高位结扎术
- E. 抗丝虫治疗

正确答案：BAD 您选择的答案：

第68-70题

患儿，9个月。右睾丸未下降阴囊内，查右阴囊空虚没触及睾丸，左侧发育正常

1. 该患儿采取正确治疗是
 - A 右隐睾牵引
 - B 右睾丸切除
 - C 药物绒毛膜促性腺激素治疗
 - D 等待到1岁仍不下降用绒毛膜促性腺激素治疗
 - E 辜酮治疗
 2. 患儿2岁仍未下降应采取治疗是
 - A 右隐辜牵引
 - B 右辜丸切除
 - C 辜酮治疗
 - D 绒毛膜促性腺激素治疗
 - E 观察等待到5岁
 3. 该患儿手术中发现右辜丸发育极差如黄豆粒大小，应采取治疗是
 - A 右辜丸切除
 - B 右辜丸切除如有斜疝行修补术
 - C 右辜丸牵引术+绒毛膜促性腺激素治疗
 - D 右辜丸牵引术+辜酮治疗
 - E 右辜丸切除+辜酮治疗
- 正确答案：DAB 您选择的答案：

四、A4型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第71-74题

男性，65岁，进行性右侧阴囊肿大1年余，有下坠、牵扯感，无痛，行走不便，无外伤史。体检：右侧阴囊肿大、阴茎缩入包皮内，囊性感，表面光滑无压痛，辜丸未触及。

1. 为明确诊断，首选的检查是
 - A. CT
 - B. CET
 - C. X线摄片
 - D. 阴囊透光试验
 - E. 穿刺抽液
 2. 首选的治疗方案是
 - A. 穿刺抽液
 - B. 辜丸鞘膜翻转术
 - C. 中草药
 - D. 鞘膜突高位结扎术
 - E. 辜丸切除术
 3. 如果术中积液为乳糜状，最可能的原因是
 - A. 辜丸肿瘤
 - B. 丝虫病
 - C. 辜丸炎
 - D. 附辜结核
 - E. 附辜肿瘤
 4. 若诊断为乳糜性辜丸鞘膜积液，则体检时不出现下列体征
 - A. 辜丸鞘膜积液呈球形
 - B. 有弹性和囊性感
 - C. 无压痛
 - D. 不能触及辜丸附辜
 - E. 透光试验阳性
- 正确答案：DBBE 您选择的答案：

五、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第75-78题

- A. 辜丸鞘膜积液
 - B. 精索静脉曲张
 - C. 辜丸鞘膜积血
 - D. 肿瘤
 - E. 附辜炎
1. 常见于左侧的是
 2. 与隐辜有关的是
 3. 继发于外伤的是
 4. 透光试验阳性的是

正确答案：BDCA 您选择的答案：

第79-82题

- A. 辜丸鞘膜积液
 - B. 精索鞘膜积液
 - C. 交通性鞘膜积液
 - D. 辜丸肿瘤
 - E. 完全性腹股沟斜疝
1. 阴囊肿块，卵圆形，质软，无压痛，表面光滑，有弹性和囊性感，触不到辜丸和附辜，透光试验阳性
 2. 阴囊囊性肿块，站立时肿块明显增大，透光试验阳性，卧位时肿块缩小或消失，辜丸不能触及
 3. 位于腹股沟或辜丸上方的囊性肿块，透光试验阳性，肿块与辜丸有明显界限
 4. 阴囊肿块，质地坚硬，托起或掂量有沉重感，透光试验阴性
- 正确答案：ACBD 您选择的答案：

第83-86题

A. 先天性鞘膜积液

B. 外观呈哑铃形

C. 外观呈梨形

D. 质地坚硬

E. 鞘状突闭合正常

1. 睾丸鞘膜积液

2. 精索鞘膜积液

3. 睾丸、精索鞘膜积液

4. 交通性鞘膜积液

正确答案：EBCA 您选择的答案：

习题集 外科学 泌尿、男生殖系统结核

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 泌尿系统结核的原发病灶最常见于

- A. 肝
- B. 肠道
- C. 脾
- D. 骨关节
- E. 肺

正确答案：E 您选择的答案：

第2题 关于病理性肾结核，下列哪项是错误的

- A. 不出现临床症状
- B. 大多能自行愈合
- C. 结核菌经血行感染肾脏
- D. 结核菌首先进入皮质层
- E. 结核菌在肾髓质形成结核灶并穿破肾乳头

正确答案：E 您选择的答案：

第3题 关于肾结核，下列哪项是错误的

- A. 多经尿路逆行感染
- B. 最初是双肾同时受累
- C. 病理性肾结核常不出现症状
- D. 原发病灶多在肺
- E. 从病理性肾结核到临床性肾结核一般长达数年

正确答案：A 您选择的答案：

第4题 关于肾结核，下列哪项是错误的

- A. 肾结核病变主要在肾，症状主要在膀胱
- B. 膀胱结核形成挛缩膀胱时发生的主要是充溢性尿失禁
- C. 严重肾结核可引起高血压
- D. 一侧肾结核也可导致慢性肾功能衰竭
- E. 肾结核可以同时存在其他结核病

正确答案：B 您选择的答案：

第5题 泌尿男性生殖器结核原发灶多在

- A. 肾
- B. 输尿管
- C. 膀胱
- D. 附睾
- E. 前列腺

正确答案：A 您选择的答案：

第6题 关于肾结核的临床表现，下列哪项是错误的

- A. 肾结核全身症状常不明显
- B. 肾结核病原在肾，症状在膀胱
- C. 脓尿是肾结核最常见的症状
- D. 血尿多在膀胱刺激症状发生以后出现
- E. 尿频是肾结核最早出现的症状

正确答案：C 您选择的答案：

第7题 为确诊肾结核，下列哪项有决定意义

- A. 尿中查出结核杆菌
- B. 有附睾结核
- C. 有膀胱刺激症状
- D. 肾盂造影片示肾盏边缘不齐，有虫蛀样阴影
- E. PCR测定结核杆菌阳性

正确答案：A 您选择的答案：

第8题 泌尿系统造影诊断早期肾结核的依据是

- A. 与肾盏相连的空洞形成
- B. 肾盂肾盏变形
- C. 肾盂肾盏不显影
- D. 肾盏边缘不光滑，如虫蛀状
- E. 输尿管僵硬管腔狭窄

正确答案：D 您选择的答案：

第9题 肾结核手术治疗原则，哪项不正确

- A. 无泌尿男性生殖系统以外活动病灶存在
- B. 有附睾结核存在不切除病肾
- C. 手术前足够抗结核药物
- D. 手术后足够抗结核药物
- E. 术中尽量保存肾正常组织

正确答案：B 您选择的答案：

第10题 单纯使用抗结核药物治疗肾结核的指征是

- A. 静脉肾盂造影一侧不显影

B. 尿路造影检查显示一侧肾广泛严重破坏
C. 肾结核伴膀胱挛缩
D. 早期肾结核，肾盂造影显示病变轻微或范围较局限
E. 一侧肾严重钙化
正确答案：D 您选择的答案：

第11题 肾结核肾切除指征，哪项不对
A. 单肾结核，对侧肾功能正常，肾脏破坏严重且广泛
B. 双肾结核，轻侧能担负起肾功能，严重侧切除
C. 一侧肾结核对侧肾积水，但肾功能正常可切除病肾
D. 一侧肾结核合并膀胱挛缩对侧无积水可切除病肾
E. 一侧肾结核对侧肾正常，即使病变轻也可做病肾切除
正确答案：E 您选择的答案：

第12题 肾结核的原发灶多在
A. 骨关节
B. 淋巴结
C. 肠道
D. 肺
E. 腹腔
正确答案：D 您选择的答案：

第13题 肾结核常见晚期并发症是
A. 结核性尿道狭窄
B. 结核性膀胱阴道瘘
C. 附睾结核
D. 前列腺结核
E. 膀胱挛缩和对侧肾积水
正确答案：E 您选择的答案：

第14题 早期肾结核唯一的阳性发现是
A. 大量血尿
B. 结核中毒症状
C. 肾区包块
D. 尿中有结核杆菌
E. 肾盂造影有破坏病灶
正确答案：D 您选择的答案：

第15题 病理型肾结核主要位于肾
A. 肾盏
B. 髓质层
C. 肾乳头、肾盏
D. 肾皮质层
E. 肾盂
正确答案：D 您选择的答案：

第16题 关于肾结核的药物治疗，下列哪项是错误的
A. 药物治疗关键是药量充分，时间足
B. 治疗失败主要是治疗不充分
C. 一般至少治疗半年以上
D. 早期病例用药6~9个月，即可能治愈
E. 连续半年尿中无结核杆菌称为治愈
正确答案：E 您选择的答案：

第17题 肾结核早期唯一严重的阳性发现是
A. 大量血尿
B. 肾区包块
C. 结核中毒症状
D. 尿常规有少量红细胞和脓细胞
E. 肾盂造影有破坏病灶
正确答案：D 您选择的答案：

第18题 位于肾实质表浅不与肾盏肾盂相通的结核病灶，理想的治疗是
A. 抗结核药物治疗
B. 病灶清除术
C. 患肾切除术
D. 患肾部分切除术
E. 抗结核治疗3~6个月，无效时病灶清除术
正确答案：E 您选择的答案：

第19题 肾结核的血尿表现为
A. 全血尿
B. 间歇性无痛血尿
C. 起始血尿
D. 终末血尿
E. 镜下血尿
正确答案：D 您选择的答案：

第20题 下列哪项不是抗结核首选药物
A. 异烟肼

- B. 利福平
- C. 乙胺丁醇
- D. 吡嗪酰胺
- E. 链霉素

正确答案：C 您选择的答案：

第21题 尿培养发现结核杆菌的患者，进一步检查应是

- A. 24小时尿沉渣找抗酸杆菌
- B. B超
- C. 腹部平片
- D. 腹部平片 + 排泄性尿路造影
- E. 附睾活检

正确答案：D 您选择的答案：

第22题 病理改变主要在肾脏，但临床表现主要在膀胱的疾病是

- A. 肾结石
- B. 肾结核
- C. 肾肿瘤
- D. 肾积水
- E. 多囊肾

正确答案：B 您选择的答案：

第23题 肾结核X线检查主要靠

- A. 腹部平片
- B. 肾动脉造影
- C. 肾盂造影
- D. 肾断层造影
- E. 后腹膜充气造影

正确答案：C 您选择的答案：

第24题 肾结核的手术治疗原则，哪项不正确

- A. 无泌尿男生殖系统以外的活动性结核病灶
- B. 手术前使用足量的抗结核药物
- C. 术中尽量保存正常的肾组织
- D. 有附睾结核存在、不切除病肾
- E. 手术后使用足量的抗结核药物

正确答案：D 您选择的答案：

第25题 确定肾结核下列哪项最可靠

- A. 尿中查到红白细胞
- B. 附睾有硬结
- C. 肺结核同时伴膀胱刺激症状
- D. 膀胱镜检查可见膀胱内充血水肿
- E. 肾盂造影片可见肾盏虫蚀样破坏

正确答案：E 您选择的答案：

第26题 延误肾结核的诊断原因，哪一项是错误的

- A. 满足于膀胱结核的诊断，不追究其继发于肾结核
- B. 满足于一般膀胱炎的诊治，不追究其原因
- C. 满足于肾积水的诊断，不追究积水原因
- D. 满足于附睾结核的诊断，不追究继发肾结核
- E. 满足于前列腺结核诊断，不追究其是继发肾结核

正确答案：C 您选择的答案：

第27题 双侧肾结核的治疗方法是

- A. 选择较严重的一侧肾作肾切除
- B. 先给予抗结核药物治疗，再切除严重破坏的肾
- C. 肾造瘘术
- D. 空洞引流术
- E. 结肠膀胱术

正确答案：B 您选择的答案：

第28题 一侧无功能结核肾脏，对侧轻度肾积水，膀胱容量正常，处理方法是

- A. 积水侧肾造瘘
- B. 暂保守治疗
- C. 切除结核无功能肾，观察积水肾进展情况，再决定是否行输尿管膀胱再植
- D. 切除仍保留无功能肾3~6个月后行积水侧肾造瘘
- E. 切除无功能肾3~6个月行积水侧输尿管膀胱再植术

正确答案：C 您选择的答案：

第29题 关于泌尿系统结核的病理，下列哪项是错误的

- A. 结核结节形成
- B. 结核性溃疡
- C. 输尿管结核病变修复后，可出现管腔节段性狭窄
- D. 弥漫性钙化肾的病灶内还可能有活的结核菌
- E. “肾自截”是肾结核自行愈合的表现

正确答案：E 您选择的答案：

第30题 肾结核最常见的临床表现是

- A. 血尿脓尿

- B 尿频尿急尿痛
- C 全身结核中毒症状
- D 肾区疼痛
- E 肾区包块

正确答案：B 您选择的答案：

第31题 肾结核患者膀胱镜检中，可见下列哪项不正确

- A 充血水肿
- B 结核结节
- C 溃疡及瘢痕形成
- D 输尿管可呈洞穴状
- E 膀胱内可见乳头状肿物样改变

正确答案：E 您选择的答案：

第32题 一侧肾下盏结核，充分抗结核治疗后最好的治疗方法

- A 病灶清除术
- B 肾部分切除术
- C 肾切除术
- D 保守治疗抗结核药物应用
- E 根治性肾切除术

正确答案：B 您选择的答案：

第33题 关于挛缩膀胱的手术治疗，下列哪项是错误的

- A 手术必须在膀胱结核控制以后
- B 肠膀胱扩大术适用于无尿道结核的病人
- C 有前列腺结核不影响行膀胱扩大术
- D 有尿道梗阻者考虑尿流改道手术
- E 回肠膀胱术属于尿流改道手术

正确答案：C 您选择的答案：

第34题 病理改变主要在肾脏而临床表现主要在膀胱，多见于

- A 肾结石
- B 肾肿瘤
- C 肾结核
- D 肾积水
- E 多囊肾

正确答案：C 您选择的答案：

第35题 病理性肾结核主要位于肾脏的

- A 肾皮质
- B 肾髓质
- C 肾乳头
- D 肾盏
- E 肾盂

正确答案：A 您选择的答案：

第36题 肾结核最早出现的症状是

- A 尿频
- B 尿急
- C 腰痛
- D 血尿
- E 脓尿

正确答案：A 您选择的答案：

第37题 肾结核的原发灶多位于

- A 骨关节
- B 肺
- C 回肠
- D 结肠
- E 膀胱

正确答案：B 您选择的答案：

第38题 肾结核单纯使用抗结核药物指征是

- A 静脉肾盂造影一侧不显影
- B 静脉肾盂造影一侧广泛破坏
- C 肾盂造影显示病变轻
- D 一侧肾钙化
- E 肾结核并结核性挛缩膀胱

正确答案：C 您选择的答案：

第39题 对肾自截的描述下列哪项不正确

- A 肾内病灶无结核菌
- B 全肾广泛钙化
- C 膀胱结核好转
- D 膀胱刺激症状基本消失
- E 输尿管完全闭塞

正确答案：A 您选择的答案：

第40题 肾结核的血尿特点为

- A 活动后血尿

- B. 尿频、尿痛后终末血尿
C. 初段血尿
D. 间歇性无痛血尿
E. 全程性肉眼血尿

正确答案：B 您选择的答案：

第41题 凡有尿频、尿急、尿痛等膀胱刺激症状，一般抗菌药物治疗无效，尿普通培养无细菌生长。应首先考虑下列哪项诊断

- A. 慢性细菌性膀胱炎
B. 膀胱结石
C. 慢性细菌性前列腺炎
D. 膀胱癌
E. 肾结核

正确答案：E 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第42题 女，22岁。尿频尿急2年，有米汤样尿和终末血尿。尿检：脓细胞(+++)，红细胞(+)。尿细菌培养阴性，IVU：左肾未显影，左肾区可见斑片状高密度阴影，右肾盂肾盏显示光滑，有轻度积水，诊断应为

- A. 左肾结核
B. 右肾结核
C. 双肾结核
D. 左输尿管结石肾积水
E. 左肾癌

正确答案：A 您选择的答案：

第43题 男，32岁。右侧肾结核无功能伴左肾严重积水，膀胱挛缩，查：血Cr：800 μ mol/L，血红蛋白82g/L，应选择哪项处理最好

- A. 右肾切除术
B. 右肾切除+左肾造瘘术
C. 左肾造瘘术
D. 肠道扩大膀胱术
E. 抗结核治疗同时行左肾造瘘术

正确答案：E 您选择的答案：

第44题 男，35岁，左侧结核性脓肾，右侧肾积水，膀胱挛缩，BUN21mmol/L，Hb80g/L，最适宜的处理为

- A. 左脓肾切除术
B. 抗结核药物治疗
C. 膀胱扩大术
D. 中药治疗
E. 抗结核治疗同时行右肾造瘘术

正确答案：E 您选择的答案：

第45题 男，40岁。左肾切除术2年，抗结核治疗后，尿频25次/天，现恶心呕吐，B超见右肾积水，行右肾穿刺造影，可见上段输尿管狭窄，尿常规：正常，血Cr 620 μ mol/L，该患者适合于哪种治疗

- A. 结肠膀胱扩大术
B. 输尿管狭窄切除对端吻合术
C. 输尿管皮肤造口术
D. 肾造口术
E. 输尿管膀胱吻合术

正确答案：D 您选择的答案：

第46题 女，32岁。尿频尿急尿痛1年半，有米汤样尿，及终末血尿，尿检：脓细胞(+++)，红细胞(++)，IVU：双肾破坏样改变，上下盏均有虫蚀样改变，左肾上盏颈部狭窄，血Cr 108 μ mol/L，其最佳治疗

- A. 左肾切除
B. 左肾部分切除
C. 抗结核治疗左肾切除
D. 抗结核治疗6~9个月左肾部分切除
E. 抗结核治疗

正确答案：E 您选择的答案：

第47题 男性，28岁，右肾结核。发现左输尿管中上1/3结石1个月，直径1.5cm。静脉肾盂造影显示右肾无功能，左肾轻度积水。应首先考虑的治疗是

- A. 左输尿管切开取石术
B. 右肾切除及左输尿管切开取石术
C. 左肾造瘘术
D. 抗结核药物准备下行左输尿管切开取石术
E. 抗结核及药物排石

正确答案：D 您选择的答案：

第48题 25岁，男性。膀胱刺激症2年，一般抗炎无效，且逐渐加重，有米汤尿及和终末血尿，现排尿30余次，您考虑下列哪种疾病

- A. 慢性肾盂肾炎
B. 慢性前列腺炎
C. 膀胱结石
D. 肾结核
E. 膀胱肿瘤

正确答案：D 您选择的答案：

第49题 青年女性，尿频、尿急、尿痛伴终末血尿2个余，尿呈淘米水状，内有大量脓细胞和絮状物，最可能的诊断是

- A. 肾盂肾炎
- B. 肾结核
- C. 膀胱炎
- D. 输尿管结石
- E. 膀胱肿瘤

正确答案：B 您选择的答案：

第50题 女，29岁。尿频尿急，尿痛2年余。有终末血尿。尿检：脓细胞(+++)，红细胞(++)，尿细菌培养阴性。IVU：右肾不显影，左肾上下盏均有虫蚀样改变有轻度积水，血Cr：100 μ mol/L，血红蛋白110g/L。诊断为双肾结核，该患应怎样治疗

- A. 非手术抗结核治疗
- B. 右肾切除，左肾造口
- C. 左肾造口
- D. 右肾切除
- E. 抗结核治疗后右肾切除

正确答案：E 您选择的答案：

第51题 女，28岁。因左肾结核1年前行左肾切除术，术后应用抗结核药物，尿频不见好转，现每次尿量40ml左右。化验：血沉正常，尿镜检血细胞2~3个/HP，红细胞0~1个/kip，尿抗酸菌2次阳性，IVU：右肾盂肾盏显示有轻度积水，膀胱小而圆形，首先治疗

- A. 继续抗结核治疗
- B. 右肾造瘘术
- C. 右输尿管皮肤造口术
- D. 结肠扩大膀胱术
- E. 中药治疗

正确答案：D 您选择的答案：

第52题 男性，33岁，因尿频3个月就诊，IVP示右肾结核无功能，左肾大致正常，下列哪项措施是错误的

- A. 胸部X线片
- B. 术前服用抗结核药物2周
- C. 切除结核肾
- D. 肾切除术后停用抗结核药物
- E. 支持疗法

正确答案：D 您选择的答案：

第53题 25岁，女性。尿频尿痛一周，尿常规：白细胞(+)，红细胞(+)，消炎治疗好转。因过去有尿频尿痛病史，行肾造影找其原因，做IVU检查时发现右肾区为一高密度影，其钙化区呈肾脏的轮廓，左肾盂肾盏显示正常。右肾病变应是

- A. 肿瘤钙化
- B. 结石
- C. 胆囊结石
- D. 肾结核自截肾
- E. 肠道粪块

正确答案：D 您选择的答案：

第54题 男性，45岁，因晚期肾结核行一侧患肾切除术后，在抗结核治疗中，出现尿量逐渐减少，每天约350ml，全身浮肿，血尿素氮35.7mmol/L。最可能原因是

- A. 对侧肾结核
- B. 对侧输尿管口狭窄
- C. 对侧输尿管结石
- D. 慢性肾炎
- E. 链霉素造成肾功能损害

正确答案：B 您选择的答案：

第55题 女，38岁，尿频、尿急、尿痛半年余，抗炎治疗不见好转，IVU右肾不显影，尿常规：白细胞满视野/HP，红细胞10~20个/HP；右肾穿刺造影可见广泛破坏灶，肾盂肾盏严重积水扩张。诊断右肾结核，应选用哪种治疗最好

- A. 继续抗结核治疗
- B. 右肾切除术
- C. 全身支持疗法+抗结核治疗
- D. 术前抗结核治疗+右肾切除术
- E. 术前抗结核治疗+右肾切除术+术后抗结核治疗

正确答案：E 您选择的答案：

第56题 女性，30岁，尿频尿急3年。尿沉渣：脓细胞+++，红细胞+。尿培养阴性。IVP：左肾未显影，相当于左肾区可见散在小片状高密度阴影，右肾积水，膀胱如乒乓球大小。应诊断为

- A. 左肾结核
- B. 右肾结核
- C. 双肾结核
- D. 左肾结石
- E. 左肾癌

正确答案：A 您选择的答案：

第57题 男性，26岁，尿频伴终末肉眼血尿2个月，膀胱镜检查发现左输尿管口周围膀胱黏膜充血、水肿，散在几个米黄色粟粒样小结节。还应考虑做下列哪项检查

- A. 膀胱造影

- B. 膀胱B超
- C. 残余尿量测定
- D. 尿流动力学检查
- E. 膀胱黏膜结节活检

正确答案：E 您选择的答案：

第58题 男，28岁。阴囊破溃流脓1个月，无疼痛，抗炎治疗未愈，发病以来无发热，可能诊断是

- A 急性附睾炎
- B 急性睾丸炎
- C 附睾结核
- D 阴囊丝虫病
- E 睾丸肿瘤感染

正确答案：C 您选择的答案：

第59题 男，35岁。尿频，尿急，尿痛一年，有米汤尿史，尿常规：白细胞充满 / HP；IVU左肾实质内有数个大小不等异常充盈区，肾盂显示不佳，右肾盂肾盏显示有轻度积水，治疗方法是

- A 左肾部分切除
- B 左肾病灶清除术
- C 右肾造瘘术
- D 左肾切除术
- E 抗结核药物治疗

正确答案：D 您选择的答案：

第60题 男，26岁。右肾结核肾切除术后一年，左肾有中度积水，膀胱容量50ml，现尿常规：白细胞3~5个 / HP，红细胞0~1个 / HP，尿抗酸菌三次阴性，尿道扩张器对尿道探查，不能扩入仅能插入8号尿管，如何治疗

- A 左肾造口术
- B 膀胱造瘘术
- C 左输尿管腹壁造口
- D 乙状结肠扩大膀胱术
- E 尿道成形术

正确答案：C 您选择的答案：

第61题 老年女性，尿频、尿痛伴终末血尿4个月余，尿呈淘米水状，内有大量脓细胞和絮状物，最可能的诊断为

- A. 肾盂肾炎
- B. 肾结核
- C. 膀胱炎
- D. 输尿管结石
- E. 膀胱肿瘤

正确答案：B 您选择的答案：

第62题 女性，23岁，因左肾结核于1年前行左肾切除术，术后应用抗结核药物，尿频不见好转，每次尿量约20-40ml。化验：血沉正常，尿蛋白阴性，镜检可见红细胞0~3个 / 高倍，尿找结核杆菌3次阴性。尿路造影：右肾显影正常，肾盂轻度积水，膀胱小而圆形。首选治疗为

- A. 继续抗结核治疗
- B. 右肾造口术
- C. 右输尿管皮肤造口术
- D. 结肠扩大膀胱术
- E. 中药治疗

正确答案：D 您选择的答案：

第63题 女，25岁。尿频，尿急，尿痛3个月，一般抗菌素治疗不见好转，目前每次尿量30ml。IVU：右肾未显影，为早期确诊，还应给予哪项检查

- A 尿沉渣查抗酸杆菌
- B 尿结核杆菌培养
- C 尿动物接种
- D 膀胱镜检查
- E 同位素肾图

正确答案：A 您选择的答案：

第64题 女，38岁，尿频尿急，尿痛半年余，抗炎治疗不见好转，IVU右肾不显影，尿常规：白细胞充满 / HP，红细胞10~20个 / HP；右肾穿刺造影可见广泛破坏灶，肾盂肾盏严重积水扩张。诊断右肾结核，应选用哪种治疗最好

- A 继续抗结核治疗
- B 右肾切除术
- C 全身支持疗法+抗结核治疗
- D 术前抗结核药物治疗+右肾切除术
- E 术前抗结核药物治疗+右肾切除术+术后抗结核治疗

正确答案：E 您选择的答案：

三、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第65-66题

男性，45岁，尿频尿急尿痛伴尿末血尿2年，时有低热、盗汗。排泄性尿路造影示右肾不显影，相当于右肾区可见散在小片状高密度阴影，左肾中度积水，左肾盂显影模糊，如虫蛀状，膀胱容量正常。全身轻度浮肿，血尿素氮23.7mmol / L。

- 1. 此患者最可能诊断是
- A. 右肾结核，左肾积水
- B. 双肾结核
- C. 右肾结石，左肾结核

- D. 右输尿管结石，左肾积水
- E. 右肾肿瘤，左肾结核

2. 治疗应选择

- A. 抗痨治疗
- B. 右肾切除
- C. 抗痨治疗后右肾切除
- D. 右肾切除同时左肾引流
- E. 左肾引流后，右肾切除

正确答案：BD 您选择的答案：

第67-70题

男，31岁，间歇发作肉眼全程血尿2年，低热、盗汗、右腰不适，不伴尿频、尿急、尿痛，有肺结核史。

1. 若血尿为泌尿系肿瘤所致，其可靠依据是

- A. 间歇发作的肉眼全程血尿
- B. 不伴膀胱刺激症状
- C. 腰痛
- D. 尿中找到癌细胞
- E. 低热、盗汗

体检：血压120/80mmHg，脉搏72次/分，体温37.5℃，双肾区无叩击痛。尿常规：呈酸性反应。镜检发现红细胞及少量脓球。胸片示右上肺浸润性结核。

2. 若结核所致的血尿，其重要发现应是

- A. 有肺结核
- B. 有膀胱刺激症状
- C. 尿呈酸性，尿中含有红细胞及脓球
- D. 结核菌培养阳性
- E. 尿中找到抗酸杆菌

3. 若泌尿系结核诊断确立，定位诊断措施是

- A. 放射性核素扫描
- B. 泌尿系统平片
- C. 肾动脉造影
- D. B超
- E. IVU

4. 若经检查确诊为早期肾结核，其治疗应为

- A. 病灶清除
- B. 肾部分切除
- C. 肾切除
- D. 抗结核治疗
- E. 肾造瘘

正确答案：DEDE 您选择的答案：

第71-73题

女，24岁。尿频，尿痛一年余，用一般消炎药不见好转，有米汤尿和终末血尿史

1. 根据病史怀疑哪种疾病

- A. 膀胱炎
- B. 肾结核
- C. 膀胱肿瘤并感染
- D. 肾盂肾炎
- E. 膀胱结石

2. 为了确诊哪样检查意义大

- A. 膀胱镜
- B. IVU
- C. B超
- D. CT
- E. 肾图

3. 如确诊为早期肾结核，其治疗应为

- A. 病灶清除
- B. 肾部分切除
- C. 肾切除
- D. 抗结核药物治疗
- E. 肾造瘘

正确答案：BBD 您选择的答案：

第74-76题

男，27岁。尿频，尿急，尿痛一年，一般抗炎治疗不好转，时有低热无力，尿检：白细胞20~30/HP，红细胞5~8个/HP，肾图：右肾严重受损，左肾积水，初诊为肾结核

1. 为了确诊还应做哪项检查意义更大

- A. IVU
- B. B超
- C. CT
- D. 肾动脉造影
- E. 血常规

2. 确诊右肾结核左肾积水，为了治疗哪项检查更好

- A. 血Cr
- B. 尿结核菌培养
- C. 左肾穿刺造影
- D. 右肾穿刺造影
- E. 肾扫描

3. 检查结果左肾功能不佳，现最佳治疗是

- A. 右肾切除
- B. 左肾造瘘

- C 结核药物治疗
- D 右肾切除，左肾造瘘
- E 抗结核治疗+左肾造瘘

正确答案：AAE 您选择的答案：

第77-78题

女性，32岁，尿频尿急尿痛5年。体检：贫血貌，尿沉渣脓细胞+++，红细胞++，血尿素氮30mmol/L，常规排泄性尿路造影两肾均未显影，膀胱容量约50ml。

1. 首先考虑的诊断是
 - A. 慢性膀胱炎
 - B. 慢性肾盂肾炎
 - C. 一侧肾结核一侧肾积水
 - D. 双肾结核
 - E. 双肾积水
2. 本病例进一步明确诊断应首先考虑
 - A. 排泄性大剂量延迟尿路造影
 - B. 逆行肾盂造影
 - C. 膀胱镜检查
 - D. 24小时尿找抗酸杆菌
 - E. 膀胱侧压

正确答案：CD 您选择的答案：

四、A4型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第79-82题

男性，30岁，间歇性全程肉眼血尿1年，低热、盗汗，右腰不适，不伴尿频、尿急、尿痛，有肺结核史。

1. 若血尿为泌尿系统肿瘤所致，其有利依据是
 - A. 间歇发作的肉眼全程血尿
 - B. 不伴膀胱刺激症状
 - C. 腰痛
 - D. 尿中找到癌细胞
 - E. 低热、盗汗
2. 假设尿常规示：酸性反应，镜检发现红细胞及少量脓球。胸片示浸润性右上肺结核。若系结核所致血尿，其最重要发现是
 - A. 有膀胱刺激症状
 - B. 尿呈酸性，尿中含有红细胞及脓球
 - C. 有肺结核
 - D. 尿中找到抗酸杆菌
 - E. 尿结核杆菌培养阳性
3. 若泌尿系统结核诊断确立后，定位诊断措施最好是
 - A. 排泄性尿路造影
 - B. 核素肾图
 - C. 核素肾扫描
 - D. 肾动脉造影
 - E. MRI
4. 若经检查确诊为早期肾结核，其治疗是
 - A. 抗痨治疗
 - B. 病灶清除
 - C. 肾部分切除
 - D. 肾切除
 - E. 肾造瘘

正确答案：DEAA 您选择的答案：

五、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第83-86题

- A 肾结核的主要临床表现
 - B 肾结石的主要临床表现
 - C 膀胱癌的主要临床表现
 - D Wilms瘤的主要临床表现
 - E 前列腺增生症的主要临床表现
1. 尿频，尿痛，血尿和脓尿为
 2. 无痛性肉眼血尿为
 3. 老年男性进行性排尿困难为
 4. 小儿腹部巨大肿块为

正确答案：ACED 您选择的答案：

第87-90题

- A. 肾结核病灶清除术
 - B. 肾部分切除术
 - C. 肾切除术
 - D. 乙状结肠膀胱扩大术
 - E. 输尿管皮肤造口术
1. 肾实质表现有结核空洞，病灶与肾盂不相通，药物治疗3~6个月无效。应行
 2. 病灶局限于肾以及肾盂肾盏相通的结核病灶，药物治疗6~9个月无效。应行
 3. 男性不育患者，28岁，腹部平片示左肾钙化，排泄性尿路造影左肾不显影，右肾功能正常。应行

4. 女, 17岁, 尿频、尿失禁, 1年前因右肾结核行右肾切除, 术后一直抗结核治疗, 尿检阴性。排泄性尿路造影左肾轻度积水, 功能尚可, 膀胱呈乒乓球大小, 光滑。应行
正确答案: ABCD 您选择的答案:

第91-94题

- A. 无菌性脓尿
- B. 无痛性肉眼血尿
- C. 疼痛后血尿
- D. 尿频终末血尿
- E. 血尿进行性加重

- 1. 肾结核尿液改变常见为
- 2. 膀胱肿瘤的血尿特点为
- 3. 输尿管结石血尿特点为
- 4. 膀胱结核血尿特点为

正确答案: ABCD 您选择的答案:

第95-98题

- A. 肾结核病灶清除术
- B. 肾部分切除术
- C. 肾切除术
- D. 肠膀胱扩大术
- E. 输尿管皮肤造口术

- 1. 肾实质表面结核空洞, 病灶与肾不连通, 药物治疗2个月无效, 应行
- 2. 病变局限于肾的一极与肾盂肾盏相通的结核病灶, 药物治疗6个月无效, 应行
- 3. 肾结核患者, 排泄性尿路造影示左肾不显影, 右肾功能正常, 应行
- 4. 青年女性, 尿频尿失禁, 1年前右肾结核右肾切除, 术后一直抗结核治疗, 尿检阴性。排泄性尿路造影示左肾轻度积水, 功能尚可, 膀胱如乒乓球大小, 光滑, 应行

正确答案: ABCD 您选择的答案:

习题集 外科学 泌尿系统损伤

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 肾外伤最常见的病理类型是

- A．肾挫伤
- B．肾实质深裂伤
- C．肾横断
- D．肾蒂血管损伤
- E．肾盂撕裂伤

正确答案：A 您选择的答案：

第2题 球部尿道损伤后出现严重尿外渗，局部处理方法应是

- A 局部穿刺抽吸外渗的尿和血液
- B 局部热敷
- C 理疗
- D 尿外渗部位多处切开引流
- E 消炎预防感染即可

正确答案：D 您选择的答案：

第3题 男性尿道损伤的最常见部位是尿道的

- A．外口处
- B．悬垂部
- C．球膜部
- D．前列腺部
- E．内口处

正确答案：C 您选择的答案：

第4题 球部尿道损伤尿外渗部位

- A 膀胱周围
- B 会阴浅袋
- C 会阴深袋
- D 阴茎部
- E 阴囊部

正确答案：B 您选择的答案：

第5题 肾外伤的治疗方案中，下列哪项是错误的

- A．肾挫伤施行非手术治疗
- B．肾裂伤仍可行非手术治疗
- C．开放性肾外伤应立即手术
- D．肾外伤后休克不能纠正，应立即手术
- E．肾下极严重裂伤首选的手术是伤肾切除术

正确答案：E 您选择的答案：

第6题 肾损伤早期手术指征，应除外

- A 开放性肾损伤
- B 严重肾裂伤
- C 肾血管损伤
- D 合并其他脏器损伤
- E 已诊肾损伤有休克

正确答案：E 您选择的答案：

第7题 下列哪种肾外伤最常出现血尿

- A．肾血管断裂
- B．肾挫伤合并输尿管断裂
- C．肾皮质挫伤合并肾周围血肿
- D．肾裂伤
- E．肾盂广泛裂伤

正确答案：D 您选择的答案：

第8题 对肾重度损伤患者施行手术时宜采用的切口是

- A 经11肋间切口
- B 经12肋下切口
- C 腰背部切口
- D 经腹切口
- E 胸膜联合切口

正确答案：D 您选择的答案：

第9题 下列哪种不是肾损伤晚期的并发症

- A．尿囊肿
- B．肾盂积水
- C．肾血管性高血压
- D．肾囊肿
- E．假性肾动脉瘤

正确答案：D 您选择的答案：

第10题 骑跨伤所致尿道破裂，其尿道出血的特点是

- A．尿道口滴血

- B. 终末血尿
- C. 尿道口无流血
- D. 全程肉眼血尿
- E. 镜下血尿

正确答案：A 您选择的答案：

第11题 尿道球部损伤的最常见原因是

- A. 尿道器械检查
- B. 骑跨伤
- C. 骨盆骨折
- D. 锐器伤
- E. 踢伤

正确答案：B 您选择的答案：

第12题 下列哪种检查，不适合于肾损伤

- A. 大剂量静脉肾盂造影
- B. 逆行尿路造影
- C. B超检查
- D. CT检查
- E. 肾动脉造影

正确答案：B 您选择的答案：

第13题 骑跨伤常造成尿道哪部位损伤

- A. 阴茎部
- B. 球部
- C. 膜部
- D. 前列腺部
- E. 膀胱颈部

正确答案：B 您选择的答案：

第14题 下列哪项不是球部尿道损伤尿外渗的范围

- A. 会阴
- B. 阴囊
- C. 阴茎
- D. 腹壁
- E. 耻骨后间隙

正确答案：E 您选择的答案：

第15题 若要检查尿道损伤的程度，应使用的器械是

- A. 金属探子
- B. 金属导管
- C. 普通导尿管
- D. 丝状探子
- E. 尿道镜

正确答案：C 您选择的答案：

第16题 下列哪种检查不适宜于肾损伤

- A. B超
- B. CT
- C. 排泄性尿路造影
- D. 逆行肾盂造影
- E. 肾动脉造影

正确答案：D 您选择的答案：

第17题 对侧肾功能正常时肾损伤肾切除指征是

- A. 肾下极碎裂伤
- B. 肾上极碎裂伤
- C. 肾严重碎裂伤或肾血管撕裂严重
- D. 肾被膜裂伤
- E. 肾损伤

正确答案：C 您选择的答案：

第18题 肾损伤明显血尿时见于

- A. 输尿管断裂
- B. 肾盂广泛撕裂
- C. 肾血管严重损伤
- D. 输尿管血块堵塞
- E. 肾实质深度裂伤，破入肾盏肾盂

正确答案：E 您选择的答案：

第19题 尿道膜部损伤时，尿生殖膈没损伤时，尿外渗至

- A. 会阴部
- B. 阴囊部
- C. 阴茎部
- D. 膀胱前列腺周围
- E. 下腹壁

正确答案：D 您选择的答案：

第20题 肾损伤下列哪种情况可有血尿

- A. 肾挫裂伤

- B 肾血管断裂
- C 肾盂广泛撕裂
- D 输尿管断裂
- E 输尿管血管堵塞

正确答案：A 您选择的答案：

第21题 肾下极严重裂伤可考虑哪种手术治疗

- A 肾修补术
- B 肾部分切除术
- C 肾周引流
- D 肾切除术
- E 肾动脉栓塞后再肾切除术

正确答案：B 您选择的答案：

第22题 下列哪种肾损伤不需早期立即手术

- A 肾碎裂
- B 肾横断
- C 肾挫裂伤
- D 肾蒂断裂
- E 肾盂撕裂伤

正确答案：C 您选择的答案：

第23题 球部尿道损伤尿外渗的最佳处理为

- A 应用抗生素
- B 留置导尿
- C 外渗部位多处切开引流
- D 局部穿刺抽液
- E 观察

正确答案：C 您选择的答案：

第24题 肾损伤施行排泄性尿路造影和CT检查不能了解

- A 肾实质碎裂部位和程度
- B 患肾和健肾的功能
- C 肾内有无血块阻塞
- D 肾动脉阻塞是否完全
- E 造影剂有无外溢

正确答案：D 您选择的答案：

第25题 关于肾损伤而无血尿的原因，下列哪项是错误的

- A 贯通肾盂肾盏的肾实质损伤
- B 肾盂广泛裂伤使尿流受阻
- C 合并输尿管断裂致血尿转流尿路外
- D 肾蒂血管损伤，血液到不了尿路
- E 输尿管被血块或组织碎块阻塞

正确答案：A 您选择的答案：

第26题 大多数肾损伤采取的治疗方法

- A 肾切除术
- B 部分肾切除术
- C 肾周引流术
- D 非手术治疗
- E 肾修补术

正确答案：D 您选择的答案：

第27题 下列哪种检查部适用于肾损伤

- A 逆行肾盂造影
- B 大剂量静脉肾盂造影
- C B超检查
- D CT检查
- E 肾动脉造影

正确答案：A 您选择的答案：

第28题 肾损伤非手术疗法应除外

- A 抗休克治疗
- B 密切观察
- C 应用止血剂，止痛和镇静剂
- D 抗感染治疗
- E 血尿转清后即可下床活动

正确答案：E 您选择的答案：

第29题 下列哪项不是肾损伤施行肾动脉造影的适应证

- A 伤侧肾脏不显影
- B 疑有肾动脉血栓形成
- C 疑有肾动脉静脉瘘
- D 疑有肾挫伤
- E 疑有创伤性肾动脉瘤

正确答案：D 您选择的答案：

第30题 下列哪种情况可采取非手术治疗

- A 肾挫伤

- B. 严重肾部分裂伤
- C. 肾全层裂伤
- D. 肾蒂裂伤
- E. 肾裂伤合并输尿管损伤

正确答案：A 您选择的答案：

第31题 闭合性肾损伤必须绝对卧床休息

- A. 到休克纠正后
- B. 到血尿转清后
- C. 腰部肿块不再增大
- D. 1周
- E. 2~4周

正确答案：E 您选择的答案：

第32题 下列哪种症状，体征和检查可确诊为后尿道完全断裂

- A. 会阴部血肿
- B. 下腹及骨盆部皮下淤斑
- C. 骨盆挤压痛
- D. 插导尿管不能进入膀胱
- E. 尿道造影，见造影剂外溢于后尿道周围未进入膀胱

正确答案：E 您选择的答案：

第33题 关于排泄性尿路造影对诊断肾损伤的价值，下列哪项是错误的

- A. 可显示对侧肾功能
- B. 可发现患肾造影剂排泄减少
- C. 可发现肾、腰大肌影消失
- D. 可有造影剂外渗
- E. 可显示肾挫伤

正确答案：E 您选择的答案：

第34题 后尿道损伤最常见的后期并发症是

- A. 尿道直肠瘘
- B. 直肠损伤
- C. 尿外渗
- D. 尿道狭窄
- E. 阳痿

正确答案：D 您选择的答案：

第35题 下列哪项不是肾损伤的晚期病理或病理生理改变

- A. 尿囊肿
- B. 肾积水
- C. 动静脉瘘
- D. 肾血管性高血压
- E. 肾周血肿

正确答案：E 您选择的答案：

第36题 后尿道损伤最常见的原因是

- A. 尿道器械检查
- B. 骑跨伤
- C. 刀伤
- D. 骨盆骨折
- E. 手术损伤

正确答案：D 您选择的答案：

第37题 泌尿系损伤常见的器官是

- A. 阴茎
- B. 尿道
- C. 膀胱
- D. 输尿管
- E. 肾

正确答案：B 您选择的答案：

第38题 外伤性尿道狭窄早期的最佳治疗是

- A. 服用抗生素
- B. 定期尿道扩张
- C. 理疗
- D. 经尿道冷刀切开
- E. 尿道吻合术

正确答案：B 您选择的答案：

第39题 肾损伤最严重的病理类型是

- A. 肾挫伤
- B. 表浅肾皮质裂伤
- C. 肾实质深度裂伤
- D. 肾脏横断或碎裂伤
- E. 肾蒂损伤

正确答案：E 您选择的答案：

第40题 骨盆骨折最易损伤的尿道部位

- A. 阴茎部

- B 球部
- C 膜部
- D 前列腺部
- E 膀胱颈部

正确答案：C 您选择的答案：

第41题 肾损伤密切观察过程中哪项不应手术治疗

- A 抗休克治疗不好转
- B 观察过程中发现有合并脏器损伤
- C 血尿愈来愈加重
- D 尿仍存在，但血压在上升
- E 腹部包块愈来愈大

正确答案：D 您选择的答案：

第42题 若对侧肾功能正常，肾损伤肾切除的指征是

- A．肾下极裂伤
- B．肾上极裂伤
- C．肾背缘全层裂伤
- D．肾挫伤
- E．肾严重碎裂伤或肾血管撕裂

正确答案：E 您选择的答案：

第43题 闭合性肾损伤保守治疗，须绝对卧床休息到

- A．休克纠正后
- B．血尿转清
- C．腹部肿块不再增大
- D．至少2～3天
- E．至少2～4周

正确答案：E 您选择的答案：

第44题 泌尿系统损伤最常见的部位是

- A．肾脏
- B．输尿管上段
- C．输尿管下段
- D．膀胱
- E．尿道

正确答案：E 您选择的答案：

第45题 关于肾损伤时出现血尿，下列哪项是错误的

- A．肾损伤患者大多有血尿
- B．血尿与损伤程度一致
- C．肾挫伤时可出现少量血尿
- D．严重肾裂伤一般呈大量肉眼血尿
- E．肾蒂血管断裂可以无血尿

正确答案：B 您选择的答案：

第46题 肾脏损伤漏诊的主要原因常是

- A．无血尿症状
- B．血液流向肾外
- C．合并其他脏器损伤
- D．尿液外溢至肾周
- E．合并感染

正确答案：C 您选择的答案：

第47题 关于尿外渗，下列哪项是错误的

- A．尿外渗也称尿痿
- B．尿外渗尿液存在于尿路以外的组织间隙或体腔中
- C．尿外渗可引起组织坏死、感染和脓毒血症
- D．尿外渗可引起尿性囊肿
- E．明显尿外渗时需切开引流

正确答案：A 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第48题 男，28岁。骑跨伤8小时，排尿困难，尿道口流血，排尿时会阴部疼痛加重。体检：阴囊明显肿大，有血尿外渗，尿管不能插入，其最佳的处理方法

- A 以金属导尿管导尿
- B 立即施行尿道修补
- C 行尿道会师
- D 耻骨上膀胱造瘘
- E 施行尿道修补和引流积血尿外渗

正确答案：E 您选择的答案：

第49题 18岁男性患者，骑跨伤后，尿道外口少量滴血，可以排尿。最佳处理是

- A．尿道修补术
- B．应用抗生素，留置导尿管
- C．尿道会师术
- D．耻骨上膀胱造瘘

E. 清除会阴血肿

正确答案：B 您选择的答案：

第50题 男性，27岁，骑跨伤后，尿道外口少量滴血，可以排尿。最佳处理是

A. 耻骨上膀胱造瘘

B. 尿道会师术

C. 尿道修补术

D. 应用抗生素，插尿管1周

E. 清除会阴部血肿

正确答案：D 您选择的答案：

第51题 男，30岁。从高处跌下，左腰部着地，伤后腰痛并有肉眼全程血尿，有小血块，查：BP110 / 70mmHg，P：100次 / 分；左腰部青紫压痛，腹部无压痛反跳痛，可初步诊断为

A 膀胱损伤

B 输尿管损伤

C 脾损伤并肾损伤

D 肾损伤

E 肾挫伤

正确答案：D 您选择的答案：

第52题 男，22岁。因打架被他人用刀从左腰部刺入体内，伤后血尿，腹痛，伤口流血不止2小时来院。查：BP100 / 70mmHg，P100次 / 分，左腰三角处伤口4cm长，深度约7~8cm，伤口流出新鲜血，触全腹痛，肌紧张，患者输血补液，采取最佳治疗方案

A 腰部切口进入探查肾脏和腹腔脏器

B 腰部切口进入探查肾脏

C 经腹切口探查腹腔脏器及阻断肾蒂后探查肾脏

D 经腹切口探查腹腔脏器及肾脏

E 输血补液密切观察治疗

正确答案：C 您选择的答案：

第53题 男，27岁。因墙倒被压骨盆骨折10小时来院，查：BP 80 / 50mmHg，P110次 / 分，全身擦皮伤，骨盆处淤斑重，当地插入导尿管留出新鲜血性液体400ml，膀胱仍胀满，肛门指检：可触及浮动的前列腺，该患者最佳治疗

A 继续留置导尿管

B 立即行膀胱造瘘

C 抗休克下观察，如休克很快纠正可做尿道探查，根据情况采取尿道会师或缝合治疗，如休克不易纠正在抗休克下做膀胱造瘘

D 抗休克下行膀胱造瘘或尿道缝合

E 立即行尿道会师或尿道缝合术

正确答案：C 您选择的答案：

第54题 男性，21岁，骑跨伤后，尿道口滴血，不能排尿，试插尿管失败，最佳处理是

A. 耻骨上膀胱造瘘

B. 尿道会师术

C. 金属尿管导尿

D. 尿外渗多处切开引流

E. 尿道修补术

正确答案：E 您选择的答案：

第55题 男，25岁。骑跨伤8小时，排尿困难，尿道口流血，排尿时会阴部疼痛加重。体检：阴囊明显肿大，有血尿外渗，尿管不能插入，最佳的处理方法是

A. 以金属导尿管导尿

B. 立即施行尿道修补

C. 行尿道会师

D. 耻骨上膀胱造瘘

E. 施行尿道修补和引流积血及外渗的尿液

正确答案：E 您选择的答案：

第56题 男性，23岁，砸伤1小时，血压110 / 70mmHg，神志清醒，不能排尿，下腹膨隆，尿道口少量滴血，X线示骨盆骨折，最佳处理是

A. 金属导尿管导尿

B. 耻骨上高位膀胱造瘘

C. 尿道修补术

D. 药物治疗

E. 下腹部理疗

正确答案：B 您选择的答案：

第57题 男，38岁。从车上摔下骨盆骨折，不能排尿8小时。查：抬入病室，BP110 / 70mmHg，P：90次 / 分，有肠指检可触之浮动的前列腺，直肠前壁触之痛，下腹触之胀大的膀胱，该患者最佳治疗选择

A 尿道会师术

B 膀胱造瘘术

C 输血补液下探查尿道缝合或会师术

D 急行尿道修补术

E 留置导尿

正确答案：C 您选择的答案：

第58题 男，23岁。因骑跨伤4小时，排尿通畅但尿道痛。查：会阴部有青紫淤斑，无血肿，尿道口有血迹。该患者的治疗方法最好选择

A 留置导尿2周

B 抗炎对症治疗

C 尿道探查

- D 留置导尿1周
E 耻骨上膀胱造瘘

正确答案：B 您选择的答案：

第59题 男，46岁。左腰部撞伤后，即刻面色苍白，脉细弱，BP：70 / 50mmHg，左腰膨隆，腹平软无压痛，导出150ml 淡黄色透明尿液，快速输血800ml 无好转，诊断哪种损伤较确切

- A 脾破裂
B 肠破裂
C 肾重度损伤
D 肾中度损伤
E 肾蒂损伤

正确答案：E 您选择的答案：

第60题 男，42岁。被车撞伤致骨盆骨折，不能排尿一天。查：抬入病室，BP70 / 50mmHg，P120次 / 分，该患者入院后紧急治疗最好方法

- A 尿道会师术
B 膀胱造瘘术
C 抗休克治疗后膀胱造瘘术
D 止痛止血镇静消炎
E 尿道缝合术

正确答案：C 您选择的答案：

第61题 男，26岁。骑跨伤后4天，排尿困难，尿道口仍流血。体检：体温38.5，阴囊明显肿大青紫，能触有波动感；下腹可触到胀大膀胱最佳治疗应是

- A 立即行双腔尿管导尿并留置
B 立即用金属尿管导尿
C 立即行尿道修补术
D 立即行尿道会师术
E 耻骨上膀胱造瘘及引流会阴部积血尿外渗

正确答案：E 您选择的答案：

第62题 男，35岁。车从骨盆压过6小时来院。查BP 100 / 70mmHg，P98次 / 分，骨盆及下腹淤斑，下腹及全腹有压痛，右下腹抽吸出血性液体，色淡红，下腹没触及膀胱，直肠指诊前列腺浮动，尿管不能插入膀胱，可诊为后尿道断裂，膀胱破裂，最佳治疗

- A 立即膀胱修补和膀胱造瘘
B 立即行膀胱修补和尿道会师或尿道缝合
C 输血补液下行膀胱修补
D 输血补液下行膀胱修补，根据情况尿道行会师或缝合术
E 输血补液下行尿道会师或修补，膀胱留置尿管等待愈合

正确答案：D 您选择的答案：

第63题 男，21岁。骑自行车摔在右腰部，伤后腰部痛，无肉眼血尿。查：尿常规：红细胞充满 / HP，血压，脉搏正常，右腰部无包块，但叩击痛，诊断哪种损伤确切

- A 重度肾损伤
B 肾挫伤
C 中度肾损伤
D 肾血管损伤
E 输尿管损伤

正确答案：B 您选择的答案：

第64题 男性，18岁，车祸后半小时，血压80 / 50mmHg，神志模糊，下腹膨隆，不能自主排尿，尿道口有少量滴血，最先考虑的处理是

- A 立即导尿
B 膀胱穿刺造瘘
C 抗休克治疗
D 尿道会师术
E 耻骨上穿刺放尿

正确答案：C 您选择的答案：

第65题 男，36岁。被车撞在左腰部和上腹部，伤后血尿伴血块，全腹痛8小时来院。查左腰部触痛，全腹有压痛，左十一肋骨有骨折，BP：100 / 70mmHg，P：92次 / 分，以左肾外伤入院，入院后输血400ml，血尿有所减轻，右下腹抽出不凝血，B超发现脾有裂伤，左肾裂伤，右肾正常，该患者应立即采取最好治疗方法

- A 经腹探查肾同时探查脾
B 经十一肋间探查肾，经腹探查脾
C 经腹探查脾并经腹行肾切除
D 行腹腔引流并继续输血
E 经腹探查脾，先阻断肾蒂后探查肾脏

正确答案：E 您选择的答案：

第66题 男，28岁。被车撞伤在左腰部，伤后腰部痛，全程血尿伴血块8小时。BP70/50mmHgP120次/分，左腰部包块季肋下5指并触痛，经输血800ml 血压仅上升80/60mmHg，尿色无改变，左腰部肿块增大，B超为肾裂伤，对侧肾正常，该患者应立即采取的最佳治疗方法是

- A 快速输血补液
B 经11肋间切口行肾切除术
C 经腹行肾切除术
D 继续输血下经腹行肾切除术
E 继续输血下经腹先阻断肾蒂根据情况采取肾修补术、肾部分切除术或肾切除术

正确答案：E 您选择的答案：

第67题 男性，40岁，车祸引起尿道断裂，行尿道会师术，术后3个月尿道狭窄，排尿时尿液可从肛门排出。最佳处

理是

- A. 服用抗生素
- B. 立即修补直肠瘘口
- C. 膀胱造瘘
- D. 理疗
- E. 内镜切除瘢痕

正确答案：C 您选择的答案：

第68题 男，25岁。因骑跨伤4小时排尿困难来院。查：尿道口滴血，会阴青紫，皮下淤斑，在严密消毒下插入双腔导管流出正常尿液，该患者继续治疗的最佳方案

- A 继续留置导尿管留置2周，以后适当尿道扩张
- B 继续留置导尿管留置1周，以后适当尿道扩张
- C 手术施行尿道修补术
- D 耻骨上膀胱造瘘
- E 不留置导尿管让其自排

正确答案：B 您选择的答案：

第69题 男性，25岁，半小时前由5米高处跌下，左腰撞于石块。血压正常，尿常规红细胞++。最可能的诊断是

- A. 肾挫伤
- B. 肾皮质深部裂伤
- C. 肾碎裂伤
- D. 肾盂裂伤
- E. 肾蒂裂伤

正确答案：A 您选择的答案：

第70题 男性，40岁，1小时前腰部撞伤后出现大量肉眼血尿，血压85 / 50mmHg，拟行排泄性尿路造影，应选择

- A. 立即进行
- B. 2周后进行
- C. 肉眼血尿转淡后进行
- D. 休克纠正后进行
- E. 腰部肿块不再增大后施行

正确答案：D 您选择的答案：

第71题 男性，32岁，车祸后创伤急症患者，手术探查发现腹膜后巨大血肿，右肾下极严重裂伤，活动性出血，其处理是

- A. 右肾全切除
- B. 右肾部分切除
- C. 右肾修补
- D. 出血处纱布填塞止血
- E. 无需处理

正确答案：B 您选择的答案：

第72题 男，28岁。被车撞伤在左腰部，伤后腰部痛，全程血尿伴血块8小时。查：BP70 / 50mmHg，P：120次 / 分，左腰部包块季肋下5指并触痛，经输血800ml，血压仅上升到80 / 60mmHg，尿色无改变，左腰部肿块增大，B超为肾裂伤对侧肾正常，该患者应立即采取最佳治疗方法

- A 快速输血补液
- B 经十一肋间切口肾切除术
- C 经腹行肾切除术
- D 继续输血下经腹行肾切除术
- E 继续输血下经腹先阻断肾蒂探查肾脏根据情况采取肾修补，肾部分切除或肾切除术

正确答案：E 您选择的答案：

三、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第73-75题

男，25岁。会阴部不慎骑跨在钢管上，立即出现尿道口滴血，之后不能排尿，发生尿潴留，体检发现，会阴部，阴茎和阴囊明显肿胀

1. 对该患者的初步诊断

- A. 悬垂部尿道损伤
- B. 球部尿道损伤
- C. 后尿道损伤
- D. 膜部尿道损伤
- E. 前列腺部尿道损伤

2. 对该患者诊断考虑为尿道断裂，但无尿外渗，若试行留置导尿失败，应作哪项处理

- A. 耻骨上膀胱造瘘
 - B. 耻骨上膀胱穿刺造瘘
 - C. 以金属导尿管导尿
 - D. 会阴血肿清除+尿道断端吻合
 - E. 尿道会师
3. 若患者术后3周发生排尿困难，尿线变细，可作哪项处理
- A. 尿道扩张
 - B. 尿道会师术
 - C. 经会阴部瘢痕切除尿道吻合术
 - D. 经尿道镜尿道内切开术
 - E. 膀胱造瘘术

正确答案：BDA 您选择的答案：

第76-79题

男性，19岁，腰部被刺后出现休克症状，伤口持续溢出淡红色液体，血压96 / 60mmHg，脉搏100次 / 分，左上腹有触痛，但无肌紧张和反跳痛。

1. 最可能的诊断是

- A. 脾破裂
- B. 胃穿孔
- C. 肾损伤
- D. 肠破裂
- E. 胰损伤

2. 为明确诊断应采用

- A. 腹腔穿刺
- B. 钡餐检查
- C. 钡剂灌肠
- D. 排泄性尿路造影
- E. 伤口溢出液作淀粉酶测定

3. 本病例的处理应是

- A. 保守治疗
- B. 立即手术探查
- C. 再次出现休克时手术探查
- D. 出现肉眼血尿时手术探查
- E. 出现腹膜炎时手术探查

4. 如需手术治疗，应采用

- A. 脾切除术
- B. 胃修补或胃大部切除术
- C. 肠修补术
- D. 胰部分切除术
- E. 肾修补或肾切除术

正确答案：CDBE 您选择的答案：

第80-83题

男，25岁。下船时，会阴部骑跨在船沿上，立即出现尿道口滴血，之后不能排尿，发生尿潴留，体检发现，会阴部，阴茎和阴囊明显肿胀

1. 对该患者的初步诊断

- A. 前尿道损伤
- B. 球部尿道损伤
- C. 后尿道损伤
- D. 膜部尿道损伤
- E. 前列腺部尿道损伤

2. 对该患者诊断考虑为：球部尿道断裂，但无尿外渗，应做哪项处理

- A. 耻骨上膀胱造瘘
- B. 耻骨上膀胱穿刺造瘘
- C. 留置导尿
- D. 会阴血肿清除+尿道断端吻合
- E. 尿道会师

3. 若患者术后3周发生排尿困难，尿线变细，可做哪项处理

- A. 尿道扩张
- B. 尿道会师术
- C. 经会阴部尿道切除吻合
- D. 经尿道镜狭窄切除术
- E. 膀胱造瘘术

4. 该患行会阴血肿清除加尿道端端吻合术后3周，拔导尿管后能自行排尿，但不久出现手术切口处肿痛，逐渐出现会阴

部伤口漏尿，考虑最可能原因

- A. 吻合口愈合不佳
- B. 术后伤口感染
- C. 尿道吻合口远端狭窄
- D. 尿路感染
- E. 合并尿道直肠瘘

正确答案：BDAB 您选择的答案：

第84-87题

男，32岁。因汽车从骨盆压过不能排尿4小时，抬入诊室。查体：BP：70 / 50-mmHg，P：120次 / 分，膀胱位于脐耻之间，小腹及骨盆处皮下淤血。直肠指诊可触之浮动的前列腺，输血补液后血压上升不明显

1. 该患者诊断哪种病

- A. 球部尿道损伤
- B. 骨盆骨折并后尿道损伤
- C. 骨盆骨折并膜部尿道损伤
- D. 膀胱损伤
- E. 前列腺部尿道损伤

2. 该患者尿外渗的部位

- A. 三角韧带内
- B. 会阴浅袋
- C. 腹壁浅筋膜
- D. 腹腔内
- E. 膀胱前列腺周围腹膜外

3. 该患者最好的治疗是

- A. 立即高位膀胱造瘘
- B. 立即低位膀胱造瘘
- C. 留置导尿管
- D. 经会阴尿道切开尿道吻合
- E. 尿道复位术

4. 该患者术后尿道狭窄再手术的最短时间是

- A. 2周
- B. 一个月
- C. 二个月
- D. 3~6个月
- E. 一年以上

正确答案：CEAD 您选择的答案：

第88-90题

男性，29岁，1小时前跌倒时会阴部撞击于硬物上，欲尿不能，不久出现阴茎、阴囊、会阴和下腹壁肿胀。

1. 患者受伤后出现的上述病症的原因是

- A. 血肿
- B. 水肿
- C. 炎性肿胀
- D. 尿外渗
- E. 腹水漏出

2. 下列哪层组织或筋膜损伤方可出现上述病症

- A. 阴茎筋膜
- B. 会阴浅筋膜
- C. 腹壁浅筋膜
- D. 尿生殖隔
- E. 膀胱直肠中隔

3. 此患者的治疗应是

- A. 热敷
- B. 冷敷
- C. 穿刺抽液
- D. 切开引流
- E. 加压包扎

正确答案：DAD 您选择的答案：

第91-92题

青年男性，车祸致骨盆骨折，排尿困难，且每当排尿时有尿液自肛门流出，病程2周。

1. 应诊断为

- A. 后尿道损伤
- B. 尿道直肠瘘
- C. 膀胱直肠瘘
- D. 后尿道损伤并尿道直肠瘘
- E. 后尿道损伤并膀胱直肠瘘

2. 当前应如何处理

- A. 耻骨上膀胱造瘘
- B. 结肠造瘘
- C. 尿道会师
- D. 尿道直肠修补
- E. 膀胱造瘘+结肠造瘘

正确答案：DE 您选择的答案：

四、A4型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第93-96题

男性，40岁，因倒塌围墙砸伤下腹部3小时，神志清醒，尿道口滴血，不能自主排尿，下腹部疼痛，局部肌肉紧张，会阴部肿胀，X线片示骨盆骨折。

1. 最可能的诊断是

- A. 前尿道损伤
- B. 后尿道损伤
- C. 会阴外伤
- D. 膀胱破裂
- E. 肠道外伤

2. 为明确诊断，最适宜的检查是

- A. 试插导尿管
- B. 尿道造影
- C. 尿道镜
- D. 膀胱镜
- E. 膀胱穿刺抽液

3. 若查血压90/50mmHg，心率105次/分。本患者最应采取的治疗是

- A. 高位膀胱造瘘术
- B. 膀胱穿刺抽尿
- C. 尿道会师术
- D. 尿道修补术
- E. 导尿术

4. 若此患者施行尿道会师术，则留置导尿管的时间应是

- A. 1~2周
- B. 2~3周
- C. 3~4周
- D. 3个月
- E. 6个月

正确答案：BBAC 您选择的答案：

五、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与

问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第97-100题

A. 1周

B. 2~4周

C. 6周

D. 3个月

E. 3~6个月

1. 肾挫裂伤绝对卧床休息时间为

2. 前尿道裂伤，尿管引流时间为

3. 后尿道断裂术后若不能恢复排尿，二次手术时间为

4. 尿道直肠瘘修补术应在尿道外伤后

正确答案：BADE 您选择的答案：

第101-104题

A. 肾切除术

B. 血管修复术

C. 选择性肾动脉栓塞术

D. 部分肾切除术

E. 肾脏修补术

1. 肾下极严重裂伤可施行

2. 对侧肾良好，伤肾严重肾积水，可施行

3. 对侧肾良好，患侧肾严重碎裂，可行

4. 对侧肾良好，患侧肾动脉损伤，可施行

正确答案：DAAB 您选择的答案：

第105-107题

A. 肾部分裂伤

B. 肾一极严重裂伤

C. 全肾广泛裂伤

D. 开放性肾损伤，伤口漏尿、污染

E. 肾挫伤

1. 肾切除适用于

2. 肾部分切除适用于

3. 清创引流术适用于

正确答案：CBD 您选择的答案：

第108-111题

A. 1周

B. 2~4周

C. 6周

D. 3个月

E. 4~6月

1. 肾挫裂伤绝对卧床休息时间为

2. 前尿道裂伤，尿管引流时间为

3. 后尿道断裂，膀胱造瘘管留置时间为

4. 尿道直肠瘘修补术在尿道外伤后

正确答案：BADE 您选择的答案：

习题集 外科学 泌尿系统梗阻

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 下列哪项不是成年人常见的泌尿系统梗阻原因

- A. 先天畸形
- B. 结石
- C. 损伤
- D. 肿瘤
- E. 结核

正确答案：A 您选择的答案：

第2题 B超检查证实肾积水，IVP未能清除显示。若进一步检查，下列哪项不能直接显示肾积水

- A. 大剂量造影剂静脉连续滴注造影
- B. 推注造影剂后延迟24~36小时摄片
- C. 逆行肾盂造影
- D. 腹部X线平片
- E. CT

正确答案：D 您选择的答案：

第3题 前列腺增生出现临床症状的年龄常在多少岁以后

- A. 40岁
- B. 50岁
- C. 55岁
- D. 60岁
- E. 65岁

正确答案：B 您选择的答案：

第4题 前列腺增生最重要的症状是

- A. 尿频
- B. 血尿
- C. 尿潴留
- D. 进行性排尿困难
- E. 肾积水

正确答案：D 您选择的答案：

第5题 若要检查前列腺是否突入膀胱，下列哪项检查无助于诊断

- A. 膀胱造影
- B. 膀胱镜检查
- C. B超
- D. CT
- E. 直肠指诊

正确答案：E 您选择的答案：

第6题 前列腺增生与神经源性膀胱功能障碍的明确鉴别需依靠

- A. 有无排尿困难或尿潴留
- B. 残余尿量测定
- C. 有无肾积水和肾功能不全
- D. 有无充盈性尿失禁
- E. 尿流动力学检查

正确答案：E 您选择的答案：

第7题 关于前列腺增生诊断时行尿流率检查，下列哪项是错误的

- A. 可以测定排尿时膀胱内压的改变
- B. 最大尿流率 $<15\text{ml}/\text{秒}$ 即说明排尿不畅
- C. 最大尿流率 $<10\text{ml}/\text{秒}$ 则梗阻严重必须治疗
- D. 最大尿流率不恒定
- E. 评估最大尿流率时，排尿量必须超过 150ml

正确答案：A 您选择的答案：

第8题 前列腺增生与前列腺癌的鉴别依据是

- A. 发病年龄
- B. 排尿困难程度
- C. 残余尿量
- D. 血清PSA及前列腺穿刺活检
- E. 膀胱造影

正确答案：D 您选择的答案：

第9题 前列腺增生患者行前列腺切除术，是切除

- A. 前列腺增生的部分
- B. 整个前列腺腺体
- C. 前列腺的中央带
- D. 前列腺的外周带
- E. 尿道尿道周围的组织

正确答案：A 您选择的答案：

第10题 关于前列腺及其增生，下列哪项是错误的

- A. 前列腺增生患者多在50岁以上出现临床

B. 前列腺大小与尿流梗阻的程度不一定呈正比
C. 增生部分的位置与梗阻程度密切相关
D. 前列腺增生的起始部位是移行带
E. 残余尿量并不能表示梗阻严重程度
正确答案：E 您选择的答案：

第11题 泌尿系统梗阻最危险的是
A. 肾小球滤过率降低，尿量减少
B. 肾血流量减少
C. 细菌直接进入血循环
D. 肾浓缩能力受损
E. 肾酸化能力受损
正确答案：C 您选择的答案：

第12题 关于前列腺增生，下列哪项是正确的
A. 前列腺增生是指细胞增多但不增大
B. 男性自30岁时即可有不同程度的增生
C. 多在45岁以后出现临床症状
D. 前列腺的正常发育可不依赖雄激素
E. 良性前列腺增生的病因已经明确
正确答案：A 您选择的答案：

第13题 治疗前列腺增生的药物中，可使前列腺缩小的是
A. 哌唑嗪
B. 特拉唑嗪
C. 非那雄胺
D. 坦索罗辛
E. 雌激素
正确答案：C 您选择的答案：

第14题 下列哪项不是膀胱颈部梗阻的原因
A. 前列腺增生
B. 纤维化
C. 肿瘤
D. 结石
E. 膀胱调节功能障碍
正确答案：E 您选择的答案：

第15题 前列腺增生症伴尿潴留，首先考虑的处理方法是
A. 导尿一次拔除导尿管
B. 导尿并保留导尿管
C. 耻骨上膀胱穿刺排尿
D. 用金属导尿管导尿
E. 急诊行膀胱造瘘
正确答案：B 您选择的答案：

第16题 肾积水时行尿路造影检查，下列哪项是错误的
A. 在肾积水的诊断中有重要价值
B. IVP出现浓的肾影是急性梗阻的特点
C. 肾穿刺造影可了解分侧肾功能
D. IVP检查有时需要将造影剂增加2~3倍
E. MRI水成像可代替逆行造影
正确答案：C 您选择的答案：

第17题 同时双侧上尿路梗阻，若持续存在，下列哪项不是所导致的后果
A. 肾积水
B. 肾实质萎缩
C. 肾功能损害
D. 肾功能衰竭
E. 膀胱输尿管返流
正确答案：E 您选择的答案：

第18题 前列腺增生症，最主要的症状是
A. 血尿
B. 排尿痛
C. 进行性排尿困难
D. 会阴疼痛和便秘
E. 尿流中断
正确答案：C 您选择的答案：

第19题 下列哪项是大剂量延缓排泄性尿路造影的适应证
A. 怀疑一侧输尿管被结扎者
B. 逆行肾盂造影有禁忌者
C. 肾积水一般造影剂不能显示者
D. 有碘过敏病史者
E. 肾功能衰竭时
正确答案：C 您选择的答案：

第20题 前列腺增生患者，最大尿流率在下列哪项数值之内，即说明排尿不畅
A. <30ml / 秒

- B. <25ml / 秒
- C. <20ml / 秒
- D. <15ml / 秒
- E. <10ml / 秒

正确答案：D 您选择的答案：

第21题 泌尿系统梗阻引起的基本病理改变是

- A. 尿路管壁压力升高
- B. 梗阻以上的尿路扩张
- C. 尿路管壁增厚
- D. 尿路管壁变薄
- E. 尿路管壁压力减退

正确答案：B 您选择的答案：

第22题 泌尿系统梗阻引起的基本病理改变是

- A. 梗阻以上的尿路扩张
- B. 容易诱发感染
- C. 可以促使结石形成
- D. 肾积水
- E. 肾功能受损

正确答案：A 您选择的答案：

第23题 关于急性尿潴留的治疗，下列哪项是错误的

- A. 导尿是急性尿潴留时最常用的方法
- B. 导尿应迅速排空尿液
- C. 导尿应遵循无菌操作
- D. 若排尿一时难以恢复，应留置导尿管
- E. 不能插入导尿管者，应行膀胱造瘘

正确答案：B 您选择的答案：

第24题 前列腺增生可导致下列变化，除外

- A. 前列腺尿道弯曲
- B. 前列腺尿道伸长
- C. 前列腺尿道受压变窄
- D. 精阜下移接近外括约肌
- E. 膀胱颈平滑肌松弛

正确答案：E 您选择的答案：

第25题 关于泌尿系统梗阻，下列哪项是错误的

- A. 肿瘤、炎症都可引起肾积水
- B. 肾盂输尿管交界处梗阻可因异位血管造成
- C. 肾下垂可引起肾积水
- D. 多囊肾的梗阻部位在肾小管
- E. 海绵肾不是泌尿系统梗阻性疾病

正确答案：E 您选择的答案：

第26题 前列腺增生症手术切除部位应是

- A. 受压迫而狭窄的后尿道
- B. 全部前列腺
- C. 前列腺增生部分
- D. 前列腺增生部分和前列腺外科包膜
- E. 后尿道和精阜

正确答案：C 您选择的答案：

第27题 前列腺增生可使膀胱出现下列变化，除了

- A. 逼尿肌收缩力增强
- B. 逼尿肌收缩力减弱
- C. 不稳定的逼尿肌收缩
- D. 膀胱输尿管返流
- E. 过多残余尿导致压力性尿失禁

正确答案：E 您选择的答案：

第28题 肾积水最理想的治疗是

- A. 减少饮水
- B. 去除病因，保留患肾
- C. 使用保肾药物，防止肾功能损害
- D. 肾切除术
- E. 肾造瘘术

正确答案：B 您选择的答案：

第29题 前列腺增生症与神经原膀胱鉴别，除了神经原膀胱有其他相应的神经损害症状外，其他两者区别，前者有

- A. 排尿困难
- B. 可合并感染
- C. 尿潴留
- D. 肾积水
- E. 可合并结石

正确答案：C 您选择的答案：

第30题 前列腺增生产生梗阻的程度取决于

- A. 前列腺增生的程度

B. 前列腺增生部分的部位
C. 前列腺增生的组成成分
D. 膀胱是否出现小梁
E. 膀胱是否出现假憩室
正确答案：B 您选择的答案：

第31题 尿道梗阻的最常见原因是
A. 尿道结石
B. 结核
C. 尿道肿瘤
D. 尿道狭窄
E. 尿道瓣膜
正确答案：D 您选择的答案：

第32题 老年男性泌尿系统梗阻最常见的原因是
A. 尿道狭窄
B. 膀胱颈硬化
C. 前列腺增生
D. 膀胱结石
E. 神经性膀胱尿道功能障碍
正确答案：C 您选择的答案：

第33题 泌尿系梗阻一段时间未能解除，肾内“安全阀”开放时，下列哪项变化不会出现
A. 肾盏在穹隆部出现小裂隙
B. 肾盂内尿液静脉回流
C. 肾盂内尿液淋巴回流
D. 肾盂内尿液经肾窦渗至肾周
E. 肾盂内尿液进入输尿管
正确答案：E 您选择的答案：

第34题 对前列腺中叶增生的检查，下述哪项无助于诊断
A. 膀胱镜检查
B. 直肠指诊
C. 膀胱造影
D. CT
E. B超
正确答案：B 您选择的答案：

第35题 关于B超在前列腺诊断中的作用，下列哪项是错误的
A. 可以测量前列腺体积
B. 测得的前列腺体积不如直肠指诊准确
C. 可以观察前列腺内部结构
D. 可以测定膀胱残余尿
E. 可以测定前列腺是否突入膀胱
正确答案：B 您选择的答案：

第36题 关于泌尿系统梗阻后肾功能的改变下列哪一项是错误的
A. 肾小球滤过率降低
B. 肾血管受压，血流量减少
C. 尿浓缩能力下降
D. 尿的酸化能力受损害
E. 尿稀释能力下降
正确答案：E 您选择的答案：

第37题 关于肾积水，下列哪项是错误的
A. 可造成肾实质萎缩
B. 肾实质萎缩的原因是肾盂内持续高压压迫肾乳头和肾组织缺氧
C. 急性完全性上尿路梗阻可引起巨大肾积水
D. 肾积水有时间歇性发作
E. 妊娠时的肾积水是一种生理状态
正确答案：C 您选择的答案：

第38题 不能测定分侧肾功能的检查有
A. 排泄性尿路造影
B. MRI水成像
C. 放射性核素肾图
D. 放射性核素肾滤过显像
E. 膀胱镜下分肾导尿检查
正确答案：B 您选择的答案：

第39题 前列腺增生尿潴留，膀胱过胀，尿液自尿道口溢出，成为
A. 压力性尿失禁
B. 神经性尿失禁
C. 充溢性尿失禁
D. 松弛性尿失禁
E. 痉挛性尿失禁
正确答案：C 您选择的答案：

第40题 关于前列腺的病理，下列哪项是错误的

- A. 良性前列腺增生起始于移行带
- B. 正常前列腺外周带占3 / 4
- C. 正常前列腺中央带占1 / 4
- D. 正常前列腺移行带占5%
- E. 中央带围绕尿道精阜

正确答案：E 您选择的答案：

第41题 关于前列腺，下列哪项是错误的

- A. 前列腺分为移行带、外周带和中央带
- B. 前列腺癌多起源于外周带
- C. 前列腺增生结节的类型有基质型、腺泡型和混合型
- D. 增生的前列腺将外周带压扁形成假包膜
- E. 尿流梗阻程度与腺体增生程度呈正比

正确答案：E 您选择的答案：

第42题 老年男性病人，最常见的泌尿系统梗阻原因是

- A. 尿道狭窄
- B. 膀胱结石
- C. 前列腺增生
- D. 膀胱肿瘤
- E. 神经源性膀胱调节功能障碍

正确答案：C 您选择的答案：

第43题 泌尿系统梗阻后在肾脏的功能变化方面受影响最小的是

- A. 肾小球滤过率降低
- B. 肾血流量减少
- C. 尿稀释能力
- D. 尿酸化能力
- E. 尿浓缩能力

正确答案：C 您选择的答案：

第44题 前列腺增生梗阻症状主要决定于

- A. 前列腺增生的部位
- B. 前列腺体积大小
- C. 患者年龄
- D. 前列腺硬度
- E. 有无并发癌

正确答案：A 您选择的答案：

第45题 输尿管梗阻最常见的原因是

- A. 结石
- B. 炎症
- C. 结核
- D. 肿瘤
- E. 腹膜后纤维化

正确答案：A 您选择的答案：

第46题 肾积水最理想的治疗是

- A. 抗生素控制感染，利尿
- B. 先用保肾药物，防止肾功能损害
- C. 去除病因，保留患肾
- D. 肾造瘘术
- E. 肾切除术

正确答案：C 您选择的答案：

第47题 前列腺增生最初出现的症状常是

- A. 尿频
- B. 尿急
- C. 排尿困难
- D. 尿潴留
- E. 血尿

正确答案：A 您选择的答案：

第48题 前列腺增生症鉴别诊断下列哪项无意义

- A. 前列腺癌和膀胱癌
- B. 神经源性膀胱
- C. 膀胱颈硬化
- D. 前列腺炎
- E. 尿道狭窄

正确答案：D 您选择的答案：

第49题 关于泌尿系统梗阻下列哪项是错误的

- A. 泌尿系统持续梗阻终将导致肾积水
- B. 膀胱以上梗阻一般仅一侧肾受影响
- C. 膀胱以下梗阻一般累及双侧肾脏
- D. 膀胱以下梗阻对肾影响较快
- E. 泌尿系统自肾至包皮口，任何部位都可发生梗阻

正确答案：D 您选择的答案：

第50题 前列腺增生症状与哪项无关

A 梗阻的程度
B 病变发展的速度
C 合并膀胱炎症
D 合并膀胱结石
E 前列腺增生体积大小
正确答案：E 您选择的答案：

第51题 急性尿潴留的治疗，哪项是错误的
A 留置导尿
B 耻骨上膀胱穿刺抽吸尿液
C 耻骨上膀胱穿刺造瘘
D 应用利尿药
E 耻骨上膀胱切开造瘘
正确答案：D 您选择的答案：

第52题 前列腺增生症，残余尿过多，使膀胱失去收缩能力，膀胱过度膨胀，尿不自主从尿道口充出，称为
A 压力性尿失禁
B 充盈性尿失禁
C 急迫性尿失禁
D 真性尿失禁
E 尿淋漓
正确答案：B 您选择的答案：

第53题 造成多囊肾、海绵肾、尿酸肾病的梗阻部位在
A 肾小管
B 肾小盏
C 肾盂
D 输尿管
E 肾盂输尿管交界处
正确答案：A 您选择的答案：

第54题 关于肾积水时行尿路造影检查，下列哪项是错误的
A 有重要诊断价值
B IVP可了解尿路形态及肾脏功能
C IVP典型表现之一是肾盂肾盏扩张
D IVP不显影时可行逆行尿路造影
E 出现浓的肾影是慢性梗阻的特点
正确答案：E 您选择的答案：

第55题 有关泌尿系梗阻，下列哪一项是错误的
A 膀胱以上梗阻肾积水进展快
B 膀胱以上梗阻一般仅累及一侧肾
C 膀胱以下梗阻对肾影响更快
D 膀胱以下梗阻可累及双侧肾
E 泌尿系任何部位都可发生梗阻，梗阻持续加重，均可导致肾功能损害
正确答案：C 您选择的答案：

第56题 关于尿流动力学检查在前列腺增生诊断中的作用，下列哪项是错误的
A 可判断是否存在下尿路梗阻及梗阻的程度
B 可判断前列腺是否突入膀胱
C 可鉴别前列腺增生与神经源性膀胱
D 是确定手术适应证的重要依据
E 是手术后观察疗效的重要指标
正确答案：B 您选择的答案：

第57题 关于妊娠期间的肾积水，下列哪项是错误的
A 正常妊娠期间常有轻度肾、输尿管积水
B 与妊娠子宫压迫有关
C 与妊娠期黄体酮分泌有关
D 是一种生理状态
E 几乎都发生在左侧
正确答案：E 您选择的答案：

第58题 关于急性尿潴留，下列哪项是错误的
A 病因分机械性和动力性因素
B 急性尿潴留又称尿闭
C 治疗原则是解除病因，恢复排尿
D 导尿是治疗急性尿潴留的最常用方法
E 导尿时应使尿液缓慢排出
正确答案：B 您选择的答案：

第59题 前列腺增生出现的症状不决定于
A 前列腺尿路梗阻的程度
B 前列腺增生的程度
C 病变发展的速度
D 是否合并感染
E 是否合并结石
正确答案：B 您选择的答案：

第60题 前列腺增生的起始部位是

- A. 移行带
- B. 中央带
- C. 外周带
- D. 前纤维肌区域
- E. 射精管周围区域

正确答案：A 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第61题 男性，70岁，进行性排尿困难5年余，并经常发生急性尿潴留。直肠指诊：前列腺高度增大，中央沟消失，残余尿300ml。3个月前因心肌梗死住院。血生化检查：尿素氮11mmol/L。肌酐146μmol/L。目前应采取的治疗为

- A. 前列腺切除术
- B. 插入导尿管或膀胱造瘘引流尿液
- C. 中医治疗
- D. 女性激素治疗
- E. 前列腺热疗

正确答案：B 您选择的答案：

第62题 男，72岁。排尿困难5年，夜尿4~5次。直肠指检可触及前列腺增生^Ⅱ，B超可查残余尿220ml，双肾中度积水，血Cr 360μmol/L，尿常规：白细胞20~30个/HP，此患者目前选择哪项治疗方法最佳

- A. 经耻骨后前列腺切除术
- B. 膀胱造瘘术
- C. 留置导尿
- D. 药物治疗
- E. 经膀胱前列腺切除术

正确答案：C 您选择的答案：

第63题 男性，62岁，左腰痛、发热1周。查体：体温39.5℃，左腰部肿物压痛明显。B超：右肾萎缩，左肾中度积水。血常规：白细胞 $1.8 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞90%。血生化：血肌酐320μmol/L。此时首选治疗方法是

- A. 血液透析
- B. 左肾切除术
- C. 右肾切除术
- D. 左肾造瘘术
- E. 右肾造瘘术

正确答案：D 您选择的答案：

第64题 男，78岁。排尿困难2年，曾有尿潴留病史，查：BP 160/105mmHg，心电图有陈旧性心梗；肛诊前列腺^I°增生，B超双肾正常，前列腺面积18cm²，尿常规白细胞3~5个/HP，最佳治疗是

- A. 经膀胱前列腺切除术
- B. 经耻骨后前列腺切除术
- C. 膀胱造瘘
- D. 经尿道前列腺切除术
- E. 药物治疗

正确答案：D 您选择的答案：

第65题 男性，34岁，左腰部剧痛1天，尿常规示红细胞(+++)，B超提示左肾积水。肾积水的原因最可能是

- A. 左肾结核
- B. 左输尿管结石
- C. 左肾肿瘤
- D. 肾盂输尿管连接部狭窄
- E. 左输尿管肿瘤

正确答案：B 您选择的答案：

第66题 女性，32岁，右输尿管结石并右肾中度积水1周。当肾内"安全阀"开放时，下列哪项是错误的

- A. 肾盂淋巴返流
- B. 肾盂静脉返流
- C. 肾盂肾囊返流
- D. 肾盂肾小球返流
- E. 肾盂肾小管返流

正确答案：D 您选择的答案：

第67题 男性，53岁，夜尿频1年，无尿潴留史。直肠指诊：前列腺略大，质韧，中央沟变浅。B超残余尿量10ml。适宜的治疗是

- A. 前列腺摘除术
- B. 前列腺尿道支架
- C. 经尿道前列腺电切术
- D. 应用α受体阻滞剂改善排尿症状
- E. 膀胱造瘘术

正确答案：D 您选择的答案：

第68题 男，72岁。排尿困难2年，有终末排尿痛，1月前因尿潴留，留置导尿7天，拔除尿管后仍排尿困难。肛诊前列腺^Ⅱ°增生；B超可见中叶向膀胱内突出4cm左右，膀胱内有结石3cm，双肾无积水，心肝功好，其最佳治疗

- A. 耻骨后膀胱外前列腺切除术
- B. 经膀胱前列腺切除术
- C. 膀胱造瘘
- D. 前列腺尿道支架网置入
- E. 留置导尿管

正确答案：B 您选择的答案：

第69题 男性，65岁，多年来排尿困难，伴有便秘。检查：下腹胀大，尿检正常，残余尿500ml，直肠指诊：前列腺增大，表面光滑，中央沟消失，肛门括约肌松弛，下肢及会阴部感觉异常，下肢运动障碍。应诊断为

- A. 前列腺增生
- B. 膀胱颈挛缩
- C. 前列腺增生合并神经性膀胱功能障碍
- D. 前列腺癌
- E. 神经源性膀胱功能障碍

正确答案：C 您选择的答案：

第70题 男，76岁。排尿困难3年，多次尿潴留，每次导尿后拔除尿管仍不能排尿，现留置导尿管。查：肛门指诊前列腺增大，弹性硬；B超：双肾无积水，前列腺增大，患者不能平卧，心功不全，长期慢性气管炎病史，该患最佳治疗方法是

- A. 耻骨后膀胱前列腺切除术
- B. 经膀胱前列腺切除术
- C. 经尿道前列腺电切除
- D. 局麻下膀胱造瘘双睾丸切除术
- E. 继续留置导尿

正确答案：D 您选择的答案：

第71题 男性，77岁，排尿不畅8年，反复发生尿潴留，多次留置导尿。查体：膀胱上界达脐下2指，直肠指诊前列腺明显增大，质韧，中间沟消失。化验血肌酐 $240\mu\text{mol/L}$ 。下列哪项处理是错误的

- A. 先留置尿管引流
- B. 先用 α 受体阻滞剂改善排尿功能
- C. 应行尿动力学检查
- D. 肾功能改善后可行经尿道前列腺电切术
- E. 腹部B超检查

正确答案：B 您选择的答案：

第72题 男性，30岁，排尿困难1年余，逐渐加重，现尿流滴沥不能成线。2年前有骨盆骨折史。排尿困难的最可能原因是

- A. 前列腺增生
- B. 膀胱损伤
- C. 尿道结石
- D. 尿道狭窄
- E. 包茎

正确答案：D 您选择的答案：

第73题 男性，12岁，发现左腹部渐膨隆1年。体检：左中上腹部隆起，可扪及肿块巨大，有波动感。B超检查：左肾巨大积水，肾皮质菲薄。IVP：左肾不显影，右肾显影正常。逆行肾盂造影：左输尿管肾盂交界处狭窄。应考虑下列哪项治疗

- A. 肾切除术
- B. 肾造瘘术
- C. 输尿管狭窄段切除+肾盂成型术
- D. 输尿管造瘘术
- E. 逆行输尿管肾盂插管引流

正确答案：C 您选择的答案：

第74题 男性，70岁，诊断为良性前列腺增生、慢性尿潴留合并尿路感染、肾功能损害。血尿素氮 14.3mmol/L ，肌酐 $265.2\mu\text{mol/L}$ 。应采取下列哪项措施

- A. 女性激素治疗
- B. 持续导尿及女性激素治疗
- C. 永久性耻骨上膀胱造瘘术
- D. 前列腺切除术
- E. 持续导尿情况改善后行前列腺切除术

正确答案：E 您选择的答案：

第75题 男性，5岁，2周来每次排尿时剧烈疼痛，尿液滴沥不能成线，尿末血尿。4小时前出现急性尿潴留。体检：体温 39°C ，尿道口无狭窄，膀胱胀大平脐。X线平片显示后尿道黄豆大小结石影。尿常规：脓细胞 $20\sim 30$ 个/HP，红细胞 $12\sim 15$ 个/HP。诊断为后尿道结石嵌顿，急性尿潴留合并尿路感染。首先应进行的处理是

- A. 耻骨上膀胱切开取石，抗感染治疗
- B. 将结石推回膀胱，持续导尿，抗感染治疗
- C. 尿道切开取石
- D. 经尿道钳夹取石
- E. 解痉、利尿、抗感染治疗

正确答案：B 您选择的答案：

第76题 男，67岁。渐进性排尿困难3年，夜尿5~6次，直肠指检：前列腺增大，光滑弹性硬，中间沟消失，血Cr： $100\mu\text{mol/L}$ 。B超：残余尿200ml，前列腺侧叶增大，中叶无明显增长，心脏、肝功正常，尿常规正常，此患者治疗应采用

- A. 经膀胱前列腺切除术
- B. 经耻骨后前列腺切除术
- C. 膀胱造瘘术
- D. 药物治疗
- E. 前列腺尿道网状支架

正确答案：B 您选择的答案：

第77题 男性，40岁，反复发作阴茎包皮炎2年，不能自解小便1天。查体：膀胱胀大于脐下2指；阴茎包皮过长，包

茎，包皮口针眼状。当前对该患者最合适的处理是

- A. 导尿
- B. 包皮环切
- C. 包皮口切开
- D. 前列腺切除
- E. 膀胱造瘘

正确答案：B 您选择的答案：

第78题 男，68岁。5年来有尿频及排尿困难。查：肛诊查前列腺 2cm×3cm 大，B超：双肾正常，前列腺28cm²，残余尿200ml，BPI 60 / 100mmHg；无心肺疾病，理想的治疗方法是

- A. α受体阻滞剂
- B. 留置导尿
- C. 双睾丸切除，膀胱造瘘
- D. 前列腺尿道留网支架
- E. 前列腺切除术

正确答案：E 您选择的答案：

三、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第79-81题

男，63岁。因渐进性排尿困难，夜尿增多就诊，医生询问病史后给患者做检查

1. 关于直肠指诊，下述哪项不正确

- A. 直肠指检在排尿后进行
- B. 前列腺位于直肠前壁外
- C. 了解肛管括约肌功能
- D. 了解前列腺大小，质地，有无结节及中间沟情况
- E. 直肠指检前列腺越大梗阻症状越重

2. 该患需测残余尿，下列方法中哪项损伤小，最简便并反复测定

- A. 排尿后导尿
- B. 排尿后B超
- C. 膀胱镜检查
- D. 膀胱造瘘
- E. 排尿性尿路造影

3. 前列腺增生症的治疗方法很多，下列哪项治疗适合该患

- A. 根据全身情况及梗阻程度及前列腺增生部位选择治疗方法
- B. 药物治疗为主
- C. 手术并连同前列腺包膜一同切除
- D. 经尿道前列腺切除术
- E. 激光等热疗治疗无效

正确答案：EBA 您选择的答案：

第82-86题

男，68岁，进行性排尿困难5年，尿潴留留置导尿3次，1年前曾测残余尿量100ml。查体：下腹胀膨，浊音界在脐下2指，右侧腹股沟区有一包块，肿块突入阴囊可以还纳。

1. 该患者的主要诊断是

- A. 腹股沟疝
- B. 尿道狭窄
- C. 前列腺增生
- D. 膀胱结石
- E. 神经源性膀胱功能障碍

2. 该患者右侧腹股沟区包块为并发症，其诊断为

- A. 右侧腹股沟区血肿
- B. 睾丸鞘膜积液
- C. 腹股沟斜疝
- D. 腹股沟直疝
- E. 腹股沟囊肿

3. 首先的治疗措施是

- A. 膀胱穿刺造瘘
- B. 5α还原酶抑制剂
- C. 留置导尿
- D. 将腹股沟包块还纳
- E. 给予利尿剂

4. 若经检查患者需要手术，理想的治疗方法是

- A. 腹股沟疝修补术
- B. 前列腺摘除术
- C. 经尿道前列腺电切术
- D. 前列腺尿道支架
- E. 前列腺高温治疗

5. 假设需作前列腺切除术，手术是在假包膜内切除前列腺的增生部分，关于假包膜的形成正确的解释是

- A. 增生的前列腺体将外周带腺体压扁形成
- B. 增生的前列腺体将中央带腺体压扁形成
- C. 增生的前列腺体将移行带腺体压扁形成
- D. 正常前列腺周围即存在该包膜
- E. 由周围脂肪组织形成

正确答案：CCCCA 您选择的答案：

第87-89题

男性，60岁，进行性排尿困难3年。查体：贫血貌，面部水肿，双肾未扪及，肾区无叩痛。直肠指诊：肛门括约肌紧张度正常，前列腺中度增大，表面光滑，无结节，中央沟消失。尿流率检查提示下尿路梗阻严重。B超测得膀胱残余尿135ml。血生化检查：肌酐 $930\mu\text{mol/L}$ 。

1. 诊断应首先考虑

- A. 前列腺癌
- B. 神经源性膀胱功能障碍
- C. 前列腺增生
- D. 膀胱颈挛缩
- E. 慢性前列腺炎

2. 目前最佳治疗方案是

- A. 留置导尿持续引流尿液
- B. 雌激素治疗
- C. 前列腺切除术
- D. 膀胱穿刺抽尿
- E. 肾造瘘

3. 最理想的治疗是

- A. 微波治疗
- B. 雌激素治疗
- C. 去势疗法
- D. 应用保列治
- E. 前列腺切除术

正确答案：CAE 您选择的答案：

第90-92题

男性，68岁。因患前列腺增生症，排尿困难，需手术治疗

1. 在前列腺手术指征中，下列哪种情况不是绝对手术指征

- A. 膀胱残余超过50ml
- B. 有尿潴留史
- C. 伴膀胱结石
- D. 心、肺和肾功能耐受手术
- E. 前列腺明显增大

2. 该患者，不需与哪个疾病鉴别

- A. 膀胱颈硬化
- B. 膀胱炎
- C. 前列腺癌
- D. 神经源性膀胱
- E. 膀胱癌

3. 现患者残余尿200ml，以中叶大为主，心肺肾功能好，最好采用哪种治疗

- A. 经尿道切除前列腺
- B. 药物治疗
- C. 膀胱造瘘
- D. 热疗
- E. 经膀胱耻骨上前列腺切除术

正确答案：EBE 您选择的答案：

第93-94题

男性，63岁，与家人团聚喝烈性酒后，小便不能自解12小时，体检发现膀胱区明显膨隆。有排尿犹豫，夜尿增多病史3年。

1. 最可能的诊断是

- A. 尿道结石
- B. 尿道口狭窄
- C. 包茎
- D. 膀胱结石
- E. 前列腺增生

2. 当前最合适的处理是

- A. 插入并留置硅胶导尿管
- B. 耻骨上膀胱穿刺抽尿
- C. 耻骨上膀胱穿刺造瘘
- D. 立即行前列腺切除
- E. 口服 α 受体阻滞剂

正确答案：EA 您选择的答案：

第95-97题

女性，30岁，突发左腰痛伴间歇性高热、寒战3天，查体温 39.8°C 。尿常规：白细胞 $10\sim 12$ 个/HP。血常规：白细胞 $12.0\times 10^9/\text{L}$ ，中性91%。B超：左肾中度积水，左输尿管上段扩张。IVP检查：左肾显影时间延长，左肾中度积水，肾盏显影模糊，输尿管中段可见 $1.0\text{cm}\times 1.2\text{cm}$ 大小高密度结石影一枚。输尿管未显影。

1. 此患者不考虑下列哪项诊断

- A. 输尿管结石
- B. 肾积水
- C. 肾功能衰竭
- D. 肾积脓
- E. 菌血症

2. 首先应考虑的外科治疗是

- A. 输尿管切开取石术
- B. 经皮穿刺肾造瘘术
- C. 肾切除术
- D. 输尿管造瘘术
- E. 逆行输尿管肾盂插管引流

3. 此患者不考虑进行下列哪项检查

- A. 逆行肾盂造影
- B. 血生化
- C. 尿常规
- D. 尿细菌培养
- E. 血培养

正确答案：CBA 您选择的答案：

第98-99题

男性，20岁，因发热、呕吐、腰痛2天入院，自幼有排尿困难史。体检：贫血貌，双肾可扪及并有叩痛，膀胱胀大平脐，包皮口狭窄如针眼状。血清肌酐 $312.0\mu\text{mol/L}$ 。B超：双肾积水，肾皮质菲薄。

1. 引起肾功能损害的直接原因是

- A. 发热、水分丢失
- B. 呕吐、失水
- C. 结石梗阻感染
- D. 前列腺增生
- E. 包皮口狭窄

2. 最佳治疗方案是

- A. 包皮口扩大术
- B. 包皮环切术
- C. 导尿
- D. 膀胱造瘘术
- E. 肾造瘘术

正确答案：EB 您选择的答案：

四、A4型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第100-103题

男性，8岁，发现右腰腹部肿块1年，排尿可，无任何不适，当地医院检查诊断为先天性肾盂输尿管交界处狭窄，右肾积水。

1. 先天性肾盂输尿管交界处狭窄的病因应除外

- A. 迷走血管压迫
- B. 纤维索带压迫
- C. 输尿管管腔狭窄
- D. 输尿管肾盂高位连接
- E. 炎症性输尿管狭窄

2. 若对此患者进一步检查，最具诊断意义的检查是

- A. 同位素肾图
- B. 肾动脉造影
- C. IVP或逆行造影
- D. B超
- E. 经皮肾穿刺造影

3. 若IVP提示右肾并不显影，左肾功能形态正常，此患者最好采取下列哪项治疗

- A. 肾切除
- B. 肾部分切除
- C. 肾造瘘
- D. 肾盂输尿管成型
- E. 无需治疗

4. 若决定对此患者行肾盂输尿管成形术，则治疗原则应除外

- A. 凡有梗阻存在，应解除梗阻
- B. 最大限度保护肾功能
- C. 保护肾血供
- D. 凡对侧肾功能良好者，均可行肾切除
- E. 保证良好的尿液引流

正确答案：ECDD 您选择的答案：

第104-107题

男性，66岁，进行性排尿困难5年，不能自主排尿1天。半年前B超检查：残余尿量85ml。体检：下腹膨隆，浊音界位于脐下1指，右侧腹股沟区有一囊性包块，可还纳。

1. 该患者的主要诊断应考虑

- A. 腹股沟疝
- B. 尿道狭窄
- C. 前列腺增生
- D. 膀胱结石
- E. 膀胱颈挛缩

2. 尿液引流后，首先进行的检查是

- A. B超检查
- B. CT检查
- C. 膀胱镜检查
- D. 直肠指诊检查
- E. 尿流动力学检查

3. 经检查患者心肺肝肾功能良好，理想的治疗方法是

- A. α 受体阻滞剂
- B. 5 α 还原酶抑制剂
- C. 前列腺切除术
- D. 前列腺尿道支架
- E. 前列腺热疗

4. 关于前列腺假包膜的形成正确的是

- A. 增生的前列腺将中央带腺体压扁形成
- B. 增生的前列腺将外周带腺体压扁形成
- C. 增生的前列腺将移行带腺体压扁形成
- D. 正常前列腺周围即存在该包膜
- E. 由周围纤维组织形成

正确答案：CDCB 您选择的答案：

五、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第108-112题

- A. 中央带
- B. 外周带
- C. 移行带
- D. 前纤维基质区
- E. 逼尿肌
- 1. 前列腺增生起源于
- 2. 前列腺癌起源于
- 3. 形成前列腺假包膜的是
- 4. 围绕尿道精阜部位的腺体是
- 5. 射精管通过的部位是

正确答案：CBBCA 您选择的答案：

第113-115题

- A. 结石
- B. 结核
- C. 肿瘤
- D. 狭窄
- E. 先天性后尿道瓣膜
- 1. 输尿管梗阻最常见的原因是
- 2. 成人尿道梗阻最常见的原因是
- 3. 男性婴儿尿道梗阻的重要原因是

正确答案：ADE 您选择的答案：

第116-119题

- A. 结石，损伤，肿瘤或结核
- B. 盆腔内疾病
- C. 先天性畸形
- D. 前列腺增生症
- E. 包皮过长
- 1. 小儿泌尿系梗阻常见原因是
- 2. 成人泌尿系梗阻常见原因
- 3. 妇女泌尿等梗阻常见原因
- 4. 老年男性泌尿系梗阻常见原因

正确答案：CABD 您选择的答案：

第120-123题

- A. 结石
- B. 缺氧
- C. 肿瘤
- D. 狭窄
- E. 先天性后尿瓣膜
- 1. 输尿管梗阻最常见的原因是
- 2. 成人尿道梗阻最常见的原因是
- 3. 男婴尿道梗阻最常见的原因是
- 4. 肾积水时肾实质萎缩的原因是

正确答案：ADEB 您选择的答案：

习题集 外科学 泌尿、男生殖系统肿瘤

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 关于睾丸肿瘤标记物质检查，下列哪项是错误的

- A. 精原细胞瘤大多数HCG阳性
- B. 主要是aFP和HCG
- C. 有助于临床分期
- D. 有助于判断组织学性质
- E. 有助于预后估计和早期发现复发

正确答案：A 您选择的答案：

第2题 治疗早期精原细胞瘤应

- A. 手术切除
- B. 手术切除及术后放疗或化疗
- C. 放射治疗
- D. 先放射治疗再手术切除
- E. 手术切除睾丸并行腹膜后淋巴结清扫

正确答案：B 您选择的答案：

第3题 膀胱原位癌若细胞分化不良或已有浸润时的治疗是

- A. 经尿道膀胱肿瘤电切术
- B. 膀胱部分切除术
- C. 膀胱全切除术
- D. 膀胱灌注化疗
- E. 化疗 + 放疗

正确答案：C 您选择的答案：

第4题 关于前列腺癌，下列哪项是错误的

- A. 绝大多数是腺癌
- B. 多发生在老年人
- C. 常从尿道周围腺体发生
- D. 局限在包膜内的肿瘤可行根治性前列腺切除术
- E. 激素依赖型癌，后期可发为非激素依赖型

正确答案：C 您选择的答案：

第5题 若考虑行保留肾组织的局部切除术，肾癌直径应小于

- A. 1cm
- B. 2cm
- C. 3cm
- D. 4cm
- E. 5cm

正确答案：C 您选择的答案：

第6题 关于膀胱肿瘤的病理，下列哪项是错误的

- A. 上皮性肿瘤占绝大多数
- B. 多数为移行细胞癌
- C. 肿瘤分化程度和浸润深度多为一致
- D. 肿瘤分布在三角区最多
- E. 肿瘤的扩散主要向深部浸润

正确答案：D 您选择的答案：

第7题 CT检查示膀胱肿瘤已浸润深肌层，这属于临床分期哪一期

- A. Tis
- B. T1
- C. T2
- D. T3
- E. T4

正确答案：D 您选择的答案：

第8题 对细胞分化良好的膀胱原位癌，治疗是

- A. 无需治疗，严密随访
- B. 药物灌注后严密随访
- C. 膀胱部分切除术
- D. 膀胱全切除术
- E. 化疗 + 放疗

正确答案：B 您选择的答案：

第9题 阴囊部肿瘤最常见的是

- A. 睾丸肿瘤
- B. 附睾肿瘤
- C. 输精管肿瘤
- D. 精索肿瘤
- E. 鞘膜肿瘤

正确答案：A 您选择的答案：

第10题 以下各项检查中，对确定膀胱肿瘤最可靠的是

- A. B型超声

- B. CT
- C. 膀胱镜检查+活检
- D. 尿细胞学检查
- E. 膀胱双合诊

正确答案：C 您选择的答案：

第11题 哪一种肾肿瘤应作肾、全输尿管和膀胱部分切除

- A. 肾癌
- B. 肾盂癌
- C. 肾错构瘤
- D. 肾胚胎瘤
- E. 肾肉瘤

正确答案：B 您选择的答案：

第12题 老年男性近期发生左侧精索静脉曲张，最可能的原因是

- A. 肾结核
- B. 睾丸肿瘤
- C. 肾积水
- D. 肾盂巨大结石
- E. 肾癌

正确答案：E 您选择的答案：

第13题 多发的T1期膀胱癌，治疗后多次复发，并伴恶性程度增高，应选择

- A. 经尿道肿瘤电切
- B. 经膀胱肿瘤切除
- C. 膀胱部分切除
- D. 膀胱全切除
- E. 膀胱灌注化疗

正确答案：D 您选择的答案：

第14题 关于膀胱癌，下列哪项是错误的

- A. 膀胱肿瘤切除后容易复发
- B. 复发的膀胱癌仍有可能治愈
- C. 保留膀胱的各种手术，2年内肿瘤复发率在50%以上
- D. 1年无复发者可酌情停止定期膀胱镜检查
- E. 肿瘤复发者约10%~15%有恶性程度增加趋势

正确答案：D 您选择的答案：

第15题 肾癌淋巴结转移最先到何处

- A. 主动旁淋巴结
- B. 腔静脉旁淋巴结
- C. 肾蒂淋巴结
- D. 腰淋巴结
- E. 髂淋巴结

正确答案：C 您选择的答案：

第16题 肾癌可出现下列临床表现，除了

- A. 血尿
- B. 肿块
- C. 肾绞痛
- D. 寒战高热
- E. 腰部钝痛

正确答案：D 您选择的答案：

第17题 诊断膀胱癌最主要检查方法是

- A. 尿脱落细胞检查
- B. 膀胱镜检查必要时活检
- C. 膀胱双合诊
- D. B超
- E. 静脉尿路造影

正确答案：B 您选择的答案：

第18题 确诊前列腺癌最可靠的方法是

- A. 直肠指诊
- B. 经直肠超声
- C. 血PSA测定
- D. 针吸细胞学或穿刺活组织检查
- E. MRI

正确答案：D 您选择的答案：

第19题 膀胱肿瘤行膀胱部分切除术的范围要求距离肿瘤边缘

- A. 0.5cm
- B. 1.0cm
- C. 1.5cm
- D. 2.0cm
- E. 2.5cm

正确答案：D 您选择的答案：

第20题 婴幼儿最常见的腹部肿瘤

- A. 透明细胞癌

- B. 畸胎瘤
- C. 肾母细胞瘤
- D. 肾上腺神经母细胞瘤
- E. 错构瘤

正确答案：C 您选择的答案：

第21题 浸润性肾盂癌，手术应切除肾及全长输尿管，包输尿管开口部位的膀胱壁，其理由是

- A. 防止残留输尿管坏死
- B. 防止残留输尿管感染
- C. 防止残留输尿管及其开口附近之膀胱壁发生同类型肿瘤
- D. 防止膀胱输尿管返流
- E. 防止残留输尿管结石

正确答案：C 您选择的答案：

第22题 阴茎癌最好的预防措施是

- A 每天外阴清洗
- B 治疗包皮龟头炎
- C 包皮环切术
- D 包皮背侧纵切开术
- E 应用抗生素

正确答案：C 您选择的答案：

第23题 无痛性血尿病人，尿脱落细胞检查发现移行上皮癌细胞，不可能的诊断是

- A. 肾癌
- B. 肾盂癌
- C. 输尿管癌
- D. 膀胱癌
- E. 尿道癌

正确答案：A 您选择的答案：

第24题 膀胱肿瘤最多发生的部位是

- A 膀胱三角区
- B 颈部
- C 两侧壁及后壁
- D 底部
- E 顶部

正确答案：C 您选择的答案：

第25题 在我国泌尿生殖系统肿瘤最常见的是

- A. 肾癌
- B. 肾盂癌
- C. 前列腺癌
- D. 膀胱癌
- E. 阴茎癌

正确答案：D 您选择的答案：

第26题 诊断前列腺癌的基本方法是

- A. CT
- B. MRI
- C. 全身核素骨扫描
- D. IVP
- E. 直肠指诊、经直肠超声和血PSA

正确答案：E 您选择的答案：

第27题 膀胱三角区有蒂乳头状瘤，治疗最好选择

- A. 放射治疗
- B. 经尿道肿瘤电切
- C. 膀胱部分切除
- D. 膀胱切开，肿瘤切除
- E. 膀胱全切除术

正确答案：B 您选择的答案：

第28题 血尿是下列哪种肿瘤的早期临床表现

- A. 肾癌
- B. 肾盂癌
- C. 肾肉瘤
- D. 肾母细胞瘤
- E. 肾错构瘤

正确答案：B 您选择的答案：

第29题 膀胱左侧壁有带蒂的乳头状肿瘤1.5cm，最佳的治疗方法

- A 膀胱部分切除术
- B 膀胱全切除术
- C 膀胱切开肿瘤单纯切除术
- D 经膀胱镜电切术
- E 经尿道灌注抗癌药物治疗

正确答案：D 您选择的答案：

第30题 膀胱肿瘤早期症状哪个是正确的

- A 镜下血尿

B 终末血尿
C 间歇性无痛性肉眼血尿终末加重
D 腰痛伴血尿
E 血尿伴膀胱刺激症状
正确答案：C 您选择的答案：

第31题 肾母细胞瘤的主要，临床特点是
A．无痛性肉眼血尿
B．腰部剧痛
C．高血压和发热
D．贫血和恶液质
E．虚弱婴幼儿腹部巨大包块
正确答案：E 您选择的答案：

第32题 有关膀胱肿瘤的扩散及转移，下列哪项是错误的
A．膀胱肿瘤的扩散主要是淋巴转移
B．浸润深肌层者几全部淋巴管内有癌细胞
C．浸润至膀胱周围组织时，多数已有远处淋巴结转移
D．血行转移多在晚期
E．细胞分化不良者容易发生转移
正确答案：A 您选择的答案：

第33题 小儿最常见的腹部肿瘤是
A．肾癌
B．肾盂癌
C．肾错构瘤
D．肾母细胞瘤
E．肾上腺神经母细胞瘤
正确答案：D 您选择的答案：

第34题 简单易行，常可发现尿道造影未出现改变的早期肿瘤的检查方法是
A．排泄性尿道造影
B．逆行性尿道造影
C．超声检查
D．CT检查
E．MRI检查
正确答案：C 您选择的答案：

第35题 T2期膀胱肿瘤浸润哪一层组织
A 粘膜层
B 固有层
C 浅肌层
D 深肌层
E 浆膜层
正确答案：C 您选择的答案：

第36题 关于肾肿瘤的病理，下列哪项是错误的
A．肾癌从肾小管上皮细胞发生
B．肾盂癌从肾盂上皮细胞发生
C．肾母细胞瘤由肾间质组成
D．肾癌局限在包膜内时恶性程度较小
E．肾盂的鳞状细胞癌多继发于尿石和感染
正确答案：C 您选择的答案：

第37题 关于睾丸肿瘤，下列哪项是错误的
A．是20～30岁年轻人最常见的实性肿瘤
B．生殖细胞肿瘤占90%～95%
C．多数睾丸肿瘤可早期发生血行转移
D．可以由多种成分组成
E．几乎都属于恶性
正确答案：C 您选择的答案：

第38题 肾癌主要的三大临床症状是
A．血尿、肿块和发热
B．血尿、疼痛和发热
C．血尿、肿块和疼痛
D．发热、疼痛和肿块
E．高血压、疼痛和发热
正确答案：C 您选择的答案：

第39题 右肾癌对侧正常治疗方法哪项正确
A 右肾切除
B 右肾部分切除
C 右肾切除输尿管切除膀胱部分切除术
D 抗肿瘤药物治疗
E 右肾连同肾被膜肾蒂淋巴结肾上腺切除，手术先结扎肾蒂血管
正确答案：E 您选择的答案：

第40题 肾盂肿瘤最常见的病理类型是
A．鳞状细胞癌

- B. 基底细胞癌
- C. 柱状上皮癌
- D. 腺癌
- E. 移行细胞乳头状肿瘤

正确答案：E 您选择的答案：

第41题 关于膀胱肿瘤出现的血尿症状，下列哪项是错误的

- A. 绝大多数以无痛性肉眼血尿出现
- B. 血尿可自行停止或减轻
- C. 分化良好的乳头状肿瘤可有严重血尿
- D. 分化不良的浸润性癌血尿可不严重
- E. 非上皮性肿瘤血尿一般较重

正确答案：E 您选择的答案：

第42题 睾丸肿瘤的主要临床特点是

- A. 发热
- B. 睾丸肿痛
- C. 睾丸硬结
- D. 睾丸肿大变形
- E. 睾丸肿大质硬有沉重感

正确答案：E 您选择的答案：

第43题 能早期发现骨转移灶的检查方法是

- A. B超
- B. CT
- C. MRI
- D. 骨骼X线检查
- E. 全身核素骨扫描

正确答案：E 您选择的答案：

第44题 下列哪项不是肾癌的肾外表现

- A. 高血压
- B. 红细胞增多症
- C. 发热
- D. 高血钙
- E. 咯血

正确答案：E 您选择的答案：

第45题 肾癌出现血尿时，说明肿瘤已发展到

- A. 穿破肾包膜
- B. 穿入肾盂肾盏
- C. 血行转移
- D. 淋巴转移
- E. 癌细胞种植于膀胱

正确答案：B 您选择的答案：

第46题 肾癌血尿特点，是

- A. 镜下血尿
- B. 肉眼血尿
- C. 持续性全程血尿
- D. 腰痛伴血尿
- E. 无痛性间歇性肉眼血尿

正确答案：E 您选择的答案：

第47题 肾癌的典型三大症状是

- A. 血尿、肿块和高血压
- B. 血尿、发热和疼痛
- C. 血尿、发热和高血压
- D. 血尿、肿块和疼痛
- E. 肿块、血沉快和高血压

正确答案：D 您选择的答案：

第48题 可确诊膀胱肿瘤的检查是

- A. B超检查
- B. 膀胱造影
- C. 流式细胞肌计检查
- D. 膀胱镜检查
- E. 尿脱落细胞检查

正确答案：D 您选择的答案：

第49题 关于睾丸肿瘤的病理，下列哪项是错误的

- A. 生殖细胞瘤占绝大多数
- B. 生殖细胞肿瘤又分为精原细胞瘤和非精原细胞瘤
- C. 多数睾丸肿瘤可早期发生淋巴转移
- D. 睾丸肿瘤多发生在青壮年
- E. 卵黄囊肿瘤多见于20岁左右的青年人

正确答案：E 您选择的答案：

第50题 临床发现早期肾癌最简便的方法是

- A. CT

- B. B超
- C. 排泄性尿路造影
- D. 腹部平片
- E. 尿常规

正确答案：B 您选择的答案：

第51题 膀胱内灌注药物治疗膀胱肿瘤，目前认为效果最好的是

- A. BCG
- B. 丝裂霉素
- C. 阿霉素(多柔比星)
- D. 塞替哌
- E. 羟基喜树碱

正确答案：A 您选择的答案：

第52题 肾母细胞瘤2 / 3的患儿发病年龄在几岁以内

- A. 1岁
- B. 2岁
- C. 3岁
- D. 4岁
- E. 5岁

正确答案：C 您选择的答案：

第53题 关于肾脏肿瘤，下列说法不正确的是

- A. 肾肿瘤多为恶性
- B. 任何肾肿瘤在组织学检查前都应疑为恶性
- C. 肾肿瘤在组织学上都源自肾实质
- D. 成人肾肿瘤中绝大多数为肾癌
- E. 成人恶性肿瘤中肾肿瘤仅占2%左右

正确答案：C 您选择的答案：

第54题 睾丸肿瘤分型哪项没有

- A. 精原细胞瘤
- B. 胚胎癌
- C. 畸胎瘤
- D. 畸胎瘤
- E. 乳头状癌

正确答案：E 您选择的答案：

第55题 睾丸肿瘤病检后诊为精原细胞瘤，其治疗方法应是

- A. 腹股沟淋巴结清除术
- B. 后腹膜淋巴结清除术
- C. 抗肿瘤药物治疗
- D. 深部放射治疗
- E. 性激素治疗

正确答案：D 您选择的答案：

第56题 肾癌未发现转移时，治疗应为

- A. 单纯肾切除
- B. 根治性肾切除
- C. 单纯肾切除+化疗
- D. 单纯性肾切除+放疗
- E. 单纯性肾切除+化疗+放疗

正确答案：B 您选择的答案：

第57题 决定膀胱癌预后的主要因素是

- A. 肿瘤的大小
- B. 肿瘤的数目
- C. 选择的治疗方法
- D. 手术者的水平
- E. 肿瘤病理和病人的免疫力

正确答案：E 您选择的答案：

第58题 凡保留膀胱的膀胱癌手术后，均需严密随访，其中最重要的是定期检查

- A. B超
- B. CT
- C. IVP
- D. 尿常规
- E. 膀胱镜

正确答案：E 您选择的答案：

第59题 泌尿系男生殖系肿瘤中哪个器官最常见

- A. 肾脏
- B. 膀胱
- C. 输尿管
- D. 睾丸
- E. 前列腺

正确答案：B 您选择的答案：

第60题 膀胱癌最常见的症状是

- A. 尿频

- B. 尿急
- C. 尿痛
- D. 排尿困难
- E. 无痛性肉眼血尿

正确答案：E 您选择的答案：

第61题 T3期膀胱肿瘤侵犯下列哪层组织

- A. 黏膜层
- B. 固有层
- C. 浅肌层
- D. 深肌层
- E. 膀胱临近组织

正确答案：D 您选择的答案：

第62题 膀胱原位癌的病变

- A. 达膀胱深肌层
- B. 达膀胱浅肌层
- C. 侵犯膀胱壁外组织
- D. 限于固有层以内
- E. 位于膀胱黏膜层内

正确答案：E 您选择的答案：

第63题 肾胚胎瘤最早出现的症状

- A. 腹痛
- B. 血尿
- C. 高血压
- D. 腹部包块
- E. 发热

正确答案：D 您选择的答案：

第64题 泌尿系统最常见的肿瘤是

- A. 肾癌
- B. 输尿管癌
- C. 膀胱癌
- D. 肾母细胞瘤
- E. 肾盂肿瘤

正确答案：C 您选择的答案：

第65题 关于肾癌，下列哪项是错误的

- A. 肾癌从肾小管上皮细胞发生
- B. 可有出血、坏死和钙化
- C. 有时呈多囊性
- D. 半数肾癌同时有两种细胞
- E. 无痛肉眼血尿是其早期症状

正确答案：E 您选择的答案：

第66题 有关膀胱原位癌，下列哪项是错误的

- A. 可在药物灌注后严密观察
- B. 均不需手术治疗
- C. 若癌细胞分化不良，可行膀胱全切除术
- D. 其中一部分可发展为浸润性癌
- E. 可长期无发展

正确答案：B 您选择的答案：

第67题 肾癌根治性切除是指

- A. 单纯肾切除
- B. 肾切除+部分输尿管切除
- C. 肾切除+全部输尿管切除
- D. 肾切除+全部输尿管切除+部分膀胱壁切
- E. 肾切除+肾周筋膜和脂肪、肾门淋巴结切除

正确答案：E 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第68题 男性，52岁，无痛性肉眼血尿1周，膀胱镜检查发现单发的直径1.2cm的膀胱右侧壁肿瘤，呈暗红色菜花状，宽蒂，活动度小。肿瘤边缘距左输尿管口1cm，应选择

- A. 经尿道肿瘤电切术
- B. 膀胱切开，肿瘤切除
- C. 膀胱部分切除术
- D. 膀胱部分切除及左输尿管膀胱吻合
- E. 膀胱全切除术

正确答案：D 您选择的答案：

第69题 男性，80岁，无明显临床症状。例行体检时肛门指诊：前列腺增大，质韧，中央沟消失，左侧叶可触及一个黄豆大小硬结。血清PSA20ng/ml 经直肠超声前列腺低回声灶，局限在前列腺内。前列腺穿刺活检：前列腺中分化腺癌。最适宜的治疗是

- A. 不作处理严密随访
- B. 根治性前列腺切除术

- C. 根治性前列腺切除术 + 抗雄治疗
D. 根治性前列腺切除术 + 放射治疗
E. 双侧睾丸切除 + 抗雄治疗 + 放射治疗
正确答案：E 您选择的答案：

第70题 男，历岁。间歇性无痛性肉眼血尿一年，近2个月左腰痛。膀胱镜检：膀胱见距输尿管口0.5cm，可见2.5cm乳头状肿瘤无蒂，静脉肾盂造影可见左肾轻度积水，输尿管全段轻度扩张，该患最佳治疗方案

- A. 膀胱部分切除
B. 膀胱部分切除+输尿管膀胱再植
C. 膀胱全切
D. 经尿道膀胱肿瘤电切术
E. 膀胱切开肿瘤单纯切除术
正确答案：B 您选择的答案：

第71题 男性，50岁，间断性无痛性肉眼血尿3个月余，膀胱镜检查发现膀胱左侧壁有直径约2cm大小绒毛样肿瘤，似水草样在水中漂浮。B超提示左侧壁肿瘤，约2.0cm×1.5cm大小，蒂细小，距左输尿管口3cm。CT可见膀胱壁完整。该病人最适合的治疗方法是

- A. 膀胱部分切除术
B. 膀胱部分切除+左输尿管膀胱吻合术
C. 膀胱切开肿瘤局部切除
D. 经尿道膀胱肿瘤切除术
E. 膀胱灌注化疗
正确答案：D 您选择的答案：

第72题 男性，55岁，无痛性肉眼血尿伴血块2个月余。尿中找到癌细胞。体检无异常。首先考虑下列哪一种肿瘤

- A. 肾癌
B. 肾盂癌
C. 输尿管癌
D. 膀胱癌
E. 尿道癌
正确答案：D 您选择的答案：

第73题 男，38岁。间歇性无痛性肉眼血尿4个月，查：膀胱镜见左输尿管口处上方1cm处有一带蒂的肿瘤约2.5cm2水草样改变，静脉肾盂造影上尿路正常。术中肿瘤注射噻替酚见肿物隆起，该患应采取最好方法

- A. 膀胱部分切除
B. 膀胱全切
C. 膀胱肿瘤单纯切除
D. 膀胱部分切除+左输尿管膀胱再植
E. 膀胱肿瘤单纯切除+左输尿管膀胱再植
正确答案：C 您选择的答案：

第74题 男，75岁。进行性排尿困难6个月，直肠指诊发现前列腺右侧有2cm×2cm硬结，一周后行PSA检查为]20ng/ml，核素全身骨扫描示骨盆及腰椎系统放射性浓聚区，诊断为前列腺癌骨转移，此患现最适宜的治疗是

- A. 根治性前列腺切除+放射治疗
B. 根治性前列腺切除+化疗
C. 根治性前列腺切除+盆腔淋巴结清扫
D. 前列腺切除+综合治疗
E. 双睾丸切除+抗雄性激素药物+放射治疗
正确答案：E 您选择的答案：

第75题 男性，62岁，无痛性肉眼血尿2个月。体检：两肾触诊不满意，左精索静脉曲张，平卧时不消失。首先考虑的诊断是

- A. 肾癌
B. 肾盂癌
C. 肾母细胞瘤
D. 输尿管癌
E. 膀胱癌
正确答案：A 您选择的答案：

第76题 男性，58岁。右腰痛2年，无痛性全程肉眼血尿3天，查：右肾区叩痛，右肾可触及季肋下3指，尿常规：红细胞充满/HP，肾盂静脉造影可见右肾中盏移位拉长变形，应诊断

- A. 肾癌
B. 肾囊肿
C. 肾结核
D. 肾盂癌
E. 肾胚胎瘤
正确答案：A 您选择的答案：

第77题 男，60岁。2年来出现间歇性无痛性全程肉眼血尿，终末加重，近半年来出现尿频，尿痛，3月来耻骨后痛，应诊断

- A. 膀胱炎
B. 前列腺增生症
C. 膀胱肿瘤
D. 膀胱结石
E. 肾结核
正确答案：C 您选择的答案：

第78题 男性，65岁，经影像学检查确诊为左肾癌，近1个月来出现左阴囊内精索静脉曲张，平卧不消失，最可能的原因是

- A. 原发性精索静脉曲张

- B. 肿瘤外在压迫精索内静脉
C. 下腔静脉癌栓
D. 肾静脉癌栓
E. 肾动脉癌栓

正确答案：D 您选择的答案：

第79题 男，47岁。间歇性无痛性肉眼血尿5个月，右腰痛2个月。查膀胱镜检见有膀胱三角区多个乳头状肿物，(0.5~1.0)cm2不等，右输尿管口处有一1.0cm肿物堵塞输尿管口，肾盂造影右肾积水。既往2年前曾因膀胱癌行膀胱部分切除术。该患治疗应采取的最佳方案

- A 膀胱部分切除
B 膀胱全切
C 膀胱切开肿瘤分别切除
D 膀胱部分切除右输尿管膀胱再植
E 经尿道膀胱肿瘤电切术

正确答案：B 您选择的答案：

第80题 男，48岁。间歇性肉眼血尿2月，消瘦低热，右腰酸痛。查体：体温37℃，脉搏80次/分，白细胞12000/mm3，血红蛋白75g/L，血压120/70mmHg，右肾区饱满有触痛。x线平片：右肾外形增大，有点絮状钙化。IVU右肾未显影；肾动脉造影，右肾中下极血管丰富，有肿瘤血管染色，应诊断

- A 右肾结核
B 右肾积水无功能
C 右肾囊肿
D 右肾肿瘤
E 右肾周围脓肿

正确答案：D 您选择的答案：

第81题 男，48岁。间歇性无痛性肉眼血尿3个月，膀胱镜检：膀胱内右输尿管口外方有1.0cm肿瘤，乳头状有蒂约0.2cm，静脉肾盂造影，双肾及输尿管正常，该患应采取的最佳治疗方法

- A 膀胱部发切除
B 膀胱切开肿瘤单纯切除
C 经尿道膀胱肿瘤电切术
D 膀胱部分切除+膀胱输尿管再植术
E 膀胱内灌注抗肿瘤治疗

正确答案：C 您选择的答案：

第82题 男，62岁。间歇性无痛性肉眼血尿4个月，伴蚯蚓状血块，膀胱镜检查：膀胱内未见肿瘤，见右输尿管口喷血。B超可见右肾轻度积水，下列哪项检查最好

- A CT
B 磁共振
C 肾盂镜检查
D 右肾盂输尿管逆行造影
E 右肾穿刺造影

正确答案：D 您选择的答案：

第83题 女性，67岁，间歇性无痛肉眼血尿6个月。体检：左肾肿大实质感。IVP：左肾影增大似新生儿头大小，肾盂肾盏未显示。膀胱镜检查：左输尿管口附近有2个黄豆大小乳头状肿瘤，活组织检查报告为移行上皮癌。膀胱双合诊：膀胱壁正常，能触及左输尿管末端增粗变硬。可能的诊断是

- A. 膀胱原位癌
B. 直肠癌累及膀胱
C. 膀胱浸润癌累及左输尿管
D. 左肾盂癌并发左输尿管癌及膀胱癌
E. 以上都不是

正确答案：D 您选择的答案：

第84题 男性，61岁，因复发性膀胱癌手术治疗2次。近2周来又出现肉眼血尿。膀胱镜检查：三角区有一2.5cm×3.0cm大小的菜花状肿瘤，基底宽，活检为移行细胞癌Ⅱ级。宜采用

- A. 经尿道膀胱肿瘤电切术
B. 膀胱部分切除术
C. 膀胱切开肿瘤剜除术
D. 膀胱全切除术
E. 放疗+化疗

正确答案：D 您选择的答案：

第85题 男，48岁。体检时发现右肾下有2cm×2cm占位病变，IVU尿路造影未见右肾盂肾盏形态改变；CT可诊断右肾下极恶性肿瘤，左肾正常形态和功能。下列治疗方案哪项正确

- A 根治性右肾切除
B 右肾切除
C 右肾部分切除
D 右肾动脉栓塞
E 右肾部分切除加放化疗

正确答案：A 您选择的答案：

第86题 男，52岁。间断无痛全程肉眼血尿3月，查：肾区无叩痛，尿检，红细胞充满/HP，膀胱镜未见异常，静脉尿路造影示右肾盂有充盈缺损，首先应考虑诊断为

- A 肾盂肾炎
B 肾结核
C 肾结石
D 肾囊肿
E 肾盂癌

正确答案：E 您选择的答案：

第87题 女性，46岁，无痛肉眼血尿10天，查体无异常。尿中找到肿瘤细胞，膀胱镜检查见右输尿管口喷血，最可能的诊断是

- A．肾癌
- B．肾盂癌
- C．肾胚胎瘤
- D．肾错构瘤
- E．多囊肾

正确答案：B 您选择的答案：

第88题 男性，50岁，间歇性无痛血尿3个月，经检查诊断为左侧肾癌。应考虑该患者是

- A．早期肾癌
- B．晚期肾癌
- C．肿瘤内出血
- D．肾癌已侵入肾盂、肾盂黏膜
- E．肾癌已侵入肾门

正确答案：D 您选择的答案：

第89题 男性，40岁，间歇无痛性全程肉眼血尿一年余，体检无异常。B超检查无异常。IVP：左肾盂有一小的充盈缺损，膀胱镜检查见左输尿管口喷血。最大的可能是

- A．肾癌
- B．输尿管癌
- C．肾盂癌
- D．多囊肾
- E．肾错构瘤

正确答案：C 您选择的答案：

第90题 男性，50岁，以突发性肉眼血尿就诊。体检：左腹可触及肿块，有轻压痛。肾盂造影可见左肾盂肾盏拉长、狭窄、受压变形。诊断首先考虑

- A．肾癌
- B．肾盂癌
- C．肾囊肿
- D．多囊肾
- E．肾结石

正确答案：A 您选择的答案：

第91题 男性，30岁，左阴囊内肿块半年。术后病理：精原细胞瘤。该患者的治疗下列哪项最合适

- A．经阴囊睾丸切除术
- B．经阴囊睾丸切除术+腹膜后放疗
- C．经阴囊睾丸切除术+腹膜后淋巴结清扫
- D．高位睾丸切除术+腹膜后放疗
- E．高位睾丸切除术+腹膜后淋巴结清扫

正确答案：D 您选择的答案：

三、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第92-93题

男性，50岁，间歇无痛肉眼血尿2个月，近3周出现低热。体检：右肾可扪及，轻叩痛。KUB：右肾影增大，不规则，右点状钙化影。IVP：右肾上盏充盈缺损，中盏弧形压迹。红细胞生成素增高。

1．最可能的诊断是

- A．肾癌
- B．肾盂癌
- C．肾结核
- D．输尿管癌
- E．肾错构瘤

2．治疗应选择

- A．右肾单纯切除术
- B．右肾切除+生物治疗
- C．右肾根治性切除术
- D．右肾部分切除术
- E．介入性放射治疗

正确答案：AC 您选择的答案：

第94-96题

男，66岁。无痛性肉眼血尿伴条状血块2个月，B超可见左肾轻度积水，2次细胞学检查未见癌细胞

1．为进一步诊治下列哪项检查最有价值

- A 血尿常规，肝，肾功能
- B 尿路平片和排泄性尿路造影
- C 膀胱镜检查
- D 膀胱造影
- E MRI

2．若检查发现左肾盂内似有充盈缺损，尿细胞学检查有可疑细胞，进一步选择什么方法检查

- A CT
- B MBI
- C IVU
- D 左肾逆行造影
- E 左肾穿刺造影

3．确诊为左肾盂癌并轻度肾积水，刷取活组织检查找到癌细胞，该患下列哪项错误

- A 肾移行细胞癌
- B 肾盂鳞癌
- C 早期可淋巴结转移
- D 根治性左肾切除
- E 肾腺癌

正确答案：BDE 您选择的答案：

第97-98题

男，49岁，间歇性无痛性全程肉眼血尿3个月。

1. 此患者不可能诊断为

- A. 膀胱癌
- B. 尿道癌
- C. 输尿管癌
- D. 肾盂癌
- E. 肾癌

2. 如诊断为肾癌，治疗应首选

- A. 肾动脉栓塞，使癌细胞缺血坏死
- B. 肾、输尿管及输尿管开口处膀胱壁切除，以达到根治目的
- C. 单纯肾切除+术后干扰素治疗
- D. 根治性肾切除术
- E. 术前化疗+手术，可提高存活率

正确答案：BD 您选择的答案：

第99-100题

男性，40岁，2年前因左肾盂癌已行左肾、输尿管及部分膀胱壁切除，近1个月来反复出现无痛性肉眼血尿，排尿不畅及尿频。

1. 诊断应首先考虑

- A. 右肾癌
- B. 右肾盂癌
- C. 右输尿管癌
- D. 膀胱癌
- E. 膀胱结核

2. 最有价值的检查是

- A. 膀胱尿道造影
- B. 排泄性尿道造影
- C. 腹部X线平片
- D. 膀胱镜检查
- E. B超

正确答案：DD 您选择的答案：

第101-102题

女，48岁。血尿一个月来诊。B超可见左肾4cm×4cm实质肿瘤。尿路造影见右肾正常，左肾肾盂肾盏显影，但肾盏拉长移位

1. 对该患者治疗方法最佳选择是

- A 肾切除后放疗
- B 肾切除+全输尿管+部分膀胱切除
- C 肾切除+肾周筋膜及肾蒂淋巴结，先结扎肾蒂
- D 肾切除
- E 放疗后再肾切除

2. 肾癌的细胞类型哪项是错误的

- A 透明细胞癌
- B 颗粒细胞癌
- C 移行细胞癌
- D 梭形细胞癌
- E 透明细胞+颗粒细胞

正确答案：CC 您选择的答案：

第103-105题

男，52岁。间歇性无痛性全程肉眼血尿半年，尿脱落细胞检查，可见恶性肿瘤细胞

1. 该患者的诊断，下述哪个是错误

- A 前列腺癌
- B 膀胱癌
- C 输尿管癌

- D 肾盂癌
- E 肾盏癌

2. 为进一步明确诊断，下列哪项检查意义不大

- A B超检查
- B CT检查
- C 膀胱镜检查
- D 尿路造影
- E 肾图

3. 检查后发现该患上尿路正常，左输尿管口上方0.5cm处有2.0cm×2.0cm基底宽的乳头状肿瘤应采取的最佳治疗方案是

- A 膀胱部分切除
- B 膀胱部分切除+输尿管膀胱再植
- C 经尿道膀胱肿瘤切除术
- D 左肾，输尿管及膀胱部分切除
- E 膀胱肿瘤单纯切除术

正确答案：AEB 您选择的答案：

第106-108题

男性，3岁，发现右侧腹部膨隆1个月，消瘦，并不规则发热，红细胞生成素增高，IVP示右肾不显影。

1. 最可能的诊断是

- A. 肾癌
- B. 肾母细胞瘤
- C. 肾上腺神经母细胞瘤
- D. 多囊肾
- E. 巨大肾积水

2. 最能支持诊断的体征是

- A. 贫血
- B. 发热
- C. 高血压
- D. 腹部包块
- E. 腹部压痛

3. 最合适的治疗方案是

- A. 单纯肾切除术
- B. 根治性肾切除术
- C. 经腹肾切除+放疗和化疗
- D. 肾、输尿管全长及部分膀胱切除术
- E. 肾切除+免疫治疗

正确答案：BDC 您选择的答案：

第109-113题

男，57岁，无痛性肉眼血尿1个月，经抗炎止血治疗症状消失。查体无异常。IVP：双肾及输尿管显影良好。膀胱区有充盈缺损改变。

1. 为确定诊断，最可靠的检查方法是

- A. B超
- B. CT
- C. MRI
- D. 逆行造影
- E. 膀胱镜及活检

2. 假如进一步检查确诊为肿瘤，下列哪项与预后关系最不密切

- A. 肿瘤组织类型
- B. 细胞分化程度
- C. 有无钙化
- D. 生长方式
- E. 浸润深度

3. 假如确诊为膀胱肿瘤，有关血尿的特征哪个是错误的

- A. 多数为全程无痛性肉眼血尿
- B. 血尿与活动有关
- C. 血尿出现前，可有尿频、尿痛、排尿困难或下腹部肿块
- D. 血尿可自行停止或减轻，多数间歇出现
- E. 出血量与肿瘤大小、数目、恶性程度不一致

4. 膀胱内充盈缺损最不可能的是

- A. 膀胱肿瘤
- B. 前列腺增生
- C. 膀胱内血块
- D. 膀胱结石
- E. 膀胱结核

5. 假如确诊为膀胱肿瘤，有关其复发哪项是错误的

- A. 膀胱肿瘤切除后容易复发
- B. 复发后不可能治愈
- C. 复发常不在原来部位
- D. 保留膀胱后，2年内半数以上要复发
- E. 10%~15%的复发病例恶性程度增加

正确答案：ECBEB 您选择的答案：

第114-115题

男，58岁，无痛性肉眼血尿3个月，偶伴有面条状血块；尿细胞学检查3次未发现癌细胞，B超可见左肾轻度积水。

1. 进一步明确诊断，首先应作哪一项检查

- A. 膀胱镜
- B. 肿瘤系列
- C. CT
- D. IVP
- E. MRI

2. 如检查发现左肾盂及输尿管中段两处充盈缺损，最可能的诊断是

- A. 肾及输尿管结石
- B. 上尿路上皮肿瘤
- C. 肾癌
- D. 肾结核
- E. 输尿管狭窄

正确答案：DB 您选择的答案：

第116-117题

男性，60岁，3个月来反复出现无痛性全程肉眼血尿。血尿时尿色鲜红，常有条形血块。B超示右肾盂内似有肿块。

1. 最常用的有效检查是

- A. 尿细菌培养
- B. 尿结核杆菌培养

- C. 核素肾图
 - D. 尿路造影、CT
 - E. 膀胱镜检查
2. 诊断应考虑
- A. 肾癌
 - B. 肾盂癌
 - C. 肾母细胞瘤
 - D. 肾结核
 - E. 肾盂结石

正确答案：DB 您选择的答案：

四、A4型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第118-121题

男性，50岁，无痛性肉眼血尿半个月。2年前因膀胱癌曾行经尿道膀胱肿瘤电切术。IVP：双肾及输尿管显影良好，膀胱区有充盈缺损改变。

1. 若术后病理为TaG1，术后怎样处理

- A. 不需膀胱灌注化疗
- B. 膀胱灌注抗癌药物
- C. 膀胱灌注BCG
- D. 膀胱灌注白细胞介素
- E. 膀胱灌注干扰素

2. 该患者术后需要膀胱内灌注治疗，目前认为效果最好的药物是下列哪一种

- A. BCG
- B. 丝裂霉素
- C. 阿霉素(多柔比星)
- D. 塞替派
- E. 羟基喜树碱

3. 如术后病理证实癌细胞侵犯浅肌层，则临床分期是

- A. Tis期
- B. Ta期
- C. T1期
- D. T2期
- E. T3期

4. 如膀胱镜检查发现膀胱三角区、左右侧壁有5个绿豆或黄豆大小菜花样无蒂肿瘤，则治疗应首先考虑

- A. 放弃手术
- B. 膀胱部分切除术
- C. 膀胱全切除术
- D. 经尿道膀胱肿瘤电切术
- E. 膀胱内灌注化疗药物

正确答案：AADC 您选择的答案：

第122-125题

男性，20岁，右侧阴囊内肿物3个月。查体：右睾丸圆形肿大，质硬而沉重，透光试验阴性。附睾输精管无异常。

1. 该患者最可能的诊断是

- A. 鞘膜积液
- B. 附睾炎
- C. 睾丸炎
- D. 睾丸生殖细胞瘤
- E. 睾丸非生殖细胞瘤

2. 假若该患者HCG阳性，则最可能的诊断是

- A. 睾丸生殖细胞瘤
- B. 睾丸非生殖细胞瘤
- C. 睾丸炎
- D. 附睾炎
- E. 鞘膜积液

3. 假如患者肺部有多处转移灶，则最可能的诊断是

- A. 睾丸胚胎癌
- B. 睾丸畸胎瘤
- C. 睾丸绒毛膜上皮癌
- D. 睾丸精原细胞瘤
- E. 睾丸卵黄囊肿瘤

4. 若术后病理证实为畸胎瘤，合适的治疗方案是

- A. 高位睾丸切除术
- B. 高位睾丸切除术+放疗
- C. 高位睾丸切除术+化疗
- D. 高位睾丸切除术+腹膜后淋巴结清扫
- E. 高位睾丸切除术+腹膜后淋巴结清扫+化疗

正确答案：DBCE 您选择的答案：

第126-129题

女性，47岁，无痛性肉眼血尿半月，体检无异常。尿中找到癌细胞。双肾B超检查未见异常。

1. 为进一步明确诊断，下列哪项检查最有意义

- A. 腹部平片
- B. 肾动脉造影
- C. 膀胱镜检查
- D. 排泄性尿道造影
- E. CT检查

2. 若膀胱镜检查可见右输尿管口喷出血尿,膀胱内未见异常,应首先考虑进行下列哪项检查

- A. MRI 检查
- B. CT 检查
- C. 肾动脉造影检查
- D. 排泄性尿路造影
- E. 输尿管镜检查

3. 若IVP:左肾功能及形态正常,右肾盂内可见一小的充盈缺损,此患者最可能的诊断是

- A. 肾癌
- B. 肾盂癌
- C. 输尿管癌
- D. 肾错构瘤
- E. 肾母细胞瘤

4. 应考虑采取的治疗方法是

- A. 单纯肾切除术
- B. 根治性肾切除术
- C. 肾动脉栓塞术
- D. 肾切除+化疗
- E. 肾切除+全部输尿管切除+部分膀胱壁切除

正确答案: CDBE 您选择的答案:

第130-133题

男性,50岁,无痛性肉眼血尿半个月。2年前因膀胱癌曾行经尿道膀胱肿瘤电切术。IVP:双肾及输尿管显影良好,膀胱区有充盈缺损改变。

1. 为了明确诊断,最好进行下列哪项检查

- A. B超检查
- B. CT检查
- C. MRI 检查
- D. 膀胱双合诊检查
- E. 膀胱镜检查+活检

2. 下列检查中,最可能出现异常的是

- A. 尿细菌学
- B. 尿生化学
- C. 尿细胞学
- D. 尿乳糜试验
- E. 尿酚红试验

3. 该肿瘤最常见的组织类型为

- A. 鳞癌
- B. 腺癌
- C. 透明细胞癌
- D. 移行细胞癌
- E. 肉瘤

4. 若肿瘤位于膀胱右侧壁,乳头状,直径1.0cm,有直径0.2cm的蒂,最好选择下列哪种手术方式

- A. 膀胱部分切除术
- B. 经尿道膀胱肿瘤电切术
- C. 膀胱全切除术
- D. 膀胱内灌注化疗
- E. 全身化疗+局部放疗

正确答案: ECDB 您选择的答案:

第134-137题

男性,58岁,3个月来出现无痛肉眼血尿3次,左腰胀痛1个月余。B超检查发现左肾中上极有一7.0cm×6.0cm大小的实质性占位,肾门处有一直径2.0cm肿块。IVP提示左肾上盏不显影,下盏受压变形。

1. 要进一步明确诊断,最好选择下列哪项检查

- A. 腹部平片
- B. ECT肾扫描
- C. 尿细胞学检查
- D. 肾穿刺活检
- E. CT检查

2. 该病最常见的临床症状是

- A. 无痛血尿
- B. 腹部肿块
- C. 腰部疼痛
- D. 发热
- E. 血沉快

3. 该病最可能的诊断是

- A. 肾癌
- B. 肾盂癌
- C. 肾错构瘤
- D. 肾脓肿
- E. 肾母细胞瘤

4. 该病的组织来源是

- A. 肾小管上皮细胞
- B. 肾胚胎性组织
- C. 肾血管组织
- D. 肾内平滑肌组织
- E. 肾盂肾盏移行上皮

正确答案: EAAA 您选择的答案:

第138-140题

男性,58岁,3个月来出现无痛肉眼血尿3次,左腰胀痛1个月余。B超检查发现左肾中上极有一7.0cm×6.0cm大小的

实质性占位，肾门处有一直径2.0cm肿块。IVP提示左肾上盏不显影，下盏受压变形。

1. 该患者的治疗应采取

- A. 肾部分切除术
- B. 单纯肾切除术
- C. 根治性肾切除术
- D. 肿瘤剜除术
- E. 肾、输尿管全长及部分膀胱切除术

2. 若考虑术前行肾动脉栓塞，其主要目的是

- A. 使肿瘤缩小
- B. 防止术中肿瘤扩散
- C. 减少术中出血
- D. 减轻术中粘连
- E. 防止肿瘤术后复发

3. 如果术前检查发现肾静脉内癌栓，应采取

- A. 放弃手术，放疗加化疗
- B. 单纯肾切除后再放疗和化疗
- C. 肿瘤姑息性切除后，生物治疗
- D. 根治性肾切除术，静脉内癌栓同时取出
- E. 单纯肾切除术，同时取出癌栓

正确答案：CCD 您选择的答案：

五、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第141-143题

- A. Tis期
- B. Ta期
- C. T2期
- D. T3期
- E. T4期

- 1. 肿瘤浸润前列腺
- 2. 肿瘤浸润深肌层
- 3. 肿瘤乳头状无浸润

正确答案：EDB 您选择的答案：

第144-146题

- A. 肾癌
- B. 肾盂癌
- C. 膀胱癌
- D. 前列腺癌
- E. 睾丸肿瘤

- 1. 多数为雄激素依赖型
- 2. 双侧睾丸切除术常用于治疗
- 3. 肾、输尿管全长及膀胱袖口状切除术用于治疗

正确答案：DDB 您选择的答案：

第147-149题

- A. 肾癌
- B. 肾盂癌
- C. 肾母细胞瘤
- D. 睾丸肿瘤
- E. 前列腺癌

- 1. 可以形成肾静脉和腔静脉癌栓的肿瘤是
- 2. 容易发生骨骼转移的是
- 3. 可以先后或同时伴有尿路其他部位上皮肿瘤的是

正确答案：AEB 您选择的答案：

第150-152题

- A. 肾癌
- B. 肾盂癌
- C. 膀胱癌
- D. 前列腺癌
- E. 睾丸肿瘤

- 1. 98%为腺癌
- 2. 常伴发精索静脉曲张
- 3. 泌尿系统最常见的肿瘤

正确答案：DAC 您选择的答案：

第153-156题

- A. 肾癌
- B. 肾胚胎瘤
- C. 膀胱癌
- D. 肾囊肿
- E. 肾盂癌

- 1. 成人泌尿系最常见的肿瘤
- 2. 早期血尿伴条状血块可出现肾绞痛
- 3. 腹部包块出现最早
- 4. 手术根治术中应切除肾脏+全输尿管+部分膀胱

正确答案：CEBE 您选择的答案：

习题集 外科学 尿结石

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 哪种结石易在碱性尿中形成

- A 尿酸结石
- B 磷酸盐结石
- C 草酸盐结石
- D 胱氨酸结石
- E 黄嘌呤结石

正确答案：B 您选择的答案：

第2题 尿路结石对泌尿系统不引起下列哪项损害

- A 直接损伤
- B 穿孔
- C 梗阻
- D 感染
- E 恶变

正确答案：B 您选择的答案：

第3题 上尿路结石典型的症状是

- A 血尿+尿痛
- B 腰痛+血尿
- C 腰痛+脓尿
- D 尿频+血尿
- E 腰痛+尿痛

正确答案：B 您选择的答案：

第4题 下列哪项是形成感染性结石的原因

- A 尿路梗阻
- B 饮水减少
- C 肾上皮细胞转运钙异常
- D 尿pH改变
- E 产生脲酶的细菌感染

正确答案：E 您选择的答案：

第5题 下面哪种血尿应考虑为上尿路结石

- A 无痛性血尿
- B 活动后血尿
- C 终末血尿
- D 初期血尿
- E 血尿伴血块

正确答案：B 您选择的答案：

第6题 体外冲击波碎石的禁忌症中，下列哪项是错误的

- A 过于肥胖
- B 结石远端尿路梗阻
- C 鹿角型结石
- D 妊娠
- E 安置心脏起搏器者

正确答案：C 您选择的答案：

第7题 膀胱结石的诊断下列哪项最可靠

- A 尿线中断史
- B 膀胱刺激症状
- C 直肠指检
- D 膀胱区平片
- E 膀胱镜检查

正确答案：E 您选择的答案：

第8题 上尿路结石的主要临床表现是

- A 无痛性血尿
- B 镜下血尿
- C 肉眼血尿
- D 肾绞痛
- E 与活动有关的血尿和疼痛

正确答案：E 您选择的答案：

第9题 关于尿路结石预防机制，以下正确的是

- A 服维生素B6以增加尿中草酸盐溶解
- B 服氧化镁以减少尿中草酸盐排出
- C 碱化尿液以利于磷酸盐的溶解
- D 患草酸盐结石应多吃菠菜西红柿，多吃高蛋白高糖
- E 别嘌呤醇可使尿酸形成减少

正确答案：E 您选择的答案：

第10题 左肾结石1.2cm，肾积水轻度，尿检有红细胞，应采取哪种治疗方法

- A 肾盂切开取石

- B 肾镜取石
- C 药物排石治疗
- D 肾盂肾窦切开取石
- E 体外震波碎石

正确答案：E 您选择的答案：

第11题 哪种细菌尿路感染有利于磷酸盐结石形成

- A 大肠杆菌
- B 变形杆菌
- C 产气杆菌
- D 绿脓杆菌
- E 金黄色葡萄球菌

正确答案：B 您选择的答案：

第12题 有关上尿路结石的临床表现，下列哪项是错误的

- A 结石可引起钝痛或疫痛
- B 结石越大，越易引起疼痛
- C 可引起肉眼和镜下血尿
- D 伴感染时可有尿频，尿痛等症状
- E 双侧或孤立肾上尿路结石完全梗阻可无尿

正确答案：B 您选择的答案：

第13题 尿结石的形成部位在

- A．肾
- B．膀胱
- C．肾和膀胱
- D．肾和输尿管
- E．输尿管和膀胱

正确答案：C 您选择的答案：

第14题 膀胱结石治疗原则不包括下列哪一项

- A．去除结石
- B．防止复发
- C．纠正病因
- D．改善营养
- E．防治上尿路结石

正确答案：D 您选择的答案：

第15题 结石进入输尿管最常嵌顿于哪一处

- A．肾盂输尿管连接处
- B．输尿管跨越髂血管处
- C．输尿管膀胱连接处
- D．输尿管上1/3处
- E．以上都不是

正确答案：C 您选择的答案：

第16题 关于肾和输尿管结石的临床表现，下列哪项是错误的

- A．可表现为肉眼或镜下血尿
- B．结石越大症状越明显
- C．输尿管上段梗阻时，疼痛放射至同侧睾丸或阴唇
- D．输尿管中段梗阻时，疼痛放射至中下腹部
- E．输尿管膀胱壁部梗阻时，常有尿道和阴茎头部放射痛

正确答案：B 您选择的答案：

第17题 关于膀胱结石，下列哪项是错误的

- A．典型症状为排尿中断并有阴茎头部和远端尿道放射痛
- B．经跑跳或改变体位，可继续排尿
- C．可有排尿刺激症状
- D．小儿患者常并发脱肛
- E．膀胱结石患者都会出现排尿中断症状

正确答案：E 您选择的答案：

第18题 上尿路结石最常见的血尿类型为

- A．肉眼血尿
- B．镜下血尿
- C．初始血尿
- D．终末血尿
- E．全程血尿

正确答案：B 您选择的答案：

第19题 关于上尿路结石的治疗哪项是不确切的

- A 结石引起肾疼前时应手术
- B 双侧肾结石应先手术简单安全一侧
- C 双侧输尿管结石，先取梗阻重一侧
- D 一侧肾结石一侧输尿管结石，先取输尿管结石
- E 结石引起梗阻，肾功能严重受损应手术

正确答案：A 您选择的答案：

第20题 膀胱结石的典型症状是

- A．进行性排尿困难

- B. 排尿突然中断
- C. 膀胱刺激症状
- D. 痛性血尿
- E. 无痛性血尿

正确答案：B 您选择的答案：

第21题 上尿路结石是指

- A. 肾结石
- B. 输尿管结石
- C. 膀胱结石
- D. 输尿管和膀胱结石
- E. 肾和输尿管结石

正确答案：D 您选择的答案：

第22题 输尿管肾镜取石的并发症应除外

- A. 输尿管裂伤
- B. 输尿管狭窄
- C. 膀胱输尿管返流
- D. 可能带进感染
- E. 尿失禁

正确答案：E 您选择的答案：

第23题 输尿管结石最多见的部位是

- A. 肾盂输尿管交界处
- B. 输尿管上1/3段
- C. 输尿管中1/2段
- D. 输尿管下1/3段
- E. 输尿管跨越髂血管处

正确答案：D 您选择的答案：

第24题 输尿管结石病人,术前必须

- A. 多活动
- B. 多饮水
- C. 输血
- D. 拍摄腹部X线平片
- E. 尿常规检查

正确答案：D 您选择的答案：

第25题 对侧肾功能良好的肾结石患者,下列哪种情况可作患侧肾切除

- A. 肾盂结石功能尚好
- B. 肾盏结石
- C. 肾下极多发结石
- D. 鹿角形结石合并肾积水
- E. 肾多发结石合并积水,肾功能丧失

正确答案：E 您选择的答案：

第26题 肾结石病人对侧肾功能良好,下列哪种情况应考虑切除患肾

- A. 复发性肾结石
- B. 肾脏多发性结石
- C. 鹿角状结石伴肾积水
- D. 患侧肾功能严重受损
- E. 体外冲击波碎石后输尿管形成石街

正确答案：D 您选择的答案：

第27题 膀胱结石直径2cm,尿检白细胞3~5个,最佳治疗方法

- A. 膀胱镜碎石
- B. 膀胱切开取石
- C. 留置导尿管消炎后,膀胱切开取石
- D. 体外震波碎石
- E. 药物排石

正确答案：A 您选择的答案：

第28题 关于上尿路结石,下述哪项是错误的

- A. 输尿管结石多位于下段输尿管
- B. 绝大多数是单侧性
- C. 感染性结石必须在碱性尿中形成
- D. 结石位于输尿管口时,常伴有膀胱刺激症状
- E. 当输尿管中段梗阻时,疼痛放射至同侧大腿内侧

正确答案：E 您选择的答案：

第29题 在腹部平片不易显影的结石是

- A. 磷酸盐结石
- B. 草酸盐结石
- C. 尿酸结石
- D. 碳酸盐结石
- E. 混合结石

正确答案：C 您选择的答案：

第30题 使尿酸排出增加的因素,下列哪项是错误的

- A. 痛风

- B. 尿持续酸性
- C. 高温环境
- D. 慢性腹泻
- E. 噻嗪类利尿剂

正确答案：C 您选择的答案：

第31题 导致尿路结石形成的主要因素是

- A. 甲状旁腺功能亢进
- B. 长期卧床
- C. 饮食中动物蛋白增多
- D. 慢性腹泻
- E. 尿中形成结石结晶的盐类呈过饱和状态

正确答案：E 您选择的答案：

第32题 尿结石的形成部位是

- A. 肾
- B. 膀胱
- C. 肾、输尿管、膀胱及尿道
- D. 肾和膀胱
- E. 以上都不是

正确答案：D 您选择的答案：

第33题 关于尿路结石，以下哪项是不正确的

- A. 我国南方发病率明显高于北方
- B. 男女之比为3:1
- C. 上尿路结石大多数是草酸钙结石
- D. 膀胱结石中磷酸镁铵结石较上尿路多见
- E. 下尿路结石较上尿路结石多见

正确答案：E 您选择的答案：

第34题 胱氨酸结石的非手术疗法应除外

- A. 碱化尿液
- B. 口服α-MPG
- C. 多饮水
- D. 酸化尿液
- E. 限制动物蛋白的摄入

正确答案：D 您选择的答案：

第35题 右肾结石0.6cm大小光滑，肾轻度积水应采取哪种治疗方法

- A. 肾盂切开取石
- B. 肾实质切开取石
- C. 套石术
- D. 非手术治疗
- E. 肾镜取石

正确答案：D 您选择的答案：

第36题 膀胱结石最佳确诊方法是

- A. 依据典型症状尿流中断
- B. 双合诊检查
- C. 金属尿道探子检查
- D. 腹部平片检查
- E. 膀胱镜检查

正确答案：E 您选择的答案：

第37题 左肾下盏多发性结石并明显扩张，最好的治疗方法是

- A. 肾盂切开取石
- B. 肾切开取石
- C. 肾切除
- D. 肾部分切除
- E. 体外震波碎石术

正确答案：D 您选择的答案：

第38题 关于泌尿系结石对泌尿系的损害，下列哪项是错误的

- A. 直接损害
- B. 泌尿系梗阻
- C. 泌尿系感染
- D. 恶性变
- E. 诱发憩室

正确答案：E 您选择的答案：

第39题 诊断尿路结石的最主要方法是

- A. 超声波检查
- B. 放射性核素肾图
- C. 放射性核素肾扫描
- D. 排泄性尿路造影
- E. X线腹部平片

正确答案：E 您选择的答案：

第40题 输尿管结石绞痛发作时的治疗

- A. 大量饮用磁化水促使结石排出
- B. 立即体外冲击波碎石
- C. 立即手术取石
- D. 用药物、针刺等首先解除绞痛症状
- E. 输尿管导管套石

正确答案：D 您选择的答案：

第41题 上尿路中最常见的结石是

- A. 胱氨酸结石
- B. 黄嘌呤结石
- C. 草酸钙结石
- D. 磷酸镁胺结石
- E. 尿酸盐结石

正确答案：C 您选择的答案：

第42题 上尿路结石大多数为

- A. 草酸钙结石
- B. 磷酸镁胺结石
- C. 磷酸钙结石
- D. 尿酸结石
- E. 胱氨酸结石

正确答案：A 您选择的答案：

第43题 直径为3.0cm的膀胱结石，伴有严重膀胱炎，应如何处理

- A. 行膀胱镜碎石术
- B. 先置导尿管控制炎症后再行碎石术
- C. 立即行耻骨上膀胱切开取石术
- D. 先置导尿管控制炎症后再行耻骨上膀胱切开取石
- E. 控制炎症及非手术治疗

正确答案：D 您选择的答案：

第44题 关于上尿路结石的临床表现，下列哪项是错误的

- A. 结石可引起钝痛和绞痛
- B. 结石越大越易引起绞痛
- C. 可引起肉眼或镜下血尿
- D. 伴感染时可有尿频、尿痛等症状
- E. 双侧上尿路结石或孤肾上尿路结石完全梗阻时，可导致无尿

正确答案：B 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第45题 男性，32岁，体重96kg，发现右输尿管结石6个月，结石直径1cm，位于右侧髂嵴关节下缘，经服用排石中药、利尿、解痉药物治疗，结石未移动，患侧肾区常有疼痛，并出现右肾中度积水，最好采取下列哪项措施

- A. 体外冲击波碎石
- B. 输尿管套石术
- C. 输尿管切开取石术
- D. 增加电针、局部治疗促使结石排出
- E. 输尿管肾镜取石或碎石

正确答案：E 您选择的答案：

第46题 男性，45岁，左腹部绞痛反复发作3个月，排泄性尿路造影见左输尿管上段有1.2cm×1.5cm的高密度结石，伴左肾积液，合适的处理是

- A. 经膀胱经用特殊的多环输尿管导管套石
- B. 肾切除术
- C. 输尿管肾镜碎石或取石
- D. 输尿管切开取石
- E. 给予解痉药物使结石排出

正确答案：D 您选择的答案：

第47题 男，32岁。右腰部痛，尿频，尿急，尿痛及向阴茎头放散痛，患者有排石史，查：右肾叩击痛阳性，尿：白细胞3~5/HP，红细胞10~20个/HP，该患者可诊断为泌尿系结石，其结石部位应在

- A. 输尿管下段
- B. 膀胱内
- C. 输尿管间壁段
- D. 后尿道
- E. 前尿道

正确答案：C 您选择的答案：

第48题 女性，52岁，右侧慢性肾盂肾炎7年，近日B超发现右肾鹿角结石伴积水，尿pH值为7.5，此种结石成分最可能是

- A. 磷酸盐结石
- B. 尿酸盐结石
- C. 纯尿酸结石
- D. 草酸盐结石
- E. 胱氨酸结石

正确答案：A 您选择的答案：

第49题 男性，41岁，2年前有尿道外，伤史，近半年来尿痛，尿线中断。尿道扩张至18~20号。腹部平片膀胱区见

1. 8cm×1.0cm结石一枚。治疗应采取下列哪项措施

- A. 膀胱切开取石术
- B. 膀胱碎石术
- C. 大量饮水
- D. 针刺疗法
- E. 以上均不是

正确答案：A 您选择的答案：

第50题 男，25岁。诊断左肾结核，右输尿管结石，直径0.8cm，静脉肾盂造影，左肾未显示，右肾轻度积水，结石下输尿管显示正常，肾功能检查正常，宜先行哪种治疗

- A. 切除左肾
- B. 引流右肾积水
- C. 急行右输尿管切开取石
- D. 抗痨下，等待结石自然排出
- E. 抗痨下，输尿管结石体外震波碎石治疗

正确答案：E 您选择的答案：

第51题 男，42岁。右腰痛5年，查B超：右肾积水中度；腹部平片可见右中段输尿管结石1.2cm，肾盂静脉造影，左肾显示正常，右肾盏显示扩张，肾盂未显示，行右肾穿刺造影右肾中度积水，输尿管上段扩张2cm，结石下输尿管有狭窄，该患最好治疗方法是

- A. 右肾盂造瘘
- B. 经输尿管镜取石
- C. 右输尿管切开取石，输尿管成形
- D. 右肾切除术
- E. 继续中西药排石

正确答案：C 您选择的答案：

第52题 男性。40岁，左肾区绞痛入院。X线平片发现右肾区巨大结石，左输尿管上段1.0cm直径小结石，排泄性尿路造影发现：右肾功能减退，左肾盂轻度积水。治疗应首先考虑

- A. 右肾盂切开取石术
- B. 左输尿管切开取石术
- C. 右肾及左输尿管同时切开取石
- D. 右肾盂造瘘术
- E. 中药排石

正确答案：B 您选择的答案：

第53题 男性，25岁，右侧孤立肾，右腰绞痛并无尿3天，腹部X线平片示右输尿管上段结石一枚，1.5cm×1.3cm大小。下列治疗方法哪项是错误的

- A. 输尿管插管并留置导管引流
- B. 右肾造瘘
- C. 右输尿管切开取石
- D. 血液透析
- E. 大剂量甘露醇利尿

正确答案：E 您选择的答案：

第54题 男，45岁。右腰钝痛3年，未经诊治，2周前B超可见右肾区有鹿角结石，面积在400mm²，有轻度积水，肾图，右肾轻度受损，IVU左肾正常，双输尿管正常，应最好采取治疗方法

- A. 经皮肾镜碎石
- B. 体外震波碎石
- C. 肾切除术
- D. 肾盂切开取石
- E. 肾实质切开取石

正确答案：B 您选择的答案：

第55题 男，36岁。腰痛2年，半月前B超发现右肾结石3.0cm，并有右肾积水中度，5天前感冒发热并右腰痛加重，伴高热尿频，尿痛，查体温38.5℃，右肾区叩痛明显，尿检红细胞充满/HP，肾图右肾功严重受损，左侧正常B超右肾中度积水，肾盂内透声不好疑感染，右肾穿刺为脓性，其治疗方法是

- A. 右肾切除
- B. 右肾造瘘
- C. 右肾切开取石
- D. 继续消炎治疗
- E. 体外震波碎石

正确答案：A 您选择的答案：

第56题 女，30岁。因右肾结石行ESWL治疗3天后排出结石，两周复查右肾结石已排净，结石成分分析为磷酸盐结石，预防磷酸盐结石方法是

- A. 口服维生素B₆或氧化镁
- B. 口服别嘌呤醇
- C. 碱化尿液，服卡托普利
- D. 碱化尿液，少食动物内脏
- E. 控制感染，服氢氧化铝凝胶

正确答案：E 您选择的答案：

第57题 男，31岁。B超可见肾上盏结石0.6cm，经解痉，中西药治疗和大量饮水现出现尿频，尿急，尿痛，现结石的位置应在

- A. 肾盂
- B. 输尿管中段
- C. 膀胱
- D. 输尿管膀胱入口段
- E. 尿道

正确答案：D 您选择的答案：

第58题 男性，40岁尿痛血尿间歇发作3年。膀胱镜检查：膀胱内有2枚大小分别为2.8cm×1.5cm×1.0cm和2.3cm×1.2cm×1.1cm的结石。宜采用下列哪种治疗

- A. 口服磁化水
- B. 套石术
- C. 膀胱内碎石术
- D. 中药排石
- E. 膀胱切开碎石

正确答案：C 您选择的答案：

第59题 患者，男性，42岁，左腰区不适5年，右腰区剧痛3小时，影像检查提示：左肾结石，直径为2.5cm，右输尿管下段结石，直径为0.9cm。首选治疗方案是

- A. 左肾切开取石
- B. 右输尿管镜碎石
- C. 双侧切开取石
- D. 大量饮水
- E. 左肾造瘘术

正确答案：B 您选择的答案：

第60题 女性，47岁，右腰部疼痛1年，右侧腹部有一高密度阴影，诊断考虑为上尿路结石，但应排除下列疾病，除了

- A. 腰椎钙化
- B. 静脉石
- C. 胆囊结石
- D. 肠系膜淋巴结钙化
- E. 粪石

正确答案：A 您选择的答案：

第61题 患者，女性，21岁，左腰区疼痛3天，尿常规RBC(++++), B超可见左输尿管内强回声影，腹部X线平片未见异常，最可能的原因是

- A. 草酸钙结石
- B. 尿酸结石
- C. 磷酸钙结石
- D. 胱氨酸结石
- E. 磷酸镁胺结石

正确答案：B 您选择的答案：

第62题 男性，37岁。左肾绞痛3天，经解痉药应用好转，排泄性尿路造影，双肾显示好左肾有轻度积水，左输尿管上段有结石1cm×0.8cm，非手术治疗两周，结石下移1cm，该患现最佳治疗应是

- A. 继续非手术治疗
- B. 肾镜取石
- C. 体外震波碎石
- D. 输尿管镜取石
- E. 输尿管切开取石

正确答案：C 您选择的答案：

第63题 男，70岁。排尿困难2年，腹部平片提示膀胱区有2.0cm椭圆形致密影。典型的临床症状是

- A. 膀胱刺激症状
- B. 进行性排尿困难
- C. 血尿
- D. 腰痛，血尿，脓尿
- E. 尿流中断，改变体位后好转

正确答案：E 您选择的答案：

第64题 男性，32岁。右肾绞痛后尿闭一天，腹部平片可见双侧输尿管中部各有结石一枚，约1cm大小，左肾内还有鹿角形结石，急诊处理应先采用

- A. 服中药排石
- B. 中西医结合解痉排石
- C. 膀胱镜下输尿管插管缓解肾功引流尿液
- D. 利尿药物应用
- E. 立即手术输尿管切开取石

正确答案：C 您选择的答案：

第65题 女，27岁。活动后突感右下腹放散痛，伴恶心，1月前有同样发作史，查：右肾区叩痛，腹软，右下腹有深压痛，无肌紧张，尿液检查：白细胞3~4个/HP，红细胞20~30个/HP，腹部平片右输尿管上段有阴影0.8cm，B超右肾轻度积水，目前最好治疗方法是

- A. 体外震波碎石
- B. 输尿管切开取石
- C. 肾镜取石
- D. 解痉止痛后体外震波碎石
- E. 非手术排石

正确答案：D 您选择的答案：

第66题 患儿12岁，针孔样包茎，阴茎根部尿道内有1.2cm×1.0cm×1.0cm结石一枚，治疗宜采用

- A. 用探针钩取石
- B. 用直血管钳取结石
- C. 包皮背切开后尿道扩张器将结石推回膀胱，然后行膀胱内碎石术
- D. 包皮背切开后尿道扩张器将结石推回膀胱，然后行膀胱切开取石术
- E. 阴茎根部尿道切开取石术

正确答案：D 您选择的答案：

第67题 女性，28岁，突然发生右下腹痛，伴有恶心、呕吐。体检：腹平，软，右下腹深压痛，无反跳痛，右肋脊角叩痛。尿镜检：白细胞0~5个/高倍，红细胞10~15个/高倍。血常规：白细胞 $9.6 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞0.78。首先考虑的诊断为

- A. 右侧输卵管炎
- B. 右侧输尿管结石
- C. 膀胱结石
- D. 急性阑尾炎
- E. 不完全肠梗阻

正确答案：B 您选择的答案：

三、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第68-70题

男性，35岁。右肾疼痛3天，尿常规红细胞充满/HP，白细胞2~3/HP，尿路平片可见右下段输尿管走行区高密度阴影0.6cm，IVU可见右输尿管下段结石，其上输尿管轻度扩张，右肾轻度积水

1. 输尿管结石绞痛发作时应给予的治疗

- A. 大量饮水，促使结石排出
- B. 体外震波碎石
- C. 立即手术取石
- D. 输尿管导管套石
- E. 用药物解除绞痛症状

2. 患者中西药物治疗和大量饮水及活动后绞痛解除，突然出现尿流中断，及排尿终末痛，原因是

- A. 急性前列腺炎
- B. 结石在输尿管间壁段
- C. 结石到膀胱
- D. 结石到尿道
- E. 尿道炎

3. 该患者采用哪种治疗方法

- A. 膀胱切开取石术
- B. 套石术
- C. 药物排石
- D. 大量饮水等待自然排出
- E. 体外震波碎石

正确答案：ECD 您选择的答案：

第71-72题

男，46岁。右肾区疼痛，间歇性肾绞痛1个月，尿常规：红细胞10~15个/HP，B超可见左肾积水轻一中度，静脉肾盂造影：左肾中段一1.0cm的结石，其上段输尿管轻度扩张1.2cm，肾盂肾盏显示好，右肾盂肾盏显示好

1. 最佳的治疗方案

- A. 输尿管切开取石
- B. 输尿管套石术
- C. 左肾造瘘术
- D. 体外震波碎石
- E. 中西药物排石

2. 配合治疗方法哪项不对

- A. 解痉药黄体酮
- B. 利尿药双氢克尿塞
- C. 多饮水每天排尿2000ml以上
- D. 每天饮水2000ml以上
- E. 应用排石中药

正确答案：DD 您选择的答案：

第73-75题

患者，男，30岁，突然发生尿潴留，以往有排尿中断史，检查发现膀胱区膨隆。

1. 下列哪项检查最有诊断意义

- A. 腹部平片
- B. CT检查
- C. B超检查
- D. 膀胱尿道镜
- E. MRI

2. 最有可能的诊断是

- A. 前列腺增生
- B. 尿道狭窄
- C. 输尿管结石
- D. 膀胱结石
- E. 尿道结石

3. 最适当的处理是

- A. 膀胱切开取石
- B. 尿道切开取石
- C. ESWL
- D. 内镜碎石
- E. 大量饮水

正确答案：DED 您选择的答案：

第76-79题

男性，58岁。尿频，排尿困难3年，尿流中断半年，下腹平片及B超可见膀胱区2枚 $3.0\text{cm} \times 2.5\text{cm} \times 2.5\text{cm}$ 和 $2.0\text{cm} \times 1.5\text{cm} \times 1.5\text{cm}$ 的结石。

5cm×2.0cm×2.0cm结石，上尿路未见异常改变

1. 治疗后为预防结石，下列措施中哪项不对

- A 定期X线或B超检查
- B 大量饮水
- C 膀胱镜检查
- D 依结石成分调节饮食
- E 少吃盐和糖

2. 尿中无感染患者宜采用哪种治疗

- A 饮用磁化水
- B 膀胱内碎石术
- C 膀胱切开取石
- D 套石术
- E 药物排石

3. 查尿白细胞充满 / HP，采用哪种方法最佳

- A 先留置尿管，抗炎后再膀胱切开取石
- B 立即膀胱切开取石
- C 膀胱镜碎石
- D 先留置尿管抗炎后，再碎石
- E 消炎等非手术治疗

4. 该病人是膀胱结石原因是由于

- A 膀胱炎
- B 前列腺增生症
- C 膀胱颈硬化
- D 神经源性膀胱
- E 前列腺癌

正确答案：CCAB 您选择的答案：

第80-82题

男性，36岁，左腰痛伴镜下血尿反复发作4年，近3天来无尿。右肾2年前已切除。体检：神志朦胧，全身浮肿，血压180 / 110mmHg，左肾区叩痛。血肌酐720μmol / L。B超检查左肾轻度积水，腹部X线平片未见明显异常。

1. 该病人最可能的诊断是

- A 肾动脉栓塞
- B 肾结石
- C 输尿管结石
- D 肾盂肿瘤
- E 输尿管肿瘤

2. 为明确诊断，宜做下列何种检查

- A 排泄性尿路造影
- B 超声波检查
- C 核素肾图
- D 肾动脉造影
- E 左输尿管插管和逆行造影

3. 上述病例急诊处理应首先考虑

- A 肾造瘘术
- B 输尿管切开取石术
- C 输尿管导管套石术
- D 输尿管插管引流术
- E 体外冲击波碎石术

正确答案：CED 您选择的答案：

第83-85题

男性，25岁，腹部X线平片提示双侧肾盂各有一枚1cm×1.5cm大小的高密影，静脉肾盂造影示双肾中度积水，双侧输尿管通畅，一次ESWL将双侧结石粉碎。术后当天即有血尿及碎石排出，第二天双肾绞痛，发热，尿闭。

1. 根据病史，最可能的诊断是

- A 血块梗阻
- B 肾挫伤
- C 双侧输尿管碎石梗阻
- D 急性肾小管坏死
- E 急性肾盂肾炎

2. 正确的处理是

- A 中草药排石
- B 理疗
- C 利尿剂利尿
- D 血液透析
- E 手术处理

3. 上述治疗的失误是不应该

- A 术前抗感染治疗
- B 术前定位X线摄片
- C 双侧一次性碎石治疗
- D 选择ESWL
- E 术后未给大量输液

正确答案：CEC 您选择的答案：

四、A4型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第86-90题

患者男性，69岁。因尿频、尿急、排尿困难及排尿疼痛3个月收住入院。既往有排尿中断史，改变体位后，可继续排

尿。有高血压病史5年。入院时体检：血压196 / 106mmHg。浅表淋巴结不大，心肺无异常，上腹平软，无压痛及反跳痛。腹部未扪及包块，肝脾无肿大，双肾区无压痛及叩击痛，无移动性浊音，肠鸣音正常。下腹部较膨隆，浊音界耻骨上5cm。肛检：前列腺 度增生，无明显压痛，质地偏硬、中央沟消失、表面光滑无结节。

1. 根据病史，初步诊断不考虑下列哪项疾病

- A. 尿路感染
- B. 前列腺增生
- C. 膀胱肿瘤
- D. 慢性尿潴留
- E. 膀胱结石

2. 该患者入院后，应考虑作下列检查以明确诊断，除了

- A. 腹部X线平片
- B. B超
- C. 逆行肾盂造影
- D. 膀胱镜检查
- E. 血清肌酐尿素氮

3. B超检查提示前列腺增生，膀胱结石，残余尿200ml。KUB + IVP检查示双肾功能、形态基本正常，膀胱憩室，内可见5

. 0cm × 4 . 0cm × 3 . 0cm 结石阴影、膀胱颈抬高。血液生化检查正常、尿常规红细胞3 ~ 5个 / HP，白细胞4 ~ 6个 / HP，

尿培养示大肠杆菌。应进一步考虑下列的诊疗措施除了

- A. 使用抗生素
- B. 心肺功能检查
- C. 导尿
- D. 控制高血压
- E. 凝血机制检查

4. 下列哪一项治疗方法最适宜该患者

- A. 耻骨上膀胱切开取石 + 前列腺摘除术
- B. 经尿道机械钳石 + 前列腺电切术
- C. 经尿道激光碎石 + 前列腺电切术
- D. 经尿道气压弹道碎石
- E. 耻骨上膀胱切开取石术

5. 如果该膀胱结石患者具有下列情况则不宜行经膀胱镜碎石，除了

- A. 结石大于5cm
- B. 糖尿病患者
- C. 尿道外伤性梗阻者
- D. 膀胱憩室内结石
- E. 结石较硬者

正确答案：CC CAB 您选择的答案：

五、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第91-95题

- A. 草酸钙结石
- B. 尿酸结石
- C. 胱氨酸结石
- D. 黄嘌呤结石
- E. 磷酸钙和磷酸镁氨结石

- 1. 感染性结石的主要成分是
- 2. 痛风易形成
- 3. 临床上最常见的结石成分是
- 4. 透光结石是
- 5. 常形成鹿角型结石的是

正确答案：EBABE 您选择的答案：

第96-97题

- A. 排尿中断
- B. 尿频、尿急
- C. 尿潴留
- D. 肾绞痛和镜下血尿
- E. 排尿困难

- 1. 膀胱结石典型的症状是
- 2. 肾盂造影发现原来的结石下降至输尿管上段。典型的症状为

正确答案：AD 您选择的答案：

第98-101题

- A. 肾窦肾盂切开取石
- B. 肾部分切除术
- C. 肾实质切开取石
- D. 肾切除术
- E. 输尿管套石术

- 1. 肾下盏多个0.5cm大小结石，应行
- 2. 左肾巨大结石并重度积水，IVP示左肾不显影，右肾功能正常，应行
- 3. 一侧巨大鹿角形结石，功能尚可，应行
- 4. 肾内型肾盂结石，直径2cm大小，应行

正确答案：BDCA 您选择的答案：

第102-105题

- A. 氧化镁或维生素B6

- B 氯化铵
- C 碳酸氢钠
- D 氯化钾
- E 别嘌呤醇

- 1. 预防尿酸盐结石可服用
- 2. 预防磷酸盐结石可服用
- 3. 减少尿酸形成时可服用
- 4. 预防草酸盐结石时可服用

正确答案：CBEA 您选择的答案：

习题集 外科学 骨肿瘤

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 骨软骨瘤外科分期属于

- A GoTl Ml
- B GoTobo
- C Gl ToNl
- D G2T1Mo
- E G2T2M1

正确答案：B 您选择的答案：

第2题 骨巨细胞瘤的性质，属于

- A 良性
- B 潜在恶性
- C 恶性
- D 高度恶性
- E 性质不明

正确答案：B 您选择的答案：

第3题 骨软骨瘤临床表现为

- A 生长较快，伴明显疼痛
- B 肿块明显，并可见其表面静脉怒张
- C X线检查见骨膜反应
- D 本身可无症状，但压迫周围组织可影响功能
- E 肿块与周围界限不清

正确答案：D 您选择的答案：

第4题 骨肉瘤x线片可见病变

- A 发生于骨端
- B 短管状骨多见
- C 可见"日光照射"现象
- D 可为膨胀性生长
- E 与正常组织界限清楚

正确答案：C 您选择的答案：

第5题 对骨肿瘤的诊断、鉴别诊断，最有价值的检查是

- A . X线片
- B . 核素骨扫描
- C . MRI
- D . 查ALP
- E . 组织活检

正确答案：E 您选择的答案：

第6题 Codman三角多见于

- A . 脂肪肉瘤
- B . 骨肉瘤
- C . 骨软骨瘤
- D . 软骨肉瘤
- E . 骨巨细胞瘤

正确答案：B 您选择的答案：

第7题 骨膜"葱皮"样改变多见于

- A . 骨肉瘤
- B . 尤文肉瘤
- C . 骨软骨瘤
- D . 脂肪肉瘤
- E . 骨髓瘤

正确答案：B 您选择的答案：

第8题 骨巨细胞瘤外科分级，属于

- A GoTl ~ 2Mo ~ 1
- B Go ~ 1ToMo
- C Go ~ 1To ~ 2Mo ~ 1
- D G2ToN1
- E G2ToNo

正确答案：C 您选择的答案：

第9题 骨巨细胞瘤X线表现

- A 外生性，可见明显破坏
- B 偏心性，位于骨端，溶骨性破坏
- C 位于干骺端，可见有分格
- D 骨破坏，可见Codman三角
- E 骨性破坏，可见片状钙化

正确答案：B 您选择的答案：

第10题 尤文肉瘤的诊断需与下列哪种疾病鉴别

- A . 骨结核

- B. 化脓性骨髓炎
- C. 骨纤维肉瘤
- D. 骨纤维异常增殖症
- E. 骨肉瘤

正确答案：B 您选择的答案：

第11题 下列哪项不符合单发的骨软骨瘤的临床表现

- A. 年轻人多见
- B. 好发于干骺端
- C. 随年龄的增长可不断长大
- D. 1%的病人可以恶化
- E. 单发比多发性骨软骨瘤恶变机会少

正确答案：C 您选择的答案：

第12题 内生性软骨瘤的治疗方案应选择

- A. 刮除植入松质骨
- B. 肿瘤段切除
- C. 必要时可行人工关节置换手术
- D. 截肢术
- E. 放疗、化疗、手术相结合

正确答案：A 您选择的答案：

第13题 Codman三角常见于

- A. 骨肉瘤
- B. 尤文肉瘤
- C. 骨软骨瘤
- D. 脂肪肉瘤
- E. 骨髓瘤

正确答案：A 您选择的答案：

第14题 对骨肿瘤的诊断、鉴别诊断，最有价值的检查是

- A. 查相关的肿瘤标志物
- B. X线平片
- C. CT或MRI
- D. 核素骨扫描
- E. 组织活检、病理检查

正确答案：E 您选择的答案：

第15题 骨巨细胞瘤治疗方案的确定决定于

- A. 临床表现
- B. X线表现
- C. 病理检查
- D. G、T、M分级
- E. 放疗后有无恶变

正确答案：D 您选择的答案：

第16题 骨巨细胞瘤X线表现

- A. 外生性，可见明显破坏
- B. 骨性破坏，可见片状钙化
- C. 位于干骺端，可见有分格
- D. 骨破坏，可见Codman三角
- E. 偏心性，位于骨端，溶骨性破坏

正确答案：E 您选择的答案：

第17题 骨巨细胞瘤外科分级属于

- A. G0T1 ~ 2M0 ~ 1
- B. G0 ~ 1ToMo
- C. G0 ~ 1To ~ 2M0 ~ 1
- D. G2ToM1
- E. G2ToMo

正确答案：C 您选择的答案：

第18题 只有在骨肉瘤X线片中可见的现象是

- A. 发生于骨端
- B. 有完整囊壁
- C. 与正常组织界限清楚
- D. 可见膨胀性生长
- E. 可见"日光照射"现象

正确答案：E 您选择的答案：

第19题 内生性软骨瘤的X线表现是

- A. 溶骨性骨破坏
- B. 葱皮样骨膜反应
- C. 密度增高的肿瘤骨
- D. 可见"日光照射"现象
- E. 膨胀性低密度区内夹杂钙化斑的肿块

正确答案：E 您选择的答案：

第20题 骨巨细胞瘤治疗方案的确定，决定于

- A. X线表现

B 临床表现
C G、T、M分级
D 病理检查
E 放疗后有否恶变
正确答案：C 您选择的答案：

第21题 内生软骨瘤常见部位是
A．指骨管状骨
B．肱骨管状骨
C．股骨管状骨
D．胫骨管状骨
E．肋骨
正确答案：A 您选择的答案：

第22题 骨巨细胞瘤的性质属于
A．良性
B．性质不明
C．潜在恶性
D．恶性
E．高度恶性
正确答案：C 您选择的答案：

第23题 内生软骨瘤的x线表现，是
A 溶骨性骨破坏
B 葱皮样骨膜反应
C 日光放射状骨膜反应
D 膨胀性低密度区内夹杂钙化斑块
E 密度增高的肿瘤骨
正确答案：D 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第24题 病人已确诊为骨巨细胞瘤，局部皮肤表浅静脉怒张，肿胀与压痛均显著，触诊有乒乓球样感觉。x片：骨皮质已破坏，断裂。病理报告：骨巨细胞瘤 级。治疗应选择
A 截肢术
B 刮除植骨术
C 刮除骨水泥充填术
D 刮除灭活植骨术
E 刮除灭活骨水泥充填术
正确答案：A 您选择的答案：

第25题 男，22岁，右股骨下端疼痛2个月。体检：右股骨下端偏内侧局限性隆起，皮温略高，皮肤浅静脉怒张，明显压痛，膝关节运动受限。X线片股骨下端溶骨性骨破坏，可见Codman三角。诊断为
A．软骨肉瘤
B．内生软骨瘤
C．骨肉瘤
D．尤文肉瘤
E．骨巨细胞瘤
正确答案：C 您选择的答案：

第26题 男，18岁，右大腿下端肿痛2月余，皮肤表面静脉怒张，皮温略高，X线平片示右股骨下端有边界不清的骨质破坏区，骨膜增生呈放射状阴影，最可能的诊断是
A．骨髓炎
B．骨结核
C．骨肉瘤
D．骨巨细胞瘤
E．骨转移癌
正确答案：C 您选择的答案：

第27题 5岁男童，左手中指近节指骨肿胀，疼痛。体检：左手中指近节指骨膨隆，皮肤颜色正常，轻微压痛，关节运动不受限。可能性最大的诊断是
A．骨巨细胞瘤
B．骨囊肿
C．骨软骨瘤
D．内生软骨瘤
E．脂肪瘤
正确答案：D 您选择的答案：

第28题 成人椎体结核和椎体肿瘤在X线平片上的主要鉴别点是
A．椎体的破坏程度
B．是否有死骨存在
C．椎体有无压缩变形
D．椎间隙是否狭窄或消失
E．椎旁软组织阴影
正确答案：D 您选择的答案：

第29题 17岁男患，诊断右股骨下端内侧长蒂状骨软骨瘤，3天前跌倒后，出现局部疼痛，伴膝关节活动轻微受限。其原因是

A 骨软骨瘤恶变
B 骨软骨瘤基底部折断
C 骨软骨瘤周围出现滑囊炎
D 局部软组织挫伤
E 骨软骨瘤外层软骨帽损伤
正确答案：B 您选择的答案：

第30题 19岁男孩，发现右大腿下端内侧硬性突起，无疼痛，膝关节运动尚好。最可能的诊断是

A．内生软骨瘤
B．骨软骨瘤
C．骨囊肿
D．骨巨细胞瘤
E．尤文肉瘤
正确答案：B 您选择的答案：

第31题 男，12岁，确诊为左肱骨下端骨肉瘤，行截肢手术后2个月，出现胸痛，X线片显示：右肺上叶转移性肿瘤，其转移途径可能是

A．直接蔓延
B．通过淋巴管转移
C．通过动脉转移
D．通过静脉转移
E．通过神经转移
正确答案：D 您选择的答案：

第32题 骨巨细胞瘤患者其肿瘤活检病理报告：骨巨细胞瘤 级。治疗首选

A．截肢术+全身化疗
B．刮除植骨术
C．刮除灭活植骨术
D．刮除骨水泥充填术
E．刮除灭活骨水泥充填术
正确答案：A 您选择的答案：

第33题 40岁男性，股骨下端疼痛，膝关节活动轻微受限。查体：股骨下端偏外侧局限性隆起，压痛，皮温略高。X片：股骨外侧髁可见偏心性生长的骨吸收病灶，皮质向外膨隆，变薄，无骨膜反应。诊断为

A 骨纤维异样增殖症
B 骨巨细胞瘤
C 嗜酸性肉芽肿
D 内生软骨瘤
E 骨囊肿
正确答案：B 您选择的答案：

第34题 35岁男性，右手中指近节指骨肿胀，疼痛。查体：右手中指近节指骨膨隆，皮肤颜色正常，轻微压痛，关节运动不受限。可能性最大的诊断是

A 骨囊肿
B 内生软骨瘤
C 骨巨细胞瘤
D 骨软骨瘤
E 骨结核
正确答案：B 您选择的答案：

第35题 学生，19岁，右股骨下端疼痛3月，夜间尤甚。查体：右股骨下端偏内侧局限性隆起，皮温略高，皮肤浅静脉怒张，明显压痛，膝关节运动受限。X片，股骨下端溶骨性骨破坏，可见Codman三角。诊断为

A 软骨肉瘤
B 纤维肉瘤
C 骨肉瘤
D 骨巨细胞瘤
E 尤文肉瘤
正确答案：C 您选择的答案：

第36题 9岁男孩，右胫骨上端疼痛，肿胀，压痛，关节活动受限。X片：右胫骨上端偏右骨密度增高，边界不清，有骨膜反应。治疗应选择

A 大量抗生素
B 非甾体类抗炎剂
C 截肢术
D 理疗
E 牵引制动
正确答案：C 您选择的答案：

第37题 女，38岁，右手中环指肿胀，疼痛，X线片显示中、环指近节指骨膨胀性骨吸收，夹杂钙化斑。诊断为内生软骨瘤，施刮除植骨术后一年复发，下一步的治疗是

A．肿瘤段切除植骨术
B．肿瘤段切除人工关节置换术
C．刮除植骨术
D．截指术
E．放射治疗
正确答案：C 您选择的答案：

第38题 男，15岁，半年前因右肱骨下端骨肉瘤行截肢手术，半月前出现右胸痛、咳嗽，X线片示右肺上叶转移性肿瘤，其转移途径可能是

A．直接蔓延扩散

- B. 经动脉传播
- C. 经淋巴扩散
- D. 经静脉传播
- E. 沿神经干蔓延

正确答案：D 您选择的答案：

第39题 男，40岁，股骨下端疼痛，膝关节屈曲障碍。体检：股骨下端偏内侧局限性隆起，压痛，皮温略高。X线片：股骨内侧髁可见偏心性生长的骨吸收病灶，皮质向外膨隆，变薄，无明显骨膜反应。考虑诊断为

- A. 骨囊肿
- B. 骨巨细胞瘤
- C. 内生软骨瘤
- D. 嗜酸性肉芽肿
- E. 骨纤维异样增殖症

正确答案：B 您选择的答案：

第40题 9岁男孩，右胫骨上端疼痛，肿胀，压痛，关节活动受限。X线片，右胫骨上端偏右骨密度增高，边界不清，骨膜出现“日光照射”现象。治疗应选择

- A. 大量抗生素
- B. 非甾体类抗炎剂
- C. 截肢术+全身化疗
- D. 理疗
- E. 牵引制动

正确答案：C 您选择的答案：

第41题 30岁男性，右手中环指肿胀，疼痛，x片显示中、环指近节指骨膨胀性骨吸收，夹杂钙化斑。诊断内生软骨瘤，施刮除植骨术。术后一年复发，进一步的治疗是

- A. 肿瘤段切除植骨术
- B. 肿瘤段切除人工关节置换术
- C. 刮除植骨术
- D. 截指术
- E. 放射治疗

正确答案：C 您选择的答案：

第42题 男，15岁，左膝内下方可扪及一硬性肿块，轻度压痛，X线片示病变白干骺端突出的骨性突起，较触之略小，其诊断最大的可能是

- A. 骨肉瘤
- B. 内生软骨瘤
- C. 骨瘤
- D. 骨软骨瘤
- E. 骨巨细胞瘤

正确答案：D 您选择的答案：

第43题 16岁男患，洗浴时无意中触及右大腿下端内侧硬性突起，无疼痛，膝关节运动良。最可能的诊断是

- A. 软骨瘤
- B. 骨软骨瘤
- C. 骨巨细胞瘤
- D. 骨囊肿
- E. 骨化性肌炎

正确答案：B 您选择的答案：

三、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第44-47题

男，35岁，右膝关节内侧疼痛，肿胀半年，曾在外院摄X线片，见右胫骨上端内侧有一5cm×4cm大小透光区，中间有肥皂泡沫阴影，骨端膨大。近1个月来肿胀明显加重，夜间疼痛难忍，右膝关节活动受限。入院后X线摄片示胫骨上端病变扩大，肥皂泡沫阴影消失，呈云雾状阴影，病变侵入软组织

1. 该患者最可能的诊断是

- A. 骨肉瘤
- B. 骨软骨瘤恶变
- C. 骨囊肿
- D. 骨纤维肉瘤
- E. 骨巨细胞瘤恶变

2. 下列治疗措施哪项最合适

- A. 病灶刮除+植骨
- B. 病灶刮除+骨水泥填充
- C. 广泛切除+大块骨或假体植入
- D. 截肢
- E. 放射治疗或化疗

3. 复查时最重要的项目是

- A. 血常规
- B. 胸部X线检查
- C. 局部检查
- D. 血碱性磷酸酶测定
- E. 尿本-周蛋白测定

4. 上述病人若病变处于早期阶段时，治疗应选择

- A. 病灶刮除+植骨
- B. 病灶不处理，严密观察
- C. 瘤段切除，假体植入

D 瘤段切除，植骨
E 放射治疗
正确答案：EDBA 您选择的答案：

第48-50题

女，40岁，因腰背痛半月余入院，剑突与脐连线的中点以下皮肤感觉减退，双下肢肌力减弱

1. 病因检查中，下列哪项最有价值
- A. 详细询问病史和检查
- B. X线平片
- C. MRI
- D. CT
- E. 核素骨扫描
2. 查体时最有价值的发现是
- A. 下肢肌力减退
- B. 病变累及的节段平面以下皮肤感觉和肌力异常
- C. 尿潴留
- D. 膝腱反射消失
- E. 大便干结
3. 考虑其病变节段为
- A. 胸5~6椎体
- B. 胸6~7椎体
- C. 胸7~8椎体
- D. 胸8~9椎体
- E. 胸9~10椎体

正确答案：ABD 您选择的答案：

第51-54题

女，36岁。右股骨上端疼痛20天，查体：右股骨上端肿胀，压痛，右髋关节活动受限。X片：右股骨颈及转子下溶骨性骨破坏。3年前患乳癌，施乳癌根治术。局部无复发

1. 最可能的诊断是
- A 骨肉瘤
- B 软骨肉瘤
- C 纤维肉瘤
- D 骨巨细胞瘤
- E 乳癌骨转移
2. 最佳治疗方案
- A 皮牵引，止痛，化疗
- B 单纯化疗
- C 单纯放疗
- D 瘤段切除，假体置入
- E 瘤段切除，假体置入，化疗
3. 最重要的辅助检查项目是
- A 胸部X线检查
- B 局部CT检查
- C 局部MRI检查
- D 血生化检查
- E 腹部B超检查
4. 拟检查其他部位的骨骼是否有并存的病灶，最重要的检查项目是
- A CT
- B ECT
- C MRI
- D X线断层摄影
- E 骨髓穿刺

正确答案：EEAB 您选择的答案：

第55-57题

16岁女孩，左小腿上段肿胀疼痛半年，近1个月来肿胀明显，夜间痛明显。查体：左胫骨上端肿胀严重，压痛明显，浅静脉怒张，扪及一6cm×7cm硬性肿块，固定，边界不清。x线片示左胫骨上段呈虫蚀状溶骨性破坏，骨膜反应明显，可见Codman三角

1. 最可能的诊断是
- A 左胫骨慢性骨髓炎
- B 左胫骨骨肉瘤
- C 左胫骨骨巨细胞瘤恶变
- D 左胫骨纤维肉瘤
- E 左胫骨骨软骨瘤恶变
2. 在住院行手术治疗前，应常规进行下列哪项检查
- A 淋巴结活检
- B 头颅CT
- C 胃肠道钡餐检查
- D 胸部X线摄片
- E 骨髓穿刺
3. 最佳治疗方案是
- A 单纯化疗
- B 单纯放疗
- C 截肢术，术前后化疗
- D 刮除植骨术，术前后化疗
- E 刮除骨水泥充填术，术前后化疗

正确答案：DDC 您选择的答案：

第58-60题

女性，25岁，左膝上方逐渐隆起包块伴酸痛半年，X线平片提示左股骨下端外侧有一病灶，边缘膨胀，中央有肥皂泡样改变，无明显的骨膜反应

1. 其诊断考虑为

- A 骨纤维异样增殖症
- B 骨髓瘤
- C 骨肉瘤
- D 骨巨细胞瘤
- E 骨囊肿

2. 确立诊断，最有力的检查方法是

- A 外周血中碱性磷酸酶检测
- B 局部穿刺活组织检查
- C CT检查
- D 核素骨扫描
- E 外周血白细胞计数和分类

3. 以下准备采用的治疗方案中，哪一个不恰当

- A 病灶刮除骨水泥填塞
- B 病段骨切除，胫骨翻转植骨膝关节融合
- C 病段骨切除，同种异体半关节移植术
- D 病段骨切除，带血管骨移植
- E 股骨中上1/3截肢，安装假肢

正确答案：DBE 您选择的答案：

第61-63题

女性，14岁，右小腿酸痛2个月，进行性加重近1周，疼痛难忍，夜间尤其明显，伴发热38℃。体格检查：右胫骨中段膨隆，压痛，局部皮温增高。X线片显示胫骨中段骨质破坏，骨膜呈葱皮样改变

1. 诊断为尤文肉瘤，主要应与以下哪一种病变相鉴别

- A 骨结核
- B 化脓性骨髓炎
- C 骨囊肿
- D 骨纤维肉瘤
- E 骨纤维异样增殖症

2. 对诊断、鉴别诊断最有价值的是哪一项检查

- A X线平片
- B 核素骨扫描
- C CT
- D 血白细胞计数及分类
- E 组织活检，病理检查

3. 应采取哪一种治疗最有效

- A 化疗药物治疗
- B 放射治疗
- C 截肢+化疗
- D 放射治疗+截肢
- E 病段切除，灭活再植

正确答案：BED 您选择的答案：

第64-66题

女，35岁，右膝上方肿痛3个月，膝关节伸屈活动受限，X线片示右股骨下端有一破坏灶，边缘膨胀，中央有肥皂泡样改变，向内已超过中线，远端距关节面不足1cm，周围无骨膜反应

1. 该诊断考虑为

- A 骨巨细胞瘤
- B 骨囊肿
- C 骨髓炎
- D 骨结核
- E 骨肉瘤

2. 确立诊断的最有力的依据是

- A 血清碱性磷酸酶增高
- B 核素骨扫描
- C CT检查
- D 血沉增快
- E 局部穿刺活组织检查

3. 治疗措施中，下列哪项是错误的

- A 病灶刮除填塞骨水泥
- B 瘤段骨切除+同种异体半关节移植术
- C 股骨中上1/3截肢，安装假肢
- D 病段骨切除，带血管骨移植
- E 病灶刮除骨水泥填塞术后长腿石膏托外固定

正确答案：AEC 您选择的答案：

第67-69题

男，50岁，腰痛1个月入院。体检：下腹壁反射消失，双下肢感觉及肌力减弱。

1. 在作出初步诊断的过程中，下列哪项很重要

- A 详细询问病史及全面的体格检查
- B X线片检查
- C CT
- D MRI
- E 核素骨扫描

2. X线片检查提示脊柱旁有占位，一般不考虑下列哪项疾病鉴别

- A 胸主动脉瘤
- B 胸椎结核
- C 脊髓肿瘤

- D. 脊柱骨肿瘤
- E. 神经根肿瘤
- 3. 估计其病变阶段位于
- A. T5~6椎体
- B. T6~7椎体
- C. T7~8椎体
- D. T8~9椎体
- E. T10~12椎体

正确答案：AAE 您选择的答案：

四、A4型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第70-74题

男，19岁，右小腿上段肿胀疼痛8个月，近2个月，来肿胀明显，低热，无夜间盗汗现象。体检：右胫骨上端肿胀严重，压痛明显，浅静脉怒张，扪及一8cm×6cm硬性肿块，固定，边界不清。X线片示：右胫骨上段呈虫蚀状溶骨性破坏，骨膜反应明显，可见“日光照射”现象。

1. 最可能的诊断是
- A. 右胫骨慢性骨髓炎
- B. 右胫骨软骨肉瘤
- C. 右胫骨骨巨细胞瘤恶变
- D. 右胫骨肉瘤
- E. 右胫骨骨软骨瘤恶变
2. 在住院行手术治疗前，应常规进行下列哪项检查

- A. 淋巴结活检
- B. 头颅CT
- C. 胃肠道钡餐检查
- D. 胸部X线摄片
- E. 骨髓穿刺

3. 确诊的最有力证据是

- A. 血清酸性磷酸酶升高
- B. CT或者MRI检查+体征
- C. 核素骨扫描
- D. 肿瘤标志物
- E. 局部穿刺活组织检查

4. 最佳治疗方案是

- A. 单纯化疗
- B. 放疗+免疫疗法
- C. 截肢术，术前术后化疗
- D. 刮除植骨术，术前术后化疗
- E. 刮除骨水泥充填术，术前术后化疗

5. 若患者术后5年出现胸痛、咯血，胸片可见右肺有2cm×3cm包块，分叶，边缘不清，考虑为骨肉瘤肺转移，关于骨肉瘤肺转移下列说法正确的是

- A. 骨肉瘤肺转移是骨肉瘤患者致死的重要原因
- B. 骨肉瘤术后预防性肺部照射可以明显提高患者的生存率
- C. 骨肉瘤肺转移一般采取开胸治疗，术后辅助化疗，可以提高生存率
- D. 骨肉瘤肺转移治疗关键在于早期发现
- E. 为防止骨肉瘤肺转移，术后应该每6周摄胸片一次，每3个月行肺部CT检查，持续3年

正确答案：DDECB 您选择的答案：

五、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第75-78题

- A. 内生软骨瘤
- B. 股骨下端骨肉瘤
- C. 股骨下端尤文肉瘤
- D. 骨巨细胞瘤
- E. 骨软骨瘤

1. 男，20岁，左膝内上方无痛性硬性肿块1个月，X线片示左股骨内上缘有一白干骺端突出的骨性突起，无骨膜反应，诊断最大的可能是
2. 男，30岁，左膝肿胀半年隐痛，膝关节屈曲功能正常，X线平片示左股骨下端外侧有骨质破坏区，边缘膨胀性改变，中央有肥皂泡样改变，诊断是
3. 男，8岁，左大腿肿痛低热5天，疼痛进行性加重，X线片示左股骨干骨膜呈“葱皮”样改变，诊断可能是
4. 男，18岁，右大腿下端肿痛1个月，表皮温度高，静脉怒张，X线片示右股骨下端有边界不清的骨质破坏区，有Codman三角表现，诊断是

正确答案：EDCB 您选择的答案：

第79-81题

- A. 局部肿块，无触痛，外伤后始发现
- B. 表面静脉怒张
- C. 多发生于扁平骨及不规则骨
- D. 发病后迅速出现瘫痪
- E. 病理性骨折后可自愈

1. 骨软骨瘤可见到
2. 骨囊肿可见到
3. 骨肉瘤可见到

正确答案：AEB 您选择的答案：

第82-84题

- A．多发生于扁平骨及不规则骨
- B．表面静脉怒张，皮温明显增高
- C．病理性骨折后可自愈
- D．发病后迅速出现瘫痪
- E．局部肿块，无触痛，外伤后始发现
- 1．骨软骨瘤可见到
- 2．骨囊肿可见到
- 3．骨肉瘤可见到

正确答案：ECB 您选择的答案：

第85-87题

- A．日光放射现象
 - B．葱皮样骨膜反应
 - C．大量棉絮样肿瘤骨
 - D．膨胀性皂泡样改变
 - E．膨胀性磨砂样改变
 - 1．尤文瘤的X线片改变
 - 2．骨巨细胞瘤的X线片改变
 - 3．骨肉瘤的X线片改变
- 正确答案：BDA 您选择的答案：

习题集 外科学 骨与关节感染

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 骨关节结核窦道形成继发化脓感染时与慢性化脓性脊椎炎在x片上鉴别诊断的要点是

- A 一般只影响单个椎体，椎间隙正常
- B 椎体骨质密度增高，硬化，椎间隙变窄
- C 椎体骨质疏松，脊柱呈竹节样融合
- D 椎体边缘破坏，椎间隙变窄，椎旁软组织阴影增宽
- E 一般影响多个椎体，椎体变形，椎间隙正常

正确答案：D 您选择的答案：

第2题 关于化脓性关节炎，哪项是错误的

- A 好发于髋关节
- B 可自愈
- C 致病菌是金黄色葡萄球菌
- D 感染途径多为血源性
- E 可并发病理脱位

正确答案：B 您选择的答案：

第3题 Brodie脓肿即

- A 局限性骨脓肿
- B Garre骨髓炎
- C 创伤后骨髓炎
- D 血源性骨髓炎
- E 硬化性骨髓炎

正确答案：A 您选择的答案：

第4题 关于急性化脓性骨髓炎，最可靠的查体发现是

- A 体温高，患部皮温高
- B 患肢干骺端深压痛
- C 患肢干骺端肿胀、关节活动受限
- D 呼吸急促
- E 脉搏加快

正确答案：B 您选择的答案：

第5题 化脓性关节炎经穿刺及关节内注入抗生素治疗后，未能控制症状时，应当

- A 调整抗生素种类
- B 调整并加大抗生素全身用量
- C 增加关节穿刺次数
- D 增加关节内抗生素用量
- E 切开引流

正确答案：E 您选择的答案：

第6题 下列慢性骨髓炎的手术治疗目的，哪项是错误的

- A 消灭窦道病灶
- B 取出大片状死骨
- C 消灭死腔
- D 关闭伤口
- E 查明致病菌

正确答案：E 您选择的答案：

第7题 化脓性关节炎与关节结核的鉴别，下列哪项无价值

- A 是否有高热等急性全身表现
- B 局部是否有红肿、疼痛与皮温明显增高
- C 血和关节液的白细胞总数和中性粒细胞增多的程度
- D 浮髌试验阳性
- E 关节液是否培养出革兰氏阳性球菌

正确答案：D 您选择的答案：

第8题 骨与关节结核多见于

- A 肘关节
- B 肩关节
- C 脊柱
- D 髋关节
- E 膝关节

正确答案：C 您选择的答案：

第9题 血源性骨髓炎病理特点是

- A 骨质增生为主
- B 死骨形成
- C 骨质破坏为主
- D 细胞浸润和炎性渗出为主
- E 骨质破坏与反应性骨质增生同时存在

正确答案：C 您选择的答案：

第10题 成人脊椎结核和椎体肿瘤在x线上的主要鉴别点是观察

- A 椎体破坏的程度

B 椎体破坏的数目
C 椎旁软组织阴影的形态
D 椎间隙是否变狭窄或消失
E 椎体骨质疏松的程度
正确答案：D 您选择的答案：

第11题 单纯滑膜结核的X线表现为
A．关节间隙狭窄，软组织肿胀
B．关节间隙增宽，骨质破坏
C．骨质疏松，软组织肿胀
D．骨质密度增高
E．骨膜反应性增生
正确答案：C 您选择的答案：

第12题 治疗化脓性关节炎，哪项是错误的
A．局部制动
B．联合应用大剂量抗生素
C．全身支持疗法
D．关节腔穿刺吸引，灌洗或切开引流
E．急性期发生病理性脱位，应切开复位
正确答案：E 您选择的答案：

第13题 形成急性血源性骨髓炎大块死骨的原因主要是
A．骨膜血管断裂
B．骨的滋养血管栓塞
C．脓肿直接破坏骨组织
D．病理骨折
E．身体抵抗力差
正确答案：B 您选择的答案：

第14题 小儿股骨上端急性骨髓炎并发化脓性髋关节炎的主要途径，是
A．血行感染
B．脓肿穿破骺板进入关节
C．脓肿穿破干骺端骨皮质进入关节
D．骨膜下脓肿破入关节
E．软组织脓肿破入关节
正确答案：C 您选择的答案：

第15题 骨关节结核最常见的发生部位，是
A 全身滑膜面积最大的膝关节
B 脊柱椎体
C 活动最多的髋关节
D 负重最大的踝关节
E 肌肉最不发达的腕关节
正确答案：B 您选择的答案：

第16题 关节结核的早期X线主要表现是
A．以骨质增生为主
B．骨质增生与破坏并存
C．以骨破坏为主
D．局限性脱钙
E．关节间隙消失
正确答案：C 您选择的答案：

第17题 全关节结核是指
A 关节内积液增多
B X线片可见骨质破坏
C 血沉明显增快
D 关节疼痛严重
E 病变累及骨、软骨及滑膜
正确答案：E 您选择的答案：

第18题 急性血源性骨髓炎的致病菌是
A．绿脓杆菌
B．金黄色葡萄球菌
C．白葡萄球菌
D．大肠杆菌
E．甲型链球菌
正确答案：B 您选择的答案：

第19题 急性化脓性骨髓炎，骨膜下穿刺抽出脓液后，治疗主要是
A．立即石膏托固定患肢
B．立即行患肢皮牵引
C．骨密质开窗引流
D．大剂量、联合应用广谱抗生素
E．清热解毒中药治疗
正确答案：C 您选择的答案：

第20题 化脓性关节炎的早期表现中，下列哪项是错误的
A．关节疼痛

- B. 发热
 - C. 关节肿胀及积液
 - D. X线片见关节面破坏，关节间隙变窄
 - E. 关节液中可找到脓细胞
- 正确答案：D 您选择的答案：

第21题 临床诊断脊柱结核，下列哪项指标最有价值

- A. 局部疼痛肿胀
 - B. X线摄片
 - C. 穿刺液作结核菌培养
 - D. 消瘦、贫血、盗汗及食欲不振
 - E. 结核菌素试验阳性
- 正确答案：B 您选择的答案：

第22题 早期诊断化脓性关节炎，最有确诊价值的检查是

- A. 血沉
 - B. 血培养
 - C. X线摄片
 - D. 血细胞计数及分类
 - E. 关节穿刺及关节液检查
- 正确答案：E 您选择的答案：

第23题 急性化脓性骨髓炎行局部引流的原则是

- A. 在软组织内可触及脓肿时方施行
 - B. 待X线片显示骨质破坏时进行
 - C. 应尽量避免切开以免形成窦道
 - D. 临床诊断一经明确，抗生素治疗数日无效，即行引流手术
 - E. 待全身中毒症状改善后再施行
- 正确答案：D 您选择的答案：

第24题 骨与关节结核的表现，下列哪项不正确

- A. 常形成流注脓肿
 - B. 常形成窦道
 - C. 死骨可经窦道流出
 - D. 寒性脓肿不会穿破肠管，膀胱等空腔脏器
 - E. 关节结核可出现梭形肿胀
- 正确答案：D 您选择的答案：

第25题 慢性骨髓炎的手术指征是

- A. 有骨膜反应
 - B. 病变骨变粗
 - C. 有死骨
 - D. 局部红肿
 - E. 反复发热
- 正确答案：C 您选择的答案：

第26题 急性血源性骨髓炎好发于

- A. 婴幼儿
 - B. 青壮年
 - C. 儿童
 - D. 老年
 - E. 中年
- 正确答案：C 您选择的答案：

第27题 骨关节结核下列哪种情况，不适于手术治疗

- A. 有明显死骨，较大脓肿
 - B. 经久不愈的窦道
 - C. 脊柱结核合并截瘫
 - D. 全身中毒症状严重，衰弱，重度贫血
 - E. 早期全关节结核，为了抢救关节功能
- 正确答案：D 您选择的答案：

第28题 儿童期急性骨髓炎脓肿穿破干骺端骨皮质后，可直接进入关节的部位是

- A. 胫骨上端
 - B. 胫骨下端
 - C. 股骨上端
 - D. 股骨下端
 - E. 肱骨上端
- 正确答案：C 您选择的答案：

第29题 儿童化脓性骨髓炎的脓肿不易进入关节腔的原因，是

- A. 儿童的关节对化脓性炎症的抵抗力强
 - B. 关节囊对关节腔具有保护作用
 - C. 脓肿容易局限和吸收
 - D. 脓肿容易向软组织溃破
 - E. 干骺端的骺板起屏障作用
- 正确答案：E 您选择的答案：

第30题 急性化脓性骨髓炎抗生素治疗哪项较为合理

- A. 体温降至正常即停药

- B. 体温降至正常继续用药3天
 - C. 体温降至正常继续用药1周
 - D. 体温降至正常继续用药2~3周
 - E. 体温降至正常继续用药1个月
- 正确答案：D 您选择的答案：

第31题 诊断成人腰椎结核最可靠的依据是

- A. 低热盗汗、乏力、食欲不振
 - B. 贫血、血沉增快
 - C. 腰痛、活动困难、棘突叩痛
 - D. X线片示椎间隙窄，椎体邻缘模糊
 - E. 结核菌素试验阳性
- 正确答案：D 您选择的答案：

第32题 诊断成人脊柱结核最有价值的检查项目是

- A. 细菌培养
 - B. 血沉
 - C. X线照片
 - D. 结核菌素试验
 - E. 血尿常规与血生化检查
- 正确答案：C 您选择的答案：

第33题 急性血源性骨髓炎的发病部位最常见于

- A. 尺桡骨
 - B. 肱骨、肩胛骨
 - C. 胫骨、股骨
 - D. 髌骨、髌骨
 - E. 脊椎骨
- 正确答案：C 您选择的答案：

第34题 X线片上成人的椎体结核和椎体肿瘤的主要鉴别点，是

- A. 椎体的破坏程度
 - B. 是否有死骨形成
 - C. 椎旁软组织阴影
 - D. 椎间隙是否狭窄或消失
 - E. 椎体骨质疏松的程度
- 正确答案：D 您选择的答案：

第35题 关于急性化脓性骨髓炎，最可靠的体征是

- A. 体温升高，患肢皮温较健侧高
 - B. 患肢干骺肿胀、关节活动受限
 - C. 呼吸急促，心跳加快
 - D. 血压下降，脉搏细弱
 - E. 患肢干骺端深压痛
- 正确答案：E 您选择的答案：

第36题 在治疗早期膝关节滑膜结核中，除全身治疗外，局部治疗最恰当的措施是

- A. 制动
 - B. 穿刺抽脓，注入抗痨药
 - C. 穿刺抽脓，注入抗痨药+制动
 - D. 滑膜切除术
 - E. 膝关节加压融合术
- 正确答案：C 您选择的答案：

第37题 诊断成人腰椎结核最可靠的依据

- A. 低热、盗汗、乏力和食欲不振
 - B. 贫血、血沉加快
 - C. 腰痛、拾物实验阳性
 - D. X线片示椎间隙狭窄，椎体边缘模糊
 - E. 结核菌素试验阳性
- 正确答案：D 您选择的答案：

第38题 化脓性关节炎后期关节已有破坏与增生，强直已不可避免时，最恰当的治疗方法是

- A. 避免负重
 - B. 加强活动
 - C. 固定于功能位
 - D. 行关节融合术
 - E. 物理疗法
- 正确答案：D 您选择的答案：

第39题 急性骨髓炎，在骨膜下或骨髓内抽得脓液后，最关键的治疗措施是

- A. 局部引流
 - B. 联合使用大量抗生素
 - C. 多次抽脓并注入抗生素
 - D. 进行脓液细菌培养及药敏试验，据结果调整用药
 - E. 局部固定防止病理性骨折
- 正确答案：A 您选择的答案：

第40题 早期骨关节结核与类风湿性关节炎可靠的鉴别诊断依据是

- A. 单一关节肿胀

B. 血沉增快
C. X线平片关节间隙有无狭窄
D. 关节穿刺行关节液检查
E. 活组织检查
正确答案：E 您选择的答案：

第41题 急性骨髓炎转为慢性骨髓炎的主要原因是
A 机体抵抗力低
B 细菌毒力过于强大
C 治疗不及时和不恰当
D 局部血运不好
E 肢体活动过早
正确答案：C 您选择的答案：

第42题 诊断成人脊柱结核最可靠的依据是
A 有低热，盗汗史
B 血沉快
C 结核菌素试验(+)
D X线摄片示椎间隙狭窄，相邻椎体边缘模糊
E 全身虚弱、贫血
正确答案：D 您选择的答案：

第43题 化脓性关节炎后期关节已有破坏与增生，强直已不可避免时，最恰当的治疗方法是
A. 避免负重
B. 行关节融合术
C. 固定于功能位
D. 加强活动
E. 物理疗法
正确答案：B 您选择的答案：

第44题 慢性化脓性骨髓炎，如大部分病灶已愈合，只有小块死骨存在，死骨不大的，应采取哪种治疗方法
A 单纯窦道刮除术
B 单纯死骨摘除术
C 切开引流术
D 大量抗生素应用
E 死骨摘除窦道刮除碟形手术
正确答案：E 您选择的答案：

第45题 急性血源性骨髓炎早期局部穿刺的正确方法是
A 一次穿入骨髓腔
B 一次穿入骨膜下
C 逐层穿刺
D 不可穿入骨髓内
E 仅刺入软组织即可
正确答案：C 您选择的答案：

第46题 急性血源性骨髓炎应用抗生素治疗后，全身及局部症状消失，仍需应用抗生素至少
A. 1周
B. 2周
C. 3周
D. 4周
E. 6周
正确答案：C 您选择的答案：

第47题 一般多采用非手术治疗的骨关节结核是
A 破坏较明显，进展快，又很靠近关节软骨的单纯骨型
B 全关节型早期
C 病灶内有较大死骨
D 单纯滑膜型
E 窦道长期未愈合
正确答案：D 您选择的答案：

第48题 化脓性关节炎与关节结核的关节炎区别点在于
A. 黏稠度
B. 臭味及颜色
C. 红细胞量的多少
D. 积液量的多少
E. 白细胞总数及中性粒细胞所占比例
正确答案：E 您选择的答案：

第49题 骨关节结核最容易发生的部位是
A. 全身滑膜面积最大的膝关节
B. 脊柱椎体
C. 活动最多的髋关节
D. 负重最大的踝关节
E. 肌肉最不发达的腕关节
正确答案：A 您选择的答案：

第50题 下列哪项不是骨关节结核病灶清除术的适应证
A. 有明显死骨或较大脓肿不易自行吸收者

- B. 窦道流脓，经久不愈者
 - C. 脊柱结核合并截瘫者
 - D. 病人全身中毒症状重，抗结核药物治疗后无效者
 - E. 单纯骨或滑膜结核，即将发展成全关节结核者
- 正确答案：D 您选择的答案：

第51题 早期滑膜结核与类风湿性关节炎鉴别的可靠依据是

- A 累及关节的数目
- B 血沉是否正常
- C 关节间隙是否狭窄
- D 结核菌素试验
- E 滑膜组织病理学检查

正确答案：E 您选择的答案：

第52题 单纯滑膜结核的X线表现是

- A 关节间隙狭窄，软组织肿胀
- B 关节间隙增宽，骨质破坏
- C 骨质疏松，软组织肿胀
- D 骨质密度增高
- E 骨膜反应性增生

正确答案：C 您选择的答案：

第53题 急性血源性骨髓炎早期局部穿刺的正确方法是

- A. 逐层穿刺
- B. 一次穿入骨膜下
- C. 一次穿入骨髓腔
- D. 不可穿入骨髓内
- E. 仅刺入软组织即可

正确答案：A 您选择的答案：

第54题 化脓性关节炎与关节结核的关节液区别点，在于

- A 粘稠度
- B 臭味
- C 白细胞总数及中性粒细胞所占比例
- D 积液量的多少
- E 细胞量的多少

正确答案：C 您选择的答案：

第55题 髋关节全关节结核合并冷脓肿形成，诊断确定后最好应

- A 立即进行切开引流
- B 立即进行病灶清除
- C 应用抗结核药物2~4周后行病灶清除术
- D 应用抗结核药物2~4周后行脓肿搔刮
- E 髋人字石膏固定，并应用抗结核药物

正确答案：C 您选择的答案：

第56题 急性化脓性骨髓炎行局部引流的原则，是

- A 应尽量避免切开以免形成窦道
- B 应待x线片显示骨质破坏时进行
- C 临床诊断--经明确抗生素治疗数日无效即行引流手术
- D 在软组织内可触及脓肿时方施行
- E 待全身中毒症状改善后再施行

正确答案：C 您选择的答案：

第57题 急性骨髓炎，在骨膜下或骨髓内抽得脓液后，最关键的治疗措施是

- A 多次抽脓并注入抗生素
- B 进行脓液细菌培养及药敏试验，据结果调整用药
- C 联合使用大量抗生素
- D 局部引流
- E 局部固定防止病理性骨折

正确答案：D 您选择的答案：

第58题 慢性骨髓炎死骨摘除术指征，是

- A 有死骨、死腔骨包壳薄弱
- B 发热，局部红肿，有死骨、死腔
- C 开放性骨折感染，骨折尚未愈合，有大块死骨
- D 骨包壳充分形成，有死骨、死腔
- E 死骨分界不清，有死腔与窦道

正确答案：D 您选择的答案：

第59题 急性血源性骨髓炎最常见的致病菌是

- A 白色葡萄球菌
- B 霉菌
- C 金黄色葡萄球菌
- D 大肠杆菌
- E 肺炎双球菌

正确答案：C 您选择的答案：

第60题 慢性骨髓炎迁延不愈，反复发作的最主要原因是

- A 窦道的形成

- B 死骨的残留
- C 瘢痕组织增生
- D 机体抵抗力低
- E 细菌毒力太强

正确答案：B 您选择的答案：

第61题 脊柱结核好发年龄是

- A. 婴幼儿
- B. 10岁以下儿童
- C. 青壮年
- D. 中年
- E. 老年

正确答案：B 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第62题 某患者第8、9胸椎结核病灶清除术后，恢复工作已半年。近1个月来又出现背痛乏力、盗汗低热和双下肢无力症状再次出现。体检第8、9胸椎局部有明显叩击痛，双下肢肌力Ⅱ级，巴彬斯基征(+)，血沉80mm/小时，最适当的治疗措施是

- A. 非手术治疗，卧石膏床
- B. 后路植骨融合术
- C. 按急症行病灶清除术
- D. 以非手术治疗为主，必要时行病灶清除术
- E. 在抗结核药物保护下尽早行病灶清除术

正确答案：E 您选择的答案：

第63题 男，14岁，高热3天，左膝部痛，活动受限，浮髌试验阳性，左膝红肿热痛，x线片显示左膝关节周围软组织肿胀，关节间隙增宽，临床诊断为

- A. 急性骨髓炎
- B. 急性化脓性膝关节炎
- C. 左膝关节结核
- D. 左膝部软组织脓肿
- E. 风湿性膝关节炎

正确答案：B 您选择的答案：

第64题 女，38岁，腰痛1年，1个月前发现右髂窝肿块，x线平片示胸12腰1椎体破坏，诊断为胸腰椎结核伴髂窝脓肿，下列哪项治疗方案最佳

- A. 抗结核治疗+石膏背心固定
- B. 抗结核治疗+髂窝脓肿切开引流
- C. 立即行病灶清除、椎体间植骨融合+术后抗结核治疗
- D. 术前2周抗结核治疗后行病灶清除椎体间植骨融合+术后继续抗结核治疗
- E. 脓肿穿刺吸脓后，注入抗结核药物

正确答案：D 您选择的答案：

第65题 一个5岁男孩，低热颈痛数月，检查颈部旋转受限，X线侧位片可见寰椎向前脱位，咽后壁增宽，其诊断最大可能为

- A 外伤性寰椎脱位
- B 自发性寰椎脱位
- C 咽后壁脓肿
- D 寰枢椎结核
- E 寰枢椎畸形

正确答案：D 您选择的答案：

第66题 第7、8胸椎结核病灶清除术后，恢复工作已一年。近3个月来又出现背痛乏力、盗汗低热和双下肢无力症状。查体第7、8胸椎局部有明显叩击痛，双下肢肌力Ⅲ级，巴彬斯基反射(+)，血沉增快，最适当的治疗措施是

- A 非手术治疗，卧石膏床
- B 以非手术治疗为主，必要时行病灶清除术
- C 在抗结核药物保护下尽早行病灶清除术
- D 按急症病灶清除术
- E 后路植骨融合术

正确答案：C 您选择的答案：

第67题 10岁女童，左大腿下端肿痛。体检：体温40℃，局部皮温高，深压痛，穿刺抽出少量脓性液体。进一步治疗中，下列哪项是最关键的

- A. 联合应用大剂量抗生素
- B. 根据药敏选用敏感抗生素
- C. 全身支持疗法，注意水电解质平衡
- D. 局部减压引流+患肢制动
- E. 避免外伤骨折

正确答案：D 您选择的答案：

第68题 10岁男孩，摔倒后当晚发热，左膝部疼痛，青霉素治疗2日无效来院。检查左股骨下端肿胀，有局限性深压痛，局部皮肤红肿，体温明显升高，浮髌试验(+)，测腋温39℃，白细胞计数 $16 \times 10^9/L$ ，中性0.80，血沉30mm/小时，诊断为

- A. 化脓性膝关节炎
- B. 风湿性膝关节炎
- C. 股骨下端骨肉瘤
- D. 创伤性膝关节炎

E. 股骨下端化脓性骨髓炎

正确答案：A 您选择的答案：

第69题 24岁，女性患者，背痛，体检发现胸椎角状后突畸形，伴低热，血沉增快，主要考虑是

- A 脊椎肿瘤
- B 强直性脊柱炎
- C 脊柱骨性关节炎
- D 胸椎结核
- E 化脓性脊椎炎

正确答案：D 您选择的答案：

第70题 幼儿，7岁。骤然起病，恶寒高热3周，右小腿肿痛，膝关节活动受限右小腿弥漫性红肿，广泛压痛，膝关节积液，浮髌试验阳性，关节穿刺为浆液性渗出，X线片示右胫骨上端骨皮质散在虫蚀样骨破坏，骨膜反应明显，血象：白细胞总数 $15.6 \times 10^9/L$ ，分层穿刺见软组织内与骨膜下大量蓄脓，切开引流后体温下降，急性症状消退，其转归是

- A 痊愈
- B 形成慢性骨髓炎
- C 形成硬化性骨髓炎
- D 形成Brodie骨脓肿
- E 以上都不是

正确答案：B 您选择的答案：

第71题 青年患者，患胸椎结核，经一年抗结核治疗未见好转，近一个月有截瘫趋势，其治疗应选用

- A 继续抗结核药物+石膏床固定
- B 更换抗结核药物治疗观察三个月
- C 施行胸椎病灶清除及椎管减压术
- D 施行胸椎融合术
- E 采用椎管内注射链霉素，每日一次，共三个月

正确答案：C 您选择的答案：

第72题 青年男患，右膝关节慢性肿痛半年，活动障碍，但皮肤色泽正常，x线片示关节间隙变窄，诊断考虑为

- A 单纯骨结核
- B 单纯滑膜结核
- C 全关节结核
- D 化脓性关节炎
- E 化脓性骨髓炎合并关节炎

正确答案：C 您选择的答案：

第73题 女，31岁，背痛2个月，消瘦，乏力，食欲不振和盗汗，查体胸椎7~8棘突压痛及叩击痛，此时下列哪项检查是不必要的

- A. 血常规
- B. 胸椎正侧位片
- C. 胸部正侧位片
- D. 放射性核素骨扫描
- E. 结核菌素试验

正确答案：D 您选择的答案：

第74题 一女性病人，28岁。妊娠后期出现进行性背痛，下肢乏力，食欲减退。查体见第7胸椎轻度后突，有叩痛，x线片示第6、7胸椎间隙变窄，椎旁软组织阴影膨隆，血沉60mm/小时，最可能的诊断是

- A 胸椎转移癌
- B 胸椎结核
- C 胸椎血管瘤
- D 化脓性脊椎炎
- E 胸椎间盘脱出

正确答案：B 您选择的答案：

第75题 6岁男童，5天前突发右髋剧痛，右下肢活动受限，伴畏寒，高热，全身不适及食欲不振，体温39℃，脉搏110次/分。体检：右大腿近端肿胀，皮温升高，但外观无异常，腹股沟韧带中点稍下方深压痛，最可能的诊断是

- A. 右大腿软组织炎症
- B. 右股骨近端恶性肿瘤
- C. 右髋关节结核
- D. 右髋关节急性化脓性关节炎
- E. 右髋关节急性风湿性关节炎

正确答案：D 您选择的答案：

第76题 女，30岁，诊断为右膝关节单纯滑膜结核，行滑膜切除术后3周，病情恢复平稳，对膝关节的下一步处理是

- A. 逐渐开始练习关节不负重活动
- B. 必须大运动量，加强练习关节活动
- C. 继续皮牵引3个月，避免关节活动
- D. 待病情稳定后施关节融合术
- E. 用石膏管型固定于功能位促其骨性强直

正确答案：A 您选择的答案：

第77题 12岁女孩，左膝关节弥漫性肿胀已10个月，自觉轻度疼痛，无外伤史，检查见左膝关节肿胀，肌肉分层不清，骨质轻度疏松无破坏，可能为

- A 左膝关节结核性滑膜炎
- B 左膝关节风湿性关节炎
- C 左膝关节色素沉着绒毛结节性滑膜炎
- D 左膝关节滑膜瘤
- E 左膝关节类风湿性滑膜炎

正确答案：A 您选择的答案：

第78题 男性患者10岁，半年前曾患右股骨急性化脓性骨髓炎，经治疗后好转，但局部有窦道形成，常有少许稀黄色脓汁流出，近四日窦道口闭合，但出现高热，局部压痛明显，并有红肿，X线片示有死骨存留，而且包壳形成充分，应立即

- A 瘻道切除，一期缝合
- B 骨钻孔手术
- C 死骨摘除，植骨术
- D 切开引流
- E 瘻道搔刮术

正确答案：D 您选择的答案：

第79题 5岁男孩，突起高热，畏寒3天，伴左膝关节肿、痛就诊。查体：左侧膝关节明显红肿、压痛，活动时疼痛剧烈，浮髌试验(+)。下列处理哪项欠佳

- A 局部固定
- B 大剂量静脉注射抗生素
- C 关节内注射抗生素
- D 全身支持疗法
- E 切开引流

正确答案：E 您选择的答案：

第80题 一男孩，10岁。右膝部疼痛跛行2年，有夜间痛。检查右膝活动良好，右髌不能伸直，大腿肌肉萎缩，血沉28mm。X线片示髌关节骨质疏松，诊断应为

- A 髌关节类风湿性滑膜炎
- B 髌关节结核性滑膜炎
- C 髌关节一过性滑膜炎
- D 髌关节风湿性滑膜炎
- E 髌关节滑膜结核

正确答案：B 您选择的答案：

第81题 8岁男孩，右小腿轻微外伤后发冷发热(39.5)5天，右小腿上端肿胀，剧痛，局部皮温高，肤色正常，白细胞计数 $25 \times 10^9/L$ ，X线片未见明显变化，局部穿刺，针达骨膜下时抽出黄色脓汁，首先应考虑为

- A 急性蜂窝组织炎
- B 化脓性膝关节炎
- C 化脓性骨髓炎
- D 滑囊炎感染
- E 胫骨上端骨结核转变为膝关节全关节结核

正确答案：C 您选择的答案：

第82题 女，35岁，左膝肿痛半年，无红、热现象，X线片左膝关节骨小梁模糊，关节间隙变窄，诊断为膝关节结核，下列判断基本治愈的标准中哪项是错误的

- A 全身情况良好，体温正常，血沉正常
- B 局部无肿痛、无窦道
- C X线片显示脓肿消失或钙化
- D 起床活动一年或轻工作半年，以上三项无改变
- E 起床活动一年或轻工作半年，病情复发在两次之内

正确答案：E 您选择的答案：

第83题 男，30岁，腰痛2年，加重2个月，查体怀疑腰椎结核，下列哪项检查不合适

- A X线摄片
- B 核素检查
- C CT检查
- D MRI检查
- E 血沉

正确答案：B 您选择的答案：

第84题 女，17岁，半月前突感左膝关节疼痛伴高热，左膝部有跌伤史，查体左膝关节肿胀皮温高，压痛，浮髌试验阳性，诊断为

- A 急性风湿性关节炎
- B 软组织感染
- C 骨肉瘤
- D 化脓性关节炎
- E 创伤性滑膜炎

正确答案：D 您选择的答案：

第85题 12岁男孩，跌跤后当晚自感全身不适，发热，左膝部疼痛，经用青霉素3日无效来院。检查左股骨下端肿胀，有局限性深压痛，膝关节内有积液，活动障碍，潮红不著，体温39.5，白细胞计数 $18 \times 10^9/L$ ，中性90%，血沉80mm/h，诊断

- A 风湿性膝关节炎
- B 化脓性膝关节炎
- C 股骨下端化脓性骨髓炎
- D 创伤性膝关节炎
- E 股骨下端骨肉瘤

正确答案：C 您选择的答案：

第86题 9岁女性患儿，8天前突发左髌剧痛，左下肢活动受限，伴畏寒，高热，全身不适及食欲不振，急重病容，贫血，体温38.7，脉搏100次/分，左大腿近端肿胀，皮温升高，但外观无异常，腹股沟韧带中点稍下方深压痛，最可能的诊断是

- A 左髌关节急性风湿性关节炎
- B 左髌关节急性化脓性关节炎

- C 左髌关节结核
- D 左大腿软组织炎症
- E 左股骨近端恶性肿瘤

正确答案：B 您选择的答案：

第87题 男，10岁，左股骨下端肿胀发高热3天，X线片未见骨质异常，股部分层穿刺抽液找到脓细胞，下列治疗措施哪项是错误的

- A．静注大剂量广谱抗生素
- B．物理降温注意水、电平衡
- C．局部引流减压
- D．患肢制动
- E．体温降至正常，维持3天后停药

正确答案：E 您选择的答案：

第88题 男，12岁，右膝关节外伤半月后疼痛、活动受限，高热5天，右胫骨上端明显深压痛，为明确诊断应采取

- A．X线平片
- B．手术切开活检
- C．局部分层穿刺抽液送检
- D．CT
- E．MRI

正确答案：C 您选择的答案：

第89题 女患，诊断为右膝关节单纯滑膜结核，已行滑膜切除术后3周，病情恢复平稳，此时对膝关节的处理原则，是

- A 待病情稳定后施关节融合术
- B 用石膏管型固定于功能位促其骨性强直
- C 继续皮牵引三个月，避免关节活动
- D 逐渐开始练习不负重关节活动
- E 必须大运动量，加强练习关节活动

正确答案：D 您选择的答案：

第90题 男，16岁，低热2个月，胸椎后突畸形，X线片示胸。椎体破坏，椎体压缩成楔形，血沉增快，椎弓根阴影仍清晰可见，最可能的诊断是

- A．压缩性骨折
- B．脊椎结核
- C．脊椎肿瘤
- D．化脓性脊椎炎
- E．先天性脊柱畸形

正确答案：B 您选择的答案：

第91题 男患，26岁。截瘫，双下肢肌力 级，剑突以下痛，触觉消失，膝踝反射亢进，巴彬斯基反射阳性，疑诊脊柱结核所致。摄脊柱X线片应以

- A 第3胸椎为中心
- B 第5胸椎为中心
- C 第7胸椎为中心
- D 第9胸椎为中心
- E 第11胸椎为中心

正确答案：B 您选择的答案：

第92题 女，18岁，8月前曾患右股骨急性化脓性骨髓炎，经治疗后好转，但局部有窦道形成，常有少许稀黄色脓汁流出，近1周窦道口闭合，但出现高热，局部压痛明显，并有红肿，X线片示有死骨存留，而且包壳形成充分，应立即

- A．切开引流
- B．骨钻孔手术
- C．死骨摘除，植骨术
- D．瘻道搔刮术
- E．窦道切除，1期缝合

正确答案：A 您选择的答案：

第93题 26岁，女性患者，平素有背痛，乏力与低热，分娩后出现下肢瘫痪，检查胸椎9、10压痛，平脐以下痛觉减退，下肢痉挛性瘫，血沉加快，首先应考虑是

- A 脊髓蛛网膜炎
- B 脊髓肿瘤
- C 硬膜外腔脓肿
- D 胸椎结核
- E 横断性脊髓炎

正确答案：D 您选择的答案：

第94题 男，13岁，跌倒后10天，左膝上疼痛5天，伴高热39℃以上，膝上皮温高，压痛，左膝关节屈曲状，浮髌试验阴性，X线检查未见异常，此时行局部脓肿分层穿刺骨髓下抽出混浊液体，诊断应是

- A．左膝关节化脓性关节炎
- B．左股骨下端急性血源性骨髓炎
- C．尤文肉瘤
- D．左股部脓肿
- E．左股骨结核

正确答案：B 您选择的答案：

第95题 10岁男孩。右膝部疼痛跛行1年，有夜间痛。检查右膝活动良好，右髌不能伸直，大腿肌肉萎缩，血沉50mm/小时。X线片示髌关节骨质疏松，诊断应为

- A．髌关节-过性滑膜炎
- B．膝关节滑膜结核

- C. 髋关节结核性滑膜炎
- D. 髋关节风湿性滑膜炎
- E. 髋关节类风湿性滑膜炎

正确答案：C 您选择的答案：

第96题 男，10岁，发热伴左膝肿痛6天，穿刺有脓，诊断为左股骨下端急性化脓性骨髓炎，下列治疗中哪项是不妥的

- A. 全身支持疗法
- B. 联合应用大剂量有效抗生素
- C. 立即手术，病灶搔刮清除
- D. 切开钻孔引流
- E. 患肢制动

正确答案：C 您选择的答案：

第97题 男，18岁，左小腿中上段疼痛5年，偶有局部红、肿、疼痛及发热史，X线片示左胫骨近端囊性病变，周围有硬化区，诊断为局限性骨脓肿，其最佳治疗应为

- A. 应用抗生素治疗
- B. 刮除病灶
- C. 放疗
- D. 刮除病灶，冲洗干净后用自体骨植入
- E. 安置闭式引流冲洗脓腔

正确答案：D 您选择的答案：

第98题 5岁男孩，驼背，疼痛5个月，消瘦贫血，无神经症状，经检查双肺浸润性结核，6~8胸椎结核，伴椎旁脓肿，SRI 12mm，在支持疗法及全身抗结核治疗时应首选

- A. 病灶清除术
- B. 石膏背心
- C. 卧硬板床
- D. 冷脓肿穿刺
- E. 矫正驼背

正确答案：C 您选择的答案：

第99题 男，18岁，左小腿外伤后局部红肿热痛，破溃伴脓性渗出液2个月，X片见左胫骨骨膜反应，内有小片状游离骨片，其诊断是

- A. 胫骨骨折
- B. 急性骨髓炎
- C. 尤文肉瘤
- D. 慢性化脓性骨髓炎
- E. 胫骨结核

正确答案：D 您选择的答案：

第100题 12岁男孩，低热颈痛数月伴吞咽不适感，检查颈部旋转受限，X线侧位片可见寰椎向前脱位，咽后壁增宽，其诊断最大可能为

- A. 外伤性寰椎脱位
- B. 自发性寰椎脱位
- C. 咽后壁脓肿
- D. 寰枢椎畸形
- E. 寰枢椎结核

正确答案：E 您选择的答案：

第101题 女，45岁，胸痛背3个月，消瘦，贫血貌，胸8~9椎棘突压痛、叩击痛，X线片示胸8~9椎体破坏、椎间隙狭窄，椎旁有软组织阴影，血沉增快，胸部平片示左肺有钙化灶，其诊断为

- A. 胸8~9椎体肿瘤
- B. 化脓性脊椎炎
- C. 椎间盘突出症
- D. 胸椎结核
- E. 胸椎包囊虫病

正确答案：D 您选择的答案：

第102题 男，15岁，因高热左膝上剧痛5天，骨膜下抽出混浊液体，临床诊断为左股骨急性血源性骨髓炎，临床应用大剂量抗生素治疗3天不见好转，应采取

- A. 改换抗生素的种类
- B. 加大抗生素的剂量
- C. 联合应用多种抗生素
- D. 立即行开窗引流手术
- E. 股骨下端开窗引流，扩大剥离骨膜

正确答案：D 您选择的答案：

第103题 男孩，8岁。左大腿下端肿痛，查体：体温39.5，局部皮温高，深压痛，穿刺抽出少量脓性液体。进一步治疗中，下列哪项是最关键的

- A. 联合应用大剂量抗生素
- B. 患肢制动
- C. 全身支持疗法，注意水电解质平衡
- D. 局部减压引流
- E. 避免外伤骨折

正确答案：D 您选择的答案：

第104题 女，38岁，腰痛1年，加重2个月，体格检查怀疑是腰椎结核，下列哪项是不恰当的

- A. 摄腰椎X线平片
- B. 查ESR

- C. CT
- D. MRI
- E. 核素扫描

正确答案：E 您选择的答案：

第105题 骨与关节结核病人，混合感染，发热，体质虚弱，最好的处理方法是

- A 抗结核药+抗化脓菌感染药物
- B 穿刺抽脓，注入抗痨药物
- C 小切口引流
- D 彻底的病灶消除术
- E 局部Mqs04湿敷，谨防破溃，禁忌切开

正确答案：C 您选择的答案：

三、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第106-109题

男，30岁，无肺结核病史，右膝关节疼痛伴低热1年，行走困难，查体右膝关节肿胀，右股部肌萎缩，右膝关节呈屈曲畸形，X线片示右膝关节骨质增生，关节间隙变窄，血沉35mm/h

1. 该患者最可能的诊断是

- A. 类风湿性关节炎
- B. 膝关节结核
- C. 风湿性关节炎
- D. 痛风性关节炎
- E. 松毛虫性关节炎

2. 为进一步明确诊断，下列哪项检查最有价值

- A. CT
- B. MRI
- C. ECT
- D. 滑膜活检
- E. 关节穿刺液涂片检查

3. 如已确诊为膝关节结核，下一步治疗宜采用

- A. 抗结核药物
- B. 休息+营养
- C. 关节穿刺抽液+注入抗结核药物
- D. 病灶清除术
- E. 抗结核治疗+制动

4. 如果该患者治疗不及时、不彻底，发展成全关节结核，并有窦道形成，最合适的治疗是

- A. 继续抗结核治疗
- B. 石膏固定+开窗换药
- C. 全身支持疗法+窦道冲洗
- D. 病灶清除+关节融合
- E. 病灶清除+人工膝关节置换

正确答案：BDCD 您选择的答案：

第110-112题

男，21岁，左小腿因外伤手术后经常自伤口处流脓3年余，伤口愈合后无任何症状，破溃流脓时发热、局部肿胀，反复多次发作，现局部流脓，有时流出小碎骨片

1. 依据以上资料，诊断应是

- A. 急性骨髓炎
- B. 急性化脓性关节炎
- C. 慢性化脓性关节炎
- D. 慢性骨髓炎
- E. 尤文肉瘤

2. 最合理的进一步检查是

- A. 拍X线平片
- B. 核素扫描
- C. B超
- D. MRI
- E. 局部血管造影

3. X线片示左胫骨有死腔，其外有包壳形成，其内有较大的死骨片，此时治疗应采取

- A. 大剂量联合有效抗生素
- B. 开窗引流术
- C. 单纯闭式引流
- D. 清除病灶，取出死骨肌瓣填塞死腔
- E. 截肢术

正确答案：DAD 您选择的答案：

第113-115题

女性，30岁。以往有肺结核史，近1个月来腰背痛，伴低热，盗汗。体格检查：胸11~12棘突明显压痛

1. 对该患者最简便有效的诊断方法为

- A 血常规及血沉
- B 摄胸腰段X线片
- C CT
- D OT试验
- E 核素骨扫描

2. 有助于诊断的试验是

- A Dugas征
- B 直腿抬高试验

C Trendelenburg征
D 拾物试验
E Thomas征
3. 早期诊断确立后, 下列哪项治疗措施不妥
A 正规抗痨治疗
B 卧硬板床休息
C 立即手术, 病灶清除
D 全身支持疗法
E 注意检查全身其他部位有无结核
正确答案: BDC 您选择的答案:

第116-118题
10岁, 右大腿下端疼痛伴高热达39.5 一天, 怀疑为急性化脓性骨髓炎

1. 体格检查有力的证据是
A 右股骨下端皮温升高
B 右股骨下端(干骺端)深压痛
C 右股骨下端肿胀
D 局部血管充盈怒张
E 右膝关节伸屈受限
2. 最有价值的辅助检查是
A X线摄片检查
B CT检查
C 血培养
D 局部穿刺
E 血常规检查
3. 若已确定诊断最合适的方法为
A 卧床休息
B 大量广谱抗生素
C 肢体制动
D 输液、注意水电平衡
E 静脉注射抗生素+钻孔引流

共用题干(57-59题)

男, 30岁。右髋部疼痛一年, 伴低热、盗汗、纳差及体重减轻。查: 右髋关节呈屈曲畸形, 活动受限, Thomas征(+)
ESR

30mm/h。X线片示右髋关节间隙变窄, 关节面有骨质破坏, 右髋臼有2cm大小空洞, 内有坏死骨片

1. 最可能的诊断是
A 化脓性髋关节炎
B 髋关节滑膜结核
C 髋关节骨型结核
D 全髋关节结核
E 类风湿性髋关节炎
2. 最佳治疗方案是
A 立即进行病灶清除
B 髋人字型石膏固定
C 患肢持续皮肤牵引
D 抗痨治疗2~4周后行病灶清除术
E 关节穿刺抽脓, 注入抗结核药物
3. 在治疗期间右髋大转子处出现一8cm~6cm大小包块, 表面皮肤红热, 有波动感, 体温39, 为了解包块的性质, 下列穿刺进针部位的选择哪项最正确
A 脓肿波动明显处
B 于脓肿低位处
C 于脓肿高位处
D 于脓肿外周健康皮肤处
E 只要能抽出脓液, 进针部位不限
正确答案: BDE 您选择的答案:

第119-120题

女性, 18岁。咳嗽4个月, 伴低热, 1个月前右膝部外伤。体格检查: 跛行, 右股四头肌萎缩, 右膝肿胀, 浮髌试验(+)

1. 该患者应首先进行哪项检查
A 右膝CT
B 血常规
C 血沉
D 右膝穿刺抽液, 生化检查及细菌培养
E 胸部平片及右膝正侧位片
2. 肺部平片示右上肺有散在钙化灶, 血沉90mm/h, 这时初步诊断是
A 类风湿性关节炎
B 化脓性关节炎
C 结核性关节炎
D 创伤性关节炎
E 风湿性关节炎
正确答案: EC 您选择的答案:

第121-123题

某女, 28岁, 有肺结核史10年, 间断性抗结核治疗3年, 近2个月来腰背痛伴低热、盗汗, 查体胸11~12棘突压痛, 叩击痛

1. 该患者最简便有效的诊断方法是
A 查血常规、血沉
B MRI

- C. 核素骨扫描
 - D. 胸腰椎正侧位片
 - E. B超
 - 2. 最有助于诊断的检查是
 - A. Dugas征
 - B. Thomas征
 - C. Trendelenburg征
 - D. 拾物试验
 - E. 直腿抬高试验
 - 3. 确诊后, 下列哪项治疗措施不妥
 - A. 抗结核治疗
 - B. 卧硬板床休息
 - C. 立即手术, 病灶清除
 - D. 全身支持疗法
 - E. 进一步检查其他部位有无结核, 并作相应治疗
- 正确答案: DDC 您选择的答案:

第124-127题

12岁男童, 左股骨下1/3骨折术后4天, 出现左大腿下端疼痛伴高热达39.7, 局部穿刺可引流量少量淡黄色液体, 怀疑为急性化脓性骨髓炎

- 1. 急性化脓性骨髓炎相对特有的体征是
 - A. 左股骨下端皮温升高
 - B. 左膝关节伸屈受限
 - C. 左股骨下端肿胀
 - D. 局部血管充盈怒张
 - E. 左股骨下端(干骺端)深压痛
 - 2. 最有价值的辅助检查是
 - A. X线摄片检查
 - B. B超检查
 - C. 血培养
 - D. 局部穿刺
 - E. 局部血管造影
 - 3. 最合适的治疗方法为
 - A. 卧床休息
 - B. 大量广谱抗生素
 - C. 肢体制动
 - D. 输液、注意水电解质平衡
 - E. 静脉注射抗生素+钻孔引流
 - 4. 该患者抗生素的使用不正确的是
 - A. 早期宜联合大量使用抗生素
 - B. 可根据药敏试验选择敏感抗生素
 - C. 如果骨髓炎已经被控制, 仍需连续使用抗生素3周以上
 - D. 凡出现X线片改变, 均需手术治疗
 - E. 抗生素治疗无效应该及时手术治疗
- 正确答案: EDED 您选择的答案:

第128-130题

男, 13岁, 有外伤史, 左膝关节肿痛伴发热7天, 体温达39, 局部拒压, 浮髌试验阳性, 白细胞计数增高

- 1. 此病儿最可能的诊断是
 - A. 膝部骨折
 - B. 急性血源性骨髓炎
 - C. 尤文肉瘤
 - D. 膝关节结核
 - E. 化脓性关节炎
 - 2. 最有价值的进一步检查是
 - A. 拍X线平片
 - B. 查白细胞计数及分类
 - C. 查ESR
 - D. 膝关节穿刺, 作革兰染色涂片及脓培养
 - E. CT检查
 - 3. 此时的治疗最好是
 - A. 每天作1~2次关节穿刺, 抽出脓液
 - B. 应用大剂量抗生素
 - C. 膝关节腔冲洗闭式引流
 - D. 作持续性膝关节被动功能锻炼防止关节内粘连
 - E. 膝关节石膏托外固定
- 正确答案: EDC 您选择的答案:

四、A4型题: 以下提供若干个案例, 每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息, 在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第131-134题

女, 30岁, 左膝关节疼痛伴低热10个月。体检: 左膝关节肿胀, 左侧股四头肌略萎缩, 左侧膝关节X线片示: 骨质增生, 关节间隙变窄, 血沉: 60mm/小时。

- 1. 为确诊须采取哪种辅助检查方法
- A. 血常规及血沉
- B. 滑膜活检
- C. CT
- D. 关节液涂片检查

- E. 核素骨扫描
 2. 该患者可能的初步诊断为
 A. 风湿性关节炎
 B. 类风湿性关节炎
 C. 结核性膝关节炎
 D. 痛风性关节炎
 E. 松毛虫性关节炎
 3. 初步诊断确立后, 应采取下列哪项治疗措施
 A. 正规抗痨治疗
 B. 卧硬板床休息
 C. 立即手术, 病灶清除
 D. 全身支持疗法 + 抗痨治疗 + 制动
 E. 关节穿刺抽液 + 局部注入抗痨药物
 4. 如果该患者治疗无效, 发展为全关节结核, 局部形成窦道, 正确的治疗措施是
 A. 继续正规抗痨治疗
 B. 全身支持疗法 + 窦道冲洗
 C. 石膏固定制动 + 开窗引流
 D. 病灶清除 + 人工膝关节置换
 E. 病灶清除 + 关节融合
- 正确答案: BCEE 您选择的答案:

五、B1型题: 以下提供若干组考题, 每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第135-137题

- A. 髋关节功能保存
 B. 髋关节骨性强直
 C. 髋关节形成前屈内收畸形
 D. 局部形成寒性脓肿
 E. 局部形成窦道
 1. 髋关节单纯滑膜结核或单纯骨结核早期及时治疗, 其结果可能是
 2. 髋关节全关节结核晚期病灶清除术, 最终达到的结果是
 3. 髋关节结核, 未经治疗常发生的畸形是
- 正确答案: ABC 您选择的答案:

第138-141题

- A. 关节痛: 病情缓慢, 肿而不红, 穿刺: 脓液
 B. 关节痛: 游走性、轻度红、肿、热, 与天气变化有关
 C. 关节痛: 多发性, 有畸形及功能障碍, 穿刺液: 白细胞数增多, 中性比例占75%
 D. 关节痛: 急性发作, 高烧、红肿明显, 不能活动, 白细胞高, 关节液白细胞甚多, 中性比例占90%
 E. 关节附近痛, 急性发作, 高烧, 红肿不明显, 深压痛, 不愿意活动关节, 白细胞明显增高
 1. 急性化脓性关节炎是
 2. 关节结核
 3. 类风湿性关节炎是
 4. 急性骨髓炎
- 正确答案: DACE 您选择的答案:

第142-145题

- A. 颈椎结核
 B. 胸椎结核
 C. 腰椎结核
 D. 膝关节结核
 E. 髋关节结核
 1. 女, 28岁, 低热盗汗2年, 近2个月双下肢肌无力, 逐渐出现瘫痪, 体检咽后壁有脓肿, 诊断应考虑为
 2. 女, 16岁, 低热盗汗, 腰痛2个月, 右髂窝出现肿块, B超检查为液性, 右髋关节屈曲活动受限, 诊断考虑为
 3. 男, 10岁, 低热伴右下肢痛, 活动受限, 跛行, 右髋关节"4"字试验阳性, 诊断考虑为
 4. 男, 8岁, 低热左膝关节肿痛活动受限1月余, 左股部肌萎缩, 浮髌试验阳性, 诊断考虑为
- 正确答案: ACED 您选择的答案:

第146-150题

- A. 急性化脓性骨髓炎
 B. 类风湿性关节炎
 C. 化脓性关节炎
 D. 股骨头缺血性坏死
 E. 急性脓肿
 1. 男, 16岁, 右股外侧局限性红肿热痛10天, 伴发热, 局部有波动感, 查白细胞计数增加, 诊断是
 2. 女, 17岁, 左膝关节肿痛半月, 伴高热, 局部皮肤温度高, 拒动, 浮髌试验阳性, 诊断是
 3. 男, 48岁, 双髋关节疼痛4年, 加重5个月, 跛行, 4年前, 因患角膜炎有长期服用激素史, 其诊断是
 4. 女, 32岁, 晨起双手指足趾关节僵硬, 活动时疼痛, 关节肿胀、压痛。X线片显示指关节周围软组织阴影肿大, 骨质疏松, 其诊断是
 5. 男, 10岁, 突然发热, 伴左大腿内下部持续性剧痛半月, 拒按, 膝关节不肿, 无压痛, 浮髌试验阴性, 白细胞计数增加, X线片见股骨下端骨破坏其诊断是
- 正确答案: ECDBA 您选择的答案:

第151-153题

- A. 髋关节功能保存
 B. 局部形成窦道
 C. 髋关节骨性强直
 D. 局部形成寒性脓肿

E. 髋关节形成前屈内收畸形

1. 髋关节单纯滑膜结核或单纯骨结核早期及时治疗，其结果可能是

2. 髋关节全关节结核晚期病灶清除术，最终达到的结果是

3. 髋关节结核，未经治疗常发生的畸形是

正确答案：ACE 您选择的答案：

习题集 外科学 骨病

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 狭窄性腱鞘炎，疗效较好的方法，是

- A 理疗
- B 限制活动和石膏固定
- C 体疗加内服药物
- D 伤湿止痛膏局部贴敷
- E 醋酸强的松龙局部封闭

正确答案：E 您选择的答案：

第2题 关于慢性运动系统损伤的治疗，临床上最常用的行之有效的方法是

- A 限制致伤动作，纠正不良姿势
- B 局部注射肾上腺皮质类固醇
- C 理疗、按摩
- D 服用消炎镇痛药
- E 手术治疗

正确答案：B 您选择的答案：

第3题 肩关节周围炎的病理变化主要发生在

- A 盂肱关节周围
- B 肩锁关节周围
- C 三角肌
- D 冈上肌
- E 冈下肌

正确答案：A 您选择的答案：

第4题 狭窄性腱鞘炎最常发生的部位在

- A 手与腕部
- B 肘部
- C 肩部
- D 踝部
- E 足趾部

正确答案：A 您选择的答案：

第5题 腰椎间盘突出症的诱因是

- A 腰椎间盘突出退行性变
- B 腰部扭伤
- C 腰肌受凉
- D 腰部损伤，积累劳力
- E 腰部软组织感染

正确答案：D 您选择的答案：

第6题 腰椎间盘突出症与腰椎管狭窄的鉴别，主要依据是

- A 有无向下肢的放射性疼痛
- B 有无间歇性跛行
- C 腰部疼痛的程度
- D CT检查
- E X线平片

正确答案：D 您选择的答案：

第7题 髌骨软骨的营养主要来自

- A 关节液
- B 股四头肌的血液供应
- C 关节囊的血液供应
- D 髌韧带的血液供应
- E 髌骨的滋养动脉

正确答案：A 您选择的答案：

第8题 治疗成人股骨头缺血性坏死，特别强调

- A 理疗
- B 非甾体类抗炎剂
- C 高压氧
- D 避免过早负重
- E 扩血管药物

正确答案：D 您选择的答案：

第9题 髌骨软化症出现症状后，首先应该制动膝关节

- A 3~5天
- B 1~2周
- C 3~4周
- D 5~6周
- E 8~10周

正确答案：C 您选择的答案：

第10题 关于肩关节周围炎，下列哪项不正确

- A 好发年龄为50岁

B. 能自愈
C. 醋酸泼尼松龙局部封闭有效
D. 主要为肩痛，活动受限
E. 常伴有手指麻木感
正确答案：E 您选择的答案：

第11题 骨关节炎的疼痛最主要的特点是

- A. 运动痛
- B. 静止痛
- C. 不定时痛
- D. 阴雨天痛
- E. 寒冷痛

正确答案：B 您选择的答案：

第12题 有关肩关节周围炎的说法，正确的是

- A. 多见于青少年
- B. 发病急，病程约数周
- C. 晚间疼痛减轻
- D. 可见典型疼痛弧
- E. 具有自限性，多于1年内自愈

正确答案：E 您选择的答案：

第13题 腰间盘突出症下肢放射痛最常见于

- A. 坐骨神经分布区
- B. 闭孔神经分布区
- C. 阴部神经分布区
- D. 股神经分布区
- E. 股外侧皮神经分布区

正确答案：A 您选择的答案：

第14题 肱骨外上髁炎的病因，主要是

- A. 急性化脓性感染
- B. 结核
- C. 类风湿
- D. 风湿
- E. 慢性损伤

正确答案：E 您选择的答案：

第15题 弹响指发病频度最多的手指是

- A. 拇指、示指
- B. 示指、中指
- C. 中指、环指
- D. 环指、小指
- E. 拇指、小指

正确答案：C 您选择的答案：

第16题 膝关节疾病与有关试验中，下列哪项是错误的

- A. 浮髌试验(+) - 膝关节积液
- B. 麦氏(McMurray)试验(+) - 半月板损伤
- C. 髌骨磨擦试验(+) - 髌骨软骨软化症
- D. 前抽屉试验(+) - 后交叉韧带断裂
- E. 后抽屉试验(+) - 后交叉韧带断裂

正确答案：D 您选择的答案：

第17题 膝关节疾病与有关试验中，下列哪项是错误的

- A. 浮髌试验(+)：膝关节积液
- B. 前抽屉试验(+)，后交叉韧带断裂
- C. 后抽屉试验(+)：后交叉韧带断裂
- D. 麦氏(McMurray)试验(+)：半月板损伤
- E. 髌骨摩擦试验(+)：髌骨软骨软化症

正确答案：B 您选择的答案：

第18题 关于肩关节周围炎，下列哪项是错误的

- A. 本病能自愈
- B. 本病是关节周围软组织的慢性炎症
- C. 疼痛、活动受限是本病的特征
- D. 病变的结果为关节外软组织粘连
- E. 本病体征以肩关节外展、外旋受限最明显

正确答案：D 您选择的答案：

第19题 椎动脉型颈椎病最常见的症状是

- A. 眩晕
- B. 疼痛
- C. 猝倒
- D. 眼花
- E. 记忆力减退

正确答案：A 您选择的答案：

第20题 肩关节周围炎

- A. 多见于青少年

- B 发病急，病程约数周
- C 夜间疼痛减轻
- D 可见典型疼痛弧
- E 肩关节外展受限

正确答案：E 您选择的答案：

第21题 急性腰扭伤与腰椎间盘突出症均可有坐骨神经支配区疼痛，其鉴别依靠

- A 外伤史
- B X线照像
- C 局部痛点普鲁卡因封闭
- D 直腿抬高试验
- E 股神经牵拉试验

正确答案：C 您选择的答案：

第22题 50岁以上髋关节骨关节炎病人有明显疼痛和运动障碍者，应首选

- A 髋关节融合术
- B 截骨术
- C 人工关节置换术
- D 关节清理术
- E 钻孔减压术

正确答案：C 您选择的答案：

第23题 下列哪种情况，不是狭窄性腱鞘炎的体征

- A 弹响指
- B 弹响拇
- C 扳机指
- D 鼓槌指
- E 握拳尺偏试验阳性

正确答案：D 您选择的答案：

第24题 出现拇趾背伸力减弱的腰间盘突出间隙是

- A L1、2
- B L2、3
- C L3、4
- D L4、5
- E L5S1

正确答案：D 您选择的答案：

第25题 肱骨外上髁炎的体征主要是

- A ．Lasegue阳性
- B ．Mills阳性
- C ．Finkelstein阳性
- D ．Dugas阳性
- E ．Thomas阳性

正确答案：B 您选择的答案：

第26题 股骨头骨骺缺血性坏死的病人，首诊主诉常为

- A ．髋部疼痛
- B ．膝关节内上方牵涉痛
- C ．膝关节外上方牵涉痛
- D ．膝关节内下方牵涉痛
- E ．膝关节外下方牵涉痛

正确答案：B 您选择的答案：

第27题 腰椎间盘突出症，感觉减退出现在外踝部及足背外侧，踝反射异常，压迫的神经根是

- A 腰3神经根
- B 腰4神经根
- C 腰5神经根
- D 骶1神经根
- E 骶2神经根

正确答案：D 您选择的答案：

第28题 50岁，男性。肩病，僵硬，活动受限，颈部无症状，最大可能是

- A 颈椎病
- B 胸廓出口综合征
- C 臂丛神经炎
- D 肩关节周围炎
- E 脊髓空洞症

正确答案：D 您选择的答案：

第29题 类风湿性关节炎的诊断标准共计10项，典型病例应具备其中几项

- A 三项
- B 四项
- C 五项
- D 六项
- E 七项

正确答案：E 您选择的答案：

第30题 颈椎病最常见的类型为

- A ．神经根型

- B. 脊髓型
- C. 交感神经型
- D. 椎动脉型
- E. 混合型

正确答案：A 您选择的答案：

第31题 腰椎间盘突出症，出现鞍区麻木及二便功能障碍，乃突出间盘压迫

- A. 脊髓圆锥大部
- B. 脊髓圆锥
- C. 马尾神经
- D. 骶1神经根
- E. 骶2神经根

正确答案：C 您选择的答案：

第32题 首次急性发作的腰椎间盘突出症治疗首选

- A. 避免负重
- B. 绝对卧床休息，同时牵引
- C. 口服镇静止痛药物
- D. 醋酸泼尼松龙局部封闭
- E. 手术治疗

正确答案：B 您选择的答案：

第33题 早期类风湿性关节炎，除药物治疗外，还应选择

- A. 截骨术
- B. 关节清理术
- C. 关节成形术
- D. 滑膜切除术
- E. 钻孔减压术

正确答案：D 您选择的答案：

第34题 下列哪项不属于颈椎病的基本分类

- A. 脊髓型
- B. 神经根型
- C. 颈型
- D. 椎动脉型
- E. 交感神经型

正确答案：C 您选择的答案：

第35题 下列哪项不是膝关节骨关节炎的手术治疗目的

- A. 解除症状
- B. 改进活动范围
- C. 增强关节稳定性
- D. 延缓病情进展
- E. 切除增生的骨赘

正确答案：E 您选择的答案：

第36题 腕管综合征是下列哪项组织在腕管中受压

- A. 尺神经
- B. 桡神经
- C. 正中神经
- D. 尺动脉
- E. 桡动脉

正确答案：C 您选择的答案：

第37题 关于肱骨外上髁炎，下列哪项不正确

- A. 肘关节外侧局限性压痛
- B. Mills试验(+)
- C. Hoffmann征(+)
- D. 持物无力
- E. X线片正常

正确答案：C 您选择的答案：

第38题 髌骨软骨软化症的治疗，下列哪项是错误的

- A. 理疗
- B. 局部封闭
- C. 确诊后应手术治疗
- D. 服用消炎镇痛药
- E. 加强股四头肌锻炼

正确答案：C 您选择的答案：

第39题 腰椎间盘突出症下肢放射痛最常见于

- A. 坐骨神经分布区
- B. 闭孔神经分布区
- C. 阴部神经分布区
- D. 股神经分布区
- E. 股外侧皮神经分布区

正确答案：A 您选择的答案：

第40题 桡骨茎突狭窄性腱鞘炎特有的体征是

- A. Lasegue阳性

- B. Mills阳性
- C. Finkelstein阳性
- D. Dugas阳性
- E. Thomas阳性

正确答案：C 您选择的答案：

第41题 髌骨软化症出现症状后，首先应制动膝关节

- A. 3~5天
- B. 1~2周
- C. 3~4周
- D. 5~6周
- E. 7~8周

正确答案：B 您选择的答案：

第42题 关于肱骨外上髁炎，下列哪项不对

- A. Hoffmann征(+)
- B. 好发于网球运动员
- C. 局封常有效
- D. 是伸腕伸指肌腱止点处的慢性损伤性炎症
- E. 伸腕抗阻力试验(+)

正确答案：A 您选择的答案：

第43题 治疗髌骨软骨软化症，下列哪项措施应慎用

- A. 理疗
- B. 口服氨基糖美辛
- C. 制动休息
- D. 股四头肌运动练习
- E. 关节内注射醋酸泼尼松龙

正确答案：E 您选择的答案：

第44题 椎动脉型颈椎病最突出的症状是

- A. 恶心
- B. 猝倒
- C. 头痛头晕
- D. 视物不清
- E. 耳鸣耳聋

正确答案：B 您选择的答案：

第45题 治疗成人股骨头缺血性坏死，下列哪项措施应特殊强调

- A. 理疗
- B. 非甾体类抗炎剂
- C. 减少负重
- D. 高压氧
- E. 扩血管药物

正确答案：C 您选择的答案：

第46题 下肢牵涉痛是由哪部分神经组织受刺激所致

- A. 脊神经前根
- B. 脊神经后根
- C. 交感神经
- D. 脊神经前支
- E. 脊神经后支

正确答案：B 您选择的答案：

第47题 股骨头骨软骨病的基本病理变化是

- A. 软骨发育不全
- B. 急性创伤性炎症
- C. 关节囊内压增高
- D. 骨骺缺血坏死
- E. 慢性劳损性肌炎

正确答案：D 您选择的答案：

第48题 腰椎间盘突出症，出现鞍区麻木及大小便功能障碍，是椎间盘压迫了

- A. 脊髓腰膨大部
- B. 脊髓圆锥
- C. 骶1神经根
- D. 骶2神经根
- E. 马尾神经

正确答案：E 您选择的答案：

第49题 肩关节周围炎，一般自愈的时间是

- A. 3个月
- B. 6个月
- C. 1年
- D. 2年
- E. 3年

正确答案：C 您选择的答案：

第50题 关于肱骨外上髁炎，治疗和预防复发的基本原则是

- A. 手腕、肘关节石膏托外固定

- B. 及时治疗
 - C. 反复多次注射醋酸泼尼松龙
 - D. 限制握拳及伸腕动作
 - E. 限制屈腕动作
- 正确答案：D 您选择的答案：

第51题 腰间盘突出症与腰椎管狭窄症临床症状的主要不同点为

- A. 腰痛及下肢放射痛的程度
- B. 有否间歇性跛行
- C. 鞍区感觉改变情况
- D. 双下肢无力情况
- E. 二便是否障碍

正确答案：B 您选择的答案：

第52题 肱骨外上髁炎的治疗措施中，下列哪项不妥

- A. 可将手腕肘诸关节用石膏托外固定
- B. 压痛点醋酸泼尼松龙注射
- C. 加强腕背伸抗阻运动练习
- D. 伸肌总腱起点剥离松解术
- E. 伸肌总腱起点神经血管束切除结扎术

正确答案：C 您选择的答案：

第53题 关于肩周炎的发病情况，下列哪项正确

- A. 男性多于女性
- B. 右侧多于左侧
- C. 与外伤无关
- D. 长期活动不易患此病
- E. 多见于40岁以上中老年人

正确答案：E 您选择的答案：

第54题 下肢牵涉痛是由哪部分神经组织受刺激所致

- A. 交感神经
- B. 脊神经前支
- C. 脊神经前根
- D. 脊神经后根
- E. 脊神经后支

正确答案：D 您选择的答案：

第55题 下列哪种情况，不是狭窄性腱鞘炎的体征

- A. 弹响指
- B. Mills阳性
- C. 扳机指
- D. 鼓槌指
- E. 弹响拇

正确答案：B 您选择的答案：

第56题 出现踝反射减弱的腰椎间盘突出间隙是

- A. L1、2
- B. L2、3
- C. L3、4
- D. L4、5
- E. L5S1

正确答案：E 您选择的答案：

第57题 关于肱骨外上髁炎，下列哪项不对

- A. 好发于网球运动员
- B. 一旦确诊应手术松解
- C. 局封常有效
- D. 是伸腕伸指肌腱止点处的慢性损伤性炎症
- E. 伸腕抗阻力试验(+)

正确答案：B 您选择的答案：

第58题 股骨头骨软骨病，多见于

- A. 3~10岁
- B. 15~25岁
- C. 35~55岁
- D. 65~75岁
- E. 股骨颈骨折后

正确答案：A 您选择的答案：

第59题 弹响指各手指发病频度最多的是

- A. 拇、示指
- B. 示、中指
- C. 中、环指
- D. 环、小指
- E. 拇、小指

正确答案：C 您选择的答案：

第60题 颈椎病的手术指征，是

- A. 颈痛伴手麻木

B 头痛、头晕、眩晕
C 颈肩痛较重，手握力减退，X线片有骨棘生成，椎间隙狭窄
D 反复发作，症状严重，长期保守疗法无效，有脊髓受压或瘫痪
E 颈肩痛，手部肌力减弱，头痛头晕，耳鸣
正确答案：D 您选择的答案：

第61题 急性腰扭伤与腰椎间盘突出症均可有坐骨神经支配区疼痛，其鉴别依靠

A．外伤史
B．X线片
C．体检时是否有病变部位椎管压痛
D．直腿抬高试验
E．局部痛点普鲁卡因封闭
正确答案：E 您选择的答案：

第62题 男，25岁，腰腿痛2年，加重半个月，跛行，左膝腱反射减弱，左踝反射消失，直腿抬高试验阳性，临床拟诊腰椎间盘突出症，需拍X线片的理由中哪项是错误的

A．除外腰椎结核
B．除外腰椎骨肿瘤
C．除外脊柱的化脓性感染
D．明确椎间盘突出的部位及程度
E．除外腰椎骨折
正确答案：D 您选择的答案：

第63题 股骨头骨软骨病的基本病理变化是

A．骨骺缺血性坏死
B．软骨发育不全
C．急性创伤性炎症
D．关节囊内压增高
E．慢性劳损性炎症
正确答案：A 您选择的答案：

第64题 治疗髌骨软骨软化症，下列哪项措施应慎用

A 制动休息
B 理疗
C 口服氨基糖甙
D 关节内注射醋酸强地松龙
E 股四头肌运动练习
正确答案：D 您选择的答案：

第65题 肱骨外上髁炎的治疗措施中，下列哪项不妥

A 理疗
B 压痛点醋酸强地松龙注射
C 加强腕关节背伸抗阻运动练习
D 伸肌总腱起点剥离松解术
E 伸肌总腱起点神经血管束切除结扎术
正确答案：C 您选择的答案：

第66题 关于醋酸泼尼松龙局部封闭，下列说法错误的是

A．适用于诊断明确的慢性损伤性炎症
B．严格无菌操作
C．注意部位准确
D．防止注入血管
E．必须配合口服止痛药治疗
正确答案：E 您选择的答案：

第67题 髌骨软骨软化症手术治疗的目的是，下列哪项是错误的

A．切除发育异常的髌骨，去除病灶
B．改变髌骨关节的力线
C．刮除髌骨关节软骨上较小的侵蚀病灶
D．增加髌骨在关节活动过程中的稳定性
E．髌骨关节软骨已完全破坏者，可切除髌骨
正确答案：A 您选择的答案：

第68题 早期类风湿性关节炎，除药物治疗外，还应选择

A．截骨术
B．钻孔减压术
C．关节清理术
D．关节成形术
E．滑膜切除术
正确答案：E 您选择的答案：

第69题 腰间盘突出症与椎管内肿瘤最有鉴别意义的辅助检查是

A X线片
B CT
C MIR
D 肌电图
E 超声波
正确答案：C 您选择的答案：

第70题 狭窄性腱鞘炎，疗效较好的方法是

A. 理疗
B. 限制活动
C. 内服止痛药物
D. 伤湿止痛膏局部贴敷
E. 醋酸泼尼松龙局部封闭
正确答案：E 您选择的答案：

第71题 颈椎病患者，MRI 检查见C5. 6间盘突入椎管压迫颈脊髓，保守治疗无效，瘫痪渐渐加重，应选择哪种治疗方案

A 大重量牵引
B 旋转复位推拿
C 后路椎板切除手术
D 前外侧椎管减压术
E 前路髓核摘除植骨术
正确答案：E 您选择的答案：

第72题 女，50岁，患左拇指狭窄性腱鞘炎2周，此时最简便、有效的治疗方法是

A. 制动
B. 理疗
C. 醋酸泼尼松龙封闭
D. 腱鞘切开术
E. 局部注射抗生素
正确答案：C 您选择的答案：

第73题 桡骨茎突狭窄性腱鞘炎，下列哪-体征为阳性

A Finkelstein
B Milner
C Lasegue
D Thomas
E Dugas
正确答案：A 您选择的答案：

第74题 在类风湿性关节炎的10项诊断标准中，典型病例应具备其中的

A. 5项
B. 6项
C. 7项
D. 8项
E. 10项
正确答案：C 您选择的答案：

第75题 骨关节炎的疼痛最主要的特点是

A. 休息痛
B. 运动痛
C. 寒冷痛
D. 阴雨天痛
E. 不定时痛
正确答案：A 您选择的答案：

第76题 下列类风湿性关节炎的特征，哪一项是错误的

A. 病程长
B. 关节痛
C. 肿胀反复发作
D. 始终伴有低热
E. 关节畸形逐渐形成
正确答案：D 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第77题 中央型腰椎间盘突出症和马尾神经瘤最有意义的鉴别点是

A. 鞍区麻痹
B. 脊髓造影
C. 腰穿脑脊液检查
D. 肛门括约肌功能检查
E. X线片检查
正确答案：B 您选择的答案：

第78题 女，50岁，左拇指掌指关节处疼痛、压痛半年。检查：左拇指掌指关节处的掌侧可扪及一小结节，光滑、压痛，活动时有关弹响，其诊断是

A. 神经纤维瘤
B. 血管瘤
C. 脂肪瘤
D. 腱鞘囊肿
E. 狭窄性腱鞘炎
正确答案：E 您选择的答案：

第79题 中年男子，猛抬重物后腰剧痛并向右下肢放射，咳嗽时加重，其诊断最大可能是

A 腰椎骨折
B 腰椎滑脱

- C 腰部肌筋膜炎
- D 腰椎间盘突出症
- E 腰扭伤

正确答案：D 您选择的答案：

第80题 女，40岁，右腕关节桡侧痛渐加重，持物无力，在桡骨茎突表面压痛，为明确桡骨茎突狭窄性腱鞘炎的诊断应作下列哪项试验

- A．Thomas征
- B．McMurry征
- C．Mills征
- D．Finkelstein征
- E．Hoffmann征

正确答案：D 您选择的答案：

第81题 女，48岁，因左肩痛3个月逐渐加重，不能梳头，左肩关节外展、后伸受限，三角肌萎缩，无手臂麻木感，最可能的原因是

- A．颈椎病
- B．肩部肿瘤
- C．肩周炎
- D．肩关节结核
- E．风湿性关节炎

正确答案：C 您选择的答案：

第82题 女，40岁，双侧手、腕、膝等诸关节疼痛，肿胀反复发作5年，指关节呈梭形肿大，有压痛，诊断为类风湿性关节炎，其下列临床表现的特征中哪项是错误的

- A．病程慢
- B．关节痛
- C．反复肿胀
- D．关节畸形
- E．皮肤颜色发暗

正确答案：E 您选择的答案：

第83题 患者女性，49岁。颈肩痛5年余，出现四肢麻木，无力半年，行走时步态不稳，查体见双手尺侧以下皮肤感觉减退，双下肢肌张力增高，肌力Ⅲ级，X线片见颈椎骨质明显退行性改变，其诊断可能为

- A 颈椎增生
- B 神经根型颈椎病
- C 脊髓型颈椎病
- D 交感神经型颈椎病
- E 椎管内肿瘤

正确答案：C 您选择的答案：

第84题 男，13岁，初始右膝内上方疼痛，后右髌关节疼痛伴跛行2年，X线片右股骨头密度增高，骨骺碎裂变扁，诊断为股骨头骨软骨病，治疗目的中错误的是

- A．恢复股骨头的外形
- B．使股骨头完全包容在髋臼内
- C．避免髋臼外上缘对股骨头的局限性压力
- D．减轻对股骨头的压力
- E．维持髌关节有良好的活动范围

正确答案：A 您选择的答案：

第85题 患者男性，40岁，车工。因近两月来经常加班劳动而引起腰背痛及活动障碍，约5日前又扭伤腰部，疼痛加剧，且向右下肢后侧放散，每于弯腰、咳嗽及用力排便时加重，脊髓造影显示L4/5间盘水平偏右有一圆形压迹，最可能的诊断是

- A 腰部肌筋膜炎
- B 慢性腰部损伤
- C 强直性脊柱炎
- D 劳累性腰痛
- E 腰椎间盘突出症

正确答案：E 您选择的答案：

第86题 一男性患者，40岁。诉头痛头晕，颈侧弯后伸后头晕加重并出现猝倒。肱二头肌腱反射亢进，颈椎斜位片显示钩椎关节增生，你认为最大可能是

- A 美尼尔征
- B 体位性眩晕
- C 脊髓肿瘤
- D 椎动脉型颈椎病
- E 粘连性蛛网膜炎

正确答案：D 您选择的答案：

第87题 男，56岁，右膝关节疼痛半年，加重5天，尤以上楼梯加剧，X线片显示膝关节退行性改变，诊断为髌骨软骨软化症，非手术治疗首先应制动膝关节

- A．1~2周
- B．3~4周
- C．5~6周
- D．无需制动
- E．制动2个月

正确答案：A 您选择的答案：

第88题 男，30岁，左膝关节疼痛5个月逐渐加重，上、下楼梯困难，查体：左髌骨下缘局限性压痛，髌骨研磨试验(+)，股四头肌萎缩。X线片未见异常，核素扫描见髌骨局限性核素浓聚，其诊断是

- A.半月板损伤
- B.髌韧带损伤
- C.交叉韧带损伤
- D.髌骨软骨软化症
- E.膝关节骨关节炎

正确答案：D 您选择的答案：

第89题 男，13岁，左胫骨结节处疼痛，隆起，压痛(+)，对抗伸膝阻力时疼痛加剧，X线片示胫骨结节骨骺增大，碎裂，周围软组织肿胀。临床诊断应是

- A.胫骨结节骨骺骨折
- B.股四头肌肌腱断裂
- C.胫骨结节骨骺感染
- D.胫骨结节骨软骨病
- E.尤文肉瘤

正确答案：D 您选择的答案：

第90题 女，50岁，左手桡侧3个手指感觉过；敏，大鱼际肌萎缩，拇指对掌无力，腕部正中神经Tinel征阳性，屈腕试验(Phalen征)阳性，其诊断应是

- A.颈椎病，神经根型
- B.腕部腱鞘炎
- C.腕骨结核
- D.腕管综合征
- E.月骨无菌性坏死

正确答案：D 您选择的答案：

第91题 女，52岁，颈肩部伴左手臂尺侧麻木半年，头颈转动时有眩晕，X线片显示颈椎退行性改变，在颈椎病的诊断中，以下哪项最有价值

- A.颈椎病时X线片示颈椎增生，椎间隙变窄
- B.Hoffmann征阳性
- C.活动时眩晕
- D.颈肩部疼痛、压痛
- E.肩部活动受限

正确答案：B 您选择的答案：

第92题 患者男性，20岁，青年工人。抬东西而致腰痛，右下肢亦痛，直腿抬高试验阳性，而加强试验阴性，腰部右侧有压痛，站立时压痛区可摸到指肚大之肿块，平卧时即消失，其诊断为

- A.腰间盘突出症
- B.肌疝
- C.腰肌筋膜炎
- D.第三腰椎横突综合征
- E.棘间韧带损伤

正确答案：B 您选择的答案：

第93题 女，65岁。近半年来反复出现头痛，头晕，今晨在突然转头时感眩晕耳鸣恶心呕吐，摔倒在地，2分钟后缓解。既往曾类似发作2次，x线片示颈5~6椎体后，缘骨质增生，椎间孔明显缩小，最可能的诊断是

- A.神经根型颈椎病
- B.脊髓型颈椎病
- C.交感神经型颈椎病
- D.椎动脉型颈椎病
- E.癫痫发作

正确答案：D 您选择的答案：

第94题 女，40岁，纺织工人，右肘关节外侧疼痛半月，持物无力，局限性压痛，下列哪项试验最有助于诊断

- A.Tinel征
- B.Finkelstein征
- C.Dugas征
- D.Hoffmann征
- E.Mills征

正确答案：E 您选择的答案：

第95题 一青年工人抬重物后感觉腰痛，检查时发现骶棘肌紧张，仰卧检查直腿抬高试验阳性，在屈髋屈膝姿势下将双膝向腹部推压时疼痛加剧，俯卧位检查时腰部肌肉压痛，正确的诊断是

- A.腰间盘脱出症
- B.急性腰扭伤
- C.脊柱滑脱
- D.急性肌筋膜炎
- E.腰肌劳损

正确答案：B 您选择的答案：

第96题 男性，40岁。长期从事办公室工作，弯腰取物时，突感腰部疼痛来诊。体格检查发现：被动姿式，腰3~4右椎旁及腰3右横突压痛明显，放射到臀部，腰部，右直腿抬高试验(+)，加强(-)，应诊断为

- A.急性腰扭伤
- B.腰椎间盘突出症
- C.腰椎管狭窄症
- D.腰肌劳损
- E.腰椎滑脱

正确答案：A 您选择的答案：

第97题 男性，26岁。汽车修配工人，两天前抬轮胎时失手，腰部骤然有撕裂感，随即剧痛，自今晨起疼痛向右下肢放散，咳嗽与排便时疼痛加剧，查体腰部僵硬，腰肌活动明显受限，右棘突旁明显压痛，直腿抬高试验左侧60°，右

侧45°，加强试验阳性，最可能的诊断是

- A 腰部肌筋膜炎
- B 腰间盘突出症
- C 急性腰扭伤
- D 腰椎屈曲型压缩骨折
- E 腰椎结核

正确答案：B 您选择的答案：

第98题 有一患者伤后表现单侧坐骨神经痛及腰痛，直腿抬高试验及加强试验阳性，脊性侧弯，踝反射异常，足趾跖屈力减退，此时最可能的诊断为

- A 腰椎间盘突出症
- B 慢性腰肌劳损
- C 腰椎骶化
- D 类风湿性脊柱炎
- E 骶椎裂

正确答案：A 您选择的答案：

第99题 男，50岁。四肢麻胀，乏力逐渐加重近2年，1个月前不慎滑倒，当即出现四肢活动障碍，查体：神志清楚，头部活动无明显受限，第2肋以下皮肤痛觉减退，四肢不能主动活动，肌张力增高，病理征(+)。x线片示颈4胸1椎体后缘骨质增生，椎间隙变窄，诊断为

- A 外伤性颈髓损伤
- B 颈椎脱位
- C 脊髓型颈椎病
- D 颈椎肿瘤
- E 颈椎管内肿瘤

正确答案：C 您选择的答案：

第100题 青年男性病人，腰痛、腰僵硬，逐渐出现驼背，x线片见骶髂关节模糊，间隙消失，可能诊断是

- A 慢性腰扭伤
- B 腰肌劳损
- C 腰椎结核
- D 腰间盘突出症
- E 强直性脊柱炎

正确答案：E 您选择的答案：

第101题 男，27岁，喜好网球运动，右肘关节外侧疼痛2个月，加重5天，持物无力。体检：除右肘关节外侧局限性压痛外，下列哪项检查最有助于诊断

- A. Froment试验
- B. Finkelstein试验
- C. Mills试验
- D. Gaenslen试验
- E. Dugas试验

正确答案：C 您选择的答案：

第102题 女，32岁，右腕痛1个月，右腕桡侧掌面可见隆起，局限性压痛(+)，可触及黄豆粒大小之结节，Finkelstein征(+)，其诊断为

- A. 痛风
- B. 风湿性关节炎
- C. 桡骨茎突狭窄性腱鞘炎
- D. 神经纤维瘤
- E. 腕关节结核

正确答案：C 您选择的答案：

第103题 女，30岁，右肱骨外上髁炎半月，治疗后好转，预防复发的基本原则是

- A. 及时理疗
- B. 持续服用镇痛药物2周
- C. 限制握拳及伸腕动作
- D. 限制屈腕动作
- E. 反复多次局部注射醋酸泼尼松龙

正确答案：C 您选择的答案：

第104题 男，56岁，诉头痛头晕2年余，近半年无诱因猝倒2次。体检：肱二头肌腱反射亢进，颈椎斜位片显示钩椎关节增生，诊断考虑为

- A. 美尼尔征
- B. 体位性眩晕
- C. 脊髓肿瘤
- D. 椎动脉颈椎病
- E. 粘连性蛛网膜炎

正确答案：D 您选择的答案：

第105题 中年男性，既往腰痛2年余，1周前猛抬重物后腰疼明显加剧并向右下肢放射，咳嗽时加重，其诊断最可能是

- A. 腰椎骨折
- B. 腰椎滑脱
- C. 腰部肌筋膜炎
- D. 腰椎间盘突出症
- E. 腰扭伤

正确答案：D 您选择的答案：

第106题 12岁男性，右腕部掌侧可见一椭圆形肿块，大小为3cm×3cm，触之有囊性感，边界清晰，推之横向移动，

轻压痛，其诊断可能为

- A. 脂肪瘤
- B. 腱鞘囊肿
- C. 局部脓肿
- D. 血管瘤
- E. 类风湿关节炎

正确答案：B 您选择的答案：

第107题 男性中年患者，2周前明确诊断为右示指狭窄性腱鞘炎，此时最简便、有效的治疗方法是

- A. 制动
- B. 理疗
- C. 醋酸泼尼松龙局部封闭
- D. 局部注射抗生素
- E. 腱鞘切开术

正确答案：C 您选择的答案：

第108题 男性，25岁。喜好网球运动，右肘关节外侧疼痛1个月，加重3天，持物无力，拧毛巾痛。体格检查：除右肘关节外侧局限性压痛外，下列哪项试验最有助于诊断

- A. Froment
- B. Milner
- C. Finkelstein
- D. Gaenslen
- E. Dugas

正确答案：B 您选择的答案：

三、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第109-111题

男，48岁，无明显诱因的腰部慢性疼痛半月，休息后好转，但活动过久疼痛加剧，不发热，双下肢无不适，腰椎旁有压痛

1. 依据临床症状、体征，其最可能的诊断是
 - A. 腰椎间盘突出症
 - B. 肾、输尿管结石
 - C. 腰肌劳损
 - D. 强直性脊柱炎
 - E. 腰椎结核
2. 为进一步明确诊断，下列哪项检查最有意义
 - A. 尿常规
 - B. 血常规
 - C. ECT
 - D. 腰椎X线平片
 - E. 全肠钡餐透视
3. 下列治疗中，哪一项是最迅速有效的
 - A. 带腰围
 - B. 旋转复位
 - C. 理疗
 - D. 口服扶他林25mg，一日3次
 - E. 局部痛点行肾上腺皮质类固醇注射

正确答案：CDE 您选择的答案：

第112-114题

腰痛多年，时轻时重，伴双下肢痛。10天前搬重物后腰腿痛加剧，并出现麻木与排尿困难。查体：腰运动受限，椎旁压痛向下肢放散，直腿高举与足背屈附加试验阳性。马鞍区痛觉减退

1. 出现排尿困难，鞍区麻木的原因是
 - A. 窦椎神经受刺激
 - B. 脊神经后支卡压
 - C. 马尾神经受压
 - D. L5神经根受压
 - E. S1神经根受压
2. 最需要鉴别的疾病是
 - A. 腰扭伤
 - B. 腰椎管狭窄症
 - C. 第三腰椎横突综合征
 - D. 椎管内肿瘤
 - E. 强直性脊柱炎
3. 最主要的治疗措施是
 - A. 卧床休息
 - B. 牵引
 - C. 硬脊膜外腔强地松龙注射
 - D. 手术
 - E. 激素，非甾体类抗炎剂

正确答案：CDD 您选择的答案：

第115-117题

男性，55岁。双下肢无力半年，右侧明显，近2个月行走不稳，右手不能扣钮扣，无外伤史，无发热。体格检查，颈背部无明显压痛，两上肢前臂、手及上臂尺侧皮肤感觉减退，右侧尤其明显，四肢肌张力增高，肱二头肌反射亢进，双侧膝踝反射亢进，右髌阵挛阳性，右巴彬斯基征阳性

1. 应考虑的治疗是

- A 颈枕吊带牵引
- B 激素治疗
- C 推拿按摩治疗
- D 手术
- E 颈托围领

2. 致病因素是

- A 病毒感染
- B 细菌感染
- C 退行性改变
- D 变态反应
- E 高血压

3. 下列哪项对该病人最不利

- A 长时间低头伏案写作
- B 枕头过高
- C 头过度后伸
- D 颈部突然前后摆动
- E 牵引

正确答案：DCD 您选择的答案：

第118-120题

男性，55岁。双下肢无力半年，右侧明显，近2个月行走不稳，右手不能扣钮扣，无外伤史，无发热。体格检查，颈背部无明显压痛，两上肢前臂、手及上臂尺侧皮肤感觉减退，右侧尤其明显，四肢肌张力增高，肱二头肌反射亢进，双侧膝踝反射亢进，右髌阵挛阳性，右巴彬斯基征阳性

1. 最可能的诊断是

- A 脑中风
- B 颈椎病
- C 颈椎肿瘤
- D 颈椎结核
- E 颈神经根炎

2. 根据体格检查，确定病变节段为

- A 颈5~6
- B 颈6~7
- C 颈7~胸1
- D 颈45
- E 臂丛神经

3. 最有助于鉴别诊断的辅助检查为

- A 颈椎X线片
- B 颈段X线断层摄片
- C 肌电图
- D 颈段MRI
- E 核素扫描

正确答案：BAD 您选择的答案：

第121-123题

男，26岁，左腰腿痛1个月加重5天，直腿抬高试验及加强试验阳性，左拇趾背伸肌力减弱，X线平片示腰椎屈度变直，轻度退行性改变

1. 依据病史体征及X线检查其诊断应是

- A 腰肌劳损
- B 梨状肌综合征
- C 腰椎管狭窄症
- D 腰椎间盘突出症
- E 棘上韧带炎

2. 为明确诊断进一步检查最好是作

- A 脊椎静脉造影
- B B超
- C 脊髓造影
- D MRI 检查
- E 硬膜外造影

3. 最好的治疗方案是

- A 绝对卧床休息半月并用镇痛药物
- B 立即牵引治疗
- C 推拿按摩
- D 理疗
- E 手术治疗

正确答案：DDA 您选择的答案：

第124-126题

男，52岁，腰痛3年，长期口服止痛药。10天前搬重物后突感腰腿痛加剧，并出现左下肢麻木与排尿困难。体检：腰运动受限，腰5骶1平面偏棘突左侧压痛向下肢放散，直腿抬高试验阳性。马鞍区痛觉减退。

1. 出现排尿困难，鞍区麻木的原因是

- A 窦椎神经受刺激
- B 脊神经后支卡压
- C L5神经根受压
- D S1神经根受压
- E 马尾神经受压

2. 与下列哪项疾病最容易鉴别

- A 腰扭伤
- B 腰椎管狭窄症
- C 第3腰椎横突综合征
- D 椎管内肿瘤

- E. 强直性脊柱炎
- 3. 最主要的治疗措施是
- A. 卧硬床休息
- B. 牵引
- C. 硬脊膜外腔泼尼松龙注射
- D. 椎间盘摘除术
- E. 激素, 非甾体类抗炎剂

正确答案: EED 您选择的答案:

四、A4型题: 以下提供若干个案例, 每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息, 在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第127-131题

男, 60岁, 右髋部疼痛2年余, 加重伴跛行1个月, 既往有“慢性肾炎史”, 长期口服“激素”治疗。体检, 右髋关节“4”字试验阳性。

1. 该患者首先应做的检查是
- A. 血常规 + 血沉
- B. 摄双侧髋关节正位片
- C. 髋关节穿刺 + 细菌培养
- D. 髋关节片 + 活检
- E. 摄腰椎正侧位片
2. 初步诊断为
- A. 强直性脊柱炎合并髋关节强直
- B. 髋关节化脓性关节炎
- C. 右股骨头缺血性坏死
- D. 右髋关节结核
- E. 右髋关节创伤性滑膜炎
3. 为进一步明确诊断, 最有价值的检查是
- A. 肌电图检查
- B. 查空腹血糖
- C. 髋关节B超
- D. 髋关节MRI
- E. 选择性髋关节血管造影
4. 如果明确诊断为右股骨头缺血性坏死, 应该首选哪项治疗措施
- A. 长期口服止痛药
- B. 外敷活血化瘀类药物
- C. 正规的高压氧治疗
- D. 局部封闭治疗
- E. 人工髋关节置换术
5. 若患者术后2年出现同侧髋关节疼痛, 关节囊空虚, 患肢呈弹性固定, 可能出现的并发症是
- A. 创伤性关节炎
- B. 股骨头缺血坏死
- C. 髋关节结核
- D. 人工股骨头脱位
- E. 急性化脓性髋关节炎

正确答案: BCDED 您选择的答案:

五、B1型题: 以下提供若干组考题, 每组考题共用在前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第132-136题

- A. 狭窄性腱鞘炎
- B. 类风湿性关节炎
- C. 髌骨软化症
- D. 肩周炎
- E. 腰椎间盘突出症
- 1. 女, 42岁, 右拇指伸屈时疼痛2个月, 掌指关节掌面可触及痛性结节, 诊断是
- 2. 女, 50岁, 左肩疼痛1月余, 活动受限, 左三角肌、肱二头肌肌腱压痛, 双手无麻木感诊断是
- 3. 女, 34岁, 双手指关节晨起僵硬、疼痛, 指关节肿胀、压痛, X线片示指骨骨质疏松, 关节周围软组织肿胀阴影, 诊断是
- 4. 男, 55岁, 双膝关节痛3个月, 上楼梯时疼痛加重, 研磨试验阳性, X线片未见异常, 诊断是
- 5. 男, 26岁, 腰腿痛1年, 查体: 脊柱侧凸畸形, 直腿抬高试验及加强试验阳性, 左小腿外侧感觉减弱, 诊断是

正确答案: ADBCE 您选择的答案:

第137-141题

- A. 髌骨软化症
- B. 颈椎病
- C. 肱骨外上髁炎
- D. 肩周炎
- E. 桡骨茎突狭窄性腱鞘炎
- 1. 女, 31岁, 左腕关节疼痛1个月, 左腕桡侧有局限性压痛, Finkelstein试验阳性, 诊断是
- 2. 男, 26岁, 右膝关节疼痛半月, 以髌骨下缘疼痛明显, 浮髌试验阳性。X线片未见明显异常, 诊断是
- 3. 右肘外侧痛2个月, 用力握拳或拧毛巾时疼痛加重, 右肘外侧局限性压痛, Mills征阳性, 其诊断是
- 4. 女, 50岁, 左肩疼痛1个月, 左肩关节; 外展、外旋、后伸活动受限, 其诊断是
- 5. 男, 60岁, 颈肩痛3年, 行走不稳4个月, 近1个月来行走有踏棉花感, 查体: Hoffmann征阳性, 双膝腱反射活跃, 双踝阵挛阳性, 诊断是

正确答案: EACDB 您选择的答案:

第142-145题

- A. 肩关节外展受限
- B. 肩部疼痛、无活动受限
- C. 肘关节外侧疼痛
- D. 肘关节活动受限
- E. Finkelstein试验阳性

- 1. 肩关节周围炎
- 2. 颈椎病
- 3. 桡骨茎突狭窄性腱鞘炎
- 4. 肱骨外上髁炎

正确答案：ABEC 您选择的答案：

第146-149题

- A. Mills试验阳性
- B. 肘关节活动受限
- C. 肩关节外展受限
- D. 肩部疼痛、无活动受限
- E. Finkelstein试验阳性

- 1. 肩关节周围炎
- 2. 神经根型颈椎病可出现
- 3. 桡骨茎突狭窄性腱鞘炎
- 4. 肱骨外上髁炎

正确答案：CDEA 您选择的答案：

习题集 外科学 手外伤及断肢(指)再植

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 运送断指时，下列哪种方法是正确的

- A. 简单冲洗断指残端后用清洁敷料包扎好
- B. 将断指残端浸泡在75%的酒精中
- C. 将断指残端浸泡在干净或清洁的冰水中
- D. 将断指直接放在冰块中
- E. 用干燥冷藏法保存

正确答案：E 您选择的答案：

第2题 断肢(指)再植术后什么时候较易发生血管危象

- A. 24小时内
- B. 48小时内
- C. 72小时内
- D. 96小时内
- E. 1周以后

正确答案：B 您选择的答案：

第3题 鼻咽窝的深部组织，是

- A. 第一掌指关节
- B. 大多角骨
- C. 腕舟骨
- D. 桡侧伸腕肌止点
- E. 外展拇短肌止点

正确答案：C 您选择的答案：

第4题 根据断肢损伤的性质，断肢一般可分为

- A. 切割性和撕裂性断肢
- B. 碾压性和切割性断肢
- C. 完全性与不完全性断肢
- D. 切割性、碾压性和撕裂性断肢
- E. 完全性、不完全性和混合性断肢

正确答案：D 您选择的答案：

第5题 Bennett骨折是指

- A. 腕舟骨骨折
- B. 月骨骨折并脱位
- C. 第一掌骨头骨折并脱位
- D. 第一掌骨基底部骨折并脱位
- E. 第一及第二掌骨基底部同时骨折

正确答案：D 您选择的答案：

第6题 手外伤后创口出血，在转送途中，首先采用的止血方法是

- A. 手压法
- B. 患肢抬高
- C. 缚止血带
- D. 局部加压包扎
- E. 钳夹止血

正确答案：D 您选择的答案：

第7题 断肢(指)再植吻合血管时，其所吻合的动、静脉的适宜比例应以

- A. 1:1
- B. 1:2
- C. 1:3
- D. 2:1
- E. 3:2

正确答案：B 您选择的答案：

第8题 再植的断手，最好的保存方法是

- A. 放于无菌生理盐水中
- B. 放于冰块中
- C. 放于75%酒精溶液中
- D. 无菌纱布包裹4 保存
- E. 断手放于冰水中

正确答案：D 您选择的答案：

第9题 Bennett骨折是指

- A. 足舟骨骨折
- B. 腕舟骨骨折
- C. 第1第2掌骨基底部同时骨折
- D. 第1掌骨基底部骨折并脱位
- E. 第1掌骨头骨折并脱位

正确答案：D 您选择的答案：

第10题 断指再植吻合血管时，吻合动静脉比例多少为宜

- A. 1:1

- B. 1:2
- C. 1:3
- D. 2:3
- E. 2:1

正确答案：B 您选择的答案：

第11题 断肢(指)再植手术的原则和程序，哪项是不正确的

- A. 首先应吻合动、静脉，以迅速恢复血循环
- B. 进行彻底的清创手术，凡血循环不良的肌均需彻底切除
- C. 缺血时间较长时，可用肝素生理盐水灌注断肢(指)血管床
- D. 缩短和固定骨骼，以恢复其支架作用
- E. 一般应先吻合一根静脉，然后吻合一根动脉

正确答案：A 您选择的答案：

第12题 单纯指深屈肌腱断裂后，临床可发生

- A. 手指过伸畸形
- B. 手指出现垂状指
- C. 手指的伸，屈功能丧失
- D. 手指屈曲功能丧失
- E. 手指远位指间关节屈曲功能丧失

正确答案：E 您选择的答案：

第13题 断肢再植术中操作，对肢体存活影响最大的因素是

- A. 骨支架建立是否牢固
- B. 神经缝合的质量
- C. 肌腱缝合的质量
- D. 皮肤对合的好坏
- E. 血管吻合的质量

正确答案：E 您选择的答案：

第14题 Allen试验是用于检查手的

- A. 感觉情况
- B. 供血情况
- C. 运动情况
- D. 发汗情况
- E. 皮温情况

正确答案：B 您选择的答案：

第15题 手的肌腱断裂后，出现的体征是

- A. 手指，被动活动丧失
- B. 局部出现剧烈的疼痛
- C. 出现手的成角畸形
- D. 手的休息位发生改变
- E. 出现侧方摆动

正确答案：D 您选择的答案：

第16题 虎口挛缩畸形手术松解后，应将患者固定于

- A. 休息位
- B. 保护位
- C. 背伸位
- D. 伸直位
- E. 功能位

正确答案：B 您选择的答案：

第17题 断肢再植吻合血管时，其所吻合的动、静脉比例应以

- A. 1:2为宜
- B. 1:1为宜
- C. 1:4为宜
- D. 2:1为宜
- E. 2:1.5为宜

正确答案：A 您选择的答案：

第18题 手部创伤出血最简便、有效的方法是

- A. 钳夹血管
- B. 缝扎止血
- C. 较大血管必须结扎
- D. 以气压止血带止血
- E. 局部包扎加压止血

正确答案：E 您选择的答案：

第19题 关于断肢(指)再植，下列哪项是错误的

- A. 断肢平面越近躯干，再植后全身反应越大
- B. 断肢平面越低，术后反应越轻
- C. 断肢时间越短，术后存活的机会越大
- D. 断肢保存良好者，术后存活的可能性大
- E. 断肢保存的温度越高，断肢成活的机会越大

正确答案：E 您选择的答案：

第20题 手部各关节中，哪些是关键性关节

- A. 第1腕掌关节及掌指关节

- B. 腕关节、第1腕掌关节及第1掌指关节
C. 第1掌指关节、第3掌指关节及近节指间关节
D. 腕关节、各指的指间关节及掌指关节
E. 第1指间关节、第1掌指关节及掌腕关节
正确答案：B 您选择的答案：

第21题 手外伤清洗创口的具体步骤是

- A. 用0.1%的新洁尔灭冲洗创口
B. 用生理盐水冲洗创口后冲创口周围
C. 先用碘酒，酒精消毒，再清洗创口
D. 用0.1%的新洁尔灭冲洗伤口内外
E. 先用肥皂水刷洗创口周围皮肤，再用生理盐水洗净创口周围，最后再冲洗创口
正确答案：E 您选择的答案：

第22题 断肢再植术后防止血管痉挛预防血栓形成最重要的措施是

- A. 肢体保暖
B. 禁止吸烟
C. 注意止痛
D. 适当应用血管舒张剂和抗凝剂
E. 可常规静滴低分子右旋糖苷500ml，连用5~7天
正确答案：A 您选择的答案：

第23题 断肢(指)再植术后，若血管吻合口通畅，患肢(指)的皮肤温度应比健侧

- A. 低1~2
B. 一致
C. 高1~2
D. 低3~4
E. 高3~4
正确答案：C 您选择的答案：

第24题 手外伤清创术应争取在伤后多长时间内进行

- A. 6~8小时
B. 9~12小时
C. 12~16小时
D. 1天
E. 36小时
正确答案：A 您选择的答案：

第25题 断肢再植手术距外伤的时间(热缺血时间)，一般以多长为限

- A. 2~4小时
B. 6~8小时
C. 10~12小时
D. 14~16小时
E. 24小时
正确答案：B 您选择的答案：

第26题 屈指肌腱损伤，修复后提倡

- A. 固定三周后，逐渐练习功能
B. 保护性被动活动
C. 固定四周后，开始活动
D. 术后即开始功能练习
E. 固定二周，开始功能练习
正确答案：B 您选择的答案：

第27题 根据断肢损伤的性质，断肢一般可分为

- A. 切割性和撕裂性两大类
B. 完全性与不完全性断肢两大类
C. 撕裂性和辗压性两大类
D. 切割性和辗压性两大类
E. 部分离断和撕裂性离断两大类
正确答案：B 您选择的答案：

第28题 断肢的急救不包括哪一方面

- A. 止血
B. 包扎
C. 保存断肢
D. 清创
E. 迅速运送
正确答案：D 您选择的答案：

第29题 手外伤的处理中哪项是错误的

- A. 必要时可将已污染的神外膜小心部分切除
B. 尽量保存健康的皮肤
C. 作清创术时最好不用止血带
D. 对微小血管出血可钳夹数分钟，不必结扎
E. 若感染的可能性较大者，清创后不宜缝合创口
正确答案：C 您选择的答案：

第30题 手的肌腱断裂后，出现的体征是

- A. 手的休息位发生改变

- B. 局部出现剧烈的疼痛
- C. 被动活动丧失
- D. 出现手的成角畸形
- E. 出现侧方摆动

正确答案：A 您选择的答案：

第31题 右手环指远端缺损骨外露，下列哪种方法不适采用

- A. 缩短指骨，缝合皮肤
- B. 中厚皮片植皮
- C. 带蒂皮瓣移植
- D. 推进皮瓣移植
- E. 鱼际皮瓣转位

正确答案：B 您选择的答案：

第32题 断肢再植术后，血管吻合通畅，患肢(指)的皮温应比健侧

- A. 高1~2
- B. 高2~3
- C. 高3~4
- D. 低1~2
- E. 低2~3

正确答案：A 您选择的答案：

第33题 手部外伤后，凡手指不能主动活动提示可能发生

- A. 有关手指的指骨骨折
- B. 有关手指的血供中断
- C. 手指的神经损伤
- D. 手指的肌腱损伤
- E. 有关手指的关节脱位

正确答案：D 您选择的答案：

第34题 在肢体断离的病理变化中，下列哪项是错误的

- A. 肢体血循环虽中断，但组织并未立即死亡
- B. 细胞在常温下缺血6~7小时，可发生不可逆的病理变化，逐渐死亡
- C. 若断肢8小时以后才作断肢再植手术，可出现全身中毒现象
- D. 病人会因有毒性物质从静脉回流，出现血红蛋白尿
- E. 断肢离断水平越接近躯干，再植后全身反应也越小

正确答案：E 您选择的答案：

第35题 再植的断手，最好的保存方法，是

- A. 放于无菌生理盐水中
- B. 放于林格液中
- C. 放于75%的酒精溶液中
- D. 无菌纱布包裹常温保存
- E. 断手放于冰水中

正确答案：D 您选择的答案：

第36题 在断指再植的手术指征中，哪项是错误的

- A. 青年断指者，应尽量设法再植
- B. 小儿断指者，均宜争取再植
- C. 拇指功能最重要，要千方百计再植
- D. 两处以上断离的断指应力争再植
- E. 老人断指者，一般应慎重决定再植或不再植

正确答案：D 您选择的答案：

第37题 虎口挛缩畸形手术松解后，应将患手固定于

- A. 保护位
- B. 休息位
- C. 功能位
- D. 背伸位
- E. 伸直位

正确答案：A 您选择的答案：

第38题 断指再植手术距外伤的时间一般以多长为限

- A. 2~4小时
- B. 6~8小时
- C. 10~12小时
- D. 14~15小时
- E. 20小时

正确答案：B 您选择的答案：

第39题 断肢的现场急救不包括下列哪一项

- A. 止血
- B. 包扎
- C. 断肢的保存
- D. 彻底清创术
- E. 迅速运送

正确答案：D 您选择的答案：

第40题 关于手部皮肤切割伤的处理，下列哪项不正确

- A. 清创术，应在伤后6~8小时内进行

- B 最好在止血带下进行清创
 - C 切除皮缘宁多勿少，以防感染
 - D 创口应力争一期闭合
 - E 伤后超过24小时，可行二期处理
- 正确答案：C 您选择的答案：

第41题 手部骨折和脱位的处理原则中哪项是错误的

- A 早期达到解剖复位或近似解剖复位
 - B 早期予以牢固功能位固定
 - C 手部的开放性骨折不必早期复位
 - D 早期消灭创面，尽量减少感染及肉芽创面发生
 - E 尽量减少术后手部固定的范围
- 正确答案：C 您选择的答案：

第42题 带蒂皮瓣移植术，适用于下列哪种类型的手外伤

- A 手部有肌腱骨外露及皮肤缺损者
 - B 手部皮肤浅度烧伤
 - C 手部感染者
 - D 手部骨折
 - E 手部皮肤单纯缺损损伤
- 正确答案：A 您选择的答案：

第43题 手部关节皮肤切割伤的处理，下列哪项不正确

- A 最好在止血带下进行清创
 - B 清创术，应在伤后6~8小时内进行
 - C 切除皮缘宁多勿少，以防感染
 - D 伤后超过24小时，可行二期处理
 - E 创口争取一期缝合
- 正确答案：C 您选择的答案：

第44题 关于断肢再植原则，下列哪项是错误的

- A 首先进行彻底的清创
 - B 可将骨骼短缩
 - C 肌腱常作二期缝接
 - D 主要的动、静脉均应做吻合
 - E 神经应一期修复
- 正确答案：C 您选择的答案：

第45题 Allen试验可检查

- A 桡、尺动脉的通畅和相互吻合的情况
 - B 腕管综合征
 - C 胸廓出口综合征
 - D 神经根型颈椎病
 - E 颈肋畸形
- 正确答案：A 您选择的答案：

第46题 若固定除患指外的其他3个手指于伸直位，让病人屈患指近侧指间关节，若不能活动，则表示那条肌腱断裂

- A 患指指深屈肌腱
 - B 患指指浅屈肌腱
 - C 患指指浅和指深屈肌腱
 - D 蚓状肌
 - E 骨间肌
- 正确答案：B 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第47题 男，30岁，13小时前，前臂下1/3切割伤致骨折及深、浅屈指肌腱，正中、尺神经，尺、桡动脉损伤，应采用的治疗方法为

- A 立即缝合皮肤，其他组织待二期处理
 - B 清创后，骨折复位，吻合尺、桡动脉，其它组织待二期处理
 - C 清创后，吻合尺、桡动脉，并一期修复其它组织
 - D 清创后，骨折复位，吻合桡动脉结扎尺动脉，并一期修复其它组织
 - E 清创后，结扎尺、桡动脉，二期修复其它组织
- 正确答案：B 您选择的答案：

第48题 27岁男性。入院前一小时右腕上6cm处被机器绞断，软组织挫伤严重，神经血管均较骨骼短缩2cm，该患者最好的治疗方案，是

- A 清创后，残端缝合
 - B 清创后，残端缝合，断肢保存，待二期再植
 - C 包扎换药
 - D 立即行断肢再植术
 - E 清创后，做前臂分叉成形术
- 正确答案：D 您选择的答案：

第49题 82岁老人，左环指末节离断伤并环指掌侧面有纵行长约6cm皮裂伤，考虑治疗方法是

- A 指骨短缩，右掌侧面皮肤直接缝合
- B 示指残端做邻指皮瓣掌侧面皮肤缝合
- C 示指残端做中厚植皮，掌侧面皮肤直接缝合

D 短缩指骨缝皮肤，掌侧面创口做"Z"字成型缝合

E 换药待其自然愈合

正确答案：D 您选择的答案：

第50题 3小时前，76岁男性，因外伤致右手大鱼际，第一掌骨桡侧有5cm×6cm的皮肤缺损，大鱼际肌肉部分挫灭，第一掌骨有1.0cm×0.5cm的骨外露，该患应采用哪种治疗方法为妥

A 清创后，并局部软组织覆盖第一掌骨的外露，然后行中厚皮片植皮覆盖创面

B 清创后，行游离足背皮瓣移植

C 清创后，行前臂逆行岛状皮瓣移植

D 清创后，用全厚皮片植皮

E 清创后行游离背阔肌皮瓣移植

正确答案：A 您选择的答案：

第51题 24岁男患，入院前3小时被他人砍伤右桡骨小头部致桡骨小头完全骨折，该患最可能伤及

A 桡神经深支

B 正中神经

C 尺神经

D 桡神经和尺神经

E 桡神经和正中神经

正确答案：A 您选择的答案：

第52题 24岁男性，一小时前右手拇指近端被刀完全切断，清创后，应按哪个顺序进行再植手术

A 吻合动、静脉 固定骨骼 修复肌腱

B 固定骨骼 修复神经，肌腱

C 固定骨骼 修复肌腱 吻合动静脉 修复神经 闭合创口

D 修复肌腱 固定骨骼 修复神经 吻合动静脉 闭合创口

E 修复肌腱，神经 吻合动、静脉 固定骨骼 闭合创口

正确答案：C 您选择的答案：

第53题 患者右手掌被一薄而窄的铁器插入至第三掌骨，造成中指屈指肌腱及桡侧固有神经损伤，该患应为

A 切割伤

B 刺伤

C 撕脱伤

D 压伤

E 复合伤

正确答案：B 您选择的答案：

第54题 断指再植术后28小时患者，发现患指指甲绀，指腹肿胀，毛细血管反应存在，皮温尚正常，其原因可能是

A 动脉痉挛或栓塞

B 静脉痉挛或栓塞

C 再灌注综合征所致

D 创口有活动性出血

E 创口感染

正确答案：B 您选择的答案：

第55题 32岁，男性患者，52天前，右前臂因锐器刺伤，经清创缝合，现伤口愈合，但遗有爪形手畸形和骨间肌萎缩，该患最可能损伤为

A 正中神经损伤

B 桡神经损伤

C 尺神经损伤

D 骨间肌损伤

E 正中神经和桡神经损伤

正确答案：C 您选择的答案：

第56题 21岁男性，右腕完全离断伤，再植术后当天，患者诉说有疼痛，此时应重点观察

A 疼痛的变化

B 血压的变化

C 脉搏的变化

D 体温的变化

E 患指血循环的变化

正确答案：E 您选择的答案：

第57题 断指再植术后30小时，发现患指指甲发绀，指腹肿胀，毛细血管反应存在，皮温尚正常，其原因可能是

A 创口感染

B 创口有活动性出血

C 再灌注综合征所致

D 静脉痉挛或栓塞

E 动脉痉挛或栓塞

正确答案：D 您选择的答案：

第58题 男，30岁，右腕完全离断伤，再植术后当天，患者诉说有疼痛，此时应重点观察

A 疼痛的变化

B 血压的变化

C 脉搏的变化

D 体温的变化

E 患指血循环的变化

正确答案：E 您选择的答案：

第59题 某中指离断伤患者，再植术后10小时，发现，患指苍白，皮温低于健侧3℃，经解除包扎，解痉药物等处理，不见好转，此时应采取

- A 抬高患肢，保温
 - B 臂丛神经阻滞麻醉
 - C 应用抗凝溶栓药物
 - D 立即手术探查吻合的血管情况
 - E 继续观察
- 正确答案：D 您选择的答案：

第60题 22岁青年，被电锯伤及右手小鱼际，有2.0cm×2.5cm的皮肤缺损，基底未见骨外露和神经外露，经清洗，消毒，清创后，应采取哪种修复方法

- A 局部皮瓣移植
 - B 前臂交叉皮瓣移植
 - C 胸，腹部皮瓣移植
 - D 游离中厚皮瓣植皮
 - E 吻合血管的游离皮瓣移植
- 正确答案：D 您选择的答案：

第61题 25岁男性，2小时前，腕掌侧切割伤，致深，浅屈指肌腱，正中尺神经，尺桡动脉损伤，应采用的治疗方法

- A 立即缝合皮肤，其他组织待二期处理
 - B 清创后，吻合尺桡动脉，其他组织待二期处理
 - C 清创后，吻合尺，桡动脉，并一期修复其他组织
 - D 清创后，吻合桡动脉结扎尺动脉，并一期修复其他组织
 - E 清创后，结扎尺桡动脉，一期修复其他组织
- 正确答案：C 您选择的答案：

第62题 男，32岁，半月前，左前臂因锐器刺伤，经清创缝合，现伤口愈合，但遗有爪形手畸形和骨间肌萎缩，该患者最可能的损伤为

- A 正中神经损伤
 - B 桡神经损伤
 - C 骨间肌损伤
 - D 尺神经损伤
 - E 正中神经和桡神经损伤
- 正确答案：D 您选择的答案：

第63题 男，20岁，入院前2小时被他人砍伤桡侧半腕关节，最可能伤及

- A 桡神经和尺神经
 - B 正中神经
 - C 桡神经和正中神经
 - D 桡神经深支
 - E 尺神经
- 正确答案：C 您选择的答案：

第64题 肌腱损伤近年来缝合方法有所改变，主要是改用显微外科技术，指的是

- A 间断缝合
 - B 抽出缝合
 - C 双垂直缝合
 - D 编织缝合
 - E 用4.0~8.0的显微缝合线进行缝合
- 正确答案：E 您选择的答案：

第65题 某患者中指离断伤，再植术后10小时，发现患指苍白，皮温低于健侧3℃，经解除包扎，解痉药物等处理，不见好转，此时应采取

- A 抬高患肢，保温
 - B 继续观察
 - C 臂丛神经阻滞麻醉
 - D 应用抗凝溶栓药物
 - E 立即手术探查吻合的血管情况
- 正确答案：E 您选择的答案：

三、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第66-67题

青年患者入院前1小时，右肱骨中段，被机器绞伤，致上臂仅后侧有宽2cm的皮肤相连，该皮肤有较重的挫伤，其余组织完全离断

1. 该患者应诊断为
 - A 右肱骨严重的开放性骨折
 - B 右上臂完全离断伤
 - C 右上臂不完全离断伤
 - D 右肱骨开放性骨折，伴血管损伤
 - E 右肱骨开放性骨折伴神经损伤
 2. 该患者的治疗方案应选择
 - A 清创术，右肱骨内固定术
 - B 清创后，右肱骨内固定，修复损伤血管
 - C 清创后，右肱骨内固定，修复损伤的神经
 - D 断肢再植术
 - E 清创后，残端缝合
- 正确答案：BD 您选择的答案：

第68-69题

该患术后20小时，发现患手轻度肿胀，指甲略发绀，毛细血管反应存在，针刺指尖部有鲜红的血液溢出，皮温较健侧高0.5

1. 其原因可能是

- A 静脉栓塞或痉挛
- B 动脉栓塞或痉挛
- C 动、静脉同栓塞或痉挛
- D 属正常现象
- E 创口部有活动性出血

2. 此时，该患应如何处理

- A 解除压迫因素后，采用血管解痉措施，观察1小时后不见好转，手术治疗
- B 选用有效的抗生素
- C 理疗，抬高患肢
- D 拆除缝线止血
- E 手术切开，取动静脉血栓

正确答案：AA 您选择的答案：

第70-73题

男，21岁，3小时前右示指近节指骨处被刀完全切断，创面整齐较清洁

1. 彻底清创后，应按以下哪一顺序进行再植修复

- A. 吻合静脉 动脉 固定骨骼 修复肌腱、神经
- B. 固定骨骼 吻合静脉 动脉 修复肌腱、神经
- C. 固定骨骼 缝合深层肌腱 吻合动静脉 神经
- D. 修复肌腱 固定骨骼 吻合动静脉 神经
- E. 修复肌腱 神经 吻合动静脉 固定骨骼

2. 术后处理中哪项不正确

- A. 抬高患肢
- B. 防止血管痉挛
- C. 定期观察断指血运
- D. 一经发现血管危象，应立即手术探查
- E. 禁止吸烟，并注意患肢的保暖

3. 如果术后30小时发现患指指甲发绀，指腹稍肿胀，毛细血管反应仍存在，皮温稍下降，其原因可能是

- A. 静脉痉挛或栓塞
- B. 动脉痉挛或栓塞
- C. 创口感染坏死
- D. 再灌注综合征所致
- E. 创口内有活动性出血

4. 此时应如何处理

- A. 解除压迫因素后，使用血管解痉措施
- B. 改用有效的抗生素
- C. 理疗
- D. 拆除缝线止血
- E. 切开动脉取出栓子

正确答案：CDAA 您选择的答案：

第74-76题

34岁女性，入院2小时左手中指掌指关节处掌面，被宽3cm锐器刺伤，查体发现中指呈伸直位，感觉障碍，手指苍白发凉，Allen试验阳性

1. 该患者诊断考虑为

- A 皮肤裂伤
- B 手指不全离断伤
- C 开放性指骨骨折
- D 手指固有神经损伤
- E 左中指屈指肌腱，指两侧固有神经和指动脉开放性损伤

2. 该患者的治疗方案是

- A 清创后修复屈指肌腱，神经，吻合动脉缝合创口
- B 清创后，修复神经，吻合动脉，肌腱二期修复
- C 清创后，修复肌腱，吻合动脉，神经二期修复
- D 清创后，修复肌腱和神经
- E 清创后，缝合伤口，其他组织二期修复

3. 该患术后48小时突然出现中指色泽发白，凉，皮温较健指低2.5，指腹发瘪，此时应采取什么措施

- A 患肢抬高，保温
- B 应用镇静，止痛药
- C 立即手术探查吻合的指动脉
- D 臂丛麻醉
- E 应用抗血管痉挛药物

正确答案：EAC 您选择的答案：

第77-79题

患者，男，36岁，批倒后右手支撑地面，腕部肿痛，活动障碍，鼻回窝部有明显压痛

1. 最可能的诊断是

- A. 第一掌骨基底骨折
- B. 月骨脱位
- C. 第二掌骨基底部骨折
- D. 舟骨骨折
- E. 豆状骨骨折

2. 多长时间后的X线片才能明确诊断

- A. 3天
- B. 1周
- C. 2周
- D. 3周

- E. 6周
3. 初步确诊后应采取的治疗方案为
A. 切开复位内固定术
B. 短臂石膏外固定
C. 手法复位弹力绷带外固定
D. 应用外固定支架
E. 骨牵引后理疗
正确答案：DCB 您选择的答案：

第80-82题

患者男性，32岁，摔倒后右手支撑地面，腕部肿痛，活动障碍，鼻烟壶部有明显压痛。

1. 可能的诊断是
A. 腕舟骨骨折
B. 月骨脱位
C. 第2掌骨基底部骨折
D. Bennett骨折
E. 豆状骨骨折
2. 一般几周后才能通过X线片确诊
A. 1周
B. 2周
C. 3周
D. 4周
E. 5周
3. 采取的治疗措施是
A. 手法复位弹力绷带外固定
D. 应用外固定支架
C. 短臂石膏外固定
D. 切开复位内固定
E. 骨牵引物理疗法
正确答案：ABC 您选择的答案：

四、A4型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第83-85题

20岁男性，入院3小时，左手中指掌指关节处掌面有宽2cm锐器刺伤，体检发现中指呈现伸直位，感觉障碍，手指苍白发凉，Allen试验阳性。

1. 该患者的诊断考虑为
A. 皮肤裂伤
B. 手指不全离断伤
C. 开放性指骨骨折
D. 手指固有神经损伤
E. 左中指屈指肌腱、两侧固有神经和指动脉开放性损伤
2. 该患者的治疗方案是
A. 清创后，修复神经，吻合动脉，肌腱2期修复
B. 清创后修复屈指肌腱、神经，吻合动脉缝合伤
C. 清创后，修复肌腱和神经
D. 清创后，修复肌腱，吻合动脉，神经2期修复
E. 清创后，缝合伤口，其他组织2期修复
3. 若该患者术后26小时突然出现中指色泽发白，凉，皮温较健指低1.5℃，指腹发瘪，此时应采取哪项措施
A. 患肢抬高，保温
B. 应用镇静，止痛药
C. 臂丛麻醉
D. 立即手术探查吻合的指动脉
E. 应用抗血管痉挛药物
正确答案：EBD 您选择的答案：

五、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第86-88题

- A. 创口无任何规律可循
B. 创口整齐，污染较轻，但出血多
C. 创口小而深，可损伤深部组织
D. 可有皮肤脱套伤，肌腱被拉出，骨骼可能破坏
E. 创口不规律，伴有多发性骨折和内在肌挫伤
1. 手部开放性损伤中，撕脱伤的特点是
2. 手部开放性损伤中，刺伤的特点是
3. 手部开放性损伤中切割伤的特点是
正确答案：DCB 您选择的答案：

第89-91题

- A. 创口无任何规律可循
B. 创口小而深，可损伤深部组织
C. 创口整齐，污染较轻，但出血多
D. 可有皮肤脱套伤，肌腱被拉出，骨骼可能破坏
E. 创口不规律，伴有多发性骨折，和内在肌挫伤
1. 手部开放性损伤中刺伤的特点，是

2. 手部开放性损伤中切割伤的特点，是
3. 手部开放性损伤中，撕脱伤的特点是
正确答案：BCD 您选择的答案：

第92-94题

A 拇指完全离断
B 老人一指多节段断指
C 儿童小指完全断指
D 两处以上的断指
E 多指断指，仅拇指断指远端无再植条件
1. 千方百计再植
2. 不宜再植
3. 移位再植
正确答案：ABE 您选择的答案：

习题集 外科学 关节脱位

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 脱位的正确定义是

- A. 关节自关节囊内突出
- B. 关节囊发育不良导致关节失去稳定性的现象
- C. 关节面失去正常的对合关系
- D. 组成关节的关节面部分失去对合关系
- E. 组成关节的各关节面失去正常的啮合关系

正确答案：C 您选择的答案：

第2题 新鲜关节脱位是指脱位时间不超过

- A. 1周
- B. 2周
- C. 3周
- D. 2个月
- E. 4个月

正确答案：C 您选择的答案：

第3题 肩关节脱位最多见的类型是

- A. 前脱位
- B. 后脱位
- C. 下脱位
- D. 孟上脱位
- E. 中心型脱位

正确答案：A 您选择的答案：

第4题 关节脱位的特有体征

- A. 疼痛与压痛
- B. 反常活动
- C. 运动消失
- D. 关节面外露
- E. 弹性固定

正确答案：E 您选择的答案：

第5题 新鲜脱位是指关节脱位后的时间未满足

- A. 1周
- B. 2周
- C. 3周
- D. 3个月
- E. 6个月

正确答案：C 您选择的答案：

第6题 肘关节脱位固定复位后，在固定期间开始肌锻炼时应避免

- A. 肱二头肌收缩动作
- B. 活动手指与腕部
- C. 中药熏洗浸泡肘关节
- D. 麻醉下行肘关节手法松解
- E. 进行一定的理疗与体疗

正确答案：D 您选择的答案：

第7题 单纯肘关节脱位时，可出现

- A. 骨擦音
- B. 反常活动
- C. 关节饱满
- D. 肘后三角失常
- E. 鹰嘴固定压痛

正确答案：D 您选择的答案：

第8题 关节脱位的特有体征是

- A. 疼痛与压痛
- B. 反常活动
- C. 运动消失
- D. 关节面外露
- E. 弹性固定

正确答案：E 您选择的答案：

第9题 髌关节脱位的最多见类型是

- A. 前脱位
- B. 后脱位
- C. 中心型脱位
- D. 合并髌臼骨折的脱位
- E. 合并股骨头骨折的脱位

正确答案：B 您选择的答案：

第10题 何谓开放性脱位

- A. 脱位伴皮肤裂伤

B 同时伴关节面骨折
C 手术探查时发现关节囊有裂伤
D 同时伴关节韧带断裂
E 关节腔与外界相通
正确答案：E 您选择的答案：

第11题 肘关节后脱位的并发症哪项是不正确的

A．Volkmann前臂缺血性挛缩
B．正中神经损伤
C．尺神经损伤
D．骨化性肌炎
E．关节强直
正确答案：E 您选择的答案：

第12题 桡骨小头半脱位常见发生年龄及常用处理方法，是

A 5～10岁小儿，手法复位，三角巾悬吊
B 6～8岁小儿，手法复位，石膏外固定
C 10岁儿童，切开复位内固定
D 5岁以下幼儿，手法复位，三角巾悬吊
E 成年人，切开复位内固定
正确答案：D 您选择的答案：

第13题 最常发生先天性脱位的关节是

A．肩锁关节
B．上尺桡关节
C．髋关节
D．肩关节
E．踝关节
正确答案：C 您选择的答案：

第14题 鉴别髋关节前脱位与髋关节后脱位的主要依据是

A．外伤史
B．外伤时的体位
C．外伤暴力的大小
D．髋关节X线正侧片的表现
E．患髋肢体的畸形表现
正确答案：E 您选择的答案：

第15题 下述关节脱位的特有体征，哪项是正确的

A 肿胀，畸形，功能障碍
B 压痛，肿胀，淤斑
C 畸形，反常活动，关节空虚
D 畸形，反常活动，弹性固定
E 畸形，弹性固定，关节空虚
正确答案：E 您选择的答案：

第16题 髋关节后脱位的合并症中，哪项是最不常见的

A．髋臼后缘骨折
B．股骨头骨折
C．股神经损伤
D．坐骨神经损伤
E．髋臼壁骨折
正确答案：C 您选择的答案：

第17题 在临床上，鉴别髋关节前脱位与髋关节后脱位的简便有效的依据是

A．外伤史
B．受伤时的体位
C．外伤暴力的大小
D．患髋肢体的畸形表现
E．髋关节X线正侧位片的表现
正确答案：D 您选择的答案：

第18题 治疗新鲜髋关节后脱位的措施，不应选择

A．Allis手法复位
B．复位后持续皮牵引固定于伸直，外层位3～4周
C．早期进行股四头肌收缩活动及踝部功能锻炼
D．伤后3个月患肢不能负重，以免股骨头缺血坏死
E．即刻手术切开复位
正确答案：E 您选择的答案：

第19题 关节脱位的专有体征有

A．畸形、反常活动、关节空虚
B．畸形、反常活动及骨擦感
C．关节空虚、畸形、弹性固定
D．弹性固定及反常活动
E．畸形及弹性固定
正确答案：C 您选择的答案：

第20题 关节脱位的定义是

A．关节自关节囊脱出

B. 关节囊发育不良导致的关节失稳现象
C. 组成关节的关节面部分失去对合关系
D. 关节面失去正常的对合关系
E. 组成关节的各关节面形态发生改变
正确答案：D 您选择的答案：

第21题 肘关节后脱位的并发症哪项不正确

A. 正中神经损伤
B. 关节强直
C. 尺神经损伤
D. 骨化性肌炎
E. Volkmann前臂缺血性挛缩
正确答案：B 您选择的答案：

第22题 髋关节后脱位型的处理最好在

A. 24小时复位完毕
B. 48小时复位完毕
C. 72小时复位完毕
D. 1周复位完毕
E. 3周复位完毕
正确答案：A 您选择的答案：

第23题 新鲜肩关节前脱位病人，治疗上首选的方法是

A. 悬吊牵引
B. 皮肤牵引
C. 骨牵引
D. 手法复位外固定
E. 手术切开复位内固定
正确答案：D 您选择的答案：

第24题 何谓关节脱位

A. 关节分离
B. 关节囊扭伤并断裂
C. 关节面失去正常对合关系
D. 关节韧带断裂
E. 关节出现畸形和弹性固定
正确答案：C 您选择的答案：

第25题 下列哪种方法不是肩关节脱位的复位方法

A. Hippocrates法
B. 足蹬法
C. Stimson法
D. Kocher法
E. Bigelow法
正确答案：E 您选择的答案：

第26题 桡骨小头半脱位常见发生年龄及常用处理方法是

A. 5岁以下幼儿，手法复位，三角巾悬吊
B. 6~8岁小儿，手法复位，石膏外固定
C. 10岁儿童，切开复位内固定
D. 5~10岁小儿，手法复位，三角巾悬吊
E. 成年人，切开复位内固定
正确答案：A 您选择的答案：

第27题 在髋关节后脱位复位时，正确的方法应该是

A. 必须在全麻或椎管内麻醉下行手法复位
B. 必须切开复位
C. 不需行任何麻醉即可手法复位
D. 必须在X线透视监视下进行复位
E. 复位成功后必须行石膏外固定2~3周
正确答案：A 您选择的答案：

第28题 下述关节脱位的特有体征，哪项是正确的

A. 肿胀，畸形，功能障碍
B. 压痛，肿胀，淤斑
C. 畸形，反常活动，关节空虚
D. 畸形，弹性固定，关节空虚
E. 畸形，反常活动，弹性固定
正确答案：D 您选择的答案：

第29题 发生脱位率最高的关节是

A. 肩关节
B. 肘关节
C. 膝关节
D. 髋关节
E. 髌髁关节
正确答案：A 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第30题 3岁患儿上楼梯时，其父向上牵拉右上肢，患儿哭叫，诉肘部疼痛，不肯用左手取物，最可能的诊断是

- A．肘关节脱位
- B．桡骨头骨折
- C．桡骨头半脱位
- D．肌肉牵拉伤
- E．尺骨鹰嘴撕脱伤

正确答案：C 您选择的答案：

第31题 一交通事故幸存者，诉右髋关节疼痛，不能活动，体检：右髋关节屈曲内收、内旋畸形，髋关节囊明显空虚，诊断可能为

- A．髋关节脱位
- B．股骨颈骨折
- C．股骨头骨折
- D．股骨转子间骨折
- E．股骨上端骨折

正确答案：A 您选择的答案：

第32题 某患者跌倒，手掌撑地，肩外展外旋，出现肩痛，肿胀，活动受限，体检Dugas征阳性。该病人肩部的畸形是

- A．方肩
- B．肩过度后伸屈曲
- C．肩过度膨隆
- D．屈曲外展，外旋
- E．内收，内旋

正确答案：A 您选择的答案：

第33题 三岁患儿上楼梯时，其父向上牵拉右上肢，患儿哭叫，诉肘部疼痛，不肯用左手取物，最可能的诊断是

- A 肘关节脱位
- B 桡骨头骨折
- C 桡骨头半脱位
- D 肌肉牵拉伤
- E 尺骨鹰嘴撕脱伤

正确答案：C 您选择的答案：

第34题 交通事故，右髋关节疼痛，不能活动，查体：右髋关节屈曲内收，内旋，畸形，诊断为

- A 股骨颈骨折
- B 股骨转子间骨折
- C 股骨头骨折
- D 髋关节脱位
- E 股骨上端骨折

正确答案：D 您选择的答案：

第35题 一确诊为髋关节后脱位第 型的患者，最好在什么时间复位完毕

- A．24小时
- B．48小时
- C．72小时
- D．1周内
- E．2周内

正确答案：A 您选择的答案：

第36题 一确诊为髋关节后脱位的患者，在其身上较少出现的合并症是

- A．股骨头骨折
- B．股神经损伤
- C．坐骨神经损伤
- D．髌臼壁骨折
- E．髌臼后缘骨折

正确答案：B 您选择的答案：

第37题 跌倒，手掌撑地，肩外展外旋，出现肩痛，肿胀，活动受限，查体Dupas征阳性。该病人肩部的畸形是

- A 屈曲外展，外旋
- B 屈曲内收，内旋
- C 方肩
- D 肩过度后伸
- E 肩过度膨隆

正确答案：C 您选择的答案：

三、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第38-39题

患儿4岁，其母提拉其手上台阶时，出现患儿哭闹，右肘疼痛，不思活动。查体：右肘关节无肿胀，未见明显畸形，X线片未见明显异常征象

- 1．其诊断最可能是
- A．右肘关节软组织损伤
- B．习惯性右肩关节脱位
- C．右尺骨鹰嘴骨折伴肘关节前脱位
- D．右桡骨头半脱位

- E. 右尺神经卡压综合征
 - 2. 正确的治疗方法应是
 - A. 单纯手法复位
 - B. 全麻下行手法复位
 - C. 切开复位并内固定
 - D. 手法复位后患肘外固定2周
 - E. 手术松解卡压的神经
- 正确答案：DA 您选择的答案：

第40-43题

乘车时，急刹车，右膝前方受到撞击，出现右髌剧痛，髌关节运动障碍，处于屈曲内收，内旋，畸形状。

- 1. 应诊断为
 - A. 股骨颈骨折
 - B. 股骨粗隆间骨折
 - C. 股骨粗隆下骨折
 - D. 髌关节后脱位
 - E. 髌关节前脱位
 - 2. 可能出现哪些合并损伤
 - A. 坐骨神经
 - B. 股神经
 - C. 闭孔神经
 - D. 胫神经
 - E. 腓总神经
 - 3. 应选择哪种治疗方法
 - A. Hippocrates法
 - B. Koeher法
 - C. Bigelow法
 - D. 骨牵引
 - E. 皮牵引
 - 4. 该病人治疗4周后，自行下地负重行走，正常活动，预计可能发生下列哪一种情况
 - A. 关节强直
 - B. 关节周围组织损伤
 - C. 习惯性关节脱位
 - D. 股骨头缺血性坏死
 - E. 髌关节周围创伤性骨化
- 正确答案：DACD 您选择的答案：

第44-47题

患者男，42岁，乘车时盘腿而坐，突然刹车时右膝关节受撞击致右髌关节疼痛不能活动6小时，查体：患肢缩短，右髌关节屈曲、内收、内旋畸形。

- 1. 应首先考虑的诊断是
 - A. 髌关节脱位
 - B. 髌关节后脱位
 - C. 髌关节前脱位
 - D. 髌关节脱位合并膝关节损伤
 - E. 髌关节中心脱位
 - 2. 应首先作哪种辅助检查
 - A. 右髌关节X线侧位片
 - B. 右髌关节X线正位片
 - C. 双侧髌关节X线正、侧位片
 - D. 右髌关节X线正、侧位片
 - E. MRI
 - 3. 若X线片未见明显的骨折征象，应选择哪种治疗方法
 - A. 骨牵引4周
 - B. 切开复位石膏托外固定
 - C. 单纯手法复位
 - D. 手法复位后卧床4周
 - E. 手法复位后患肢骨牵引2~3周
 - 4. 该病人复位4周后，扶双拐下地活动，需多长时间后才能完全承重
 - A. 1周
 - B. 2周
 - C. 3个月
 - D. 4个月
 - E. 5个月
- 正确答案：BCEC 您选择的答案：

第48-51题

男，25岁，摔倒后致单纯性左肩关节脱位，2小时后来医院就诊，X线片排除骨折可能。

- 1. 此时应该首先采取哪种治疗措施
 - A. 局麻后手法复位
 - B. 局麻后切开复位
 - C. 全麻后手法复位
 - D. 切开复位后同时修复关节囊
 - E. 骨牵引后行外展架固定
- 2. 复位不成功的标志是
 - A. 疼痛减轻
 - B. 原肩胛盂处空虚感消失
 - C. 方肩畸形消失
 - D. Dugas征阴性
 - E. 弹性固定

3. 复位成功后，应屈肘90°用三角巾悬吊上肢

- A. 1周
- B. 2周
- C. 3周
- D. 4周
- E. 5周

4. 该病人解除外固定后，其左侧肩、肘关节活动受限，应如何处理

- A. 单纯予以理疗
- B. 行关节囊切开松解术
- C. 在局麻下行手法扳正
- D. 延长外固定1~2周
- E. 进行关节各个活动方向的主动锻炼

正确答案：AECE 您选择的答案：

第52-55题

患者男性，28岁，摔倒后致左肩关节脱位，X线片未见合并骨折征象。

1. 首先应采取哪种治疗措施

- A. 局麻后手法复位
- B. 局麻后切开复位
- C. 全麻后手法复位
- D. 切开复位后同时修复关节囊
- E. 骨牵引后行外展架固定

2. 复位成功的标志是

- A. 方肩消失
- B. 疼痛减轻，可做轻微活动
- C. 肩胛盂处有空虚感
- D. 弹性固定消失
- E. Dugas征阴性

3. 复位成功后，可屈肘90°三角巾悬吊上肢

- A. 1周
- B. 2周
- C. 3周
- D. 4周
- E. 5周

4. 该病人解除外固定后，左侧肩、肘关节活动受限，应如何处理

- A. 进行关节各个活动方向的主动锻炼
- B. 应在麻醉下行手法扳正
- C. 行关节囊切开松解术
- D. 理疗
- E. 延长外固定1~2周

正确答案：AECA 您选择的答案：

四、A4型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第56-58题

某患者乘车时，因急刹车，右膝前方受到撞击，出现右髌剧痛，髌关节运动障碍，处于屈曲内收，内旋，畸形状态。

1. 应选择哪种治疗方法

- A. 骨牵引
- B. 皮牵引
- C. Bigelow法
- D. Kocher法
- E. Hippocrates法

2. 若该病人治疗4周后，自行下地负重行走，正常活动，预计可能发生下列哪一种情况

- A. 关节强直
- B. 关节周围组织损伤
- C. 习惯性关节脱位
- D. 髌关节周围创伤性骨化
- E. 股骨头缺血性坏死

3. 该患者固定4周后，扶双拐下地活动，需多长时间才能完全承重

- A. 1周后
- B. 2周后
- C. 1个月后
- D. 2个月后
- E. 3个月后

正确答案：CEE 您选择的答案：

第59-61题

某患者乘车时，因急刹车，右膝前方受到撞击，出现右髌剧痛，髌关节运动障碍，处于屈曲内收，内旋，畸形状态。

1. 应诊断为

- A. 股骨颈骨折
- B. 股骨粗隆间骨折
- C. 股骨粗隆下骨折
- D. 髌关节后脱位
- E. 髌关节前脱位

2. 可能出现哪些合并损伤

- A. 坐骨神经
- B. 股神经
- C. 闭孔神经

- D. 胫神经
 - E. 腓总神经
 - 3. 应该首选下列哪项辅助检查
 - A. 右髋关节X线侧位片
 - B. 右髋关节X线正位片
 - C. 右髋关节CT
 - D. 右髋关节X线正、侧位片
 - E. 右髋关节MRI
- 正确答案：DAD 您选择的答案：

五、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第62-64题

- A. 肩关节脱位
 - B. 肘关节脱位
 - C. 髋关节后上脱位
 - D. 髋关节前下脱位
 - E. 髋关节中心脱位
 - 1. Dugas征阳性
 - 2. Hippocrates法复位
 - 3. 下肢短缩，髋关节屈曲、内收、内旋畸形
- 正确答案：AAC 您选择的答案：

第65-67题

- A. 肩关节脱位
 - B. 肘关节脱位
 - C. 髋关节后上脱位
 - D. 髋关节前下脱位
 - E. 髋关节中心脱位
 - 1. Dugas征阳性
 - 2. Hippocrates法复位
 - 3. 下肢短缩，髋关节屈曲、内收、内旋畸形
- 正确答案：AAC 您选择的答案：

习题集 外科学 脊柱和骨盆骨折

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 脊柱外伤后导致脊髓右侧半横断损伤，其典型的临床表现是

- A. 双侧肢体完全瘫痪
- B. 同侧肢体运动消失，对侧肢体感觉丧失
- C. 同侧肢体运动和深感觉丧失，对侧浅感觉消失
- D. 同侧肢体运动和浅感觉丧失，对侧深感觉丧失
- E. 同侧肢体感觉丧失，对侧肢体运动消失

正确答案：C 您选择的答案：

第2题 骨盆骨折比较常见的体征是

- A. 局部畸形
- B. 骨摩擦音
- C. 异常活动
- D. 局部压痛及骨盆间接挤压痛
- E. 功能障碍

正确答案：D 您选择的答案：

第3题 脊柱外伤造成脊髓休克，是由于

- A. 脊髓神经细胞遭受震荡，产生暂时性功能抑制，发生传导障碍
- B. 骨折片刺入脊髓
- C. 因脊髓受血肿等压迫
- D. 外伤后脊髓神经细胞遭破坏
- E. 脊髓上、下行神经传导束断裂

正确答案：A 您选择的答案：

第4题 颈椎椎体骨折多发生在

- A. C1~2
- B. C3~4
- C. C5~7
- D. C8~T1
- E. 棘突

正确答案：C 您选择的答案：

第5题 关于脊柱外伤与脊髓损伤的关系的叙述，下列哪项是错误的

- A. 脊髓损伤节段与椎骨受伤平面不一致
- B. 胸椎较固定，所以胸椎骨的脱位多无脊髓损伤
- C. 有的病例表现为明显脊髓损伤，但X线片却无骨折脱位
- D. 屈曲型骨折脱位造成脊髓损伤最多见
- E. 椎管狭窄患者，脊柱创伤更易发生脊髓损伤

正确答案：B 您选择的答案：

第6题 腰：椎体压缩性骨折，双下肢感觉运动功能正常，X线片示椎体压缩1/3，合理的治疗应该是

- A. 急诊手术复位，内固定
- B. 石膏固定
- C. 平卧硬板床，腰下垫枕休息
- D. 神经营养药物治疗
- E. 抗生素治疗

正确答案：C 您选择的答案：

第7题 骨盆骨折最危险的并发症是

- A. 膀胱破裂
- B. 盆腔出血合并休克
- C. 尿道断裂
- D. 骶丛神经损伤
- E. 直肠损伤

正确答案：B 您选择的答案：

第8题 脊髓震荡是指

- A. 脊髓受压
- B. 脊髓挫伤
- C. 脊髓裂伤
- D. 脊髓血运障碍
- E. 脊髓暂时性功能抑制

正确答案：E 您选择的答案：

第9题 骨盆骨折处理原则中最重要的是

- A. 骨盆固定
- B. 抗休克
- C. 处理直肠损伤
- D. 处理尿道损伤
- E. 手术治疗

正确答案：B 您选择的答案：

第10题 铲土者骨折是指

- A. 枢椎齿状突底部骨折

- B. 腰3横突撕脱骨折
- C. 颈7及胸1棘突撕脱骨折
- D. 腰椎附件的骨折
- E. 椎体的单纯压缩性骨折

正确答案：C 您选择的答案：

第11题 在脊椎骨折脱位中，哪项属于稳定型骨折

- A. 椎体粉碎压缩骨折
- B. 第1颈椎脱位或半脱位
- C. 腰1椎体骨折脱位
- D. 腰2的附件骨折
- E. 椎体压缩1/3以上的单纯压缩骨折

正确答案：D 您选择的答案：

第12题 颌枕吊带牵引治疗一成年男性颈椎压缩性骨折，复位满意后行石膏外固定，一般固定多长时间

- A. 1个月
- B. 2个月
- C. 3个月
- D. 4个月
- E. 5个月

正确答案：C 您选择的答案：

第13题 可导致马尾神经损伤的是

- A. 第10胸椎骨折脱位
- B. 第11胸椎骨折脱位
- C. 第12胸椎骨折脱位
- D. 第1腰椎骨折脱位
- E. 第2腰椎骨折脱位

正确答案：E 您选择的答案：

第14题 坐骨结节撕脱骨折一般采用的治疗方法是

- A. 手术切开复位
- B. 手法复位内固定
- C. 髌人字石膏外固定
- D. 患侧大腿伸直外旋位卧床休息
- E. 患侧髌、膝屈曲位卧床休息3~4周

正确答案：D 您选择的答案：

第15题 颈椎压缩性骨折合并脱位最先选择的治疗方法是

- A. 手法复位，石膏外固定
- B. 颌枕带牵引
- C. 两桌复位法
- D. 颅骨牵引
- E. 切开复位内固定

正确答案：D 您选择的答案：

第16题 骨盆由下列哪些结构构成

- A. 两侧髌骨
- B. 两侧髌骨+尾骨
- C. 两侧髌骨+骶尾骨
- D. 两侧髌骨+骶尾骨
- E. 耻骨+耻骨联合+骶骨+双侧骶髂关节

正确答案：D 您选择的答案：

第17题 可以导致马尾神经损伤的是

- A. 腰2椎体骨折并脱位
- B. 腰1椎体骨折并脱位
- C. 胸12椎体骨折并脱位
- D. 胸11椎体骨折并脱位
- E. 胸10椎体骨折并脱位

正确答案：A 您选择的答案：

第18题 骨盆骨折最危险的并发症，是

- A. 盆腔内出血
- B. 膀胱破裂
- C. 尿道断裂
- D. 骶丛神经损伤
- E. 直肠损伤

正确答案：A 您选择的答案：

第19题 关于骨盆的构成，下列哪种说法是正确的

- A. 由两侧髌骨及尾骨构成
- B. 由两侧髌骨构成
- C. 是骶尾骨及两侧髌骨构成
- D. 由耻骨、耻骨联合、骶骨及双侧骶髂关节构成
- E. 由骶尾骨及两侧髌骨构成

正确答案：C 您选择的答案：

第20题 在脊柱骨折中，下列哪项叙述是不正确的

- A. 绝大多数是由间接暴力引起

- B. 胸腰段交界处脊柱活动较多，最不易受损伤
C. 脊柱骨折可导致脊髓损伤
D. 伸直型脊柱骨折极少见
E. 屈曲型脊柱骨折最常见
正确答案：B 您选择的答案：

第21题 脊柱骨折病人在搬运过程中，最正确的体位是

- A. 侧卧位
B. 仰卧屈曲位
C. 仰卧过伸位
D. 俯卧过伸位
E. 半坐卧位

正确答案：C 您选择的答案：

第22题 骨盆骨折合并尿道完全断裂，最好的处理是

- A. 采用橡皮导尿管导尿
B. 采用金属导尿管导尿
C. 膀胱穿刺
D. 膀胱造瘘
E. 尿道吻合术

正确答案：E 您选择的答案：

第23题 脊髓休克的病理生理变化是

- A. 骨折片刺入脊髓
B. 脊髓受水肿压迫
C. 外伤后脊髓神经细胞遭破坏
D. 脊髓上下神经传导中断
E. 脊髓神经细胞遭受震荡，产生暂时的功能抑制，发生传导障碍

正确答案：E 您选择的答案：

第24题 在脊椎骨折或脱位中，属于稳定性骨折的是

- A. 椎体压缩1/3以上不伴有移位的骨折
B. 腰5椎体附件骨折
C. 椎体粉碎性骨折
D. 颈1椎体的脱位
E. 腰2椎体压缩性骨折，椎体压缩1/4

正确答案：E 您选择的答案：

第25题 椎体横突骨折多发生在

- A. C5~7
B. T5~7
C. T10~12
D. L2~4
E. L5, S1

正确答案：D 您选择的答案：

第26题 骨盆环由下列哪些结构构成

- A. 髌骨与骶尾骨
B. 耻坐骨与骶尾骨
C. 髌骨与骶尾骨
D. 髌骨与尾骨
E. 耻、坐骨与骶骨

正确答案：C 您选择的答案：

第27题 第十胸椎压缩性骨折合并脊髓损伤，损伤的脊髓是

- A. 胸段脊髓
B. 胸腰段脊髓
C. 腰段脊髓
D. 腰骶段脊髓
E. 骶段脊髓

正确答案：C 您选择的答案：

第28题 脊柱骨折造成脱位并脊髓半横切损伤，其损伤平面以下的改变，是

- A. 双侧肢体完全截瘫
B. 同侧肢体运动消失，双侧肢体深浅感觉消失
C. 同侧肢体运动和深感觉消失，对侧肢体痛温觉消失
D. 同侧肢体运动和痛温觉消失，对侧肢体深感觉消失
E. 同侧肢体痛温觉消失，对侧肢体运动及深感觉消失

正确答案：C 您选择的答案：

第29题 骶骨骨折时，最容易受损伤的神经是

- A. S1和S2
B. S3和S4
C. L4和L5
D. L2和L3
E. 股神经

正确答案：A 您选择的答案：

第30题 脊柱外伤时，关节突交锁是指

- A. 关节突完全骨折

- B. 关节突不完全脱位
 - C. 上关节突位于下一椎骨下关节突的前方
 - D. 下关节突位于下一椎骨上关节突的前方
 - E. 关节突骨折并伴脱位
- 正确答案：D 您选择的答案：

第31题 双侧耻骨上下枝骨折，无明显移位，哪种治疗方法最理想

- A. 蛙式石膏固定
 - B. 仅卧床休养即可
 - C. 骨盆悬吊牵引
 - D. 切开复位
 - E. 手法复位夹板固定
- 正确答案：B 您选择的答案：

第32题 颈椎压缩骨折合并脱位最先选择的治疗方法，是

- A. 颌枕带牵引
 - B. 手法复位，石膏固定
 - C. 颅骨牵引
 - D. 两桌复位法
 - E. 切开复位
- 正确答案：C 您选择的答案：

第33题 判断脊柱骨折是否伴有脊髓损伤，下列哪项诊断方便快捷

- A. X线片检查
 - B. CT检查
 - C. MRI检查
 - D. 腰椎穿刺行脑脊液检查
 - E. 系统的神经系统检查
- 正确答案：E 您选择的答案：

第34题 骨盆骨折最重要的体征，是

- A. 畸形
 - B. 反常活动
 - C. 局部压痛及间接挤压痛
 - D. 骨擦音及骨擦感
 - E. 肿胀及瘀斑
- 正确答案：C 您选择的答案：

第35题 哪种类型骨折常伴有严重的并发症

- A. 肋骨翼骨折伴肋前上棘骨折
 - B. 一侧耻骨上支骨折
 - C. 双侧耻骨上下支骨折
 - D. 骨盆边缘骨折
 - E. 髌臼骨折伴中心性脱位
- 正确答案：C 您选择的答案：

第36题 对压缩或移位较轻的颈椎骨折或脱位，行枕颌带牵引复位时，其牵引重量应为

- A. 1~2kg
 - B. 3~5kg
 - C. 6~7kg
 - D. 8~10kg
 - E. 11~12kg
- 正确答案：B 您选择的答案：

第37题 颈椎压缩骨折或脱位较轻的病人行枕颌带牵引复位满意者，用头颈胸石膏外固定，固定时间约为

- A. 1个月
 - B. 2个月
 - C. 3个月
 - D. 4个月
 - E. 5个月
- 正确答案：C 您选择的答案：

第38题 判断脊柱骨折脱位是否并发脊髓损伤，下列哪项检查最重要

- A. X线摄片
 - B. CT
 - C. MRI
 - D. 神经系统检查
 - E. 腰穿作奎肯试验及脑脊液生化检查
- 正确答案：D 您选择的答案：

第39题 颈椎骨折与脱位病人最首要而且有效的治疗措施是

- A. 颈托固定
 - B. 石膏固定
 - C. 枕颌带牵引
 - D. 颅骨牵引
 - E. 高压氧
- 正确答案：D 您选择的答案：

第40题 在脊髓损伤中，下列哪项表现是不可能出现的

- A. 四肢瘫痪

- B. 双上肢瘫痪
- C. 双下肢瘫痪
- D. 截瘫
- E. 节段性瘫痪

正确答案：E 您选择的答案：

第41题 在骨盆骨折中，下列哪种说法是不正确的

- A. 骨盆骨折的合并症常较骨折本身更为重
- B. 骨盆骨折产生的巨大血肿可沿腹膜后蔓延到肾区、膈下或肠系膜
- C. 腹膜后血肿可出现休克、腹痛、腹肌紧张等腹膜激惹症状
- D. 骨盆骨折合并膀胱损伤的可能性大于尿道损伤
- E. 如合并髂内血管损伤，病人常迅速出现休克或死亡

正确答案：D 您选择的答案：

第42题 脊柱骨折和脱位最基本的辅助检查是

- A. MRI 检查
- B. CT检查
- C. X线检查
- D. B超
- E. 椎管造影

正确答案：C 您选择的答案：

第43题 对于骨盆骨折合并尿道损伤及失血性休克患者的处理，顺序是

- A. 骨盆骨折—尿道损伤—休克
- B. 休克—尿道损伤—骨盆骨折
- C. 休克—骨盆骨折—尿道损伤
- D. 尿道损伤—休克—骨盆骨折
- E. 同时处理休克和尿道损伤—骨盆骨折

正确答案：B 您选择的答案：

第44题 颈椎压缩性骨折行颌枕吊带牵引复位时，合适的牵引重量是

- A. 0.5~1kg
- B. 1~2kg
- C. 2~6kg
- D. 6~8kg
- E. 8~10kg

正确答案：C 您选择的答案：

第45题 怀疑有骨盆骨折的病人急诊时首选的检查应该是

- A. 骨盆挤压分离试验
- B. 神经系统检查
- C. 测量生命体征
- D. 放射线检查
- E. B超检查

正确答案：D 您选择的答案：

第46题 骨盆骨折并腹膜后出血休克，经积极抢救未见好转时，应立即

- A. 结扎髂外动脉
- B. 结扎髂内动脉
- C. 结扎髂总动脉
- D. 髂内髂外动脉结扎
- E. 结扎髂内髂外动脉和静脉

正确答案：B 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第47题 脊柱损伤后，跟腱反射消失，膝腱反射正常，可能为脊髓哪一节段损伤

- A. S1以下
- B. S2以下
- C. L5以下
- D. L2以下
- E. Th12以下

正确答案：C 您选择的答案：

第48题 20岁，男性。夜间骑自行车，头朝下跌于壕沟，发生四肢不全瘫，x线片显示齿状突骨折伴半脱位，此时在治疗上最先采取的措施，是

- A. 石膏领固定
- B. 颅骨牵引固定
- C. 吊带牵引
- D. 环枕固定术
- E. 切开复位内固定

正确答案：B 您选择的答案：

第49题 男性患者，被重物砸伤后，体检：耻骨联合处压痛，挤压试验阳性，膀胱充盈，导尿管插入一定深度未见尿液流出，导尿管尖端见新鲜血液流出，此时应该考虑

- A. 导尿管插入方法不正确
- B. 患者根本就没有尿液
- C. 导尿管插入深度不足

D. 骨盆骨折合并膀胱损伤
E. 骨盆骨折合并尿道断裂
正确答案：E 您选择的答案：

第50题 男，30岁，骑自行车时不慎摔倒，出现四肢不全瘫痪，X线片示：齿状突骨折伴脱位，此时治疗首选

A. 石膏领固定
B. 颅骨牵引固定术
C. 吊带牵引
D. 环枕固定术
E. 切开复位内固定术
正确答案：B 您选择的答案：

第51题 男性，马车翻车时砸伤下腹部，查体：耻骨联合处压痛，挤压试验阳性，膀胱胀满，橡皮导尿管插入一定深度未引出尿液，导尿管尖端见血迹，此时应考虑

A. 导尿管插入深度不足
B. 导尿管插入方法不对
C. 导尿管阻塞
D. 骨盆骨折合并尿道断裂
E. 骨盆骨折合并膀胱损伤
正确答案：D 您选择的答案：

第52题 青年男性，1个月前从高处落下，当地医院体检时发现双下肢不全瘫痪，X线片提示：第一腰椎压缩性骨折，经Ommi paque脊髓造影时发现椎管内有不完整性梗阻，第一腰椎后缘压迫脊髓，此时因该采取的措施是

A. 双踝悬吊复位法
B. 椎板切除减压法
C. 两桌法复位
D. 椎管侧后方减压术
E. 手法复位，石膏外固定
正确答案：D 您选择的答案：

第53题 学生在训练时，倒立不稳，枕部触于垫上，出现双上肢麻木，活动无力，头稍歪向一侧，不敢转动。估计为何种损伤

A. 环椎前脱位
B. 环椎单侧半脱位
C. 枢椎齿突基底骨折
D. 环椎后弓骨折
E. 环椎后脱位
正确答案：B 您选择的答案：

第54题 双侧耻骨上下支骨折，无明显移位，哪种方法治疗更好

A. 手法复位夹板固定
B. 卧床休息
C. 蛙式石膏固定
D. 切开复位
E. 骨盆悬吊牵引
正确答案：B 您选择的答案：

第55题 脊柱损伤后，跟腱反射消失，膝腱反射正常存在，损伤的脊髓平面可能是

A. S1以下平面
B. S2
C. L5
D. L2
E. L1
正确答案：C 您选择的答案：

第56题 患者颈椎外伤截瘫，查体：双上肢屈肘位，屈肘动作存在，伸肘功能丧失，损伤部位是在

A. 2~3颈椎之间
B. 3~4颈椎之间
C. 4~5颈椎之间
D. 5~6颈椎之间
E. 6~7颈椎之间
正确答案：D 您选择的答案：

第57题 枢椎齿突基底部骨折，但无移位，环椎亦无移位。枕颌吊带牵引两周后，颈痛减轻，活动范围增加。3周后离床活动，6周后颈痛再次加剧，活动明显受限，并逐渐出现四肢无力与瘫痪，这种迟发性瘫痪的原因，是

A. 迟发性水肿压迫
B. 椎管内纤维质增生压迫
C. 脊髓血运障碍
D. 黄韧带增厚
E. 环椎迟发性前脱位
正确答案：E 您选择的答案：

第58题 一年轻患者，从敞篷卡车上摔下，枕部着地，颈部活动受限，下颈椎压痛明显，四肢迟缓性瘫痪，胸骨柄以下痛温觉消失，不能自行排尿，诊断考虑为

A. 颈部软组织损伤
B. 颈椎间盘突出症
C. 颈椎骨折脱位并脊髓损伤
D. 胸椎骨折并脊髓损伤
E. 颈椎骨折脱位并臂丛神经与腰骶丛神经损伤
正确答案：C 您选择的答案：

第59题 女性，20岁。因外伤致第4、5颈椎骨折并发颈髓损伤，四肢呈弛缓性瘫痪，高热40℃，持续数日不降，应采取何种降温方法

- A 口服A、P、C
- B 冬眠疗法
- C 使用抗生素
- D 物理降温
- E 以上都不是

正确答案：D 您选择的答案：

第60题 从马车上摔下，头后枕部着地，颈部活动受限，下颈椎压痛明显，四肢弛缓性瘫，躯干感觉平面在胸骨柄以下，痛、温觉消失，不能自行排尿，诊断首先考虑

- A 颈椎间盘突出症
- B 颈椎骨折脱位并颈髓损伤
- C 颈部软组织损伤
- D 颈椎骨折脱位并臂丛神经与腰骶丛神经损伤
- E 胸椎骨折并脊髓损伤

正确答案：B 您选择的答案：

第61题 男性，35岁。两个月前由高处跌落，发生第一腰椎压缩性骨折，双下肢不全瘫，Ommi paque脊髓造影发现有不全梗阻，脊髓被向后突出的第一腰椎后缘骨嵴压迫。此时应采用

- A 自身功能复位
- B 双踝悬吊复位
- C 椎板切除减压术
- D 桌法复位
- E 椎管侧后方减压术

正确答案：E 您选择的答案：

三、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第62-64题

建筑工人不慎坠楼，腰剧痛，双下肢感觉运动障碍，二便功能障碍

1. 现场搬运的正确方法

- A 平托或滚动法
- B 单人搂抱法
- C 双人搂抱法
- D 侧卧搬运法
- E 背驮法

2. 经X线平片检查，诊断为胸腰段屈曲型压缩骨折合并脊髓损伤。为进一步明确骨折片向椎管内的移位情况，下列哪项检查是最有价值的

- A MRI
- B CT
- C ECT
- D 脊髓造影
- E X线断层摄影

3. 除手术外，伤后早期最重要的治疗措施，是

- A 抗生素
- B 止痛剂
- C 甘露醇与大剂量糖皮质激素
- D 防止褥疮
- E 留置尿管

正确答案：ABC 您选择的答案：

第65-67题

马车从小腹压过，腰与骨盆区疼痛，休克，不能自行排尿，膀胱膨满，直肠指诊，指套上染有血迹

1. 正确的诊断是

- A 骨盆骨折
- B 骨盆骨折合并休克
- C 骨盆骨折合并休克与尿道损伤
- D 骨盆骨折合并休克，尿道与直肠损伤
- E 骨盆骨折合并膀胱破裂

2. 治疗措施的先后顺序，是

- A 抗休克，修复尿道、直肠损伤，处理骨折
- B 修复尿道、直肠损伤，处理骨折，抗休克
- C 抗休克，处理骨折，修复尿道、直肠损伤
- D 处理骨折，抗休克，修复尿道、直肠损伤
- E 处理骨折，修复尿道，直肠损伤，抗休克

3. 休克难以矫正时，应采取的最主要的措施是

- A 加快输血速度
- B 使用升压药物
- C 使用止血药物
- D 结扎髂内动脉
- E 结扎髂外动脉

正确答案：DAD 您选择的答案：

第68-72题

男，29岁，高处坠落2小时后送至医院，主诉胸背部疼痛，双下肢不能活动

1. 诊断时应首先考虑有以下哪种可能

- A. 颅脑损伤
 - B. 脊柱损伤
 - C. 双下肢骨折
 - D. 骨盆骨折
 - E. 腹部闭合性损伤
2. 此时首先应作以下哪项检查
- A. B超
 - B. 心电图
 - C. X线平片
 - D. 脑脊液穿刺检查
 - E. 腹穿

3. CT示胸11椎体爆裂骨折，椎体压缩1/2，椎管内有较大骨块，伴关节突交锁，最佳的治疗方案应是

- A. 手术减压，脊柱内固定术
- B. 两点法过伸复位，石膏背心固定
- C. 行椎板切除、椎管减压术
- D. 颅骨牵引和激素、脱水药物治疗
- E. 手法复位

4. 经正确的治疗5天后，截瘫恢复不理想，此时应需要注意的并发症是

- A. 椎管内进行性活动性出血
 - B. 腹主动脉损伤
 - C. 褥疮
 - D. 硬膜外粘连
 - E. 伤口感染
5. 若该病人手术半月后病情改善，双下肢肌力已恢复至3级以上，此时应采取哪种治疗方法
- A. 再次手术减压并扩大神经根管
 - B. 积极防治可能出现的并发症
 - C. 电针、理疗及功能锻炼治疗
 - D. 延长脱水药物及激素的使用时间
 - E. 行选择性神经后根切断术

正确答案：BCACC 您选择的答案：

第73-77题

青年男性患者，自高处坠落3小时后送入医院，自诉胸背部疼痛，双下肢不能活动。

1. 最有可能的诊断是

- A. 脊柱损伤
- B. 颅脑损伤
- C. 骨盆骨折
- D. 双下肢骨折
- E. 闭合性腹部损伤

2. 此时首先应做哪项检查

- A. SEP
- B. EKG
- C. X线平片
- D. EMG
- E. 脑脊液穿刺检查

3. CT显示胸11椎体爆裂性骨折，胸11椎体压缩1/2，椎管内有较大骨折块，同时伴有关节突交锁，合理的治疗方案是

- A. 手术减压，脊柱内固定术
- B. 手术切除相应椎板使脊髓减压
- C. 手法复位并行推拿治疗
- D. 颅骨牵引并使用激素及脱水药物
- E. 高低两点法过伸复位，石膏背心固定

4. 若经恰当处理1周后，双下肢功能恢复不理想，此时要注意的并发症是

- A. 硬膜外粘连
- B. 内固定器材断裂
- C. 胸主动脉损伤
- D. 椎管内活动性出血
- E. 褥疮

5. 1个月后患者截瘫症状明显改善，双下肢肌力达 级，后续治疗应该选用

- A. 积极防治可能出现的并发症
- B. 再次手术减压，扩大神经根管
- C. 延长脱水药物及激素的使用时间
- D. 理疗 + 功能锻炼
- E. 行选择性神经根切断术

正确答案：ACAEE 您选择的答案：

第78-81题

患者从高空坠落，臀部着地，出现腰与骨盆区疼痛，四肢湿冷，心率120次/分，血压90/60mmHg(12/8kPa)，膀胱充盈，排尿不能，直肠指检，可见指套上带血。

1. 正确的诊断是

- A. 骨盆骨折
- B. 骨盆骨折合并休克
- C. 骨盆骨折合并休克与尿道损伤
- D. 骨盆骨折合并休克，尿道损伤，直肠损伤
- E. 骨盆骨折合并休克，膀胱损伤

2. 治疗顺序是

- A. 处理骨折，修复尿道、直肠损伤，抗休克
- B. 处理骨折，抗休克，修复尿道、直肠损伤
- C. 抗休克，修复尿道、直肠损伤，处理骨折

- D. 修复尿道、直肠损伤，处理骨折，抗休克
 - E. 抗休克，处理骨折，修复尿道、直肠损伤
 - 3. 如果抗休克无效，血压进行性下降，应采取的紧急措施是
 - A. 使用大剂量的升压药
 - B. 使用大量的止血药
 - C. 加快输血速度
 - D. 阻断髂外动脉
 - E. 阻断髂内动脉
 - 4. 下列哪种说法错误
 - A. 注意观察腹部情况，以排除肠道的复合伤存在
 - B. 加强会阴部皮肤的护理，防止皮肤破溃感染
 - C. 重视全身情况，防止血压进一步下降
 - D. 在血压已经有效控制的情况下，为了减少皮下淤血，可切开软组织清除皮下积血
 - E. 注意尿量变化，防止多器官衰竭的发生
- 正确答案：DCED 您选择的答案：

第82-84题

男，23岁，高处坠落伤，右侧臀部着地，疼痛伴运动障碍并有休克表现

1. 首先考虑的诊断是
 - A. 软组织挫裂伤
 - B. 肾损伤
 - C. 骨盆骨折
 - D. 股骨颈骨折
 - E. 股骨粗隆间骨折
2. 在抗休克的同时，急需进行哪项检查
 - A. MRI
 - B. CT
 - C. X线
 - D. B超
 - E. 静脉肾盂造影
3. 在积极抗休克的同时，血压未能回升，可能的原因是
 - A. 软组织挫伤严重
 - B. 肾包膜下出血
 - C. 肝脾破裂
 - D. 腰大肌血肿形成
 - E. 剧烈疼痛刺激

正确答案：ACC 您选择的答案：

四、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第85-87题

- A. 骨牵引
 - B. 皮牵引
 - C. 手法复位及石膏外固定
 - D. 介入疗法(髂内动脉造影及栓塞)
 - E. 骨盆兜悬吊牵引法
 - 1. 髌臼骨折合并髌关节中心性脱位者，应采用何种治疗
 - 2. 骨盆骨折合并腹膜后出血，若经积极抢救未能使休克好转且血压继续下降，脉搏继续加快或渐微弱，可采用何种治疗
 - 3. 骨盆骨折伴有骨盆环破裂分离者，应采用何种治疗方法
- 正确答案：ADE 您选择的答案：

第88-90题

- A. 专门托扶伤员头部，沿纵轴向上略牵引，头颈随躯干一同缓慢搬移，放置木板上后，用折好的衣物放在颈部两侧固定
 - B. 两至三人托扶伤员躯干，使成一体搬动，避免躯干扭转，移至木板
 - C. 一人抬躯干，一人抬下肢，尽快送至医院作X线检查
 - D. 缓慢牵引受伤下肢，用夹板固定
 - E. 让伤者平卧，使受伤下肢处于伸直外旋位
 - 1. 男，25岁，车祸后，神清，呼吸稍困难，四肢麻木，活动差，急救搬运应采取的方法是
 - 2. 男，18岁，高坠伤，主诉腰背痛，双下肢活动力量差，急救搬运时应采取的方法是
 - 3. 男，28岁，车祸致左大腿剧痛、肿胀、成角畸形，急救搬运时应采取的方法是
- 正确答案：ABD 您选择的答案：

第91-93题

- A. 皮牵引
 - B. 骨牵引
 - C. 手法复位及石膏外固定
 - D. 骨盆兜垂吊牵引法
 - E. 介入疗法(髂内动脉造影及栓塞)
 - 1. 骨盆骨折伴有骨盆环破裂分离者，应该采用何种治疗方法
 - 2. 髌臼骨折合并髌关节中心性脱位者，应采用何种治疗
 - 3. 骨盆骨折合并腹膜后出血，经积极抗休克无效，血压进行性下降，应该采取的措施是
- 正确答案：DBE 您选择的答案：

第94-96题

- A. 立即窒息死亡
- B. 四肢全瘫

- C 上肢屈肘动作存在，伸肘及手的功能丧失，下肢瘫
- D 下肢痉挛性瘫
- E 下肢弛缓性瘫

- 1. 颈椎2~3骨折脱位合并脊髓严重损伤
- 2. 颈椎4~5骨折脱位合并脊髓损伤
- 3. 颈椎5~6骨折脱位合并脊髓损伤

正确答案：ABC 您选择的答案：

第97-99题

- A. 骨折部位垫厚枕，使脊柱过伸，1~2周后逐渐进行腰背肌锻炼
- B. 颅骨牵引，牵引重量3~5kg，必要时可增加到6~10kg
- C. 切开复位、内固定术
- D. 卧硬板床3个月，石膏背心固定后起床活动
- E. 两桌法过伸复位，复位后包石膏背心固定，鼓励伤员起床活动

- 1. 颈椎外伤后、X线片证实第5、6颈椎半脱位，治疗方法选用
- 2. 高坠伤，腰痛剧烈，X线片证实腰，压缩性骨折，椎体前部压缩约1/4，治疗方法选用
- 3. 车祸致不完全性瘫痪，X线片显示：胸，压缩性骨折，胸，前脱位约2mm，治疗方法选用

正确答案：BAC 您选择的答案：

习题集 外科学 下肢骨折

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 右股骨干上1/3骨折患者，其牵引治疗时的最好体位是

- A 水平牵引
- B 髋关节前屈位牵引
- C 内收位牵引
- D 外层位牵引
- E 大腿外旋外展，髋屈曲位牵引

正确答案：E 您选择的答案：

第2题 股骨颈骨折与股骨转子间骨折在临床表现中主要的鉴别依据是

- A 大转子上移的程度不同
- B 外旋畸形程度的不同
- C 患肢活动受限程度的不同
- D 骨折移位程度的不同
- E 好发年龄的不同

正确答案：B 您选择的答案：

第3题 较稳定的股骨颈骨折是

- A 外展型
- B 内收型
- C 头下型
- D 基底型
- E 粗隆间型

正确答案：A 您选择的答案：

第4题 引起足下垂的原因是

- A 腓总神经损伤
- B 胫神经损伤
- C 尺神经损伤
- D 腋神经损伤
- E 跟腱断裂

正确答案：A 您选择的答案：

第5题 股骨颈骨折有以下表现哪一项是不正确的

- A 患髋有压痛
- B Bryant三角底边增加
- C 患肢缩短
- D 大转子明显突出
- E 外旋畸形

正确答案：B 您选择的答案：

第6题 股骨干下1/3骨折后，引起远折端向后倾斜移位的原因是

- A 半膜肌的牵拉
- B 半腱肌的牵拉
- C 缝匠肌的牵拉
- D 腓肠肌的牵拉
- E 股二头肌的牵拉

正确答案：D 您选择的答案：

第7题 2岁小儿股骨干骨折，最好选用哪种治疗

- A 平衡皮牵引
- B 石膏绷带固定
- C 垂直悬吊皮牵引
- D 胫骨结节牵引
- E 切开复位内固定

正确答案：C 您选择的答案：

第8题 28岁男性，高处坠下时，左小腿肿胀，压痛，膝下8cm处成角畸形，小腿短缩，胫骨前侧有10cm，皮肤裂口，足背动脉搏动消失，正确的诊断

- A 左胫骨上1/3骨折伴静脉血管损伤
- B 左胫骨上1/3开放性骨折，伴动脉损伤
- C 左胫骨上1/3骨折伴胫前神经损伤
- D 左胫骨上1/3骨折伴骨筋膜室综合征
- E 左胫骨上1/3开放性骨折，伴胫后神经损伤

正确答案：B 您选择的答案：

第9题 下列何种股骨颈骨折最容易发生股骨头坏死

- A 股骨头下骨折
- B 经股骨颈骨折
- C 经基底部股骨颈骨折
- D 稳定性股骨颈骨折
- E 不完全移位的股骨颈骨折

正确答案：A 您选择的答案：

第10题 股骨颈的颈干角平均角度是

- A. 107°
- B. 127°
- C. 137°
- D. 97°
- E. 157°

正确答案：B 您选择的答案：

第11题 外伤后右髋屈曲内收内旋畸形，最可能．的初步诊断为

- A. 髋关节后脱位
- B. 髋关节前脱位
- C. 股骨颈骨折
- D. 股骨转子骨折
- E. 髋关节中心脱位

正确答案：A 您选择的答案：

第12题 外伤导致腓骨小头处骨折，伤后患足不能背伸，其原因是

- A. 胫前肌损伤
- B. 胫后肌损伤
- C. 腓总神经损伤
- D. 坐骨神经损伤
- E. 胫后神经损伤

正确答案：C 您选择的答案：

第13题 24岁男性，因车祸致开放性胫腓骨骨折，4小时后入院，急诊手术，手术的重点在于

- A. 胫腓骨折的复位和内固定
- B. 胫骨骨折的复位和内固定
- C. 腓骨骨折的复位和内固定
- D. 彻底清创，确保伤口一期愈合
- E. 骨牵引，待伤口二期愈合

正确答案：D 您选择的答案：

第14题 股骨上1／3骨折，近折片的移位方向，是

- A. 屈曲外展外旋位
- B. 屈曲内收内旋位
- C. 后伸外展外旋位
- D. 后伸外展内旋位
- E. 后伸内收内旋位

正确答案：A 您选择的答案：

第15题 成人新鲜股骨干闭合性横折患者，治疗时首选

- A. 切开复位内固定
- B. 手法复位，夹板固定
- C. 手法复位，髋人字石膏固定
- D. 皮牵引加小夹板固定
- E. 卧床制动休息

正确答案：A 您选择的答案：

第16题 在股骨干骨折髓内钉内固定指征中，说法错误的是

- A. 开放性骨折清创术后可同时行髓内钉固定
- B. 伴有多发性损伤者
- C. 保守治疗失败者
- D. 新生儿股骨干骨折不主张行髓内钉固定
- E. 老年人不宜行髓内钉固定治疗

正确答案：A 您选择的答案：

第17题 股骨头血液主要由哪几支血管供给

- A. 股骨干的滋养动脉升支
- B. 旋股内、外侧动脉的分支
- C. 股骨头圆韧带的小凹动脉
- D. 腹壁浅动脉的分支
- E. 阴部内外动脉

正确答案：B 您选择的答案：

第18题 右股骨下1/3骨折首选的牵引方法是

- A. 皮肤牵引
- B. 悬吊牵引
- C. 股骨髁上牵引
- D. 胫骨结节牵引
- E. 跟骨牵引

正确答案：D 您选择的答案：

第19题 股骨上1／3骨折，骨折近端的移位方向是

- A. 屈曲内收内旋位
- B. 屈曲外展外旋位
- C. 后伸内收内旋位
- D. 后伸外展外旋位
- E. 后伸外展内旋位

正确答案：B 您选择的答案：

第20题 下列哪处骨折好发骨筋膜室综合征

- A. 骨盆处骨折
- B. 股骨骨折
- C. 胫腓骨骨折
- D. 肱骨骨折
- E. 掌骨骨折

正确答案：C 您选择的答案：

第21题 股骨下1/3骨折后，远折端，向后倾斜移位，主要是由于

- A. 股二头肌的牵拉
- B. 腓肠肌的牵拉
- C. 半腱肌的牵拉
- D. 半膜肌的牵拉
- E. 缝匠肌的牵拉

正确答案：B 您选择的答案：

第22题 胫骨骨折常出现开放性骨折和粉碎性骨折，其主要原因是

- A. 暴力多是直接的且局部软组织少
- B. 胫骨的脆性较大
- C. 暴力间接的通过腓骨传导
- D. 因腓骨细小，缺乏对胫骨的支持
- E. 胫骨在解剖上多有变异

正确答案：A 您选择的答案：

第23题 患者外伤致腓骨小头处骨折，伤后患足不能背伸，其原因是

- A. 坐骨神经损伤
- B. 胫前肌损伤
- C. 胫后肌损伤
- D. 腓总神经损伤
- E. 胫后神经损伤

正确答案：D 您选择的答案：

第24题 股骨颈外展型骨折是指Pauwel角

- A. 小于 10°
- B. 小于 15°
- C. 小于 20°
- D. 小于 25°
- E. 小于 30°

正确答案：E 您选择的答案：

第25题 3岁幼儿股骨干骨折，哪种治疗方案比较好

- A. 平衡皮牵引
- B. 石膏绷带内固定
- C. 垂直悬吊皮牵引
- D. 切开复位内固定
- E. 胫骨结节皮牵引

正确答案：C 您选择的答案：

第26题 股骨颈的颈干角平均角度为

- A. 15°
- B. 20°
- C. 55°
- D. 90°
- E. 127°

正确答案：E 您选择的答案：

第27题 成人股骨颈的主要血液供应来源是

- A. 股圆韧带的小凹动脉
- B. 股骨干的滋养动脉升支
- C. 旋股内外侧动脉的分支
- D. 旋髂动脉
- E. 阴部内外动脉

正确答案：C 您选择的答案：

第28题 下列哪种股骨颈骨折最容易发生股骨头坏死

- A. 头下骨折
- B. 经股骨颈骨折
- C. 经基底部骨折
- D. 不完全移位的股骨颈骨折
- E. 稳定型股骨颈骨折

正确答案：A 您选择的答案：

第29题 右髌外伤后患肢呈 55° 外旋畸形，最可能的诊断是

- A. 股骨上段骨折
- B. 股骨颈骨折
- C. 髌关节前脱位
- D. 股骨转子间骨折
- E. 髌臼骨折

正确答案：B 您选择的答案：

第30题 70岁平素健康男性患者，股骨头下骨折，有移位，较恰当的治疗是

- A 三刃行内固定
- B 粗隆间截患术
- C 皮牵引
- D 人工股骨头置换术
- E 不需特殊治疗，卧床休息

正确答案：D 您选择的答案：

第31题 在股骨颈骨折治疗的过程中，下列哪项是不正确的

- A. 无明显移位的外展“嵌插”型骨折，可用持续皮牵引6~8周
- B. 内收骨折或有移位的股骨颈骨折，可先牵引，7~12日内进行内固定
- C. 65岁以上病人头下型股骨颈骨折可作人工股骨头置换术
- D. 儿童和青壮年的股骨颈骨折尽量不行手术治疗
- E. 陈旧性股骨颈骨折不愈合者可行转子间截骨术

正确答案：D 您选择的答案：

第32题 股骨颈骨折各类型中预后最好的是

- A. 头下骨折
- B. 经股骨颈骨折
- C. 基底骨折
- D. 内收骨折
- E. 外展骨折

正确答案：C 您选择的答案：

第33题 在股骨颈骨折治疗的过程中，下列哪项说法不正确

- A. 无明显移位的外展“嵌插”型骨折，可用持续皮牵引6~8周
- B. 内收骨折或有移位的股骨颈骨折，可先牵引，7~12日内进行内固定
- C. 65岁以上病人头下型股骨颈骨折可行人工股骨头置换术
- D. 儿童和青壮年的股骨颈骨折尽量不行手术治疗
- E. 陈旧性股骨颈骨折不愈合者可行转子间截骨术

正确答案：D 您选择的答案：

第34题 下肢骨折引起整个肢体极度外旋位时，最可能的损伤，是

- A 股骨颈骨折
- B 股骨转子间骨折
- C 股骨干骨折
- D 股骨髁上骨折
- E 髋关节中心型脱位

正确答案：B 您选择的答案：

第35题 股骨颈外展型骨折是指Pauwel角

- A. 小于10°
- B. 小于20°
- C. 小于30°
- D. 小于40°
- E. 小于50°

正确答案：C 您选择的答案：

第36题 股骨头血液供给的主要来源，是

- A 股骨干的滋养动脉升支
- B 肌骨头圆韧带的小凹动脉
- C 旋股内、外侧动脉的分支
- D 腹壁下动脉的分支
- E 腹壁浅动脉的分支

正确答案：C 您选择的答案：

第37题 较易发生骨折后骨不连的骨折是

- A. 骨盆坐骨支处骨折
- B. 股骨干骨折
- C. 掌骨骨折
- D. 肱骨骨折
- E. 胫腓骨中段骨折

正确答案：E 您选择的答案：

第38题 股骨颈骨折好发于

- A 儿童
- B 青年人
- C 成年人
- D 老年人
- E 无年龄差别

正确答案：D 您选择的答案：

第39题 股骨转子间骨折与股骨颈骨折临床主要不同点是

- A 肢体明显短缩
- B 功能严重丧失
- C 肿胀不明显
- D 骨摩擦音，骨擦感不明显
- E 远折骨折段处于极度外旋位

正确答案：E 您选择的答案：

第40题 股骨干骨折的患者切开复位内固定术后一周，进行功能锻炼的指导原则为

- A. 患侧可作股四头肌舒缩活动
- B. 患侧髋关节应加大活动幅度
- C. 应加大患侧膝, 关节活动以防止粘连
- D. 扶双拐下地锻炼
- E. 此时患肢避免作任何活动

正确答案: A 您选择的答案:

第41题 在股骨干骨折髓内钉内固定手术指征中, 下列哪项是错误的

- A. 伴有多发性损伤者
- B. 伴有股动脉损伤而需要修补者
- C. 老年病人不宜卧床过久者
- D. 保守治疗失败者
- E. 新生儿股骨干骨折伴明显移位者

正确答案: E 您选择的答案:

二、A2型题: 每一道考题是以一个小案例出现的, 其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第42题 25岁男性, 右股骨干骨折已一年半, 目前仍有短缩畸形和反常活动, X线片示, 两骨折端已被硬化骨封闭, 目前应采取的治疗

- A. 手法复位, 牵引固定
- B. 手法复位, 石膏外固定
- C. 加强营养, 促进骨愈合
- D. 加强功能锻炼
- E. 手术切除硬化骨, 植骨加钢板固定, 加牢固外固定

正确答案: E 您选择的答案:

第43题 男, 70岁, 摔伤后右髋关节处疼痛, 入院后行X线片示 外展型嵌插型股骨颈骨折, 正确的治疗方法是

- A. 夹板固定
- B. 髋人字石膏外固定
- C. 立即行人工股骨头置换术
- D. 皮牵引6~8周后, 三刃钉内固定
- E. 持续皮牵引固定6~8周

正确答案: E 您选择的答案:

第44题 青年男性, 右大腿刀砍伤1小时入院, 患者烦躁不安。体检: 心率110次/分, 唇发绀, 血压90/60mmHg(12/8kPa), 右足发凉, 足背动脉消失, 股骨下段可见骨折端突出于皮肤, 可能的诊断是

- A. 右股骨下段骨折伴休克
- B. 右股骨下段开放性骨折
- C. 右股骨下段开放性损伤伴股动脉损伤
- D. 右股骨下段开放性骨折伴坐骨神经损伤
- E. 右股骨下段开放性骨折伴休克

正确答案: E 您选择的答案:

第45题 男, 23岁, 车祸后3小时入院。体检: 右大腿中段明显肿胀, 明显移位畸形, 皮温高于对侧, 体温39, 白细胞正常, 最可能的诊断

- A. 右大腿软组织化脓性感染
- B. 右大腿血肿
- C. 右股骨干骨折
- D. 右大腿软组织挫伤
- E. 右股骨骨髓炎

正确答案: C 您选择的答案:

第46题 60岁, 女性。一年前因股骨颈骨折, 行三刃钉固定术, 髋活动仍有疼痛, x线片示股骨头密度增高, 纹理不清, 应考虑为

- A. 化脓性关节炎
- B. 创伤性关节炎
- C. 股骨头缺血发生坏死
- D. 老年性退行性关节炎
- E. 关节结核

正确答案: C 您选择的答案:

第47题 胫腓骨骨折后, 创口纵长10cm, 位于小腿内前方, 肿胀严重, 张力大, 钢板内固定后比较好的闭合方法是

- A. 敞开伤口, 准备延期缝合
- B. 开放换药, 直到伤口自愈
- C. 直接缝合伤口
- D. 两侧做减张切口, 缝合原创口
- E. 两侧做减张切口, 缝合原创口, 减张切口处, 游离植皮覆盖

正确答案: E 您选择的答案:

第48题 右大腿被撞伤, 下1/3向后成角, 局部明显肿胀, 不能扪及足背动脉搏动, 足趾发凉, 最大的可能是

- A. 软组织挫伤
- B. 血肿
- C. 股骨下1/3骨折伴股动脉损伤
- D. 股骨下1/3骨折
- E. 股动脉损伤

正确答案: C 您选择的答案:

第49题 男性青年, 因车祸致胫腓骨中上1/3处开放性粉碎性骨折, 行彻底清创术, 摘除所有的粉碎的骨片, 术后行

牵引治疗8个月后，骨折仍未愈合，其最可能的原因是

- A 骨折处血液供应差
- B 伤肢固定不确切
- C 清创时摘除了过多的碎骨片
- D 功能锻炼不够
- E 未做内固定

正确答案：C 您选择的答案：

第50题 胫腓骨骨折，行切开复位钢板内固定，手术结束时，因肿胀重，张力大，闭合创口困难，此时，闭合创口的最佳方法是

- A 尽力直接缝合
- B 暂不缝合，做延期缝合
- C 开放换药，直到愈合
- D 两侧做减张切口，缝合原创口
- E 两侧做减张切口，缝合原创口，减张切口处，游离植皮覆盖

正确答案：E 您选择的答案：

第51题 女性，70岁。下台阶时摔伤髌部，查体右下肢短缩3cm，足外旋45°，髌部叩压痛明显，旋转痛阳性髌部无明显肿胀，该患最可能的诊断是

- A 右股骨干骨折
- B 右髌骨骨折
- C 右髌脱位
- D 右股骨颈骨折
- E 右粗隆间骨折

正确答案：D 您选择的答案：

第52题 男，70岁，10个月前因股骨颈骨折，行三刃钉固定术，髋关节活动仍有疼痛，X线片示股骨头密度增高，纹理不清，应考虑为

- A 老年退行性关节炎
- B 化脓性关节炎
- C 创伤性关节炎
- D 髋关节骨性关节炎
- E 关节结核

正确答案：C 您选择的答案：

第53题 24岁男性，3小时前车祸致左股骨上段骨折，骨端外露，X线片示为小斜折，此时该患的最佳治疗是

- A 清创缝合，夹板固定
- B 清创，骨折复位，髓针内固定加外固定
- C 清创缝合，骨折待二期处理
- D 清创缝合，石膏固定
- E 清创缝合，手法复位，夹板固定

正确答案：B 您选择的答案：

第54题 11岁小孩，踢球时被人踢伤左腿。体检：左小腿下1/3腓侧有压痛，局部肿胀，明显畸形，可闻及骨摩擦音，该患者步行入院，诊断最大可能是

- A 胫骨骨折
- B 左小腿软组织损伤
- C 胫腓骨闭合性骨折
- D 骨筋膜室综合征
- E 腓骨闭合性骨折

正确答案：E 您选择的答案：

第55题 男，20岁，骑车被撞伤2小时入院。体检：神志清楚，左小腿肿胀、压痛，左膝下7cm处畸形，表现为左小腿短缩、重叠，皮肤破裂口长11cm，左足发凉，左侧足背动脉搏动消失，最可能的诊断是

- A 左胫骨上1/3骨折并左腘动脉损伤
- B 左胫骨上1/3骨折并左胫后动脉损伤
- C 左胫骨上1/3骨折并左胫前动脉损伤
- D 左小腿骨折合并血管损伤
- E 左胫骨骨折合并骨筋膜室综合征

正确答案：C 您选择的答案：

第56题 男，23岁，右股骨中上1/3处粉碎性骨折，行彻底清创术，去除所有的碎骨片，术后行牵引治疗1年，骨折仍未愈合，以下哪项不是导致骨不连的原因

- A 骨折处血液供应差
- B 清创时剥离过多的骨膜
- C 清创时摘除过多的碎骨片
- D 伤肢固定不确切
- E 功能锻炼不够

正确答案：E 您选择的答案：

第57题 男，60岁，外伤后右股骨颈骨折Garden Ⅱ型，下列哪种治疗是错误的

- A 闭合复位+三翼钉内固定
- B 闭合复位+螺纹钉内固定
- C 切开复位+三翼钉内固定
- D 人工股骨头置换术
- E 闭合复位+石膏外固定

正确答案：E 您选择的答案：

第58题 76岁老人，平素健康，跌倒后，致股骨头下型骨折有移位，选择哪种治疗最合适

- A. 皮牵引治疗
- B. 髌人字石膏固定
- C. 骨牵引治疗
- D. 股骨粗隆间截骨术
- E. 人工股骨头置换术

正确答案：E 您选择的答案：

第59题 女，20岁，2小时后外伤导致左股骨上段骨折，呈二度骨折，X线片显示斜行骨折，合适的治疗方法是

- A. 清创缝合，夹板固定
- B. 清创缝合，石膏固定
- C. 清创缝合，骨折待二期处理
- D. 清创，骨折复位，髓针内固定加外固定
- E. 清创缝合，手法复位，夹板固定

正确答案：D 您选择的答案：

第60题 74岁，男性，跌倒后致股骨头下型骨折有移位，选择哪种治疗最合适

- A. 骨牵引治疗
- B. 皮牵引治疗
- C. 髌人字石膏固定
- D. 股骨粗隆间截骨术
- E. 人工股骨头置换术

正确答案：E 您选择的答案：

第61题 青年男性，骑自行车跌倒，左小腿下1/3腓侧有压痛，局部肿胀，可闻骨擦音，该患步行到医院，其诊断最大可能是

- A. 腓骨闭合性骨折
- B. 胫腓骨闭合性双折
- C. 胫骨骨折
- D. 左小腿软组织损伤
- E. 左小腿下1/3软组织挫伤

正确答案：A 您选择的答案：

第62题 26岁，男性入院前2小时，被他人用斧砍伤致股骨下段骨折，来院查体足背动脉触不到，足苍白，发凉，血压测不到，正确的诊断是

- A. 股骨下段开放性骨折
- B. 股骨下段骨折伴休克
- C. 股骨下段开放性骨折，股动脉损伤伴休克
- D. 股骨下段开放性损伤伴股动脉损伤
- E. 股骨下段开放性骨折伴休克

正确答案：C 您选择的答案：

第63题 男，28岁，高处跌伤1小时，神清，左小腿肿胀、压痛，左膝下8cm处短缩畸形，皮肤破裂口长约10cm，足背动脉搏动消失，正确的诊断应是

- A. 胫骨上1/3骨折并胫前动脉损伤
- B. 胫骨上1/3骨折并腘动脉损伤
- C. 胫骨1/3骨折并胫后动脉损伤
- D. 小腿骨折并血管损伤
- E. 胫骨骨折并骨筋膜室综合征

正确答案：A 您选择的答案：

第64题 女，54岁，右股骨颈骨折行三翼钉内固定后5年，右髋疼痛跛行1年，最可能的病变是

- A. 骨折未愈合
- B. 股骨头坏死
- C. 巴创伤性关节炎
- D. 髋关节感染
- E. 髋关节脱位

正确答案：B 您选择的答案：

第65题 55岁男性，右大腿被汽车撞伤一天，中段明显肿胀，压痛，向外成角畸形，皮温高于对侧，体温38℃，白细胞正常，最可能的诊断

- A. 右股骨骨髓炎
- B. 右大腿软组织化脓感染
- C. 右腿血肿
- D. 右股骨干骨折
- E. 右大腿软组织挫伤

正确答案：D 您选择的答案：

第66题 某老年人跌倒后，右髋疼痛，步行到医院，x线片示外展型嵌插型股骨颈骨折，正确的治疗方法是

- A. 持续皮牵引固定6~8周
- B. 皮牵引6~8周后，三刃钉内固定
- C. 立即手术行三刃钉内固定
- D. 髌人字石膏固定
- E. 夹板固定

正确答案：A 您选择的答案：

三、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第67-69题

男性，70岁。下楼时不慎摔伤右髌部，查体右下肢短缩。外旋50°畸形，右髌肿胀不明显，但有叩痛

1. 该患最可能的诊断，是

- A 右髌后脱位
- B 右髌前脱位
- C 右股骨颈骨折
- D 右粗隆间骨折
- E 右髌软组织损伤

2. 为证实诊断首先需要的检查，是

- A 普遍X线片
- B CT检查
- C MRF检查
- D 核骨扫描
- E 关节造影

3. 该患最易发生的并发症，是

- A 脂肪检查
- B 坐骨神经损伤
- C 髌内翻畸形
- D 股骨头缺血性坏死
- E 髌关节周围创伤性骨化

正确答案：CAD 您选择的答案：

第70-72题

女，28岁，不慎从高处跌落，半小时急送医院后查体，神清、腹痛、右大腿畸形伴疼痛

1. 医生应首先进行哪方面检查

- A. 右股部有无反常活动
- B. 右股部有无骨擦音或骨擦感
- C. 生命体征的检查
- D. 诊断性腹腔穿刺
- E. 检查胫前、后动脉的搏动情况

2. 若病人的一般情况尚可，应该对该病人进行如何处理

- A. 行急诊下肢手术
- B. 密切观察病人腹部情况及全身情况变化
- C. 急诊行剖腹探查术
- D. 密切观察病情的同时对右下肢进行简单的外固定
- E. 探查腘动脉是否损伤，以便修复

3. 若病人最后诊断是右股骨下1/3螺旋骨折，骨盆骨折伴轻度移位，3天后病人腹部情况完全改善，生命体征稳定，但右足背动脉搏动减弱，此时应采取哪种治疗方法

- A. 右股骨切开复位内固定+血管探查术
- B. 手法复位+石膏托外固定
- C. 右股骨行垂直悬吊牵引
- D. 外固定支架固定
- E. 探查血管后石膏管形外固定

正确答案：CDA 您选择的答案：

第73-74题

30岁女性，半小时前从高处坠下，右股骨下端肿痛，腹部疼痛，查体：神智淡漠，股骨下端有成角畸形

1. 该患应首先检查哪项

- A 右股骨下端有无反常活动
- B 右股骨下端有无骨擦音
- C 生命体征的检查
- D 诊断性腹腔穿刺
- E 检查有无足背动脉搏动

2. 该患最后诊断为右股骨下1/3斜折，骨盆坐骨支及耻骨支骨折，3天后患者腹部症状消失，生命体征平衡，但出现右足背动脉搏动弱，足发凉，色苍白，此时应采了哪种治疗

- A 手法复位，石膏外固定
- B 切开复位，内固定加探查血管
- C 手法复位、夹板固定
- D 探查血管后，石膏外固定
- E 继续观察

正确答案：CB 您选择的答案：

四、A4型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第75-77题

女，25岁，高处落地后2小时入院，诉腹痛、左髌关节疼痛。体检：神志清楚，左股骨畸形。

1. 入院后接诊医生应该首先进行的检查是

- A. 诊断性腹腔穿刺
- B. 行脑部CT
- C. 行胸部X线
- D. 检查左股部有无反常活动
- E. 全身状况全面综合的体检

2. 若病人的一般情况尚可，应该对病人进行的处理是

- A. 行急诊下肢手术
- B. 急诊行剖腹探查
- C. 探查腘动脉是否受损，以便修复
- D. 密切观察病情的同时对左下肢进行简单的固定
- E. 密切观察病人的腹部情况及全身情况变化

3. 若患者最后诊断为：左股骨下1/3螺旋形骨折，左侧坐骨支及耻骨支骨折，2天观察期间，患者生命体征平稳，腹痛完全消失，左足足背动脉明显减弱，下一步应该采取的措施是

- A. 手法复位+石膏托外固定
- B. 外固定架固定
- C. 探查血管后石膏管型外固定
- D. 右股骨行垂直悬吊
- E. 右股骨切开复位内固定

正确答案：EDE 您选择的答案：

第78-82题

男，75岁，摔倒后右髋部着地，起身行走后感觉右髋关节处疼痛，入院后体检：测右侧踝关节到同侧大转子间的距离较左下肢短缩，右下肢轻度外旋，右髋关节处无明显肿胀畸形，右下肢纵向叩击痛明显。

1. 该患者可能的诊断是

- A. 右髋前脱位
- B. 右髋后脱位
- C. 右粗隆间骨折
- D. 右髋软组织损伤
- E. 右股骨颈骨折

2. 有助于诊断经济而方便的辅助检查是

- A. X线片检查
- B. MRI检查
- C. 核素扫描
- D. 关节造影
- E. CT检查

3. 合理的治疗措施是

- A. 夹板固定
- B. 髋人字石膏外固定
- C. 立即行人工股骨头置换术
- D. 皮牵引6~8周后，三刃钉内固定
- E. 持续皮牵引固定后6~8周

4. 以下哪项并发症在该患者治疗过程中极少发生

- A. 褥疮
- B. 坠积性肺炎
- C. 关节僵硬
- D. 脂肪栓塞
- E. 骨化性肌炎

5. 若患者术后2年出现同侧髋关节疼痛，关节囊空虚，患肢呈弹性固定，可能出现的并发症是

- A. 创伤性关节炎
- B. 股骨头缺血坏死
- C. 髋关节结核
- D. 人工股骨头脱位
- E. 急性化脓性髋关节炎

正确答案：EACDD 您选择的答案：

五、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第83-85题

- A. 手法复位石膏外固定
- B. 闭合复位外固定支架固定
- C. 持续性颅骨牵引
- D. 内固定持续皮牵引
- E. 切开复位内固定

1. 右桡骨远端骨折，首选的治疗方案是

2. 颈5椎体骨折合并2度前脱位首选的治疗方案是

3. 三踝骨折，伴下胫腓联合分离，关节面错位不平，首选治疗方案是

正确答案：ACE 您选择的答案：

第86-88题

- A. 股骨粗隆间骨折
- B. 股骨颈骨折
- C. 股骨髁上骨折
- D. 股骨上1/3骨折
- E. 股骨上中段骨折

1. 骨折近端向后倾斜移位

2. 下肢短缩，外展，极度外旋位

3. 骨折远端向后倾斜移位

正确答案：DAC 您选择的答案：

第89-91题

- A. 股骨颈骨折
- B. 股骨粗隆间骨折
- C. 股骨上1/3骨折
- D. 股骨上中段骨折
- E. 股骨髁上骨折

1. 骨折近折段外展，外旋屈曲移位

2. 远折段向后倾斜移位

3. 下肢短缩，外展，极度外旋位

正确答案：CEB 您选择的答案：

第92-93题

A 切开复位内固定

B 闭合复位外固定支架固定

C 悬吊牵引

D 骨牵引

E 手法复位，石膏外固定

1. 75岁老人，跌倒手掌着地，致桡骨下端骨折

2. 2岁小儿外伤致股骨干骨折

正确答案：EC 您选择的答案：

第94-96题

A 畸形愈合

B 筋膜室综合征

C 感染

D 休克

E 股骨头坏死

1. 股骨颈骨折的并发症

2. 股骨颈粗隆间骨折的并发症

3. 骨盆骨折的并发症

正确答案：EAD 您选择的答案：

习题集 外科学 上肢骨折

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 Co es骨折远段的典型移位，是

- A 远侧端向尺侧移位
- B 近侧端向背侧移位
- C 远侧端向背侧移位
- D 近侧端向尺侧移位
- E 远侧端向桡侧移位

正确答案：C 您选择的答案：

第2题 锁骨骨折可发生的合并损伤，是

- A 颈2，3神经根
- B 胸锁乳突肌
- C 副神经损伤
- D 膈神经损伤
- E 臂丛神经损伤

正确答案：E 您选择的答案：

第3题 科雷(Co es)骨折，发生在

- A 桡骨近端
- B 桡骨干
- C 桡骨的任何部位
- D 尺骨的远端
- E 桡骨的远端

正确答案：E 您选择的答案：

第4题 肱骨中段骨折，为粉碎性骨折，选择哪种治疗方法为好

- A 骨牵引治疗
- B 髓内针固定
- C 加压钢板固定
- D 普通钢板固定
- E 手法复位，夹板固定

正确答案：E 您选择的答案：

第5题 肱骨髁上骨折，有尺侧侧方移位，未能矫正时，最常见的后遗症

- A 肘关节后脱位
- B 尺神经损伤
- C 肘内翻畸形
- D 肘关节前脱位
- E 前臂缺血性肌挛缩

正确答案：C 您选择的答案：

第6题 肱骨上1 / 3骨折，骨折线在三角肌止点以上，远位骨折段移位，主要是由于

- A 胸大肌牵拉
- B 背阔肌牵拉
- C 大圆肌牵拉
- D 三角肌，喙肱肌，肱二头肌，肱三头肌牵拉
- E 肱桡肌牵拉

正确答案：D 您选择的答案：

第7题 锁骨骨折比较多见的并发症是

- A 气胸
- B 副神经损伤
- C 膈神经损伤
- D 胸锁乳突肌的损伤
- E 颈2，3神经根损伤

正确答案：A 您选择的答案：

第8题 锁骨骨折的常见表现为

- A 局部骨摩擦音
- B 局部异常活动
- C 局部淤血
- D 局部肿胀
- E 局部可以触及骨折端

正确答案：E 您选择的答案：

第9题 伸直型肱骨髁上骨折的断端最常见的移位方向是

- A 远折端向后移位
- B 近侧端向后移位
- C 远折端向前移位
- D 近折端向桡侧移位
- E 近折端向尺侧移位

正确答案：A 您选择的答案：

第10题 桡骨下端骨折下列哪项是错误的

- A 老年人多见

B. 桡骨下端血运丰富
C. 常合并下尺桡关节脱位
D. 多为闭合性骨折
E. 均为“银叉”畸形
正确答案：E 您选择的答案：

第11题 肱骨中下1/3骨折，最易发生的并发症是

A. 肱动脉损伤
B. 正中神经损伤
C. 尺神经损伤
D. 桡神经损伤
E. 肱二头肌断裂伤
正确答案：D 您选择的答案：

第12题 Colles骨折，最有诊断意义的体征

A. 局部肿胀
B. 典型畸形
C. 局部压痛
D. 反常活动
E. 手功能受限
正确答案：B 您选择的答案：

第13题 锁骨骨折时下列哪项是错误的

A. 成人多为短斜骨折
B. 多由间接暴力引起
C. 远端向上移位
D. 损伤臂丛神经的机会较少
E. 可有重叠移位
正确答案：C 您选择的答案：

第14题 Colles骨折的典型移位方向是

A. 向桡侧及背侧
B. 向尺侧及背侧
C. 向桡侧及掌侧
D. 向尺侧及掌侧
E. 向桡、尺侧之间
正确答案：A 您选择的答案：

第15题 锁骨骨折常用的治疗方法是

A. 手法复位，夹板固定
B. 手法复位，石膏外固定
C. 牵引治疗
D. 切开复位内固定
E. 手法复位，横8字绷带固定
正确答案：E 您选择的答案：

第16题 Colles骨折，比较少见的现象是

A. 合并尺骨茎突骨折
B. 合并腕三角软骨盘破裂
C. 骨折不愈合
D. 合并下尺桡关节脱位
E. 骨折畸形愈合
正确答案：C 您选择的答案：

第17题 肘关节的正常提携角为

A. 0°
B. 10°~20°
C. 30°~50°
D. 60°~75°
E. 120°~130°
正确答案：B 您选择的答案：

第18题 治疗肱骨髁上骨折时，应重点防治的畸形是

A. 向前成角畸形
B. 肘外翻畸形
C. 向后成角畸形
D. 肘内翻畸形
E. 旋转畸形
正确答案：D 您选择的答案：

第19题 锁骨骨折常用的治疗方法，是

A. 切开复位，内固定
B. 手法复位，横8字绷带固定
C. 牵引治疗
D. 手法复位，夹板固定
E. 手法复位，石膏外固定
正确答案：B 您选择的答案：

第20题 伸直型肱骨髁上骨折，常见的并发症是

A. 肱骨下端缺血性坏死

- B 血管神经损伤
- C 骨折局部感染
- D 脂肪栓塞
- E 损伤性休克

正确答案：B 您选择的答案：

第21题 肱骨髁上骨折，最易损伤

- A 肱二头肌
- B 肱三头肌
- C 肱动，静脉
- D 肌皮神经
- E 桡神经

正确答案：C 您选择的答案：

第22题 肱骨干中、下1/3骨折易损伤

- A 正中神经
- B 尺神经
- C 桡神经
- D 腋神经
- E 肌皮神经

正确答案：C 您选择的答案：

第23题 伸直型肱骨髁上骨折，常见的并发症是

- A 神经血管的损伤
- B 肱骨下段缺血坏死
- C 坠积性肺炎
- D 脂肪栓塞
- E 骨折局部感染

正确答案：A 您选择的答案：

第24题 Colles骨折，最有诊断意义的体征是

- A 局部肿胀
- B 局部压痛
- C 反常活动
- D 典型畸形
- E 手功能受限

正确答案：D 您选择的答案：

第25题 以下哪一结构不是在肱骨尺侧神经血管鞘里走行

- A 正中神经
- B 桡神经
- C 尺神经
- D 肱动脉
- E 肱静脉

正确答案：B 您选择的答案：

第26题 反科雷(Colles)骨折(Smith骨折)的典型移位，是

- A 远侧端向掌侧移位
- B 远侧端向尺侧移位
- C 远侧端向桡侧移位
- D 近侧端向掌侧移位
- E 近侧端旋转移位

正确答案：A 您选择的答案：

第27题 伸直型肱骨髁上骨折的移位方向是

- A 远端向前
- B 远端向后
- C 远端向桡侧
- D 近端向尺侧
- E 远端向尺侧

正确答案：B 您选择的答案：

第28题 在治疗肱骨髁上骨折时，最应防止出现的畸形是

- A 向前成角畸形
- B 肘内翻畸形
- C 肘外翻畸形
- D 旋转畸形
- E 向后成角畸形

正确答案：B 您选择的答案：

第29题 Colles骨折发生在

- A 桡骨近端
- B 桡骨干
- C 桡骨的任何部位
- D 尺骨的远端
- E 桡骨的远端

正确答案：E 您选择的答案：

第30题 肱骨髁上骨折，骨折向尺侧移位，如矫正不完全，可能遗留的后遗症是

- A 尺神经损伤

- B. 肘关节后脱位
- C. 肘关节前脱位
- D. 肘内翻畸形
- E. 肘关节骨化性肌炎

正确答案：D 您选择的答案：

第31题 肱骨中段粉碎性骨折，选用哪种手术方法较好

- A. 加压钢板固定
- B. 髓内针固定
- C. 手法复位，夹板固定
- D. 普通钢板固定
- E. 骨牵引治疗

正确答案：C 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第32题 患者肱骨中段骨折已6个月，局部有异常活动，x线片对位对线良好，但仍有骨折线，骨痂极少，骨端有硬化现象，采用何种治疗为宜

- A. 继续小夹板固定
- B. 胸肩肱石膏外固定
- C. 钢板内固定
- D. 钢板内固定+植骨
- E. 钢板内固定+植骨+石膏外固定

正确答案：E 您选择的答案：

第33题 8岁男孩，右肘关节外伤，当地拍x线片诊断肱骨髁上骨折，经两次手法复位未成功，来院时为伤后48小时，查体右肘关节半屈位，肿胀较重，压痛明显，手指活动障碍，桡动脉搏动弱，手指凉，麻木，应诊断为肱骨髁上骨折合并

- A. 广泛软组织挫伤
- B. 主要静脉损伤
- C. 肱动脉损伤
- D. 肌肉断裂伤
- E. 正中、尺、桡神经损伤

正确答案：C 您选择的答案：

第34题 男性，26岁。左上肢外层位跌倒；手掌着地，当即左肩肿痛。查体：左肩部包满，局部稍下方凹陷有明显压痛，患肩活动障碍，最可能的诊断

- A. 左肩关节前脱位
- B. 左肩关节后脱位
- C. 左肩软组织损
- D. 肱骨外科颈骨折
- E. 肱骨外科颈骨折合并关节脱位

正确答案：D 您选择的答案：

第35题 10岁小孩，右肘关节外伤，外院X线片示：肱骨髁上骨折，在外院两次手法复位失败，伤后35小时入院。体检：右肘关节半屈位，肿胀较严重，压痛明显，手指活动障碍，桡动脉搏动减弱，手指发凉，感觉麻木，诊断为

- A. 肱骨髁上骨折合并广泛软组织损伤
- B. 肱骨髁上骨折合并主要静脉损伤
- C. 肱骨髁上骨折合并肱动脉损伤
- D. 肱骨髁上骨折合并肌肉断裂伤
- E. 肱骨髁上骨折合并正中、尺、桡神经损伤

正确答案：E 您选择的答案：

第36题 青年男性，因车祸导致右上臂外伤。体检：局部肿胀，压痛。畸形，反常活动并可触及骨摩擦感，垂腕且各掌指关节不能背伸，最可能的诊断为

- A. 肱骨干骨折并肩关节脱位
- B. 肱骨干骨折并桡神经损伤
- C. 肱骨外科颈骨折并腋神经损伤
- D. 肱骨外科颈骨折
- E. 锁骨骨折合并肩关节脱位

正确答案：B 您选择的答案：

第37题 男性，20岁，外伤导致肱骨中下1/3骨折，伴桡神经损伤，临床上除骨折体征外，还可以出现的体征是

- A. 屈指、屈腕功能丧失
- B. 屈指、伸指功能丧失
- C. 伸指、伸腕功能丧失
- D. 伸指功能丧失，伸腕功能存在
- E. 手指不能靠拢

正确答案：C 您选择的答案：

第38题 历岁女性，跌倒后右手掌着地，腕部疼痛，肿胀，压痛，无反常活动，但餐叉状畸形明显，该患最可能的诊断是

- A. 右腕关节脱位
- B. 右舟状骨骨折
- C. 右腕Coles(科雷)骨折
- D. 尺骨茎突骨折
- E. 右腕关节挫伤

正确答案：C 您选择的答案：

第39题 男性40岁，八个月前外伤致肱骨干骨折，行手法复位，夹板外固定治疗来院检查肱骨干骨折部位有反常活动，X线片示骨折线存在，断端有0.3cm的间隙，断端骨髓腔，已封闭硬化，此时应选择哪种治疗

- A 继续夹板固定
- B 手术切除硬化骨，钢板固定，植骨，加牢固的外固定
- C 改为石膏外固定
- D 改为牵引固定
- E 手术切除硬化骨，钢板固定加牢固的外固定

正确答案：B 您选择的答案：

第40题 一中年患者，前臂尺、桡骨双骨折，经手法复位2次失败，此时比较合理的治疗方案是

- A 石膏管型固定，3周后再手术治疗
- B 小夹板固定，3周后再行手术治疗
- C 持续骨牵引治疗
- D 手术切开复位，钢板内固定
- E 待骨折愈合后，再行矫正手术

正确答案：D 您选择的答案：

第41题 患者，66岁，跌倒时前臂旋前、腕关节背伸，手掌着地，患腕明显肿胀，压痛及功能障碍，侧面观“银叉”畸形，最可能的诊断是

- A 屈曲型桡骨下端骨折
- B 伸直型桡骨下端骨折
- C Smith骨折
- D 腕关节脱位
- E 腕舟骨骨折

正确答案：B 您选择的答案：

第42题 男性，30岁，6个月前外伤导致肱骨干骨折，行手法复位，夹板外固定治疗，来院复查X线片示：骨折线存在，断端有0.3cm的间隙，断端骨髓腔已封闭硬化，此时应该选择哪种治疗措施

- A 继续夹板固定
- B 改为石膏外固定
- C 改为牵引固定
- D 手术切除硬化骨，钢板固定外加牢固的外固定
- E 手术切除硬化骨，植骨，钢板内固定外加石膏外固定

正确答案：E 您选择的答案：

第43题 4岁幼儿，摔倒后肩部疼痛，检查患肩下沉，患肢活动障碍，头向患侧偏斜，杜加(Dugas)征阴性，最可能的诊断

- A 肩关节脱位
- B 臂丛神经损伤
- C 锁骨骨折
- D 肱骨外科颈骨折
- E 桡骨小头半脱位

正确答案：C 您选择的答案：

第44题 外伤导致肱骨中下1/3骨折合并垂腕垂指畸形3天，哪项治疗最合适

- A 复位后石膏固定
- B 复位后夹板固定
- C 手法切开复位，内固定
- D 牵引治疗
- E 切开复位，桡神经探查，加压钢板螺钉内固定

正确答案：E 您选择的答案：

第45题 患者，5岁，摔倒后肩部疼痛。体检：患肩下沉，患肢有活动障碍，头向患侧偏斜，Dugas征阴性，最有可能的诊断是

- A 肩关节脱位
- B 臂丛神经损伤
- C 颈部假性动脉瘤
- D 锁骨骨折
- E 桡骨小头半脱位

正确答案：D 您选择的答案：

第46题 外伤致肱骨中下1/3骨折合并垂腕垂指畸形2天，该患最适合哪项治疗

- A 复位后夹板固定
- B 复位后，石膏固定
- C 牵引治疗
- D 手术切开复位，内固定
- E 手法复位后，夹板或石膏固定，观察2~3月，伸腕伸指不见恢复，再手术治疗

正确答案：E 您选择的答案：

第47题 男性，28岁。外伤致肱骨中下1/3骨折，伴有桡神经损伤，临床上除骨折体征外，还可出现的体征是

- A 手指不能靠拢
- B 伸指，伸腕功能丧失
- C 屈指，屈腕功能丧失
- D 屈指伸指功能丧失
- E 伸腕功能存在，伸指功能丧失

正确答案：B 您选择的答案：

第48题 中年男性，跌倒时前臂旋前，腕关节背伸，手掌着地，2小时后来医院就诊，患腕明显肿胀，压痛及功能障碍，侧面观“银叉”畸形，最可能的诊断是

- A. 腕关节脱位
- B. Smith骨折
- C. 屈曲型桡骨下端骨折
- D. 伸直型桡骨下端骨折
- E. 腕舟关节骨折

正确答案：D 您选择的答案：

第49题 老年男性，70岁，外伤后X线片示：桡骨下端骨折，无明显移位，该患者应该选择的治疗是

- A. 牵引治疗
- B. 对症治疗
- C. 手术治疗
- D. 消肿治疗
- E. 手法复位，夹板或者石膏固定

正确答案：E 您选择的答案：

第50题 肩部外伤致锁骨骨折患者，检查时发现，肩外展，伸肘，屈肘功能及腕，手的功能完全丧失，并有感觉障碍，此患应选择哪种治疗

- A. 早期手术切开复位，内固定，同时探查臂丛神经
- B. 手法复位，横8字绷带固定
- C. 手法复位，石膏外固定
- D. 手法复位，夹板固定
- E. 牵引复位

正确答案：A 您选择的答案：

第51题 老年患者外伤致桡骨下端(Co es)骨折。骨折对位对线良好，并有嵌插，该患应选择哪项治疗

- A. 牵引治疗
- B. 对症治疗
- C. 手术治疗
- D. 消肿治疗
- E. 夹板固定或石膏固定

正确答案：E 您选择的答案：

第52题 青年男性，跌倒后受伤，诊断为肱骨髁上伸直型骨折，远侧骨折断端向后上方与桡侧移位，下列关于手法复位错误的是

- A. 仰卧位，屈肘50°，前臂置于中立位
- B. 拔伸牵引，充分纠正短缩移位与成角移位
- C. 充分矫正旋转移位
- D. 充分矫正远侧端的向后移位
- E. 必须保证完全对位对线

正确答案：E 您选择的答案：

第53题 前臂尺、桡骨双骨折青年患者，经手法复位失败，此时应采取的合理治疗，是

- A. 小夹板固定，三周后再手术治疗
- B. 石膏管型固定，三周后再手术治疗
- C. 持续骨牵引治疗
- D. 手术切开复位内固定加外固定
- E. 待骨折愈合后，再行矫形手术

正确答案：D 您选择的答案：

第54题 男性，右上臂外伤，局部肿胀，压痛、畸形，反常活动并可触及骨擦感，垂腕且各掌指关节不能背伸，最可能的诊断是

- A. 肱骨干骨折并肩关节脱位
- B. 肱骨干骨折并桡神经损伤
- C. 肱骨外科颈骨折
- D. 肱骨外科颈骨折并腋神经损伤
- E. 肱骨外科颈骨折并桡神经损伤

正确答案：B 您选择的答案：

第55题 5岁女孩，肘关节半屈位跌倒，手掌着地，致肱骨髁上伸直型骨折，远骨折断端向后上方与桡侧移位，手法复位时，下列哪项操作是错误的

- A. 仰卧，屈肘50°，前臂置于中立位
- B. 拔伸牵引，充分纠正短缩移位与成角移位
- C. 充分矫正旋转移位
- D. 充分矫正远侧段的向后移位
- E. 必须完全矫正桡侧方移位

正确答案：E 您选择的答案：

第56题 患儿3岁，摔倒后肩部疼痛，出现患肩下沉和活动障碍，头向患侧偏斜，Dugas征阴性，最有可能的诊断是

- A. 肩关节脱位
- B. 锁骨骨折
- C. 桡骨小头半脱位
- D. 颈部软组织损伤
- E. 臂丛神经损伤

正确答案：B 您选择的答案：

第57题 男性，46岁，跌倒时左上肢处于外层位，手掌着地，当即左肩肿胀。体检：左肩部饱满，局部稍下方凹陷有明显压痛，患肩活动障碍，可能的诊断是

- A. 左肩关节后脱位
- B. 左肩关节前脱位
- C. 肱骨外科颈骨折

- D. 肱骨外科颈骨折合并关节脱位
E. 左肩软组织损伤

正确答案：C 您选择的答案：

三、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第58-59题

患儿6岁，跌倒时手掌着地，查体肘关节半屈状，肘部明显肿胀及压痛，皮下有瘀斑，呈向外突出畸形，桡动脉搏动减弱，肘后三角存在，被动伸指时有剧疼痛

1. 该患最有可能的诊断是

- A. 伸直型肱骨髁上骨折
B. 屈曲型肱骨髁上骨折
C. 肘关节脱位
D. 桡骨小头半脱位
E. 尺骨鹰嘴骨折

2. 该患正确的治疗方案是

- A. 立即切开筋膜减压
B. 尺骨鹰嘴牵引
C. 手法复位，石膏托固定
D. 切开复位，内固定

E. 臂丛麻醉或应用血管扩张剂无效后，手术探查肱动脉，同时行骨折复位，内固定

正确答案：AE 您选择的答案：

第60-61题

患儿8岁，跌倒时手掌着地，肘关节半屈位，肘部明显肿胀及压痛，呈向外突出畸形，桡动脉搏动消失，肘后三角存在，被动伸指时有剧烈疼痛

1. 最有可能的诊断是

- A. 伸直型肱骨髁上骨折
B. 屈曲型肱骨髁上骨折
C. 肘关节脱位
D. 桡骨头半脱位
E. 尺骨鹰嘴骨折

2. 正确的治疗方案为

- A. 立即切开筋膜减压，切开的皮肤可不缝合
B. 持续尺骨鹰嘴牵引
C. 立即手法复位，后侧石膏托固定
D. 急诊手术切开复位及钢板内固定术
E. 臂丛阻滞或应用血管扩张剂无效后，立即手术探查

正确答案：AE 您选择的答案：

第62-63题

青年男性外伤导致右肱骨干骨折，呈二度骨折。体检：有垂腕，垂指畸形，第1、2掌骨背侧皮肤麻木。

1. 该患者诊断是

- A. 右肱骨干开放性骨折
B. 右肱骨干骨折伴桡神经损伤
C. 右肱骨干开放性骨折伴桡神经损伤
D. 右肱骨干闭合性骨折
E. 右肱骨干闭合性骨折伴桡神经损伤

2. 该患者治疗方案是

- A. 清创后，直视下复位，钢板内固定
B. 清创后，直视下复位，钢板内固定，观察2个月后桡神经功能不能恢复，再次手术治疗
C. 清创缝合，手法复位，石膏固定
D. 清创后，手法复位，加压钢板内固定，探查桡神经并修复加外固定
E. 清创后缝合，牵引治疗

正确答案：CD 您选择的答案：

第64-65题

青年男性外伤致右肱骨干骨折，折端外露，查体有垂腕，垂指畸形，虎口局感觉障碍

1. 该患的正确诊断是

- A. 右肱骨干开放性骨折
B. 右肱骨干开放性骨折伴桡神经损伤
C. 右肱骨干骨折伴桡神经损伤
D. 右肱骨干闭合性骨折
E. 右肱骨干闭合性骨折伴桡神经损伤

2. 该患者正确的治疗方案是

- A. 清创缝合，手法复位，内固定
B. 清创后，手法复位，内固定，观察2月，桡神经功能不恢复。再次手术治疗
C. 清创缝合，手法复位，石膏固定
D. 清创后，手法复位，加压钢板内固定，探查桡神经并修复加外固定
E. 清创缝合，牵引治疗

正确答案：BD 您选择的答案：

第66-68题

5岁患儿，跌倒时手掌着地，肘关节半屈，查肘部明显肿胀及压痛，骨折远侧端向后外突出，肘关节呈半屈畸形，桡动脉搏动消失，肘后三角存在。被动伸指时有剧烈疼痛。

1. 最有可能的诊断是

- A. 肘关节脱位
B. 桡骨小头半脱位

- C. 尺骨鹰嘴骨折
 - D. 屈曲型肱骨髁上骨折
 - E. 伸直型肱骨髁上骨折
 - 2. 正确的治疗方案为
 - A. 立即切开筋膜减压，敞开皮肤
 - B. 急诊手术切开复位及钢板内固定术
 - C. 持续尺骨鹰嘴骨牵引
 - D. 臂丛阻滞下行手法复位，应用血管扩张剂解除血管痉挛，无效后立即手术探查
 - E. 立即手法复位，后侧石膏托固定
 - 3. 该患儿手术后需石膏外固定，关于石膏外固定说法错误的是
 - A. 石膏外固定塑性效果好，方便、经济
 - B. 石膏外固定缺点是不能及早地进行功能锻炼
 - C. 石膏外固定一般都要固定骨折段上下关节
 - D. 石膏外固定后应该注意桡动脉脉搏及末梢血运情况
 - E. 桡动脉存在多可排除骨筋膜室综合征的存在
- 正确答案：EDE 您选择的答案：

第69-70题

36岁，男性。翻车肩部外伤，半小时后来院，查左锁骨中外1/3处明显畸形，局部肿胀明显，瘀血，桡动脉搏动触不到，手部发凉，皮肤苍白，血压80/40mmHg

- 1. 该患应首先做哪项处置
 - A. 立即拍照X线片
 - B. 立即做化验各项检查
 - C. 做血管造影
 - D. 立即补液，输血
 - E. 整复骨折，固定
 - 2. 该患正确的治疗方法，是
 - A. 手法复位，横8字绷带固定
 - B. 手法复位，石膏固定
 - C. 牵引治疗
 - D. 手术切开复位，内固定探查臂丛神经
 - E. 立即手术探查受损血管并修复血管，骨折复位内固定，再加适当的外固定
- 正确答案：DE 您选择的答案：

四、A4型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第71-74题

青年男性，踢球时摔到，右肩着地，当时神志清，四肢感觉、运动消失，持续3分钟后恢复，即感肩部疼痛，呼吸困难。体检：右上肺皮下握雪感，右肺呼吸音弱，心率100次/分，右肩中外2/3处局部隆起、淤血，桡动脉搏动弱，四肢发凉，皮肤苍白，血压90/60mmHg(12/8kPa)。

- 1. 该患者应该最先接受哪项急救处理
 - A. 立即拍X线片以明确诊断
 - B. 完善各项化验检查，准备手术治疗
 - C. 手法复位矫正明显骨折畸形后再行进一步检查
 - D. 积极抗休克治疗，保持足够的氧饱和度的同时，准备下一步治疗
 - E. 行动脉血管造影，在破损处行栓塞治疗
 - 2. 该患者诊断时除锁骨骨折外应该考虑
 - A. 桡动脉损伤
 - B. 正中神经损伤
 - C. 尺神经损伤
 - D. 气胸合并肺部血管损伤
 - E. 肺部开放性创伤合并脊髓震荡
 - 3. 该患者的治疗方法是
 - A. 手法复位，8字绷带固定
 - B. 手法复位，石膏外固定
 - C. 手术切开复位，内固定探查有无神经血管损伤
 - D. 胸腔闭式引流，手术切开，内固定，观察数小时，如抗休克治疗无效应该开胸手术治疗
 - E. 胸腔闭式引流，手法矫正明显移位畸形，8字绷带固定，观察数小时，如抗休克治疗无效应该开胸手术治疗
 - 4. 伤后半年该患者出现右侧上下肢疼痛伴同侧手指麻木，其病因考虑可能为
 - A. 锁骨骨折伤及右侧桡神经
 - B. 手法复位粗暴，挫伤同侧臂丛神经
 - C. 形成的骨痂压迫臂丛神经
 - D. 肩颈部外伤导致继发性颈椎椎间盘突出症
 - E. 脊髓震荡导致脊髓水肿变性
- 正确答案：DEED 您选择的答案：

五、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第75-77题

- A. 肱骨髁上伸直型骨折
- B. 肱骨干骨折
- C. 桡骨远端骨折
- D. 锁骨骨折
- E. 尺骨上1/3骨折
- 1. 前臂缺血性肌挛缩多见于
- 2. 桡神经损伤多见于

3. 老年人常见的骨折

正确答案：ABC 您选择的答案：

第78-81题

A. 桡骨远端骨折

B. 前臂屈肌群

C. 锁骨骨折

D. 尺骨上1/3骨折

E. 肱骨干骨折

1. 桡神经损伤多见于

2. 前臂缺血性肌挛缩多见于

3. 老年人常见的骨折

4. 骨折后容易出现骨筋膜室综合征的是

正确答案：EBAD 您选择的答案：

习题集 外科学 骨折概论

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 骨筋膜室综合征常见的原因中哪项是不正确的

- A. 软组织严重挫伤及挤压伤
- B. 四肢骨折时小夹板包扎过紧
- C. 肢体严重的局部压迫
- D. 小腿的激烈运动
- E. 开放性骨折所致的大量出血

正确答案：E 您选择的答案：

第2题 前臂缺血性肌挛缩，多见于

- A. 肱骨髁上骨折
- B. 尺骨骨折
- C. 桡骨骨折
- D. 股骨骨折
- E. Colles骨折

正确答案：A 您选择的答案：

第3题 骨折切开复位内固定的指征中下列哪项是错误的

- A. 骨折断端间有肌等软组织嵌入，手法复位失败者
- B. 手法复位未能达到解剖复位的标准
- C. 保守治疗未达到功能复位的标准
- D. 关节内骨折手法复位后对位不好者
- E. 多处骨折或并发主要的血管损伤

正确答案：B 您选择的答案：

第4题 下列哪项不属于骨折并发症的范畴

- A. 褥疮
- B. 缺血性肌挛缩
- C. 缺血性骨坏死
- D. 关节强直
- E. 关节僵硬

正确答案：D 您选择的答案：

第5题 骨折的全身表现中，哪种描述是错误的

- A. 一般骨折后体温正常
- B. 病人可因大量出血或并发内脏损伤而引起休克
- C. 严重骨折病人血肿吸收时，体温略有升高
- D. 开放性骨折病人体温升高时，应考虑感染
- E. 严重骨折病人血肿吸收时，其体温通常不超过37

正确答案：E 您选择的答案：

第6题 股骨干骨折转移瘤合并病理性骨折时，为减轻骨折的症状，应采用

- A. 皮牵引
- B. 患肢抬高，置下肢外展屈曲位
- C. 髓内针固定
- D. 石膏外固定
- E. 夹板固定

正确答案：C 您选择的答案：

第7题 骨折临床愈合的标准，下列哪项是不正确的

- A. 局部无压痛
- B. 局部无反常活动
- C. 局部无畸形
- D. 局部无纵向叩击痛
- E. X线示骨折线模糊，有连续性骨痂通过

正确答案：C 您选择的答案：

第8题 下列属于理学检查的是

- A. 超声
- B. 病理切片
- C. 腱反射
- D. 化验检查
- E. X线片

正确答案：C 您选择的答案：

第9题 下列哪项不是骨折的早期并发症

- A. 休克
- B. 感染
- C. 神经损伤
- D. 损伤性骨化
- E. 脂肪栓塞

正确答案：D 您选择的答案：

第10题 骨折时最易发生骨缺血坏死的部位是

- A. 远端桡骨头

- B. 远端锁骨头
- C. 肱骨头
- D. 胫骨内髁
- E. 股骨头

正确答案：E 您选择的答案：

第11题 股骨闭合性骨折后，体温可能出现的情况

- A. 上午正常，下午高热
- B. 通常不超过38
- C. 时高时低不规则
- D. 常在38.5 以上
- E. 一般低于正常

正确答案：B 您选择的答案：

第12题 下列为三度开放性骨折的是

- A. 皮肤被骨折端刺破
- B. 皮肤被割裂压碎，皮下组织与肌肉中度损伤
- C. 肌肉严重损伤伴神经血管损伤
- D. 骨盆骨折刺破膀胱
- E. 伴有严重感染的骨折

正确答案：D 您选择的答案：

第13题 在骨折的急救中，哪项处理不正确

- A. 首先抢救生命
- B. 可用当时认为最清洁的布类包扎创口
- C. 开放外露的骨折断端均应立即复位
- D. 妥善的外固定十分重要
- E. 病人经妥善固定后，应迅速转运往医院

正确答案：C 您选择的答案：

第14题 根据骨折是否与外界相通，可把骨折分为

- A. 外伤性骨折和不稳定性骨折
- B. 压缩性骨折和横行骨折
- C. 稳定性骨折和不稳定性骨折
- D. 完全性骨折和不完全性骨折
- E. 开放性骨折和闭合性骨折

正确答案：E 您选择的答案：

第15题 骨骺分离，是属于

- A. 先天性发育不良
- B. 骨折
- C. 关节脱位
- D. 骨肿瘤
- E. 骨髓炎的一种类型

正确答案：B 您选择的答案：

第16题 骨筋膜室综合征，最好的处理方法是

- A. 给予血管舒张剂，消除血管痉挛
- B. 抬高患肢，以利消肿
- C. 被动按摩，以利消肿
- D. 做臂丛麻醉，解除血管痉挛
- E. 解除包扎及固定物，经观察不见好转，切开筋膜减压

正确答案：E 您选择的答案：

第17题 下列哪种不是导致骨折段移位的因素

- A. 暴力的大小和作用方向
- B. 肌牵拉力
- C. 伤者的年龄
- D. 搬运及治疗不当
- E. 肢体远侧段的重量

正确答案：C 您选择的答案：

第18题 在进行骨折复位时，下列哪项是正确的

- A. 原则上将远侧骨折段对准近侧骨折段所指的方向
- B. 原则上将近侧骨折段对准远侧骨折段所指的方向
- C. 应在肢体的中立位进行复位
- D. 应在肢体的功能位进行复位
- E. 原则上应以反折、回旋的手法进行复位

正确答案：A 您选择的答案：

第19题 下列哪种骨折愈合最慢

- A. 胫骨内髁骨折
- B. 桡骨远端骨折
- C. 股骨转子间骨折
- D. 肱骨髁上骨折
- E. 胫骨中、下1/3骨折

正确答案：E 您选择的答案：

第20题 压缩性骨折最常发生于

- A. 椎骨

- B. 股骨
- C. 肱骨
- D. 尺骨
- E. 腓骨

正确答案：A 您选择的答案：

第21题 骨折早期的常见并发症是

- A. 缺血性肌挛缩
- B. 感染
- C. 血管、内脏和神经损伤
- D. 损伤性骨化
- E. 脂肪栓塞

正确答案：C 您选择的答案：

第22题 根据骨折是否与外界相通，可把骨折分为

- A. 完全性骨折与非完全性骨折
- B. 稳定性骨折与非稳定性骨折
- C. 清洁型骨折与非清洁性骨折
- D. 开放性骨折与非开放性骨折
- E. 单纯骨折与粉碎性骨折

正确答案：D 您选择的答案：

第23题 手术切开复位内固定最常见的弊端是

- A. 损伤神经，导致对应部位的功能和感觉障碍
- B. 手术费用大大高于手法复位
- C. 易引起血管损伤
- D. 手术后感染
- E. 影响骨折部位的血运，延迟骨折愈合

正确答案：E 您选择的答案：

第24题 关于骨折后的锻炼，正确的是

- A. 提倡早期锻炼，越早越好
- B. 伤后1周活动上下关节
- C. 伤后1个月活动上下关节
- D. 骨折线基本消失后方可主动活动锻炼
- E. 伤后1~2周以患肢肌肉主动活动为主

正确答案：E 您选择的答案：

第25题 无明显污染的骨折什么时间段内清创可一期愈合

- A. 1~2小时
- B. 3~4小时
- C. 4~6小时
- D. 6~8小时
- E. 8~10小时

正确答案：D 您选择的答案：

第26题 骨折后最易发生骨缺血性坏死的部位，是

- A. 股骨头
- B. 肱骨头
- C. 桡骨远端
- D. 锁骨远端
- E. 胫骨内髁

正确答案：A 您选择的答案：

第27题 骨折的专有体征，是

- A. 疼痛
- B. 功能障碍
- C. 反常活动
- D. 肿胀
- E. 瘀斑

正确答案：C 您选择的答案：

第28题 治疗骨折不可轻易切开复位内固定，最主要的原因

- A. 易损伤大血管，引起肢体坏死
- B. 损伤神经，引起肢体瘫痪
- C. 术中发生意外
- D. 影响骨折血运，导致延迟愈合或不愈合
- E. 手术后发生感染，形成骨髓炎

正确答案：D 您选择的答案：

第29题 最容易引起骨折不连接的移位，是

- A. 成角移位
- B. 侧方移位
- C. 分离移位
- D. 旋转移位
- E. 嵌插移位

正确答案：C 您选择的答案：

第30题 最容易出现骨不连的骨折移位是

- A. 侧方移位

- B. 成角移位
- C. 旋转移位
- D. 分离移位
- E. 嵌插移位

正确答案：D 您选择的答案：

第31题 右下肢被机动车压伤，具备下列哪项可诊断为骨折

- A. 局部高度肿胀
- B. 压痛明显
- C. 下肢不能自主活动
- D. 骨摩擦音
- E. 明显跛行

正确答案：D 您选择的答案：

第32题 可能发生骨坏死的是

- A. 关节内骨折，长期固定
- B. 关节附近骨折，血肿较大
- C. 骨折合并大血管损伤
- D. 股骨颈囊内型骨折
- E. 长骨多段骨折

正确答案：D 您选择的答案：

第33题 发生骨折现场，急救时特别强调

- A. 积极抗休克，抢救生命
- B. 创口包扎
- C. 早期彻底清创
- D. 妥善固定
- E. 迅速运送至医院

正确答案：D 您选择的答案：

第34题 关于骨折的愈合，下列哪项不正确

- A. 多次手法复位，不利于骨折愈合
- B. 手术比手法复位，更能增加愈合机会
- C. 骨牵引过度可造成延迟愈合或不愈合
- D. 内固定和外固定不充分不利愈合
- E. 适当功能练习有利于愈合

正确答案：B 您选择的答案：

第35题 骨折刚达到临床愈合时，正处于骨折愈合过程的哪一阶段

- A. 血肿机化演进期
- B. 骨折后2周以内
- C. 原始骨痂形成期
- D. 骨痂改造塑形期
- E. 永久骨痂形成期

正确答案：C 您选择的答案：

第36题 下列哪项骨折为稳定性骨折

- A. 斜骨折
- B. 横骨折
- C. 螺旋性骨折
- D. 股骨内收性骨折
- E. 嵌顿性骨折

正确答案：E 您选择的答案：

第37题 骨筋膜室综合征，最主要的治疗措施

- A. 给予血管舒张剂，消除血管痉挛
- B. 抬高患肢，以利消肿
- C. 被动按摩，以利消肿
- D. 做臂位麻醉，解除血管痉挛
- E. 解除包扎，固定物，经观察不见好转，切开筋膜减压

正确答案：E 您选择的答案：

第38题 压缩性骨折，最常发生于

- A. 肱骨头
- B. 股骨头
- C. 椎体
- D. 腕舟状骨
- E. 足舟状骨

正确答案：C 您选择的答案：

第39题 关于骨折愈合，正确的是

- A. 早期锻炼可促进骨折愈合
- B. 切开对位较手法复位准确，易于愈合
- C. 修复时尽可能多的保留游离的骨折块易于愈合
- D. 创口感染时，可以选择内固定便于愈合
- E. 骨折伤后7小时修复时，多采用二期愈合策略

正确答案：C 您选择的答案：

第40题 下列骨折中最不稳定的类型是

- A. 嵌插骨折

- B. 斜骨折
- C. 青枝骨折
- D. 横骨折
- E. 裂缝骨折

正确答案：B 您选择的答案：

第41题 开放性骨折清创时，哪项是不正确的

- A. 清创术时最好不用止血带(大血管破裂时例外)
- B. 应将创口的边缘切除
- C. 已污染的韧带、关节囊均应切除
- D. 已污染的骨膜均应切除
- E. 大的游离骨片在清洁、消毒后仍宜放回原处

正确答案：D 您选择的答案：

第42题 疲劳性骨折常常发生在哪些部位

- A. 髌骨上极
- B. 尺骨鹰嘴
- C. 第二、三跖骨
- D. 第一趾骨
- E. 尺骨下段

正确答案：C 您选择的答案：

第43题 运动系统最基本和最主要的检查方法是

- A. 肌电图
- B. 病理切片
- C. 理学检查
- D. 化验室检查
- E. X线片

正确答案：C 您选择的答案：

第44题 骨折临床愈合后，骨痂的改造塑形，决定于

- A. 外固定的牢固性
- B. 肢体活动和负重所形成的应力
- C. 局部血液供应情况
- D. 骨痂的多少
- E. 是否配合治疗

正确答案：B 您选择的答案：

第45题 开放性骨折的处理，哪项是正确的

- A. 清创洗刷污染的骨质
- B. 失去活力的大块肌组织可以部分保留
- C. 大块的碎骨块可在清洁消毒后放回原处
- D. 不能切除创口的边缘
- E. 已污染的骨膜应完全切除

正确答案：C 您选择的答案：

第46题 下列哪项是骨折专有体征

- A. 发热
- B. 骨摩擦音
- C. 疼痛
- D. 肿胀
- E. 功能障碍

正确答案：B 您选择的答案：

第47题 下列哪项骨折，为稳定性骨折

- A. 单一桡骨干的斜骨折
- B. 股骨干的横骨折
- C. 伸直型肱骨髁上骨折
- D. 尺，桡骨双骨的青枝骨折
- E. 股骨颈骨折内收型

正确答案：D 您选择的答案：

第48题 在骨折复位中，以下哪项正确

- A. 允许成人下肢骨折存在与关节活动方向垂直的侧方成角
- B. 复位后骨折断端的对位对线必须完全良好
- C. 骨折部分的旋转移位、分离移位不必完全矫正
- D. 若无骨骺损伤，可允许儿童下肢骨折短缩2cm以内
- E. 肱骨干骨折必须达到解剖复位

正确答案：D 您选择的答案：

第49题 关于骨折的临床表现，下列哪项描述是错误的

- A. 骨折的专有体征包括畸形、反常活动及骨擦音或骨擦感
- B. 只要发现骨折专有体征的其中一项，即可作出骨折的明确诊断
- C. 骨折时可以没有骨擦音或骨擦感
- D. 检查可疑骨折病人时，应尽量诱发骨擦音或骨擦感的出现，以明确诊断
- E. 临床未见有骨折专有体征时，也可能有骨折

正确答案：D 您选择的答案：

第50题 在骨折愈合中以下哪项是正确的

- A. 增加软骨内化骨范围

- B. 手法复位可反复多次，力争达到解剖复位标准
C. 只有骨折对线良好，骨折段间即便有软组织嵌入也不会影响骨折愈合
D. 骨折部剪力的存在可促进骨痂的生长
E. 在临床上应防止产生较大的血肿
正确答案：E 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

- 第51题 一青年女性患者，摔伤右上臂，出现右上臂中上1/3明显畸形伴疼痛，无皮肤破损，尺桡动脉搏动正常，患者自觉手背部麻木，事发现场应采取的措施是
A. 在附近寻找线性钢性材料固定患肢，迅速送附近医院
B. 在腋窝处用止血带结扎，记录结扎时间
C. 矫正右上臂明显成角畸形，简单固定后再行后送
D. 将患肢固定于胸前，迅速送附近医院
E. 石膏固定后临床观察
正确答案：C 您选择的答案：

- 第52题 男性，30岁，挤压伤致双下肢疼痛，当时神清，脉搏72次/分，血压120/70mmHg，右小腿有皮肤裂伤骨折端外露，局部畸形、活动障碍，伤口不断有血液涌出，足趾血运好，现场急救首先要做的处理是
A. 输血输液
B. 下肢捆扎橡皮止血带
C. 敷料加压包扎伤口
D. 外露的骨折端复位
E. 夹板固定伤肢
正确答案：B 您选择的答案：

- 第53题 6岁，女孩，外伤致肱骨髁上伸直型骨折，经手法复位，石膏外固定，5小时后出现手麻，主动活动障碍，手发凉，此时的治疗，应采取
A. 立即拆除石膏，改用骨牵引治疗
B. 观察2天，视情况采用相应措施
C. 手术探查，手术治疗
D. 应用血管扩张剂
E. 臂丛麻醉
正确答案：A 您选择的答案：

- 第54题 男，30岁，车祸后3小时入院，诊断为：骨盆骨折、左股骨干骨折。首先应该密切观察的是哪种并发症
A. 休克
B. 创口感染
C. 疼痛
D. 坠积性肺炎
E. 泌尿系统感染
正确答案：A 您选择的答案：

- 第55题 30岁，男性，10个月前胫腓骨闭合性骨折，行手法复位，石膏外固定，现原骨折处有反常活动，X线显示胫骨上下端髓腔被硬化骨封闭，骨折端有2mm间隙，并向后成10°角，其治疗应采用
A. 手法复位，小夹板固定
B. 手法复位，石膏外固定
C. 切开复位，外固定
D. 切开复位，内固定外加外固定
E. 切开复位，骨移植，内固定外加外固定
正确答案：E 您选择的答案：

- 第56题 右前臂尺桡骨开放性骨折，清创复位，石膏外固定后36小时，患者高热，脉快，白细胞计数明显增高，伤口剧痛，有大量恶臭渗液，x线片显示皮下有气体，触诊有握雪感，应首先考虑
A. 血肿吸收
B. 组织坏死
C. 伤口严重化脓感染
D. 气性坏疽
E. 骨筋膜室综合征
正确答案：D 您选择的答案：

- 第57题 男性，26岁。因外伤造成左肱骨干骨折，来院时检查，上臂较对侧短4cm，有轻度成角畸形，听诊骨传导音明显弱，骨折的移位是
A. 短缩移位
B. 混合移位
C. 侧方移位
D. 成角多移位
E. 分离移位
正确答案：B 您选择的答案：

- 第58题 运动员百米赛跑途中突然闻及左膝撕裂声，然后倒地，查体左膝不能主动伸，x线片显示髌骨中断段折，考虑造成骨折的原因是
A. 直接暴力
B. 间接暴力
C. 病理性骨折
D. 肌肉拉力
E. 积累性劳损
正确答案：D 您选择的答案：

第59题 胫腓骨中段1/3骨折患者，复位后，用长腿石膏固定，4个月后骨折愈合拆除石膏，发现膝关节功能发生障碍，可能原因是

- A. 肌肉萎缩
- B. 关节僵硬
- C. 关节强直
- D. 骨折复位不理想
- E. 骨折畸形愈合

正确答案：B 您选择的答案：

第60题 26岁女性，3小时前摔伤左前臂，来院检查发现前臂肿胀，瘀斑，剧痛，并有短缩成角畸形，诊断首先考虑

- A. 前臂软组织挫伤
- B. 尺神经损伤
- C. 尺桡骨双折
- D. 桡骨骨折
- E. 尺骨骨折

正确答案：C 您选择的答案：

第61题 某工地，工人因外伤致股骨干闭合性骨折，在运往医院途中，应该

- A. 用木板床运送
- B. 置左下肢外展屈曲位
- C. 置左下肢内收内旋位
- D. 人力牵引置下肢中立位
- E. 将左下肢和右下肢捆扎一起

正确答案：E 您选择的答案：

第62题 一名前臂骨折患者，经手法复位，小夹板固定5小时，感觉剧痛，手指麻木，肿胀，活动不灵，其主要原因是

- A. 神经损伤
- B. 神经受压和静脉受压
- C. 动脉受压和静脉受压
- D. 静脉受压
- E. 动脉损伤

正确答案：C 您选择的答案：

第63题 女，60岁，外伤后胫腓骨中下1/3开放性骨折，经治疗4个月后复查，X线检查见原骨折处上下端有轻微移位，骨折线存在，中间无任何软组织影，诊断为骨不连，考虑该患者骨不连的原因最有可能的是

- A. 年龄较大
- B. 伤口有感染
- C. 骨折段血液供应不足
- D. 周围软组织挫伤严重
- E. 骨折复位不良

正确答案：C 您选择的答案：

第64题 男性患者，因外伤致股骨内外髁骨折，关节面不平，相差0.8cm，虽经治疗，骨折移位未见改变，最可能出现晚期并发症，是

- A. 骨化性肌炎
- B. 褥疮
- C. 膝关节创伤性关节炎
- D. 膝关节僵硬
- E. 膝关节外翻畸形

正确答案：C 您选择的答案：

第65题 一个民工在建房时受伤，导致左侧股骨干闭合性骨折，在送医院的过程中应该采取的措施是

- A. 用木板床运送
- B. 置左下肢外展屈曲位
- C. 置左下肢内收内旋位
- D. 将左下肢和右下肢捆绑在一起
- E. 人力牵引置左下肢于中立位

正确答案：D 您选择的答案：

第66题 40岁男性，一年前因胫腓骨骨折，行手法复位，石膏外固定，现检查见骨折处有反常活动，X线显示胫骨上下端髓腔被硬化骨封闭，骨折端有3mm间隙，并向后成角15°，其治疗应采用

- A. 手法复位，小夹板固定
- B. 手法复位，石膏外固定
- C. 切开复位，内固定外固定
- D. 切开复位，外固定
- E. 切开复位，植骨内固定加外固定

正确答案：E 您选择的答案：

第67题 45岁男性，车祸3小时入院，诊断。骨盆骨折，左股骨干骨折及左胫骨开放性骨折，首先应密切观察的，是哪种并发症

- A. 休克
- B. 泌尿系统感染
- C. 创口感染
- D. 疼痛
- E. 坠积性肺炎

正确答案：A 您选择的答案：

第68题 一学生在运动会比赛中突然闻及右膝关节处有撕裂声，随之倒地，查体左腿不能主动伸直，X线片示：髌骨

中段骨折，考虑造成骨折的原因是

- A. 直接暴力
- B. 间接暴力
- C. 病理性骨折
- D. 肌肉牵拉
- E. 积累性劳损

正确答案：D 您选择的答案：

第69题 胫腓骨中1/3骨折患者，复位后，用长腿石膏管理固定，4个月骨折愈合拆除石膏后，发现膝关节功能发生障碍，其原因是

- A. 肌肉萎缩
- B. 关节僵硬
- C. 关节强直
- D. 骨折复位不良
- E. 骨折畸形愈合

正确答案：B 您选择的答案：

第70题 一男孩外伤导致肱骨髁上伸直型骨折，经手法复位，石膏外固定，5小时后出现手指麻木，手指发凉，应采取的措施是

- A. 继续观察1天，视情况采取相应措施
- B. 立即拆除石膏，改用骨牵引治疗
- C. 手术探查，手术治疗
- D. 应用血管扩张剂
- E. 臂丛麻醉

正确答案：B 您选择的答案：

第71题 50岁男性，外伤后致胫腓骨中下1/3开放性骨折，经治疗，3个月后X线片复查见，骨折略有移位，骨折线清晰，你认为影响骨折愈合的最主要的原因

- A. 年龄较大
- B. 骨折段血液供血不足
- C. 伤口有感染
- D. 周围软组织挫伤严重
- E. 骨折复位不良

正确答案：B 您选择的答案：

三、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第72-74题

男，30岁，在工地施工时从两米高处摔倒，伤后2小时入院，病人烦躁，诉口渴、臀部疼痛。体检：臀部皮肤有少量的擦伤，皮下淤血较明显，无明显的移位畸形。

1. 下列说法错误的是

- A. 积极术前准备后，送入手术室行切开内固定治疗
- B. 重视全身状况，体检时宜全面，以防忽视其他部位的损伤
- C. 加强临床观察，尤其是血压和呼吸指标的监测
- D. 无明显移位的骨盆骨折，在特殊体位下卧床休息3~4周骨折即可痊愈
- E. 该患者当前治疗重点为抗休克治疗，同时完善检查以排除其他部位损伤

2. 以下关于石膏外固定说法不正确的是

- A. 可用于其他固定方式难以固定的骨折
- B. 无明显软组织损伤的开放性骨折可以选用石膏外固定
- C. 石膏固定的缺点在于骨折上下关节不能及时得到锻炼
- D. 关节处损伤多用石膏固定
- E. 关节僵硬是石膏外固定后经常发生的并发症

3. 石膏外固定后最严重最常见的并发症是

- A. 坏疽及缺血性挛缩
- B. 废用性骨质疏松
- C. 坠积性肺炎
- D. 骨化性肌炎
- E. 化脓性皮炎

正确答案：ADA 您选择的答案：

第75-76题

患者男，36岁，车祸2小时，查体：一般情况尚可，右小腿有一长约16cm的伤口，胫骨断端外露，出血不多，并伴有广泛的软组织挫伤

1. 在摄X线片以前，应该进行的处理是

- A. 行简单的外固定
- B. 行气压止血带止血
- C. 急送手术室
- D. 长腿石膏托固定
- E. 紧急输血、输液

2. 最佳的处理方法应为

- A. 彻底清创后根据临床医师经验作处理
- B. 彻底清创伤口，钢板内固定术
- C. 彻底清创后行石膏托外固定
- D. 彻底清创后行小夹板外固定
- E. 彻底清创伤口，外固定支架固定

正确答案：AE 您选择的答案：

第77-78题

男性，30岁。车祸2小时后来院，一般情况尚好，右小腿中上段皮裂伤14cm，软组织挫伤较重，胫骨折端有外露，出血不多

1. 在进行x线片检查前，应该进行的处理

- A 行简单的外固定及局部包扎
- B 行气压止血带止血
- C 急送手术室
- D 石膏固定
- E 跟骨结节牵引

2. 此时最佳的处理方法，是

- A 清创术，骨折复位，外固定支架固定
- B 清创术，骨折复位，钢板内固定
- C 清创术，骨折复位，髓针内固定
- D 清创术，夹板固定
- E 清创术，石膏管型固定

正确答案：AA 您选择的答案：

第79-80题

男性，26岁。外伤致肱骨中下1/3骨折，来院检查时发现垂腕，垂指畸形

1. 该患者合并哪条神经损伤

- A 尺神经损伤
- B 臂丛神经损伤
- C 正中神经损伤
- D 桡神经损伤
- E 正中，尺神经同时损伤

2. 该患选择哪种治疗方法痛苦小，稳妥

- A 立即切开复位，内固定，同时探查并修复受损的神经
- B 骨牵引治疗
- C 手法复位，夹板固定
- D 手法复位，石膏管型固定
- E 手法复位，悬垂石膏固定，观察2月，垂腕垂指无恢复，再行手术治疗

正确答案：DE 您选择的答案：

第81-83题

青年男性，23岁，踢足球时被对方球员踩中左小腿1小时来医院就医。体检：一般状况好，左小腿中下1/3皮肤裂伤5cm，明显软组织损伤，可见白色的胫骨骨折断端穿破皮肤，出血不多。

1. 入院后首先应该进行的处理是

- A 行气压止血带止血
- B 行简单的外固定及局部包扎后摄左下肢X线片
- C 详细询问病史后行常规实验室检查，准备送手术室
- D 石膏固定
- E 跟骨结节牵引治疗

2. 入院后X线片提示左胫骨中下1/3骨折，此时应该采取的措施是

- A 清创术，骨折复位，外固定支架固定
- B 清创术，骨折复位，钢板内固定 + 石膏外固定
- C 清创术，骨折复位，髓内针固定
- D 清创术，夹板外固定
- E 清创术，石膏管性固定

3. 在清创过程中下列说法正确的是

- A 为防止出血，清创时最好用止血带
- B 一般受伤后16小时的清创不能行一期缝合
- C 清创的目的就是清理
- D 凡是有污染的肌肉、肌腱、神经均需要切除
- E 为防止筋膜综合征的出现，可预防性切开深筋膜

正确答案：BAE 您选择的答案：

第84-86题

患者，29岁，右胫腓骨中段闭合骨折后行手法复位石膏外固定24小时，出现患肢持续性剧烈疼痛，进行性加重

1. 此时首先采取的措施应为

- A 予以确切有效的止痛药物
- B 立即解除石膏外固定
- C 抬高患肢以减轻疼痛
- D 更换石膏托或改用其他的外固定方法
- E 局部硫酸镁湿敷

2. 若患肢由疼痛转为无痛，出现皮肤苍白、大理石花纹，感觉异常、肌力减弱，最有可能的诊断是

- A 骨筋膜室综合征
- B 下肢静脉栓塞
- C DIC
- D 缺血性肌挛缩
- E 血栓闭塞性脉管炎

3. 下列哪种是本病首选的有效处理方法

- A 改善微循环药物的应用
- B 立即行神经阻滞或给予血管扩张剂，以改善血管痉挛
- C 立即切开筋膜室减压
- D 立即施行截肢术
- E 对症处理后继续观察

正确答案：BAC 您选择的答案：

四、A4型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第87-90题

男，20岁，在建房施工过程中钢架倒塌砸伤右腿，伤后12小时送入医院。患者烦躁不安，主诉右大腿疼痛，口渴，恶心。体检：右大腿中段广泛挫裂伤，可见一骨折断端刺破皮肤，伤口长约15cm，骨折断端及周围皮肤沾有少许污泥。

1. 下列哪项提示骨折发生
 - A. 局部肿胀疼痛
 - B. 患肢功能障碍
 - C. 患肢出现运动感觉障碍
 - D. X线片提示骨连续性消失
 - E. 和对侧比较患肢长度明显缩短
2. 为预防诊断时发生遗漏，以下措施最实用可行的是
 - A. 了解受伤当时的情况
 - B. 详细而全面的体检
 - C. 有重点的实验室、影像学检查
 - D. 观察期间注意一般状况的变化
 - E. 简单包扎后按几大系统逐一检查
3. 该患者清创缝合最好采用
 - A. 彻底清创，直视下行骨折复位，钢板内固定，一期缝合
 - B. 简单清创，解除明显的成角移位，包扎后留待二期缝合
 - C. 彻底清创，直视下行骨折复位，争取二期缝合
 - D. 彻底清创，切开深筋膜，骨外固定架外固定，一期缝合
 - E. 彻底清创，切开深筋膜，置引流条引流，骨外固定架外固定，一期缝合
4. 以下不是外固定架的适应证的是
 - A. 三度骨折固定
 - B. 发生于5小时前的二度骨折固定
 - C. 有严重软组织损伤的骨折固定
 - D. 关节融合术后的固定
 - E. 有感染的骨不连手术后固定

正确答案：DBEB 您选择的答案：

第91-93题

男，20岁，在建房施工过程中钢架倒塌砸伤右腿，伤后12小时送入医院。患者烦躁不安，主诉右大腿疼痛，口渴，恶心。体检：右大腿中段广泛挫裂伤，可见一骨折断端刺破皮肤，伤口长约15cm，骨折断端及周围皮肤沾有少许污泥。

1. 该患者手术后至少多长时间患肢不能负重
 - A. 1个月
 - B. 2个月
 - C. 3个月
 - D. 4个月
 - E. 5个月
2. 若为该患者施行清创术，下列说法正确的是
 - A. 为减少搬动最快速度的获得麻醉效果，可采用全麻下清创
 - B. 为改善患肢感觉运动障碍，有少量污染的挫伤神经应该保留
 - C. 为防止骨髓炎的发生，骨折断端应该用毛刷彻底刷净
 - D. 骨折断端表面有污染，可以去除污染的骨折端0.5cm
 - E. 任何挫裂的肌腱在清除污染后可保留并缝合
3. 若患者于清创术后13小时突然出现动脉血氧降低，诉胸痛，呼吸困难。胸部X线片示，有广泛肺实变，可能的并发症是
 - A. 休克
 - B. 肺部挫裂伤
 - C. 脂肪栓塞综合征
 - D. 坠积性肺炎
 - E. 下肢深静脉血栓形成并游离导致肺栓塞

正确答案：CDC 您选择的答案：

五、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第94-96题

- A. 粉碎性骨折
 - B. 病理性骨折
 - C. 疲劳性骨折
 - D. 压缩性骨折
 - E. 撕脱性骨折
1. 肌肉拉力可引起
 2. 直接暴力可引起
 3. 骨组织疾患可引起

正确答案：EAB 您选择的答案：

第97-99题

- A. 粉碎性骨折
 - B. 病理性骨折
 - C. 疲劳性骨折
 - D. 压缩型骨折
 - E. 撕脱性骨折
1. 长期行军引起的骨折
 2. 肌肉拉伤引起的骨折
 3. 骨肿瘤引起的骨折

正确答案：CEB 您选择的答案：

第100-101题

- A . 内骨痂
- B . 外骨痂
- C . 内骨痂及外骨痂
- D . 无内骨痂及外骨痂
- E . 纤维组织钙化
- 1 . 膜内化骨
- 2 . 软骨内化骨

正确答案：CD 您选择的答案：

第102-103题

- A 内骨痂
- B 外骨痂
- C 两者都有
- D 两者全无
- E 纤维组织钙化
- 1 . 膜内化骨
- 2 . 软骨内化骨

正确答案：CD 您选择的答案：

习题集 外科学 运动系统检查法

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 所谓单腿站立试验，是用来测试

- A 腰部是否有侧突畸形
- B 下肢长短是否等长
- C 髋关节的臀中、小肌功能及股骨头与髋的关系是否正常
- D 臀大肌是否瘫痪
- E 髋关节是否强直

正确答案：C 您选择的答案：

第2题 下列哪种情况下，不出现脊柱圆弧形后凸

- A 类风湿性脊柱炎
- B 青年性驼背
- C 佝偻病
- D 姿势性驼背
- E 脊柱结核

正确答案：E 您选择的答案：

第3题 跟腱反射，是检查

- A 腰2神经根
- B 颈6神经根
- C 腰4神经根
- D 腰5神经根
- E 骶1神经根

正确答案：E 您选择的答案：

第4题 “浮髌征”阳性，见于膝关节

- A 少量积液
- B 中等量积液
- C 大量积液
- D 滑膜增生
- E 关节内粘连

正确答案：B 您选择的答案：

第5题 肘关节提携角，为

- A $1^{\circ} \sim 5^{\circ}$
- B $6^{\circ} \sim 9^{\circ}$
- C $10^{\circ} \sim 15^{\circ}$
- D $16^{\circ} \sim 19^{\circ}$
- E $20^{\circ} \sim 25^{\circ}$

正确答案：C 您选择的答案：

第6题 肌电图或诱发电位，主要是检查

- A 肌肉损伤
- B 肌腱损伤
- C 骨关节损伤
- D 炎症
- E 周围神经损伤

正确答案：E 您选择的答案：

第7题 运动系统检查法，最基本基础的是

- A X线检查
- B 理学检查
- C 化验检查
- D 肌电图
- E 关节镜检查

正确答案：B 您选择的答案：

第8题 腕关节的功能位，是背伸

- A $5^{\circ} \sim 15^{\circ}$
- B $20^{\circ} \sim 25^{\circ}$
- C $30^{\circ} \sim 40^{\circ}$
- D $40^{\circ} \sim 50^{\circ}$
- E 0°

正确答案：B 您选择的答案：

第9题 运动系统最重要的体征，是

- A 肿胀
- B 波动
- C 肿块
- D 压痛
- E 运动受限

正确答案：D 您选择的答案：

第10题 运动系统理学检查次序，是

- A 触望动量，特殊检查

- B 动量触望，特殊检查
- C 望触动量，特殊检查
- D 量动望触，特殊检查
- E 特殊检查，望触动量

正确答案：C 您选择的答案：

第11题 了解下肢和足血循环，最重要的检查是

- A 足趾能主动活动
- B 足是否肿胀或发凉
- C 足趾被动活动是否疼痛
- D 足背动脉触诊
- E 腹动脉触诊

正确答案：D 您选择的答案：

第12题 测量两下肢真实长度时，一般误差不应超过

- A 0.1cm
- B 0.2cm
- C 0.5cm
- D 1.0cm
- E 2.0cm

正确答案：C 您选择的答案：

第13题 肱骨下1/3骨折，哪项检查，简单实用正确

- A 肱骨下1/3部位CT叮
- B 肱骨全长的X线正侧位
- C 肱骨下1/3为中心MRI
- D 肱骨下1/3为中心，包括肘关节的正侧位
- E 肱骨下1/3正侧，斜位X线片

正确答案：D 您选择的答案：

第14题 测定大粗隆上移，可用哪种方法确定

- A Bryant三角
- B Chamberlain线
- C Pauwels角
- D Codman三角
- E Schmorl 结节

正确答案：A 您选择的答案：

第15题 骨科的理学检查，X线检查，和什么检查称为"三结合"检查

- A 病理检查
- B 实验室检查
- C 关节镜检查
- D 电生理检查
- E 神经系统检查

正确答案：A 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第16题 男性，20岁工人。在工地右大腿，被砸伤，当即不能站立，局部剧痛，用哪种检查最安全迅速，无痛，还可判断有无骨折

- A 移动式小型X线机照像
- B 检查有否骨磨擦音
- C 检查有否异常活动
- D 听诊
- E 有否纵向压痛

正确答案：D 您选择的答案：

第17题 8岁男孩，左大腿轻微外伤后，第二天出现局部明显肿胀，剧痛，不敢活动，高热，来院后，最有意义的检查哪项

- A 测体温
- B 拍X线片
- C 超声探查
- D 局部检查
- E 分层穿刺

正确答案：E 您选择的答案：

第18题 患者，一小时前，被他人刺伤左腹股沟中部，来院时，伤口有大量鲜血涌出，此时最先应检查的是

- A 足部有否主动活动
- B 触诊足背和胫后动脉
- C 检查膝腱或跟腱反射
- D 检查肢体感觉有无缺失
- E 立即做X线检查

正确答案：B 您选择的答案：

第19题 要确诊为腰椎间盘突出脱出的患者，手术前除实验室化验检查外，首先最应做的检查是哪项

- A 肌电图
- B CT
- C MRI

- D 腰椎管造影
- E 腰椎正侧位X线平片

正确答案：E 您选择的答案：

第20题 男患。2小时前。右手中指被刀砍伤，致屈指深，浅肌腱损伤，来院首先应进行的检查是

- A 详细检查伤口情况
- B 有无骨折存在
- C 手的休息位有无改变
- D 手的功能位
- E 有无指神经损伤

正确答案：C 您选择的答案：

第21题 股骨下1/3被砸伤患者，局部肿胀，疼痛，畸形，首先正确的检查是什么

- A 包括胫骨上1/3在内的膝关节正侧位X线片
- B 包括膝关节在内的股骨下1/3正侧位X线片
- C 股骨下1/3横断面的CT
- D 检查有无骨摩擦音
- E 检查有无异常活动

正确答案：B 您选择的答案：

第22题 腰椎结核伴有右髂窝脓肿，检查时托马斯征(Thomas)阳性，说明

- A 髋关节活动受限
- B 右下肢有放射性疼痛
- C 右侧髂腰肌受刺激
- D 右股四头肌受刺激
- E 臀大肌受刺激

正确答案：C 您选择的答案：

第23题 月腓窝部软组织严重损伤伴有腓动脉断裂的患者就诊是，最简单直接的检测手段是

- A 触诊足背动脉
- B 拍X线片检查
- C 观察小腿和足的肿胀情况
- D 检查小腿和足的感觉
- E 检查小腿和足的运动

正确答案：A 您选择的答案：

第24题 胸椎骨折脱位伴脊髓损伤患者，双下肢出现完全性瘫，这时的肌力是几级

- A 0级
- B 1级
- C 2级
- D 4级
- E 5级

正确答案：A 您选择的答案：

第25题 颈部疼痛，四肢无力2年患者，检查时出现第二肋间以下感觉明显减弱，对其诊断最有意义的检查

- A 胸椎的X线平片
- B 颈椎的X线平片
- C 颈椎的MRI
- D 胸椎的MRI
- E 全身详细的体检

正确答案：C 您选择的答案：

第26题 颈6骨折脱位伴截瘫患者，检查时，股四头肌稍有收缩，但不引起膝关节活动，这时的肌力应该是

- A 1级
- B 2级
- C 3级
- D 4级
- E 5级

正确答案：A 您选择的答案：

第27题 高处坠落致脊髓损伤的患者，来院后哪项检查，最能准确的确定脊髓损伤的平面

- A 检查感觉平面
- B 检查肢体的运动
- C 检查肢体的温度
- D MRI 检查
- E X线平片

正确答案：D 您选择的答案：

三、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第28-29题

车祸造成右小腿中上段皮裂伤，短缩，成角畸形并有骨外露

1. 来院后，首先应用哪项理学检查

- A 量诊
- B 触诊
- C 初诊
- D 听诊
- E 望诊

2. 理学检查后，还要作哪项最必要的检查

A 右小腿中上1/3为中心的包括膝关节在内的X线正侧位平片

B CT

C 血常规检查

D 电生理检查

E 右小腿的全长X线正侧位平片

正确答案：EA 您选择的答案：

四、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第30-31题

A 垂腕垂指畸形

B 爪形手畸形

C 猿手畸形

D 锅铲畸形

E 以上都不是

1. 尺神经损

2. 桡神经损

正确答案：BA 您选择的答案：

习题集 外科学 原发纵隔肿瘤

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 多位于前纵隔接近心底部心脏大血管前方的肿瘤是

- A．胸骨后甲状腺肿
- B．胸腺瘤
- C．畸胎瘤
- D．心包囊肿
- E．脂肪瘤

正确答案：C 您选择的答案：

第2题 可呈“哑铃”状生长的纵隔肿瘤是

- A．胸腺瘤
- B．气管囊肿
- C．心包囊肿
- D．畸胎瘤
- E．神经源肿瘤

正确答案：E 您选择的答案：

第3题 容易合并重症肌无力的纵隔肿瘤是

- A．神经源肿瘤
- B．纵隔淋巴肉瘤
- C．畸胎瘤
- D．胸腺瘤
- E．胸骨后甲状腺肿

正确答案：D 您选择的答案：

第4题 简单的纵隔划区法是从以下哪项水平连线为界把纵隔分为上下两部分的

- A．胸骨柄与第4胸椎上缘的水平连线
- B．胸骨柄与第4胸椎下缘的水平连线
- C．胸骨角与第4胸椎上缘的水平连线
- D．胸骨角与第4胸椎下缘的水平连线
- E．胸骨角与第4胸椎中点的水平连线

正确答案：D 您选择的答案：

第5题 女性，20岁，咳嗽，咳脓痰及痰中带豆腐渣样物1天。胸片显示心包底左前侧直径长7cm肿块，密度不均，内有钙化。最可能的诊断是

- A．肺脓肿
- B．畸胎瘤
- C．淋巴源性肿瘤
- D．胸腺瘤并感染
- E．神经源性肿瘤

正确答案：B 您选择的答案：

第6题 前纵隔内最常见的纵隔肿瘤是

- A．胸腺瘤
- B．胸骨后甲状腺肿
- C．淋巴源性肿瘤
- D．畸胎瘤与皮样囊肿
- E．心包囊肿

正确答案：D 您选择的答案：

第7题 神经源性纵隔肿瘤好发于

- A．前纵隔
- B．前上纵隔
- C．中纵隔
- D．前下纵隔
- E．后纵隔

正确答案：E 您选择的答案：

第8题 关于胸腺瘤，哪项是错误的

- A 多位于前上纵隔
- B 分为上皮细胞型，淋巴细胞型，混合型
- C 潜在恶性
- D 约15%合并重症肌无力
- E 重症肌无力都合并有胸腺瘤

正确答案：E 您选择的答案：

第9题 关于纵隔肿瘤症状，下述哪项是错误的

- A 其症状的程度及发生时间与肿瘤的部位，生长速度相关
- B 大部分患者在体检时偶然发现
- C 每一类肿瘤都有相应的症状
- D 一部分患者有胸闷，胸痛症状
- E 一部分患者有压迫相应器官的症状

正确答案：C 您选择的答案：

第10题 前上纵隔肿瘤，最常见的是

- A 胸骨后甲状腺肿
- B 畸胎瘤
- C 淋巴类肿瘤
- D 皮样囊肿
- E 心包囊肿

正确答案：A 您选择的答案：

第11题 纵隔良性肿瘤多呈

- A. 膨胀性生长，进展缓慢
- B. 浸润性生长，进展迅速
- C. 时有时无，位置不定
- D. 忽大忽小，形态多变
- E. 抗炎治疗可迅速缩小

正确答案：A 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第12题 男性，18岁。入学查体胸透，发现左侧胸腔第6胸椎旁有直径6cm圆形肿大影。最可能的诊断是

- A 畸胎瘤
- B 胸腺瘤
- C 中央型肺癌
- D 神经源性肿瘤
- E 淋巴源性肿瘤

正确答案：D 您选择的答案：

第13题 女性，20岁。发热，咳嗽，咳脓痰及痰中带豆腐渣样物1天。胸片显示心包底左前侧直径长7cm肿块，密度不均，内有钙化。最可能的诊断是

- A 肺脓肿
- B 畸胎瘤
- C 淋巴源性肿瘤
- D 胸腺瘤并感染
- E 神经源性肿瘤

正确答案：B 您选择的答案：

三、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第14-15题

男性，18岁。入学体检胸透，发现左侧胸腔第6胸椎旁有直径6cm圆形肿大影。

1. 最可能的诊断是

- A. 畸胎瘤
- B. 胸腺瘤
- C. 中央型肺癌
- D. 神经源性肿瘤
- E. 淋巴源性肿瘤

2. 如诊断成立，治疗应考虑

- A. 药物治疗
- B. 放射疗法
- C. 放疗加化疗
- D. 手术切除
- E. 免疫疗法

正确答案：DD 您选择的答案：

四、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第16-19题

- A. 胸腺瘤
- B. 胸骨后甲状腺肿
- C. 畸胎瘤
- D. 支气管囊肿
- E. 神经源性肿瘤

1. 临床最常见的后纵隔肿瘤是
2. 多位于前上纵隔的纵隔肿瘤是
3. 多位于前纵隔，接近心底部心脏大血管前方的纵隔肿瘤是
4. 最常合并重症肌无力表现的纵隔肿瘤是

正确答案：EACA 您选择的答案：

第20-22题

- A 胸腺瘤
- B 畸胎瘤
- C 心包囊肿
- D 神经源性肿瘤
- E 淋巴源性肿瘤

1. 合并有重症肌无力的纵隔肿瘤，是
2. 后纵隔最常见的纵隔肿瘤，是

3. 瘤体内含有骨骼及毛发的肿瘤，是
正确答案：ADB 您选择的答案：

习题集 外科学 食管癌

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 较早出现食管阻塞的食管癌，病理类型，常是

- A 溃疡型
- B 硬化型
- C 蕈伞型
- D 髓质型
- E 癌侵及周围组织

正确答案：B 您选择的答案：

第2题 食管癌病人，进食后全部吐出、脱水、每日输液，左锁骨上淋巴结肿大，血红蛋白88g/L，食管钡透癌肿长约8.0cm，选用哪种治疗方法最适宜

- A 食管部分切除胃吻合术
- B 胃造瘘术
- C 局部放疗
- D 全身化疗
- E 输血补液支持疗法

正确答案：A 您选择的答案：

第3题 食管癌起于食管的

- A 粘膜层
- B 粘膜下层
- C 环行肌层
- D 纵行肌层
- E 肌膜层

正确答案：A 您选择的答案：

第4题 与手术疗法相配合，有助于提高食管鳞癌切除率的方法是

- A 放射治疗
- B 化学药物治疗
- C 中医治疗
- D 抗生素治疗
- E 免疫治疗

正确答案：E 您选择的答案：

第5题 中期食管癌手术切除范围应距癌瘤

- A 2cm
- B 2~3cm
- C 3~5cm
- D 5cm以上
- E 7cm以上

正确答案：D 您选择的答案：

第6题 食管癌早期诊断简易而有效的方法，是

- A X线食管钡透
- B 食管镜检查
- C 带网气囊检查
- D 气管镜检查
- E 同位素扫描

正确答案：C 您选择的答案：

第7题 食管炎与早期食管癌的鉴别，主要方法是

- A 胸骨灼痛
- B 食管钡透粘膜紊乱
- C 脱落细胞检查
- D 免疫诊断方法
- E 试验治疗

正确答案：C 您选择的答案：

第8题 食管癌病人有持续性胸背痛，多表示

- A 癌肿部有炎症
- B 癌已侵犯食管外组织
- C 有远处血行转移
- D 癌肿较长
- E 食管气管瘘

正确答案：B 您选择的答案：

第9题 食管癌的典型症状是

- A 咽下疼痛
- B 食管内异物感
- C 胸骨后烧灼感
- D 进行性咽下困难
- E 呕吐粘液

正确答案：D 您选择的答案：

第10题 食管癌好发于食管

- A. 颈段
- B. 上段
- C. 中段
- D. 下段
- E. 腹段

正确答案：C 您选择的答案：

第11题 食管癌的早期临床表现是

- A. 声音嘶哑
- B. 锁骨上淋巴结转移
- C. 持续性胸背疼痛
- D. 吞咽困难
- E. 食管异物感和梗噎感

正确答案：E 您选择的答案：

第12题 早，中期食管癌常用的手术方法是

- A. 食管胃转流术
- B. 食管癌切除，用结肠食管重建术
- C. 食管癌切除，用胃食管重建术
- D. 食管癌切除，用空肠食管重建术
- E. 胃造瘘术

正确答案：C 您选择的答案：

第13题 食管癌患者进食呛咳，提示

- A. 癌侵犯吞咽神经
- B. 上段食管癌
- C. 食管气管瘘
- D. 癌肺转移
- E. 伴有气管炎

正确答案：C 您选择的答案：

第14题 食管癌淋巴转移最终可能转至

- A. 锁骨上淋巴结
- B. 食管旁淋巴结
- C. 上纵隔淋巴结
- D. 气管分叉淋巴结
- E. 腹上淋巴结

正确答案：A 您选择的答案：

第15题 食管癌的典型症状，是

- A. 胸骨后烧灼感
- B. 食管内异物感
- C. 咽下食物哽噎感
- D. 咽下食物停滞感
- E. 进行性吞咽困难

正确答案：E 您选择的答案：

第16题 食管癌好发部位，是

- A. 颈部食管
- B. 胸部食管上段
- C. 胸部食管中段
- D. 胸部食管下段
- E. 腹部食管

正确答案：C 您选择的答案：

第17题 食管癌主要为

- A. 小细胞未分化癌
- B. 腺癌
- C. 神经内分泌癌
- D. 鳞癌
- E. 鳞腺癌

正确答案：D 您选择的答案：

第18题 食管癌病理分型，哪项是错误的

- A. 狭窄型
- B. 蕈伞型
- C. 梗阻型
- D. 髓质型
- E. 溃疡型

正确答案：C 您选择的答案：

第19题 哪一项不是食管癌的手术禁忌证

- A. 声音嘶哑
- B. 食管严重狭窄
- C. 持续胸背痛
- D. 锁骨上淋巴结转移
- E. 发生食管气管瘘

正确答案：B 您选择的答案：

第20题 高度怀疑食管癌而未确诊者，最有价值的检查方法是

- A. 食管镜取活组织检查
- B. 隔期食管钡透视
- C. 反复采用摩擦拉网法
- D. 开胸探查
- E. 纵隔镜检查

正确答案：A 您选择的答案：

第21题 早期食管癌的病变范围，是

- A. 限于粘膜层
- B. 侵入或穿透肌层
- C. 远处淋巴能够转移
- D. 其他器官转移
- E. 病变长度超过5cm

正确答案：A 您选择的答案：

第22题 食管原位癌是指

- A. 限于黏膜内
- B. 超过黏膜下层
- C. 不超过肌层
- D. 未侵及全层食管
- E. 未发展到食管壁1周

正确答案：A 您选择的答案：

第23题 早期食管癌病人治疗，首选是

- A. 化学疗法
- B. 放射疗法
- C. 激光疗法
- D. 手术疗法
- E. 免疫疗法

正确答案：D 您选择的答案：

第24题 食管下段癌的治疗原则是

- A. 先放射治疗后手术
- B. 先手术后放射治疗
- C. 单纯放射治疗
- D. 先化学治疗后手术
- E. 手术切除、手术前后不宜放射治疗

正确答案：B 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第25题 女性，30岁，间歇性进食梗噎，胸骨后憋胀，偶有呕吐5年，伴消瘦，食管吞钡造影，见食管贲门呈"鸟嘴样"改变，应诊断为

- A. 食管癌
- B. 食管腐蚀性狭窄
- C. 贲门失弛症
- D. 食管炎
- E. 食管痉挛

正确答案：C 您选择的答案：

第26题 男性，54岁进行性吞咽困难已半年，食管钡透见中段食管有6cm长狭窄，管壁僵硬，粘膜破坏，最适宜的治疗方法

- A. 放射疗法
- B. 化学疗法
- C. 激光疗法
- D. 放疗和手术切除
- E. 胃造瘘术

正确答案：D 您选择的答案：

第27题 病人，22岁。吞咽不畅，胸骨后沉重不适，症状时轻时重，时有呕吐，吐出食管滞留的食物，病史2年，用药症状无缓解，作食管钡剂造影，食管下端呈鸟嘴样狭窄，该病人诊断是

- A. 食管癌
- B. 食管良性肿瘤
- C. 贲门失弛缓症
- D. 食管炎
- E. 食管憩室

正确答案：C 您选择的答案：

第28题 女性，40岁，进食后胸骨后刺痛伴梗噎感2个月。X线食管钡餐检查示：食物通过贲门时受阻。最可能的诊断是

- A. 贲门癌
- B. 食管良性肿瘤
- C. 神经官能症
- D. 食管炎
- E. 贲门失弛缓症

正确答案：C 您选择的答案：

第29题 中段食管癌患者50岁，进行性吞咽困难6个月，完全不能进食2个月。体检：消瘦、脱水，左锁骨上可触及直

径2cm坚硬淋巴结，不能推动，治疗应首选

- A．手术切除
 - B．放射治疗
 - C．化学治疗
 - D．输血、输液、保守治疗
 - E．食管、胃转流术或胃造瘘术
- 正确答案：D 您选择的答案：

第30题 男性，40岁。平时喜欢饮热开水及热粥，近5个月有进食困难，并逐渐加重。钡餐检查：食管中段有5cm狭窄，粘膜；断裂，最可能的诊断是

- A 食管癌
- B 食管瘢痕性狭窄
- C 食管炎
- D 贲门失弛缓症
- E 食管静脉曲张

正确答案：A 您选择的答案：

第31题 男性，50岁。咽部异物感1月，肝炎病史20年。查体：锁骨上未触及肿大淋巴结，肝脾不大。进一步检查，首先应考虑

- A 食管镜
- B 胸部CT
- C 腹部超声波
- D 食管x线钡餐透视
- E 带网气囊食管脱落细胞检查

正确答案：D 您选择的答案：

第32题 男性，70岁。吞咽困难3个月。食管钡透：中段有3cm的不规则食管充盈缺损，取活体组织病检为鳞癌。心电图有ST段下降，T波倒置，肺功：严重障碍，其治疗方法为

- A 药物治疗
- B 根治性手术切除
- C 姑息性手术
- D 放射治疗
- E 胃造瘘术

正确答案：D 您选择的答案：

第33题 男性，56岁，因进行性吞咽困难5个月就诊，入院诊断为食管癌，决定行食管癌切除术。试问食管癌治疗方法应除外下列哪项

- A．食管癌切除后，结肠代食管
- B．食管癌切除后，空肠代食管
- C．食管癌切除后，食管断端吻合
- D．食管癌切除后，胃代食管
- E．胃造瘘术

正确答案：B 您选择的答案：

第34题 男性，55岁。进行性吞咽困难7个月，近20天只能进少量牛奶。查体：明显消瘦，脱水，锁骨上可触及肿大淋巴结，x线食管造影见中下段食管有约8cm狭窄，粘膜不平整，上段食管轻度扩张，其治疗方法是

- A 病变食管切除，食管重建
- B 食管内置管术
- C 放射疗法
- D 放疗后手术切除
- E 胃造瘘术

正确答案：E 您选择的答案：

第35题 病人，50岁。进行性下咽困难4个月。食管造影上段食管3cm长狭窄，粘膜破坏，采用的治疗是

- A 病变食管切除
- B 胃造瘘术
- C 食管内置管术
- D 化学疗法
- E 放射疗法

正确答案：E 您选择的答案：

第36题 一贲门失弛缓症患者，病史10余年，近一月症状加重，反复呕吐，其治疗方法为

- A 少食多餐
- B 饭后散步
- C 应用平滑肌松弛药
- D 扩张疗法
- E 食管下段及贲门肌层切开

正确答案：E 您选择的答案：

第37题 男性，52岁。6个月发现进食哽噎感，其后症状逐渐加重，近3周只能进全流质，体重减轻，体力下降。查体：脉搏80次/分，血压17/12kPa，体温36.5℃，消瘦，颈，锁骨上淋巴结未触及，化验正常，食管钡剂造影，于食管中、下段见8cm狭窄，粘膜破坏，其诊断是

- A 贲门失弛缓症
- B 食管良性肿瘤
- C 腐蚀性食管灼伤
- D 食管炎
- E 食管癌

正确答案：E 您选择的答案：

第38题 食管癌根治食管胃吻合术后第6天，出现呼吸困难、胸痛，高热，白细胞 $19 \times 10^9/L$ ，分叶核0.90，下列

哪种并发症可能性大

- A. 肺炎
- B. 吻合口瘘
- C. 切口感染
- D. 乳糜胸
- E. 腹腔感染

正确答案：B 您选择的答案：

三、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第39-40题

男性，50岁。吞咽困难3个月，现尚能进半流质食物。体格检查：锁骨上未触及肿大淋巴结

1. 最先考虑的诊断是

- A. 食管炎
- B. 食管癌
- C. 食管平滑肌瘤
- D. 食管静脉曲张
- E. 贲门失弛缓症

2. 首先应选择的检查是

- A. 食管镜
- B. 胸部X线
- C. 食管X线钡餐透视
- D. 胸部及纵隔CT
- E. 腹部超声波和肝功检查

正确答案：BC 您选择的答案：

第41-43题

男性，65岁。进行性吞咽困难2个月，现仅能进流质食物。查体：消瘦，锁骨上未触及肿大淋巴结，食管x线钡餐透视显示：食管中段粘膜破坏，充盈缺损，管腔狭窄

1. 进一步检查，应首选

- A. 食管镜
- B. 食管拉网
- C. 放射性核素
- D. 胸部及纵膈CT
- E. 腹部超声波和肝功检查

2. 如病人出现声音嘶哑，提示：肿瘤已侵犯

- A. 声带
- B. 气管隆突
- C. 迷走神经
- D. 喉返神经
- E. 喉上神经

3. 腹部超声波检查发现肝内有多发性转移瘤，提示，来自食管癌的

- A. 直接浸润
- B. 血行转移途径
- C. 淋巴转移途径
- D. 种植转移途径
- E. 消化道粘膜下浸润

正确答案：ADB 您选择的答案：

第44-46题

男性，48岁，进食梗噎1个月余，营养状况尚好，双锁骨上淋巴结无肿大，胸部X线片两肺清晰，食管钡餐造影示食管中段僵直，管腔狭窄，长约7.5cm。

1. 病人可能的诊断为

- A. 食管化学性烧伤
- B. 食管平滑肌瘤
- C. 反流性食管炎
- D. 食管癌
- E. 贲门失弛缓症

2. 为进一步明确诊断还需做哪些重要检查

- A. 胸部CT
- B. 食管镜
- C. MRI检查
- D. 腹部B超检查
- E. 食管脱落细胞检查

3. 如诊为食管癌，下列哪项为最佳治疗方案

- A. 手术治疗
- B. 化疗+手术
- C. 手术后放疗
- D. 术前放疗后手术
- E. 单纯放疗

正确答案：CBC 您选择的答案：

四、A4型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第47-49题

男性，70岁，进行性吞咽困难半年，现只能进半流质。

1. 若查食管X线钡餐造影，下列哪项不是早期表现

- A. 食管管壁局限性僵硬
- B. 一侧管壁长2.5cm的充盈缺损
- C. 管腔狭窄伴钡剂梗阻
- D. 局限性黏膜皱襞增粗和断裂
- E. 食管壁直径为1cm的溃疡龛影

2. 为确诊，最有效的检查方法是

- A. 食管镜取活组织检查
- B. 反复采用摩擦拉网法
- C. 开胸探查
- D. 隔期食管钡透视
- E. 反复行纵隔CT检查

3. 患者如出现下列情况，不能提示远处转移的是

- A. 锁骨上淋巴结肿大
- B. 肝大
- C. 胸水
- D. 腹水
- E. 明显消瘦

正确答案：CAE 您选择的答案：

五、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第50-52题

- A. 食管息肉
- B. 食管平滑肌瘤
- C. 食管下段静脉曲张
- D. 食管憩室
- E. 食管炎

1. 老年男性，以脱入口腔肿物就诊

2. 进食轻微哽噎，食管造影见中段半圆形外压改变

3. 反酸、剑突后灼痛，食管镜见食管下段粘膜充血糜烂

正确答案：ABE 您选择的答案：

第53-54题

- A. 食管良性肿瘤
- B. 贲门失弛缓症
- C. 食管癌
- D. 食管良性狭窄
- E. 食管憩室

1. 58岁男性患者，长期过硬、过热饮食且进食过快，近3个月来，进行性吞咽困难，消瘦乏力，食管钡餐X线造影示：食管下段充盈缺损，管腔狭窄，局部黏膜断裂，该患者诊断应是

2. 25岁男青年，消瘦，胸骨后不适，吞咽困难时轻时重，时有呕吐，食管钡餐X线造影可见食管扩大，并有液平，下端呈鸟嘴状，诊断为

正确答案：CB 您选择的答案：

第55-56题

- A. 进食时呛咳
- B. 进食时有哽噎感
- C. 进行性吞咽困难
- D. 进食后呕吐
- E. 进食后胸腹痛

1. 食管癌的早期症状为

2. 食管癌的典型症状为

正确答案：BC 您选择的答案：

第57-58题

- A. 溃疡型
- B. 缩窄型
- C. 髓质型
- D. 腔内型
- E. 蕈伞型

1. 癌肿呈环形生长，阻塞症状出现早的是

2. 癌肿浸润管壁各层及全周，恶性程度高的是

正确答案：BC 您选择的答案：

习题集 外科学 肺癌

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 对放疗最敏感的肺癌是

- A．鳞癌
- B．腺癌
- C．小细胞癌
- D．大细胞癌
- E．细支气管肺泡癌

正确答案：C 您选择的答案：

第2题 诊断肺癌常用最主要手段，是

- A 痰细胞学检查
- B 支气管检查
- C 胸部X线检查
- D 胸水检查
- E 胸壁穿刺活检

正确答案：C 您选择的答案：

第3题 肺癌较常见的类型，是

- A 腺癌
- B 未分化癌
- C 肺泡细胞癌
- D 鳞状细胞癌
- E 小细胞肺癌

正确答案：D 您选择的答案：

第4题 较早出现淋巴和血行转移的肺癌是

- A．鳞癌
- B．腺癌
- C．小细胞癌
- D．大细胞癌
- E．Pancoast's瘤

正确答案：C 您选择的答案：

第5题 肺癌的转移方式中，下列何者正确

- A 鳞癌发生血行转移出现早
- B 肺泡细胞癌，早期血行淋巴转移
- C 腺癌早期发生淋巴转移，血行转移较晚
- D 未分化癌早期出现血行，淋巴转移
- E 淋巴转移只发生肺癌同侧

正确答案：D 您选择的答案：

第6题 放射疗法禁忌，下列哪项错误

- A 呈现恶病质者
- B 有广泛转移
- C 高度肺气肿
- D 癌性空洞，肿瘤过大
- E 肺门转移切除未彻底

正确答案：E 您选择的答案：

第7题 以下哪项为肺癌与肺结核球的鉴别诊断要点

- A．肺结核球多见于青年女性
- B．肺结核球常位于上叶
- C．肺癌多见于中老年
- D．肺结核球X线见肿块影密度不均匀有钙化点，周围常有散在性结构病灶
- E．肺癌常表现刺激性咳嗽

正确答案：D 您选择的答案：

第8题 小细胞肺癌的特点是

- A．女性常见
- B．发病率最高
- C．周围型多见
- D．恶性程度最高
- E．对放疗和化疗不敏感

正确答案：D 您选择的答案：

第9题 下列哪项不属于肺癌的非转移全身症状

- A．杵状指(趾)
- B．重症肌无力
- C．Homer's综合征
- D．Cushing's综合征
- E．男性乳腺增生

正确答案：C 您选择的答案：

第10题 早期中心型肺癌诊断阳性率较高的方法是

- A．胸片

- B. 普通断层片
- C. 胸部CT
- D. 纤维支气管镜
- E. 肺放射性核素扫描

正确答案：D 您选择的答案：

第11题 对放疗最敏感的肺癌，是

- A. 小细胞未分化癌
- B. 鳞癌
- C. 腺癌
- D. 肺泡细胞癌
- E. 以上均不敏感

正确答案：A 您选择的答案：

第12题 右肺癌病人，哪一种情况不宜手术治疗

- A. 右肺门淋巴结肿大
- B. 气管旁淋巴结肿大
- C. 双侧肺门淋巴结肿大
- D. 上腔静脉后淋巴结肿大
- E. 以上都不是

正确答案：C 您选择的答案：

第13题 细支气管肺泡癌属于

- A. 鳞癌
- B. 小细胞癌
- C. 腺癌
- D. 大细胞癌
- E. 混合型癌

正确答案：C 您选择的答案：

第14题 早期肺癌，首选的治疗方法，是

- A. 药物治疗
- B. 放射疗法
- C. 放疗加化疗
- D. 手术切除病肺
- E. 免疫疗法

正确答案：D 您选择的答案：

第15题 肺癌早期表现为

- A. 无症状
- B. 刺激性咳嗽
- C. 痰中带血
- D. 少量咯血
- E. 以上都是

正确答案：E 您选择的答案：

第16题 早期即可发生淋巴转移最常见的肺癌是

- A. 鳞癌
- B. 腺癌
- C. 鳞腺癌
- D. 小细胞癌
- E. 大细胞癌

正确答案：D 您选择的答案：

第17题 诊断早期中央型肺癌最有价值的检查方法是

- A. 胸水检查
- B. 纵隔镜检查
- C. 转移灶活组织检查
- D. 纤维支气管镜检查
- E. 经胸壁穿刺活组织检查

正确答案：D 您选择的答案：

第18题 肺癌常见的症状，是

- A. 脓性痰
- B. 白色泡沫样痰
- C. 血痰
- D. 胸闷，气短
- E. 肺部干啰音

正确答案：C 您选择的答案：

第19题 中央型肺癌最常见的症状是

- A. 胸痛
- B. 发热
- C. 胸闷气促
- D. 反复咯血
- E. 刺激性咳嗽

正确答案：E 您选择的答案：

第20题 肺鳞癌的特点是

- A. 发病年龄较小

B. 起源于段支气管以下
C. 生长速度快，病程短
D. 对放疗和化疗较敏感
E. 较早出现淋巴和血行转移
正确答案：D 您选择的答案：

第21题 早期肺癌，首选的治疗方法是

A. 药物治疗
B. 放射疗法
C. 放疗加化疗
D. 手术切除病肺
E. 免疫疗法
正确答案：D 您选择的答案：

第22题 下列哪项对肺鳞癌不正确

A 肺癌中最常见
B 常为中心型
C 生长迅速，病程短
D 对放疗，化疗较敏感
E 血行转移发生晚
正确答案：C 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第23题 男性，37岁。右上叶肺癌切除术后24小时，肺癌的非转移性全身症状即逐渐消失。此类症状不包括

A 骨关节痛
B 重症肌无力
C 男性乳腺增大
D Cushing综合征
E 颈交感神经综合征
正确答案：E 您选择的答案：

第24题 男性，35岁。刺激性咳嗽并痰中带血丝6个月。胸片示左肺中央型块影，左肺上叶不张，左胸腔中量积液，右纵隔阴影增宽，轮廓呈波浪形。右侧的病变应考虑是肺癌的

A 交叉转移
B 直接扩散
C 细胞脱落种植
D 经肺循环血行转移
E 经体循环血行转移
正确答案：A 您选择的答案：

第25题 男性，35岁，刺激性咳嗽痰中带血丝6个月。胸片显示左肺中央型块影，左肺上叶不张，左胸膜腔中量积液；右纵隔阴影增宽，轮廓呈波浪形。右侧的病变应考虑是肺癌的

A. 交叉转移
B. 直接扩散
C. 细胞脱落种植
D. 经肺循环血行转移
E. 经体循环血行转移
正确答案：A 您选择的答案：

第26题 男性，40岁。20年前患过肺结核外，平素健康，近3个月来有刺激性咳嗽，痰中偶有血丝，有时发热。x线示：右肺上叶前段有2cm×2.5cm的块状阴影，边缘不整呈分叶状，痰查脱落细胞3次均阴性，诊断首先考虑

A 肺结核
B 肺脓肿
C 肺囊肿
D 肺癌
E 肺良性肿瘤
正确答案：D 您选择的答案：

第27题 男性，30岁。低热，咳嗽并痰中偶带血丝20天，胸片显示右肺上叶不张。最可能的诊断是

A 肺癌
B 肺脓肿
C 肺结核球
D 支气管肺炎
E 纵隔淋巴肉瘤
正确答案：A 您选择的答案：

第28题 男性，65岁。低热，咳嗽并痰中带血丝3个月。胸片显示左肺上叶不张，少量胸膜腔积液。为确诊，进一步检查应首选

A 胸部CT
B 剖胸探查
C 胸腔镜检查
D 支气管镜检查
E 经胸壁穿刺活组织检查
正确答案：D 您选择的答案：

第29题 肺结核球的特点，是

A 常有薄壁空洞

- B 可发生淋巴转移
- C 好发肺上叶尖段
- D 浅表淋巴结肿大
- E 全身毒性症状明显

正确答案：C 您选择的答案：

第30题 女性，68岁，无吸烟史，咳嗽1个月，胸痛2周。胸部X线提示：右下肺周围型占位，伴胸膜凹陷征；头颅CT示：颅腔占位，转移性肿瘤可能，考虑肺癌脑转移，其肺部肿瘤最可能的病理类型为

- A. 腺癌
- B. 鳞癌
- C. 细胞未分化癌
- D. 类癌
- E. 大细胞癌

正确答案：A 您选择的答案：

第31题 男性，29岁。刺激性咳嗽1个月，头痛10天。胸片显示左肺门块状阴影；颅脑CT发现颅内占位性病变。考虑肺癌脑转移，肺内原发癌最可能的病理类型，是

- A 鳞癌
- B 腺癌
- C 小细胞癌
- D 大细胞癌
- E 细支气管肺泡癌

正确答案：C 您选择的答案：

第32题 男性，49岁。刺激性咳嗽5个月，视物不清10天。胸片示左肺上叶尖段边缘直径8cm不规则块状阴影。此病变造成的颈交感神经综合征不包括

- A 面部无汗
- B 瞳孔缩小
- C 眼球内陷
- D 声音嘶哑
- E 上眼睑下垂

正确答案：D 您选择的答案：

三、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第33-35题

男性，67岁。咳嗽，痰中带血丝2个月，发热10天，胸片显示右肺上叶片状阴影，呈肺炎样征象

1. 为明确诊断，应首选

- A 胸部CT
- B 剖胸探查
- C 纵隔镜检查
- D 痰细胞学检查
- E 经胸壁穿刺活组织检查

2. 病人1个月后发现右面部无汗，瞳孔缩小，上睑下垂及眼球内陷。复查胸片显示右胸顶部致密块影，诊断最可能是

- A 转移性肺癌
- B 中央型肺癌
- C 粟粒性肺结核
- D 纵隔淋巴瘤
- E Pancoast肿瘤

3. 病人出现的以上症状，是由于肿瘤侵犯或压迫了

- A 膈神经
- B 喉返神经
- C 臂丛神经
- D 上腔静脉
- E 颈交感神经

正确答案：DEE 您选择的答案：

第36-38题

男性，58岁，20年吸烟史。刺激性咳嗽并痰中带血丝6个月。胸片示左肺中央型块影，左肺上叶不张，左胸腔中量积液，右纵隔阴影增宽，轮廓呈波浪形。

1. 为确诊，进一步检查应首选

- A. 胸部CT
- B. 剖胸探查
- C. 胸腔镜检查
- D. 支气管镜检查
- E. 经胸壁穿刺活组织检查

2. 该患者诊断为肺癌，右侧的病变更应考虑是肺癌的

- A. 交叉转移
- B. 直接扩散
- C. 细胞脱落种植
- D. 经肺循环血行转移
- E. 经体循环血行转移

3. 首选的治疗方法是

- A. 药物治疗
- B. 放射疗法
- C. 放疗加化疗
- D. 手术切除病肺
- E. 免疫疗法

正确答案：DEC 您选择的答案：

第39-40题

男性，40岁，不规则发热半月，两侧锁骨上均可触及肿大淋巴结，胸片示上纵隔增宽及两肺门肿块影，气管镜示两侧支气管粘膜轻度充血。

1. 诊断首选
 - A. 中心型肺癌
 - B. 纵隔淋巴瘤
 - C. 周围型肺癌
 - D. 肺门淋巴结核
 - E. Pancoast's瘤
2. 进一步检查首选
 - A. 锁骨上淋巴结活检
 - B. 胸部CT
 - C. 纵隔镜
 - D. 痰细胞学检查
 - E. 胸腔镜

正确答案：BA 您选择的答案：

第41-42题

女性，31岁。咳嗽，咳白色泡沫样痰1年，胸痛20天，胸片显示右肺下叶背段有一直径3cm分叶状阴影，密度不均匀并见钙化点

1. 最可能的诊断是
 - A. 肺癌
 - B. 转移癌
 - C. 肺脓肿
 - D. 肺结核球
 - E. 肺良性肿瘤
2. 药物治疗后，胸痛消失，但复查胸片，块影略有增大。进一步必须作
 - A. 纵隔镜检查
 - B. 放射性核素扫描
 - C. 结核菌素来试验
 - D. 支气管镜检查
 - E. 晨痰培养加药敏试验

正确答案：DD 您选择的答案：

四、A4型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第43-45题

男性，67岁，咳嗽，痰中带血丝2个月，发热10天，胸片显示右肺上叶片状阴影，呈肺炎样征象。

1. 为明确诊断，应首选
 - A. 胸部CT
 - B. 剖胸探查
 - C. 纵隔镜检查
 - D. 痰细胞学检查
 - E. 经胸壁穿刺活组织检查
2. 若病人1个月后可出现右面部无汗，瞳孔缩小，上睑下垂及眼球内陷。复查胸片显示右胸顶部致密块影，诊断最可能是
 - A. 转移性肺癌
 - B. 中央型肺癌
 - C. 粟粒性肺结核
 - D. 纵隔淋巴瘤
 - E. PanCoastB中瘤
3. 病人出现的以上症状，是由于肿瘤侵犯或压迫了
 - A. 膈神经
 - B. 喉返神经
 - C. 臂丛神经
 - D. 腔静脉
 - E. 颈交感神经

正确答案：DEE 您选择的答案：

五、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第46-48题

- A. 鳞癌
 - B. 腺癌
 - C. 细胞癌
 - D. 大细胞癌
 - E. 弥漫性细支气管肺泡癌
 1. 女性相对多见，周围型，生长慢，早期易发生血性转移，对放疗及化疗相对不敏感。早期一般无明显症状，往往在胸部X线查体时发现肺内圆形或椭圆形分叶状肿块影。其病理分型为
 2. 临床常见，多为中央型。50岁以上男性多发，与吸烟关系密切，多呈淋巴转移，对放疗和化疗较敏感。其病理分型为
 3. 多为中央型，多见于男性，发病年龄轻；生长快，恶性程度高；早期即可发生淋巴及血行转移；对放疗及化疗很敏感。其病理分型为
- 正确答案：BAC 您选择的答案：

第49-51题

A 结核菌素试验

B 痰细胞学检查

C 支气管镜检查

D 痰培养加药敏试验

E 经胸壁穿刺活组织检查

1. 男性, 30岁。低热, 乏力, 咳嗽, 痰中偶带血丝1年。胸片显示, 双肺片状阴影, 轮廓模糊。进一步的检查是

2. 男性, 30岁。无吸烟史。高热, 胸痛及咳嗽1周, 咳脓痰3天, 胸片显示右肺外周圆形肿块, 中央薄壁空洞并有液平。进一步的检查是

3. 男性, 50岁。吸烟史30年, 刺激性咳嗽, 痰中带血丝3周, 胸片显示右肺门处阴影增大, 纵隔增宽, 上叶不张, 进一步的检查是

正确答案: ADC 您选择的答案:

习题集 外科学 脓胸

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 急性脓胸并发支气管胸膜瘘最主要的治疗方法是

- A．消炎治疗
- B．胸腔穿刺
- C．开放引流
- D．闭式引流
- E．以上都不是

正确答案：D 您选择的答案：

第2题 急性脓胸拔除闭式引流管主要依据

- A 体温恢复正常
- B 脓腔消失，肺完全膨胀
- C 白细胞降至正常
- D 脓汁每日少于50ml
- E 呼吸困难消失

正确答案：B 您选择的答案：

第3题 关于慢性脓胸哪项是错误的

- A．脓汁稠厚
- B．脓胸局限包裹
- C．脏、壁层纤维板
- D．排脓后肺膨胀受限
- E．纵隔向患侧移位

正确答案：D 您选择的答案：

第4题 急性脓胸最常见的致病菌是

- A．肺炎双球菌
- B．金黄色葡萄球菌
- C．链球菌
- D．绿脓杆菌
- E．结核杆菌

正确答案：B 您选择的答案：

第5题 急性脓胸经胸穿刺后，脓汁又迅速增多，其适当的治疗方法，是

- A 加大抗生素用量
- B 增加胸穿次数
- C 胸腔闭式引流
- D 周身支持疗法
- E 开胸手术清除脓汁

正确答案：C 您选择的答案：

第6题 急性脓胸并发支气管胸膜瘘者，首先选用的治疗，是

- A 胸腔穿刺排脓
- B 胸腔闭式引流术
- C 开放引流
- D 瘘口缝合
- E 病肺切除

正确答案：B 您选择的答案：

第7题 急性脓胸的治疗方法哪项是下正确的

- A．消炎治疗
- B．支持疗法
- C．开胸清除脓液
- D．闭式引流
- E．胸穿抽脓

正确答案：C 您选择的答案：

第8题 急性脓胸在病程上超过几周为慢性脓胸

- A 3周
- B 6周
- C 12周
- D 24周
- E 48周

正确答案：B 您选择的答案：

第9题 慢性脓胸主要治疗措施之一是

- A．清除胸膜腔内异物
- B．胸膜腔开放性引流
- C．应用足量广谱抗生素
- D．改进胸膜腔闭式引流
- E．胸膜腔反复穿刺抽脓、注入抗生素

正确答案：D 您选择的答案：

第10题 诊断急性脓胸最可靠的依据，是

- A 高热，胸痛

- B X线所见胸部致密影
- C 白细胞升高
- D 胸穿抽出脓液
- E 抗生素治疗有效

正确答案：D 您选择的答案：

第11题 慢性脓胸多数患者的病因是

- A 急性脓胸治疗不当
- B 血行性感染
- C 邻近气管的感染
- D 胸部外伤
- E 特异性感染

正确答案：A 您选择的答案：

第12题 急性多房性脓胸最适当的治疗方法，是

- A 大量抗生素治疗
- B 胸腔穿刺排脓
- C 胸腔闭式引流
- D 开胸清除脓汁，闭式引流
- E 胸廓改形术

正确答案：D 您选择的答案：

第13题 急性脓胸的最重要治疗措施是

- A 胸膜腔穿刺
- B 胸膜、肺切除术
- C 胸膜腔开放引流
- D 胸膜纤维板剥除术
- E 尽早开胸清除感染病灶

正确答案：A 您选择的答案：

第14题 小儿脓胸的常见致病菌

- A 金黄色葡萄球菌
- B 大肠杆菌
- C 结核杆菌
- D 绿脓杆菌
- E 真菌

正确答案：A 您选择的答案：

第15题 脓胸病人咯出的脓痰与胸穿抽出的脓汁一样，说明合并

- A 肺炎
- B 肺脓肿
- C 肺结核
- D 对抗生素不敏感
- E 支气管胸膜瘘

正确答案：E 您选择的答案：

第16题 脓胸纤维板剥除术的适应证

- A 病程短的慢性脓胸，肺内无病变
- B 急性包裹性脓胸
- C 肺内有病灶，肺不能复张
- D 伴支气管胸膜瘘
- E 病程久，肺有纤维变性

正确答案：A 您选择的答案：

第17题 适宜胸膜内胸廓成形术的脓胸是

- A 病程久，肺有纤维变性的脓胸
- B 急性包裹性脓胸
- C 小儿脓胸
- D 病程短，肺组织无病变的脓胸
- E 以上都不是

正确答案：A 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第18题 某患者1个月前发热，胸痛，咳嗽，有大量脓痰，经用抗炎治疗不见好转，1周前咳嗽加重，并有呼吸困难。胸部X线片见左胸大片状阴影，经胸穿抽出脓汁，反复穿刺排脓不能控制，其治疗应为

- A 抗炎，输血，补液
- B 继续胸穿并注入抗生素
- C 开放引流
- D 纤维板切除术
- E 低位胸腔闭式引流

正确答案：E 您选择的答案：

第19题 男性幼儿，4岁。发热，咳脓痰2周。体温波动于38 ~ 39，X线胸片示右肺下叶大片致密影，右胸腔积液。最常见的致病菌为

- A 链球菌
- B 厌氧菌
- C 肺炎球菌

- D 大肠杆菌
E 葡萄球菌

正确答案：E 您选择的答案：

第20题 男性，19岁。寒战，发热，咳脓痰3天。体温40℃，X线胸片示右肺下叶大片致密影，右胸腔积液。体格检查中不应该有的体征是

- A 气管移向健侧
B 右胸叩诊浊音
C 右胸活动度小
D 右胸肋间隙变窄
E 右肺呼吸音减弱

正确答案：D 您选择的答案：

第21题 患儿，女，5岁，发热、咳脓痰16天。体温波动于37.5~39.5℃。X线胸片示左肺下叶大片致密影，左胸腔积液。最常见的致病菌是

- A 链球菌
B 厌氧菌
C 肺炎球菌
D 大肠杆菌
E 葡萄球菌

正确答案：E 您选择的答案：

第22题 男性，23岁，搬运物体时因用力摒气，突感胸痛、胸闷，6小时后来院就诊，胸片示左侧中等量胸腔积液。在进行胸腔闭式引流术时，下列哪个部位是错误的

- A 左锁骨中线第2肋间
B 左腋中线第7肋间
C 左腋中线第6肋间
D 左腋后线第6肋间
E 左腋后线第7肋间

正确答案：A 您选择的答案：

第23题 男性，19岁，寒战，发热，咳脓痰3天。体温40℃，X线胸片示右肺下叶大片致密影，右胸腔积液。体检中不应该有的体征是

- A 气管移向健侧
B 右胸叩诊浊音
C 右胸活动度小
D 右胸肋间隙变窄
E 右肺呼吸音减弱

正确答案：D 您选择的答案：

第24题 女性，35岁，因肺炎入院治疗。在症状有所好转后又出现高热，达39.2℃，并觉右侧胸痛。体检：右肺叩诊浊音，呼吸音减低。胸片示右侧胸腔积液，胸腔穿刺抽出脓液。此时，适宜的治疗是

- A 剖胸手术，清除脓液
B 大剂量抗生素治疗
C 应用敏感抗生素，同时行胸腔闭式引流
D 胸腔内注射抗生素
E 胸腔开放引流

正确答案：C 您选择的答案：

第25题 女，12岁。因肺炎继发右侧脓胸，多次胸膜腔穿刺，脓液较为稠厚，感染中毒症状仍难控制，进一步治疗应

- A 继续胸穿抽脓，注入敏感抗生素
B 继续胸穿抽脓，全身用敏感抗生素
C 更换胸穿位置抽脓
D 闭式胸膜腔引流术
E 早日剖胸手术

正确答案：D 您选择的答案：

第26题 患者，一个月前发热，胸痛，咳嗽，有大量脓痰，经用抗炎治疗不见好转，一周前咳嗽加重，并有呼吸困难。胸部X线片见左胸大片状阴影，经胸穿抽出脓汁，反复穿刺排脓不能控制，其治疗应为

- A 抗炎，输血，补液
B 继续胸穿并注入抗生素
C 开放引流
D 纤维板切除术
E 低位胸腔闭式引流

正确答案：E 您选择的答案：

第27题 男患，11岁。发热，胸痛，咳嗽约2周，近5天有呼吸困难。体温39℃，脉搏120次/分，呼吸30次/分，胸片见：第七后肋高度有液平面，胸穿抽出稀薄脓汁，治疗方法主要是

- A 全身抗生素治疗
B 全身支持疗法
C 胸腔闭式引流
D 胸腔穿刺排脓
E 胸腔内注入抗生素

正确答案：C 您选择的答案：

三、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第28-29题

男性，36岁，胸部外伤致血胸10天。曾行胸腔穿刺治疗，近日出现寒战、高热、胸痛。X线胸片示：右胸腔积液较前增加。

1. 下述哪种治疗最恰当

- A. 胸腔闭式引流
- B. 开胸手术清除脓液
- C. 反复胸腔穿刺
- D. 胸腔闭式引流加负压吸引
- E. 每日胸腔注入抗生素

2. 为防止病情演变成慢性，最重要的是

- A. 增加营养，提高抵抗力
- B. 经常更换抗生素
- C. 防止合并结核
- D. 尽早排净胸腔积液
- E. 防止出现肺部感染

正确答案：CD 您选择的答案：

第30-32题

女性，23岁。寒战，高热，咳脓痰2天。查体：体温39.2℃，左肺闻及湿啰音，X线胸片示：左肺下叶大片状致密影，给予抗生素治疗。2天后症状加重，胸痛并呼吸困难，左胸呼吸音降低，胸片示左胸腔积液

1. 目前考虑为

- A. 重症肺炎
- B. 肺为合并肺脓肿
- C. 肺炎合并急性脓胸
- D. 肺炎合并反应性胸膜腔积液
- E. 结核性渗出性胸膜腔积液

2. 进一步诊断最有价值的方法，是

- A. 胸部CT
- B. 结核菌素试验
- C. 胸部超声波检查
- D. 左侧胸膜腔穿刺
- E. 痰细菌培养及药敏试验

3. 在治疗中的错误方法是

- A. 胸膜腔穿刺
- B. 全身支持治疗
- C. 应用广谱抗生素
- D. 胸膜腔闭式引流
- E. 胸膜腔开放引流

正确答案：CDE 您选择的答案：

第33-35题

女性，23岁，寒战，高热，咳脓痰2天。体检：体温39.2℃，左肺闻及湿啰音。X线胸片示：左肺下叶大片状致密影，给予抗生素治疗，2天后症状加重，胸痛并呼吸困难，左胸呼吸音减低，胸片示左胸腔积液。

1. 目前考虑为

- A. 重症肺炎
- B. 肺炎合并肺脓肿
- C. 肺炎合并急性脓胸
- D. 肺炎合并反应性胸膜腔积液
- E. 结核性渗出性胸膜腔积液

2. 进一步诊断最有价值的方法是

- A. 胸部CT
- B. 结核菌素试验
- C. 胸部超声波检查
- D. 左侧胸膜腔穿刺
- E. 痰细菌培养及药敏试验

3. 下列哪项治疗是错误的

- A. 胸膜腔穿刺
- B. 全身支持治疗
- C. 应用广谱抗生素
- D. 胸膜腔闭式引流
- E. 胸膜腔开放引流

正确答案：CDE 您选择的答案：

四、A4型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第36-39题

患儿，男，4岁，发热、咳脓痰2周。体温波动于38~39℃。X线胸片示右肺下叶大片致密影，右胸腔积液。

1. 目前诊断考虑为

- A. 重症肺炎
- B. 肺炎合并肺脓肿
- C. 肺炎合并急性脓胸
- D. 肺炎合并反应性胸膜腔积液
- E. 结核性渗出性胸膜腔积液

2. 进一步诊断最有价值的方法是

- A. 胸部CT
- B. 结核菌素试验
- C. 胸部超声波检查
- D. 左侧胸膜腔穿刺
- E. 痰细菌培养及药敏试验

3. 如上述诊断成立，最常见的致病菌是

- A. 链球菌
- B. 厌氧菌
- C. 肺炎球菌
- D. 大肠杆菌
- E. 葡萄球菌

4. 下列治疗方法哪项是不正确的

- A. 消炎治疗
- B. 支持疗法
- C. 开胸清除脓液
- D. 闭式引流
- E. 胸穿抽脓

正确答案：CDEC 您选择的答案：

五、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第40-41题

- A. 应用广谱抗生素
 - B. 胸腔闭式引流
 - C. 消除脓腔、恢复肺功能
 - D. 胸膜纤维板剥除术
 - E. 排净脓液、控制原发病
1. 急性脓胸的治疗原则
2. 慢性脓胸的治疗原则

正确答案：EC 您选择的答案：

第42-43题

- A. 应用广谱抗生素
 - B. 胸膜腔闭式引流
 - C. 消除病因和脓腔
 - D. 胸膜纤维板剥除手术
 - E. 彻底排净脓液，使肺早日复张
1. 急性脓胸的治疗原则
2. 慢性脓胸的治疗原则

正确答案：EC 您选择的答案：

第44-45题

- A. 应用广谱抗生素
 - B. 胸膜腔闭式引流
 - C. 消除致病原因和脓腔
 - D. 胸膜纤维板剥除手术
 - E. 彻底排净脓液，使肺早日复张
1. 急性脓胸的治疗原则
2. 慢性脓胸的治疗原则

正确答案：EC 您选择的答案：

习题集 外科学 胸部损伤

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 怀疑张力性气胸应立即

- A. 拍胸片
- B. 吸氧
- C. 气管插管、辅助呼吸
- D. 胸腔排气
- E. 输液输血

正确答案：D 您选择的答案：

第2题 肺爆震伤属胸部

- A. 开放性损伤
- B. 闭合性损伤
- C. 减速伤
- D. 加速伤
- E. 枪弹伤

正确答案：B 您选择的答案：

第3题 张力性气胸主要的病理生理改变是

- A. 纵隔向健侧移位
- B. 纵隔扑动
- C. 胸壁反常呼吸运动
- D. 肺内气体对流
- E. 皮下气肿

正确答案：A 您选择的答案：

第4题 肋骨容易发生骨折的是

- A. 1~3肋
- B. 4~7肋
- C. 8~10肋
- D. 11~12肋
- E. 肋弓

正确答案：B 您选择的答案：

第5题 治疗张力性气胸下列哪项错误

- A. 吸氧
- B. 粗针头排气
- C. 胸腔闭式引流
- D. 气管插管辅助呼吸
- E. 皮下气肿切开排气

正确答案：D 您选择的答案：

第6题 肋骨骨折后最有效的镇痛方法是

- A. 口服镇痛
- B. 肌注镇痛
- C. 病人自控镇痛
- D. 肋间神经封闭
- E. 硬脊膜外插管镇痛

正确答案：E 您选择的答案：

第7题 胸部损伤外科治疗原则是

- A. 纠正酸碱平衡失调
- B. 纠正电解质紊乱
- C. 给予脱水利尿剂
- D. 给予止痛，输血
- E. 纠正循环、呼吸功能障碍

正确答案：E 您选择的答案：

第8题 连枷胸指

- A. 单处肋骨骨折
- B. 多根肋骨骨折
- C. 多处肋骨骨折
- D. 两侧胸部多根肋骨骨折
- E. 多根多处肋骨骨折

正确答案：E 您选择的答案：

第9题 胸部损伤下述哪种情况为剖胸探查手术适应证

- A. 气胸肺萎陷超过30%
- B. 多根多处肋骨骨折
- C. 胸部爆震伤
- D. 进行性血胸
- E. 损伤性窒息发绀严重

正确答案：D 您选择的答案：

第10题 张力性气胸最主要的紧急处理方法是

- A. 剖胸探查

- B. 立即胸腔排气减压
- C. 气管切开
- D. 气管插管辅助呼吸
- E. 氧气吸入

正确答案：B 您选择的答案：

第11题 胸外伤后，胸壁软化(浮动胸)的发病原因是

- A. 2根以上肋骨骨折
- B. 多根多处肋骨骨折
- C. 胸骨骨折
- D. 反常呼吸
- E. 二氧化碳滞留

正确答案：B 您选择的答案：

第12题 下列哪些项目诊断肋骨骨折是不可靠的

- A. 间接疼痛
- B. 胸壁反常呼吸运动
- C. 骨擦感
- D. 局部疼痛
- E. 受伤后胸部变形

正确答案：D 您选择的答案：

第13题 可发生急性心脏压塞征的心包腔内积血量

- A. 50ml
- B. 100 ~ 200ml
- C. 250ml
- D. 300ml
- E. 350ml

正确答案：B 您选择的答案：

第14题 损伤性窒息最常见的原因是

- A. 胸部撞击伤
- B. 胸部摔伤
- C. 胸部暴力挤伤
- D. 胸部扑打伤
- E. 胸部高压气浪冲击伤

正确答案：C 您选择的答案：

第15题 关于胸外伤引起呼吸困难的机制，下列哪项是错误的

- A. 气胸或血胸压迫肺脏
- B. 气管或支气管分泌物堵塞
- C. 疼痛使胸廓活动受限
- D. 肺挫伤引起瘀血及水肿
- E. 反射性中枢调节作用失常

正确答案：E 您选择的答案：

第16题 下列哪项不应及时开胸探查

- A. 胸腔内进行性出血
- B. 支气管断裂
- C. 张力性气胸
- D. 心脏压塞
- E. 胸内存留较大异物

正确答案：C 您选择的答案：

第17题 损伤性、进行性血胸是指

- A. 胸腔积血1000ml 以上
- B. 胸部伤口流血不止
- C. 胸腔中等量以上积血
- D. 气管向健侧移位，叩诊浊音
- E. 经输血补液后，血压不回升或回升后又迅速下降

正确答案：E 您选择的答案：

第18题 闭合性肋骨骨折时，哪项说明肺或支气管肯定有损伤

- A. 伤侧肺呼吸音减低
- B. 伤侧肺有啰音
- C. 伤侧肺内剧痛
- D. 伤侧皮下气肿
- E. 伤侧胸膜腔积液

正确答案：D 您选择的答案：

第19题 闭合性气胸，肺萎陷不超过百分之几，患者可无自觉症状，不需处理

- A. 10%
- B. 20%
- C. 30%
- D. 40%
- E. 50%

正确答案：C 您选择的答案：

第20题 急性脓胸经穿刺后，脓液又迅速增多，最适当的处理方法是

- A. 加大抗生素用量

- B. 增加胸穿次数
- C. 胸腔闭式引流
- D. 加强支持疗法
- E. 开胸手术清除脓液

正确答案：C 您选择的答案：

第21题 多根多处肋骨骨折最主要的处理方法是

- A. 应用抗生素控制呼吸道感染
- B. 止痛、利于深呼吸
- C. 鼓励病人咳嗽排痰
- D. 吸氧、改善呼吸
- E. 纠正胸壁反常呼吸运动

正确答案：E 您选择的答案：

第22题 胸部损伤后咯血或痰中带血提示

- A. 气胸
- B. 血胸
- C. 肺或支气管损伤
- D. 食管损伤
- E. 损伤性窒息

正确答案：C 您选择的答案：

第23题 胸外伤咯血表明有哪种损伤

- A. 血胸
- B. 肋间血管损伤
- C. 肺或支气管损伤
- D. 食管损伤
- E. 心脏大血管损伤

正确答案：C 您选择的答案：

第24题 开放性气胸的主要病理生理变化是

- A. 胸壁反常呼吸运动
- B. 吸气时纵隔向患侧偏移
- C. 呼气时纵隔向健侧偏移
- D. 呼吸时纵隔左右摆动
- E. 纵隔持续向健侧偏移

正确答案：D 您选择的答案：

第25题 张力性气胸不会出现

- A. 颈静脉怒张
- B. 皮下气肿
- C. 气管移位
- D. 纵隔扑动
- E. 奇脉

正确答案：D 您选择的答案：

第26题 血胸继发感染诊断最可靠的依据是

- A. 寒战，高热
- B. 白细胞计数增高
- C. 胸腔穿刺检查，红细胞与白细胞比例为300：1
- D. 胸腔穿刺液混浊
- E. 穿刺液查到细菌，细菌培养阳性

正确答案：E 您选择的答案：

第27题 闭合性胸外伤后出现严重皮下气肿和极度呼吸困难首先应考虑为

- A. 肋骨骨折
- B. 肺挫伤
- C. 创伤性窒息
- D. 张力性气胸
- E. 血胸

正确答案：D 您选择的答案：

第28题 开放性胸部损伤诊断的主要依据是

- A. 胸部皮肤裂伤
- B. 气管或食管裂伤
- C. 肋骨骨折刺破胸膜
- D. 胸壁创口与胸膜腔相通
- E. 开放性肋骨骨折

正确答案：D 您选择的答案：

第29题 最易发生骨折的肋骨是

- A. 1~3肋
- B. 4~7肋
- C. 8~10肋
- D. 11~12肋
- E. 肋软骨

正确答案：B 您选择的答案：

第30题 多根多处肋骨骨折急救要点主要是

- A. 输血补液，防治休克

B 控制反常呼吸，保持呼吸道通畅
C 立即行开胸探查术
D 加压给氧
E 镇静、镇痛
正确答案：B 您选择的答案：

第31题 胸部损伤后出现颈静脉怒张，奇脉，血压下降，脉压差变小，此时首先应想到
A．闭合性气胸
B．张力性气胸
C．外伤性气胸
D．外伤性血心包
E．创伤性窒息
正确答案：D 您选择的答案：

第32题 诊断肋骨骨折下述哪项是可靠的
A 直接疼痛
B 局部肿胀
C 间接疼痛
D 皮下气肿
E 伤部皮下瘀血
正确答案：C 您选择的答案：

第33题 容易发生骨折的肋骨是
A 1～3肋
B 4～7肋
C 8～10肋
D 11～13肋
E 肋软骨
正确答案：B 您选择的答案：

第34题 放置闭式引流后，进行性出血的指征是连续3小时，每小时引流血液超过
A．50ml
B．100ml
C．150ml
D．200ml
E．250ml
正确答案：D 您选择的答案：

第35题 闭合性多根多处肋骨骨折，若骨折范围较小，治疗时采用哪种方法纠正反常呼吸最合适
A 牵引固定法
B 压力包扎固定
C 肋骨内固定法
D 胶布肋骨固定法
E 用呼吸器行辅助呼吸
正确答案：B 您选择的答案：

第36题 张力性气胸行闭式引流术，肺膨胀漏气停止，拔管最合适的时间是
A 可立即拔管
B 24小时后拔管
C 48小时后拔管
D 72小时后拔管
E 一周后拔管
正确答案：B 您选择的答案：

第37题 进行性血胸是指
A 损伤后DIC
B 血胸量大于500ml
C 血胸量大于1000ml
D 胸腔闭式引流一次放出血量达500ml
E 闭式引流后，引流量每小时大于200ml，持续3小时
正确答案：E 您选择的答案：

第38题 下列哪种情况应考虑手术探查
A．胸部爆震伤
B．创伤性窒息
C．纵隔气肿
D．皮下气肿
E．胸腹联合伤
正确答案：E 您选择的答案：

第39题 张力性气胸产生休克，急救措施首先是
A．输血
B．用升压药
C．抗休克同时开胸探查
D．患侧胸腔排气减压
E．气管插管辅助呼吸
正确答案：D 您选择的答案：

第40题 损伤性血胸，胸腔内积血不凝固的原因是
A 多种凝血因子的减少

B 胸腔内渗出液稀释
C 主要是凝血酶原减少
D 腔静脉出血
E 肺、心脏、膈活动去纤维蛋白作用
正确答案：E 您选择的答案：

第41题 损伤性血胸其出血可自行停止者多为

A 肋间动脉出血
B 肺破裂
C 胸廓内动脉出血
D 腔静脉出血
E 心脏大血管出血

正确答案：B 您选择的答案：

第42题 开放性气胸的病理生理改变，下述哪项是错误的

A 伤侧负压消失
B 伤侧肺萎陷
C 肺内部分气体对流
D 纵隔扑动
E 伤侧有反常呼吸

正确答案：E 您选择的答案：

第43题 肺挫伤后最可能发生

A. CO₂潴留
B. 出血休克
C. 肺动静脉分流
D. 空气栓塞
E. ARDS

正确答案：C 您选择的答案：

第44题 张力性气胸、胸腔闭式引流后，排出大量气体，病人呼吸困难不见好转，最大可能是由于

A. 大气管断裂
B. 肺挫伤
C. 食管破裂
D. 引流层周围进气
E. 肠疝并有消化道穿孔

正确答案：A 您选择的答案：

第45题 能出现反常呼吸的肋骨骨折是

A 两根肋骨骨折
B 两根以上肋骨骨折
C 双侧肋骨单根骨折
D 多根多处肋骨骨折
E 多发性肋软骨骨折

正确答案：D 您选择的答案：

第46题 损伤性血气胸呼吸困难的主要原因是

A. 气体交换容量减少
B. 回心血量减少
C. 心脏排血阻力增加
D. 肺表面活性物质减少
E. 肺脏弥散功能障碍

正确答案：A 您选择的答案：

第47题 开放性气胸引起休克的主要原因是

A. 血容量不足
B. 纵隔摆动，静脉回流受阻，刺激肺门神经
C. 伤侧肺萎缩
D. 心脏受压
E. 健侧肺被压缩

正确答案：B 您选择的答案：

第48题 外伤性血胸胸腔内积血不凝固的原因是

A. 胸腔内有抗凝物质
B. 胸腔内渗出液体的稀释作用
C. 肺、膈肌运动的去纤维作用
D. 凝血因子减少
E. 以上都不是

正确答案：C 您选择的答案：

第49题 进行性血胸最主要的治疗措施是

A. 应用止血剂
B. 使用升压药
C. 胸腔闭式引流
D. 输血、输液
E. 剖胸手术止血

正确答案：E 您选择的答案：

第50题 闭合性气胸，肺萎缩30%，其临床表现是

A. 呼吸困难

- B. 伤侧呼吸音消失
- C. 气管向健侧明显移位
- D. 无明显症状
- E. 痰量增多

正确答案：D 您选择的答案：

第51题 胸外伤，下述哪一种损伤危险性最大

- A. 多根肋骨骨折有移位
- B. 多根多处肋骨骨折
- C. 中等量血胸
- D. 闭合性气胸肺被压缩50%
- E. 张力性气胸

正确答案：E 您选择的答案：

第52题 开放性气胸患者呼吸困难最主要的急救措施是

- A. 吸氧
- B. 输血补液
- C. 气管插管行辅助呼吸
- D. 立即剖胸探查
- E. 迅速封闭胸部伤口

正确答案：E 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第53题 男性，38岁，车祸伤半小时。体检：发绀，烦躁不安，呼吸困难。左胸第5肋间处见直径约4cm不规则创口并

可闻及气体进出声。此病例的病理生理改变是

- A. 纵隔扑动造成循环衰竭
- B. 急性肺水肿导致气体交换降低
- C. 纵隔向健侧移位，伤侧肺代偿性膨胀
- D. 胸膜腔内压力不断升高导致呼吸衰竭
- E. 吸气时健侧胸膜腔内压力增高，纵隔摆向伤侧

正确答案：A 您选择的答案：

第54题 某男，40岁，车祸，左9~10肋骨骨折，肺压缩20%，腹部穿出不凝血，准备全麻开腹探查，胸部伤情应

- A. 观察
- B. 止痛
- C. 吸氧
- D. 胸穿
- E. 胸腔闭式引流

正确答案：E 您选择的答案：

第55题 患者胸部外伤2小时。查体：脉搏120次/分，血压12/8kPa，右胸可触到骨擦感和皮下气肿，叩诊鼓音，呼

吸音消失，急救处理是

- A. 输血，补液，抗休克
- B. 立即胸腔排气
- C. 胶布固定
- D. 应用升压药
- E. 氧气吸入

正确答案：B 您选择的答案：

第56题 男性，38岁，车祸伤3小时。X线检查示右肺压缩20%，第5肋骨单处骨折。其治疗应首选

- A. 吸氧
- B. 镇静，止痛
- C. 胸穿排气
- D. 胸膜腔闭式引流
- E. 保持呼吸道通畅

正确答案：B 您选择的答案：

第57题 男性，33岁，右胸车祸伤1小时。呼吸困难，发绀。体检：脉搏130次/分，血压76/50mmHg，右前胸可及皮

下气肿，右胸叩诊鼓音，右肺呼吸音消失。最可能的诊断是

- A. 张力性气胸
- B. 闭合性气胸
- C. 创伤性血胸
- D. 创伤性休克
- E. 多发性肋骨骨折

正确答案：A 您选择的答案：

第58题 男性，20岁，右胸刀刺伤1小时，关于进行性血胸，下列哪种征象不正确

- A. 脉搏逐渐增快，血压持续下降
- B. 胸膜腔闭式引流量等于200ml/小时
- C. 经输血补液后，血压升高后又迅速下降
- D. 血红蛋白、红细胞计数和红细胞比容连续复查，持续降低
- E. 胸膜腔穿刺未抽出血液，但胸片提示胸膜腔阴影进行性增大

正确答案：B 您选择的答案：

第59题 男性，25岁，房屋倒塌，上半身被压伤，20分钟后入院，神志清，呼吸困难，无腹痛及呕吐等。体检：体温36.5℃，脉搏100次/分，血压16/10kPa，呼吸30次/分，瞳孔反射正常，睑结膜出血，颈部四肢正常。化验：Hb12g，WBC $10 \times 10^9/L$ ，胸透及便常规正常，最大可能诊断是

- A 挤压综合征
- B 广泛软组织挫伤
- C 创伤性休克
- D 损伤性窒息
- E 颅脑损伤

正确答案：D 您选择的答案：

第60题 病人被刀刺伤左前胸约半小时，呼吸困难，烦躁不安，面色苍白，检查发现口唇发绀，颈静脉怒张，气管右移，胸骨左缘4肋间有一伤口，随呼吸有气体进出，血压80 / 60mmHg(10 . 6 / 8kPa)，心音较弱，心率120次 / 分，最主要的急救措施

- A . 输血、输液抗休克
- B . 封闭胸部伤口并做胸穿
- C . 封闭胸部伤口心包穿刺减压
- D . 开胸探查
- E . 闭式引流

正确答案：C 您选择的答案：

第61题 男，15岁，心前刀刺伤半小时，胸憋，气促，恐惧，躁动，颈静脉怒张，两肺呼吸音清，心音听不清，血压测不到。应立即

- A . 心包穿刺
- B . 拍胸片
- C . 作心脏超声心动图检查
- D . 胸部CT检查
- E . 开胸手术

正确答案：E 您选择的答案：

第62题 男性，37岁，半小时前用电锯锯木时，被木头击伤前胸部，当即感胸痛，气促，心悸。体检：呼吸35次 / 分，心率120次 / 分，血压80 / 50mmHg(10 . 6 / 6 . 7kPa)，痛苦面容，双肺呼吸音清，心音弱，颈静脉扩张，应如何处理

- A . 快速输液，纠正休克
- B . 急拍X线胸片
- C . 胸腔穿刺
- D . 心包穿刺
- E . 立即手术

正确答案：B 您选择的答案：

第63题 男性，34岁，右胸车祸伤1小时，呼吸困难，发绀。查体：右前胸可见反常呼吸运动。病人吸气时，下列哪项病理生理变化是不正确的

- A 软化胸壁内陷
- B 纵隔移向健侧
- C 伤侧膈肌上升
- D 静脉回流受阻
- E 二氧化碳滞留

正确答案：C 您选择的答案：

第64题 病人胸部受伤，急诊入院，经吸氧，呼吸困难无好转，有发绀，休克。查体：左胸饱满，气管向右移位，左侧可触及骨擦音，叩之鼓音，听诊呼吸音消失，皮下气肿明显，诊断首先考虑是

- A 肋骨骨折
- B 张力性气胸
- C 肋骨骨折并张力性气胸
- D 血心包
- E 闭合性气胸

正确答案：C 您选择的答案：

第65题 一侧胸外伤病人，显现休克状态，伤侧胸膜穿刺抽出血液、很快凝固，抗休克治疗无效，血红蛋白与红细胞逐渐降低，此时，在治疗上应采取的主要措施是

- A . 继续输血补液
- B . 继续观察病情变化
- C . 行胸腔闭式引流
- D . 开胸手术探查止血
- E . 用升压药

正确答案：D 您选择的答案：

第66题 患者胸部外伤2小时。体检：脉搏120次 / 分，血压90 / 60mmHg(12 / 8kPa)，右胸可触到骨感和皮下气肿，叩诊鼓音，呼吸音消失，急救处理是

- A . 输血，补液，抗休克
- B . 立即胸腔排气
- C . 胶布固定
- D . 应用升压药
- E . 氧气吸入

正确答案：B 您选择的答案：

第67题 一张力性气胸患者，急诊入院。X线片见右肺完全萎缩，纵隔向右移位，立即给右锁骨中线第二肋间置闭式引流溢出大量气体，但病人呼吸困难不见好转，左呼吸音消失，皮下气肿有扩延，此诊断应考虑

- A 支气管或肺广泛裂伤
- B 食管裂伤
- C 引流管位置过高
- D 血心包
- E 并发血胸

正确答案：A 您选择的答案：

第68题 某男，19岁，车祸，胸憋，呼吸困难。右胸压痛，叩诊鼓音，呼吸音消失，心音左移，应立即

- A. 吸氧
- B. 拍胸片
- C. 胸腔穿刺
- D. 输血、输液
- E. 气管插管

正确答案：C 您选择的答案：

第69题 男性，34岁，右胸车祸伤1小时，呼吸困难，发绀。体检：右前胸可见反常呼吸运动。病人吸气时，下列哪项病理生理变化是不正确的

- A. 软化胸壁内陷
- B. 纵隔移向健侧
- C. 伤侧膈肌上升
- D. 静脉回流受阻
- E. 二氧化碳滞留

正确答案：C 您选择的答案：

第70题 男性，25岁，房屋倒塌，上半部被压伤，20分钟后入院，神志清，呼吸困难，无腹痛及呕吐等。体检，体温36.5，脉搏100次/分，血压120/75mmHg(16/10kPa)，呼吸30分，瞳孔反射正常，睑结膜出血，颈部四肢正常。化验：血红蛋白120g/L，白细胞 $10 \times 10^9/L$ ，胸透及尿常规正常，最大可能的诊断是

- A. 挤压综合征
- B. 广泛软组织挫伤
- C. 创伤性休克
- D. 损伤性窒息
- E. 颅脑损伤

正确答案：D 您选择的答案：

第71题 男性，40岁，车祸伤2小时。体格检查：发绀，呼吸困难。左侧大块胸壁软化。在为其行胸壁牵引固定时，下列哪项是错误的

- A. 固定时间为3~4周
- B. 牵引重量为2~3kg
- C. 夹住中央处游离段肋骨牵引
- D. 适用于包扎固定不能奏效者
- E. 不适用于开放性肋骨骨折的病人

正确答案：A 您选择的答案：

第72题 男性，33岁，右胸车祸伤1小时。呼吸困难，发绀。查体：脉搏130次/分，血压76/50mmHg，右前胸可及皮下气肿，右胸叩鼓音，右肺呼吸音消失。最可能的诊断是

- A. 张力性气胸
- B. 闭合性气胸
- C. 创伤性血胸
- D. 创伤性休克
- E. 多发性肋骨骨折

正确答案：A 您选择的答案：

第73题 男，24岁，坠落伤，昏迷，左侧胸壁大面积软化，两肺大量痰鸣音，处理应

- A. 伤侧胸壁胶布固定
- B. 加压包扎
- C. 牵引
- D. 手术内固定
- E. 气管插管或气管切开，辅助呼吸

正确答案：E 您选择的答案：

第74题 某患者被汽车撞伤右胸部，呼吸20次/分，胸部X线检查示右侧气胸，肺压缩20%，第4后肋有骨折线。处理原则是

- A. 胸穿排气
- B. 一般观察
- C. 肋间闭式引流术
- D. 牵引固定
- E. 胶布固定

正确答案：B 您选择的答案：

第75题 外伤病人，右4~6肋骨骨折，呼吸极度困难、发绀，出冷汗。体检：血压65/40mmHg(8.7/5.3kPa)，右胸廓饱满，右肺呼吸音消失叩诊鼓音，颈胸部有广泛皮下气肿，处理应首选

- A. 补液输血
- B. 胸腔穿刺排气
- C. 立即行开胸手术
- D. 胶布固定胸壁
- E. 气管插管辅助呼吸

正确答案：B 您选择的答案：

第76题 病人2个月前发现胸痛、咳嗽，有少量黄脓痰，经消炎治疗不见好转。1个月前咳嗽增重，并有呼吸困难，胸穿抽脓不见好转，胸片见左胸大片暗影，主要治疗方法是

- A. 消炎、输血、补液
- B. 锁骨中线第2肋间闭式排气引流
- C. 继续胸穿排脓
- D. 腋后线第8肋间闭式引流
- E. 开放引流

正确答案：D 您选择的答案：

第77题 男性，44岁，右胸车祸伤2小时，呼吸困难，发绀。查体：右前胸未见反常呼吸运动。胸部挤压试验阳性，右肺呼吸音降低。胸片显示右侧第8~10肋骨后端骨折。错误的处理是

- A 胸带固定
- B 牵引固定
- C 镇静止痛
- D 应用抗生素
- E 清除呼吸道分泌物

正确答案：B 您选择的答案：

第78题 男性，38岁，车祸伤半小时。查体：发绀，烦躁不安，呼吸困难。左胸第5肋间处见直径约4cm不规则创口并可闻及气体进出声。此病例的病理生理改变是

- A 纵隔扑动造成循环衰竭
- B 急性肺水肿导致气体交换降低
- C 纵隔向健侧移位，伤侧肺代偿性膨胀
- D 胸膜腔内压力不断升高导致呼吸衰竭
- E 吸气时健侧胸膜腔内压力增高，纵隔摆向伤侧

正确答案：A 您选择的答案：

第79题 病人从5m高处跌下，胸部受伤2小时，胸痛、呼吸困难、有咯血。体检：胸壁无创口，胸壁可见反常呼吸运动，胸片所见第3后肋水平有液气面，诊断是

- A 肋骨骨折、气胸
- B 肋骨骨折、血胸
- C 多根肋骨骨折、血气胸
- D 多根多处肋骨骨折、血气胸
- E 多根多处肋骨骨折、气胸

正确答案：D 您选择的答案：

第80题 男性，28岁，汽车司机，前胸撞于方向盘上，伤后约1小时。查体：意识清，脉搏130次/分，奇脉(+)，血压12/10.7kPa，呼吸32次/分，颈静脉怒张，心浊音界扩大，心音弱，两肺呼吸音正常，诊断可能性最大是

- A 闭合性气胸
- B 张力性气胸
- C 肺挫伤
- D 血胸
- E 血心包

正确答案：E 您选择的答案：

第81题 某患者被汽车撞伤右胸部，呼吸20次/分，胸部X线检查示右侧气胸，肺受压20%，第4后肋有骨折线。处理原则是

- A 胸穿排气
- B 一般观察
- C 肋间闭式引流术
- D 牵引固定
- E 胶布固定

正确答案：B 您选择的答案：

第82题 男性，30岁，车祸伤半小时。体格检查：发绀，烦躁不安，呼吸困难。左侧大块胸壁软化，两肺湿啰音。首要的处理是

- A 紧急剖胸手术
- B 吸氧及雾化吸入
- C 清除呼吸道分泌物
- D 软化胸壁牵引固定
- E 左侧胸腔闭式引流

正确答案：C 您选择的答案：

第83题 男性，20岁，右胸刀刺伤1小时，关于进行性血胸，下列哪种征象不准确

- A 脉搏逐渐增快，血压持续下降
- B 胸膜腔闭式引流量等于200ml/h
- C 经输血补液后，血压升高后又迅速下降
- D 血红蛋白、红细胞计数和红细胞压积连续复查，持续降低
- E 胸膜腔穿刺未抽出血液，但胸片提示胸膜腔阴影进行性增大

正确答案：B 您选择的答案：

第84题 右血胸患者，急诊入院。查体：脉搏120次/分，血压10.7/6.7kPa，气管左移，输血同时作右胸闭式引流术，第1小时引流量200ml，第二小时为250ml，第三小时为180ml，血压虽经输血不见回升，此时最有效的处置是

- A 继续输血补液
- B 给止血药
- C 剖胸探查止血
- D 闭式引流加负压吸引
- E 给血管活性药

正确答案：C 您选择的答案：

第85题 男性，25岁，伤后12小时。脉搏100次/分，血压16/10kPa，呼吸30次/分，伤侧胸腔有积液征，胸穿抽出血液，静置后血不凝固，主要治疗是

- A 立即开胸手术止血
- B 输血输液
- C 胸腔穿刺排除积液
- D 周身抗生素防治感染
- E 胸腔闭式引流术

正确答案：C 您选择的答案：

三、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第86-87题

男性，32岁，胸部撞伤后30分钟，自觉右胸痛。查体：脉搏80次/分，血压120/80mmHg，呼吸16次/分，气管居中，左右胸均有压痛，两肺呼吸音存在

1. 其诊断可能性最大为

- A 气胸
- B 血胸
- C 血气胸
- D 多根多处肋骨骨折
- E 单纯性肋骨骨折

2. 其处理原则是

- A 胶布固定
- B 压力包扎固定
- C 内固定
- D 牵引固定
- E 胸腔闭式引流术

正确答案：EA 您选择的答案：

第88-89题

男，38岁，车祸1小时，前胸撞方向盘，心前区疼痛，心律失常，心电图示心动过速和室早。

1. 最不可能的损伤是

- A 心脏破裂
 - B 食管破裂
 - C 心肌挫伤
 - D 室间隔破裂
 - E 乳头肌断裂
2. 下列检查应首选
- A 胸片
 - B CT
 - C 超声心动图
 - D 食管造影
 - E 磁共振成像

正确答案：BC 您选择的答案：

第90-91题

患者胸部受伤，急诊入院。经吸氧，呼吸困难无好转，有发绀，休克。查体：左胸饱满，气管向右移位，左侧可触及骨擦音，叩之鼓音，听诊呼吸音消失，皮下气肿明显

1. 诊断首先考虑是

- A 肋骨骨折
- B 张力性气胸
- C 肋骨骨折并张力性气胸
- D 血心包
- E 肋骨内固定

2. 处理原则是

- A 升压药抗休克
- B 立即剖胸探查
- C 肋骨固定，胸腔排气
- D 呼吸机加压呼吸
- E 快速输血输液

正确答案：CC 您选择的答案：

第92-93题

男性，7岁，6小时前由货车上跌下，伤后即有呼吸困难，并逐渐加重。入院体检：脉搏130次/分，血压80/50mmHg(10.7/6.7kPa)，呼吸22次/分，颜面发绀，吸气性呼吸困难，颈上胸部有皮下气肿，气管向左移位，右侧呼吸音消失。

1. 其诊断首先考虑

- A 多根多处肋骨骨折
- B 血胸
- C 血心包
- D 开放性气胸
- E 张力性气胸

2. 急救措施是

- A 立即输血补液抗休克
- B 抗休克同时开胸探查
- C 胸腔闭式引流排气减压
- D 大量吸氧
- E 呼吸机辅助呼吸

正确答案：BE 您选择的答案：

第94-97题

男性，30岁，左前胸刀刺伤半小时，查体：烦躁不安，皮肤苍白湿冷，呼吸困难，脉细弱，140次/分，颈静脉怒张，血压70/50mmHg。左前胸第5肋间处见约4cm刀伤口

1. 此病例的病理生理改变是

- A 低血容量休克
- B 纵隔移位，心脏受压
- C 左胸腔内压力持续上升

- D 腔静脉受阻，回心血量减少
 - E 纵隔扑动，呼吸循环功能衰竭
 - 2. 最可能的诊断是
 - A 心脏压塞
 - B 失血性休克
 - C 左侧进行性血胸
 - D 左侧张力性气胸
 - E 心脏大血管破裂
 - 3. 既有诊断意义又有治疗价值的最佳选择是
 - A 胸膜腔穿刺
 - B 心包腔穿刺
 - C 胸腔镜检查
 - D 心导管检查
 - E 胸腔闭式引流
 - 4. 诊断明确后，正确的治疗措施
 - A 胸膜腔闭式引流负压吸引
 - B 快速输血，补液，抗休克
 - C 心包穿刺减压后紧急手术
 - D 气管切开，呼吸机辅助呼吸
 - E 快速扩容后，应用血管活性药物
- 正确答案：DABC 您选择的答案：

第98-100题

男性，25岁，车祸伤1小时。查体：脉搏130次/分，血压86/60mmHg。烦躁不安，发绀，严重呼吸困难，皮肤湿冷，左颈胸部皮下捻发感，气管右移，左胸饱满，左肺呼吸音消失。胸片示左肺完全萎陷

- 1. 最可能的诊断为
 - A 左侧进行性血胸
 - B 左侧闭合性气胸
 - C 左侧开放性气胸
 - D 左侧张力性气胸
 - E 左侧反常呼吸运动
 - 2. 急救处理是
 - A 抗休克
 - B 气管插管
 - C 高流量吸氧
 - D 呼吸机辅助呼吸
 - E 左侧胸膜腔穿刺
 - 3. 经急救处理，病情好转后又迅速恶化。此时治疗应立即
 - A 气管切开
 - B 清除呼吸道分泌物
 - C 左胸膜腔闭式引流
 - D 静脉快速输血补液
 - E 多头胸带包扎固定胸壁
- 正确答案：DEC 您选择的答案：

第101-103题

男性，32岁，右胸外伤后肋骨骨折，并出现极度呼吸困难、发绀、烦躁不安等表现。体检：血压80/60mmHg(10.7/8kPa)，脉细速，皮肤湿冷，气管向左偏移，颈静脉充盈，头颈及右胸皮下气肿，右侧胸廓饱满、肋间隙增宽、呼吸幅度减低，叩诊鼓音，右肺呼吸音消失。

- 1. 此患者最可能的诊断是
 - A 闭合性气胸
 - B 开放性气胸
 - C 张力性气胸
 - D 创伤性气胸
 - E 血气胸伴出血性休克
 - 2. 其主要的病理生理紊乱为
 - A 纵隔摆动
 - B 伤侧胸膜腔压力愈来愈高
 - C 反常呼吸
 - D 休克
 - E 肺水肿
 - 3. 急救处理首选
 - A 加压供氧
 - B 快速输血
 - C 剖胸探查
 - D 排气减压
 - E 气管切开
- 正确答案：CBD 您选择的答案：

第104-106题

男性，40岁，不慎从高空坠地后出现呼吸困难、发绀、出冷汗。体检心率110次/分，血压68/45mmHg(9/6kPa)，气管左偏，颈部广泛皮下气肿，右胸廓饱满，叩诊鼓音，右肺呼吸音消失。

- 1. 最可能的诊断是
- A 血胸
- B 肺挫裂伤
- C 创伤性湿肺
- D 张力性气胸
- E 创伤性窒息
- 2. 此时，首选的处理措施为
- A 气管插管辅助呼吸

- B. 剖胸探查
 - C. 胸腔穿刺排气
 - D. 补液、输血支持治疗
 - E. 止痛、镇静等对症处理
3. 该病人疾病发展的病理生理改变中, 不会出现
- A. 右胸的压力超过 $1.0132 \times 10^5 \text{Pa}$ (1大气压)
 - B. 纵隔摆动
 - C. 低氧血症
 - D. 心脏的静脉回流受阻
 - E. 休克
- 正确答案: DDC 您选择的答案:

- 第107-108题
- 男性, 7岁, 6小时前由货车上跌下, 伤后即有呼吸困难, 并逐渐加重。入院查体: 脉搏130次/分, 血压 $10.7/6.7 \text{kPa}$, 呼吸22次/分, 颜面发绀, 吸气性呼吸困难, 颈上胸部有皮下气肿, 气管向左移位, 右侧呼吸音消失
1. 其诊断首先考虑
- A. 多根多处肋骨骨折
 - B. 血胸
 - C. 血心包
 - D. 开放性气胸
 - E. 张力性气胸
2. 急救措施是
- A. 立即输血补液抗休克
 - B. 抗休克同时开胸探查
 - C. 胸腔闭式引流排气减压
 - D. 大量吸氧
 - E. 呼吸机辅助呼吸
- 正确答案: EC 您选择的答案:

四、A4型题: 以下提供若干个案例, 每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息, 在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

- 第109-111题
- 男性, 25岁, 车祸伤1小时。体检: 脉搏130次/分, 血压 $86/60 \text{mmHg}$ 。烦躁不安, 发绀, 严重呼吸困难, 皮肤湿冷, 左颈胸部皮下捻发感, 气管右移, 左胸饱满, 左肺呼吸音消失。胸片示左肺完全萎陷。
1. 最可能的诊断为
- A. 左侧进行性血胸
 - B. 左侧闭合性气胸
 - C. 左侧开放性气胸
 - D. 左侧张力性气胸
 - E. 左侧反常呼吸运动
2. 急救处理是
- A. 抗休克
 - B. 气管插管
 - C. 高流量吸氧
 - D. 呼吸机辅助呼吸
 - E. 左侧胸膜腔穿刺
3. 若经急救处理, 病情好转后又迅速恶化。此时治疗应立即
- A. 气管切开
 - B. 清除呼吸道分泌物
 - C. 左胸膜腔闭式引流
 - D. 静脉快速输血补液
 - E. 头胸带包扎固定胸壁
- 正确答案: CEC 您选择的答案:

五、B1型题: 以下提供若干组考题, 每组考题共用在前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

- 第112-115题
- A. 反常呼吸运动
 - B. 胸膜腔压力持续升高
 - C. 呼吸时纵隔左右扑动
 - D. 静脉压升高, 心搏微弱, 动脉压降低
 - E. 胸膜腔引流量 $>200 \text{ml/h}$, 连续3小时
1. 进行性血胸表现为
2. 多根多处肋骨骨折会出现
3. 心脏压塞的特征是
4. 张力性气胸表现为
- 正确答案: EADB 您选择的答案:

- 第116-117题
- A. 闭合性多根多处肋骨骨折
 - B. 严重闭合性气胸
 - C. 非进行性血胸
 - D. 进行性血胸
 - E. 开放性气胸
1. 应及时开胸探查的是
2. 可出现反常呼吸的是

正确答案：DA 您选择的答案：

第118-120题

- A. 锁骨中线第2肋间
- B. 锁骨中线第5肋间
- C. 腋前线与腋中线间第6~8肋间
- D. 腋中线与腋后线间第6~8肋间
- E. 腋中线第6~8肋间

1. 女性，28岁，无明显原因自觉胸闷不适。体检：左肺呼吸音明显减弱。胸片：左肺压缩70%，两侧肋膈角清晰。

行胸腔闭式引流时，插管应位于

2. 女性，45岁，因不慎摔倒后自觉胸痛、胸闷。体检：左肺呼吸音减弱，胸穿抽出不凝血液。胸片：左下肺野大片模糊影，左侧肋膈角消失。行胸腔闭式引流时，插管应位于

3. 男性，27岁，左胸刀刺伤半小时。体检：左肺呼吸音明显减弱。胸片：左肺压缩50%，左侧肋膈角见宽液平。行胸

正确答案：ADD 您选择的答案：

第121-122题

- A. 包扎固定
 - B. 牵引固定加闭式引流
 - C. 气管切开辅助呼吸
 - D. 肋间神经阻滞
 - E. 开胸止血加压固定
1. 两侧多根多处肋骨骨折伴大面积胸壁软化致反常呼吸选用
2. 多根多处肋骨骨折伴胸腔内进行性出血选用

正确答案：CE 您选择的答案：

第123-125题

- A. 纵隔扑动
 - B. 胸壁反常呼吸运动
 - C. 颈静脉怒张
 - D. 头面颈部肿胀、紫绀、出血
 - E. 左肺呼吸音减弱，叩浊，腋下可闻及肠鸣音
1. 创伤性窒息的表现
2. 胸壁缺损直径2cm会发生
3. 张力性气胸可出现

正确答案：DAC 您选择的答案：

第126-129题

- A. 反常呼吸运动
 - B. 胸膜腔压力持续升高
 - C. 呼吸时纵隔左右扑动
 - D. 静脉压升高，心搏微弱，动脉压降低
 - E. 胸膜腔引流血量>200ml / 小时，连续3小时
1. 进行性血胸表现为
2. 多根多处肋骨骨折会出现
3. 心脏压塞的特征是
4. 张力性气胸表现为

正确答案：EADB 您选择的答案：

习题集 外科学 脾脏外科

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 下列情况不需行脾切除术的是

- A 游走脾
- B 脾囊肿
- C 脾肿瘤
- D 脾梗死
- E 脾脓肿

正确答案：D 您选择的答案：

第2题 外伤性脾下极小裂伤，其最佳手术方式是

- A 脾修补术
- B 脾切除术
- C 脾部分切除术
- D 脾动脉结扎术
- E 明胶海绵堵塞

正确答案：A 您选择的答案：

第3题 关于脾功能亢进正确的是

- A 主要由于门静脉高压引起代偿性脾肿大
- B 巨型脾肿大仅见于血吸虫病性肝硬化
- C 周围血细胞减少是由于脾脏破坏过多所致
- D 临床主要表现为红细胞降低明显
- E 脾切除效果良好，可使周围血液恢复正常

正确答案：E 您选择的答案：

第4题 腹部闭合性损伤中，较多见的实质性脏器损伤为哪一项

- A 肝
- B 肾
- C 脾
- D 胰
- E 肾上腺

正确答案：C 您选择的答案：

第5题 脾切除术的年龄限制为

- A 大于2岁
- B 大于4岁
- C 大于6岁
- D 青春期以后
- E 没有限制

正确答案：B 您选择的答案：

第6题 对某些脾破裂，行裂口修补术及部分脾切除术，是为了

- A 节约时间
- B 保留造血功能不受影响
- C 避免日后可能因免疫低下招致严重感染
- D 脾内贮有血液，避免失血过多
- E 降低手术难度

正确答案：C 您选择的答案：

第7题 脾切除的主要适应证是

- A 血液系统疾病
- B 造血系统疾病
- C 外伤性脾破裂
- D 脾脓肿
- E 脾肿瘤

正确答案：C 您选择的答案：

习题集 外科学 胰腺疾病

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 患急性胰腺炎时，尿淀粉酶与血清淀粉酶增高的关系为

- A 前者与后者同时增高
 - B 前者增高先于后者
 - C 前者增高迟于后者
 - D 前者不增高，后者增高
 - E 前者持续增高，后者先高后低
- 正确答案：C 您选择的答案：

第2题 急性胰腺炎手术适应证中，下列哪项是错误的

- A 急性水肿性胰腺炎
 - B 反复发作，证实胆总管下端或胰管狭窄
 - C 坏死性胰腺炎并发脓肿
 - D 急性化脓性胆管炎合并急性胰腺炎
 - E 出血坏死性胰腺炎合并腹膜炎
- 正确答案：A 您选择的答案：

第3题 Whipple三联征是指

- A 禁食后出现儿茶酚胺释放征、血糖低于 2.8mmol/L 、给予葡萄糖后症状缓解
 - B 禁食后出现精神症状；血糖低于 2.8mmol/L 、给予葡萄糖后症状缓解
 - C 禁食后出现低血糖症状、血糖低于 2.8mmol/L 、口服或静脉给予葡萄糖后症状缓解
 - D 禁食后出现低血糖症状、血糖低于 2.8mmol/L 、静脉给予胰高血糖素后症状缓解
 - E 禁食后出现低血糖症状、血糖低于 2.8mmol/L 、静脉给予胰岛素后症状缓解
- 正确答案：C 您选择的答案：

第4题 诊断胰岛素瘤的最准确方法是

- A Whipple三联征
 - B 血糖空腹时 2.2mmol/L 以下
 - C 葡萄糖耐量试验
 - D 饥饿试验
 - E 血胰岛素测定
- 正确答案：E 您选择的答案：

第5题 胰腺癌最常见的组织类型为

- A 腺泡细胞癌
 - B 导管细胞癌
 - C 多形性腺癌
 - D 纤维细胞腺癌
 - E 粘液癌
- 正确答案：B 您选择的答案：

第6题 壶腹周围癌不包括

- A 胰头癌
 - B 胰体癌
 - C 十二指肠癌
 - D 胆总管下端癌
 - E 壶腹癌
- 正确答案：B 您选择的答案：

第7题 急性胰腺炎病人中，血钙低于 1.75mmol/L (7mg/dl)，常提示

- A 病情严重
 - B 血钙降低，四肢抽搐
 - C 腹部体征缓解
 - D 呕吐加重
 - E 胃肠无改变
- 正确答案：A 您选择的答案：

第8题 急性胰腺炎时，血、尿淀粉酶增高的关系是

- A 前者持续增高，后者先高后低
 - B 前者不增高，后者增高
 - C 前者增高迟于后者
 - D 前者增高先于后者
 - E 前者与后者同时增高
- 正确答案：D 您选择的答案：

第9题 诊断急性胰腺炎的重要依据是

- A 血淀粉酶 $>100\text{U/dl}$ ，尿淀粉酶 $>100\text{U/dl}$ (Somogyi法)
 - B 血淀粉酶 $>200\text{U/dl}$ ，尿淀粉酶 $>200\text{U/dl}$ (Somogyi法)
 - C 血淀粉酶 $>300\text{U/dl}$ ，尿淀粉酶 $>300\text{U/dl}$ (Somogyi法)
 - D 血淀粉酶 $>400\text{U/dl}$ ，尿淀粉酶 $>100\text{U/dl}$ (Somogyi法)
 - E 血淀粉酶 $>500\text{U/dl}$ ，尿淀粉酶 $>300\text{U/dl}$ (Somogyi法)
- 正确答案：E 您选择的答案：

第10题 下列除哪条外均与胰岛细胞瘤有因果关系

- A 精神病发作

- B 精神的衰退
- C 顽固性十二指肠溃疡
- D 库欣(CushingS)综合征
- E 发作性低血糖

正确答案：D 您选择的答案：

第11题 患严重急性胰腺炎的病人不需要

- A 抗生素
- B 钾
- C 液体治疗
- D 氯化钠
- E 钙

正确答案：B 您选择的答案：

第12题 急性胰腺炎时血清淀粉酶增高在发病后24小时内可被测得，之后几天内降至正常

- A . 3天
- B . 7天
- C . 9天
- D . 2天
- E . 5天

正确答案：B 您选择的答案：

第13题 胰腺癌最好发的部位是

- A 胰腺头部
- B 胰腺体部
- C 胰腺尾部
- D 全胰腺
- E 异位胰腺

正确答案：A 您选择的答案：

第14题 胰腺疾病与胆道疾病互相关系的解剖基础是

- A 胆总管与胰管有共同通道及出口
- B 胆总管与胰腺紧贴，并位于其后方
- C 胰腺炎胰腺肿大时常能压迫胆总管
- D 均属肝门部器官
- E 均受肝内胆汁分泌压的影响

正确答案：A 您选择的答案：

第15题 急性胰腺炎血、尿淀粉酶增高说法正确的是

- A . 血淀粉酶升高早，持续时间长，尿淀粉酶升高迟，持续时间短
- B . 血淀粉酶升高早，持续时间短，尿淀粉酶升高迟，持续时间亦短
- C . 血淀粉酶升高早，持续时间短，尿淀粉酶升高迟，持续时间长
- D . 血淀粉酶升高迟，持续时间短，尿淀粉酶升高早，持续时间长
- E . 血淀粉酶升高迟，持续时间长，尿淀粉酶升高早，持续时间短

正确答案：C 您选择的答案：

第16题 急性胰腺炎时，血淀粉酶高低与病变程度的关系

- A 出血性胰腺炎发病24小时淀粉酶一般不高
- B 严重出血坏死性胰腺炎淀粉酶可以不高
- C 淀粉酶高表示胰腺严重破坏已无分泌功能
- D 严重出血性坏死性胰腺炎淀粉酶常常极高
- E 水肿性胰腺炎淀粉酶多数不高

正确答案：B 您选择的答案：

第17题 胰腺癌最常见的组织类型是

- A . 导管细胞癌
- B . 腺泡细胞癌
- C . 黏液癌
- D . 腺鳞癌
- E . 囊腺癌

正确答案：A 您选择的答案：

第18题 急性胰腺炎时，淀粉酶的高低与病变程度的关系

- A . 水肿性胰腺炎淀粉酶多数不高
- B . 严重出血坏死性胰腺炎淀粉酶常很高
- C . 淀粉酶高表示胰腺严重破坏已无分泌功能
- D . 出血坏死性胰腺炎发病24小时淀粉酶一般不高
- E . 严重坏死性胰腺炎淀粉酶可以不高

正确答案：E 您选择的答案：

第19题 胰腺癌切除率低的主要原因为

- A 癌直接浸润和转移
- B 癌的恶性程度高
- C 并发胆道疾病
- D 年老，体弱
- E 手术复杂

正确答案：A 您选择的答案：

第20题 胰腺癌与总胆管结石的主要鉴别点是

- A 进行性黄疸

- B 肝功能改变
- C 淀粉酶改变
- D 胆囊肿大
- E 皮肤瘙痒

正确答案：A 您选择的答案：

第21题 急性胰腺炎病人中，呕吐后腹痛可

- A 减轻
- B 缓解
- C 加重
- D 消失
- E 不减轻

正确答案：E 您选择的答案：

第22题 胆道结石并发急性胰腺炎最合适的治疗是

- A．非手术治疗缓解后，择期手术
- B．抗感染，对症治疗
- C．立即手术
- D．充分准备后手术
- E．中西医结合治疗

正确答案：A 您选择的答案：

第23题 急性胰腺炎手术指征不包括

- A．诊断不确定
- B．合并胆道疾病
- C．继发性的胰腺感染
- D．腹痛剧烈，有腹膜炎体征
- E．虽经合理支持治疗，临床症状继续恶化

正确答案：D 您选择的答案：

第24题 急性胰腺炎多有

- A 白细胞数升高
- B 血钙值升高
- C 白细胞数减少
- D 磷脂酶值升高
- E 血小板数升高

正确答案：A 您选择的答案：

第25题 重症急性胰腺炎实验室检查通常会出现

- A．白细胞降低
- B．血糖下降
- C．血钙升高
- D．碱中毒
- E．尿素氮或肌酐升高

正确答案：E 您选择的答案：

第26题 急性胰腺炎的基本病理改变是

- A．水肿、脂肪液化、坏死
- B．水肿、出血、坏死
- C．脂肪液化、出血、坏死
- D．脓肿、出血、坏死
- E．水肿、假性囊肿、坏死

正确答案：B 您选择的答案：

第27题 急性胰腺炎的基本病理改变是

- A 纤维性变
- B 水肿，出血，坏死
- C 假性囊肿
- D 脓肿
- E 萎缩，退化

正确答案：B 您选择的答案：

第28题 急性胰腺炎最主要的症状是

- A．黄疸
- B．恶心、呕吐
- C．上腹部剧烈疼痛
- D．脂肪泻
- E．低血糖

正确答案：C 您选择的答案：

第29题 胰腺癌最常见的首发症状是

- A 上腹痛和上腹饱胀不适
- B 黄疸
- C 消化道症状
- D 消瘦和乏力
- E 发热

正确答案：A 您选择的答案：

第30题 胰头癌最主要的症状是

- A．上腹痛和上腹饱胀不适

- B. 黄疸
- C. 消瘦乏力
- D. 腹泻或便秘
- E. 消化道出血

正确答案：B 您选择的答案：

第31题 诊断急性胰腺炎的重要依据是

- A. 上腹部疼痛
- B. 腹胀，排气，排便停止
- C. 肠鸣音减弱
- D. 血清淀粉酶超过128温氏单位
- E. 腹部X线平片

正确答案：D 您选择的答案：

第32题 急性胰腺炎在我国最常见的诱因是

- A. 胆道梗阻，胆汁逆流
- B. 饮食因素
- C. 精神因素
- D. 感染
- E. 创伤

正确答案：A 您选择的答案：

第33题 胰腺疾病与胆道疾病相关的解剖学基础是

- A. 均受肝内胆汁分泌的影响
- B. 胰腺炎胰腺肿大时常能压迫胆总管
- C. 胆总管与胰管有共同通道及出口
- D. 胆道与胰腺为相邻器官
- E. 胆总管结石压迫胰管

正确答案：C 您选择的答案：

第34题 胆道结石并胰腺炎的治疗

- A. 立即手术
- B. 作好术前准备后再手术
- C. 抗感染，对症处理
- D. 非手术治疗不缓解，进一步作手术治疗
- E. 中西医结合治疗

正确答案：D 您选择的答案：

第35题 急性胰腺炎最常见的原因是

- A. 梗阻因素
- B. 酒精中毒
- C. 暴饮暴食
- D. 感染
- E. 外伤

正确答案：A 您选择的答案：

第36题 出血性坏死性胰腺炎病理生理复杂性、严重性最主要的是

- A. 上消化道出血
- B. 黄疸
- C. 呕吐
- D. 感染性休克，失血性休克
- E. 脓肿形成

正确答案：D 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第37题 男性，27岁，半年来多次发作心慌、发抖、苍白、大汗淋漓，近日晨起早餐前锻炼后出现四肢抽搐、神志不清，送至急诊测血糖为2.0mmol/L，给予静脉注射50%葡萄糖50ml，症状缓解。诊断须首先考虑

- A. 癫痫发作
- B. 饥饿性低血糖
- C. 胰岛素瘤
- D. 胃泌素瘤
- E. 脑肿瘤

正确答案：C 您选择的答案：

第38题 男性，48岁，餐后上腹胀满，恶心，呕吐，上腹部隆起两周，3个月前有跌跤上腹部触及台阶史。检查：一般情况好，上腹正中膨隆，可触及一个15cm×12cm略呈椭圆形稍囊性的肿块，轻度压痛，X线钡餐透明见胃及横结肠均向下移位，诊断应首选考虑

- A. 肝囊肿
- B. 肠系膜囊肿
- C. 腹膜后囊肿
- D. 胰腺假性囊肿
- E. 胆总管囊肿

正确答案：D 您选择的答案：

第39题 男性，42岁，丰盛酒宴饱餐后，上腹剧痛，伴恶心，呕吐，吐物为胃内容，吐后腹痛更加剧，如刀割样，注射阿托品，痛不止，已6小时。体检：脉搏124次/分，血压80/50mmHg，痛苦容貌，腹胀，全腹肌紧张，压痛及反跳痛，上腹部为重，肠鸣音消失，肝浊音界存在，右下腹穿刺得淡红色血性液体，白细胞 $12 \times 10^9/L$ ，血清淀粉酶320

单位(温氏法), 血钙 1.5mmol/L (6mg/dl), 经3小时治疗观察, 病情无好转, 诊断应考虑为

- A 溃疡病穿孔, 弥漫性腹膜炎
- B 胆囊穿孔, 弥漫性腹膜炎
- C 急性胃炎
- D 急性出血坏死性胰腺炎
- E 急性绞窄性肠梗阻

正确答案: D 您选择的答案:

第40题 男性, 35岁黄疸已1月, 右上腹轻微胀痛, 食欲不振, 经内科治疗无效。查体: 肝大, 胆囊增大, 血胆红素 17mg/dl , AST 70单位, AKP 45单位, AFP $>5\text{ng/ml}$, 可能诊断是

- A 黄疸性肝炎
- B 胆总管结石梗阻
- C 肝癌
- D 肝硬化晚期
- E 壶腹周围癌

正确答案: E 您选择的答案:

第41题 男性35岁, 有溃疡病史, 酒后突然上腹部剧痛12小时, 伴恶心呕吐, 多汗口干。体检: 体温 37.5°C , 脉搏120次/分, 血压 $110/70\text{mmHg}$, 肝浊音界下移, 右上腹紧张, 压痛, 反跳痛明显, 移动性浊音(+), 血淀粉酶64温氏单位, 白细胞 $14.8 \times 10^9/\text{L}$, 中性80%, 诊断为

- A 急性胰腺炎
- B 急性胆囊炎
- C 急性胆管炎
- D 急性梗阻性化脓性胆管炎
- E 溃疡病穿孔

正确答案: E 您选择的答案:

第42题 男性, 51岁, 饱餐后8小时出现上腹持续疼痛, 疼痛较剧烈, 向背部放射。体检: 急性病容, 脉搏120次/分, 腹胀, 全腹肌紧张, 压痛及反跳痛, 以上腹部为著。血淀粉酶 900U/dl (Somogyi法)。诊断为急性胰腺炎, 下列检查对治疗方案价值最大的是

- A. 血常规
- B. 腹部X线平片
- C. 腹部B超
- D. 腹部增强CT
- E. 尿淀粉酶

正确答案: D 您选择的答案:

第43题 男性, 43岁, 上腹饱胀不适4个月, 黄疸1周, 伴有食欲不振、消瘦、腹泻, 给予抗感染、解痉等治疗无效。

体检: 巩膜轻度黄染, 肋下可触及肿大胆囊, 轻度压痛, 腹部未触及明显包块。血胆红素 $20\mu\text{mol/L}$, AKP、CEA、CA19-9增高。B超显示肝内、外胆管扩张, 胆囊增大, 胰管扩张。最可能的诊断是

- A. 慢性胆囊炎
- B. 黄疸性肝炎
- C. 肝癌
- D. 壶腹周围癌
- E. 慢性胆管炎

正确答案: D 您选择的答案:

第44题 男性, 35岁, 诉乏力, 心悸, 恍惚, 步履不稳已2年, 其间先后3次出现精神失常和癫痫样发作, 一个月前, 因早餐前从事体力劳动, 引起四肢抽搐, 神志不清, 验血糖 2.0mmol/L , 静脉注射50%葡萄糖溶液60ml后, 症状缓解, 既往无头部外伤史, 无其他阳性体征, 诊断应考虑为

- A 症状性癫痫
- B 特发性癫痫
- C 胰岛素瘤
- D 饥饿性低血糖
- E 促胃液素瘤

正确答案: C 您选择的答案:

第45题 女, 55岁, 近1个月来上腹渐隆起, 伴腹;痛无发热, 进食后腹胀。半年前曾患急性胰腺炎。查体: 上腹可触及拳头大肿物, 表面光滑, B超提示为囊性肿物。应考虑为

- A. 胰腺囊腺瘤
- B. 胰腺假性囊肿
- C. 胰腺脓肿
- D. 胃癌
- E. 胰腺癌

正确答案: B 您选择的答案:

第46题 患者, 男, 45岁, 上腹痛4天伴恶心, 呕吐, 吐少量胃内容物, 查体上腹部压痛, 巩膜可疑黄染, 体温 38°C , 白细胞 $15 \times 10^9/\text{L}$, 血清淀粉酶值64温氏单位, 尿淀粉酶326温氏单位, 可考虑为

- A 急性胰腺炎
- B 急性胆囊炎
- C 急性胆管炎
- D 急性肠系膜淋巴结炎
- E 溃疡病穿孔

正确答案: A 您选择的答案:

第47题 男性, 45岁, 上腹痛72小时。体检: 体温 37.5°C , 血压 $120/80\text{mmHg}$ ($16/10.7\text{kPa}$), 巩膜可疑黄染, 中上腹压痛, 轻度反跳痛, 肝区无叩痛, Murphy征阴性, 血淀粉酶 710U/dl (Somogyi法), 尿淀粉酶 1100U/dl (Somogyi法)。诊断为

- A. 急性胆囊炎

- B. 胆囊结石
- C. 消化性溃疡穿孔
- D. 急性胰腺炎
- E. 壶腹周围癌

正确答案：D 您选择的答案：

第48题 男性，40岁，上腹部隐痛4个月伴暖气，反酸，尤以进食后为重，查：消瘦体型，上腹部偏右轻压痛，未见异常，经纤维胃镜下证实胃窦部及十二指肠球部各有直径2.0cm大小溃疡，较深，粘膜皱襞集中，诊断除怀疑消化性溃疡外，还应注意

- A. 甲状旁腺功能亢进症
- B. 胃癌
- C. 促胃液素瘤
- D. 胃淋巴瘤
- E. 胃类癌

正确答案：C 您选择的答案：

第49题 女性，31岁，暴饮暴食后上腹痛2天，疼痛剧烈，向腰背部放射，呕吐、呕吐后腹痛不缓解。体检：体温37.8℃，血压120/80mmHg(16/10.7kPa)，中上腹压痛，无反跳痛及肌紧张，血淀粉酶400U/dl(Somogyi法)，尿淀粉酶800U/dl(Somogyi法)。该患者应如何处理

- A. 急诊手术
- B. 禁食，解痉止痛
- C. 禁食补液，抗生素，解痉止痛，抑制胰腺分泌
- D. 早期肠内高营养
- E. 腹腔灌洗

正确答案：C 您选择的答案：

第50题 女性，38岁，反复中上腹痛5年，近2年疼痛加重，仰卧时明显，食欲不振，饱胀，脂肪泻等，查空腹血糖11.3mmol/L。体检：腹软，上腹部深压痛，未触及包块，无反跳痛。实验室检查：白细胞为 $7.2 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞0.80，血淀粉酶400U/dl(Somogyi法)，B超示胰腺形态不整，腺体缩小，有光点及回声影，胰管直径1.0cm。该患者应诊断为

- A. 急性胰腺炎
- B. 慢性胰腺炎
- C. 胰腺假性囊肿
- D. 胰头癌
- E. 壶腹部癌

正确答案：B 您选择的答案：

第51题 女性，25岁，暴饮暴食后心窝部突然疼痛，伴恶心呕吐两天，无黄染，体温37.8℃，脉搏90次/分，血压为110/70mmHg，左上腹压痛，轻度肌紧张，白细胞 $15 \times 10^9/L$ ，血淀粉酶64单位(温氏法)，尿淀粉酶256单位(温氏法)，下列哪项处置正确

- A. 半流食，针刺疗法
- B. 半流食，解痉，助消化药
- C. 禁食补液，抗生素注射，解痉，止痛，抑肽酶
- D. 禁食，解痉止痛，肾上腺皮质激素
- E. 手术疗法

正确答案：C 您选择的答案：

第52题 男，65岁，上腹不适、纳差2个月。2周前出现黄疸并进行性加深，伴低热。血胆红素171μmol/L，尿胆红素阳性。B超提示肝内外胆管扩张，胆囊12cm×4cm×4cm张力高，可能的诊断是

- A. 胆汁淤积
- B. 胆总管结石
- C. 肝门胆管癌
- D. 胰头癌
- E. 黄疸型肝炎

正确答案：D 您选择的答案：

三、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第53-56题

男性，32岁，饱食后2小时中上腹持续疼痛，并逐渐加剧，向肩、背部放射，伴恶心、呕吐。体检：急性面容，表情痛苦，血压90/70mmHg(12/9.3kPa)，脉搏120次/分，全腹压痛，尤以中上腹为著，并有肌紧张和反跳痛，肝区未扪及肿块，肠鸣音微弱，白细胞 $15 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞0.81。

1. 最可能的诊断是

- A. 急性胃肠炎
- B. 急性胰腺炎
- C. 急性绞窄性肠梗阻
- D. 急性肾或输尿管结石梗阻
- E. 胃十二指肠溃疡穿孔

2. 下列哪项检查对明确诊断无意义

- A. 血、尿淀粉酶的测定
- B. 腹部B型超声波检查
- C. 静脉肾盂造影
- D. 腹部CT检查
- E. 腹部MRI检查

3. 诊断确定后，下列哪项检查对决定治疗方法最有价值

- A. 血、尿淀粉酶的测定
- B. 腹部B超检查
- C. 腹部CT检查

- D. 血钙测定
 - E. 穿刺液淀粉酶测定
 - 4. 该患者应采取何种治疗
 - A. 手术治疗
 - B. 半流饮食, 解痉止痛
 - C. 血液滤过
 - D. 腹腔灌洗
 - E. 禁食补液, 抗生素, 解痉止痛, 抑制胰腺分泌
- 正确答案: BCCE 您选择的答案:

第57-58题

男, 42岁, 平时身体健康, 2天前饮酒后上腹疼痛, 呕吐频繁, 上腹压痛, 左侧明显, 巩膜微黄, 体温38.5, 脉搏102次/分, 血白细胞计数 $20 \times 10^9/L$, 中性0.85。

- 1. 首先应考虑哪种疾病
- A. 急性病毒性肝炎
- B. 急性胰腺炎
- C. 急性胃炎
- D. 急性胆囊炎
- E. 急性胆管炎
- 2. 对诊断最有价值的化验检查是
- A. 肝功能检查
- B. 肾功能检查
- C. 血尿淀粉酶
- D. 尿常规
- E. 血常规

正确答案: BC 您选择的答案:

第59-62题

男性, 35岁, 暴饮暴食后, 心窝部突然疼痛, 恶心呕吐, 吐物为胃内容, 吐后疼痛不缓解, 查体温38.3。脉搏96次/分, 脐周压痛, 反跳痛, 肌紧张不明显, 无移动性浊音, 肠鸣音减弱, 血WBC $12.0 \times 10^9/L$, 中性88%。

- 1. 诊断怀疑
- A. 急性胰腺炎
- B. 急性胃肠炎
- C. 急性胆囊炎
- D. 急性单纯性肠梗阻
- E. 急性阑尾炎
- 2. 为进一步明确诊断需进行以下哪项检查
- A. 腹部立位平片
- B. 肝胆胰脾彩色超声检查
- C. 血、尿淀粉酶测定
- D. 心电图
- E. 动脉造影
- 3. 该患者应采取以下哪项治疗方法
- A. 流食, 中药治疗
- B. 半流食, 针刺疗法
- C. 禁食水, 抗生素注射, 补液, 解痉止痛
- D. 禁食水, 解痉止痛
- E. 抗生素, 补液治疗
- 4. 该患者最可能发生以下哪种并发症
- A. 胰腺假性囊肿
- B. 肠梗阻
- C. 肠出血
- D. 肠痿
- E. 腹腔脓肿

正确答案: ACCA 您选择的答案:

第63-64题

男, 65岁, 2周来上腹隐痛, 纳差, 消瘦, 乏力, 全身黄染, 尿色深。查体: 皮肤黄染, 有抓痕, 腹平软, 右上腹可触及包块, 边缘不清, 有压痛。尿胆红素(+ + +), 钡餐示胃排空延迟, 十二指肠曲扩大。初步诊断为胰头癌。

- 1. 该病的主要症状是
- A. 消瘦、乏力、体重减轻
- B. 肝脾肿大、贫血
- C. 消化不良、厌食
- D. 腹痛、腹部不适
- E. 进行性黄疸、瘙痒
- 2. 该病影像学检查首选
- A. B超
- B. PTC
- C. DSA
- D. 核素扫描
- E. CT

正确答案: EA 您选择的答案:

四、A4型题: 以下提供若干个案例, 每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息, 在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第65-68题

女性, 42岁, 既往健康, 近2个月出现巩膜、皮肤黄染, 呈进行性加重, 无腹痛, 略消瘦, 既往健康。体检: 肝肋下1cm, 右上腹扪及肿大之胆囊, 无触痛, 无发热。

1. 诊断应首先考虑
A. 壶腹周围癌
B. 肝癌
C. 慢性胆囊炎
D. 慢性胰腺炎
E. 胆囊结石
2. 为明确黄疸性质，最有意义的检查是
A. B超检查
B. CT检查
C. MRI检查
D. 肝功能检查
E. ERCP
3. 若黄疸性质为梗阻性，欲明确梗阻部位，选择下列哪项检查
A. MRI检查
B. ERCP
C. B超
D. 十二指肠低张造影
E. CT检查
4. 如术中发现胰头部一轮廓不规则肿物，边界尚清，与周围组织无粘连，未触及肿大淋巴结，宜采用何种术式
A. Whipple胰头十二指肠切除术
B. 胃空肠吻合术
C. 全胰切除术
D. 胆囊十二指肠吻合术
E. 胆总管十二指肠吻合术
- 正确答案：ADBA 您选择的答案：

五、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第69-71题

- A. 常发生在进油腻餐后
B. 过食、饮酒后发生
C. 腹痛在剧烈活动后发生
D. 持续性腹痛阵发加重
E. 转移性疼痛
1. 急性胆囊炎发病与饮食的关系
2. 急性胰腺炎发病与饮食的关系
3. 胆石症合并胆道感染时腹痛为
- 正确答案：ABD 您选择的答案：

第72-74题

- A. Grey-Turner征
B. Murphy征
C. Whipple三联征
D. 腹痛、体重下降、糖尿病、脂肪泻
E. 卓-艾综合征
1. 急性胰腺炎
2. 慢性胰腺炎
3. 胰岛素瘤
- 正确答案：ADC 您选择的答案：

第75-77题

- A. 胰头癌
B. 胆囊癌
C. 胰腺囊肿
D. 壶腹癌
E. 胰岛细胞瘤
1. 黄疸伴大便潜血阳性的是
2. 黄疸进行性加深的是
3. Whipple三联征的是
- 正确答案：DAE 您选择的答案：

习题集 外科学 上消化道大出血

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 上消化道出血的病人，伴有发热及右上腹痛，应考虑

- A 胃十二指肠溃疡病
- B 门静脉高压症
- C 出血性胃炎
- D 胃癌
- E 胆道出血

正确答案：E 您选择的答案：

第2题 上消化道大出血最常见的原因是

- A 门脉高压症
- B 出血性胃炎
- C 胃癌
- D 胃十二指肠溃疡
- E 应激性溃疡

正确答案：D 您选择的答案：

第3题 上消化道出血，可表现为呕血及黑便，主要取决于

- A 出血的速度和量
- B 出血部位和高低
- C 病变的性质
- D 凝血机制
- E 胃肠蠕动情况

正确答案：A 您选择的答案：

第4题 上消化道大出血，发病急，出血凶猛，易致休克，出血常是

- A 胃小弯溃疡出血
- B 门静脉高压症出血
- C 十二指肠溃疡出血
- D 胃体癌出血
- E 胃粘膜病变出血

正确答案：B 您选择的答案：

第5题 突然呕血1500ml 出现休克的病人，在了解一般情况后，首先应

- A 止血药物的应用
- B 作中心静脉压测定
- C 检查出血原因
- D 静脉切开输血
- E 剖腹检查手术

正确答案：D 您选择的答案：

第6题 对上消化道大出血最有价值的诊断方法是哪项

- A 临床观察判定
- B 吞少量稀钡检查
- C 红细胞比容测定
- D 凝血因子的检查
- E 急诊胃镜检查

正确答案：E 您选择的答案：

第7题 上消化道出血的临床表现为

- A 呕血
- B 呕血与黑便
- C 呕血、便血、休克
- D 呕血、便血、休克、全身皮肤出血
- E 失血性休克

正确答案：C 您选择的答案：

第8题 病人有上腹痛史，经常黑便及呕血、反酸，应考虑

- A 胃十二指肠溃疡出血
- B 胃癌出血
- C 食管静脉破裂出血
- D 应激性溃疡出血
- E 胆道出血

正确答案：A 您选择的答案：

第9题 慢性胃十二指肠溃疡并发大出血，最常见的部位在

- A 胃底部
- B 胃大弯部
- C 胃窦部
- D 十二指肠球前壁
- E 十二指肠球后壁

正确答案：E 您选择的答案：

第10题 关于处理门静脉高压症并发上消化道大出血，哪一项是不恰当的

- A 对有黄疸、腹水病人宜选用脾切除加大网膜腹膜后固定术

B 对年轻且肝功能良好者，可选用急症分流术
C 对有黄疸病人，宜行三腔双囊管处理
D 切开胃前壁，缝扎曲张静脉法止血效果不确切
E 贲门周围血管离断术，可收到立即止血效果
正确答案：A 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第11题 男性，40岁，反复呕血1周，每次呕血量约500ml，无溃疡病及肝炎史，为明确出血原因应选用何种检查
A X线钡餐检查
B 选择性腹腔动脉造影
C 纤维胃镜
D 三腔双囊管
E 血液学检查
正确答案：C 您选择的答案：

第12题 男性，34岁，因左肱骨及双股骨开放性骨折手术，4天后突发腹胀痛，呕鲜血500ml，上腹部轻压痛，无溃疡病和肝炎史，应考虑为
A 胃穿孔
B 出血性胃炎
C 胃十二指肠溃疡出血
D 食管胃底静脉曲张破裂出血
E 胃底癌出血
正确答案：B 您选择的答案：

第13题 女性，32岁，间歇发生呕血1周，每次量约300~1000ml，伴有柏油样便一日两次，无溃疡病和肝炎病史。查体，贫血外观，心率100次/分，血压正常，最为可能的病因是
A 胃十二指肠溃疡
B 出血性胃炎
C 门静脉高压症
D 肝内胆道感染
E 胃十二指肠肿瘤
正确答案：A 您选择的答案：

第14题 男性，30岁，长期饮酒，突然呕大量咖啡色胃内容物。查体，脉细数，收缩压80mmHg，面色苍白，四肢湿冷。急救中应首先
A 插入三腔双囊管
B 静脉点滴止血药物
C 输血
D 内镜止血
E 胃肠减压
正确答案：C 您选择的答案：

第15题 女性，40岁，因十二指肠溃疡大出血而行手术，术中发现十二指肠溃疡，位置很低，且穿透入胰腺，应采用术式
A 毕式胃大部切除术
B 迷走神经切断加幽门成形术
C 旷置溃疡的胃大部切除术
D 结扎十二指肠周围血管，旷置溃疡的胃大部切除术
E 缝扎出血点，结扎胃十二指肠及胰十二指肠动脉，旷置溃疡的胃大部切除术
正确答案：E 您选择的答案：

第16题 女性，36岁，突然发生右上腹阵发性绞痛，伴发热寒战，排柏油样便少量，查体急性病容，巩膜黄染，应考虑是
A 门静脉高压症
B 胃十二指肠溃疡
C 出血性胃炎
D 胆道出血
E 应激性溃疡出血
正确答案：D 您选择的答案：

第17题 男性，45岁，有慢性肝炎病史，近日呕血3次，约在1500ml以上，查体：脉快，巩膜黄染，腹水征(+)，下列哪项治疗是不正确的
A 输血
B 贲门周围血管离断术
C 补液
D 止血药物
E 护肝药物
正确答案：B 您选择的答案：

三、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第18-20题
女性，35岁，1周前有上腹部挫伤史，上腹部剧烈阵发性绞痛，发热寒战，伴少量柏油样大便2天，经非手术治疗，病情缓解，7日后反复且病情恶化，查体：急病容，巩膜黄染，肝大压痛
1. 其诊断可能是

- A 出血性胃炎
- B 胆道结石
- C 胆道出血
- D 消化道出血
- E 门静脉高压症

2. 非手术治疗的首选方法是

- A 输血
- B 静脉点滴止血药
- C 补液
- D 抗生素
- E 护肝药物

3. 目前,合理的治疗的方法是

- A 手术治疗
- B 增加抗生素的用量
- C 大量输血
- D 应用止血药物
- E 护肝药物

正确答案: CDA 您选择的答案:

第21-23题

男性,40岁,劳累后突然呕大量咖啡色胃内容物,查体:面色苍白,巩膜轻度黄染,四肢湿冷,脉细数,血压正常

1. 其出血原因最可能是

- A 胃十二指肠溃疡病
- B 门静脉高压症
- C 出血性胃炎
- D 胆道出血
- E 胃癌

2. 首选的治疗措施

- A 静脉点滴止血药物
- B 内镜止血
- C 输血
- D 应用三腔双囊管
- E 急诊手术

3. 较为合理的诊断方法

- A 纤维胃镜
- B 上消化道钡透
- C 血管造影
- D 床头腹部B超
- E 床头X线照像

正确答案: BCA 您选择的答案:

四、B1型题: 以下提供若干组考题, 每组考题共用在前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第24-25题

- A 三腔双囊管压迫
- B 胃大部切除
- C 服甲氧咪呱
- D 肝动脉结扎
- E 高选择迷走神经切除

1. 胃溃疡大出血

2. 应激性溃疡出血

正确答案: BC 您选择的答案:

习题集 外科学 胆道疾病

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 胆管癌最易发生的部位是

- A．胆管上段
- B．胆管中段
- C．胆管下段
- D．胆囊管
- E．肝内胆管

正确答案：A 您选择的答案：

第2题 急性梗阻性化脓性胆管炎的典型症状是

- A．腹痛、黄疸、呕吐、高热、昏迷、休克
- B．腹痛、黄疸、寒战、高热、休克、昏迷
- C．腹痛、黄疸、腹胀、高热、昏迷、休克
- D．腹痛、寒战、呕吐、高热、休克、昏迷
- E．寒战、高热、黄疸、呕吐、昏迷、休克

正确答案：B 您选择的答案：

第3题 胆道蛔虫症的临床特点是

- A．突发上腹部疼痛
- B．恶心呕吐明显
- C．疼痛可反复发作
- D．可诱发胰腺炎
- E．临床症状重而体征轻

正确答案：E 您选择的答案：

第4题 进行性黄疸时，B超显示胆总管及以上胆管扩张，为明确黄疸原因首选检查是

- A．静脉法胆道造影
- B．口服法胆囊造影
- C．内镜逆行胰胆管造影
- D．核素扫描
- E．十二指肠引流

正确答案：C 您选择的答案：

第5题 胆囊感染最常见的致病菌为

- A．绿脓杆菌
- B．大肠杆菌
- C．幽门螺杆菌
- D．肠球菌
- E．金黄色葡萄球菌

正确答案：B 您选择的答案：

第6题 胆道疾病与胰腺疾病相互关联的解剖学基础是

- A．副胰管的存在
- B．胆总管与主胰管有共同通道或开口
- C．两个器官相邻
- D．两个器官同属迷走神经支配
- E．两个器官的血供相互联系

正确答案：B 您选择的答案：

第7题 胆囊动脉多源于

- A 肝左动脉
- B 肝固有动脉
- C 胃十二指肠动脉
- D 肝右动脉
- E 胃右动脉

正确答案：D 您选择的答案：

第8题 胆囊结石临床确诊需依靠

- A．临床病史
- B．体格检查
- C．影像学检查
- D．血尿胆红素化验
- E．手术探查

正确答案：C 您选择的答案：

第9题 最常见的发冷、发热的外科急腹症是

- A．溃疡病穿孔
- B．绞窄性肠梗阻
- C．急性梗阻性化脓性胆管炎
- D．急性化脓性阑尾炎
- E．急性重症胰腺炎

正确答案：C 您选择的答案：

第10题 急性梗阻性化脓性胆管炎最常见的原因是

- A 胆总管结石

B 胆总管末端狭窄
C 胆道出血继发感染
D 胆总管癌
E 先天性胆总管扩张症
正确答案：A 您选择的答案：

第11题 Murphy征阳性则提示
A 细菌性肝脓肿
B 急性胆管炎
C 肝总管结石
D 左肝管结石
E 急性胆囊炎
正确答案：E 您选择的答案：

第12题 胆管结石的临床表现主要取决于
A ．结石大小
B ．有无感染及梗阻
C ．结石部位
D ．是否合并有胆源性胰腺炎
E ．是否引起肝细胞损害
正确答案：B 您选择的答案：

第13题 下列哪一项不是胆囊切除的适应证
A ．胆囊积液
B ．胆囊积脓
C ．急性胆囊炎
D ．胆道蛔虫病
E ．胆囊结石
正确答案：D 您选择的答案：

第14题 急性胆囊炎最严重的并发症是
A 细菌性肝脓肿
B 胆囊积液
C 胆囊坏疽穿死致胆汁性腹膜炎
D 急性胰腺炎
E 胆囊十二指肠内瘘
正确答案：C 您选择的答案：

第15题 胆总管的长度一般为
A ．13～15cm
B ．11～13cm
C ．9～11cm
D ．7～9cm
E ．5～7cm
正确答案：D 您选择的答案：

第16题 内镜逆行胰胆管造影(ERCP)无法用于
A ．行鼻胆管引流治疗胆道感染
B ．行Oddi括约肌切开治疗Oddi括约肌狭窄
C ．胆囊结石取石
D ．胆总管下端结石取石
E ．胆道蛔虫病
正确答案：C 您选择的答案：

第17题 坏疽性胆囊炎穿孔多发于胆囊
A ．体部
B ．底部
C ．颈部
D ．后壁
E ．前壁
正确答案：B 您选择的答案：

第18题 正常情况下肝脏分泌胆汁的最大分泌压为
A ．8cmH₂O
B ．10cmH₂O
C ．12cmH₂O
D ．15cmH₂O
E ．39cmH₂O
正确答案：E 您选择的答案：

第19题 胆道蛔虫病治疗不恰当的是
A 胆囊切除术
B 针刺足三里
C 解痉利胆驱虫
D 胆总管探查取虫引流
E 手术后驱虫治疗
正确答案：A 您选择的答案：

第20题 最常出现Charcot三联征的疾病是
A ．细菌性肝脓肿

- B. 黄疸性肝炎
- C. 胆总管结石
- D. 肝癌
- E. 胰头癌

正确答案：C 您选择的答案：

第21题 有关急性胆囊炎下列哪项是错误的

- A. 黄疸出现的早而明显
- B. 有时可扪及有触痛的肿大胆囊
- C. Murphy阳性
- D. 右上腹可有压痛及肌紧张
- E. 一般无寒战

正确答案：A 您选择的答案：

第22题 关于胆石症的说法正确的是

- A. 目前我国胆管结石发生率高于胆囊结石
- B. 目前我国胆色素结石多于胆固醇结石
- C. 普通X线检查胆固醇结石多不显影
- D. 泥沙样结石多为胆固醇结石
- E. 胆色素结石剖面多呈放射状条纹

正确答案：C 您选择的答案：

第23题 胆固醇结石好发于

- A. 胆囊内
- B. 肝内胆管
- C. 肝外胆管
- D. 胆总管
- E. 右肝管

正确答案：A 您选择的答案：

第24题 急性梗阻性化脓性胆管炎手术治疗常用

- A. 胆囊切除术
- B. 胆囊造口术
- C. 胆总管切开减压、T管引流
- D. 胆管空肠Roux-en-Y吻合术
- E. 胆总管十二指肠吻合术

正确答案：C 您选择的答案：

第25题 急性梗阻性化脓性胆管炎的治疗一般不宜采取

- A. 胆囊造口术
- B. 纠正水电解质和酸碱平衡失调
- C. 胆总管探查取石去除病灶
- D. 使用有效足量的抗生素
- E. 及时合理使用多巴胺

正确答案：A 您选择的答案：

第26题 对疑有胆结石所致梗阻性黄疸较深者，应选择哪种检查法较合适？

- A. 口服胆囊造影
- B. 静脉胆道造影
- C. EBCP
- D. PLE
- E. 气钡对比十二指肠造影

正确答案：D 您选择的答案：

第27题 引起胆绞痛及黄疸的常见原因是

- A. 急性胰腺炎
- B. 慢性胰腺炎
- C. 急性胆囊炎
- D. 胆总管结石
- E. 胆囊结石

正确答案：D 您选择的答案：

第28题 急性梗阻性化脓性胆管炎，最关键的治疗是

- A. 纠正休克
- B. 抗感染
- C. 胆道减压解除梗阻
- D. 胆囊切除
- E. 纠正酸中毒

正确答案：C 您选择的答案：

第29题 胆道蛔虫病的临床特点是

- A. 腹痛、黄疸
- B. 腹痛、寒战高热、黄疸
- C. 腹痛、寒战高热、黄疸、休克、中枢神经系统受抑制
- D. 腹部剧烈绞痛与不相称的轻微腹部体征
- E. 黄疸进行性加重

正确答案：D 您选择的答案：

第30题 梗阻性黄疸时，BUS显示肝内胆管扩张，胆总管直径2cm，进一步明确梗阻部位的检查是

- A. 放射性核素胰腺扫描

- B 低张十二指肠造影
- C PTC
- D ERCP
- E MRI

正确答案：C 您选择的答案：

第31题 下列哪项一般不需尽快行胆囊切除

- A. 无症状胆囊结石
- B. 口服胆囊造影胆囊不显影
- C. 结石直径超过2~3cm
- D. 合并糖尿病者在糖尿病已控制时
- E. 老年人和(或)有心肺功能障碍者

正确答案：A 您选择的答案：

第32题 胆道手术时，下列哪项不是胆总管探查指征

- A. 胆总管结石
- B. 黄疸病史
- C. 胆总管增粗
- D. 胆道蛔虫
- E. 胆囊积液

正确答案：E 您选择的答案：

第33题 肝外胆道的解剖特点中，下列哪项是错误的

- A. 胆囊分为底、体、颈三部
- B. Oddi 括约肌由胆管壶腹部括约肌构成
- C. 胆总管下端多与主胰管汇合
- D. 胆囊动脉常有变异
- E. 胆囊管常有变异

正确答案：B 您选择的答案：

第34题 急性梗阻性化脓性胆管炎最常见的原因是

- A. 胆总管结石
- B. 先天性胆总管囊肿
- C. 急性胆囊炎
- D. 胰头癌
- E. 胆囊癌

正确答案：A 您选择的答案：

第35题 Murphy征阳性提示

- A. 急性胆管炎
- B. 细菌性肝脓肿
- C. 急性胆囊炎
- D. 胆总管结石
- E. 肝内胆管结石

正确答案：C 您选择的答案：

第36题 诊断胆囊结石的简单而可靠的方法是

- A. BUS
- B. ERCP
- C. FIE
- D. 口服法胆囊造影
- E. 十二指肠引流术

正确答案：A 您选择的答案：

第37题 肝外胆道的解剖特点中，下列哪项是错误的

- A. 胆囊管常有变异
- B. 胆囊动脉常有变异
- C. 胆总管末端多与主胰管汇合
- D. Oddi 括约肌由胆胰管壶腹部括约肌构成
- E. 胆囊分为颈体底三部

正确答案：D 您选择的答案：

第38题 胆囊结石临床表现各异，主要取决于

- A. 结石的大小、部位、梗阻与否、有无感染
- B. 结石的大小及部位、嵌顿与否
- C. 体位的改变或静卧状态
- D. 进油腻食物后
- E. 结石嵌顿于胆囊颈部

正确答案：A 您选择的答案：

第39题 胆囊切除时需行胆总管探查的指征不包括

- A. 有梗阻性黄疸的临床表现
- B. 有胰腺炎表现
- C. 胆总管扩张，管壁增厚
- D. 胆管穿刺抽出泥沙样胆色素颗粒
- E. 胆囊积液

正确答案：E 您选择的答案：

第40题 胆道手术时，下述哪项不是胆总管探查的指征

- A. 胆总管，肝总管、肝胆管结石

- B 黄疸或黄疸病史
- C 胰头肿大、变硬
- D 胆总管增厚变粗
- E 胆囊积液

正确答案：E 您选择的答案：

第41题 胆管结石和急性胆管炎急性发作的典型症状是

- A 腹痛、呕吐、寒热
- B 腹痛、呕吐、黄疸
- C 腹痛、黄疸、腹泻
- D 腹痛、腹胀、昏迷
- E 腹痛、黄疸、寒热

正确答案：E 您选择的答案：

第42题 Charcot三联征间歇发作最大的可能是

- A 壶腹部癌
- B 肝细胞癌
- C 胆总管结石
- D 黄疸型肝炎
- E 细菌性肝脓肿

正确答案：C 您选择的答案：

第43题 梗阻性黄疸时，B超显示胆总管及以上胆管扩张，为明确梗阻部位首选的检查是

- A 静脉法胆道造影
- B 经皮肝穿刺胆道造影
- C 内镜逆行胰胆管造影
- D 核素扫描
- E 上腹部CT

正确答案：B 您选择的答案：

第44题 不属于腹腔镜胆囊切除术禁忌证的是

- A 疑有胆囊癌变者
- B 胆囊息肉者
- C 合并原发性胆管结石者
- D 有出血倾向或凝血功能障碍者
- E 合并妊娠者

正确答案：B 您选择的答案：

第45题 胆道感染急性并发症不包括

- A 胆囊穿孔
- B 胆道出血
- C 胆管炎性狭窄
- D 胆源性肝脓肿
- E 胆源性胰腺炎

正确答案：C 您选择的答案：

第46题 胆总管的血液供应主要来自

- A 肝固有动脉
- B 胆囊动脉
- C 胃十二指肠动脉
- D 肝右动脉
- E 肝左动脉

正确答案：C 您选择的答案：

第47题 B型超声(BUS)对哪种结石诊断准确率高?

- A 胆囊结石
- B 胆总管结石
- C 肾结石
- D 肝内胆管结石
- E 胰腺结石

正确答案：A 您选择的答案：

第48题 梗阻性黄疸时，BUS显示胆总管和肝内胆管均不扩张，为明确诊断应选择哪项检查

- A 放射性核素胰腺扫描
- B PTC
- C 低张十二指肠造影
- D ERCP
- E CT

正确答案：D 您选择的答案：

第49题 胆道疾病首选的检查方法为

- A 腹部CT
- B B超检查
- C 静脉胆道造影
- D 经皮肝穿刺胆道造影
- E 腹部磁共振

正确答案：B 您选择的答案：

第50题 胆道蛔虫病手术治疗指征应除外

- A 钻顶样疼痛剧烈

B. 积极治疗5天症状无缓解
C. 蛔虫与结石并存
D. 胆囊蛔虫病
E. 合并肝脓肿等并发症
正确答案：A 您选择的答案：

第51题 有关胆肠吻合术的叙述正确的是
A. 如胆囊无病变，无须切除胆囊
B. 泥沙样结石不易取尽者不宜行胆肠吻合
C. 结石复发者不宜行胆肠吻合
D. 适用于上段胆管通畅而下段有难以解除的梗阻性病变者
E. 胆管空肠Roux-en-Y吻合远期吻合口狭窄发生率高于胆总管十二指肠吻合术
正确答案：D 您选择的答案：

第52题 急性梗阻性化脓性胆管炎，最关键的治疗是
A. 输液、输血维持有效血容量
B. 纠正代谢性酸中毒
C. 静脉输入大量抗生素
D. 胆道减压引流解除梗阻
E. 急诊行胆囊切除术
正确答案：D 您选择的答案：

第53题 胆总管分段不包括
A. 十二指肠上段
B. 十二指肠后段
C. 十二指肠下段
D. 胰腺段
E. 十二指肠壁内段
正确答案：C 您选择的答案：

第54题 肝外胆管癌发生率最高的部位是
A. 左肝管
B. 下段胆管
C. 中段胆管
D. 上段胆管
E. 胆囊管
正确答案：D 您选择的答案：

第55题 急性梗阻性化脓性胆管炎休克最关键的治疗措施为
A. 足量广谱抗生素控制感染
B. 维持水、电解质平衡
C. 保护肝功能
D. 解除胆道梗阻，降低胆管内压力
E. 使用血管活性药物
正确答案：D 您选择的答案：

第56题 胆管癌最主要的组织学类型为
A. 腺癌
B. 鳞状细胞癌
C. 类癌
D. 腺鳞癌
E. 未分化癌
正确答案：A 您选择的答案：

第57题 胆囊三角是由
A. 胆囊管、肝总管、肝下缘所构成的三角区
B. 肝总管、胆囊管、胆总管所构成的三角区
C. 胆囊管、肝总管、肝上缘所构成的三角区
D. 胆囊管、胆总管、肝下缘所构成的三角区
E. 胆囊外侧缘、肝总管、肝下缘所构成的三角区
正确答案：A 您选择的答案：

第58题 以右上腹绞痛及黄疸为主要临床表现的常见疾病是
A. 壶腹周围癌
B. 胆道蛔虫病
C. 胆总管结石
D. 原发性硬化性胆管炎
E. 急性胆囊炎
正确答案：C 您选择的答案：

第59题 正常成人胆总管的直径为
A. 1.0~2.0cm
B. 2.0~3.0cm
C. 0.5~1.0cm
D. 0.6~0.8cm
E. 0.2~0.4cm
正确答案：D 您选择的答案：

第60题 胆囊动脉多数源自于
A. 肝左动脉

- B. 肝固有动脉
- C. 胃、十二指肠动脉
- D. 肝总动脉
- E. 肝右动脉

正确答案：E 您选择的答案：

第61题 Courvoisier征阳性的疾病最可能是

- A. 胆管上段癌
- B. 胆管下端癌
- C. 右肝管 级支癌
- D. 胆总管癌
- E. 胆囊体癌

正确答案：B 您选择的答案：

第62题 Reynolds五联征是指

- A. 腹痛、黄疸、寒战高热、呕吐、昏迷
- B. 腹痛、黄疸、寒战高热、休克、昏迷
- C. 腹胀、黄疸、寒战高热、休克、昏迷
- D. 腹痛、腹胀、寒战高热、休克、昏迷
- E. 腹泻、黄疸、寒战高热、休克、昏迷

正确答案：B 您选择的答案：

第63题 Charcot三联症是指

- A. 腹痛、呕吐、黄疸
- B. 呕吐、寒战高热、黄疸
- C. 腹痛、寒战高热、黄疸
- D. 黄疸、尿色深茶色、大便白陶土样
- E. 黄疸、高热、皮下瘀斑

正确答案：C 您选择的答案：

第64题 诊断胆囊结石简单而可靠的检查方法是

- A. ERCP
- B. BUS
- C. PTC
- D. MRI
- E. MRCP

正确答案：B 您选择的答案：

第65题 急性胆囊炎的描述不正确的是

- A. 多表现为右上腹阵发性绞痛
- B. 如无疼痛基本可以排除本病
- C. 常有轻度发热
- D. 不出现黄疸
- E. 血碱性磷酸酶升高比较常见

正确答案：D 您选择的答案：

第66题 急性梗阻性化脓性胆管炎最常见的病因是

- A. 胆管结石
- B. 胆道蛔虫
- C. 胆管狭窄
- D. 门静脉炎
- E. 医源性因素

正确答案：A 您选择的答案：

第67题 急性胆囊炎致病菌的主要来源于

- A. 肠道逆行入侵胆囊
- B. 淋巴管道
- C. 邻近脏器
- D. 经门静脉
- E. 经胃十二指肠动脉

正确答案：A 您选择的答案：

第68题 急性结石性胆囊炎急诊手术不适用于

- A. 发病时间大于72小时者
- B. 非手术治疗无效且病情加重恶化者
- C. 并发弥漫性腹膜炎者
- D. 并发急性化脓性胆管炎者
- E. 并发急性坏死性胰腺炎者

正确答案：A 您选择的答案：

第69题 胆囊结石的首选治疗方法是

- A. 饮食控制
- B. 溶石疗法
- C. ERCP取石
- D. 体外震波碎石
- E. 胆囊切除术

正确答案：E 您选择的答案：

第70题 B超对下列哪项诊断准确率最高

- A. 肝内胆管结石

- B. 肝总管结石
- C. 胆囊管结石
- D. 胆囊结石
- E. 胆总管结石

正确答案：D 您选择的答案：

第71题 关于T管引流的说法正确的是

- A. T管引流胆汁量每日应在500ml 以上
- B. 引流管胆汁正常且流量逐渐减少，手术后10天左右可试行夹管
- C. 夹管后患者如无不适，可不再行T管造影
- D. 因硅胶T管对周围组织刺激小宜尽量采用
- E. 如造影发现结石残留，则需保留T管2周

正确答案：B 您选择的答案：

第72题 引起右上腹绞痛及黄疸的最常见的原因是

- A 胆道虫回虫症
- B 急性胆囊炎
- C 胆总管结石
- D 先天性胆总管扩张
- E 复发性慢性胰腺炎

正确答案：C 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第73题 男性，10岁，突发剑突下阵发性剧烈绞痛3小时，发作时辗转不安，呻吟痛苦，伴恶心呕吐，发作过后如常人。检查无发热无黄疸，腹平软无明显压痛，白细胞计数正常，应诊断为何病

- A 急性胃炎
- B 急性胆囊炎
- C 肠套叠
- D 胆道蛔虫症
- E 胃溃疡穿孔

正确答案：D 您选择的答案：

第74题 女性，40岁，右上腹绞痛伴发热36小时，既往体健。体检：体温38.1℃，右上腹压痛，无反跳痛及肌紧张，Murphy征阳性。

B超检查显示胆囊结石，结石直径约3cm，胆囊壁增厚毛糙；血常规白细胞 $13 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞0.77，血清胆红素 $40 \mu\text{mol/L}$ 。最佳治疗是

- A. 广谱抗生素抗感染
- B. 消炎利胆
- C. 急诊行胆囊切除术
- D. 胆囊造口取石术
- E. 体外震波碎石、抗感染治疗

正确答案：C 您选择的答案：

第75题 女性，47岁，胆囊结石病史4年，曾先后发作性胆绞痛4次，BUS显示胆囊内充满型结石。首选的治疗方法是下列哪一种

- A 口服排石饮液
- B 口服熊去氧胆酸片
- C 口服利胆素片
- D 胆囊切除术
- E 经皮胆镜取石术

正确答案：D 您选择的答案：

第76题 男性，15岁，突发心窝部阵发性钻顶样疼痛6小时，疼痛时大汗淋漓，辗转不安，痛止时又平息如常，体检：剑突偏右方有深在压痛，无腹肌紧张及反跳痛，为明确诊断应采取简单安全的方法是

- A BUS
- B 右上腹X线平片
- C 测定血清淀粉酶
- D 十二指肠引流液检查
- E ERCP

正确答案：A 您选择的答案：

第77题 女性，40岁，反复发作右上腹痛3年，今晨突然右上腹绞痛并寒战高热，恶心、呕吐，继而出现神志淡漠、嗜睡。体检：体温 40.8°C ，脉搏130次/分，血压 $80/60\text{mmHg}$ ($10.7/8\text{kPa}$)，右上腹压痛，肌紧张。该患者最可能的诊断是

- A. 急性胆囊炎
- B. 急性梗阻性化脓性胆管炎
- C. 肝脓肿
- D. 急性胰腺炎
- E. 胆道蛔虫症

正确答案：B 您选择的答案：

第78题 男性，55岁，黄疸4个月，黄疸进行性加深，无明显腹痛。术前检查及术中探查证实为胆管下段癌，未见局部浸润及远处转移。应选择的术式为

- A. 肿瘤切除、胆道吻合术
- B. 肿瘤切除、胆管十二指肠吻合术
- C. 肿瘤切除、胆管空肠吻合术

D. 胰十二指肠切除术
E. 肿瘤段胆管置支撑管引流
正确答案：D 您选择的答案：

第79题 女性，60岁，诊断为急性胆囊炎，经非手术治疗已5天，目前仍疼痛加剧，伴高热，右上腹广泛压痛，反跳痛，腹肌紧张，肠音减弱，体温39℃，白细胞计数 $18 \times 10^9/L$ ，应做

A. 胆囊切除术
B. 胆囊切除及胆总管引流
C. 胆囊造瘘及腹腔引流术
D. 胆囊切除及腹腔引流术
E. 胆总管十二指肠引流术
正确答案：C 您选择的答案：

第80题 女性，43岁，因右上腹阵发性绞痛，伴恶心呕吐4小时来院。检查：体温37℃，右上腹深在轻度压痛，无腹肌紧张，Murphy征阴性，为确诊进一步检查应首选

A. 白细胞计数和分类
B. 腹部X线平片
C. B超
D. 测血清淀粉酶
E. FTIC
正确答案：C 您选择的答案：

第81题 男性，51岁，因“胆总管多发小结石”行胆总管切开取石加T管引流术后10日，术后患者一般情况尚可，每日胆汁引流量约400ml，T管造影胆总管下段结石残留。此时应如何处置

A. 夹管2~3日后拔除T管
B. 拔除T管，即刻手术治疗
C. 保留T管，注入溶石药物
D. 保留T管6周以上，待纤维窦道形成坚固后拔除T管经窦道行纤维胆道镜取石
E. 消炎利胆排石治疗
正确答案：D 您选择的答案：

第82题 女性，55岁，右上腹阵发性绞痛伴发热3天，恶心、呕吐。体检：体温38.2℃，皮肤黏膜无黄染，右上腹触及肿大胆囊，触痛，肌紧张，Murphy征阳性。血常规白细胞 $17 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞0.82，血胆红素 $30 \mu\text{mol/L}$ 。首先考虑的 diagnosis 是

A. 胆道蛔虫病
B. 急性胰腺炎
C. 急性胆囊炎
D. 胆总管结石
E. 胆管癌
正确答案：C 您选择的答案：

第83题 女性，40岁，2年来反复夜间上腹部不适，2天前进，油腻食物后突发右上腹部阵发性绞痛伴恶心。体检：体温38℃，经常巩膜轻度黄染，右上腹肌紧张，压痛明显，肠鸣音减弱，白细胞 $16 \times 10^9/L$ ，血清淀粉酶为180U/dl (Somogyi法)。应首先考虑诊断为何种疾病

A. 消化性溃疡穿孔
B. 胆道蛔虫病
C. 急性胰腺炎
D. 肝脓肿
E. 急性化脓性胆囊炎
正确答案：E 您选择的答案：

第84题 女性，64岁，因“右上腹绞痛伴发热”诊断为急性胆囊炎，已经非手术治疗5天，现患者持续剧烈疼痛，伴高热。体检：体温39.2℃，右上腹广泛压痛，反跳痛及腹肌紧张，肠鸣音减弱，血常规白细胞 $18 \times 10^9/L$ 。此时治疗应选择

A. 胆囊切除术
B. 胆囊造口术
C. 胆囊造口术加腹腔引流
D. 胆囊切除及胆总管切开加T管引流术
E. 胆管空肠Roux-en-Y吻合术加胆囊切除
正确答案：C 您选择的答案：

第85题 女，65岁，右上腹隐痛不适、纳差、厌油腻10余年，多次胆囊造影不显影，首先应考虑为

A. 胆道蛔虫病
B. 胆管癌
C. 慢性胰腺炎
D. 慢性胆囊炎
E. 胆囊肿瘤
正确答案：D 您选择的答案：

第86题 女性，45岁，反复发作右上腹痛伴黄疸半年。B超检查胆囊内充满小结石。血胆红素 $150 \mu\text{mol/L}$ ，尿胆红素强阳性。拟手术治疗应选择何种术式

A. 胆囊造瘘术
B. 胆囊切开取石术
C. 胆囊切除术
D. 胆囊切除+胆总管切开探查术
E. 腹腔镜胆囊切除术
正确答案：D 您选择的答案：

第87题 男，10岁，诊断为胆道蛔虫病，其病史体检不支持诊断的是

- A. 恶心、呕吐
 - B. 排虫史
 - C. 疼痛间歇性发作
 - D. 严重时出现急性胆管炎征象
 - E. 发病超过12小时，常有明显黄疸
- 正确答案：E 您选择的答案：

第88题 男性，52岁，右上腹阵发性绞痛伴寒战高热1天。体检：体温39.5℃，血压90/60mmHg(12/8kPa)，脉搏130次/分，巩膜及全身皮肤黄染，右上腹压痛，腹肌紧张。血常规白细胞 $20 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞0.90。诊断急性梗阻性化脓性胆管炎，手术方式首选

- A. 胆囊切除术
- B. 胆管空肠Roux-en-Y吻合术
- C. 胆管空肠Roux-en-Y吻合+胆囊切除术
- D. 胆总管切开减压、T管引流术
- E. 胆囊造口术

正确答案：D 您选择的答案：

第89题 男性，60岁，进行性加重的黄疸已1月，伴有上腹部胀痛，恶心呕吐，体重减轻。检查：周身黄染，肝大肋下4cm，可扪及扩大的胆囊，无触痛。Courvoisier征阳性，BUS显示肝外胆管扩张，胰头部无肿块，此病人可诊断为

- A. 胆囊癌
- B. 胰头癌
- C. 幽门管癌
- D. 胆管癌
- E. 肝细胞癌

正确答案：D 您选择的答案：

第90题 男性，43岁，突然右上腹绞痛，并出现寒战高热，于16小时后出现明显黄疸。检查：意识尚清楚，巩膜及周身黄染，BPI 30/70mmHg，体温38.5℃，右上腹轻度压痛，此病最可能为

- A. Courvoisier征
- B. Murphy征
- C. Charcot征
- D. Grey-Turner征
- E. Reynaud征

正确答案：C 您选择的答案：

第91题 男性，62岁，右上腹阵发性绞痛，伴寒战、高热24小时。检查：体温40℃，脉搏130次/分，血压90/60mmHg(12/8kPa)，巩膜及全身皮肤明显黄染，剑突下压痛，腹肌紧张，血常规白细胞 $21 \times 10^9/L$ 。急诊行剖腹探查，术中见胆总管直径为2.0cm，穿刺有脓性胆汁，此时应采用的术式为

- A. 胆囊切除
- B. 胆总管切开减压+T管引流
- C. 胆囊切除并胆总管切开引流减压
- D. 胆总管空肠Roux-Y吻合加胆囊切除
- E. 胆总管十二指肠吻合

正确答案：B 您选择的答案：

第92题 女性，45岁，反复发作右上腹痛3年，再发伴黄染4天。体检：体温37.7℃，巩膜轻度黄染，右上腹压痛。B超见胆囊内泥沙样结石，胆总管直径0.8cm，血清胆红素 $50 \mu\text{mol/L}$ ，尿胆红素阳性。最可能的诊断为

- A. 慢性胆囊炎急性发作
- B. 急性胆管炎
- C. 胆囊结石
- D. 胆囊结石+胆总管继发性结石
- E. 胆管癌

正确答案：D 您选择的答案：

第93题 女，54岁，发作性右上腹疼痛伴间断巩膜皮肤黄染半年。B超提示胆囊内多发米粒大小结石。手术方式最恰当的是

- A. 胆囊造瘘
- B. 腹腔镜胆囊切除
- C. 胆囊切除，胆总管探查
- D. 胆囊切除
- E. 胆肠吻合

正确答案：C 您选择的答案：

第94题 男性，52岁，右上腹痛已半年，近半个月出现黄疸，体重下降，食欲减退。既往患胆囊结石已5年。检查：巩膜及全身皮肤黄染，右上腹扪及的6cm×6cm肿块，无移动性，BUS显示胆囊部位有一实质性占位病变，并可见强光团及声影。此病人可能的诊断是

- A. 胆囊息肉
- B. 高位胆管癌
- C. 胆囊癌并胆囊结石
- D. 充满型胆囊结石
- E. 幽门管癌并肝十二指肠韧带淋巴结转移

正确答案：C 您选择的答案：

第95题 男性，50岁，3年前曾行胆总管切开取石术，现持续黄疸一个月，肝大肋下3cm，血清胆红素为 $70 \mu\text{mol/L}$ ，BUS显示胆总管直径2cm，下述何种检查方法是最优：

- A. 口服法胆囊造影术
- B. 静脉法胆道造影术
- C. 低张性十二指肠造影
- D. CT

E PTC

正确答案：E 您选择的答案：

第96题 女，80岁，诊断为急性胆囊炎，经非手术治疗已6天，目前疼痛加剧，伴高热，右上腹广泛压痛，反跳痛，腹肌紧张，肠鸣音减弱，体温39℃，白细胞计数 $18 \times 10^9/L$ ，应作

- A. 胆囊切除及胆总管引流术
- B. 胆囊切除及腹腔引流术
- C. 胆囊切除术
- D. 胆总管十二指肠引流术
- E. 胆囊造瘘及腹腔引流术

正确答案：E 您选择的答案：

第97题 女性，45岁，进油腻食物后右上腹绞痛1年余，发作时向右肩部放射，发作间期有时有餐后饱胀、呃逆等不适。为明确诊断首选的检查是

- A. 纤维胃镜
- B. B超
- C. PTC
- D. 腹部平片
- E. 上腹部CT

正确答案：B 您选择的答案：

第98题 女，38岁，突发右上腹剧痛并阵发性加剧3天，加重4小时，寒战高热，恶心呕吐。体检：全身黄染，体温39℃，脉搏120次/分，血压80/60mmHg，谵妄，神志不清，剑突偏左腹肌紧张，肝肋下2cm，WBC $15 \times 10^9/L$ ，中性80%，血清总胆红素 $50 \mu\text{mol/L}$ ，治疗首选

- A. 胆囊造口术
- B. 胆囊切除，腹腔引流术
- C. 胆总管减压引流
- D. 溃疡病穿孔缝合
- E. 抗休克，抗感染治疗

正确答案：C 您选择的答案：

第99题 女性43岁，突发右上腹剧痛并阵发性加剧3天，寒战高热，恶心呕吐。体检：全身黄染，体温39℃，脉搏120次/分，血压80/60mmHg，谵妄，神志不清，剑突偏左腹肌紧张，肝肋下2cm，WBC $15 \times 10^9/L$ ，中性80%血清总胆红素 $50 \mu\text{mol/L}$ ，本例治疗首选

- A. 抗休克，抗感染治疗
- B. 胆囊切除，腹腔引流术
- C. 胆囊造口术
- D. 胆总管减压引流
- E. 溃疡病穿孔缝合

正确答案：D 您选择的答案：

第100题 男性，47岁，右上腹痛伴有明显黄疸，BUS显示肝外胆管及肝内肝管均不扩张，为确定诊断应选择哪一项检查

- A. 核素肝扫描
- B. 十二指肠低张造影
- C. PTC
- D. ERCP
- E. MRI

正确答案：D 您选择的答案：

第101题 男性，62岁，黄疸半年，近1个月右上腹隐痛，黄疸进行性加深，消瘦皮肤瘙痒，尿色深黄、大便呈陶土色。体检：消瘦，皮肤黏膜明显黄染，肝脏肋缘下2cm，触痛。首选检查为

- A. CT
- B. B超
- C. MRI
- D. PTC
- E. ERCP

正确答案：B 您选择的答案：

第102题 女者，49岁，于两年前曾行胆总管探查取石，T形管引流术，术后至今先后发作性右上腹绞痛，黄疸4次，每次均经消炎疗法而愈，此次又发作性疼痛，黄疸，肝大肋下2cm，血清胆红素为 $20 \mu\text{mol/L}$ ，BUS显示直径为1.0cm，为进一步诊断应采用何种方法

- A. PFC
- B. ERCP
- C. 低张性十二指肠造影
- D. MRI
- E. 静脉法胆道造影

正确答案：B 您选择的答案：

第103题 女性，41岁，反复发作右上腹痛、发热、黄疸2年，1周前再次发作，给予抗感染治疗，症状无明显缓解，今晨突发高热寒战，躁动、谵妄。体检：体温39℃，血压80/60mmHg(10.7/8kPa)，巩膜黄染，右上腹压痛反跳痛。治疗的关键在于

- A. 足量广谱抗生素控制感染
- B. 补充足量液体
- C. 糖皮质激素冲击治疗
- D. 血管活性药物抗休克
- E. 胆总管切开减压、降低胆管内压力

正确答案：E 您选择的答案：

第104题 男性，12岁，突发心窝部阵发性钻顶样疼痛5小时，疼痛剧烈，大汗淋漓，辗转不安，痛止时如常人，体检：剑突偏右方有深在压痛，无腹肌紧张及反跳痛，为明确诊断应采用简单安全的检查方法是：

- A．测定血清淀粉酶
- B．右上腹X线平片
- C．BUS
- D．十二指肠引流液检查
- E．ERCP

正确答案：C 您选择的答案：

第105题 男性，17岁，中上腹碎发性钻顶样疼痛4小时，伴有恶心呕吐。体检：皮肤黏膜无黄染，腹软，剑突下稍偏右轻度深压痛，无反跳痛。为明，确诊首选的检查是

- A．呕吐物找蛔虫卵
- B．上消化道钡餐
- C．纤维胃镜
- D．B超
- E．血嗜酸粒细胞计数

正确答案：D 您选择的答案：

第106题 男性，62岁，黄疸半年，近1个月右上腹隐痛，黄疸进行性加深，消瘦皮肤瘙痒，尿色深黄、大便呈陶土色。体检：消瘦，皮肤黏膜明显黄染，肝脏肋缘下2cm，触痛。B超检查见肝大，肝内外胆管扩张，胆总管下段因肠道积气探查不清。为明确诊断进一步检查宜选择

- A．PTC
- B．ERCP
- C．CT
- D．MRI
- E．核素扫描

正确答案：B 您选择的答案：

第107题 女性，45岁，突发右上腹及心窝部刀割样绞痛伴阵发性加剧一天，发病后12小时寒战、高热，巩膜黄染，剑突偏右侧深压痛，右上腹轻度肌紧张，体温38℃，WBC $4 \times 10^9 / L$ ，血清总胆红素30 $\mu mol / L$ ，尿胆元(-)，尿胆素(++)，应诊断为

- A 溃疡病穿孔
- B 急性胰腺炎
- C 急性胆囊炎
- D 胆总管结石
- E 高位阑尾炎

正确答案：D 您选择的答案：

第108题 男性，12岁，突发剑突下阵发剧烈疼痛3小时，发作时辗转不安伴有恶心呕吐，既往曾有3次类似发作史，发作后无不适，发作后体检未见明显异常。血常规白细胞 $9 \times 10^9 / L$ ，中性粒细胞0.70，嗜酸性粒细胞0.05。首先考虑的诊断是

- A．急性胆囊炎
- B．胆囊结石
- C．胆道蛔虫病
- D．肠套叠
- E．胃溃疡

正确答案：C 您选择的答案：

第109题 男性，35岁，突发右上腹绞痛伴阵发加重2天，疼痛向右肩背部放射，低热、恶心。体检：体温38℃，巩膜轻度黄染，右上腹可触及肿大胆囊，触痛。血常规白细胞 $11 \times 10^9 / L$ ，中性粒细胞0.70，血清胆红素50 $\mu mol / L$ ，尿胆原阴性，尿胆红素强阳性，血淀粉酶300U / dl (Somogyi 法)。诊断首先考虑

- A．急性胆囊炎
- B．胆囊结石
- C．急性胰腺炎
- D．胆总管结石
- E．肝脓肿

正确答案：D 您选择的答案：

第110题 男性，15岁，突发剑突下钻顶样疼痛半天，半年前曾有一次类似发作。体检：皮肤黏膜无叩显黄染，右上腹压痛，可触及肿大胆囊。B超检查显示胆囊及胆管内有平行强光带。治疗应选择

- A．解痉镇痛
- B．消炎利胆
- C．利胆驱蛔
- D．ERCP取虫
- E．手术治疗

正确答案：E 您选择的答案：

第111题 女，60岁。黄疸、寒战、发热、上腹痛。此病人首先应考虑为

- A．急性胰腺炎
- B．胆总管结石
- C．胆囊积水
- D．病毒性肝炎
- E．高位化脓性阑尾炎

正确答案：B 您选择的答案：

第112题 女性，42岁，3年来经常夜间上腹部不适，2日前进油腻食，突然右上腹部阵发性绞痛伴恶心，入院时体温38℃，巩膜轻度黄染，右上腹肌紧张，压痛明显，肠鸣音减弱，WBC $6 \times 10^9 / L$ ，血清淀粉酶为128温氏单位，应首先考虑诊断为何种疾病

- A 高位急性阑尾炎
- B 急性胰腺炎
- C 溃疡病穿孔
- D 急性化脓性胆囊炎
- E 胆道蛔虫症

正确答案：D 您选择的答案：

第113题 女性，50岁，2年内先后发作4次右上腹绞痛，多在进食油腻食物后。B超显示胆囊内多枚结石，直径约1~2cm。首选的治疗方法是

- A．口服排石冲剂
- B．口服熊去氧胆酸片
- C．体外震波碎石
- D．胆囊切除术
- E．ERCP逆行取石

正确答案：D 您选择的答案：

第114题 男性，50岁，反复右上腹痛伴发热、黄疸3年。B超显示胆总管及以上胆管扩张，胆总管直径约2.5cm，胆总管下段可探及泥沙样结石。宜选择的治疗是

- A．口服中药排石
- B．溶石治疗
- C．胆总管切开取石
- D．胆肠吻合术
- E．胆肠吻合+胆囊切除术

正确答案：E 您选择的答案：

第115题 男性，39岁，因肝外胆管结石行胆管切开取石加T管引流术，术后患者恢复良好，所引流胆汁的量、颜色及性状无异常，一般应于术后多长时间试行夹管

- A．术后5天
- B．术后10天
- C．术后半月
- D．术后6周
- E．术后6个月

正确答案：B 您选择的答案：

第116题 男性，45岁，右上腹隐痛伴黄疸2个月。体检：轻度黄染，右上腹压痛，肝肋下约3cm。B超显示胆总管直径约2cm。为明确诊断首选检查为

- A．腹部CT
- B．腹部MRI
- C．ERCP
- D．PTC
- E．静脉法胆道造影

正确答案：C 您选择的答案：

第117题 女，45岁，右上腹疼痛2天来诊。体检：巩膜黄染，体温39℃，右上腹肌紧张，压痛(+)。B超：胆管轻度扩张，胆管内有结石，如不及时治疗，最严重的并发症是

- A．休克
- B．胆道出血
- C．胆源性肝脓肿
- D．胆囊穿孔
- E．胆管炎性狭窄

正确答案：A 您选择的答案：

三、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第118-120题

男性，62岁，右上腹阵发性绞痛伴恶心呕吐4小时，急诊入院，寒战高热，明显黄疸。检查：巩膜及全身皮肤黄染，P120次/分，T40℃，BP 90/60mmHg，剑突下压痛，腹肌紧张，WBC $20 \times 10^9/L$

1. 此病人应诊断为

- A 急性胆源性胰腺炎
- B 肝脓肿
- C 急性化脓性胆囊炎
- D 十二指肠溃疡急性穿孔
- E 急性梗阻性化脓性胆管炎

2. 本例的治疗原则是

- A 大量使用抗生素
- B 胃肠减压，维持水电解质平衡
- C 解痉，镇痛
- D 服用大量中药利胆
- E 胆道减压引流，解除梗阻

3. 急诊剖腹探查术，术中见胆总管直径为1.8cm，穿刺有脓性胆汁，P130次/分，BP50/30mmHg，此时应采用术式

- A 胆囊切除并胆总管切开引流减压
- B 胆囊切除术
- C 胆囊空肠改良式Roux-Y吻合
- D 胆总管空肠Roux-Y吻合
- E 胆总管切开引流减压T管引流

正确答案：EEE 您选择的答案：

第121-122题

男性，59岁，黄疸进行性加深5个月，近1个月来上腹隐痛。体检：巩膜皮肤明显黄染，肝脏右肋下2cm，可扪及肿大胆囊，无明显触痛，腹水征阴性。

1. 诊断需首先考虑

- A. 胆囊结石
- B. 胆管结石
- C. 慢性胆囊炎
- D. 慢性肝炎
- E. 胆管癌

2. 首选的检查为

- A. 静脉胆道造影
- B. BUS
- C. CT
- D. PTC
- E. 核素扫描

正确答案：EB 您选择的答案：

第123-125题

男，58岁，右上腹阵发性绞痛伴恶心呕吐12小时，急诊入院，寒战高热，明显黄疸。查体：巩膜及全身皮肤黄染，脉搏110次/分，体温39.5℃，血压90/60mmHg，剑突下压痛，腹肌紧张，血白细胞 $19 \times 10^9/L$

1. 该病人应诊断为

- A. 溃疡病急性穿孔
- B. 急性坏疽性胆囊炎
- C. 急性重症胰腺炎
- D. 细菌性肝脓肿
- E. 急性梗阻性化脓性胆管炎

2. 本病的治疗原则是

- A. 服用大量中药利胆
- B. 解痉镇痛
- C. 维持水电解质平衡
- D. 胆道减压引流，解除梗阻
- E. 大量使用抗生素

3. 急诊剖腹探查，见胆总管直径为1.6cm，穿刺有脓性胆汁，应采用的术式是

- A. 胆总管空肠Roux-Y吻合术
- B. 胆总管切开引流减压T管引流术
- C. 胆囊切除、胆总管切开减压T管引流
- D. 胆囊切除
- E. 胆总管探查

正确答案：EDC 您选择的答案：

第126-128题

女性，35岁，餐后突发右上腹绞痛2小时，进食油煎鸡蛋2个，疼痛向右肩部放射，1年前曾有类似发作一次，未经治疗自行缓解。体检：皮肤黏膜无明显黄染，右上腹压痛，有反跳痛及肌紧张，Murphy征阳性。

1. 最可能的诊断为

- A. 消化性溃疡穿孔
- B. 胆总管结石
- C. 急性结石性胆囊炎
- D. 急性梗阻性化脓性胆管炎
- E. 急性胰腺炎

2. 首选的检查是

- A. BUS
- B. CT
- C. MRI
- D. PTC
- E. 核素扫描

3. 最有效的治疗是

- A. 胆囊造口取石
- B. 胆囊切除
- C. 溶石治疗
- D. 消炎利胆
- E. ERCP逆行取石

正确答案：CAB 您选择的答案：

第129-132题

女性，14岁，上腹部钻顶样疼痛伴恶心、呕吐1小时。体检：体温37.2℃，皮肤黏膜无黄染，剑突下轻度深压痛，无反跳痛及肌紧张。血常规白细胞 $7.0 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞0.56，嗜酸性粒细胞0.06。

1. 诊断首先考虑

- A. 胆囊结石
- B. 胆管结石
- C. 急性胆囊炎
- D. 胆道蛔虫病
- E. 肠扭转

2. 首选检查方法是

- A. 立位腹平片
- B. BUS
- C. PTC
- D. ERCP
- E. CT

3. 该病特征性影像改变是

- A. 胆道造影多个小圆形充盈缺损
- B. B超见胆囊增大，轮廓模糊、增厚

- C. B超见胆管内有平行强光带
- D. B超见多个强回声光团，后方伴声影
- E. B超见肝内外胆管扩张
- 4. 其治疗方法主要是
- A. 非手术治疗
- B. 胆囊切除
- C. 胆总管探查、解除梗阻
- D. ERCP取虫
- E. 胆囊切除、胆总管探查

正确答案：DBCA 您选择的答案：

第133-135题

女性，35岁，临床表现为腹痛，寒热，黄疸

1. 临床上应首先考虑为

- A 胆囊结石
- B 壶腹周围癌
- C 急性化脓性胆囊炎
- D 肝内胆管结石
- E 结石阻塞的继发性胆管炎

2. 首选的辅助检查方法是

- A ERCP
- B CT
- C BUS
- D CT
- E MPd

3. 进一步的治疗原则是

- A 胰十二指肠切除术
- B 减压胆道取石T形管引流
- C 胆总管空肠Roux-Y吻合术
- D 胆囊空肠Roux-Y吻合术
- E 胆囊切除术

正确答案：ECB 您选择的答案：

第136-138题

男性，64岁，进行性无痛性黄疸1月，上腹胀痛，体重减轻。检查：巩膜及周身皮肤黄染，P90次/分，BP 140/70mmHg，血清总胆红素为70μmol/L，Courvoisier征阳性

1. 此病人首先考虑诊断为

- A 中、下段胆管癌
- B 胆囊癌
- C 肝门部胆管癌
- D 胆囊结石
- E 胆总管结石

2. 为进一步确诊应首先选用

- A ERCP
- B FIE
- C Cr
- D MRI
- E BUS

3. 如为胆管下端癌(下段癌)其治疗是

- A 胆管局部切除
- B 胆总管空肠Roux-Y胆道重建术
- C 胆囊空肠改良式Roux-Y吻合术
- D 胰十二指肠切除术
- E 胆囊空肠Roux-Y型吻合术

正确答案：AED 您选择的答案：

第139-141题

女性，49岁，近半年数次发作性右上腹疼痛，恶心呕吐，多为夜间睡眠后发作，并向右肩部放射。检查：肥胖体质，BP110/80mmHg，P90次/分，右上腹轻度压痛，无腹肌紧张

1. 此病人最可能的诊断是

- A 高位急性阑尾炎
- B 胆囊腺瘤性息肉
- C 十二指肠溃疡穿孔
- D 急性胰腺炎
- E 胆囊结石

2. 虽经治疗未缓解，反而持续性疼痛加重，右上腹压痛，反跳痛，腹肌紧张，体温38.5，此时可诊断为

- A 急性坏死性胰腺炎
- B 十二指肠溃疡穿孔并弥漫性腹膜炎
- C 胆总管结石
- D 结石性急性坏疽性胆囊炎
- E 急性化脓性胆管炎

3. 病情进一步加重，并出现黄疸，应首先考虑有

- A 急性坏死性胰腺炎
- B 胆囊穿孔性腹膜炎
- C 亚急性肝坏死
- D 胆囊癌侵犯肝总管
- E 胆囊结石进入胆总管并堵塞远端

正确答案：EDE 您选择的答案：

四、A4型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第142-146题

女性，41岁，突发右上腹绞痛半天，疼痛呈持续性并阵发性加剧，伴恶心，无发热及黄疸。体检：体温37.1℃，皮肤黏膜无黄染，右上腹深压痛，无反跳痛及肌紧张，Murphy征阴性。B超检查示胆总管中段腔内有一强光团伴声影，胆总管上段直径约1cm。

1. 诊断最可能是

- A. 胆总管结石
- B. 胆总管炎
- C. 胆管癌
- D. 胆道蛔虫病
- E. 急性梗阻性化脓性胆管炎

2. ERCP检查显示胆总管下段通畅，该患者首选手术方式为

- A. 胆囊切除
- B. 腹腔镜胆管切开取石
- C. 胆总管切开取石加T管引流术
- D. 胆管空肠Roux-en-Y吻合加T管引流术
- E. 胆总管十二指肠吻合加T管引流术

3. 若放置T管引流正常平均每日胆汁引流量在什么范围

- A. 0~50ml
- B. 50~100ml
- C. 100~200ml
- D. 200~400ml
- E. 400~700ml

4. 如行T管造影无异常发现，T管应如何处置

- A. 即刻拔除
- B. 开放T管引流24小时拔除
- C. 开放T管引流24小时，试夹管2~3天，仍无症状才可拔管
- D. 开放T管引流1周，试夹管1周，无症状拔管
- E. 保留T管6周以上

5. 若T管造影显示结石残留，应选择何种治疗

- A. 拔除T管，待瘘管闭合后手术
- B. 拔除T管，即刻手术治疗
- C. 保留T管，注入溶石药物
- D. 保留T管6周以上，待纤维窦道形成坚固后拔除T管经窦道行纤维胆道镜取石
- E. 消炎利胆排石治疗

正确答案：ACDCD 您选择的答案：

第147-151题

女性，46岁，反复发作右上腹痛伴黄疸1年，再发2天。疼痛多为绞痛，阵发性发作，向右肩部放射，常伴恶心、呕吐。黄疸较轻呈波动性，常在腹痛发作2、3天时出现，可自行缓解。体检：体温37.6℃，皮肤巩膜轻度黄染，右上腹可触及肿大胆囊，触痛。血常规白细胞 $9.8 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞0.70。

1. 首选辅助检查为

- A. 口服胆囊造影
- B. 静脉胆囊造影
- C. BUS
- D. PTC
- E. ERCP

2. 若检查显示胆总管及以上胆管扩张，胆总管上段直径约2.8cm，下段探查不清。为进一步明确诊断，应选择的检查是

- A. CT
- B. ERCP
- C. MRI
- D. 核素扫描
- E. 腹腔镜检查

3. 进一步检查结果显示为胆总管多发小结石，手术治疗的术式宜选择

- A. 胆总管切开取石
- B. 胆管空肠Roux-en-Y吻合术
- C. 胆总管十二指肠吻合术
- D. 胆管空肠Roux-en-Y吻合术，胆囊切除术
- E. 胆总管切开引流术

4. 若患者未行手术，保守治疗5天后，突发寒战高热，烦躁不安。体检：体温39.7℃，脉搏120次/分，血压100/70mmHg(13.3/9.33)，皮肤巩膜明显黄染，右上腹压痛，反跳痛及肌紧张。此时诊断应考虑

- A. 肝脓肿
- B. 急性胆囊炎
- C. 急性梗阻性化脓性胆管炎
- D. 急性胰腺炎
- E. 急性门静脉炎

5. 此患者治疗最重要的是

- A. 补充血容量
- B. 使用血管活性药物抗休克
- C. 广谱抗生素控制感染
- D. 胆囊造口减压
- E. 胆总管切开减压

正确答案：CBDCE 您选择的答案：

五、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次

或不被选择。

第152-156题

- A. Murphy征
 - B. Reynolds征
 - C. Grey-Turner征
 - D. Charcot征
 - E. Courvoisier征
 - 1. 胰头癌压迫胆总管，黄疸进行性加重，胆囊肿大但无压痛为
 - 2. 按压胆囊点，患者缓慢深吸气时，吸气过程中因疼痛而突然停止为
 - 3. 腹痛、寒战高热、黄疸为
 - 4. 腹痛、寒战高热、黄疸、休克、中枢神经系统抑制为
 - 5. 重症胰腺炎患者左腰部有青紫色斑为
- 正确答案：EADBC 您选择的答案：

第157-158题

- A 急性化脓性胆囊炎
 - B AOSC
 - C 急性出血性坏死性胰腺炎
 - D 急性坏死性小肠炎
 - E 绞窄性小肠梗阻
 - 1. Charcot三联征出现在
 - 2. Murphy征出现在
- 正确答案：BA 您选择的答案：

第159-162题

- A. 胆囊切除术
 - B. 胆囊切除加胆总管探查引流术
 - C. 胆囊造瘘术
 - D. 胆囊切除加胆总管空肠吻合术
 - E. Oddi 括约肌切开成形术
 - 1. 胆囊周围解剖关系不清时
 - 2. 慢性胆囊炎胆囊萎缩时
 - 3. 肝内胆管大量泥沙样结石时
 - 4. 胆囊多发小结石伴黄疸病史
- 正确答案：CADB 您选择的答案：

第163-167题

- A. 非手术治疗
 - B. 胆囊切除术
 - C. 胆管空肠Roux-en-Y吻合术
 - D. 胆总管切开引流、T管引流术
 - E. 肝叶切除术
 - 1. 无症状的胆囊结石
 - 2. 急性梗阻性化脓性胆管炎
 - 3. 胆总管泥沙样结石不易取尽
 - 4. 胆囊结石反复发作
 - 5. 肝内胆管结石局限于左叶
- 正确答案：ADCB 您选择的答案：

第168-171题

- A 胆囊切除术
 - B 胆囊造口术
 - C Oddi 括约肌切开成形术
 - D 胆囊切除加胆管空肠Roux-Y吻合术
 - E 胆囊切除加胆总管探查引流术
 - 1. 胆囊多发性小结石有黄疸史宜采
 - 2. 慢性胆囊炎合并胆囊积水宜采用
 - 3. 肝内胆管大量泥沙样结石宜采用
 - 4. 胆囊积脓穿孔合并感染性休克宜采用
- 正确答案：EADB 您选择的答案：

第172-173题

- A 胆道蛔虫症
 - B 急性梗阻性化脓性胆管炎
 - C 肝脓肿
 - D 急性水肿型胰腺炎
 - E 急性化脓性胆囊炎
 - 1. 胆囊结石最常见的并发症是
 - 2. 最易引起感染性休克的疾病
- 正确答案：EB 您选择的答案：

习题集 外科学 门静脉高压症

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 门静脉高压食管曲张静脉破裂出血最有效的止血方法是

- A 垂体后叶加压素静脉滴注
 - B 立即输新鲜全血
 - C 应用各种止血药物
 - D 三腔管气囊压迫
 - E 去甲肾上腺素加入冷盐水口服
- 正确答案：D 您选择的答案：

第2题 门静脉高压导致的病理变化不包括

- A 脾肿大、脾功能亢进
 - B 静脉曲张扩张
 - C 腹水
 - D 肝癌
 - E 门静脉高压性胃病
- 正确答案：D 您选择的答案：

第3题 门静脉与腔静脉之间的交通支临床上最有意义的是

- A 胃底、食管下段的交通支
 - B 直肠下段、肛管交通支
 - C 腹壁交通支
 - D 腹膜后交通支
 - E 以上都不是
- 正确答案：A 您选择的答案：

第4题 门静脉高压症最先出现的并发症是

- A 脾肿大
 - B 脾功能亢进
 - C 交通静脉扩张
 - D 腹水
 - E 肝性脑病
- 正确答案：A 您选择的答案：

第5题 门静脉系与腔静脉系交通支最具临床意义的是

- A 胃底、食管下段交通支
 - B 直肠下段、肛管交通支
 - C 前腹壁交通支
 - D 腹膜后交通支
 - E 脾静脉交通支
- 正确答案：A 您选择的答案：

第6题 门静脉的正常压力范围是

- A 5~12cmH₂O
 - B 5~9cmH₂O
 - C 13~24cmH₂O
 - D 10~25cmH₂O
 - E 20~30cmH₂O
- 正确答案：C 您选择的答案：

第7题 门静脉高压症时受影响最早的侧支血管为

- A 脐静脉
 - B 胃冠状静脉
 - C 直肠上静脉
 - D 腹膜后静脉
 - E 腹壁上静脉
- 正确答案：B 您选择的答案：

第8题 断流手术的目的是

- A 控制腹水
 - B 防止肝衰
 - C 防止肝癌
 - D 预防或控制上消化道出血
 - E 提高抵抗力
- 正确答案：D 您选择的答案：

第9题 门静脉高压症合并食管胃底静脉曲张破裂大出血死亡的主要原因是

- A 凝血功能障碍
 - B 多器官衰竭
 - C 肝肾综合征
 - D 肝昏迷
 - E 失血性休克
- 正确答案：E 您选择的答案：

第10题 门腔静脉分流术后发生脑病的原因是

- A 摄入大量蛋白

- B 氨中毒
- C 胃肠道出血
- D 饥饿
- E 以上都是

正确答案：E 您选择的答案：

第11题 门脉高压症最主要的原因是

- A 门静脉炎
- B 肝静脉阻塞
- C 肝硬化
- D 门静脉干血栓
- E 多囊肝

正确答案：C 您选择的答案：

第12题 断流手术方式很多，下列哪种方式疗效较为理想

- A 脾切除加贲门周围血管离断术
- B 胃冠状静脉结扎
- C 食管下段胃底切除
- D 胃底横断术
- E 胃后静脉和左膈下静脉离断

正确答案：A 您选择的答案：

第13题 降低门静脉压力最显著但肝性脑病发生率最高的手术方式是

- A 非选择性门体分流术
- B 远端脾-肾静脉分流术
- C 限制性门-腔静脉分流术
- D 门-腔静脉"桥式"分流术
- E 贲门周围血管断流术

正确答案：A 您选择的答案：

第14题 门静脉高压症分流术后，门静脉压力下降最明显，同时肝性脑病发生率最高的术式是

- A 脾肾静脉分流术
- B 门腔静脉分流术
- C 脾腔静脉分流术
- D 肠系膜上、下腔静脉分流术
- E 下腔静脉与肠系膜上静脉之间"桥式"吻合术

正确答案：B 您选择的答案：

第15题 门静脉与腔静脉之间的交通支中最有临床意义的是

- A 腹膜后交通支
- B 腹壁交通支
- C 直肠肛管交通支
- D 食管胃底交通支
- E 以上都不是

正确答案：D 您选择的答案：

第16题 门静脉高压症大出血的特点是

- A 发生急，来势猛，迅速引起休克
- B 发生急，出血量不大
- C 右上腹绞痛后黑便
- D 剧烈呕吐，呕血及黑便
- E 只有便血，无呕血

正确答案：A 您选择的答案：

第17题 下列哪项症状在门静脉高压症时不出现

- A 下肢静脉曲张
- B 脐周静脉曲张
- C 胃粘膜出血
- D 血小板减少
- E 脾肿大

正确答案：A 您选择的答案：

第18题 关于三腔管的应用，下面哪种说法是错误的

- A 三腔管一般放置24小时
- B 出血停止后，先排空胃气囊，再排空食管气囊，缓缓取出
- C 其并发症主要有吸入性肺炎、食管破裂和窒息
- D 放置三腔管时间不宜超过3~5天
- E 每隔12小时，应将气囊放空10~20分钟，如有出血再充气压迫

正确答案：B 您选择的答案：

第19题 门静脉高压症病人，实行分流术，哪一项是正确的

- A 病人有明显黄疸
- B 血清白蛋白低于50g/L时不宜进行
- C 适用于食管、胃底静脉曲张破裂出血的病人
- D 适用于严重腹水病人
- E 术后不会再发生胃底、食管静脉曲张

正确答案：C 您选择的答案：

第20题 分流手术的目的是

- A 纠正脾亢

- B. 控制腹水
- C. 纠正贫血
- D. 治疗肝性脑病
- E. 降低门静脉压力

正确答案：E 您选择的答案：

第21题 门静脉高压症的病理变化中，下列哪项是错误的

- A. 毛细血管滤过压增加，腹水形成
- B. 肝功能损害，白蛋白合成障碍
- C. 脾肿大，脾功能亢进
- D. 肝静脉淤积引起急性大出血
- E. 门静脉交通支扩张

正确答案：D 您选择的答案：

第22题 门静脉高压症断流术其主要优点不包括

- A. 明显降低门静脉压力
- B. 手术并发症少
- C. 既能控制出血又能保持肝血液供应
- D. 手术简单易于推广
- E. 手术创伤小，病人恢复快

正确答案：A 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第23题 男性，42岁，突然大量呕血，既往无腹痛史，体温37℃，脉搏98次/分，血压100/80mmHg，巩膜黄疸，肝未触及，脾大季肋下3cm，质硬，未叩出移动浊音，红细胞 $2.24 \times 10^{12}/L$ ，Hb：72g/L，白细胞 $9 \times 10^9/L$ ，血小板 $80 \times 10^9/L$ ，可能诊断为

- A. 胃溃疡病
- B. 胆道出血
- C. 胃炎
- D. 胃癌
- E. 门静脉高压症

正确答案：E 您选择的答案：

第24题 男性，48岁，11年前有乙型肝炎病史，4年前发现肝硬化，脾肿大，今突然呕血，黑便，伴头晕，出冷汗而来我院急诊，血压10/8kPa，脉搏110次/分，经复苏后循环稳定，未再出血，此时应

- A. 急诊胃镜检查
- B. 急诊胃肠钡餐检查
- C. 试用三腔管压迫
- D. 急诊分流术
- E. 急诊断流术

正确答案：A 您选择的答案：

第25题 男性，55岁，反复大呕血7次，确诊为食管静脉曲张破裂大出血。查体：贫血，腹壁静脉曲张，脾大季肋下4指，血压80/60mmHg，血红蛋白60g/L，血小板 $50 \times 10^9/L$ ，白细胞 $3.4 \times 10^9/L$ ，转氨酶100单位，应

- A. 静脉滴注垂体后叶素
- B. 口服去甲肾上腺素
- C. 行断流手术
- D. 行分流手术
- E. 三腔两囊管压迫

正确答案：E 您选择的答案：

第26题 女性，50岁，因体检发现AFP升高600mg/dl，入院体检：神志清，腹平软，肝脾未及，B超示：“小肝癌”，病人肝脏肿块大小应为

- A. 5.5cm
- B. 5cm
- C. 4.5cm
- D. 3cm
- E. 2cm

正确答案：B 您选择的答案：

第27题 女性，47岁，呕鲜血1天，既往有慢性乙型肝炎病史15年。体检：神志清楚，消瘦，面色晦暗，贫血貌，血压85/60mmHg(11.3/8kPa)，脾下缘达脐水平，肝脏未触及，腹水征阳性。血红蛋白85g/L，血胆红素55μmol/L，白蛋白31g/L。治疗宜选择

- A. 静脉使用止血药
- B. 口服去甲肾上腺素冰盐水
- C. 静脉使用奥美拉唑
- D. 三腔管压迫止血
- E. 急诊手术行门体分流

正确答案：D 您选择的答案：

第28题 男，50岁，突然大量呕血，既往无腹痛病史，体温36.5℃，脉搏96次/分，血压96/70mmHg，巩膜黄染，肝未触及，脾大肋下4cm，血红细胞 $3.20 \times 10^{12}/L$ ，血红蛋白70g/L，白细胞 $6.5 \times 10^9/L$ ，血小板 $80 \times 10^9/L$ ，可拟诊为

- A. 食管胃底静脉曲张破裂出血
- B. 胃癌出血
- C. 应激性溃疡出血
- D. 胆道出血

E. 溃疡病出血

正确答案：A 您选择的答案：

第29题 女性，67岁，因突发恶心，呕鲜血300ml伴柏油便入院，肝炎史8年，B超示肝硬化，体检脾肋下2指，肝肋下未及，补液止血治疗同时用三腔管压迫，下列哪项正确

- A 三腔管以250g重物悬吊
- B 一般胃气囊充气量为100ml
- C 做好病人思想工作，边吞咽边插三腔管
- D 病人仰卧便于牵引压迫
- E 放置三腔管同时不宜持续超过6~7天

正确答案：C 您选择的答案：

第30题 男性，47岁，柏油样黑便3天来诊，乙型肝炎病史4年，既往无胃、十二指肠溃疡病史，做食管X线钡餐检查见食管下段黏膜影呈串珠样改变，应考虑为

- A. 食管炎
- B. 食管静脉曲张
- C. 贲门失弛缓症
- D. 食管癌
- E. 食管平滑肌瘤

正确答案：B 您选择的答案：

第31题 男性，40岁，因门静脉高压症食管胃底静脉曲张出血，已行脾切除，贲门周围血管离断术1年，近2天来又有黑粪，每日4次，糊状，量每次150ml左右，血红蛋白80g/L，血压12/8kPa，应首先考虑作何种检查

- A 急诊胃肠钡餐检查
- B 急诊胃镜
- C 先止血待病人情况好转后再作胃镜检查
- D 选择性动脉造影
- E 经皮肝穿刺行门静脉造影

正确答案：B 您选择的答案：

第32题 男性，34岁，因大量腹水2月，呕血3天入院，体格检查：胸腹壁及腰背部静脉曲线明显，血流方向向上，下肢浮肿明显，住院期间做多种检查后作下腔静脉，肠系膜上静脉一右心房搭桥术，术后腹水明显消退，此例门静脉高压症的主要阻塞在

- A 窦前
- B 窦后
- C 窦内
- D 肝前
- E 肝后

正确答案：E 您选择的答案：

第33题 男性，43岁，2个月前发生上消化道出血，经胃镜检查证实为食管静脉曲张，既往有乙型肝炎病史，目前肝功能有轻度损害，应选择哪个术式，既能预防食管曲张静脉再出血，又对肝功能影响最小

- A 脾肾静脉分流术
- B 肠系膜上静脉一下腔静脉分流术
- C 门腔静脉分流术
- D 脾切除术
- E 脾切除，贲门周围血管离断术

正确答案：E 您选择的答案：

第34题 男性，50岁，既往有肝炎病因，因呕血1天急诊。体格检查：贫血貌，血红蛋白80g/L，血小板数 $50 \times 10^9/L$ ，白细胞数 $4.0 \times 10^9/L$ ，以下哪项为其主要临床表现

- A 疼痛，黄疸，乏力
- B 腹痛，无力，贫血
- C 肝大，腹胀，消瘦
- D 脾大，脾亢，黑便
- E 脾大，肝大，发热

正确答案：D 您选择的答案：

第35题 男性，48岁，既往有乙型肝炎病史，此次因食管静脉曲张、上消化道出血而入院。检查发现其肝功能轻度损害，宜选择既最小限度地影响肝功能，又预防食管曲张静脉再出血的术式，下列哪项正确

- A. 脾-肾静脉分流术
- B. 肠系膜上、下腔静脉分流术
- C. 脾切除+贲门周围血管离断术
- D. 经颈静脉肝内门体分流术
- E. 非选择性门体静脉分流

正确答案：C 您选择的答案：

第36题 女性，52岁，反复呕血2年，1天前突然又呕血，胃镜确诊为食管曲张静脉出血，体格检查：贫血貌，血压11/8kPa，蛙状腹，脾肋下3cm，肝功能SGPT：120U(赖氏法)，A/G比值为0.82：1，总胆红素(TB)：35μmol/L，最宜采用

- A 静脉注射止血药
- B 口服去甲肾上腺素
- C 脾切除，贲门周围血管离断术
- D 限制性门腔分流术
- E 三腔管压迫止血

正确答案：E 您选择的答案：

第37题 男，45岁，上消化道出血，经胃镜证实为食管静脉曲张破裂出血，既往有乙肝病，目前肝功能有轻度损害，应选择哪种术式，既能预防食管曲张静脉再出血，又对肝功能影响小

- A. 脾切除，贲门周围血管离断术
 - B. 脾切除
 - C. 门腔静脉分流术
 - D. 肠腔分流术
 - E. 脾肾静脉分流术
- 正确答案：A 您选择的答案：

三、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第38-39题

男性，33岁，突然呕鲜红色血约800ml后半小时来院，伴有恶心，心慌，乙型肝炎病史7年。体检：无黄染，血压110/75mmHg(16/10kPa)，脉搏100次/分，肝脏未触及，腹水征可疑。

1. 为明确诊断，待生命体征平稳后进一步检查宜选择
 - A. 上消化道钡餐
 - B. 消化系统B超
 - C. 纤维胃镜
 - D. 腹部CT
 - E. 选择性腹腔动脉造影
2. 该患者的诊断为门静脉高压食管静脉曲张，如再出现大出血，应如何紧急处置
 - A. 血管加压素
 - B. 内镜治疗
 - C. 三腔管压迫止血
 - D. 经颈静脉肝内门体分流术
 - E. 急诊手术

正确答案：CC 您选择的答案：

第40-42题

女性，27岁，突然呕血来急诊，呕血2次，约1200ml，血色鲜红，病人否认既往有肝炎病史

1. 体格检查时与门静脉高压症相一致的体征为
 - A. 脾肋下未及
 - B. 血压11/8kPa
 - C. 上腹壁静脉曲张
 - D. 上腹部压痛
 - E. 可疑巩膜黄染
2. 为了明确出血病因，病人生命体征稳定后，应选择何种检查
 - A. 选择性腹主动脉造影
 - B. 上腹部胃肠钡餐摄片
 - C. B型超声波检查肝、脾
 - D. 纤维胃镜检查
 - E. 用三腔管明确出血原因
3. 经一系列检查明确病人有肝硬化，食管静脉曲张，脾肿大，无黄疸，此病人若手术治疗，不宜行下列哪项手术
 - A. 脾切除，脾肾分流术
 - B. 脾切除，门腔限制性分流术
 - C. 脾切除，贲门周围血管离断术
 - D. 脾切除，脾腔分流术
 - E. 单纯脾切除术

正确答案：CDE 您选择的答案：

第43-45题

男，55岁，反复呕血半年，突然呕血一天入院。有肝炎病史8年。入院后经检查确诊为食管静脉曲张破裂出血。虽经积极非手术治疗，仍反复出血。查体：神清，贫血貌，血压80/60mmHg，腹壁静脉曲张，腹软，移动性浊音阴性，脾大肋下4cm

1. 为下一步诊治需进行的最主要的检查是
 - A. 选择性腹腔动脉造影
 - B. 血常规及出凝血时间和肝功能检查
 - C. 凝血酶原时间和肝功能检查
 - D. CT检查
 - E. MRI检查
2. 若为Child A级，应采取的首要治疗措施是
 - A. 限期手术
 - B. 急诊手术
 - C. 局部止血药的应用
 - D. 硬化剂注射疗法
 - E. 三腔管压迫止血
3. 该病人的手术方式可为
 - A. 脾切除术
 - B. 腹腔静脉转流术
 - C. 分流手术
 - D. 断流手术
 - E. 脾切除+贲门周围血管离断术

正确答案：BBE 您选择的答案：

第46-48题

男性，52岁，因腹胀不适2月，伴低热来院门诊，体检：神清，一般状态尚可，巩膜轻度黄染，肝肋下未及，脾肋下2指，肝功能A/G 1.25，白蛋白30g/L，追问病史，10年前曾患乙肝，病史中无呕血，黑便史，C1示食管胃底静脉曲张，B超示腹水(+)。

1. 病人最有可能合并症状是
 - A. 双下肢散在出血点

- B 右锁骨上淋巴结肿大
C 内痔
D 杵状指
E 颈静脉怒张

2. 治疗中哪项不适用

- A 保肝
B 制酸
C 软食
D 手术预防出血
E 利尿剂

3. 病人存在腹水，形成的最主要原因

- A 门脉压力增高，组织液回收少，漏入腹腔
B 淋巴液输出不畅，从肝表面漏入腹腔
C 肝功能下降，白蛋白水平低致血浆外渗
D 体内ADH增加水钠潴留
E 以上均不是

正确答案：CDC 您选择的答案：

第49-51题

男性，45岁，有冠心病，因门脉高压，上消化道急性大出血入院，体检：巩膜黄染，有明显腹水

1. 门脉高压，急性上消化道出血的紧急处理

- A 三腔管气囊压迫止血
B 垂体后叶加压素
C 脾、肾静脉分流术
D 门腔静脉分流术
E 胃底周围血管离断术

2. 应用三腔管应注意哪项

- A 预防吸入性肺炎
B 防止气囊滑出堵塞咽喉
C 每隔12小时将气囊放空10~12分钟
D 拔管前应给病人口服液体石蜡
E 以上都是

3. 如该病人需行分流术，分流指征

- A 脾肿大，脾功亢进而无食管静脉曲张者
B 无腹水，血清胆红素 $17\mu\text{mol/L}$ 以下，胃底曲张静脉破裂大出血
C 曾有大出血史，有腹水，但经治疗后腹水在短期内无消退者
D 有食管静脉曲张，但无出血史者
E 以上都是

正确答案：AEB 您选择的答案：

四、A4型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第52-53题

男性，51岁，厌食、消瘦3年余，近3天嗜睡。体检，嗜睡，消瘦，贫血貌，腹壁静脉曲张，脾脏中度肿大，腹水征阳性，双下肢轻度水肿。诊断为门静脉高压症。入院后查：血白蛋白 21g/L ，血胆红素 57mmol/L 。

1. 按Child分级该患者肝功能应为

- A. A级
B. B级
C. C级
D. D1级
E. D2级

2. 若患者住院期间突发大量呕血，最有效的紧急治疗措施是

- A. 三腔管压迫止血
B. 急诊胃镜下止血
C. 经颈静脉肝内门体分流
D. 急诊胃底周围血管离断术
E. 静脉使用止血药

正确答案：CA 您选择的答案：

五、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第54-57题

- A 脾、肾静脉分流术
B 门腔静脉分流术
C 肠系膜上静脉、下腔静脉桥式分流术
D 肠系膜上静脉、下腔静脉侧分流术
E 远端脾、肾静脉分流术

1. 降低门静脉压力有较大作用的术式为

2. 消除脾功亢进的术式为

3. 选择性分流术为

4. 术后肝性脑病发生率最高的分流术为

正确答案：BAEB 您选择的答案：

第58-59题

- A. 门静脉-下腔静脉端侧分流术

B. 远端脾-肾静脉分流术
C. 贲门周围血管离断术
D. 肠系膜上静脉与下腔静脉"桥式"分流术
E. 肝脏移植
1. 术后肝性脑病发生率最高的术式是
2. 治疗终末期肝病并发门静脉高压食管胃底曲张静脉出血的理想办法是
正确答案：AE 您选择的答案：

第60-62题

A. 远端脾、肾静脉分流术
B. 肠系膜上静脉、下腔静脉侧分流术
C. 肠系膜上静脉、下腔静脉桥式分流术
D. 门腔静脉侧分流术
E. 中心性脾、肾静脉分流术
1. 术后肝性脑病发生率最高的是
2. 限制性分流是
3. 降低门静脉压力效果最明显的是
正确答案：DCD 您选择的答案：

第63-64题

A 0.2~0.5kPa(2~5cmH₂O)
B 0.6~1.2kPa(6~12cmH₂O)
C 1.3~2.4kPa(13~24cmH₂O)
D 2.5~3.9kPa(25~40cmH₂O)
E 4.0~5.0kPa(41~60cmH₂O)
1. 门静脉的正常压力为
2. 正常的中心静脉压为
正确答案：CB 您选择的答案：

习题集 外科学 肝脏疾病

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 Coui naud分段法将肝脏分为8段，其中尾状叶在

- A I段
- B Ⅱ段
- C Ⅲ段
- D V段
- E Ⅵ段

正确答案：A 您选择的答案：

第2题 肝癌晚期的最常见主要体征是

- A．黄疸
- B．消瘦
- C．肝脏缩小
- D．肝脏肿大
- E．肝区叩击痛

正确答案：D 您选择的答案：

第3题 AFP定性测定持续阳性，一般不考虑

- A．肝细胞癌
- B．活动性肝病
- C．结肠癌肝转移
- D．妊娠
- E．生殖胚胎性肿瘤

正确答案：C 您选择的答案：

第4题 原发性肝癌主要应鉴别的疾病是

- A 肝硬变
- B 慢性肝炎
- C 肝内胆管结石
- D 多囊肝
- E 肝肉瘤

正确答案：A 您选择的答案：

第5题 监测肝癌手术后复发的首选检查方法是

- A．放射性核素肝扫描
- B．超声波检查
- C．CT检查
- D．选择性腹腔动脉或肝动脉造影
- E．血清甲胎蛋白动态监测

正确答案：E 您选择的答案：

第6题 小肝癌定位诊断的各种检查方法中最有价值的是

- A．B超检查
- B．CT检查
- C．放射性核素肝扫描
- D．选择性腹腔动脉或肝动脉造影
- E．磁共振成像

正确答案：D 您选择的答案：

第7题 目前肝癌早期宜采用哪一种治疗为主

- A 放射疗法
- B 化学疗法
- C 手术切除
- D 中医中药
- E 免疫疗法

正确答案：C 您选择的答案：

第8题 对伴有肝硬化的患者，肝切除量一般不超过全肝的

- A．30%
- B．40%
- C．50%
- D．60%
- E．70%

正确答案：C 您选择的答案：

第9题 细菌性肝脓肿最常见的原因

- A 坏疽性阑尾炎
- B 溃疡性结肠炎
- C 细菌性心内膜炎
- D 胃十二指肠溃疡穿孔
- E 胆道感染

正确答案：E 您选择的答案：

第10题 原发性肝癌最有效的治疗方法是

- A．手术切除

- B. 全身化疗
- C. 肝动脉介入化疗
- D. 放疗
- E. 免疫治疗

正确答案：A 您选择的答案：

第11题 对原发性肝癌相对专一的化验检查是

- A. 癌胚抗原
- B. 甲胎蛋白
- C. γ-谷氨酰转肽酶
- D. 碱性磷酸酶
- E. 乳酸脱氢酶

正确答案：B 您选择的答案：

第12题 肝癌肝外血行转移多见于

- A. 肺
- B. 骨
- C. 脑
- D. 肠系膜
- E. 胃

正确答案：A 您选择的答案：

第13题 肝癌血行肝外转移多见于

- A. 肾
- B. 胰
- C. 脑
- D. 肺
- E. 胃

正确答案：D 您选择的答案：

第14题 阿米巴原虫是沿何途径进入肝内形成阿米巴肝脓肿的

- A. 肝静脉
- B. 肝动脉
- C. 胆道
- D. 淋巴道
- E. 门静脉属支

正确答案：E 您选择的答案：

第15题 肝癌探查指征哪项是错误的

- A. 未超过半肝
- B. 肿瘤局限
- C. 未侵及肝门
- D. 无心、肺、肾功能严重损害
- E. 有黄疸、腹水

正确答案：E 您选择的答案：

第16题 左右半肝划分的标志为

- A. 镰状韧带
- B. 门静脉
- C. 肝总管
- D. 下腔静脉右缘至胆囊中部
- E. 下腔静脉左缘至胆囊中部

正确答案：E 您选择的答案：

第17题 目前最佳的小肝癌定位诊断方法是

- A. B超
- B. CT
- C. X线钡餐造影
- D. MRI
- E. 选择性动脉造影

正确答案：E 您选择的答案：

第18题 包在肝脏格利森纤维鞘内的管道有

- A. 门静脉，肝静脉，肝胆管
- B. 肝动脉，门静脉，胆总管
- C. 肝动脉，门静脉，肝静脉
- D. 肝动脉，肝胆管，门静脉
- E. 肝动脉，肝胆管，肝静脉

正确答案：D 您选择的答案：

第19题 下列哪些情况适宜作穿刺检查

- A. 肝管细胞癌
- B. 继发性肝癌
- C. 肝包囊虫病
- D. 阿米巴肝脓肿
- E. 肝细胞癌

正确答案：D 您选择的答案：

第20题 肝组织正常时，最多可切除多少肝组织仍能维持正常肝功能

- A . 30%
- B . 40%
- C . 50%
- D . 60%
- E . 70%

正确答案：E 您选择的答案：

第21题 细菌性肝脓肿的临床表现，下列哪项是错误的

- A . 寒战、高热、肝大、肝区痛
- B . 严重时出现黄疸
- C . 有脓血症的表现及转移性脓肿
- D . 少数病人有胆道出血
- E . 多有反应性胸膜炎及胸腔积液

正确答案：E 您选择的答案：

第22题 继发性肝癌特点不包括

- A . 以腹部内脏的癌肿转移至肝脏为多
- B . 以原发性癌肿引起的表现为主要表现
- C . 血清甲胎蛋白阴性
- D . 多为多发结节
- E . 无法手术切除

正确答案：E 您选择的答案：

第23题 原发性和继发性肝癌的主要鉴别方法是

- A . 寻找肝以外有无原发性癌肿病灶
- B . γ -谷氨酰转肽酶测定
- C . CEA测定
- D . 肝肿块的大小
- E . 反复测定肝功能

正确答案：A 您选择的答案：

第24题 原发性肝癌早期转移途径为

- A 肺内转移
- B 淋巴转移
- C 直接浸润转移
- D 肝内进行转移
- E 骨转移

正确答案：D 您选择的答案：

第25题 肝癌与细菌性肝脓肿的共同点是

- A . 早期高热，呈弛张热
- B . 超声检查出现液平面
- C . 肝肿大，压痛明显
- D . 白细胞升高，核左移
- E . CT检查有占位性病变

正确答案：E 您选择的答案：

第26题 符合阿米巴肝脓肿特点的是

- A . 病情急骤，全身脓毒症症状明显
- B . 多为黄白色脓液
- C . 脓肿较大，多为单发
- D . 血液细菌培养常为阳性
- E . 血液检查无任何异常

正确答案：C 您选择的答案：

第27题 引起细菌性肝脓肿的主要原因是

- A . 胆道感染
- B . 化脓性阑尾炎
- C . 败血症
- D . 膈下脓肿
- E . 肝动脉感染

正确答案：A 您选择的答案：

第28题 细菌性肝脓肿中等大小，主要治疗措施为

- A 全身应用抗生素
- B 输血，应用抗生素
- C 穿刺抽脓，应用抗生素
- D 全身支持疗法，应用抗生素
- E 手术切开引流

正确答案：E 您选择的答案：

第29题 对疑有早期原发性肝癌的患者，应首先用哪一种方法检查较好

- A 同位素肝扫描
- B 血清甲胎蛋白动态观察检查
- C 肝区超声波检查
- D 血清 γ -谷氨酰转肽酶
- E 选择性肝动脉造影

正确答案：B 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第30题 女性，48岁，右上腹痛2年，有时低热，伴脓血便，体检：右肝增大，轻度压痛，x线右膈肌抬高，右胸腔积液较多，B超示：肝右叶巨大液平，同位素扫描占位性病变首先考虑

- A 肝癌
- B 阿米巴性肝脓肿
- C 细菌性肝脓肿
- D 急性肝炎
- E 肝包囊虫病

正确答案：B 您选择的答案：

第31题 男性，35岁，右上腹胀痛4个月，突发全腹痛2小时。慢性乙型肝炎病史15年，肝硬化5年。体检：消瘦，贫血貌，血压100/60mmHg(13.3/8kPa)，肝脏肿大，全腹压痛，反跳痛，移动性浊音阳性，腹腔穿刺可抽得不凝血。最可能的诊断是

- A 消化性溃疡穿孔
- B 胆囊炎穿孔
- C 肝血管瘤破裂
- D 肝癌破裂
- E 腹主动脉破裂

正确答案：D 您选择的答案：

第32题 男，38岁，突发寒战、高热(体温39~40℃)，为弛张热，右上腹痛，肝大，右上腹触痛伴肌紧张，白细胞增高，核左移，胸腹透视右膈肌升高，活动受限，B超示肝占位伴液平面，应首先考虑

- A 胆道感染
- B 细菌性肝脓肿
- C 阿米巴性肝脓肿
- D 继发性肝癌
- E 原发性肝癌

正确答案：B 您选择的答案：

第33题 男性，32岁，右上腹疼痛不适，无畏寒，发热，黄疸，血AFP阳性，B超：肝右叶1.5cm占位病变，最适宜的治疗方法

- A 手术切除
- B 化疗
- C 放疗
- D 免疫治疗
- E 肝移植

正确答案：A 您选择的答案：

第34题 男，48岁，B超发现肝右叶约2cm实性占位病变，甲胎蛋白500ug/L，肝功正常，8年前有肝炎病史。最佳处理方案是

- A 放疗
- B 化疗
- C 肝动脉栓塞
- D 手术
- E 观察随访

正确答案：D 您选择的答案：

第35题 男性，44岁，肝病多年，随访发现肝右叶8cm占位性病变，周边多个卫星灶，肝肾功能正常，首选治疗方案

- A 全身化学治疗
- B 肿瘤局部放射治疗
- C 手术切除
- D 介入治疗
- E 肿瘤局部无水酒精注射

正确答案：D 您选择的答案：

第36题 男性，60岁，上腹部隐痛不适3月余，伴纳差，乏力。体检：腹平坦，无压痛，未及肿块，移动性浊音(-)，B超检查，肝左叶见一直径1.5cm光团，胃镜示胃窦部溃疡病变，组织学检查高分化腺癌，最适宜的治疗方案

- A 化疗
- B 肝动脉插管化疗
- C 胃大部切除加肝左叶切除
- D 免疫治疗
- E 放疗

正确答案：C 您选择的答案：

第37题 女性，52岁，B型超声波检查发现肝占位性病变1周，查肝功能正常，下列哪项阳性最有助于诊断原发性肝癌

- A γ -GT
- B AFP
- C MRI
- D CT
- E B超

正确答案：B 您选择的答案：

第38题 男性，39岁，右上腹痛伴寒战高热1周，弛张热，体温在38.5~40.1℃间。体检：体温39.7℃，未见明显黄疸，肝肋缘下3cm，有压痛及肌紧张。X线透视见右侧膈肌抬高，运动受限。B超显示液平面。白细胞 $18.4 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞0.90。应首先考虑

- A 急性肝炎

- B. 细菌性肝脓肿
- C. 阿米巴肝脓肿
- D. 急性胆囊炎
- E. 膈下脓肿

正确答案：B 您选择的答案：

第39题 男性，58岁，右上腹痛3个月。体检：右季肋部饱满，肝脏右肋缘下2cm，质地较硬，边缘不光滑，表面呈结节状。B超见肝右叶直径约7cm占位性病变，周围多个卫星灶。AFP>400μg/L，肝肾功能正常。首选的治疗方案是

- A. 手术切除
- B. 肿瘤局部放疗
- C. 全身化疗
- D. 肝动脉插管化疗
- E. 肿瘤局部无水乙醇注射

正确答案：D 您选择的答案：

第40题 男性，45岁，突起寒战，高热，右上腹痛，体温39~40℃，为弛张热，肝大，右上腹触痛伴肌紧张，白细胞增高，核左移，胸腹部透视见右膈升高，运动受限，超声示液平，同位素扫描见肝占位病变，应先考虑

- A. 肝癌
- B. 急性肝炎
- C. 阿米巴性肝脓肿
- D. 细菌性肝脓肿
- E. 胆道感染

正确答案：D 您选择的答案：

第41题 男，56岁，原发性肝癌手术后3个月，门诊复查，下列哪一项是不必要的

- A. 癌胚抗原
- B. 胸部X线片
- C. 肝功能检查
- D. 肝B超检查
- E. 甲胎蛋白测定

正确答案：A 您选择的答案：

第42题 男性，60岁，右上腹疼痛伴黄疸3月余。B超检查肝脏多发性散在性光团，AFP(-)，诊断继发性肝癌，其诊断的关键

- A. 肝穿刺
- B. 找出原发灶
- C. CT
- D. MRI
- E. 肝血管造影

正确答案：B 您选择的答案：

第43题 男性，43岁，体检发现肝脏占位。先后3次监测血清AFP>400μg/L。CT显示实性占位，大小约3cm×2cm×2cm，孤立。该患者最佳治疗是

- A. 早期手术切除
- B. 肝动脉结扎
- C. 全身化疗
- D. 肝动脉插管化疗
- E. 局部注射无水酒精

正确答案：A 您选择的答案：

第44题 男性，42岁，慢性肝炎史，近两个月右上腹持续闷痛，低热，消瘦明显，体检：贫血貌，肝于右肋弓下触及边缘，质硬，轻度压痛，Hb：80g/L，AFP(+)，便潜血试验阳性，最可能是

- A. 慢性胆囊炎急性发作
- B. 肝脓肿并胆道出血
- C. 阿米巴性肝脓肿
- D. 慢性肝炎，肝硬化
- E. 晚期肝癌

正确答案：E 您选择的答案：

第45题 女性，51岁，突起寒战、高热、右上腹胀痛，体温39~40℃，为弛张热，于外院给予抗感染及对症支持治疗症状无缓解。体检：无黄疸，右季肋部饱满，肝右肋缘下3cm，无结节，有压痛及肌紧张。腹部B超显示肝脏较大液平。治疗最关键的措施是

- A. 全身支持治疗
- B. 更换为强效抗厌氧菌抗生素
- C. 切开引流
- D. 中医中药
- E. 以上都不对

正确答案：C 您选择的答案：

三、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第46-48题

男者，45岁，近二个月出现肝区疼痛，乏力，消瘦明显，消化不良，腹胀，食欲减退，无黄疸，查体：肝于右肋下可触及3.0cm，移动浊音(-)，诊断肝癌

1. 对诊断有重要意义的实验室检查

- A. 血常规
- B. 肝炎系列

- C 肝功
 - D AFP
 - E 血浆蛋白测定
 - 2. 诊断价值不大的检查
 - A CT
 - B B超
 - C MBI
 - D ERCP
 - E ECT
 - 3. 在可能实施的情况下, 治疗最有效的方法
 - A 手术切除病灶
 - B 肝动脉结扎
 - C 肝动脉栓塞
 - D 化疗
 - E 60钴照射
- 正确答案: DDA 您选择的答案:

第49-51题

男性, 35岁, 突发性中上腹痛, 1天后出现下腹部疼痛, 特别是右下腹痛, 诊断为急性阑尾炎入院, 患者入院后拒绝手术治疗, 庆大霉素等抗感染治疗, 两天后热不退, 突然出现寒战, 高热, 黄疸等症状, 体检时发现右上腹压痛明显, 伴肝脏肿大, 白细胞升高

- 1. 应考虑
 - A 急性胆囊炎
 - B 急性传染性肝炎
 - C 急性化脓性胆管炎
 - D 血源性肝脓肿
 - E 膈下感染
 - 2. 治疗方案应首先考虑
 - A 加强抗感染并积极处理的原发灶
 - B 即刻行手术引流
 - C 继续补液支持
 - D 查各项生化指标并纠正之
 - E 强心, 消除黄疸药物应用
 - 3. 下列哪种方案不恰当
 - A 查AFP, CEA排除肝癌可能
 - B 开腹行阑尾切除术
 - C 加强抗炎药物应用及支持疗法
 - D 纠正水, 电解质及酸碱失衡
 - E 出现休克时先纠正休克, 同时抗感染治疗
- 正确答案: DBB 您选择的答案:

第52-53题

女性, 64岁, 因"右上腹痛、发热"诊为急性胆囊炎, 给予抗感染、解痉治疗5日, 症状无缓解, 寒战、高热, 并出现右季肋部胀痛。B超见肝脏明显肿大, 右叶见直径约6cm液平。

- 1. 诊断应考虑为
 - A. 细菌性肝脓肿
 - B. 阿米巴肝脓肿
 - C. 肝棘球蚴病
 - D. 原发性肝癌伴坏死
 - E. 肝囊肿
 - 2. 下列哪种情况不适宜切开引流
 - A. 较大脓肿, 估计有穿破可能
 - B. 已穿破胸腔或腹腔
 - C. 慢性肝脓肿
 - D. 肝右叶单个较大脓肿
 - E. 胆源性肝脓肿
- 正确答案: AD 您选择的答案:

第54-56题

男性, 50岁, 既往乙型肝炎病史二十余年, 今晨突然发生呕血, 色鲜红, 量约1500ml, 急至医院就诊, 查体: BP80 / 50mmHg, P106次 / 分, 面色苍白, 四肢末稍凉, 脾于肋缘下5.0cm, 触及移动浊音(+), 腹壁可见静脉曲张, 至医院后患者又呕血一次, 量约300ml

- 1. 患者出血原因最可能是
- A 食管胃底静脉曲张破裂
- B 脾功亢进
- C 脾破裂
- D 胃溃疡出血
- E 肝内胆道出血
- 2. 不恰当的治疗方法
- A 三腔两囊管压迫
- B 血管加压素静点
- C 急诊剖腹探查, 止血
- D 输血
- E 纤维胃镜介入治疗
- 3. 下列哪项与患者主要疾病关系不大
- A 食管胃底静脉曲张
- B 腹壁静脉曲张
- C 痔
- D 腹膜后静脉曲张
- E 大隐静脉曲张

正确答案：ACE 您选择的答案：

第57-59题

男性，40岁，右上腹胀痛2个月，肝肋下3cm，脾肋下2cm；移动浊音阳性，HBsAg阳性，B超检查见肝右叶有一直径5cm占位病变

1. 最可能的诊断

- A 肝硬化
- B 细菌性肝脓肿
- C 肝血管瘤
- D 肝癌
- E 肝包虫病

2. 最合适的实验室检查

- A AFP
- B γ-GT
- C 血培养
- D 包虫囊液皮试
- E 血清胆红素测定

3. 对该病最有确定诊断意义的检查

- A B超
- B 腹部Cr
- C X线检查
- D 肝功能检查
- E 肝穿刺针吸细胞等检查

正确答案：DAE 您选择的答案：

第60-62题

男，55岁，肝区持续性疼痛半年，伴乏力，消瘦明显，食欲减退，恶心，低热。肋下可及肿大之肝，质硬，收入院。

1. 根据病史及体检，以下哪一种疾病的可能性最大

- A 胆囊炎胆石症
- B 细菌性肝脓肿
- C 肝炎后肝硬化
- D 原发性肝癌
- E 急性肝炎

2. 下列哪一项化验最有诊断价值

- A γ-谷氨酰转肽酶
- B SGOT, SGPT
- C AKP
- D LDH
- E AFP

3. 下列哪一项检查有确诊意义

- A 肝穿刺细胞学检查
- B X线钡餐检查
- C B超检查
- D CT检查
- E 放射性核素肝扫描

正确答案：DEA 您选择的答案：

第63-65题

男性，60岁，右上腹胀痛4个月伴黄疸1月余，体检：肝肋下4cm，剑突下5cm，质硬，移动性浊音(+)

1. 最可能的诊断

- A 晚期肝癌
- B 肝硬化
- C 细菌性肝脓肿
- D 胆总管结石
- E 肝炎

2. 可能引起该患者死亡的最少见病因

- A 肝性昏迷
- B 肝癌破裂出血
- C 全身衰竭
- D 上消化道出血
- E 脑转移

3. 与该病最无关的因素是

- A 病毒
- B 射线
- C 真菌
- D 亚硝酸胺
- E 酒精

正确答案：AEB 您选择的答案：

四、A4型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第66-69题

男性，42岁，右上腹痛3周，胀痛，呈持续性。既往有乙型肝炎病史7年。B超显示肝右叶一7cm×5cm不均低回声区，边界不清。

1. 为明确诊断首选的检查应为

- A 腹部CT
- B 腹部MRI

- C. 放射性核素肝扫描
D. 血甲胎蛋白
E. 肝功能
2. 经入院后检查发现肿瘤局限，肝肾功能正常，该患者最优治疗方案为
A. 手术切除
B. 肝动脉结扎或栓塞
C. 全身化疗
D. 肝动脉插管化疗
E. 免疫治疗
3. 若患者术后未进行规律随诊，术后17个月时再次出现右上腹痛，B超检查见肝脏多个大小不均低回声，诊断应首先考虑为
A. 细菌性肝脓肿
B. 阿米巴性肝脓肿
C. 肝癌复发伴肝内转移
D. 结节性肝硬化
E. 转移性肝癌
4. 此时治疗应选择
A. 再次手术切除
B. 全身化疗
C. 肝动脉插管化疗
D. 免疫治疗
E. 中医中药
- 正确答案：DACC 您选择的答案：

五、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第70-73题

- A. 肝区持续性钝痛、刺痛或胀痛，有慢性肝病史
B. 起病急骤，肝区疼痛，肝肿大，寒战高热
C. 起病缓，肝区疼痛，低热，脓血便
D. 起病急，右上腹痛，寒战高热，黄疸，休克，中枢神经系统受抑制
E. 进油腻食物后，右上腹阵发性绞痛，向肩背部放射

1. 细菌性肝脓肿
2. 阿米巴肝脓肿
3. 原发性肝癌
4. 急性梗阻性化脓性胆管炎

正确答案：BCAD 您选择的答案：

第74-76题

- A. 肝局部切除
B. 左半肝切除
C. 肝动脉结扎和插管
D. 肿瘤局部无水酒精注射
E. 中医治疗
1. 男性，47岁，明确诊断为肝左外叶肝癌7cm，肝肾功能正常，治疗方案首选
2. 男性，55岁，体格检查发现，肝右叶中央10cm占位，肝肾功能正常，治疗方案首选
3. 男性，33岁，肝癌术后2个月，发现切缘1cm可疑占位，治疗方案首选

正确答案：ACE 您选择的答案：

习题集 外科学 周围血管疾病

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 下肢静脉曲张，根据哪项检查所见，即可判断深浅静脉交通支瓣膜功能障碍

- A．胫前出现皮肤营养性变化
- B．胫前内侧出现皮肤营养性变化
- C．胫前外侧出现皮肤营养性变化
- D．足靴区出现皮肤营养性变化
- E．踝部出现皮肤营养性变化

正确答案：D 您选择的答案：

第2题 假性动脉瘤为

- A 血管壁全层局部扩张
- B 血管壁部分由纤维组织构成的局部扩张
- C 动脉粥样硬化性动脉瘤
- D 检查时有震颤并可听到连续性杂音
- E 压迫动脉瘤出口部出现血压升高，脉压缩小及脉率缓的现象

正确答案：B 您选择的答案：

第3题 下肢静脉瓣膜的特点是

- A．下肢深、浅静脉及交通支管腔内有两瓣型瓣膜
- B．深静脉的瓣膜比浅静脉多
- C．在进入股、腘静脉处均有坚韧的瓣膜
- D．瓣膜的作用是使血液只能由浅入深，由下而上向心回流
- E．以上都对

正确答案：E 您选择的答案：

第4题 广泛的深静脉血栓形成最严重的并发症是

- A．下肢溃疡
- B．肺栓塞
- C．下肢浅静脉曲张
- D．伴动脉痉挛、肢体缺血
- E．腔静脉阻塞

正确答案：B 您选择的答案：

第5题 关于动脉瘤下列哪项是错误的

- A．搏动性肿块
- B．压迫症状
- C．远端肢体缺血
- D．瘤体破裂
- E．肢体远端皮温升高

正确答案：E 您选择的答案：

第6题 血栓闭塞性脉管炎常见的临床症状中，应除外

- A．静息痛
- B．间歇发作的突发性疼痛
- C．活动时有关节痛
- D．对寒冷敏感性增加
- E．局部皮肤颜色改变

正确答案：B 您选择的答案：

第7题 对于Buerger病治疗的方法错误的是

- A．严禁吸烟，防止受冷，并用热敷
- B．高压氧疗法
- C．腰交感神经切除
- D．血管扩张剂
- E．截肢术

正确答案：A 您选择的答案：

第8题 下肢静脉曲张的临床表现为

- A．大腿内外侧静脉曲张
- B．下肢内侧和小腿后侧静脉曲张
- C．全下肢内外侧静脉曲张
- D．大腿外侧静脉曲张
- E．大腿外侧及小腿内侧

正确答案：B 您选择的答案：

第9题 下肢静脉曲张病人深静脉功能试验阳性应采取

- A．弹性绷带包扎
- B．大隐静脉高位结扎术
- C．大隐静脉高位结扎加静脉整段、分段剥脱切除术
- D．局部注射硬化溶液
- E．以上都不对

正确答案：E 您选择的答案：

第10题 诊断原发性下肢深静脉瓣膜功能不全最可靠的检查方法是

- A. Burger试验
- B. 下肢深静脉造影
- C. 电阻抗血流测定
- D. Pratt试验
- E. Perthes试验

正确答案：B 您选择的答案：

第11题 血栓闭塞性脉管炎病变主要位于

- A. 大中动脉
- B. 中小静脉
- C. 中小动静脉，而以动脉为主
- D. 中小动静脉，而以静脉为主
- E. 小动静脉，而不发生于中动静脉

正确答案：C 您选择的答案：

第12题 下肢静脉曲张的主要并发症是

- A. 足部溃疡
- B. 小腿丹毒
- C. 深静脉血栓形成
- D. 小腿溃疡
- E. 深静脉瓣膜功能不全

正确答案：D 您选择的答案：

第13题 下肢静脉曲张的主要并发症是

- A. 深静脉血栓形成
- B. 深静脉瓣膜功能不全
- C. 小腿溃疡
- D. 小腿丹毒
- E. 足部溃疡

正确答案：C 您选择的答案：

第14题 血栓闭塞性脉管炎的特征是

- A. 没有间歇性跛行
- B. 游走性血栓性浅静脉炎
- C. 累及内脏
- D. 肢体皮肤正常
- E. 与酒精中毒有关

正确答案：B 您选择的答案：

第15题 血栓闭塞性脉管炎的早期表现为

- A. 患肢间歇性疼痛
- B. 趾端坏死
- C. 间歇性跛行
- D. 足背动脉搏动消失
- E. 患肢持续性疼痛

正确答案：C 您选择的答案：

第16题 判断血栓闭塞性脉管炎闭塞部位的准确方法是

- A. 肢体位置试验
- B. 静脉注射硫酸镁10ml
- C. 仔细检查肢体各动脉搏动情况
- D. 行交感神经阻滞
- E. 行动脉造影

正确答案：E 您选择的答案：

第17题 下肢静脉曲张的临床表现

- A. 大腿内侧及小腿外侧静脉曲张
- B. 大腿内外侧静脉曲张
- C. 全下肢内后侧静脉曲张
- D. 下肢内侧和小腿后侧静脉曲张
- E. 大腿内、外侧静脉曲张并向腹壁延伸

正确答案：D 您选择的答案：

第18题 一大隐静脉曲张患者，根据其解剖生理特点下列哪项是判断是否手术的关键试验

- A. Pratt试验
- B. Trendelenburg试验
- C. Perthes试验
- D. Burger试验
- E. 肢体血液供应试验

正确答案：C 您选择的答案：

第19题 假性动脉瘤手术时，最好是

- A. 不管假囊分支，用对端吻合术修复血百呎坝
- B. 经囊移植一段静脉
- C. 为结扎侧支循环应行广泛分离
- D. 结扎动脉和静脉两端
- E. 切除全部假囊的内膜

正确答案：E 您选择的答案：

第20题 关于动脉瘤的说法中，哪项是错误的

- A．最典型的临床表现是搏动性肿块和收缩期杂音
 - B．手术是动脉瘤唯一有效的治疗方法
 - C．在我国损伤是最常见的病因
 - D．穿刺、X线、超声显像及动脉造影术均有助于疑难病的诊断
 - E．多发性动脉瘤，包括伴广泛性动脉粥样硬化的患者均可手术治疗
- 正确答案：E 您选择的答案：

第21题 下肢静脉曲张的临床表现为

- A．大腿内侧及小腿外侧静脉曲张
 - B．大腿内外侧静脉曲张
 - C．全下肢内后侧静脉曲张
 - D．下肢内侧和小腿后侧静脉曲张
 - E．大腿内、外侧静脉曲张并向腹壁延伸
- 正确答案：D 您选择的答案：

第22题 较早出现的肢体持续性疼痛，与下列哪项关系最大

- A．动脉痉挛
 - B．静脉痉挛
 - C．动脉闭塞
 - D．静脉血栓
 - E．淋巴管阻塞
- 正确答案：A 您选择的答案：

第23题 判断血栓闭塞性脉管炎的闭塞部位的准确方法是

- A 肢体位置试验
 - B 静脉注射硫酸镁10ml
 - C 仔细检查肢体各动脉搏动情况
 - D 行交感神经阻滞
 - E 行动脉造影
- 正确答案：E 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第24题 男性，35岁，左下肢“蚯蚓状”肿物6年，伴沉重感。体检：血压120 / 80mmHg(16 / 11kPa)，左大隐静脉屈曲成团，浅静脉及交通支瓣膜功能试验均阳性，下肢不肿，最佳治疗方案是

- A．高位结扎术
 - B．大隐静脉成形术
 - C．高位结扎 + 剥脱 + 分段切除术
 - D．硬化剂局部注射
 - E．弹性绷带包扎
- 正确答案：C 您选择的答案：

第25题 某女，40岁，教师，右下肢静脉迂曲扩张15年，长期站立有酸胀感，近2年右足靴区颜色加深，肿胀，大隐静脉瓣膜功能试验(+)，深静脉通畅试验(-)，诊断可能是

- A 单纯性下肢静脉曲张
 - B 原发性下肢深静脉瓣膜功能不全
 - C 下肢深静脉血栓形成
 - D 动静脉瘘
 - E 血栓性浅静脉炎
- 正确答案：A 您选择的答案：

第26题 男性，30岁，右下肢近腘窝处被刀刺伤后出现搏动性肿块，逐渐增大伴右下肢麻木，查右下肢苍白，腘窝部搏动性肿块约5cm×4cm，附近有收缩期杂音，诊断为

- A．腘动脉开放性损伤
 - B．腘动脉闭合性损伤
 - C．动静脉瘘
 - D．腘动脉假性动脉瘤
 - E．以上都不是
- 正确答案：D 您选择的答案：

第27题 某男，56岁，患冠心病多年，3小时前突然出现双下肢剧烈疼痛，行走困难，局部皮肤苍白，查双下肢股动脉搏动消失，双膝以下皮温低，肌力4级，诊断为

- A．血栓闭塞性脉管炎
 - B．髂股动脉栓塞
 - C．动脉硬化性动脉闭塞症
 - D．糖尿病性动脉闭塞
 - E．大动脉炎
- 正确答案：B 您选择的答案：

第28题 男性，35岁，稍长距离步行后感右小腿疼痛，肌肉抽搐而跛行，稍休息后症状消失，平时感右足发凉，怕冷，有麻木感。右足背动脉搏动减弱。应考虑

- A 血栓性静脉炎
- B 深静脉血栓形成

- C 血栓闭塞性脉管炎(营养障碍期)
- D 血栓闭塞性脉管炎(局部缺血期)
- E 动脉粥样硬化症

正确答案：D 您选择的答案：

第29题 女，28岁，足月顺产后2周开始下床活动，觉左下肢痛，肿胀，左下肢皮肤略发绀，皮温高，表浅静脉曲张，沿左股静脉走行区有明显压痛，应考虑

- A．血栓性股静脉炎
- B．血栓性大隐静脉炎
- C．局限性股深静脉血栓形成
- D．左髂股静脉血栓形成
- E．以上均不对

正确答案：D 您选择的答案：

第30题 男，52岁，下肢浅静脉明显曲张6个月，检查：大腿根部扎一止血带，病人快速用力屈伸膝关节20次，此时浅静脉曲张更加明显，提示

- A．大隐静脉瓣膜闭锁不全
- B．小隐静脉瓣膜闭锁不全
- C．交通支静脉瓣膜闭锁不全
- D．下肢深静脉有阻塞
- E．下肢浅静脉瓣膜闭锁不全

正确答案：D 您选择的答案：

第31题 男，45岁，稍长距离步行后感右小腿疼痛，肌抽搐、跛行，休息后症状消失，平时感右足发凉，怕冷，有麻木感。右足被动动脉搏动减弱。应考虑

- A．动脉粥样硬化症
- B．血栓闭塞性脉管炎(营养障碍期)
- C．血栓闭塞性脉管炎(局部缺血期)
- D．深静脉血栓形成
- E．血栓性静脉炎

正确答案：C 您选择的答案：

第32题 男性，35岁，因病卧床休息半月。在下床活动时，突然感左下肢疼痛，并逐渐肿胀，尤其于活动之后疼痛加剧。体检：血压正常，右下肢正常，左下肢于腹股沟韧带以下肿胀明显，小腿皮肤略发绀，表浅静脉曲张；大腿的内侧可扪及条索状物，压痛明显，小腿及足部凹陷性水肿(++)，肤温降低。血红蛋白 $10.5 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞0.73。应考虑

- A．浅层血栓性静脉炎
- B．急性淋巴管炎
- C．广泛的深静脉血栓形成
- D．大隐静脉曲张合并浅静脉炎
- E．髂动脉栓塞

正确答案：C 您选择的答案：

第33题 某男，56岁，患冠心病多年，3小时前突然出现双下肢剧烈疼痛，行走困难，局部皮肤苍白，查双下肢股动脉搏动消失，双股以下皮温低，肌力4级，诊断为

- A 血栓闭塞性脉管炎
- B 髂股动脉栓塞
- C 动脉硬化性动脉闭塞症
- D 糖尿病性动脉闭塞
- E 大动脉炎

正确答案：B 您选择的答案：

第34题 男性，40岁，既往健康，有烟酒嗜好。2年前发现左下肢浅静脉红、肿、硬，压痛。踝部凹陷性水肿。5个月前感患肢凉、怕冷、麻木，活动时小腿肌肉有抽搐。体检：血压130/85mmHg(17.2/11.3kPa)，左股动脉弹性好，踝部静脉稍扩张，足背动脉减弱。胆固醇8.5mmol/L。诊断应考虑为

- A．左下肢血栓性静脉炎
- B．下肢静脉曲张
- C．血栓闭塞性脉管炎
- D．闭塞性动脉硬化症
- E．象皮腿

正确答案：C 您选择的答案：

第35题 某女，40岁，教师，右下肢静脉迂曲扩张15年，长期站立有酸胀感，近2年右足靴区颜色加深，肿胀，大隐静脉瓣膜功能试验(+)，深静脉通畅试验(-)，诊断可能是

- A．单纯性下肢静脉曲张
- B．原发性下肢深静脉瓣膜功能不全
- C．下肢深静脉血栓形成
- D．动静脉瘘
- E．血栓性浅静脉炎

正确答案：A 您选择的答案：

第36题 男性，30岁，右下肢近腘窝处被刀刺伤后出现搏动性肿块，逐渐增大伴右下肢麻木，查右下肢苍白，腘窝部搏动性肿块大小的5cm×4cm，附近有收缩期杂音，诊断为

- A 腘动脉开放性损伤
- B 腘动脉闭合性损伤
- C 动静脉瘘
- D 腘动脉假性动脉瘤
- E 以上都不是

正确答案：D 您选择的答案：

第37题 患妇，28岁，足月顺产后二周开始下床活动，觉左下肢痛，肿胀，左下肢皮肤略发绀，皮温高，表浅静脉曲张，沿左股静脉走行区有明显压痛，应考虑

- A 血栓性股静脉炎
- B 血栓性大隐静脉炎
- C 局限性股深静脉血栓形成
- D 左髂股静脉血栓形成
- E 以上均不对

正确答案：D 您选择的答案：

第38题 男性，35岁，稍长距离步行后感右小腿疼痛，肌肉抽搐而跛行，休息后症状消失，平时感右足发凉，怕冷，有麻木感。右足背动脉搏动减弱。应考虑

- A 血栓性静脉炎
- B 深静脉血栓形成
- C 血栓闭塞性脉管炎(营养障碍期)
- D 血栓闭塞性脉管炎(局部缺血期)
- E 动脉粥样硬化症

正确答案：D 您选择的答案：

第39题 男性，54岁，下肢静脉曲张，Perthes试验阳性，为下列哪种疾病

- A 原发性下肢深静脉瓣膜功能不全
- B 单纯性下肢静脉曲张
- C 深静脉血栓形成后遗症
- D 动静脉瘘
- E 胫腓大静脉畸形综合征(Klippel-TrenaunaySyndrome)

正确答案：C 您选择的答案：

三、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第40-42题

女，55岁，右下肢静脉曲张扩张20年，伴下肢酸胀，水肿，近年右足靴区色素沉着，查右下肢大腿内侧，小腿后静脉迂曲扩张

1. 该病属哪一类疾病
 - A 动脉瘤
 - B 动静脉瘘
 - C 下肢静脉倒流性疾病
 - D 静脉瘤
 - E 下肢静脉回流障碍性疾病
2. 为明确病因应进行哪项检查
 - A 深静脉瓣膜功能试验
 - B 右下肢静脉造影
 - C 下肢静脉压测定
 - D 下肢多普勒血流检查
 - E 下肢皮温测定
3. 该患者可能发生的最严重的并发症是
 - A 右踝关节强直
 - B 溃疡破裂出血
 - C 右下肢坏死
 - D 血栓性浅静脉炎
 - E 小腿溃疡

正确答案：CAB 您选择的答案：

第43-46题

患者，女，56岁，右下肢静脉曲张扩张20年，伴下肢酸胀，水肿，活动抬高减轻，近2年右足靴区皮肤发红，时有瘙痒，逐渐加重，查右下肢大腿内侧，小腿后迂曲扩张之静脉团，足靴区色素沉着，皮肤变厚

1. 该患者属于哪一类病变
 - A 下肢静脉回流障碍疾病
 - B 下肢静脉倒流性疾病
 - C 动静脉瘘
 - D 静脉瘤
 - E 以上均不是
2. 为进一步明确病因应进行哪项检查
 - A 下肢皮温测定
 - B 下肢静脉压测定
 - C 下肢多普勒血流检查
 - D 静脉造影(右下肢)
 - E 深静脉瓣膜功能试验
3. 为明确手术治疗方法，术前必须进行哪项检查
 - A 下肢皮温测定
 - B 下肢静脉压测定
 - C 下肢多普勒超声检查
 - D 右下肢静脉造影
 - E 深静脉瓣膜功能试验
4. 该患者可能发生的最严重并发症是
 - A 右小腿溃疡
 - B 血栓性浅静脉炎
 - C 右下肢坏死
 - D 溃疡破裂出血
 - E 右踝关节强直

正确答案：BEDD 您选择的答案：

第47-48题

男性，50岁，右下肢大隐静脉曲张10年。检查：血压：150 / 100mmHg (20.0 / 13.3kPa)。左下肢正常，右下肢自腹股沟至踝部可见明显静脉曲张团球，个别静脉壁变薄突出，皮肤呈紫红色，软，未扪及结节。浅静脉瓣膜功能、交通支瓣膜功能及深静脉功能试验均阳性，血胆固醇9mmol / L。

1. 应考虑的诊断是
 - A. 隐静脉曲张合并瓣膜闭锁不全
 - B. 大隐静脉曲张合并入股静脉处瓣膜闭锁不全
 - C. 大隐静脉曲张合并入股静脉处及深、浅静脉间交通支瓣膜闭锁不全
 - D. 下肢深静脉栓塞
 - E. 大隐静脉曲张合并深、浅静脉间交通支瓣膜闭锁不全
2. 处理是
 - A. 高位结扎术
 - B. 高位结扎加静脉剥脱、切除术
 - C. 有效抗菌药物治疗
 - D. 硬化剂局部注射
 - E. 以上都不是

正确答案：DE 您选择的答案：

第49-51题

女性，74岁，患慢性冠状动脉供血不足30余年，伴心房纤颤8年，2小时前突然出现左下肢剧烈疼痛，开始为大腿上部急袭性痛，触痛明显，足背动脉搏动消失，体检发现大腿上部可触及一较明显变温带，趾活动困难。

1. 最可能的病变部位在
 - A. 髂股静脉
 - B. 腹主动脉
 - C. 髂总动脉
 - D. 股总动脉
 - E. 股深静脉
2. 最可能的疾病为
 - A. 急性左下肢动脉栓塞
 - B. 左下肢深静脉血栓形成
 - C. 左下肢深静脉瓣膜功能不全
 - D. 血栓闭塞性脉管炎
 - E. 动脉瘤
3. 最有价值的检查方法是
 - A. 静脉造影
 - B. 动脉造影
 - C. 多普勒超声检查
 - D. 皮肤测温试验
 - E. X线平片

正确答案：CAB 您选择的答案：

第52-55题

男，62岁，右下肢静脉迂曲扩张20年，伴下肢酸胀，水肿，活动抬高减轻，近1年右足靴区皮肤发红，时有瘙痒，逐渐加重，查左下肢大腿内侧，小腿后迂曲扩张之静脉团，足靴区色素沉着，皮肤变厚。

1. 该患者属于哪一类病变
 - A. 下肢静脉回流障碍疾病
 - A. 下肢静脉倒流性疾病
 - C. 动脉瘤
 - D. 静脉曲张
 - E. 以上均不是
2. 为进一步明确病因应进行哪项检查
 - A. 下肢皮温测定
 - B. 下肢静脉压测定
 - C. 下肢多普勒血流检查
 - D. 左下肢静脉造影
 - E. 深静脉瓣膜功能试验
3. 为明确手术治疗方法，术前必须进行哪项检查
 - A. 下肢皮温测定
 - B. 下肢静脉压测定
 - C. 下肢多普勒超声检查
 - D. 左下肢静脉造影
 - E. 深静脉瓣膜功能试验
4. 该患者可能发生的最严重并发症是
 - A. 左小腿溃疡
 - B. 血栓性浅静脉炎
 - C. 左下肢坏死
 - D. 溃疡破裂出血
 - E. 左踝关节强直

正确答案：DEDD 您选择的答案：

四、A4型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第56-57题

男性，38岁，两下肢间歇性跛行4年，跛距800m，吸烟史15年，每日25支，体检两侧足背动脉搏动消失。

1. 最可能的诊断为
 - A. 下肢血栓闭塞性脉管炎

- B. 深静脉血栓形成
 - C. 下肢静脉倒流性疾病
 - D. 动脉瘤
 - E. 动脉粥样硬化症
2. 如患者拒绝手术，应采取下列措施，除了
- A. 戒烟
 - B. 注意保暖
 - C. 限制活动
 - D. 血管扩张药物
 - E. 抗血小板聚集药物
- 正确答案：AC 您选择的答案：

第58-61题

男性，68岁，半年前出现左下肢行走10分钟后胀痛，休息片刻缓解，再行走后疼痛又出现，5年前体格检查血压正常，吸烟每日10支，已40年。

1. 下列体征中最符合腰椎间盘突出症的是
- A. 腓肠肌压痛
 - B. 直腿抬高试验阳性
 - C. 腿肌萎缩
 - D. 下肢毛发稀少
 - E. 体格检查正常
2. 上述病例有左下肢慢性缺血表现，其体检最可能发现的是
- A. 下肢肌萎缩
 - B. 下肢皮肤温度正常
 - C. 足背动脉后动脉搏动消失
 - D. 皮肤干燥
 - E. 足趾坏疽
3. 如果患者现在血压180 / 115mmHg (24 / 14kPa)，脉搏88次 / 分。下列哪项检查能更好评价动脉粥样硬化形成的另一危险因素
- A. 血浆血管紧张素活力
 - B. 血胆固醇浓度
 - C. 血清甲状腺素浓度
 - D. 尿醛固酮检测
 - E. 尿3甲氧基肾上腺素测定
4. 如果患者诊断为左下肢动脉硬化性闭塞症，为了解阻塞部位及范围，下列哪项检查最少应用
- A. 下肢节段性测压
 - B. 彩色多普勒超声检查
 - C. 下肢X线摄片
 - D. MRA
 - E. 动脉造影
- 正确答案：BCBC 您选择的答案：

五、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第62-65题

- A. 上肢对称性皮肤颜色改变
 - B. 下肢浅静脉红、肿、硬、有压痛，足背动脉搏动减弱
 - C. 趾端坏死，血胆固醇增高
 - D. 下肢静脉淤血、水肿、慢性溃疡形成
 - E. 下肢变形、粗肿、肢端慢性溃疡形成
1. 血栓闭塞性脉管炎有
2. 闭塞性动脉硬化症有
3. 指端小动脉痉挛症有
4. 下肢静脉曲张有
- 正确答案：BCAD 您选择的答案：

第66-67题

- A. 下肢变形粗肿，肢端慢性溃疡形成
 - B. 下肢静脉淤血、水肿，慢性溃疡形成
 - C. 趾端坏死，血胆固醇增高
 - D. 下肢浅静脉红、肿、硬，有压痛，足背动脉搏动减弱
 - E. 上肢对称性皮肤颜色改变
1. 血栓闭塞性脉管炎
2. 下肢静脉曲张
- 正确答案：DB 您选择的答案：

第68-71题

- A. Buerger试验(+)
 - B. Perthes试验(+)
 - C. Rovsing试验(+)
 - D. Trendelenberg试验(+)
 - E. Pratt试验(+)
1. 下肢大隐静脉瓣膜功能不全
2. 下肢深静脉血栓阻塞
3. 下肢交通支瓣膜功能不全
4. 血栓闭塞性脉管炎
- 正确答案：DBEA 您选择的答案：

习题集 外科学 急性化脓性腹膜炎

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 难以诊断之急性腹膜炎，最有价值的辅助检查是

- A 白细胞计数分类
- B 血尿淀粉酶
- C 直肠指诊
- D 腹部X线平片
- E 腹腔穿刺

正确答案：E 您选择的答案：

第2题 急性化脓性腹膜炎的常见病因，列哪项是错误的

- A 溃疡病急性穿孔
- B 急性阑尾炎穿孔
- C 肠管损伤破裂
- D 直肠下段损伤
- E 腹内脏器炎症的扩散

正确答案：D 您选择的答案：

第3题 腹膜有多种功能，但下面有一种功能是错误的，请指出

- A 吸收功能
- B 分泌功能
- C 防御功能
- D 免疫功能
- E 修复功能

正确答案：D 您选择的答案：

第4题 原发性腹膜炎与继发性腹膜炎的主要区别点是

- A 是儿童或是成人患者
- B 是第一次发病或多次发病
- C 致病细菌的种类不同
- D 腹腔有无原发病灶
- E 病人全身抵抗力的好坏

正确答案：D 您选择的答案：

第5题 对急性腹膜炎诊断价值最大的辅助检查是

- A 白细胞计数及分类
- B 急诊胃镜
- C 血、尿淀粉酶
- D 腹部CT
- E 腹腔穿刺

正确答案：E 您选择的答案：

第6题 腹膜炎病情恶化的一项重要标志是

- A 腹部压痛
- B 腹肌紧张
- C 反跳痛
- D 腹胀加重
- E 发热

正确答案：D 您选择的答案：

第7题 引起继发性腹膜炎的细菌主要是

- A 厌氧拟杆菌
- B 链球菌
- C 大肠杆菌
- D 葡萄球菌
- E 变形杆菌

正确答案：C 您选择的答案：

第8题 急性腹膜炎的临床表现哪项是错误的

- A 有持续性腹痛
- B 恶心、呕吐
- C 腹肌紧张，压痛和反跳痛
- D 积液较多时有移动性浊音
- E 肠鸣音亢进

正确答案：E 您选择的答案：

第9题 有关急性弥漫性腹膜炎的感染途径，下列哪项是错误的

- A 病原菌由外界直接进入腹腔
- B 空腔脏器穿孔
- C 腹腔器官炎症蔓延扩散
- D 腹壁血栓性静脉炎
- E 经血运转移

正确答案：D 您选择的答案：

第10题 腹膜和腹膜腔的描述不正确的是

- A 腹膜可分为壁腹膜和脏腹膜两部分

- B. 腹膜腔是一个封闭的潜在间隙
 - C. 腹膜腔可分为腹腔和网膜囊两部分
 - D. 壁腹膜主要受体神经支配
 - E. 脏腹膜主要受自主神经支配
- 正确答案：B 您选择的答案：

- 第11题 急性腹膜炎治疗正确的是
- A. 所有病人必须留置胃管持续胃肠减压
 - B. 皮质激素易加重感染禁忌使用
 - C. 任何阶段都不可以使用止痛剂
 - D. 病程超过24小时，腹部体征有减轻者可以保守治疗
 - E. 腹膜炎病因不明不可以手术
- 正确答案：D 您选择的答案：

- 第12题 下列哪项不是继发性腹膜炎的病因
- A. 化脓性输卵管炎
 - B. 阑尾穿孔
 - C. 胃十二指肠溃疡穿孔
 - D. 肝硬化继发腹水感染
 - E. 后腹膜血肿继发感染
- 正确答案：D 您选择的答案：

- 第13题 急性腹膜炎腹痛的特点是
- A. 疼痛呈阵发性
 - B. 病人辗转不安
 - C. 疼痛先从原发病变部位开始
 - D. 呕吐、排便后可缓解
 - E. 无法定位
- 正确答案：C 您选择的答案：

- 第14题 急性腹膜炎哪项概念是错误的
- A. 继发性腹膜炎比原发性腹膜炎多
 - B. 急性腹膜炎严重者常并发中毒性休克
 - C. 急性腹膜炎不须一律手术
 - D. 急性腹膜炎常伴有碱中毒
 - E. 多数病例可出现麻痹性肠梗阻
- 正确答案：D 您选择的答案：

- 第15题 继发性腹膜炎不应包括下列哪一项
- A. 可发生于腹腔内急性炎症
 - B. 可发生于肝硬化腹水病人
 - C. 可发生于腹腔内脏器穿孔
 - D. 可发生于腹腔内脏器的损伤破裂
 - E. 可发生于手术污染
- 正确答案：B 您选择的答案：

- 第16题 腹部闭合性损伤伴休克，腹穿为炎性混浊液，其处理的首要原则
- A. 立即手术剖腹探查
 - B. 抗休克同时尽早手术治疗
 - C. 抗休克好转后手术
 - D. 严密观察腹部情况
 - E. 输血、补液、应用抗菌药物
- 正确答案：B 您选择的答案：

- 第17题 急性弥漫性腹膜炎最常见的原因是
- A. 急性胆囊炎穿孔
 - B. 胃十二指肠溃疡穿孔
 - C. 总胆管结石
 - D. 肝破裂
 - E. 肠扭转
- 正确答案：B 您选择的答案：

- 第18题 在急性腹膜炎的情况下，下列哪一类原因最常引起早期发热
- A. 胃、十二指肠溃疡穿孔
 - B. 急性阑尾炎，胆囊炎穿孔
 - C. 实质脏器破裂
 - D. 结肠破裂早期
 - E. 代谢性酸中毒
- 正确答案：B 您选择的答案：

- 第19题 下列原发性腹膜炎的特点，应除外
- A. 是急性化脓性腹膜炎中罕见的一类
 - B. 可发生在任何年龄，多见于青年
 - C. 脓液培养，多为溶血性链球菌
 - D. 与机体抗病能力低下有关
 - E. 细菌性血运感染所致
- 正确答案：C 您选择的答案：

- 第20题 急性腹膜炎的代谢率约为正常人的
- A. 50%

- B . 80%
- C . 100%
- D . 140%
- E . 180%

正确答案：D 您选择的答案：

第21题 诊断化脓性腹膜炎的主要依据是

- A 病人是否有脉快和休克
- B 白细胞计数增高
- C 腹部有无压痛、反跳痛、肌紧张
- D 腹腔穿刺结果
- E 腹部X线摄片结果

正确答案：C 您选择的答案：

第22题 继发性腹膜炎的病原菌，其中毒症状严重的原因因为

- A . 金黄色葡萄球菌感染
- B . 溶血性链球菌感染
- C . 大肠杆菌感染
- D . 各种细菌混合感染
- E . 肺炎链球菌感染

正确答案：D 您选择的答案：

第23题 急性腹膜炎发生严重休克的主要因素为

- A . 水和电解质紊乱
- B . 血容量减少和吸收大量毒素
- C . 腹腔内有无原发病灶
- D . 发病年龄不同
- E . 腹膜有无刺激征

正确答案：B 您选择的答案：

第24题 急腹症诊断不明的处理中，下列哪一项是错误的

- A 严密观察，定时反复检查
- B 禁用泻药及灌肠
- C 可以适当地用吗啡止痛
- D 在观察过程中防治休克
- E 应用抗生素，控制感染

正确答案：C 您选择的答案：

第25题 急性腹膜炎早期呕吐原因是

- A 胃肠痉挛
- B 肠梗阻
- C 肠麻痹
- D 神经性呕吐
- E 正反射性呕吐

正确答案：E 您选择的答案：

第26题 急性弥漫性腹膜炎，常见原因中哪项是错误的

- A 急性出血性胰腺炎
- B 急性胃十二指肠溃疡病穿孔
- C 外伤性空腔脏器穿孔
- D 肝破裂
- E 绞窄性腹外疝

正确答案：E 您选择的答案：

第27题 急性化脓性腹膜炎非手术治疗一般采用的体位是

- A . 平卧位
- B . 半卧位
- C . 俯卧位
- D . 左侧卧位
- E . 右侧卧位

正确答案：B 您选择的答案：

第28题 急性弥漫性腹膜炎最常见的病因是

- A . 胃、十二指肠溃疡急性穿孔
- B . 急性胆囊炎，胆囊壁坏死穿孔
- C . 急性胰腺炎
- D . 女性生殖器官化脓感染
- E . 腹壁外伤

正确答案：A 您选择的答案：

第29题 腹腔穿刺抽出凝固的血液提示

- A . 腹膜后血肿
- B . 出血性胰腺炎
- C . 肝、脾破裂
- D . 腹腔内积血
- E . 抽出为血管内血液

正确答案：E 您选择的答案：

第30题 原发性腹膜炎多发生于

- A 老年人

- B 孕妇
- C 十岁以下体弱儿童
- D 从事重体力
- E 慢性咳嗽病人

正确答案：C 您选择的答案：

第31题 急性弥漫性腹膜炎伴有气腹最常见于

- A 阑尾炎穿孔
- B 十二指肠后壁损伤
- C 美克尔憩室穿孔
- D 急性胃十二指肠溃疡穿孔
- E 外伤性回肠末段穿孔

正确答案：D 您选择的答案：

第32题 有关急性腹膜炎，下列哪项是错误的

- A 有持续性腹痛
- B 恶心，呕吐
- C 腹肌紧张，压痛及反跳痛
- D 有移动性浊音
- E 肠鸣音亢进

正确答案：E 您选择的答案：

第33题 急性腹膜炎腹痛的特点

- A 疼痛阵发加剧
- B 病人转侧不安
- C 指不出确切部位
- D 原发病灶处最著
- E 解大便后减轻

正确答案：D 您选择的答案：

第34题 继发性腹膜炎的细菌感染多是

- A 链球菌
- B 葡萄球菌
- C 绿脓杆菌
- D 变形杆菌
- E 大肠杆菌

正确答案：E 您选择的答案：

第35题 婴儿和儿童的原发性腹膜炎感染途径一般是

- A ．血行播散
- B ．淋巴管扩散
- C ．上行性感染
- D ．直接扩散
- E ．透壁性感染

正确答案：A 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第36题 女性，34岁，上腹痛72小时，右下腹痛12小时，体温37.8℃，术前诊断急性阑尾炎行手术治疗，术中发现阑尾外观无明显异常，右髂窝内有淡黄色混浊液，应考虑原发病为

- A 急性盆腔炎
- B 原发性腹膜炎
- C 阑尾粘膜化脓
- D 右侧尿路结石
- E 十二指肠球溃疡穿孔

正确答案：E 您选择的答案：

第37题 患者阑尾炎穿孔腹膜炎24小时，下列处置最关键的是

- A 补液，纠正水，电解质紊乱
- B 输血
- C 应用大量有效抗生素
- D 禁食、水，胃肠减压
- E 急诊手术

正确答案：E 您选择的答案：

第38题 女性，30岁，胃穿孔术后6天，高烧呈弛张热，下腹胀，大便次数增多，尿频，查下腹软，深压痛，未及肿块，最可能的诊断是

- A 急性菌痢
- B 盆腔脓肿
- C 肠间脓肿
- D 急性膀胱炎
- E 急性附件炎

正确答案：B 您选择的答案：

第39题 男性，29岁，转移性右下腹痛18小时，全腹痛2小时，高热，已予抗生素治疗。体检：体温39.0℃，全腹肌紧张，压痛，反跳痛，移动性浊音阴性。治疗宜选择

- A ．更换更广谱强效抗生素
- B ．纠正水、电解质紊乱

- C. 止痛
- D. 降温
- E. 急诊手术

正确答案：E 您选择的答案：

第40题 男性，75岁，腹痛、腹胀、呕吐、肛门停止排便排气2天。全腹压痛明显，腹部平片示肠管可见多处液平面。首先考虑为

- A. 急性阑尾炎
- B. 胃溃疡穿孔
- C. 急性肠梗阻
- D. 急性胰腺炎
- E. 急性胆囊炎

正确答案：C 您选择的答案：

第41题 男性，40岁，10天前因外伤行脾切除术，近2天高热，左上腹钝痛，呃逆。体检，全腹无明显压痛，左季肋部叩击痛，诊断考虑

- A. 膈下脓肿
- B. 肝脓肿
- C. 肠间脓肿
- D. 左肺炎
- E. 切口感染

正确答案：A 您选择的答案：

第42题 女性，9岁，发烧39℃，咳嗽5天，伴腹痛2天，腹胀，有广泛压痛、反跳痛及肌紧张，肠音弱，腹穿抽出稀薄无臭味脓液，应首先考虑

- A. 肠伤寒穿孔
- B. 肺脓肿破裂
- C. 阑尾穿孔
- D. 美克尔憩室穿孔
- E. 原发性腹膜炎

正确答案：E 您选择的答案：

第43题 女性，十二指肠穿孔伴腹膜炎术后10天，发热泻伴里急后重。诊断需首先考虑

- A. 吻合口瘘
- B. 肠间脓肿
- C. 盆腔脓肿
- D. 细菌性痢疾
- E. 急性胃肠炎

正确答案：C 您选择的答案：

第44题 女性，10岁，1周前患上感，1天来全腹痛，体温38℃，全腹压痛，轻度肌紧张，肠音消失，穿刺腹腔抽出5ml稀薄无臭味脓液，诊断应考虑

- A. 消化性溃疡穿孔
- B. 胆囊穿孔
- C. 原发性腹膜炎
- D. 急性胰腺炎
- E. 阑尾炎穿孔

正确答案：C 您选择的答案：

第45题 患者胃十二指肠溃疡穿孔腹膜炎24小时，伴有休克，应选择哪种治疗

- A. 积极抗休克，如休克不能纠正，不手术
- B. 积极抗休克，一定休克好转后手术
- C. 立即手术
- D. 抗休克同时手术
- E. 积极抗休克，如休克纠正，则非手术治疗

正确答案：D 您选择的答案：

第46题 患者10天前行胃大部切除术，近2天右上腹持续钝痛，呃逆，高烧。查腹胀，无明显压痛，右季肋有叩击痛，肝浊音界扩大，无黄疸，首先考虑

- A. 十二指肠残端瘘
- B. 胃肠吻合口瘘
- C. 肝脓肿
- D. 膈下脓肿
- E. 肠间脓肿

正确答案：D 您选择的答案：

第47题 女性，51岁，突发腹痛1小时。体检：38.6℃，全腹肌紧张，压痛、反跳痛，移动性浊音阳性。既往有肝病史。最有价值的辅助诊断措施是

- A. 腹部CT
- B. 胸部CT
- C. 急诊胃镜
- D. 消化系超声
- E. 腹腔穿刺，抽出液送检

正确答案：E 您选择的答案：

第48题 男性，腹膜炎手术后6天，体温升至38℃，伴有腹泻，里急后重，下列哪项检查最简便准确

- A. 腹部B超
- B. X线腹透视
- C. 便常规
- D. 直肠指诊

E 检查腹部切口

正确答案：D 您选择的答案：

第49题 男性，22岁，上腹突发刀割样剧痛2小时，全腹压痛，反跳痛，以剑突下为著，肌紧张呈木板状，肠音消失，治疗原则中应不包括

- A 早期注射抗生素
- B 禁食，胃肠减压
- C 术后必须腹腔内放引流条
- D 确诊后可用止痛剂
- E 清除引起腹膜炎的病因

正确答案：C 您选择的答案：

第50题 女性，20岁，转移性右下腹痛30小时，伴呕吐发热，体温38.5℃，下腹部有压痛，右侧为重，并有反跳痛，肌紧张，腹腔穿刺液应为

- A 黄色透明液体
- B 带臭味脓性液
- C 黄色浑浊无臭味
- D 浅红色水样液体
- E 暗红色血样液

正确答案：B 您选择的答案：

第51题 男性，25岁，饱餐后突发上腹刀割样疼痛2小时。体检：体温39.0℃，全腹压痛，反跳痛，剑突下为甚，肌紧张呈板状，肠鸣音消失，最可能的诊断是

- A 胃、十二指肠溃疡穿孔
- B 消化性溃疡穿孔伴急性腹膜炎
- C 自发性腹膜炎
- D 急性胆囊炎
- E 急性胰腺炎

正确答案：B 您选择的答案：

第52题 男性，30岁，建筑工人，半小时前从5m高处摔下，急诊摄片显示左10、11肋骨骨折，留院观察，第3天出现剧烈腹痛伴休克。首先应考虑为

- A 肠穿孔
- B 肾破裂出血
- C 血胸加重
- D 延迟性脾破裂
- E 食管贲门粘膜撕裂

正确答案：D 您选择的答案：

第53题 男性，35岁，突然腹痛1小时，肝右肋下2cm，质硬，触痛，脾未及，腹部弥漫性压痛，腹水征阳性，应首先采取的诊断方法是

- A 胸片
- B B超
- C 化验检查
- D 胃钡餐透视
- E 腹穿抽液检查

正确答案：E 您选择的答案：

第54题 男性，70岁，突发上腹痛半小时后全腹痛2天，神志淡漠、尿少半天。体检：四肢湿冷，血压80/60mmHg(10.6/8kPa)，全腹无明显肌紧张，压痛反跳痛，移动性浊音阳性。最关键的治疗是

- A 纠正水、电解质、酸碱紊乱
- B 积极纠正休克的同时手术治疗
- C 提高血压
- D 纠正休克
- E 保护肾功能

正确答案：B 您选择的答案：

第55题 女童，9岁，咳嗽、发热5天，腹痛2天。体检：体温39.3℃，全腹肌紧张，压痛和反跳痛，肠鸣音消失。腹腔穿刺抽得稀薄无臭味脓液。诊断应首先考虑

- A 化脓性阑尾炎穿孔伴急性腹膜炎
- B 急性肺炎
- C 原发性腹膜炎
- D 急性胆囊炎
- E 急性胃肠炎

正确答案：C 您选择的答案：

三、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第56-58题

女，38岁，已婚，农村妇女，2年来常感下腹部隐痛不适，12小时前突起转移性右下腹痛，伴恶心、呕吐、发热，查右下腹明显压痛、反跳痛、肌紧张。血常规：WBC $16 \times 10^9/L$ ，N0.88。尿常规无特殊异常

1. 患者此次发病与盆腔炎鉴别，最可靠的临床表现为

- A 2年来下腹部常常隐痛不适
- B 恶心、呕吐、发热
- C 转移性右下腹痛及右下腹明显压痛、反跳痛
- D 血常规和尿常规检查
- E 月经生育史

该患者诊断为急性化脓性阑尾炎合并腹膜炎，手术后第4天出现下腹坠胀不适、大便次数增多、里急后重、排尿困难

等现象

2. 首先考虑可能的原因是为

- A. 急性肠胃炎
 - B. 泌尿系感染
 - C. 急性附件炎
 - D. 直肠癌
 - E. 盆腔脓肿经直肠和阴道指诊发现波动性肿块向阴道突出，有触痛
3. 此时采用何种治疗方法最恰当
- A. 大剂量抗生素
 - B. 热水坐浴，会阴部理疗
 - C. 经直肠脓肿切开引流术
 - D. 经腹腔脓肿切开引流术
 - E. 经阴道后穹窿切开引流术

正确答案：CEE 您选择的答案：

第59-61题

37岁，已婚，农村妇女，2年来感下腹隐痛不适。12小时前突起转移性右下腹痛，伴恶心，呕吐，发热，查：右下腹明显压痛，反跳痛，肌紧张，血常规WBC $17 \times 10^9/L$ ，NO. 88，尿常规无异常

1. 应诊断为

- A. 急性阑尾炎并腹膜炎
- B. 胃十二指肠溃疡穿孔腹膜炎
- C. 急性胃肠炎
- D. 盆腔炎
- E. 泌尿系感染

2. 术后4天，下腹坠胀不适，便次增多，里急后重，排尿困难，应考虑

- A. 急性胃肠炎
- B. 泌尿系感染
- C. 急性附件炎
- D. 直肠癌
- E. 盆腔脓肿

3. 经直肠阴道指诊发现波动性肿块向阴道突出，有触痛，此时应采用何种治疗方法

- A. 大剂量抗生素
- B. 热水坐浴，会阴部理疗
- C. 经直肠脓肿切开引流术
- D. 经腹腔脓肿切开引流术
- E. 经阴道后穹窿切开引流术

正确答案：AEE 您选择的答案：

第62-64题

男，28岁，突发上腹部疼痛，蔓延至全腹8小时，腹痛呈持续性。查体：患者呈舟状腹，全腹有明显压痛及反跳痛，肝浊音界缩小，移动性浊音(±)，肠鸣音消失。血常规：WBC $18 \times 10^9/L$ ，NO. 9

1. 此患者应考虑为

- A. 急性胆囊穿孔腹膜炎
- B. 消化性溃疡穿孔腹膜炎
- C. 急性阑尾炎穿孔腹膜炎
- D. 重症胰腺炎并感染
- E. 急性肠扭转并腹膜炎

2. 为进一步明确诊断，下列哪项检查最有意义

- A. 血生化检查
- B. X线透视或摄片
- C. B超
- D. CT
- E. 腹腔穿刺

3. 此患者最适当的处理为：

- A. 胃肠减压，使用抗生素
- B. 补充血容量
- C. 穿刺引流
- D. 急诊手术
- E. 观察4~8小时，病情不见好转再紧急手术

正确答案：BBD 您选择的答案：

第65-66题

男性，50岁，腹痛6小时，初为上腹痛，20分钟后迅速蔓延至全腹，疼痛剧烈难忍。体检：体温38.5，板状腹，全腹压痛，反跳痛阳性，移动性浊音阳性，肠鸣音消失。

1. 首选的检查手段是

- A. 腹部X线平片
- B. 腹部CT
- C. 腹部B超
- D. 腹腔穿刺
- E. 急诊胃镜

2. 拟行急诊手术治疗，术前治疗哪项是不合适的

- A. 留置胃管并胃肠减压
- B. 纠正水电解质紊乱
- C. 抗生素
- D. 镇静止痛
- E. 穿刺引流

正确答案：AE 您选择的答案：

第67-68题

38岁，男性，突然上腹剧痛波及全腹，病人面色苍白，出冷汗，全腹压痛，反跳痛，肌紧张

1. 该病人首选的检查是

- A 腹部叩
- B 腹部X线
- C 血清淀粉酶
- D 尿便常规
- E 血常规

2. 应诊断哪种疾病

- A 急性阑尾炎
- B 急性胆囊炎
- C 急性胃肠炎
- D 急性胰腺炎
- E 胃十二指肠溃疡穿孔腹膜炎

正确答案：BE 您选择的答案：

第69-71题

男性，29岁，饱餐后突然发生上腹痛，蔓延至全腹8小时，腹痛呈持续性，体检：舟状腹，全腹明显压痛，反跳痛，肝浊音界缩小，移动性浊音阳性，肠音消失

1. 应考虑为

- A 急性胆囊穿孔腹膜炎
- B 消化性溃疡穿孔腹膜炎
- C 急性阑尾穿孔腹膜炎
- D 重症胰腺炎并感染
- E 急性肠扭转

2. 上述患者最适当的处理是

- A 胃肠减压，使用抗生素
- B 补充血容量
- C 穿刺引流
- D 急诊手术
- E 观察4~8小时病情不见好转再手术

3. 如诊断为十二指肠前壁溃疡穿孔，并幽门梗阻，采取手术治疗，选哪种方法最适宜

- A 胃大部切除毕I氏
- B 溃疡穿孔修补术
- C 胃大部切除毕II氏
- D 旷置性胃大部分切除术
- E 胃大部切除胃空肠吻合术

正确答案：BDC 您选择的答案：

第72-73题

女性，40岁，转移性右下腹痛10小时，初为上腹，渐移至脐周，疼痛开始约6小时后固定于右下腹，伴恶心、呕吐、发热。体检：体温38.9℃，右下腹压痛，反跳痛，肌紧张，移动性浊音阴性。血常规白细胞总数 $15.8 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞0.87。

1. 最可能的诊断是

- A 消化性溃疡穿孔伴腹膜炎
- B 急性阑尾炎伴腹膜炎
- C 急性盆腔炎
- D 右侧卵巢囊肿破裂
- E 右输尿管结石

2. 最合适的治疗是

- A 广谱抗生素抗感染
- B 止痛剂
- C 解痉剂
- D 急诊手术
- E 待感染控制后手术

正确答案：BD 您选择的答案：

四、A4型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第74-78题

男性，60岁，突发全腹剧烈疼痛3小时，有“胃炎”病史10年。体检：体温37.9℃，血压130/95mmHg(17.3/13.1kPa)，脉搏110次/分，全腹肌紧张，压痛、反跳痛，以上腹部为甚。血常规白细胞 $101.5 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞0.71。立位腹部平片显示右膈下游离气体。

1. 最可能的诊断是

- A 消化性溃疡大出血
- B 消化性溃疡急性穿孔
- C 肠梗阻
- D 急性胆囊炎
- E 急性胰腺炎

2. 如发生继发腹腔感染而暂无培养结果，抗生素宜选择

- A 青霉素
- B 第一代头孢菌素
- C 第三代头孢菌素
- D 氨基糖苷类
- E 甲硝唑

3. 患者经非手术治疗无缓解并加重，保守治疗时间一般不超过

- A 2小时
- B 2~4小时
- C 4~6小时
- D 8~12小时

- E. 24小时
4. 若患者出现症状后18小时进行手术探查，见胃窦部约直径1.5cm溃疡穿孔，腹腔污染较重，宜采用何种术式
- A. 毕式胃大部切除
- B. 毕式胃大部切除
- C. 迷走神经干切断术
- D. 选择性迷走神经切断术
- E. 穿孔修补术
5. 最常见的术后并发症是
- A. 肠粘连
- B. 肠扭转
- C. 切口疝
- D. 血运性肠梗阻
- E. 恶性变
- 正确答案：BCDEA 您选择的答案：

五、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第79-83题

- A. 腹腔抽出液呈黄色、浑浊、含胆汁、无臭气
- B. 草绿色透明腹水
- C. 血性腹水、胰淀粉酶含量高
- D. 腹腔抽出液为稀脓性略带臭气
- E. 血性腹水、臭气重
1. 绞窄性肠梗阻
2. 急性重症胰腺炎
3. 急性阑尾炎穿孔
4. 胃、十二指肠急性穿孔
5. 结核性腹膜炎
- 正确答案：ECDAB 您选择的答案：

第84-86题

- A. 草绿色透明腹水
- B. 黄色、混浊、含胆汁、无臭气之腹水
- C. 血性、臭气重之腹水
- D. 血性透明腹水
- E. 混浊、臭气重之腹水
1. 胃、十二指肠急性穿孔时腹腔穿刺液为
2. 结核性腹膜炎腹腔穿刺液为
3. 绞窄性肠梗阻时腹腔穿刺液为
- 正确答案：BAC 您选择的答案：

第87-90题

- A. 需紧急手术治疗
- B. 需待休克好转后才能手术治疗
- C. 待休克好转后手术治疗
- D. 一般不需手术治疗
- E. 一般不需特殊处理
1. 血源性腹膜炎
2. 感染性休克伴腹膜炎
3. 急性腹膜炎伴休克
4. 盆腔脏器感染并腹膜炎
- 正确答案：DCAD 您选择的答案：

习题集 外科学 肠疾病

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 绞窄性肠梗阻的临床表现哪一项是错误的

- A 有腹膜刺激征
- B 腹痛持续严重无缓解
- C 呕吐血性或棕褐色的液体
- D 肠鸣音极微弱或消失
- E X线检查见膨胀突出的孤立性肠袢，随时间而改变位置

正确答案：E 您选择的答案：

第2题 升结肠癌切除的范围包括

- A 全段升结肠
- B 升结肠、盲肠
- C 右半横结肠、升结肠、盲肠
- D 右半横结肠、升结肠、盲肠、回肠末段
- E 肿瘤两端5cm

正确答案：D 您选择的答案：

第3题 单纯性粘连肠梗阻手术指征是

- A 手术后早期粘连梗阻
- B 非手术治疗不见好转者
- C 单纯性粘连肠梗阻，肠音亢进
- D 粘连性不完全性肠梗阻
- E 广泛粘连性不完全性肠梗阻

正确答案：B 您选择的答案：

第4题 下列哪种疾病与结肠癌无关

- A 溃疡型结肠炎
- B 结肠腺瘤
- C 家族性息肉病
- D 增生型肠结核
- E 结肠血吸虫性肉芽肿

正确答案：D 您选择的答案：

第5题 下列哪种疾病与结肠癌关系最密切

- A 克隆病
- B 溃疡性结肠炎
- C 回盲部结核
- D 家族性结肠息肉病
- E 血吸虫性肉芽肿

正确答案：D 您选择的答案：

第6题 肠扭转的病因错误的是

- A 肠系膜过长
- B 肠系膜根部附着过窄
- C 肠段内重量突然增加
- D 肠管动力异常
- E 肠系膜过短

正确答案：E 您选择的答案：

第7题 对结肠癌诊断意义最大的辅助检查手段是

- A 全消化道钡餐
- B 气钡双重对比造影
- C 大便潜血试验
- D 纤维结肠镜活检病理
- E 血清癌胚抗原

正确答案：D 您选择的答案：

第8题 诊断肠梗阻最主要的根据是

- A 间歇性腹痛
- B 腹部隐痛
- C 恶心、呕吐
- D 肛门停止排便排气
- E X线见腹部有多个液气平面及胀气肠袢

正确答案：E 您选择的答案：

第9题 急性肠梗阻一般不会出现病理改变是

- A 肠管迅速膨胀
- B 肠腔压力升高
- C 肠壁充血水肿
- D 肠壁代偿性肥厚
- E 肠壁血运障碍

正确答案：D 您选择的答案：

第10题 肠管无生机的判断依据哪项不正确

- A 肠管的颜色变黑

- B. 肠管无弹性及张力
 - C. 相应的肠系膜终末小动脉无搏动
 - D. 肠管无蠕动能力
 - E. 等渗盐水热敷20分钟后肠管才可以收缩
- 正确答案：E 您选择的答案：

第11题 关于机械性单纯性肠梗阻哪项是错误的

- A. 阵发性腹部绞痛
- B. 腹部压痛甚轻或无
- C. 腹痛的同时肠鸣音亢进
- D. 全身情况变化较轻且慢
- E. 不均匀腹胀

正确答案：E 您选择的答案：

第12题 绞窄性肠梗阻特征错误的是

- A. 持续性腹部绞痛
- B. 腹部压痛明显伴腹肌紧张
- C. 早期出现休克
- D. 肠鸣音亢进，气过水音
- E. 腹胀不对称

正确答案：D 您选择的答案：

第13题 肠套叠三大典型症状是

- A. 小儿发病、腹痛、血便
- B. 腹痛、呕吐、血便
- C. 腹痛、呕吐、腹部肿块
- D. 腹痛、血便、腹部肿块
- E. 腹痛、腹胀、腹部肿块

正确答案：D 您选择的答案：

第14题 机械性肠梗阻病人，当腹部X线显示下列哪种变化时，应考虑绞窄性肠梗阻的可能

- A. 近段肠管扩张，远端肠管未见气体
- B. 扩张肠段呈阶梯型排列
- C. 孤立性肠段扩张且较固定
- D. 扩张肠段粘膜呈鱼刺状
- E. 大小肠均胀气

正确答案：C 您选择的答案：

第15题 肠管无生机的根据哪项不对

- A. 肠管无弹性及张力
- B. 相应的肠系膜终末小动脉无搏动
- C. 肠管的颜色变黑
- D. 肠管对刺激有反应，能收缩
- E. 肠管无蠕动能力

正确答案：D 您选择的答案：

第16题 下列绞窄性肠梗阻的临床表现，错误的是

- A. 持续性腹痛，逐渐加重
- B. 病情发展迅速，早期出现休克
- C. 腹膜刺激症状
- D. 腹胀不对称
- E. 阵发性腹痛，腹胀对称

正确答案：E 您选择的答案：

第17题 肿块型结肠癌好发于

- A. 右侧结肠
- B. 结肠肝曲
- C. 横结肠
- D. 结肠脾曲
- E. 左侧结肠

正确答案：A 您选择的答案：

第18题 关于肠梗阻哪些是错误的

- A. 绞窄性肠梗阻发病突然进展迅速
- B. 绞窄性肠梗阻疼痛持续阵发性加剧无缓解期
- C. 绞窄性肠梗阻肠鸣音往往减弱
- D. 单纯性肠梗阻反射性呕吐比绞窄性明显
- E. 绞窄性肠梗阻原则应早期手术

正确答案：D 您选择的答案：

第19题 哪项不是结肠癌的手术禁忌证

- A. 全身皮肤，粘膜黄染
- B. 中等量以上腹水
- C. 左锁骨上淋巴结转移
- D. 腹部肿块或出现肠梗阻
- E. 广泛肝内转移

正确答案：D 您选择的答案：

第20题 结、直肠息肉易癌变，除外

- A. 息肉性腺瘤

- B. 绒毛状息肉
- C. 儿童型息肉
- D. 遗传性多发性息肉
- E. 炎性息肉

正确答案：C 您选择的答案：

第21题 绞窄性肠梗阻其中错误的为

- A. 持续性腹部绞痛
- B. 腹部压痛明显伴腹肌紧张
- C. 早期出现休克
- D. 肠鸣音多，音调高并有金属音
- E. 腹胀不对称

正确答案：D 您选择的答案：

第22题 导致粘连性肠梗阻最常见的原因是

- A. 腹腔内炎症
- B. 腹腔内出血
- C. 腹腔内异物
- D. 腹腔内创伤
- E. 腹腔内手术

正确答案：E 您选择的答案：

第23题 肠梗阻的基础疗法哪项不对

- A. 不论需要手术与否均要采用
- B. 胃肠减压是治疗肠梗阻重要手段之一
- C. 纠正水电解质，酸碱失衡是重要措施
- D. 同时需要防治感染和中毒
- E. M-A管做为常规应用

正确答案：E 您选择的答案：

第24题 结肠癌最早出现的症状

- A. 腹部胀痛
- B. 排便习惯与粪便性状改变
- C. 腹部肿块
- D. 贫血消瘦乏力等全身症状
- E. 肠道梗阻

正确答案：B 您选择的答案：

第25题 机械性肠梗阻出现的阵发性绞痛的原因是

- A. 梗阻近端肠管的膨胀
- B. 梗阻近端肠管的阵缩
- C. 梗阻肠段神经受压
- D. 肠腔渗出液刺激
- E. 上述因素都不是

正确答案：B 您选择的答案：

第26题 肠梗阻最常见的类型为

- A. 机械性肠梗阻
- B. 麻痹性肠梗阻
- C. 血运性肠梗阻
- D. 扭转性肠梗阻
- E. 绞窄性肠梗阻

正确答案：A 您选择的答案：

第27题 结肠癌主要的转移途径是

- A. 血行转移
- B. 淋巴转移
- C. 局部浸润
- D. 腹腔种植
- E. 肠管内种植

正确答案：B 您选择的答案：

第28题 早期小儿肠套叠最常用的治疗是

- A. 禁食、胃肠减压
- B. 肛管排气
- C. 空气灌肠复位
- D. 手术复位
- E. 肠切除吻合

正确答案：C 您选择的答案：

第29题 结肠癌最早出现的症状是

- A. 排便习惯与粪便性状改变
- B. 腹部胀痛
- C. 肠梗阻症状
- D. 腹部肿块
- E. 贫血、消瘦、乏力等全身症状

正确答案：A 您选择的答案：

第30题 下列哪种疾病与结肠癌关系最密切

- A. 回盲部结核

- B 家族性结肠息肉病
- C 溃疡性结肠炎
- D 血吸虫性肉芽肿
- E 克隆病

正确答案：B 您选择的答案：

第31题 肠结核外科治疗适应证错误的是

- A ．并发肠梗阻
- B ．活动性结核
- C ．急性肠穿孔
- D ．慢性肠穿孔形成局限性脓肿或肠外瘘
- E ．不能控制的肠道大出血

正确答案：B 您选择的答案：

第32题 不完全性肠梗阻不同于完全性肠梗阻主要表现为

- A 腹胀不显著或无腹胀
- B 腹痛不剧烈或无腹痛
- C 偶见肠型或不见肠型
- D 腹部轻压痛或无压痛
- E 呕吐可有可无，少量排气排便

正确答案：E 您选择的答案：

第33题 肠梗阻的四大共同表现

- A 腹痛、肠型、呕吐、便秘
- B 便秘、呕吐、腹胀、腹痛
- C 便秘、腹痛、腹胀、肠音亢进
- D 便秘、腹痛、肠音减弱、腹胀
- E 腹痛、便秘、肠型、腹胀

正确答案：B 您选择的答案：

第34题 结肠癌最常见的病理类型是

- A ．鳞癌
- B ．腺癌
- C ．黏液癌
- D ．黏液腺癌
- E ．未分化癌

正确答案：B 您选择的答案：

第35题 肠梗阻的四大临床表现是

- A ．腹痛、肠型、呕吐、肛门停止排气排便
- B ．腹痛、呕吐、腹胀、肛门停止排气排便
- C ．腹痛、腹胀、肠鸣音亢进、肛门停止排气排便
- D ．腹痛、肠鸣音减弱、腹胀、肛门停止排气排便
- E ．腹痛、肠型、腹胀、肛门停止排气排便

正确答案：B 您选择的答案：

第36题 下列哪项不是肠套叠症状

- A 果酱样血便
- B 阵发性腹痛
- C 早期出现高热
- D 腹部可触及蜡肠样肿块
- E 恶心呕吐

正确答案：C 您选择的答案：

第37题 关于肠扭转的病因哪项是错误的

- A 肠系膜过长
- B 肠系膜根部附着过窄
- C 肠段内重量突然增加
- D 肠管动力异常
- E 肠系膜过短

正确答案：E 您选择的答案：

第38题 绞窄性肠梗阻最易发生的酸碱失衡类型是

- A ．呼吸性碱中毒
- B ．代谢性酸中毒
- C ．代谢性碱中毒
- D ．呼吸性酸中毒
- E ．呼吸性酸中毒和代谢性碱中毒

正确答案：B 您选择的答案：

第39题 疑为机械性肠梗阻的病例，当腹部平片显示下列哪项时应考虑绞窄性肠梗阻的可能

- A ．空肠、结肠均明显扩张
- B ．扩张肠段呈梯形排列
- C ．孤立肠段扩张且较固定
- D ．扩张肠段粘膜呈鱼刺样
- E ．近端肠段扩张，远端肠腔未见异常气体

正确答案：C 您选择的答案：

第40题 关于肠梗阻的全身变化，下列哪项是错误的

- A 失水后失盐，混合性缺水，代谢性酸中毒

B 大量呕吐，丢失胃液发生碱中毒
C 血液浓缩
D 血容量减少
E 毒素吸收，毒血症，全身中毒休克
正确答案：B 您选择的答案：

第41题 关于肠梗阻的论述，下列哪种不正确
A 绞窄性肠梗阻必然是急性肠梗阻
B 慢性和不全性肠梗阻多为单纯性肠梗阻
C 无机械因素存在的肠梗阻多是动力性肠梗阻
D 梗阻肠段有血循环障碍的就是绞窄性肠梗阻
E 回肠梗阻属于高位肠梗阻
正确答案：E 您选择的答案：

第42题 绞窄性肠梗阻与单纯性肠梗阻最根本的区别在于
A 腹痛程度
B 梗阻的原因
C 有无肠壁血运障碍
D 梗阻发生部位
E 梗阻是否完全
正确答案：C 您选择的答案：

第43题 结肠癌肿块型哪一项错误
A 好发于左半结肠
B 肿瘤向肠腔内生长，瘤体大
C 生长慢转移晚
D 易发生溃烂，出血
E 不易引起肠狭窄及梗阻
正确答案：A 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第44题 男性，45岁，近3个月来自觉全身乏力，头晕低热，腹泻，便无脓血，近一周出现腹部阵发性疼痛，三天未排便，少量排气，既往行阑尾切除术。查体：右下腹可触及肿块压痛明显，肠鸣音亢进，白细胞 $10 \times 10^9/L$ ，血红蛋白 $80g/L$ ，X线腹平片见多处液气平面，诊断最大可能是
A 粘连性肠梗阻
B 回盲部结核
C 阑尾残端脓肿
D 回盲部癌
E 溃疡性结肠炎
正确答案：D 您选择的答案：

第45题 女性55岁，腹痛腹胀，呕吐一天，近三个月来有时腹胀，大便带粘液，无血渍，查体：体温 $36^\circ C$ ，脉搏80次/分，血压 $14/10kPa(115/75mmHg)$ ，腹胀，未见肠型，腹软，右下腹可触及斜行肿块，质韧压痛，腹部透视见有一个液气平面，白细胞 $9.5 \times 10^9/L$ ，中性80%，可能是
A 阑尾周围脓肿
B 回盲部肿瘤
C 回盲部结核
D 克隆病
E 回盲部肠套叠
正确答案：B 您选择的答案：

第46题 男性，65岁，急性阑尾炎切除术后4天，腹部胀痛不适，呈持续性，伴恶心呕吐，肛门停止排便排气。体检：全腹胀，肠鸣音消失，腹部X线平片见小肠及结肠均有多量充气及液气平面。何种处置最为恰当
A 口服缓泻剂、促进胃肠蠕动药物
B 禁食、胃肠减压、支持疗法
C 少量进食促进胃肠功能恢复
D 剖腹探查
E 加强抗感染治疗
正确答案：B 您选择的答案：

第47题 男性，43岁，大便习惯改变5个月，纤维结肠镜检查发现为结肠脾曲溃疡型肿瘤，手术探查发现肿瘤未达浆膜。手术方式宜选择
A 右半结肠切除术
B 横结肠切除术
C 左半结肠切除术
D 全结肠切除术
E 局限肿瘤切除术
正确答案：C 您选择的答案：

第48题 女性，35岁，反复右下腹及脐周围疼痛7个月。常于进食后加重，排便后缓解，伴有消瘦、低热、盗汗，经常腹泻。体检：右下腹轻度压痛，无反跳痛及肌紧张，肠鸣音活跃，诊断首先考虑
A 慢性阑尾炎
B 肠结核
C 溃疡性结肠炎
D 克罗恩病
E 盲肠炎
正确答案：B 您选择的答案：

第49题 男性，71岁，腹痛、呕吐、肛门停止排气排便2天，诊断结肠梗阻行手术治疗，术中解除梗阻后见降结肠肠管约8cm呈黑色并塌陷，对刺激无收缩反应，相应肠系膜动脉无搏动。应选择何种手术方式

- A．解除梗阻即可
- B．肠切除肠吻合
- C．肠切除，梗阻近端造口
- D．切除坏死肠段，两断端外置造口
- E．梗阻近端与远端肠袢短路吻合

正确答案：D 您选择的答案：

第50题 女性，55岁，排便次数增多、排粘液脓血便3个月，近1周来左侧腹部胀痛。体检，腹部膨隆，左中腹部似可触及肿块，边界不清，轻度压痛。为明确诊断首选的检查是

- A．立位腹部平片
- B．全消化道钡餐
- C．钡剂灌肠
- D．腹部CT
- E．纤维结肠镜活检

正确答案：E 您选择的答案：

第51题 成年男性，3个月来有腹胀，有时有腹泻与便秘，大便带粘液，无脓血，查体，腹胀，右下腹可触及条索状肿块，压痛明显，肠鸣音亢进，X线钡剂灌肠见盲肠充盈缺损，诊断的最大可能是

- A．节段性肠炎
- B．回盲部结核
- C．回盲部癌
- D．阑尾周围脓肿
- E．以上都不是

正确答案：C 您选择的答案：

第52题 男性，2岁，阵发哭闹不安1天，排果酱样大便2小时，伴有呕吐。体检：脐右上方可扪及一腊肠样肿块，压痛，右下腹部空虚感，肠鸣音亢进。空气灌肠在结肠受阻，阻端呈“杯口”状。首先应考虑为

- A．蛔虫性肠梗阻
- B．先天性结肠息肉
- C．肠套叠
- D．肠扭转
- E．急性胃肠炎

正确答案：C 您选择的答案：

第53题 男性，49岁，腹部剧烈疼痛、呕吐半天，疼痛持续性，阵发性加重，尿少。体检：急性病容，四肢湿冷，血压90/60mmHg(12/8kPa)，左中腹局部隆起，可触及肿块，压痛，有反跳痛及肌紧张，移动性浊音阳性，肠鸣音消失。腹腔穿刺抽出血性液体。腹部X线检查见孤立、突出胀大的肠袢。诊断为

- A．高位肠梗阻
- B．低位肠梗阻
- C．动力性肠梗阻
- D．绞窄性肠梗阻
- E．完全性肠梗阻

正确答案：D 您选择的答案：

第54题 男性，50岁，阵发性腹痛，腹胀，无排便排气5天，2年前，有阑尾手术史，查体，腹膨隆，可见肠型，腹软无压痛，肠音亢进，腹部X线平片见中下腹部小肠有数个液气平面，盲肠、升结肠肠腔扩张，下列各病中以哪种可能性最大

- A．机械性肠梗阻
- B．麻痹性肠梗阻
- C．高位小肠梗阻
- D．低位小肠梗阻
- E．绞窄性肠梗阻

正确答案：A 您选择的答案：

第55题 男性，18岁，近两周出现持续性低热，头痛不适，四肢酸痛，食欲不振，3天前，出现腹部胀痛，腹泻，大便呈暗红色，入院前6小时突然出现右下腹剧痛，迅速弥漫至全腹。查体：一般状态差，呈恶液质状态，腹胀全腹压痛尤以右下腹明显肠鸣音消失，白细胞 $16 \times 10^9/L$ ，X线腹部透视见膈下游离气体，诊断应考虑为

- A．十二指肠溃疡穿孔
- B．肠伤寒穿孔
- C．急性阑尾炎穿孔
- D．美克耳憩室炎穿孔
- E．以上都不是

正确答案：B 您选择的答案：

第56题 男性，39岁，腹泻、便秘半年，左下腹隐痛3天，近2天便鲜血。体检：腹部膨隆，左下腹可触及肿块，质地较硬，可活动。钡剂灌肠见距肛门约25cm处有约4.0cm大小充盈缺损，近端肠腔扩张，诊断应首先考虑为

- A．直肠壶腹癌
- B．结肠息肉
- C．克罗恩病
- D．乙状结肠癌
- E．溃疡性结肠炎

正确答案：D 您选择的答案：

第57题 男性，30岁，10年前行阑尾切除术史，近期出现腹痛，腹胀无发热，4小时前突然出现持续性腹痛，阵发性加剧，口渴，烦躁不安，血常规WBC $12 \times 10^9/L$ ，诊断最大可能是

- A．输尿管结石
- B．单纯性机械性肠梗阻

- C 水肿性胰腺炎
- D 胆道蛔虫症
- E 绞窄性肠梗阻

正确答案：E 您选择的答案：

第58题 某患者因急性阑尾炎穿孔手术，切除术后6天，腹部胀痛不适，呈持续性，伴恶心呕吐，未排便排气。查体：全腹胀，肠鸣音消失，腹部X线平片，小肠及结肠均有多量充气及液气平面，进一步应采取

- A 剖腹探查
- B 全胃肠钡餐透视
- C 胃肠减压支持疗法
- D 腹腔穿刺，灌洗
- E 以上均不合适

正确答案：C 您选择的答案：

第59题 男性20岁，餐后搬运重物，突然脐周围剧痛，伴恶心呕吐为胃内容物，无血，发病6小时后急诊入院。查体：体温37℃，脉搏120次/分，血压12/8kPa，急性病容，大汗淋漓，呼吸急促，心肺未见异常，腹胀左侧脐旁触及可疑肿块，腹肌紧张，压痛明显，可疑移动性浊音，肝浊音界存在，肠鸣音减弱，直肠指诊未见异常，诊断应考虑为

- A 急性胰腺炎
- B 急性溃疡病穿孔
- C 急性胆囊炎
- D 急性肠扭转
- E 以上都不是

正确答案：D 您选择的答案：

第60题 男性，43岁，阵发性腹痛、腹胀1周，3天未排便，少量排气，3年前行阑尾切除术。体检：右下腹可触及肿块，压痛明显，轻度肌紧张，肠鸣音亢进。血常规白细胞 $10 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞0.70，血红蛋白100g/L，X线腹平片见中下腹小肠多处液气平面，最可能的诊断是

- A 阑尾残株炎
- B 粘连性肠梗阻
- C 回盲部结核
- D 溃疡性结肠炎
- E 麻痹性肠梗阻

正确答案：B 您选择的答案：

第61题 男，39岁，拟诊为粘连性肠梗阻，在院观察期间，出现持续性腹痛，阵发性加剧。查体：腹部压痛、反跳痛、无肌紧张，肠鸣音8~11次/分，未闻及气过水声。下列措施最适当的是

- A 继续密切观察腹部体征变化
- B 腹部X线摄片复查
- C 继续解痉抗感染治疗
- D 继续有效的胃肠减压
- E 积极剖腹探查

正确答案：E 您选择的答案：

第62题 男性，36岁，十二指肠溃疡穿孔修补术后5天，腹胀痛不适，恶心停止排气排便，查体：全腹胀，未见肠型，全腹压痛尤其以右下腹明显，轻度肌紧张，肠鸣音消失，血常规，白细胞 $11 \times 10^9/L$ ，中性86%，腹部X线平片，肠腔积气并可见小液气平面，应考虑为

- A 急性阑尾炎
- B 十二指肠溃疡穿孔
- C 粘连性肠梗阻
- D 麻痹性肠梗阻
- E 弥漫性腹膜炎

正确答案：D 您选择的答案：

第63题 女性18岁，因下腹部隐痛月余就诊，低热腹泻，贫血外观，右下腹触及肿块，压痛明显，白细胞 $10 \times 10^9/L$ ，血沉25mm/小时，既往有结核病史，X线腹平片检查，小肠多处小液气平面，钡灌肠盲肠充盈缺损，粘膜破坏，阑尾未充盈，为明确诊断进一步检查应作

- A 腹部B超
- B 纤维结肠镜
- C 选择性肠系膜血管造影
- D 腹部CT
- E 放射性核素显像

正确答案：B 您选择的答案：

第64题 男性，51岁，无明显诱因消瘦乏力半年。体检：消瘦，贫血貌，右下腹可触及包块，轻度压痛，无反跳痛。大便潜血试验持续阳性。最可能的诊断是

- A 直肠癌
- B 结肠息肉
- C 慢性阑尾炎
- D 慢性细菌性痢疾
- E 右半结肠癌

正确答案：E 您选择的答案：

第65题 女性，24岁，经常低热，乏力，腹痛由左侧腹部或脐周开始，阵发性感到腹内窜动，有时可见到腹部有起伏的肿物时隐时现，同时可听到高调肠鸣音，嗝气或排气后腹痛可稍有缓解，最可能的诊断是

- A 节段性肠炎
- B 溃疡性结肠炎
- C 肠肿瘤
- D 肠结核
- E 美克耳(Meckel)憩室炎

正确答案：D 您选择的答案：

第66题 男性，22岁，餐后即踢足球，突发脐周剧痛2小时，频繁呕吐，呕吐物无血性物。体检：体温37.5，脉搏120次/分，血压100/70mmHg(13.3/9.3kPa)，急性病容，蜷曲侧卧位，脐左侧触及可疑肿块，全腹腹肌紧张，压痛，反跳痛，以脐左侧可疑肿块处最明显，移动性浊音可疑，肝浊音界存在，肠鸣音减弱，诊断应考虑为

- A. 急性胃穿孔
- B. 急性胆囊炎穿孔
- C. 肝破裂
- D. 急性肠扭转
- E. 肠套叠

正确答案：D 您选择的答案：

第67题 男性，36岁，半年来，时有腹泻与便秘，3个月来腹部有隐痛，近两天大量便鲜血，直肠指诊和腹部触诊没有发现异常，X线钡透检查见，距肛门约25cm处肠腔有约4.0cm，充盈缺损，近端肠腔有扩张，诊断应考虑为

- A. 直肠壶腹癌
- B. 升结肠结核
- C. 乙状结肠癌
- D. 降结肠结核
- E. 溃疡性结肠炎

正确答案：C 您选择的答案：

第68题 男性，18个月患儿，阵发性哭闹一天，伴有呕吐，呕吐物内有蛔虫，腹痛时右上腹部可触及一肿块，轻压痛，右髂窝空虚，肠鸣音亢进，大便呈果酱样，蛔虫卵阳性，立位腹部X线平片见数个小液气平面，首先应考虑为

- A. 肠道蛔虫
- B. 蛔虫性肠梗阻
- C. 肠套叠
- D. 肠肿瘤
- E. 肠扭转

正确答案：C 您选择的答案：

第69题 男性，60岁，半年来经常便秘，三天前出现腹部持续疼痛，阵发性加剧，呕吐二次系胆汁性液体，约500ml，过去无类似发作史，查体腹胀Bp18/13kPa，体温：37.5，右下腹稍压痛，腹软，未触及肿块，肠鸣音亢进，白细胞 $9 \times 10^9/L$ ，其可能为

- A. 急性胃炎
- B. 急性胆囊炎
- C. 急性胰腺炎
- D. 肠梗阻
- E. 急性肠扭转

正确答案：D 您选择的答案：

第70题 男，25岁，饭后劳动时突然上腹部持续性剧痛，向背部放射，频繁呕吐，起病后12小时急诊入院。查体：体温37.0，脉搏120次/分，血压86/60mmHg，脐左上方可扪及一局限性包块，局部肌稍紧张。实验室检查：WBC $18.2 \times 10^9/L$ ，NO.86，LO.14，血清淀粉酶126索氏单位。腹部透视：可见突出孤立肠袢，大的气液平面。其诊断最可能是

- A. 急性胰腺炎
- B. 急性胆囊炎
- C. 急性小肠扭转
- D. 溃疡病穿孔
- E. 胆道蛔虫病

正确答案：C 您选择的答案：

三、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第71-73题

男性，1岁，呕吐、排果酱样大便、阵发哭闹不安1天。体检：面色苍白，出汗，右上腹扪及光滑压痛性肿块，右下腹空虚。

1. 最可能的诊断是

- A. 肠套叠
- B. 肠蛔虫堵塞
- C. 肠扭转
- D. 先天性肠息肉
- E. 急性细菌性痢疾

2. 首选的检查手段是

- A. 肛门指检
- B. 钡剂灌肠
- C. 纤维结肠镜
- D. 全消化道钡餐
- E. 粪便常规

3. 早期宜选用的治疗方法为

- A. 胃肠减压
- B. 口服植物油
- C. 抗生素治疗
- D. 空气灌肠复位
- E. 肠切除吻合

正确答案：ABD 您选择的答案：

第74-76题

男者45岁，一周前因急性阑尾炎，进行手术治疗时，阑尾系膜出血，缝扎止血时致回肠末段血运障碍，行回肠部分切

除吻合术，腹腔引流，间断性引出血性液每日约200ml，查体：腹胀，右侧腹压痛，未触及肿块，鸣音弱，BPI 6 / 11 kPa，P20次 / 分，白细胞， $12 \times 10^9 / L$ 中性80%

1. 诊断首先应考虑为

- A 粘连性肠梗阻
- B 绞窄性肠梗阻
- C 麻痹性肠梗阻
- D 小肠吻合口狭窄，梗阻
- E 以上都不是

2. 进一步检查首先应选择

- A 腹部X线平片
- B B超
- C CT
- D 钡剂灌肠
- E 腹腔穿刺

3. 应采取主要措施

- A 剖腹探查
- B 支持疗法
- C 腹腔灌洗
- D 肠造口术
- E 以上均不是

正确答案：CAB 您选择的答案：

第77-79题

女性，50岁，腹部阵发性胀痛1天，呕吐为胃内容物，近3个月来有时腹胀，大便带粘液无脓血，查体，BPI 7 / 12 kPa，P86次 / 分，腹胀，未见肠型，右下腹触及一斜行肿块，质韧压痛，腹部透视见一个气液平面，白细胞 $11 \times 10^9 / L$ ，血红蛋白87g / L

1. 下列检查意义最大的是什么

- A X线钡餐透视
- B 纤维结肠镜
- C 腹部B超
- D 腹部CT
- E 以上都不是

2. 诊断首先考虑为

- A 阑尾周围脓肿
- B 卵巢囊肿
- C 结肠癌
- D 回盲部结核
- E 回盲部套叠

3. 应采取的治疗措施为

- A 中药治疗
- B B超引导下穿刺
- C 手术治疗
- D 结肠充气复位
- E 对症支持疗法

正确答案：BCC 您选择的答案：

第80-82题

男性，42岁，阵发性腹痛、腹胀、便秘3个月，偶有脓血便，消瘦、乏力。体检：贫血貌，剑突下略偏左扪及4cm × 4cm肿块，轻度压痛，无反跳痛。腹部透视见右半结肠及横结肠右半部分充气扩张。

1. 诊断首先考虑

- A 粘连性肠梗阻
- B 溃疡性结肠炎
- C 横结肠癌伴不全梗阻
- D 肠结核
- E 克罗恩病

2. 为明确诊断首选检查方法是

- A 全消化道钡餐
- B 钡剂灌肠
- C 纤维结肠镜活检
- D 纤维胃镜活检
- E 腹部CT

3. 治疗选择

- A 胃癌根治
- B 横结肠切除术
- C 抗结核药治疗
- D 生理盐水灌肠
- E 梗阻段旷置、短路手术

正确答案：CCB 您选择的答案：

第83-85题

男，70岁，既往体健。晨练后突发左下腹痛1天余，肛门停止排便、排气，无呕吐，有便秘史。查体：明显腹胀，以左下腹为显，肠鸣音亢进，直肠指检阴性

1. 该病例最可能的诊断是

- A 乙状结肠扭转
- B 肠套叠
- C 小肠扭转
- D 结肠肿瘤
- E 肠系膜血管栓塞

2. 为明确诊断，进一步检查宜作

- A 腹部X线摄片检查

- B. 钡剂灌肠
 - C. 腹腔穿刺
 - D. 腹部B超检查
 - E. 消化道钡餐检查
3. 该病例首选的处理宜采取
- A. 早期扭转复位术
 - B. 晚期插管疗法
 - C. 早期插管疗法
 - D. 晚期扭转复位术
 - E. 一期或二期肠切除吻合术
- 正确答案：ABC 您选择的答案：

第86-87题

女性，36岁，反复腹痛、腹泻5年，腹痛常在右下腹，伴有低热、体重下降。体检：右下腹似可扪及包块，轻度压痛，无反跳痛及肌紧张。全消化道钡餐检查显示回肠末段肠腔狭窄、管壁僵硬，黏膜皱襞消失，呈线样征。

1. 该患者的诊断为
- A. 溃疡性结肠炎
 - B. 克罗恩病
 - C. 回盲部肠结核
 - D. 回肠末段肿瘤
 - E. 粘连性肠梗阻
2. 手术治疗适应证不包括
- A. 慢性肠穿孔后形成腹腔脓肿、肠内瘘或腹壁肠瘘
 - B. 肠梗阻
 - C. 长期持续出血
 - D. 高热、腹痛
 - E. 诊断上难以排除癌肿、结核者
- 正确答案：BD 您选择的答案：

第88-90题

男性，26岁，腹部阵发性胀痛半年余，时重时轻，常因饮食不注意或餐后诱发腹痛加重，有时排便排气停止，经对症治疗好转，无发热及黄染，既往一年前因腹外伤脾破裂，行脾切除，脾片大网膜移植术。查体：腹胀可见肠型，腹软无压痛，肠鸣音亢进

1. 下列检查最有意义的是
- A. 纤维结肠镜
 - B. 腹部CT
 - C. 腹部x线平片
 - D. 全胃肠钡餐透视
 - E. 钡剂灌肠
2. 最可能的诊断是
- A. 胃炎胃绞痛
 - B. 粘连性肠梗阻
 - C. 绞窄性肠梗阻
 - D. 结肠癌
 - E. 幽门梗阻
3. 最有效的治疗措施是
- A. 禁食水，胃肠减压
 - B. 低压肥皂水洗肠
 - C. 饮食疗法
 - D. 手术探查
 - E. 以上都不是
- 正确答案：CBD 您选择的答案：

第91-93题

男性，38岁，因急性化脓性阑尾炎穿孔并弥漫性腹膜炎行阑尾切除术后6天，呕吐，腹部胀痛，偶尔排气、不排便。体检：体温37.8℃，腹部膨隆，压之有胀痛，移动性浊音阴性，肠鸣音消失。

1. 最可能的诊断为
- A. 术后粘连性肠梗阻
 - B. 麻痹性肠梗阻
 - C. 绞窄性肠梗阻
 - D. 阑尾残株炎
 - E. 弥漫性腹膜炎
2. 最符合该病的X线腹平片表现是
- A. 肠黏膜皱襞出现“鱼肋骨刺”状
 - B. 孤立、突出胀大的肠袢
 - C. 马蹄状巨大的双腔充气肠袢
 - D. 大、小肠全部充气扩张
 - E. 扩张肠袢在腹中部，呈“阶梯状”排列
3. 该患者应如何治疗
- A. 剖腹探查
 - B. 胃肠减压、支持治疗
 - C. 梗阻近端外置、造口术
 - D. 腹腔穿刺、引流
 - E. 肠节段切除
- 正确答案：BDB 您选择的答案：

第94-95题

1岁男婴，突然哭闹，便血。查体：一般情况好，右上腹可扪及腊肠样肿物

1. 与肠套叠诊断相符合的X线检查发现是
- A. 膈下游离气体

- B. 钡剂在结肠受阻，阻端钡剂影呈“杯口”状
- C. 钡剂在结肠受阻，钡影尖端呈“鸟嘴”状
- D. 空肠、回肠换位
- E. 结肠瘘细

从发病到就诊40小时，采用X线下复位后，患儿仍阵发性哭闹，面色苍白，发作间歇比入院前缩短。

2. 此时治疗的最佳方案是

- A. 再次X线下检查、复位
- B. 立即手术探查
- C. 改用氧气驱虫治疗
- D. 改口服植物油
- E. 给予止痛、解痉药物，继续密切观察

正确答案：CB 您选择的答案：

四、A4型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第96-100题

男性，34岁，右下腹持续性疼痛，阵发性加重伴呕吐1天，1天前解少量大便，无肛门排气，8年前行阑尾切除术。体检：体温37.1℃，腹稍膨隆，右下腹压痛，无反跳痛及肌紧张，肠鸣音亢进。

1. 最可能的诊断是

- A. 急性肠炎
- B. 阑尾残株炎
- C. 单纯性粘连性肠梗阻
- D. 绞窄性粘连性肠梗阻
- E. 右侧输尿管结石

2. 首选的检查是

- A. 血常规
- B. 立位腹平片
- C. 纤维胃镜
- D. 腹部B超
- E. 上消化道钡餐

3. 此时患者治疗宜选择

- A. 非手术治疗
- B. 肠粘连切断分离
- C. 小肠折叠排列术
- D. 小肠插管内固定术
- E. 肠切除吻合术

4. 若患者经胃肠减压、补液等治疗第3天出现腹痛加剧，呕吐频繁。体检：四肢湿冷，血压90 / 60mmHg(12 / 8kPa)，右中腹局部隆起，全腹压痛，反跳痛及肌紧张，腹腔穿刺抽出血性液体。此时该如何处置

- A. 放射科摄片
 - B. 广谱抗生素控制感染
 - C. 大量补液抗休克
 - D. 急诊剖腹探查
 - E. 腹腔引流
5. 如手术去除梗阻原因后，梗阻段肠管为哪种情况时可考虑保留肠管
- A. 肠管颜色为黑色
 - B. 肠系膜小动脉无搏动
 - C. 肠管麻痹对刺激无反应
 - D. 等渗盐水纱布热敷15分钟肠管蠕动
 - E. 以上情况都不可保留

正确答案：CBADD 您选择的答案：

五、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第101-102题

- A. 机械性肠梗阻
- B. 痉挛性肠梗阻
- C. 绞窄性肠梗阻
- D. 麻痹性肠梗阻
- E. 闭袢性肠梗阻

1. 结肠癌

2. 弥漫性腹膜炎

正确答案：AD 您选择的答案：

第103-104题

- A. 左半结肠癌
- B. 右半结肠癌
- C. 小肠肿瘤
- D. 节段性肠炎
- E. 溃疡性结肠炎

1. 腹部不适，无力，消瘦，发热伴贫血，粪便带脓血或粘液

2. 腹痛，腹胀，便秘或腹泻，不完全性低位肠梗阻

正确答案：BA 您选择的答案：

第105-107题

A. 持续性发热二、三周，突然右下腹部疼痛，出现弥漫性腹膜炎

B 发生于20岁左右，病史长，腹痛，腹泻无脓血，有低热，贫血，可出现肠梗阻
C 多发生于老年人，腹痛，腹胀，便秘与腹泻交替出现可出现不全肠梗阻
D 夏秋季多发，多见于儿童、青年，腥臭血便，全身中毒明显往往有休克
E 起病急，腹泻，血便或脓血便，腹痛在左下腹

1. 急性坏死性肠炎
2. 肠结核
3. 肠伤寒穿孔

正确答案：DBA 您选择的答案：

第108-110题

A. 孤立、突出胀大的肠袢不因时间而改变位置，肠间隙增宽
B. 扩张的肠袢在腹中部，呈"阶梯样"排列
C. 空肠和回肠换位，或排列成多种形态的小跨度蜷曲肠袢
D. 钡剂灌肠见钡剂在结肠受阻，阻端钡影呈"杯口"状，甚至呈"弹簧"状阴影
E. 钡剂灌肠见钡剂在结肠受阻，钡影尖端呈"鸟嘴"状

1. 小肠扭转的腹部X线表现为
2. 肠套叠的腹部X线表现为
3. 低位小肠梗阻的腹部X线表现为

正确答案：CDB 您选择的答案：

习题集 外科学 急腹症

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 单纯空腔器官梗阻的腹痛特点

- A 持续性腹痛
- B 阵发性腹痛
- C 持续性痛阵发性加重
- D 持续性痛伴腹泻
- E 阵发性痛伴发热

正确答案：B 您选择的答案：

第2题 哪项不是炎症性急腹症的特点

- A 腹痛由轻转重
- B 持续性腹痛
- C 病变部位有固定压痛
- D 腹膜刺激征局限于病变局部
- E 腹膜炎范围不随病变加重而扩展

正确答案：E 您选择的答案：

第3题 诊断性腹腔穿刺不应用于

- A 小儿及老年人
- B 精神状态不正常者
- C 昏迷病人
- D 诊断已明确的病人
- E 诊断不明的病人

正确答案：D 您选择的答案：

第4题 对未明确诊断的急腹症病人，下列哪项处置是错误的

- A 严密观察
- B 禁用吗啡、杜冷丁等止痛剂
- C 禁用泻药和灌肠
- D 流食
- E 抗炎治疗

正确答案：D 您选择的答案：

第5题 急腹症手术治疗的适应证，下列哪项是错误的

- A 腹膜刺激征严重或有扩大趋势或抗炎治疗无效者
- B 腹内脏器破裂或穿孔
- C 急性机械性完全性肠梗阻
- D 急性水肿性胰腺炎
- E 嵌顿疝

正确答案：D 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第6题 女性，30岁，农民，2小时前劳动中无诱因突然上腹刀割样疼痛，迅速波及全腹，不敢直腰，肝浊音界消失，舟状腹，有腹膜刺激征，应诊断为

- A 阑尾炎穿孔，弥漫性腹膜炎
- B 宫外孕破裂
- C 溃疡病穿孔
- D 绞窄性肠梗阻
- E 急性出血性胰腺炎

正确答案：C 您选择的答案：

第7题 男性患儿3岁，上腹部汽车撞伤2小时入院，腹腔诊断性穿刺(-)。诊断为腹壁挫伤。伤后8小时腹部逐渐饱胀，腹部扪诊时哭闹，腹肌紧张，肠鸣音消失，应考虑

- A 胃破裂，弥漫性腹膜炎
- B 腹壁挫伤
- C 肝破裂
- D 脾破裂
- E 胰腺损伤

正确答案：A 您选择的答案：

第8题 10岁男孩，右下腹持续性痛阵发性加剧4天，发热，呕吐5次，为胃内容物，2天未排大便，仍排气。查：体温38.8℃，脉搏100次/分，腹稍胀，未见肠形，右下腹扪及5cm×4cm肿块，边界不清有压痛，肌紧张和反跳痛，肠鸣音减少，直肠指诊阴性。白细胞 $18 \times 10^9/L$ ，中性80%，应诊断为

- A 肠套叠
- B 肠结核
- C 蛔虫团肠梗阻
- D 阑尾周围脓肿
- E 盲肠炎

正确答案：D 您选择的答案：

第9题 女性，46岁，因上腹剧痛，休克12小时入院。巩膜轻度黄染，高度腹胀，肠鸣音消失，血糖8.3mmol/L，血钙6.5mg%，CO₂CP20.1mmol/L，血淀粉酶126温氏单位。心电图：T波倒置，ST段下降，诊断为

- A 心肌梗死，心源性休克
 - B 急性梗阻性化脓性胆管炎
 - C 胃穿孔弥漫性腹膜炎感染性休克
 - D 急性水肿性胰腺炎
 - E 急性坏死性胰腺炎
- 正确答案：E 您选择的答案：

第10题 男性，30岁，上腹隐痛，与饮食有关已4年，此次突然上腹部剧痛，不敢深呼吸。体检：面色苍白，上腹部压痛明显，伴反跳痛及肌紧张，下腹轻度压痛，白细胞 $15 \times 10^9/L$ ，中性80%，为明确诊断首先应

- A 腹部立位平片
- B 紧急钡餐透视
- C 腹腔穿刺
- D 急查血淀粉酶
- E 紧急静脉胆道造影

正确答案：A 您选择的答案：

第11题 女性，30岁，乘车后突然发生右下腹痛，伴恶心，近年来有同样发作史。查：腹软，右下腹有深压痛，血常规：白细胞 $9.0 \times 10^9/L$ 。尿镜检：红细胞(++)，白细胞0~6/HP个，应诊为

- A 慢性阑尾炎急性发作
- B 右侧输尿管结石
- C 右侧输卵管炎
- D 单纯性不完全性肠梗阻
- E 麦克尔憩室炎

正确答案：B 您选择的答案：

第12题 男性，35岁，右下腹痛2周，伴有发热，右下腹扪及 $5cm \times 4cm$ 肿块，压痛明显，查白细胞 $6.0 \times 10^9/L$ ，中性85%，截石位直肠指诊：右前方有触痛，应考虑其诊断为

- A 盆腔脓肿
- B 局限性肠炎
- C 恶性淋巴瘤
- D 回盲部结核
- E 阑尾周围脓肿

正确答案：E 您选择的答案：

三、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第13-16题

患者，男，56岁，既往多年风湿性心脏病史，今晨饭后突然出现腹部绞痛，伴恶心，呕吐，无寒战，发热3小时入院，查：急性病容，血压 $110/80mmHg$ ，全腹轻压痛，反跳痛、肌紧张不明显，无移动性浊音，肠鸣音6次/分，无气过水声。血常规WBC为 $9.0 \times 10^9/L$ ，分叶60%

1. 该患者可能的诊断是

- A 急性机械性肠梗阻
- B 急性胃肠炎
- C 急性胰腺炎
- D 急性肠系膜上动脉栓塞
- E 肠扭转

2. 该患者便常规可能的改变是

- A 完全正常
- B 含有未消化食物及脂滴
- C 含有血细胞
- D 有大量白细胞
- E 含有大量脓细胞

3. 为明确诊断，需进行下列哪项检查

- A 肝胆胰脾彩超
- B 胸腹部X线摄片
- C 肠系膜上动脉造影
- D 血尿淀粉酶测定
- E 心电图检查

4. 该患应采取哪种治疗方法

- A 抗炎治疗
- B 镇痛解痉
- C 观察疗法
- D 短期(2小时)观察，如不缓解剖腹探查
- E 立即剖腹探查

正确答案：DCCD 您选择的答案：

习题集 外科学 腹外疝

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 最常用来加强腹股沟管前壁的手术方法是

- A. Bassini 法
- B. Halsted法
- C. Shouldice法
- D. Ferguson法
- E. McVay法

正确答案：D 您选择的答案：

第2题 有关股疝的临床表现，下列哪项是错误的

- A. 站立时局部胀痛，有可复性肿块
- B. 卵圆窝处半球形肿块
- C. 疝内容物可回纳，但包块不能完全消失
- D. 咳嗽见疝囊冲击感明显
- E. 容易嵌顿

正确答案：D 您选择的答案：

第3题 肠管壁疝嵌顿时容易误诊，其原因不正确的是

- A. 临床少见
- B. 局部肿块不明显
- C. 嵌顿疝内容物是肠袢
- D. 无肠梗阻表现
- E. 不易引起绞窄

正确答案：C 您选择的答案：

第4题 绞窄性疝与嵌顿性疝最重要的区别在于

- A. 肠管受压坏死
- B. 静脉受压直至阻断，肠壁淤血、坏死
- C. 动脉血流减少直至完全阻断
- D. 出现肠梗阻
- E. 疝囊内有淡黄色渗液积聚

正确答案：C 您选择的答案：

第5题 嵌顿疝内容物中的肠管是小肠憩室，称为

- A. 闭孔疝
- B. Richter疝
- C. Littre疝
- D. 腹股沟滑动性疝
- E. 腹股沟疝

正确答案：C 您选择的答案：

第6题 在腹股沟管的解剖结构中，下列哪项是错误的

- A. 内口为内环，外口为皮下环
- B. 上壁为腹外斜肌的弓状下缘
- C. 下壁为腹股沟韧带和陷窝韧带
- D. 前壁为腹外斜肌腱膜
- E. 后壁为腹横筋膜和腹膜

正确答案：B 您选择的答案：

第7题 嵌顿疝手法复位时错误的是

- A. 复位应在嵌顿3~4小时内
- B. 必须无腹膜刺激征
- C. 可以注射吗啡或哌替啶镇静止痛
- D. 用手轻轻按摩浅环和深环以协助疝内容物回纳
- E. 间断冲击挤压疝内容物使之回入腹腔

正确答案：E 您选择的答案：

第8题 腹外疝中最易发生嵌顿的是

- A. 斜疝
- B. 直疝
- C. 股疝
- D. 切口疝
- E. 脐疝

正确答案：C 您选择的答案：

第9题 小儿一岁以内腹股沟斜疝，应采用哪一种治疗方法

- A. 非手术治疗
- B. 疝囊切除，高位结扎疝囊
- C. Ferguson修补法
- D. Bassini 修补法
- E. 疝成形术

正确答案：A 您选择的答案：

第10题 股管各边界的叙述不正确的是

- A. 前沿为腹股沟韧带

B. 后缘为耻骨梳韧带
C. 上缘为腹内斜肌、腹横肌的弓状下缘
D. 内缘为腔隙韧带
E. 外缘为股静脉
正确答案：C 您选择的答案：

第11题 股疝经股环、股管突出于
A. 腹股沟韧带上方
B. 股部小转子部位
C. 股三角内
D. 股部卵圆窝
E. 股三角外
正确答案：D 您选择的答案：

第12题 符合股疝临床特点的是
A. 常在腹股沟韧带上方表现为一半球形突起
B. 咳嗽时有较明显冲击感
C. 疝囊内容物回纳后，疝块有时并不完全消失
D. 不易嵌顿
E. 多发于老年男性
正确答案：C 您选择的答案：

第13题 符合直疝特点的是
A. 多见于儿童或青壮年
B. 椭圆形或梨形，上缘呈蒂柄状
C. 疝囊颈在腹壁下动脉内侧
D. 经腹股沟管突出，可进阴囊
E. 精索在疝囊后方
正确答案：C 您选择的答案：

第14题 腹外疝按临床类型分类不包括
A. 易复性
B. 难复性
C. 嵌顿性
D. 绞窄性
E. 先天性
正确答案：E 您选择的答案：

第15题 腹外疝最重要的发病原因是
A. 慢性咳嗽
B. 长期便秘
C. 排尿困难
D. 腹壁有薄弱点或腹壁缺损
E. 经常从事腹内压增高的工作
正确答案：D 您选择的答案：

第16题 滑动疝最易发生的部位是
A. 外伤处
B. 小网膜孔
C. 脐血管穿过的脐环
D. 髂窝区后腹膜与后腹壁结合处
E. 愈合不良的手术切口
正确答案：D 您选择的答案：

第17题 Hesselbach三角即
A. 斜疝三角
B. 直疝三角
C. 腹股沟三角
D. 腹股沟管浅环
E. 腹股沟管深环
正确答案：B 您选择的答案：

第18题 男婴，6个月，啼哭时右侧阴囊出现肿块1周，应采取何种治疗措施
A. 非手术治疗
B. 疝囊高位结扎术
C. Ferguson法
D. Bassini法
E. 无张力疝修补术
正确答案：A 您选择的答案：

第19题 最容易引起嵌顿的疝是
A. 切口疝
B. 股疝
C. 脐疝
D. 腹股沟直疝
E. 腹股沟斜疝
正确答案：B 您选择的答案：

第20题 鉴别腹股沟斜疝与直疝最有意义的体征是
A. 疝块的形状

B. 疝块是否降入阴囊
C. 单侧或双侧
D. 是否易嵌顿
E. 回纳疝块后，压住内环，增加腹内压是否脱出
正确答案：E 您选择的答案：

第21题 股疝最常用的手术为

A. McVay法
B. Bassini 法
C. Ferguson法
D. Halsted法
E. Shouldice法

正确答案：A 您选择的答案：

第22题 嵌顿性疝与绞窄性疝的根本区别是

A. 肠壁动脉血流障碍
B. 肠壁静脉血流障碍
C. 疝囊内有渗液积累
D. 疝块迅速增大
E. 发生急性机械性肠梗阻

正确答案：A 您选择的答案：

第23题 对嵌顿性疝处理正确的是

A. 所有嵌顿性疝均需行急诊手术
B. 术前应作好必要的准备，比如纠正水、电解质紊乱
C. 活力不能肯定的肠管亦应尽量保留
D. 施行肠切除吻合后应一期行疝修补术
E. 嵌顿性疝不可以行手法复位

正确答案：B 您选择的答案：

第24题 腹股沟管解剖结构说法错误的是

A. 腹股沟管的内口即深环，外口即浅环
B. 上壁为腹内斜肌、腹横肌的弓状下缘
C. 下壁为腹股沟韧带
D. 女性有子宫圆韧带通过，男性有精索通过
E. 后壁即为脏层腹膜

正确答案：E 您选择的答案：

第25题 肠管壁疝嵌顿时易误诊的原因，下列哪项不正确

A. 局部肿块不明显
B. 嵌顿疝内容物为大网膜
C. 无肠梗阻表现
D. 不易引起绞窄
E. 临床上少见

正确答案：B 您选择的答案：

第26题 对老年复发性腹股沟疝最理想的手术方法是

A. Bassini 法
B. 内环修补法
C. McVay法
D. Ferguson法
E. 单纯疝囊高位结扎术

正确答案：C 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第27题 患者，男，30岁，右腹股沟可复性肿块5年，逐渐增大，站立时出现，平卧后消失，查外环超过一指，压迫内环后肿块不出现，诊断最可能是

A. 先天性睾丸鞘膜积液
B. 精索肿物
C. 精索鞘膜积液
D. 腹股沟斜疝
E. 腹股沟直疝

正确答案：D 您选择的答案：

第28题 患儿，1岁6个月，哭闹时右腹股沟出现肿块2个月。体检：右腹股沟区肿块约1cm×1cm，压迫内环后肿块不出现，手术治疗方案宜选择

A. 疝囊高位结扎术
B. Halsted法
C. Ferguson法
D. Bassini 法
E. 无张力疝修补术

正确答案：A 您选择的答案：

第29题 女性，42岁，嵌顿性股疝6小时，经用力按压还纳疝块后2小时，腹部持续性痛伴下腹压痛，肌紧张，反跳痛，肠鸣音消失，此时应考虑

A. 股疝内容物血运不佳
B. 回纳疝内容物为大网膜并坏死

- C 嵌顿疝内容物未完全还纳
- D 肠坏死穿孔腹膜炎
- E 并发附件炎

正确答案：D 您选择的答案：

第30题 男性，70岁，排尿困难10余年，近1年右腹股沟出现半圆形肿块，站立位明显，平卧后消失，压迫内环肿块仍出现，诊断考虑

- A．腹股沟直疝
- B．股沟斜疝
- C．股疝
- D．精索鞘膜积液
- E．切口疝

正确答案：A 您选择的答案：

第31题 患者，1岁3个月，其母发现其右腹股沟区肿块3个月，在哭闹时明显，查右腹股沟区肿块约鸽卵大小，压迫内环后肿块不出现。其手术治疗的方法为

- A McVay法
- B Ferguson法
- C Halsted法
- D 疝囊高位结扎法
- E 疝成形术

正确答案：D 您选择的答案：

第32题 经产妇，50岁，久站后左侧腹股沟处出现肿块并伴胀痛半年。体检：腹股沟韧带下外方可触及一半球形突起，平卧上推后肿块不能完全消失，咳嗽无明显冲击，诊断考虑为

- A．腹股沟脂肪瘤
- B．大隐静脉曲张结节样膨大
- C．股疝
- D．腹股沟斜疝
- E．腹股沟直疝

正确答案：C 您选择的答案：

第33题 男性，19岁，右侧腹股沟可复性肿块5年，逐渐增大，站立时出现，平卧消失。体检：外环超过一指，压迫内环肿块不出现，最可能的诊断是

- A．睾丸鞘膜积液
- B．精索鞘膜积液
- C．股疝
- D．腹股沟斜疝
- E．腹股沟直疝

正确答案：D 您选择的答案：

第34题 女性，45岁，嵌顿性股疝5小时，平卧位用力回纳后2小时，腹部持续性疼痛。体检全腹压痛，反跳痛，肌紧张，肠鸣音消失，此时应考虑

- A．股疝内容物血运欠佳
- B．回纳内容物为大网膜并坏死
- C．肠坏死并穿孔
- D．肠壁静脉瘀血
- E．附件炎

正确答案：C 您选择的答案：

第35题 男性，40岁，右侧阴囊可复性肿块5年，今晨突然剧烈咳嗽后出现肿块增大，不能回纳，局部疼痛，持续加重。体检右侧阴囊肿胀有压痛，穿刺抽得少许暗红液体，处理为

- A．疝囊高位结扎术
- B．Halsted法
- C．Ferguson法
- D．无张力疝修补术
- E．剖腹探查肠切除术

正确答案：E 您选择的答案：

第36题 患者，男，36岁，右腹股沟肿块10年，可回纳，今晨突然咳嗽后，突然出现肿块增大，局部出现持续性痛，阵发性加重，查肿块局部红肿有压痛，穿出暗红液少许，处理为

- A Ferguson修补术
- B Bassini 修补术
- C Halsted修补术
- D 疝成形术
- E 腹部探查肠切除术

正确答案：E 您选择的答案：

第37题 男性，26岁，患右腹股沟斜疝3年，应首先采用下列哪种手术方式

- A．单纯疝囊高位结扎术
- B．Ferguson法
- C．McVay法
- D．Bassini 法
- E．疝成形术

正确答案：D 您选择的答案：

第38题 患者，男，70岁，有多年排尿不畅，呈滴淋状，近2年双侧腹股沟区出现半圆形肿块，站立时明显，平卧后消失，体检时压迫内环肿块仍出现，诊断为

- A 腹股沟斜疝
- B 腹股沟直疝

- C 股疝
- D 切口疝
- E 巨大疝

正确答案：B 您选择的答案：

第39题 10个月婴儿患右侧腹股沟斜疝，应首先采取下列哪项措施

- A. 暂不手术
- B. 禁忌手术
- C. 紧急手术
- D. 择期手术
- E. 及早手术

正确答案：A 您选择的答案：

第40题 男，43岁，阴囊肿物不能回纳1日，持续性腹痛2小时。体检：下腹部压痛，腹肌紧张，阴囊肿胀压痛。入手术室麻醉后，发现阴囊肿物消失，此时如何处理

- A. 取消手术，继续观察
- B. 疝囊高位结扎术
- C. 疝囊高位结扎+腹股沟管修补术
- D. 无张力疝修补术
- E. 剖腹探查

正确答案：E 您选择的答案：

三、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第41-42题

男婴，10个月，哭闹时阴囊出现肿块2周，可自行回复。体检：肿块约1cm×2cm，压迫深环后肿块不再出现。

1. 该患儿最可能的诊断为

- A. 腹股沟直疝
- B. 腹股沟斜疝
- C. 股疝
- D. 睾丸鞘膜积液
- E. 精索鞘膜积液

2. 处理应选择

- A. 用绷带压住腹股沟深环
- B. 无张力疝修补术
- C. Halsted法
- D. Ferguson法
- E. Bassini法

正确答案：BA 您选择的答案：

第43-45题

女性，47岁，发现左侧腹股沟肿块半年，咳嗽时有胀痛。体检：腹股沟韧带下外方有一半球形突起，平卧上推后肿块略减小，探查外环无明显扩大。

1. 该患者最可能的诊断是

- A. 腹股沟斜疝
- B. 腹股沟直疝
- C. 股疝
- D. 腹壁疝
- E. 嵌顿疝

2. 此种腹外疝容易发生嵌顿的原因不包括

- A. 股管几乎垂直
- B. 疝块在卵圆窝处向前转折时形成锐角
- C. 股环较小
- D. 股环周围有较多坚韧的韧带
- E. 浅环较松弛

3. 诊断明确后手术方法常选择

- A. 用绷带压住股环
- B. McVay法
- C. Halsted法
- D. Ferguson法
- E. Bassini法

正确答案：CEB 您选择的答案：

第46-48题

男，44岁，右阴囊突发肿物28小时，伴发热、呕吐、肛门停止排气，右阴囊皮肤红润

1. 此患者治疗的关键在于

- A. 鉴别是直疝还是斜疝
- B. 开腹弄清疝内容物
- C. 判断疝内容物的血供
- D. 迅速补充血容量
- E. 进行疝修补术

2. 手术中鉴别直疝与斜疝最可靠的依据是

- A. 精索与疝囊的关系
- B. 疝囊颈与腹壁下动脉的关系
- C. 疝块与内环的关系
- D. 疝块是否进入阴囊
- E. 是否产生嵌顿

3. 此患者术中探查发现肿物为嵌顿的小肠且肠管发黑，首先的处理为

- A. 坏死肠管外置术
 - B. 剖腹行肠切除肠吻合术
 - C. 切开疝环，回纳肠管后行Bassini 修补术
 - D. 肠切除术后行McVay修补术
 - E. 坏死肠段切除肠吻合术，回纳后行疝囊高位结扎术
- 正确答案：CBE 您选择的答案：

第49-51题

男性，42岁，右腹股沟肿块5年，站立时明显，平卧后消失，有时可降入阴囊。体检：肿块突入阴囊，大小约6cm×5cm×4cm，可回纳腹腔，外环可容约3指，压迫内环肿块不再出现。

1. 该患者诊断为
 - A. 睾丸鞘膜积液
 - B. 精索鞘膜积液
 - C. 腹股沟直疝
 - D. 腹股沟斜疝
 - E. 股疝
2. 该病常见且严重的并发症是
 - A. 急性肠梗阻
 - B. 肠痿
 - C. 逆行性嵌顿
 - D. 腹腔感染
 - E. 嵌顿疝并绞窄性肠梗阻
3. 该患者宜选择的最佳手术方式是
 - A. 疝囊高位结扎术
 - B. 疝前壁修补术
 - C. 疝后壁修补术
 - D. 内环缩小再塑
 - E. 疝囊高位结扎 + 内环缩小再塑 + 疝后壁修补术

正确答案：DEE 您选择的答案：

第52-55题

男性，35岁，右腹股沟肿块10年，站立时明显，平卧后消失，有时可降入阴囊，可还纳。查：右腹股沟肿块，手拳大小还纳腹腔，外环容3指，压迫内环后肿块不再出现

1. 该患者最可能的诊断为
 - A. 精索鞘膜积液
 - B. 股疝
 - C. 腹股沟直疝
 - D. 腹股沟斜疝
 - E. 先天性鞘膜积液
2. 该患者最佳手术方式为
 - A. 疝囊高位结扎
 - B. 紧缩内环
 - C. 疝前壁修补术
 - D. 疝后壁修补术
 - E. 疝囊高位结扎+紧缩内环+疝后壁修补术
3. 该患者最容易出现并发症
 - A. 逆行性嵌顿
 - B. 急性肠梗阻
 - C. 感染性休克
 - D. 嵌顿疝并绞窄性肠梗阻
 - E. 以上均不是
4. 如上述病人，行Halsted修补术，精索的位置是
 - A. 腹外斜肌腱膜下，腹内斜肌外侧
 - B. 腹内斜肌下，腹横肌外
 - C. 皮下，腹外斜肌腱膜外
 - D. 腹内斜肌内侧，腹膜外
 - E. 没有改变精索位置

正确答案：DEDC 您选择的答案：

四、A4型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第56-57题

男，51岁，右侧阴囊肿块不能回纳半天伴持续性腹痛1小时。体检：右侧阴囊肿块6cm×6cm×5cm，压痛，平卧位推送不能使肿块回纳。

1. 最可能的诊断应是
 - A. 腹股沟斜疝
 - B. 腹股沟直疝
 - C. 嵌顿性直疝
 - D. 嵌顿性斜疝
 - E. 股疝
2. 如手术中发现嵌顿肠管为W形，肠管颜色发黑，缺少光泽，此时处理应选择
 - A. 切除嵌顿肠管，一期肠吻合
 - B. 切除嵌顿肠管，肠造瘘，二期吻合
 - C. 嵌顿肠管外置，远侧开口，解除梗阻
 - D. 腹腔内相关肠袢牵出检查，判断活力
 - E. 以上都不对

正确答案：DD 您选择的答案：

第58-60题

男性，68岁，右侧阴囊可复性肿块3年，大便后肿块突入阴囊3小时，疼痛较剧并伴有恶心。体检：右侧阴囊椭圆形肿块约8cm×6cm×5cm，压痛，平卧位推送不能使肿块回纳。

1. 诊断考虑为

- A. 嵌顿性直疝
- B. 嵌顿性斜疝
- C. 嵌顿性股疝
- D. 难复性斜疝
- E. 肠壁疝嵌顿

2. 患者拒绝手术，保守治疗4小时后患者疼痛突然减轻，体检肿块无明显变化，此时最可能为

- A. 保守治疗有效
- B. 疝块部分回纳、疝囊压力降低
- C. 病人对疼痛产生耐受
- D. 肠袢坏死穿孔
- E. 以上都不是

3. 此时最恰当的处理应是

- A. 局麻下疝块还纳
- D. 镇静止痛治疗
- C. 营养支持治疗
- D. 手法复位
- E. 剖腹探查

正确答案：BDE 您选择的答案：

五、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第61-63题

- A 未闭的鞘状突为一条细小管道
- B 鞘状突下段闭锁而上段未闭
- C 鞘状突两段闭锁而中段不闭
- D 右侧睾丸下降迟于左侧
- E 腹内斜肌弓状下缘发育不全或位置偏高

1. 腹股沟疝或复发的发病机制

2. 右腹股沟多见的病因

3. 交通性睾丸鞘膜积液

正确答案：EDA 您选择的答案：

第64-66题

- A. 滑动疝
- B. 易复性疝
- C. 绞窄性疝
- D. Richter疝
- E. Littre疝

1. 疝内容物不断进入疝囊使腹膜逐渐推向疝囊，致盲肠等成为疝囊壁的一部分

2. 嵌顿的内容物是小肠憩室为

3. 嵌顿的内容物是部分肠壁为

正确答案：AED 您选择的答案：

第67-69题

- A. 易复性疝
- B. 难复性疝
- C. 嵌顿性疝
- D. 绞窄性疝
- E. 混合性疝

1. 滑动性疝属于

2. Littre疝属于

3. 逆行性嵌顿，术中见腹腔内部分肠管发黑者属于

正确答案：BCD 您选择的答案：

第70-72题

- A. 儿童或青壮年
- B. 40岁以上妇女
- C. 老年
- D. 孕妇
- E. 腹部手术后

1. 腹股沟直疝好发于

2. 腹股沟斜疝好发于

3. 股疝好发于

正确答案：CAB 您选择的答案：

习题集 外科学 颈部疾病

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 甲状腺内孤立的、无触痛性、不规则的硬结节最可能的是

- A. 结节性甲状腺肿
- B. 急性甲状腺炎
- C. 甲状腺腺癌
- D. 硬化性甲状腺炎
- E. 甲状腺脓肿

正确答案：C 您选择的答案：

第2题 有关甲状腺解剖的叙述哪项正确

- A. 正常情况下，做颈部检查时可容易的看到或摸到甲状腺
- B. 甲状腺主要由双侧甲状腺上、下动脉供血，手术结扎上述动脉严重影响残留甲状腺供血
- C. 甲状腺上、中静脉血液流入颈内静脉，甲状腺下静脉血液则直接流入上腔静脉
- D. 喉返神经行走在气管、食管之间的沟内，多在甲状腺下动脉的分支间穿过
- E. 甲状腺的动、静脉及神经和淋巴走行在外科包膜外，手术时需小心分离

正确答案：D 您选择的答案：

第3题 甲状腺各类结节处理原则错误的是

- A. 核素扫描为热结节的单发结节癌变可能小，可手术切除或核素治疗
- B. 冷结节多需手术治疗
- C. 发展快、质地硬的单发结节应尽早手术
- D. 多发结节不会恶变，故一般不需手术
- E. 男性病人单发结节恶性可能性大，应尽早手术

正确答案：D 您选择的答案：

第4题 有关甲状腺手术后导致呼吸困难的原因，不包括下列哪一项

- A. 伤口内出血、压迫气管
- B. 双侧喉上神经损伤
- C. 双侧喉返神经损伤
- D. 急性喉头水肿
- E. 气管软化、塌陷

正确答案：B 您选择的答案：

第5题 预防甲亢术后甲状腺危象的关键是

- A. 防止术中损伤，操作粗暴
- B. 术后加强护理
- C. 术时尽量选用全身麻醉
- D. 术后应用镇静剂
- E. 术前使基础代谢率降至正常

正确答案：E 您选择的答案：

第6题 有关甲亢的临床表现，下列哪一项是错误的

- A. 甲状腺弥漫性肿大
- B. 心悸伴心慌
- C. 消瘦、体重减轻
- D. 精神萎靡、嗜睡
- E. 两手颤动

正确答案：D 您选择的答案：

第7题 关于甲状腺结节的论述，下列哪项是错误的

- A. 儿童出现甲状腺结节50%是恶性的
- B. 甲状腺癌均为冷结节
- C. 热结节常提示为高功能腺瘤
- D. 多发结节多为良性病变
- E. 多发结节不会恶变

正确答案：E 您选择的答案：

第8题 甲亢手术术前常规检查不包括

- A. 测定基础代谢率，了解甲亢程度
- B. 颈部透视或摄片，了解有无气管受压或移位
- C. 详细检查心脏有无扩大、杂音或心律不齐，并作心电图检查
- D. 喉镜检查，确定声带功能
- E. 胸部CT检查，了解有无胸内甲状腺

正确答案：E 您选择的答案：

第9题 关于甲亢病人术前碘准备下列哪项是错误的

- A. 抑制蛋白水解酶，减少甲状腺球蛋白分解
- B. 抑制甲状腺素的合成
- C. 停服碘剂后，甲状腺素大量释放
- D. 不准备手术者，不宜服碘
- E. 碘剂能减少甲状腺的血流量

正确答案：B 您选择的答案：

第10题 预防甲亢手术术后出现甲状腺危象最关键的措施是

- A. 术前使基础代谢率降至正常

B. 术中尽量少切甲状腺组织
C. 术中仔细操作，降低组织损伤
D. 术后充分使用镇静药
E. 术后加强护理
正确答案：A 您选择的答案：

第11题 符合甲状腺乳头状腺癌特点的是
A. 多见于老年人
B. 常见于男性
C. 分化程度低
D. 恶性程度高
E. 较早出现颈淋巴结转移
正确答案：E 您选择的答案：

第12题 单纯性甲状腺肿的主要原因是
A. 需要甲状腺素量增加
B. 甲状腺合成障碍
C. 合成甲状腺素的原料碘缺乏
D. 甲状腺素分泌障碍
E. 应用甲状腺抑制剂
正确答案：C 您选择的答案：

第13题 下列哪一项不适宜施行甲状腺次全切除术
A. 中度原发性甲亢并发心律失常
B. 甲亢伴有气管压迫症状
C. 青少年甲亢
D. 继发性甲亢
E. 单纯性甲状腺肿
正确答案：C 您选择的答案：

第14题 甲状腺肿大并出现Horner综合征时，最可能的诊断是
A. 甲状腺功能亢进症
B. 甲状腺腺瘤
C. 甲状腺癌
D. 甲状腺炎
E. 单纯性甲状腺肿
正确答案：C 您选择的答案：

第15题 甲状腺功能亢进手术治疗正确的是
A. 即使症状较轻亦应尽早手术
B. 青少年甲亢患者应手术治疗
C. 老年病人手术适应证应放宽
D. 因手术对胎儿发育影响大，妊娠期甲亢一般不考虑手术治疗
E. 中度以上的原发性甲亢考虑手术治疗
正确答案：E 您选择的答案：

第16题 甲状腺功能亢进诊断主要依靠
A. 临床表现
B. 基础代谢率测定
C. 放射性碘摄取试验
D. 甲状腺扫描
E. PBI测定(血清蛋白结合碘)
正确答案：A 您选择的答案：

第17题 下述甲状腺疾病中哪一种必须手术
A. 结节性甲状腺肿，继发甲亢
B. 轻度原发性甲状腺机能亢进
C. 青春期甲状腺肿
D. 妊娠早期甲状腺肿
E. 青少年甲亢
正确答案：A 您选择的答案：

第18题 下列哪种药物可阻滞甲状腺球蛋白分解从而抑制甲状腺素的释放
A. 心得安
B. 丙基硫氧嘧啶
C. 他巴唑
D. 利血平
E. 碘剂
正确答案：E 您选择的答案：

第19题 原发性甲亢是指
A. 甲状腺肿大的同时，出现功能亢进症状
B. 在甲状腺肿的基础上继发功能亢进症状
C. 在结节性甲状腺肿的基础上并发功能亢进症状
D. 自主性甲状腺肿(高功能腺瘤)
E. 先出现甲状腺肿大，后出现甲亢症状
正确答案：A 您选择的答案：

第20题 单纯性甲状腺肿的治疗原则不正确的是
A. 生理性甲状腺肿宜多食含碘丰富的食物

- B. 不能使用甲状腺素治疗
 - C. 胸骨后甲状腺肿需手术切除
 - D. 结节性甲状腺肿需手术切除并明确病理性性
 - E. 结节性甲状腺肿继发功能亢进时手术是首选治疗方案
- 正确答案：B 您选择的答案：

第21题 关于甲状腺乳头状腺癌的特点

- A. 常见于男性
 - B. 多见于老年人
 - C. 分化程度低
 - D. 恶性程度高
 - E. 最主要为淋巴转移
- 正确答案：E 您选择的答案：

第22题 鉴别甲状腺单发结节为良性或恶性时，下述哪项最重要

- A. 详细的病史
 - B. 确切的体检
 - C. ¹³¹I同位素扫描
 - D. 同侧扪到肿大淋巴结
 - E. 穿刺细胞学检查
- 正确答案：E 您选择的答案：

第23题 鉴别甲状腺结节为良性或恶性中重要的是

- A. 典型的临床症状
 - B. 穿刺细胞学检查
 - C. 体格检查
 - D. ¹³¹I核素检查
 - E. 颈部CT检查
- 正确答案：B 您选择的答案：

第24题 原发性甲状腺功能亢进是指

- A. 甲状腺内有原发性单发的自主性高功能结节
 - B. 继发于结节性甲状腺肿的甲亢
 - C. 在甲状腺肿大的同时，出现功能亢进表现
 - D. 在结节性甲状腺肿的基础上并发功能亢进症状
 - E. 先出现甲状腺肿大，再出现甲亢症状
- 正确答案：C 您选择的答案：

第25题 有关甲状旁腺叙述正确的是

- A. 甲状旁腺除分泌甲状旁腺素外还分泌降钙素，两者共同调节血钙浓度
 - B. 甲状旁腺素和降钙素分泌都受下丘脑-垂体轴控制
 - C. 分泌甲状旁腺素主要调节体内钙的代谢
 - D. 甲状旁腺功能亢进除影响骨骼系统外，很少影响其他器官
 - E. 人体切除甲状旁腺后尿钙降低，尿磷增高
- 正确答案：C 您选择的答案：

第26题 甲状腺功能亢进的诊断主要依靠

- A. 典型的临床表现
 - B. 基础代谢率测定
 - C. 甲状腺摄¹³¹I率的测定
 - D. 血清中T₄和T₃含量测定
 - E. 活检
- 正确答案：A 您选择的答案：

第27题 有关甲状腺素的说法正确的是

- A. 甲状腺素分四碘甲状腺原氨酸(T₄)和三碘甲状腺原氨酸(T₃)两种
 - B. 释放入血的甲状腺素与体内甲状腺球蛋白结合
 - C. 甲状腺中90%为T₃，10%为T₄
 - D. 甲状腺素促进碳水化合物和脂肪分解，促进蛋白质合成
 - E. 甲状腺素作用于垂体细胞，通过负反馈机制抑制生长激素分泌
- 正确答案：A 您选择的答案：

第28题 甲状腺大部切除术，主要并发症中最危急的是

- A. 术后呼吸困难和窒息
 - B. 喉返神经损伤
 - C. 手足抽搐
 - D. 喉上神经损伤
 - E. 甲状腺危象
- 正确答案：A 您选择的答案：

第29题 甲状腺大部切除术并发症中最危急的是

- A. 术后呼吸困难和窒息
 - B. 喉返神经损伤
 - C. 手足抽搐
 - D. 喉上神经损伤
 - E. 甲状腺危象
- 正确答案：A 您选择的答案：

第30题 下列基础代谢率的计算公式最常用的是

- A. 基础代谢率 = 脉率 × 脉压 - 111

- B. 基础代谢率 = 脉率+脉压-111
C. 基础代谢率 = 脉率-脉压-111
D. 基础代谢率 = 111-脉压+脉率
E. 基础代谢率 = (脉率-脉压) × 111
正确答案：B 您选择的答案：

第31题 手术中发现甲状腺病变为单发实质性结节，最好做

- A 结节切除术
B 腺体大部切除术
C 全腺叶切除术
D 腺体大部切除加冰冻切片检查
E 颈部淋巴结清除术
正确答案：D 您选择的答案：

第32题 甲亢手术，预防术后并发甲状腺危象的关键是

- A 手术切除腺体适当
B 术中勿过多挤压甲状腺
C 术中止血彻底
D 术毕冲洗切口
E 基础代谢率降到正常范围再进行手术
正确答案：E 您选择的答案：

第33题 下列结节性甲状腺肿的手术适应证，哪一项是错误的

- A. 有压迫症状
B. 伴有甲亢
C. 疑有癌变
D. 病史较长者
E. 胸骨后甲状腺肿
正确答案：D 您选择的答案：

第34题 关于甲状腺结节的鉴别诊断，下列哪项是错误的？

- A. 儿童时期出现的甲状腺结节，50%为恶性
B. 年轻男性的单个结节要警惕恶性的可能
C. 过去甲状腺正常，突然发生结节，且短期发展较快，恶性的可能性大
D. 甲状腺扫描为“冷结节”者即可诊断为甲状腺癌
E. “热结节”常提示为高功能腺瘤，一般不恶变
正确答案：D 您选择的答案：

第35题 哪一种病理类型的甲状腺癌预后最差

- A 乳头状腺癌
B 滤泡状腺癌
C 未分化癌
D 髓样癌
E 甲状腺瘤恶变
正确答案：C 您选择的答案：

第36题 预后最差的甲状腺肿瘤是

- A. 甲状腺腺瘤恶变
B. 滤泡状腺癌
C. 未分化癌
D. 髓样癌
E. 乳头状腺癌
正确答案：C 您选择的答案：

第37题 不能列为甲状腺大部切除术适应证的是

- A 继发性甲亢或高功能腺瘤
B 中度以上的原发性甲亢
C 青少年甲亢患者
D 有压迫症状或胸骨后甲状腺肿伴甲亢
E 抗甲状腺药物或碘治疗复发者
正确答案：C 您选择的答案：

第38题 男性17岁，右侧甲状腺有单发冷结节，最好疗法是

- A 抗甲状腺药物
B 镇静药及碘剂
C 放射碘治疗
D 手术治疗
E 多吃海带紫菜
正确答案：D 您选择的答案：

第39题 原发性甲亢患者，行甲状腺大部切除后，12小时突然高热、烦躁、呕吐、脉速，可能是下列哪种原因引起

- A 吸入性肺炎
B 术后上感
C 术后严重反应
D 甲状腺危象
E 切口内出血
正确答案：D 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第40题 男性，45岁，家住山区，发现甲状腺结节10余年，近1年来颈部肿大明显，术中见双侧甲状腺各有2个结节，最可能的诊断是

- A．甲状腺多发腺瘤
- B．甲状腺瘤
- C．单纯性甲状腺肿
- D．结节性甲状腺肿
- E．甲状腺癌

正确答案：D 您选择的答案：

第41题 男性，40岁，家住山区，发现甲状腺结节20年，因逐渐增大影响呼吸而入院，术中见甲状腺右叶内一大结节，左叶内亦发现2个小结节，术中可诊断为

- A 甲状腺多发腺瘤
- B 结节性甲状腺肿
- C 甲状腺瘤
- D 单纯性甲状腺肿
- E 弥漫性甲状腺肿

正确答案：B 您选择的答案：

第42题 巨大甲状腺肿患者，气管插管全麻下手术，历时7小时，术后16小时发现患者烦躁不安，唇发绀，不能说话，呼吸极度困难，脉搏130次/分，血压21.3/13.3kPa(160/100mmHg)，检查切口无肿胀，引流管内仅少许陈旧性血液，此患者的手术并发症是

- A 甲状腺危象
- B 双侧喉上神经损伤
- C 出血致气管受压
- D 喉头水肿
- E 双侧喉返神经损伤

正确答案：E 您选择的答案：

第43题 女性，18岁，甲状腺弥漫性肿大，无突眼，甲状腺摄碘试验：2小时25%，24小时50%。清晨空腹测定脉搏70次/分，血压16/10kPa(120/80mmHg)，SPECT检查甲状腺无结节，最可能的诊断是

- A 甲状腺功能减退
- B 甲状腺功能亢进
- C 甲状腺炎
- D 单纯性甲状腺肿
- E 结节性甲状腺炎

正确答案：D 您选择的答案：

第44题 女性，23岁，甲状腺弥漫性肿大，无突眼，甲状腺摄碘试验：2小时25%，24小时50%。清晨空腹时脉搏80次/分，血压120/80mmHg(16/10kPa)，SPECT检查甲状腺无结节，最可能的诊断是

- A．甲状腺炎
- B．原发性甲状腺功能亢进
- C．甲状腺功能减退
- D．结节性甲状腺肿
- E．单纯性甲状腺肿

正确答案：E 您选择的答案：

第45题 女，18岁，甲状腺弥漫性肿大，无突眼。甲状腺摄¹³¹I试验：2小时25%，24小时50%。清晨空腹测定脉搏80次/分，血压120/80mmHg，SPECT检查甲状腺无结节。最可能的诊断是：

- A．甲状腺功能减退
- B．甲状腺功能亢进
- C．甲状腺炎
- D．单纯性甲状腺肿
- E．结节性甲状腺肿

正确答案：D 您选择的答案：

第46题 男性，19岁，诊断弥漫性单纯性甲状腺肿2年，其治疗方案应选择

- A．手术治疗
- B．口服碘液治疗
- C．¹³¹I核素治疗
- D．口服抗甲状腺药物
- E．小剂量甲状腺素治疗

正确答案：E 您选择的答案：

第47题 女性，28岁，因左侧甲状腺结节行左侧甲状腺大部分切除术，5天后病理结果显示为甲状腺癌，患者进一步治疗应选择

- A．静脉化疗
- B．行放射性外照射治疗
- C．行放射性碘治疗
- D．再次手术，切除患侧全部甲状腺
- E．再次手术，行患侧全切、峡部切除及对侧大部切除

正确答案：E 您选择的答案：

第48题 女性，35岁，左颈部颈锁乳突肌前缘可扪及2个结节，光滑，质硬，为明确诊断应给予

- A．颈部超声波
- B．颈部CT
- C．颈部血管造影
- D．细针穿刺或切开活组织病理检查
- E．颈部MRI

正确答案：D 您选择的答案：

第49题 女性，38岁，无意中发现左颈部肿块10天，光滑、无压痛，近3天来肿块增大明显，伴有胀痛，核素检查显示为左甲状腺“冷结节”，初步诊断考虑为

- A．单纯性甲状腺肿
- B．结节性甲状腺肿
- C．甲状腺乳头状囊性腺瘤并囊内出血
- D．甲状腺腺瘤
- E．甲状腺癌

正确答案：C 您选择的答案：

第50题 男性，40岁，因原发性甲状腺功能亢进行甲状腺大部切除术后3天，突发手足疼痛，持续痉挛，呼吸困难，其处理应立即行

- A．静脉推注肌肉松弛剂
- B．气管切开
- C．口服复方碘化钾溶液5ml
- D．静脉推注10%氯化钙15ml
- E．静脉滴注普萘洛尔5mg

正确答案：D 您选择的答案：

第51题 女性，35岁，甲状腺弥漫性肿大，同时伴有心悸，食欲亢进、消瘦，多汗、易激动，诊断最可能的是

- A．原发性甲状腺功能亢进
- B．继发性甲状腺功能亢进
- C．甲状腺高功能腺瘤
- D．单纯性甲状腺肿
- E．甲状腺腺瘤

正确答案：A 您选择的答案：

第52题 女性，35岁，因甲状腺肿块在当地行甲状腺肿块切除术后5天，病理学诊断为甲状腺乳头状腺癌 级，对该患者的进一步处理是

- A 终生服用甲状腺素片
- B 行放射性外照射
- C 行放射性碘治疗
- D 再次手术，行患侧全切及对侧全切
- E 再次手术，行患侧全切、峡部切除及对侧大部切除

正确答案：E 您选择的答案：

第53题 男性，31岁，因甲亢行甲状腺次全切除术，术后第2天，饮水时发生误咽，继出现声调降低，但无声音嘶哑，下列最可能的是

- A．喉上神经内外支损伤
- B．一侧喉上神经内侧支损伤
- C．一侧喉上神经外侧支损伤
- D．喉返神经损伤
- E．喉头水肿

正确答案：A 您选择的答案：

第54题 女性，30岁，甲状腺大部切除术后半日，突发高热，体温39℃，脉搏130次/分，烦躁、谵妄、呕吐、水泄，考虑甲状腺危象，下列治疗不正确的是

- A．控制病情，待病情平稳后再次手术切除多余甲状腺组织
- B．肾上腺能阻滞剂如利血平肌注
- C．口服复方碘化钾溶液
- D．氯化钾的松静脉滴注，拮抗过多甲状腺素
- E．静脉输注大量葡萄糖溶液补充能量

正确答案：A 您选择的答案：

第55题 男性，28岁，发现颈部肿块2天就诊，体检右颈部扪及3cm×4cm肿块，质硬，随吞咽上下移动，右侧胸锁乳突肌前缘扪及2个肿大淋巴结，首先考虑的诊断是

- A．慢性淋巴结炎
- B．颈部转移性肿瘤
- C．甲状腺腺瘤
- D．甲状腺癌
- E．恶性淋巴瘤

正确答案：D 您选择的答案：

第56题 女，25岁，无意中发现甲状腺肿块7天，近3天来肿块迅速增大，伴有胀痛。甲状腺ECT检查：甲状腺右叶“冷结节”。应初步诊断为：

- A．单纯性甲状腺肿
- B．结节性甲状腺肿
- C．甲状腺腺瘤
- D．甲状腺癌
- E．甲状腺囊腺瘤并囊内出血

正确答案：E 您选择的答案：

第57题 女性，30岁，颈前肿块多年，近1个月来，肿块生长迅速，并出现声音嘶哑，颈前可触及2cm×3cm肿块，质地较硬，表面欠光滑。诊断首先考虑

- A．甲状舌骨囊肿
- B．结节性甲状腺肿单发结节
- C．甲状腺腺瘤囊内出血
- D．甲状腺癌
- E．慢性甲状腺炎

正确答案：D 您选择的答案：

第58题 女性，18岁，诊断为弥漫性甲状腺肿，其治疗方案是

- A 手术
- B ¹³¹I 碘治疗
- C 服碘
- D 服小剂量甲状腺素
- E 服用抗甲状腺药物

正确答案：D 您选择的答案：

第59题 女性，16岁，1个月前出现食量明显增加，不到就餐时间便出现饥饿，近来经常与同学争吵，检查发现右侧甲状腺部有一直径2cm结节，SPECT检查报告为热结节，另一有诊断意义的检查是

- A 心电图检查
- B 糖测定
- C FT₃，FT₄，TSH测定
- D 血脂检查
- E TGA，MCA测定

正确答案：C 您选择的答案：

第60题 女性，56岁，洗澡时无意发现一颈部肿物来就诊，诉曾有腹泻、心慌、抽搐等症状，但未在意，体检颜面潮红，实验室检查血钙较低，该患者可能患有

- A 甲状腺乳头状腺癌
- B 甲状腺髓样癌
- C 甲状腺滤泡状腺癌
- D 甲状腺未分化癌
- E 以上都不对

正确答案：B 您选择的答案：

第61题 女性，20岁，颈前区中线甲状软骨下方可扪及2cm直径大小肿块，¹³¹I扫描示冷结节，^{99m}Tc甲状腺显影示冷结节处仍无放射性物质浓聚，B超示该肿块为实质性。可诊断为

- A 颈淋巴结炎
- B 颈下皮样囊肿
- C 甲状腺腺瘤
- D 甲状腺舌管囊肿
- E 囊状淋巴管瘤

正确答案：C 您选择的答案：

第62题 女性，25岁，诊断为原发性甲状腺功能亢进，基础代谢率+25%，治疗应选择

- A 切除单侧甲状腺
- B 甲状腺大部分切除
- C ¹³¹I 核素治疗
- D 碘剂治疗
- E 抗甲状腺药物治疗

正确答案：E 您选择的答案：

第63题 男性，33岁，甲状腺大部切除术后近1天，严重呼吸困难，不能发音，唇发绀，脉搏120次/分，血压160/100mmHg(21.3/13.3kPa)，切口无肿胀，引流管少许陈旧血液，最可能是哪种手术并发症

- A 喉头水肿
- B 损伤双侧喉返神经
- C 致气管受压迫
- D 损伤喉上神经
- E 甲状腺危象

正确答案：B 您选择的答案：

第64题 男性，20岁，被他人发现颈部肿块2天而来就诊，体格检查，发现气管右侧可扪及一结节，质硬，可随吞咽上下移动，同侧胸锁乳突肌前缘可扪及2个肿大淋巴结，首先考虑的诊断是

- A 颈淋巴结炎
- B 颈淋巴结核
- C 恶性淋巴瘤
- D 甲状腺腺瘤
- E 甲状腺癌

正确答案：E 您选择的答案：

第65题 男性，28岁，无意中发现甲状腺肿块15天，近3天来似有增大，“^{99m}Tc扫描示“冷结节”，^{99m}Tc甲状腺扫描示冷结节处有放射性浓聚，甲状腺B超结果为实质性肿块，最可能的诊断是

- A 单纯性甲状腺肿
- B 青春期甲状腺肿
- C 甲状腺腺瘤并囊内出血
- D 结节性甲状腺肿
- E 甲状腺癌

正确答案：E 您选择的答案：

第66题 女性，25岁，无意中发现甲状腺肿块7天，近3天肿块迅速增长，伴有胀痛，甲状腺SPECT检查甲状腺右叶冷结节，应初步诊断为

- A 单纯性甲状腺肿
- B 结节性甲状腺肿
- C 甲状腺腺瘤
- D 甲状腺癌
- E 甲状腺囊腺瘤并囊内出血

正确答案：E 您选择的答案：

第67题 女性，35岁，1周前，曾因咳嗽，低热就诊，诊断为上呼吸道感染，近两天来发现颈部疼痛，波及到耳颞枕部，查体：甲状腺弥漫性肿大，质硬，压痛，体温38℃，ESR 20mm/h，BMR+20%，碘吸收率2小时5%，24小时20%，甲状腺穿刺可见白细胞浸润和吞有胶体颗粒的巨细胞，此患者的诊断

- A 轻度甲亢
- B 结节性甲状腺肿
- C 单纯性甲状腺肿
- D 亚急性甲状腺炎
- E 慢性淋巴细胞性甲状腺炎

正确答案：D 您选择的答案：

第68题 因巨大结节性甲状腺肿并发甲亢行双侧甲状腺大部切除术，第3天清晨，患者突然发生手足疼痛，持续性痉挛，且呼吸困难，其处理应立即

- A 肌注安定10mg
- B 气管切开
- C 口服AT 10 10滴
- D 口服葡萄糖酸钙片3g
- E 静注10%氯化钙15ml

正确答案：E 您选择的答案：

第69题 女性，21岁，左颈部扪及2cm直径大小肿块，131I扫描显示“温结节”⁷⁵Se(硒)甲状腺显影示结节无放射性浓聚，B超示肿块为实质性。诊断为

- A 甲状腺癌
- B 甲状腺腺瘤
- C 颈部淋巴结炎
- D 甲状腺舌管囊肿
- E 囊状淋巴管瘤

正确答案：B 您选择的答案：

第70题 女性，27岁，发现甲状腺结节3个月，近1个月来出现Homer综合征，喉镜检查发现右侧声带麻痹。最可能的诊断是

- A 重度甲亢
- B 甲状腺瘤并囊内出血
- C 结节性甲状腺肿恶变
- D 桥本甲状腺肿
- E 甲状腺癌

正确答案：E 您选择的答案：

第71题 女性，26岁，首次妊娠2个月余伴甲亢，体格检查：甲状腺肿大，有轻度压迫症状，最合适的治疗应采取

- A 抗甲状腺药物治疗
- B 手术(甲状腺大部切除)治疗
- C 终止妊娠加手术治疗
- D 终止妊娠加抗甲状腺药物治疗
- E 终止妊娠加¹³¹I治疗

正确答案：B 您选择的答案：

三、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第72-74题

女性，45岁，诊断为巨大结节性甲状腺肿，在颈丛麻醉下行一侧甲状腺全切，另一侧甲状腺大部切除术，术后第2天突然发生窒息，面肌和手足持续性痉挛

1. 此时首要的处理是

- A 检查引流管通畅与否
- B 拆除颈部切口缝线，检查有否积血
- C 气管切开
- D 立即静脉注射10%氯化钙20ml
- E 立即喉镜检查

2. 进一步的检查是

- A 抽血查血清钙、磷浓度
- B 抽血查T₃、T₄
- C 抽血查血糖
- D 抽血进行血气分析
- E 抽血查肝功能

3. 预防此种并发症的关键是

- A 结扎、切断甲状腺上动脉应紧贴甲状腺上极
- B 结扎甲状腺下动脉要靠近颈总动脉
- C 保留腺体要适当
- D 术中常规作气管切开
- E 必须保存两叶腺体背面部分

正确答案：DAE 您选择的答案：

第75-76题

女性，35岁，颈部增粗，伴失眠，易激动，食欲亢进半年，查体：甲状腺弥漫性肿大，眼球突出，脉搏100次/分，血压130/80mmHg，CT示胸骨后甲状腺肿

1. 为明确诊断抽血测T₃、T₄和TSH，预计下列哪项检查结果，与病情最为相符

- A T₃略增高，T₄显著增高，TSH增高

B T3显著增高，T4略为增高，TSH增高
 C T3略增高，T4显著增高，TSH降低
 D T3显著增高，T4略为增高，TSH降低
 E T3、T4和TSH均显著增高
 2. 该患者首选的治疗方法是
 A 131I 碘治疗
 B 用心得安治疗
 C 甲状腺大部切除术
 D 抗甲状腺药物治疗
 E 多吃含碘丰富的食物，如海带、紫菜
 正确答案：DC 您选择的答案：

第77-79题

一女性患者，诊断为巨大结节性甲状腺肿，在颈丛麻醉下行一侧甲状腺全切，一侧甲状腺次全切除术，术后第2天突然发生窒息，手足持续痉挛

1. 此时首要的操作是
 A. 检查引流管通畅与否
 B. 拆除颈部伤口缝线，检查有无积血
 C. 气管切开
 D. 立即静脉注射10%氯化钙20ml
 E. 立即作喉镜检查
 2. 进一步的检查是
 A. 抽血查血清钙、磷浓度
 B. 抽血查T3、T4
 C. 抽血查血糖
 D. 抽血进行血气分析
 E. 抽血查肝功能
 3. 预防此种并发症发生的关键是
 A. 结扎、切断甲状腺上动脉应紧贴甲状腺极
 B. 结扎甲状腺下动脉要靠近颈总动脉
 C. 保留腺体要适当
 D. 术中常规作气管切开
 E. 必须保存两叶腺体背面部分
 正确答案：DAE 您选择的答案：

第80-81题

女性，38岁，右颈部肿块3年余，近1周增大迅速，胀痛。体检甲状腺左叶上极4cm×3cm椭圆形结节，稍硬，表面光滑，压痛，随吞咽上下活动。

1. 最可能的诊断为
 A. 甲状腺癌
 B. 甲状腺乳头状囊性腺瘤伴囊内出血
 C. 急性甲状腺炎
 D. 单纯性甲状腺
 E. 结节性甲状腺肿
 2. 最恰当的处理为
 A. 包括肿瘤的患侧甲状腺大部切除术，标本送病理学检查
 B. 行患侧全切、峡部切除及对侧大部切除
 C. 行患侧全切、峡部切除及对侧大部切除加颈部淋巴结清扫
 D. 口服复方碘化钾溶液，使甲状腺充血减少，因而变硬缩小
 E. 131I 核素治疗
 正确答案：BA 您选择的答案：

第82-83题

男性，40岁，发现左颈部肿块半年，近1个月来自觉肿块生长变快，体检见甲状腺内肿块质地较硬而固定，表面不平。

1. 诊断考虑为
 A. 甲状腺癌
 B. 单纯性甲状腺肿
 C. 结节性甲状腺肿
 D. 甲状腺腺瘤
 E. 甲状腺囊肿
 2. 对明确诊断最有价值的检查为
 A. 颈部超声波
 B. 颈部CT
 C. 颈部MRI
 D. 细针穿刺细胞学检查
 E. 颈部X线平片
 正确答案：AD 您选择的答案：

第84-86题

男性，30岁，右侧甲状腺单发结节，质硬，生长迅速，近一周伴声音嘶哑，ECT示右甲状腺冷结节

1. 为明确诊断下列哪项检查最有意义
 A 确切的体检
 B 颈部X线摄片
 C 穿刺细胞学检查
 D 甲状腺B超
 E 甲状腺CT
 2. 如未能确诊，拟行手术，应采用何种术式
 A 结节切除术
 B 患侧腺体全切

- C 颈部淋巴结清除术
 D 患侧腺体大部切除加冰冻切片检查
 E 患侧全切，峡部切除，对侧大部切除
 3. 如病理报告为甲状腺乳头状癌，又无远处转移表现应采用何种术式
 A 患侧全切加颈淋巴结清除
 B 患侧全切，峡部切除，对侧大部切除
 C 双侧甲状腺全部切除
 D 患侧腺体大部切除，峡部切除
 E 患侧腺体大部切除加颈淋巴结清除
 正确答案：CDB 您选择的答案：

第87-89题

女性，45岁，甲状腺肿大20余年，近1年来出现性情急躁、消瘦、心悸、多汗，体检见双侧甲状腺呈结节性肿大，两侧不对称，无眼球突出，基础代谢率测定增高至+40%。

1. 诊断考虑为
 A. 原发性甲状腺功能亢进
 B. 继发性甲状腺功能亢进
 C. 甲状腺多发性腺瘤
 D. 甲状腺癌
 E. 甲状腺囊肿
 2. 该患者甲状腺功能评估为
 A. 甲状腺功能减退
 B. 甲状腺功能正常
 C. 轻度甲状腺功能亢进
 D. 中度甲状腺功能亢进
 E. 重度甲状腺功能亢进
 3. 最常用而有效的治疗办法是
 A. 甲状腺大部切除术
 B. 口服小剂量甲状腺素
 C. 口服复方碘溶液
 D. ¹³¹I 核素治疗
 E. 口服他巴唑
 正确答案：BDA 您选择的答案：

第90-91题

女性，40岁，左颈部肿块半年，未扪及肿大淋巴结，细针穿刺细胞学检查显示乳头状癌。

1. 关于乳头状癌的说法正确的是
 A. 肿瘤生长快且有侵犯血管倾向
 B. 淋巴结转移少见
 C. 恶性程度低，80%肿瘤为多中心性
 D. 高度恶性，预后很差
 E. 来源于滤泡旁降钙素分泌细胞(C细胞)
 2. 治疗方案应选择
 A. 切除左侧甲状腺、峡部、右侧腺体大部 + 双侧颈部淋巴结清扫
 B. 切除左侧甲状腺、峡部、右侧腺体大部 + 双侧颈部淋巴结清扫 + 切除左侧甲状腺、峡部、右侧腺体大部
 C. 放射性碘内照射
 D. 外放射治疗
 E. 化疗
 正确答案：CB 您选择的答案：

第92-94题

男性，46岁，因甲状腺功能亢进行甲状腺大部切除术，手术经过顺利，术后第二天，患者诉口唇周围及双手阵发性针刺感。

1. 该患者可能的并发症是
 A. 喉上神经损伤
 B. 喉返神经损伤
 C. 甲状旁腺损伤
 D. 甲状腺危象前兆
 E. 甲状腺危象
 2. 应如何处理
 A. 口服一些营养神经的药物
 B. 进行物理治疗
 C. 口服碘剂，静脉滴注氢化可的松
 D. 适当限制肉类、乳品及蛋类等食品的摄入并口服葡萄糖酸钙
 E. 以上均可
 3. 预防此种并发症的关键是
 A. 充分术前准备，控制基础代谢率在正常范围
 B. 必须保存两叶腺体背面部分
 C. 结扎、切断甲状腺上动脉应紧贴甲状腺上极
 D. 结扎甲状腺下动脉要靠近颈总动脉
 E. 术中尽量保存甲状腺组织
 正确答案：CDB 您选择的答案：

四、A4型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第95-99题

男性，31岁，右侧甲状腺单发结节3个月，生长较快，近1周出现声音嘶哑，ECT检查显示右侧甲状腺“冷结节”。

1. 最可能的诊断是
 A. 甲状腺腺瘤
 B. 甲状腺腺瘤伴囊内出血

- C. 甲状腺癌
D. 结节性甲状腺肿
E. 甲状腺囊肿
2. 对明确诊断意义最大的检查是
A. 确切的体格检查
B. 颈部X线平片检查
C. 穿刺细胞学检查
D. 甲状腺B超
E. 甲状腺CT
3. 如未能确诊，拟行手术，应采用何种术式
A. 结节切除术
B. 患侧腺体全切
C. 颈部淋巴结清扫
D. 患侧腺体大部切，除加冰冻切片检查
E. 患侧全切，峡部切除，对侧大部切除
4. 如穿刺细胞学检查显示结节为乳头状腺癌，体检发现右侧胸锁乳突肌前缘可扪及2个肿大淋巴结，治疗方案宜选择
A. 切除右侧甲状腺、峡部、左侧腺体大部
B. 切除右侧甲状腺、峡部、左侧腺体大部 + 右侧 + 颈部淋巴结清扫
C. 切除右侧甲状腺、峡部、左侧腺体大部 + 双侧颈部淋巴结清扫
D. 甲状腺全切 + 双侧颈部淋巴结清扫
E. 甲状腺全切 + 术后放射性碘内照射
5. 如穿刺结果显示结节为未分化癌，通常选择的治疗方案为
A. 切除右侧甲状腺、峡部、左，侧腺体大部 + 右侧颈部淋巴结清扫
B. 切除右侧甲状腺、峡部、左侧腺体大部 + 右侧颈部淋巴结清扫
C. 甲状腺全切 + 术后放射性碘内照射
D. 放射性碘内照射
E. 外放射治疗
- 正确答案：CCDBE 您选择的答案：

第100-103题

女性，40岁，颈部增粗，伴食欲亢进、消瘦，易激动。体检：甲状腺弥漫性肿大，眼球突出，脉搏110次/分，血压130/80mmHg，CT显示胸骨后甲状腺肿。

1. 根据脉压和脉率计算，可判断甲状腺功能为
A. 正常
B. 轻度甲状腺功能亢进
C. 中度甲状腺功能亢进
D. 重度甲状腺功能亢进
E. 甲状腺功能减退
2. 预计化验结果与病情最相符的是
A. T3显著增高、T4略增高，TSH增高
B. T3、T4皆显著增高，TSH降低
C. T3显著增高、T4略增高，TSH降低
D. T3略增高，T4显著增高，TSH降低
E. T3略增高，T4显著增高，TSH增高
3. 甲状腺摄¹³¹I试验发现除颈部有核素浓聚外，胸骨后亦有核素浓聚，该患者治疗首选
A. 放射性碘内照射
B. 口服复方碘化钾溶液
C. 口服抗甲状腺药物
D. 甲状腺大部切除
E. 胸骨后甲状腺切除 + 颈部甲状腺大部切除
4. 若患者术后半日出现呼吸困难、发绀、烦躁，体检颈部肿胀，沿引流皮片有较多鲜红血液，处理为
A. 立即气管切开
B. 剪开缝线，敞开切口，迅速去除血肿
C. 限制高磷食物，静脉推注氯化钙10ml
D. 使用肾上腺素能阻滞药物
E. 口服复方碘化钾溶液
- 正确答案：CCEB 您选择的答案：

五、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第104-108题

- A. 面肌、手足抽搐
B. 高热、脉快、烦躁、谵妄、大汗、呕吐、水泻
C. 声嘶，严重者失音、呼吸困难
D. 音调降低或饮水时呛咳
E. 呼吸困难、烦躁、发绀，甚至窒息
1. 切口出血、喉头水肿或气管塌陷可出现
2. 喉返神经损伤引起
3. 喉上神经损伤引起
4. 损伤甲状旁腺或其血供导致
5. 甲状腺危象表现为
- 正确答案：ECDAB 您选择的答案：

第109-112题

- A. 硫脲类
B. 复方碘溶液
C. 放射性碘
D. 普萘洛尔

- E. 地高辛
1. 抑制蛋白水解酶
2. 减少甲状腺血流，使腺体缩小变硬
3. 阻断靶器官对儿茶酚胺的敏感性
4. 使甲状腺腺上皮破坏

正确答案：BBDC 您选择的答案：

第113-114题

- A. 甲状腺炎
B. 结节性毒性甲状腺肿
C. 弥漫性毒性甲状腺肿
D. 甲状腺癌
E. 甲状腺腺样囊肿

1. 女性，55岁，颈前区偶然发现一质硬、固定的无痛性肿块，应诊断为
2. 女性，50岁，颈前弥漫性肿大，不伴其他症状10年，近年来感心悸、多食、易怒，颈前可及数个结节，随吞咽上下活动，应考虑为

正确答案：DB 您选择的答案：

第115-118题

- A. 自身免疫性疾病
B. 病毒感染
C. 细菌感染
D. 血钙降低
E. 碘缺乏

1. 亚急性甲状腺炎可能是由于
2. 甲状腺髓样癌可能出现
3. 原发性甲状腺功能亢进是
4. 单纯性甲状腺肿是由于

正确答案：BDAE 您选择的答案：

第119-123题

- A. 乳头状癌
B. 滤泡状腺癌
C. 未分化癌
D. 髓样癌
E. 甲状腺腺瘤

1. 恶性程度高，预后差的是
2. 来源于滤泡旁降钙素分泌细胞的为
3. 多见，恶性程度低，肿瘤多为多中心性的是
4. 远处转移早，一般不采用手术治疗的是
5. 良性肿瘤，有恶变可能的是

正确答案：CDACE 您选择的答案：

第124-125题

- A. 甲状腺危象
B. 喉返神经损伤
C. 喉上神经外支损伤
D. 喉上神经内支损伤
E. 术后出血窒息

1. 甲状腺术后出现进行性呼吸困难、烦躁的主要原因是
2. 甲状腺术后出现误咽的可能原因是

正确答案：ED 您选择的答案：

习题集 外科学 直肠肛管疾病

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 肛瘘多由肛门部哪种手术引起

- A．环状内痔切除术
- B．内痔切除术
- C．外痔切除术
- D．肛周脓肿切开(或破溃)
- E．内痔注射疗法

正确答案：D 您选择的答案：

第2题 肛裂最常发生的部位是截石位

- A．12点处
- B．3点处
- C．6点处
- D．9点处
- E．10点处

正确答案：C 您选择的答案：

第3题 关于痔的治疗，哪项是错误的

- A 单纯内痔可用注射疗法
- B 二期内痔可用单纯结扎法治疗
- C 嵌顿内痔可先做湿敷再复位
- D 环状内痔可行环形切除术
- E 外痔可用枯痔钉疗法

正确答案：E 您选择的答案：

第4题 关于肛裂，下列哪一项是错误的

- A 肛裂是肛管皮肤全层裂开并形成慢性溃疡
- B 肛裂是肛管皮肤浅层裂开
- C 肛裂可继发于肛窦炎
- D 肛裂主要因粪便干燥，用力过猛
- E 肛管括约肌痉挛致溃疡不易愈合

正确答案：B 您选择的答案：

第5题 Miles手术适应证是

- A．肿瘤下缘距肛门10cm以上
- B．下缘距肛门5～10cm
- C．肿瘤直径3cm以内
- D．肿瘤下缘距肛门5cm以内
- E．肿瘤直径5cm以上

正确答案：D 您选择的答案：

第6题 肛裂的临床症状为

- A 脓血便，疼痛，肛门痉挛
- B 疼痛，便秘，出血
- C 里急后重，疼痛
- D 肛门持续痉挛，大量出血
- E 肛门烧灼痛，黑便，便秘

正确答案：B 您选择的答案：

第7题 内痔排便时痔块脱出肛门外，排便后自行还纳，属于

- A．第一期
- B．第二期
- C．第三期
- D．第四期
- E．第五期

正确答案：B 您选择的答案：

第8题 不常用的直肠肛管检查体位是

- A．弯腰前俯位
- B．截石位
- C．蹲位
- D．右侧卧位
- E．膝胸位

正确答案：D 您选择的答案：

第9题 肛瘘手术治疗中，最重要的是

- A 麻醉充分
- B 肛管括约肌松弛
- C 找出外口
- D 明确瘘管与括约肌关系
- E 手术后呈“V”型创面

正确答案：D 您选择的答案：

第10题 直肠肛管的生理功能是

- A 单纯排便

B 吸收少量钠离子及排便
C 吸收多量液体及排便
D 吸收少量钾离子及排便
E 排便及吸收少量液体
正确答案：E 您选择的答案：

第11题 肛管的括约肌功能主要依靠哪种结构的作用
A 外括约肌的深部
B 内括约肌
C 肛提肌
D 肛管直肠环
E 外括约肌皮下部
正确答案：D 您选择的答案：

第12题 直肠长度大约
A . 4 ~ 8cm
B . 8 ~ 12cm
C . 12 ~ 15cm
D . 8 ~ 15cm
E . 16 ~ 20cm
正确答案：C 您选择的答案：

第13题 内痔早期的常见症状是
A . 无痛性间歇性便后出鲜血
B . 排便疼痛
C . 痔块脱出
D . 瘙痒
E . 黏液脓血便
正确答案：A 您选择的答案：

第14题 肛裂最突出的表现是
A 排便时和便后肛门剧烈疼痛
B 经常便秘
C 排便时粪便表面有血迹
D 便后鲜血滴出
E 肛门瘙痒
正确答案：A 您选择的答案：

第15题 肛瘻的类型颇多，其中常见者为
A 全外瘻
B 单口外瘻
C 复杂性内外瘻
D 单纯性内外瘻
E 单口内瘻
正确答案：D 您选择的答案：

第16题 直肠癌主要的转移途径是
A . 种植转移
B . 淋巴转移
C . 血行转移
D . 直接浸润
E . 以上都不对
正确答案：B 您选择的答案：

第17题 直肠肛管交界的齿线在临床上的重要性是
A 齿线上的直肠有神经反射弧
B 齿线上的直肠易受感染
C 齿线上下血液供应、神经、淋巴引流各异
D 齿线、肛管容易受伤
E 齿线以下是外括约肌所在部位
正确答案：C 您选择的答案：

第18题 直肠黏膜呈现8 ~ 10个隆起的纵行皱壁称为
A . 肛环
B . 肛柱
C . 肛瓣
D . 肛囊
E . 肛乳头
正确答案：B 您选择的答案：

第19题 对发现直肠癌意义最大的检查是
A . 大便潜血检查
B . 直肠指检
C . 内镜检查
D . 脱落细胞学检查
E . 肿瘤标记物
正确答案：B 您选择的答案：

第20题 内痔的常见早期症状是
A 肛门疼痛

- B 大便时滴血
- C 痔核脱出
- D 粘液血便
- E 肛门周围红肿

正确答案：B 您选择的答案：

第21题 肛瘻治疗的最佳方法是

- A 1:5000高锰酸钾温水坐浴
- B 挂线疗法
- C 局部换药治疗
- D 瘻道搔爬
- E 使用抗菌药物

正确答案：B 您选择的答案：

第22题 肛管和直肠的长度为

- A 8~14cm
- B 15~18cm
- C 19~24cm
- D 25~28cm
- E 29~33cm

正确答案：B 您选择的答案：

第23题 肛瘻多由肛门部位哪种手术引起

- A 内痔注射疗法
- B 肛裂切除术
- C 血栓性外痔切开取栓术
- D 肛周脓肿切开(或穿破)
- E 内痔环切术

正确答案：D 您选择的答案：

第24题 关于齿状线解剖的叙述正确的是

- A 齿状线以上是黏膜，以下为皮肤
- B 齿状线以上由直肠上、下动脉供应，以下属肛管动脉供应
- C 齿状线以上是通过直肠上静脉回流至门静脉，以下通过肛门静脉回流至腔静脉
- D 齿状线以上的淋巴流入腹主动脉旁或髂内淋巴结，以下入腹股沟淋巴结及髂外淋巴结
- E 齿状线以上受阴部内神经支配，以下受阴部外神经支配

正确答案：E 您选择的答案：

第25题 坐骨直肠间隙脓肿早期切开引流指征

- A 体温升高
- B 白细胞数升高
- C 局部有波动
- D 局部发红，触痛明显
- E 伴有排尿困难

正确答案：C 您选择的答案：

第26题 肛管直肠周围间隙有几个

- A 2
- B 3
- C 4
- D 5
- E 7

正确答案：E 您选择的答案：

第27题 对便血的病人最重要的检查是

- A 大便潜血试验
- B 纤维结肠镜检查
- C 直肠指诊
- D 癌胚抗原检查
- E 钡灌肠检查

正确答案：C 您选择的答案：

第28题 下列哪种疾病不宜作肛门指诊

- A 内痔
- B 肛裂
- C 直肠癌
- D 肛瘻
- E 直肠息肉

正确答案：B 您选择的答案：

第29题 不会发生癌变的直肠息肉是

- A 管状腺瘤
- B 绒毛状腺瘤
- C 混合性息肉
- D 幼年型息肉
- E 家族性腺瘤性息肉病

正确答案：D 您选择的答案：

第30题 肛裂最突出的表现是

- A 排便时粪便表面带血

B. 里急后重
C. 排便时和排便后肛门剧烈疼痛
D. 脓血便、疼痛、肛门痉挛
E. 经常便秘
正确答案：C 您选择的答案：

第31题 肛裂“三联征”是指
A. 疼痛、便秘、前哨痔
B. 疼痛、便秘、出血
C. 肛裂、前哨痔、乳头肥大
D. 疼痛、便秘、粘液脓血便
E. 肛裂、出血、前哨痔
正确答案：C 您选择的答案：

第32题 肛管直肠周围脓肿常继发于
A. 肛裂
B. 肛痿
C. 肛窦炎
D. 直肠息肉继发感染
E. 嵌顿性内痔
正确答案：C 您选择的答案：

第33题 混合痔是指
A. 痔与痿同时存在
B. 两个以上内痔
C. 直肠上下静脉丛彼此相通所形成的痔
D. 内痔与外痔分别在不同位置存在
E. 内痔多发，遍置一周
正确答案：C 您选择的答案：

第34题 肛管直肠周围脓肿常继发于
A. 肛裂
B. 肛痿
C. 嵌顿性内痔
D. 肛窦炎
E. 直肠息肉继发感染
正确答案：D 您选择的答案：

第35题 直肠肛管的检查体位中哪个是不常用的
A. 胸膝位
B. 截石位
C. 蹲位
D. 右侧卧位
E. 左侧卧位
正确答案：D 您选择的答案：

第36题 肛裂常发生在肛管的
A. 前正中位
B. 后正中位
C. 左侧
D. 右前位
E. 右后位
正确答案：B 您选择的答案：

第37题 肛管直肠周围脓肿最多见的是
A. 肛门旁皮下脓肿
B. 坐骨肛管间隙脓肿
C. 直肠后间隙脓肿
D. 骨盆直肠间隙脓肿
E. 直肠粘膜下脓肿
正确答案：A 您选择的答案：

第38题 直肠镜、乙状结肠镜、纤维光束结肠镜检查最危险的并发症是
A. 肛门撕裂引起大便失禁
B. 引起直肠大出血
C. 交叉感染及癌细胞种植性转移
D. 引起直肠穿破
E. 引起内痔出血
正确答案：D 您选择的答案：

第39题 混合痔是指
A. 2个以上内痔
B. 2个以上外痔
C. 内外痔同时存在
D. 内痔多发，形成环状痔
E. 直肠上下静脉丛彼此相通形成的痔
正确答案：E 您选择的答案：

第40题 关于直肠肛管的解剖，下列哪一项是错误的
A. 齿线以上是粘膜，以下是皮肤

- B. 齿线以上由直肠上、下动脉供应
 - C. 齿线以下的静脉丛属直肠下静脉丛
 - D. 齿线以下的淋巴回流到腹股沟淋巴结
 - E. 齿线以上的直肠粘膜受阴部内神经支配
- 正确答案：E 您选择的答案：

第41题 大便时和便后肛门剧痛并带少量鲜血的病有

- A 肛管直肠周围脓肿
- B 直肠息肉
- C 肛裂
- D 混合痔
- E 血栓性外痔

正确答案：C 您选择的答案：

第42题 确诊直肠癌最可靠的办法是

- A. 直肠指诊
- B. 便常规检查
- C. 大便脱落细胞学检查
- D. 活体组织病理学检查
- E. 气钡直肠造影检查

正确答案：D 您选择的答案：

第43题 肛瘘手术中影响手术效果的关键步骤在于

- A 要广泛切除瘘管周围瘢痕组织
- B 切除瘘管后应一期缝合
- C 正确找出内口，据与括约肌关系选择术式
- D 必须用探针穿入肛管造成内口再切开
- E 麻醉选择

正确答案：C 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第44题 男，60岁，便秘、间断便血10余年，便后有肿物自肛门脱出，质软，可以还纳，诊断为

- A. 直肠部分脱出
- B. 肠完全脱出
- C. 外痔
- D. 血栓外痔
- E. 内痔脱出

正确答案：E 您选择的答案：

第45题 女性，31岁，长期便秘、粪便干结，1周前因出差在外生活不规律，5天未排便，1天前排便时用力，大便于硬，肛门周围剧烈疼痛、便纸少量血迹。诊断应为

- A. 外痔
- B. 内痔
- C. 肛裂
- D. 肛瘘
- E. 直肠癌

正确答案：C 您选择的答案：

第46题 男，58岁，便暗红色血便一周，直肠指诊距肛门4cm处有3cm×3cm肿块，病理报告为直肠腺癌，应选择哪种手术方式

- A. 腹直肠癌切除术
- B. 腹会阴联合直肠癌根治切除术
- C. 拉下式直肠癌切除术
- D. 保留肛门，直肠癌根治切除术
- E. 姑息性切除，乙状结肠造口

正确答案：B 您选择的答案：

第47题 男性，48岁，直肠癌手术治疗，术中见癌肿侵犯肠壁全层，附近系膜淋巴结肿大，余未见肿大淋巴结，送快速冰冻病理显示为癌转移。依据Dukes分期，该患者应为

- A. DukesA期
- B. DukesB期
- C. DukesC1期
- D. DukesC2期
- E. DukesD期

正确答案：C 您选择的答案：

第48题 门诊疑为痔，慢性痢疾，结肠炎或直肠癌的病人，要提高诊断率，首先应进行哪项检查

- A 粪便常规检查
- B X线钡剂灌肠检查
- C 直肠指检
- D X线钡餐检查
- E 直肠乙状结肠镜检查

正确答案：C 您选择的答案：

第49题 男性，肠镜发现距肛门20cm左右有一单个基底较宽肠息肉，选用下列哪种治疗最好

- A 圈套器切除
- B 电灼

- C 剖腹息肉单纯切除
- D 部分结肠切除
- E 观察随诊

正确答案：B 您选择的答案：

第50题 男性，36岁，肛门胀痛、排尿困难、发热1周。体检：肛门发红，左侧压痛；直肠指检：肛管左侧局限性隆起，压痛明显，诊断为

- A．肛门旁皮下脓肿
- B．骨盆直肠间隙脓肿
- C．坐骨肛管间隙脓肿
- D．直肠后间隙脓肿
- E．直肠黏膜下脓肿

正确答案：C 您选择的答案：

第51题 36岁，男性，畏寒发热3天，觉肛管内胀痛，排尿困难，继之肛周发红，出现压痛区，切开后排出脓汁60ml，应诊为哪种脓肿

- A 肛门旁皮下脓肿
- B 坐骨肛管间隙脓肿
- C 骨盆直肠间隙脓肿
- D 直肠后间隙脓肿
- E 以上都不是

正确答案：B 您选择的答案：

第52题 女性，51岁，排便习惯改变、大便变细2个月，既往长期便秘，进一步检查最先进行的应是

- A．便常规
- B．肿瘤标志物
- C．直肠指检
- D．直肠镜检
- E．纤维结肠镜检

正确答案：C 您选择的答案：

第53题 男性，"岁，大便变细2个月，直肠镜检距齿状线约4～5cm处肿块突入肠腔，活检病理显示为乳头状腺癌。拟采用何种术式

- A．局部切除
- B．腹会阴联合直肠癌根治术
- C．经腹直肠癌切除术
- D．经腹直肠癌切除、近端造口、远端封闭手术
- E．全盆腔清扫术

正确答案：B 您选择的答案：

第54题 女性，47岁，直肠指诊发现距肛门7cm处环形肿物，术中发现肿物巨大，与盆壁及骶部固定，最适宜的手术是

- A 腹会阴联合直肠癌根治术
- B 拉下式直肠癌切除术
- C 经腹直肠癌切除术
- D 乙状结肠造口术
- E 扩大直肠癌根治术

正确答案：D 您选择的答案：

第55题 女性，45岁，直肠低分化腺癌，距肛门7cm，术中见肿块巨大，与盆腔及骶部固定，最适宜的手术选择为

- A Miles手术
- B Dixon手术
- C 拉下式直肠癌手术
- D Hartmann手术
- E 仅作乙状结肠造口术

正确答案：E 您选择的答案：

第56题 患者40岁，排便后肛门外剧烈疼痛，并出现一触痛性明显的肿块，最可能的诊断是

- A 内痔脱出嵌顿
- B 直肠息肉脱出
- C 肛周脓肿
- D 血栓性外痔
- E 肛裂并前哨痔

正确答案：D 您选择的答案：

第57题 男性，60岁，患慢性支气管炎多年，经常便秘，近来大便带血，便后觉有肿物自肛门脱出，可以还纳，考虑为

- A 内痔脱出
- B 直肠部分脱出
- C 直肠完全脱出
- D 直肠息肉脱出
- E 环痔

正确答案：A 您选择的答案：

第58题 患儿，便后有出血症状，系鲜血，不与便相混，大便次数及性质尚属正常，首先考虑哪种检查

- A X线钡剂灌肠
- B 肛镜检查
- C 直肠指诊
- D 乙状结肠镜检查
- E 便常规检查

正确答案：C 您选择的答案：

第59题 男性，25岁，肛门胀痛，排尿困难5天。畏寒，高热，肛门外观无异常，直肠指检：肛管左侧局限性隆起，压痛明显，可诊断为

- A 骨盆直肠间隙脓肿
- B 肠后间隙脓肿
- C 坐骨肛管间隙脓肿
- D 前列腺脓肿
- E 直肠粘膜下脓肿

正确答案：C 您选择的答案：

第60题 男性，45岁，过去十年经常大便带血，无其他症状。近一年便血加重，便后不适，需立即进行的有效诊断方法是

- A X线钡剂灌肠检查
- B 直肠指诊
- C 纤维光束结肠镜检查
- D 乙状结肠镜检查
- E 常规体检及化验

正确答案：B 您选择的答案：

第61题 女性，54岁，间歇性无痛便血10余年，近1周来便血持续，量多。肛门镜检查膝胸位9点处齿状线上黏膜呈半球形隆起，治疗最好选择

- A．坐浴、消炎止痛
- B．注射疗法
- C．红外线凝固疗法
- D．胶圈套扎疗法
- E．手术疗法

正确答案：B 您选择的答案：

第62题 患者56岁，直肠癌，距肛门5cm，未侵出浆膜，经病理检查回报病理类型为腺癌，应选择哪种治疗

- A 拉下式直肠癌切除术
- B 经腹直肠癌切除术
- C 经腹会阴联合直肠癌根治术
- D 保留肛门，直肠癌切除，腹壁造瘘
- E 姑息乙状结肠造瘘术

正确答案：C 您选择的答案：

第63题 一患痔多年的病人突感肛门剧痛，排便，走路，咳嗽时疼痛加剧。检查：肛门部有一圆形肿块突出，与周围分界清楚，触痛，应诊断为

- A 内痔嵌顿
- B 直肠息肉脱出
- C 肛门旁皮下脓肿
- D 外痔血栓形成
- E 外痔合并感染

正确答案：D 您选择的答案：

第64题 女性，54岁，诊断直肠癌，术中探查发现肿瘤穿透浆膜层，向前侵入子宫及膀胱，与骨盆无粘连。手术宜采用

- A．Miles手术
- B．Dixon手术
- C．后盆腔清扫
- D．全盆腔清扫
- E．仅做乙状结肠造口术

正确答案：D 您选择的答案：

第65题 女性，40岁，7个月前因坐骨肛管旁间隙脓肿行切开引流，近半年来反复流出少量黏液脓性分泌物，局部皮肤发红、瘙痒。应考虑为

- A．慢性肛周皮下脓肿
- B．肛瘘
- C．直肠癌
- D．肛裂
- E．混合痔

正确答案：B 您选择的答案：

第66题 男童，5岁，反复发生大便上有鲜血约半年，便后无不适感觉，最可能的诊断为

- A．内痔
- B．肛裂
- C．肛瘘
- D．慢性细菌性痢疾
- E．直肠息肉

正确答案：E 您选择的答案：

第67题 男性，40岁，直肠癌，B超见肝左叶孤立转移结节，余无异常，适宜的治疗是

- A 乙状结肠造口术
- B 根治术+肝左叶切除
- C 单纯放疗
- D 单纯化疗
- E Miles手术

正确答案：B 您选择的答案：

第68题 患儿5岁，便血，新鲜，量不多，位于大便外面，考虑哪种疾病可能性最大

- A 痢疾
- B 痔
- C 直肠癌
- D 直肠息肉
- E 肛周脓肿

正确答案：D 您选择的答案：

第69题 6岁儿童，大便时常有鲜血染于粪便表面，便后无不适感，最可能的诊断是

- A 内痔
- B 肛裂
- C 慢性肠套叠
- D 肛窦炎
- E 直肠息肉

正确答案：E 您选择的答案：

第70题 女性，39岁，半年前因肛旁脓肿切开引流，之后局部皮肤反复红肿，破溃，局部痒，应考虑为

- A 肛旁疖肿
- B 肛瘘
- C 混合痔
- D 血栓性外痔
- E 肛旁慢性肉芽肿

正确答案：B 您选择的答案：

第71题 男性，25岁，近3个月经常排便后滴鲜血，量不多。肛门指检无异常发现，肛肠镜检截石位见3、7点各有一突出肛管内暗红色圆形软结节，诊断为

- A 直肠息肉
- B 肛裂
- C 内痔
- D 肛管癌
- E 慢性痢疾

正确答案：C 您选择的答案：

三、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第72-74题

男性，37岁，畏寒发热3天，肛门内胀痛，排尿困难。体检：肛门及周围皮肤发红，肛门右侧显著压痛，指检发现肛管右侧压痛、有波动感。

1. 诊断考虑为

- A. 肛门旁皮下脓肿
- B. 坐骨肛管间隙脓肿
- C. 骨盆直肠间隙脓肿
- D. 直肠后间隙脓肿
- E. 直肠黏膜下脓肿

2. 最有效的治疗方法是

- A. 抗生素治疗
- B. 抗生素药液坐浴
- C. 切开引流
- D. 口服缓泻剂
- E. 局部理疗

3. 上述治疗后易出现的并发症是

- A. 肛裂
- B. 肛瘘
- C. 内痔
- D. 外痔
- E. 恶变

正确答案：BCB 您选择的答案：

第75-76题

男，35岁，会阴部坠胀感3天，大便时疼痛，体温38.9℃，血白细胞 $22 \times 10^9/L$ 。

1. 该病最简单确实的检查为

- A. B超检查
- B. 直肠指诊
- C. CT检查
- D. 纤维结肠镜检查
- E. 肛门镜检查

2. 检查发现直肠左侧有压痛，肛周无明显红肿，B超检查发现直肠左侧有液性暗区。最可能的诊断是

- A. 骨盆直肠窝脓肿
- B. 盆腔脓肿
- C. 肛周脓肿
- D. 直肠后间隙脓肿
- E. 坐骨直肠窝脓肿

正确答案：BA 您选择的答案：

第77-79题

女性，54岁，近一个月来排便次数增加，有里急后重感，偶有便血

1. 此时应考虑何种检查为首选

- A 直肠乙状结肠镜检查

- B X线钡剂灌肠
- C 直肠指诊
- D 肛门镜检查
- E 大便常规检查

2. 经检查发现距肛门8cm有一质硬菜花状肿块，应首先考虑哪种诊断

- A 直肠息肉
- B 痔
- C 肛裂
- D 肛瘘
- E 直肠癌

3. 如想进一步明确诊断应选择

- A 经肛门取病理检查
- B 手术切除病检
- C 便常规
- D 便肿瘤细胞检查
- E X线钡剂灌肠检查

共用题干(48-49题)答案DE

男性，45岁，排便后痛，昨日突然加剧，肛口可及一肿块，直径1.5Cm，紫色，触痛

1. 应诊断为

- A 直肠癌
- B 直肠息肉脱出
- C 内痔脱出
- D 血栓外痔脱出
- E 肛瘘

2. 应采取哪种治疗最佳

- A 坐浴
- B 封闭
- C 口服药物
- D 注射硬化剂
- E 血栓外痔剥离术

共用题干(50-51题)答案BA

男性，50岁，间歇性便血10余年，近1个月持续便血，量多，常呈喷射状，感头晕，肛诊齿线上粘膜呈较大的串球形隆起

1. 应诊断为

- A 外痔
- B 内痔
- C 混合痔
- D 直肠癌
- E 直肠息肉

2. 应选择哪种治疗为佳

- A 注射疗法
- B 冷冻疗法
- C 胶圈套扎疗法
- D 手术切除
- E 坐浴

正确答案：CEA 您选择的答案：

第80-82题

女性，35岁，反复大便出血3年，色鲜红，无明显疼痛，既往大便常干结。直肠指检未触及肿块，肛门镜检查见齿状线上2处黏膜隆起。

1. 最可能的诊断是

- A. 内痔
- B. 外痔
- C. 直肠息肉
- D. 肛乳头肥大
- E. 直肠癌

2. 该患者属第几期

- A. 第一期
- B. 第二期
- C. 第三期
- D. 第四期
- E. 第五期

3. 该患者应选用何种治疗

- A. 口服化痔丸
- B. 红外线凝固疗法
- C. 注射疗法
- D. 胶圈套扎疗法
- E. 手术疗法

正确答案：AAC 您选择的答案：

第83-85题

男性，55岁，粘液稀便2个月，脐周及下腹部隐痛不适，腹平软，无压痛及肿块，便化验潜血(+)

1. 应首先选择哪种检查

- A 纤维结肠镜检查
- B 乙状结肠镜检查
- C 大便培养
- D 直肠指诊
- E 肛门镜检查

2. 如该患者状态较差，距肛门9cm处的直肠癌，能切除，应选择哪种手术为佳

- A 经腹直肠癌切除，人工肛门，远端封闭
 - B 拉下式直肠癌切除术
 - C 经腹直肠癌切除术
 - D 腹会阴联合直肠癌根治术
 - E 乙状结肠造瘘术
3. 如该患者状态佳时，选用哪种手术为佳
- A 经腹直肠癌切除，人工肛门，远端封闭
 - B 拉下式直肠癌切除术
 - C 经腹直肠癌切除术
 - D 乙状结肠造瘘术
 - E 以上都不是

正确答案：DAB 您选择的答案：

四、A4型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第86-90题

女性，61岁，黏液脓血便半年，近1个月大便变细、消瘦。

1. 需要首先进行的检查是
 - A. 大便潜血试验
 - B. 直肠指检
 - C. 内镜检查
 - D. 影像学检查
 - E. 肿瘤标记物
2. 若指检发现距肛缘5cm处一质硬肿块，表面不平，肠腔狭窄，肿块固定不易推动，指套染有脓血，为明确诊断，进一步检查宜选择
 - A. 盆腔CT
 - B. 盆腔MRI
 - C. 纤维结肠镜
 - D. 直肠镜检取活检病理
 - E. 肿瘤标记物
3. 如辅助检查未发现远处转移迹象，拟行何种治疗
 - A. 化学治疗
 - B. 放射治疗
 - C. 腹会阴联合直肠癌根治术
 - D. 经腹直肠癌切除术
 - E. 经腹直肠癌切除、近端造口、远端封闭手术
4. 若术中发现肿瘤侵犯子宫，应如何处置
 - A. 仅做探查，终止手术
 - B. 放弃根治，行乙状结肠造：口术
 - C. 前盆腔清扫
 - D. 后盆腔脏器清扫
 - E. 全盆腔清扫
5. 若术中见肿瘤浸润盆壁，切除不彻底，辅助治疗宜选择
 - A. 放射治疗
 - B. 化学治疗
 - C. 射频治疗
 - D. 生物治疗
 - E. 基因治疗

正确答案：BDCDA 您选择的答案：

五、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第91-93题

- A 内痔
 - B 肛瘘
 - C 外痔
 - D 直肠息肉
 - E 直肠癌
1. 直肠指检，扪到质软可推动的圆形肿块，指套染有新鲜血迹者应考虑
 2. 直肠指检，肠壁上扪到高低不平硬块，肠腔狭窄，指套染有脓血和粘液者应考虑
 3. 直肠指检，扪到条索状，伴有轻压痛，挤压时外口有脓性分泌物流出者应考虑
- 正确答案：DEB 您选择的答案：

第94-97题

- A. 对晚期直肠癌，已不能行根治性手术时，又要解除病人排便困难或肠梗阻时
 - B. 直肠癌下缘距齿状线5cm以上的患者
 - C. 直肠癌下缘距肛门在10cm以上的病人
 - D. 年老体弱，不能行一期切除吻合的病人
 - E. 距齿状线5cm以内的直肠癌患者
1. 腹会阴联合直肠癌根治术(Miles手术)适用于
 2. 经腹直肠癌切除术(Dixon手术)适用于
 3. 经腹直肠癌切除、近端造口、远端封闭(Hartmann手术)适用于
 4. 乙状结肠双腔造口适用于

正确答案：EBDA 您选择的答案：

第98-101题

- A 便血量多而鲜红
- B 便血少而疼痛
- C 便血污秽而腥臭
- D 便血量多而色黑
- E 便污血而疼痛

- 1. 肛裂
- 2. 内痔
- 3. 血栓性外痔
- 4. 直肠癌

正确答案：BAEC 您选择的答案：

第102-104题

- A. 便血量多而鲜红
- B. 柏油样便
- C. 便污血而疼痛
- D. 便鲜血伴疼痛
- E. 便污血伴腥臭

- 1. 内痔
- 2. 肛裂
- 3. 上消化道出血

正确答案：ADB 您选择的答案：

习题集 外科学 阑尾炎

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 坏疽性阑尾炎出现高热、寒战、黄疸时要注意

- A．门静脉炎
- B．膈下脓肿
- C．急性梗阻性化脓性胆管炎
- D．急性溶血反应
- E．阑尾周围脓肿

正确答案：A 您选择的答案：

第2题 急性阑尾炎早期出现上腹部及脐周疼痛是由于

- A．胃肠道反射
- B．腹膜炎症刺激
- C．内脏功能紊乱
- D．内脏神经反射
- E．合并急性胃肠炎

正确答案：D 您选择的答案：

第3题 慢性阑尾炎主要的体征是

- A．右下腹局限性压痛
- B．右下腹压痛、反跳痛
- C．右下腹压痛、反跳痛及肌紧张
- D．右下腹无痛性肿块
- E．右下腹压痛性肿块

正确答案：A 您选择的答案：

第4题 急性阑尾炎早期上腹痛及脐周痛的主要原因是

- A．胃肠道反射性痉挛
- B．感染扩散
- C．并发急性胃肠炎
- D．内脏神经反射
- E．疼痛定位不准确

正确答案：D 您选择的答案：

第5题 急性阑尾炎临床症状发生的顺序一般是

- A．恶心呕吐、发热、右下腹疼痛
- B．下腹痛、恶心呕吐
- C．上腹痛、恶心呕吐、右下腹痛
- D．右下腹痛、恶心呕吐、上腹痛
- E．无明确顺序

正确答案：C 您选择的答案：

第6题 阑尾残端安全处理的最好方法是

- A 结扎
- B 结扎和包埋
- C 单纯包埋
- D 挤压
- E 石炭酸烧灼

正确答案：B 您选择的答案：

第7题 诊断急性阑尾炎最有意义的体征是

- A 结肠充气试验阳性
- B 闭孔肌试验阳性
- C 右下腹固定压痛点
- D 直肠指诊右前方有触痛
- E 阑尾穴压痛阳性

正确答案：C 您选择的答案：

第8题 急性阑尾炎最严重的并发症是

- A．门静脉炎
- B．阑尾化脓穿孔腹膜炎
- C．阑尾周围脓肿
- D．膈下脓肿
- E．肠间积液

正确答案：A 您选择的答案：

第9题 急性阑尾炎最严重的并发症是

- A 阑尾穿孔腹膜炎
- B 门静脉炎
- C 膈下脓肿
- D 盆腔脓肿
- E 肠间脓肿

正确答案：B 您选择的答案：

第10题 不是阑尾炎急诊手术指征的是

- A．急性单纯性阑尾炎

- B. 急性化脓性阑尾炎
- C. 急性坏疽性阑尾炎
- D. 急性穿孔性阑尾炎
- E. 阑尾周围脓肿

正确答案：E 您选择的答案：

第11题 急性阑尾炎最易穿孔的是

- A. 老年人急性阑尾炎
- B. 妊娠期急性阑尾炎
- C. 小儿急性阑尾炎
- D. 慢性阑尾炎急性发作
- E. 阑尾管腔狭窄引起的急性阑尾炎

正确答案：C 您选择的答案：

第12题 腰大肌试验阳性说明阑尾位于

- A. 腰大肌前
- B. 腰大肌后
- C. 盆腔
- D. 回肠前
- E. 左侧腹腔

正确答案：A 您选择的答案：

第13题 阑尾炎手术中寻找阑尾最可靠的方法是

- A. 炎症最重处
- B. 脓液最多处
- C. 手术切口大
- D. 沿结肠带寻找
- E. 食指深部探查

正确答案：D 您选择的答案：

第14题 急性阑尾炎穿孔最易形成弥漫性腹膜炎者为

- A. 老年人
- B. 儿童
- C. 孕妇
- D. 慢性阑尾炎急性发作
- E. 全身抵抗力低下者

正确答案：B 您选择的答案：

第15题 急性阑尾炎时腰大肌试验阳性提示

- A. 盆位阑尾
- B. 盲肠后位阑尾
- C. 并发盆腔脓肿
- D. 腰神经受累
- E. 盲肠内位阑尾

正确答案：B 您选择的答案：

第16题 妊娠期急性阑尾炎首选的治疗措施是

- A. 严密观察，尽量少用药
- B. 抗感染治疗
- C. 镇痛治疗
- D. 保胎治疗
- E. 尽早手术治疗

正确答案：E 您选择的答案：

第17题 诊断急性阑尾炎下列哪项最重要

- A. 闭孔肌试验阳性
- B. 转移性右下腹痛
- C. 腰大肌试验阳性
- D. 发热及白细胞升高
- E. 直肠指诊右前方触痛

正确答案：B 您选择的答案：

第18题 急性阑尾炎最重要的体征是

- A. 结肠充气试验阳性
- B. 闭孔肌试验阳性
- C. 直肠指诊右前方触痛
- D. 右下腹固定压痛点
- E. 腰大肌试验阳性

正确答案：D 您选择的答案：

第19题 急性阑尾炎最常见的重要体征是

- A. 右下腹压痛，并有反跳痛及肌紧张
- B. 右下腹固定压痛
- C. 结肠充气试验阳性
- D. 闭孔内肌试验阳性
- E. 腰大肌试验阳性

正确答案：B 您选择的答案：

第20题 老年人急性阑尾炎的特点是

- A. 临床表现轻而病理改变却很重

- B. 体温升高明显
- C. 白细胞升高明显
- D. 腹痛剧烈
- E. 压痛、反跳痛明显

正确答案：A 您选择的答案：

第21题 诊断慢性阑尾炎，下列哪一项最重要

- A. 慢性右下腹隐痛史
- B. 有过典型的急性发作病史
- C. 右下腹有轻度压痛
- D. X线钡餐检查阑尾未显影
- E. 排除阑尾以外疾病的可能

正确答案：D 您选择的答案：

第22题 急性阑尾炎直肠指诊右前方有压痛说明

- A. 盲肠后位阑尾
- B. 阑尾穿孔
- C. 化脓性阑尾炎
- D. 坏疽性阑尾炎
- E. 阑尾尖端指向盆腔

正确答案：E 您选择的答案：

第23题 急性阑尾炎术后最常见的并发症是

- A. 出血
- B. 切口感染
- C. 粘连性肠梗阻
- D. 阑尾残株炎
- E. 粪瘘

正确答案：B 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第24题 女性，45岁，脐周痛12小时伴恶心、呕吐，吐物为胃内容，量少，2小时前扩散至全腹痛，右下腹部压痛，反跳痛，腹肌紧张，以右下腹为著，结肠充气试验(+)，白细胞数 $26 \times 10^9/L$ ，应考虑

- A. 急性胰腺炎
- B. 急性胆囊炎
- C. 右输尿管结石
- D. 右输卵管妊娠破裂
- E. 急性阑尾炎穿孔

正确答案：E 您选择的答案：

第25题 男性，35岁，脐周痛1天，12小时前开始右下腹痛，全腹痛2小时，伴发热、恶心呕吐。体检：体温 $39.1^\circ C$ ，全腹压痛，以右下腹为著，有反跳痛及肌紧张，移动性浊音阴性。白细胞 $13.5 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞0.89。该患者为

- A. 消化性溃疡穿孔并弥漫性腹膜炎
- B. 急性胰腺炎并弥漫性腹膜炎
- C. 急性胆囊炎并弥漫性腹膜炎
- D. 急性阑尾炎穿孔并弥漫性腹膜炎
- E. 肠伤寒穿孔

正确答案：D 您选择的答案：

第26题 女，45岁，上腹痛一天伴恶心呕吐，2小时前出现全腹痛。右下腹压痛，反跳痛，腹肌紧张。结肠充气试验阳性，白细胞 $24 \times 10^9/L$ ，应诊断为

- A. 急性胰腺炎
- B. 急性胆囊炎
- C. 上消化道穿孔
- D. 急性阑尾炎穿孔
- E. 右侧输尿管结石

正确答案：D 您选择的答案：

第27题 女性，33岁，脐周部隐痛10小时，右下腹痛4小时，伴恶心呕吐，吐出物为胃内容。体检：体温 $38.7^\circ C$ ，右下腹压痛，无肌紧张及反跳痛。最可能的诊断是

- A. 卵巢囊肿蒂扭转
- B. 胃、十二指肠溃疡穿孔
- C. 急性胆道感染
- D. 急性阑尾炎
- E. 宫外孕

正确答案：D 您选择的答案：

第28题 女性，38岁，转移性右下腹痛12小时。体检：全腹压痛，反跳痛及肌紧张，以右下腹为著。术前拟诊断为急性阑尾炎穿孔并弥漫性腹膜炎。手术切口宜选择

- A. 脐与右髂前上嵴连线内1/3处
- B. 脐与右髂前上嵴连线外1/3处
- C. 脐与右髂前上嵴连线中点处
- D. 右下腹经腹直肌切口
- E. 以上都不对

正确答案：D 您选择的答案：

第29题 男性，56岁，6天前行阑尾切除术，术后病理诊断为：急性坏疽性阑尾炎。现体温38.8，伴恶心，排便次数增多，量少，呈黏液状，考虑为出现

- A. 急性胃肠炎
- B. 阑尾残株炎
- C. 粪瘘
- D. 肠间积液
- E. 盆腔脓肿

正确答案：E 您选择的答案：

第30题 男，40岁，上腹疼痛12小时伴乏力咽痛、恶心、呕吐。右下腹疼痛4小时，稀便2次。体温37.5，右下腹压痛、反跳痛，肠鸣音活跃，白细胞 $13 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞0.92，尿常规：红细胞++，白细胞少许，应诊断为

- A. 上呼吸道感染
- B. 急性胃肠炎
- C. 急性阑尾炎
- D. 右侧输尿管结石
- E. 急性肠系膜淋巴结炎

正确答案：C 您选择的答案：

第31题 男性，45岁，右下腹痛2天，剑突下痛半天，伴寒颤、高热，体温39.2。体检：巩膜及皮肤轻度黄染，剑突下轻度压痛，右下腹压痛明显，反跳痛，肌紧张。该患者诊断首先考虑

- A. 急性胆囊炎
- B. 急性胆囊炎穿孔
- C. 急性阑尾炎伴门静脉炎
- D. 消化性溃疡穿孔
- E. 急性阑尾炎穿孔

正确答案：C 您选择的答案：

第32题 女性，53岁，脐周痛8小时，全腹痛2小时，伴有恶心呕吐。体检：体温39.1，腹胀，未见肠型，全腹压痛，反跳痛及肌紧张，以右下腹为著，结肠充气试验阳性。白细胞 $18 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞0.90。诊断为

- A. 右侧卵巢黄体破裂
- B. 消化性溃疡急性穿孔
- C. 急性阑尾炎穿孔
- D. 右侧输卵管妊娠破裂
- E. 右侧输尿管结石

正确答案：C 您选择的答案：

第33题 男性，68岁，最近因心梗住院，上腹绞痛，脸色苍白，大汗淋漓，1小时后腹痛减轻，继之全腹胀肠音消失，出现休克，可能的诊断

- A. 急性胆囊炎
- B. 结肠癌
- C. 憩室炎
- D. 肠系膜上动脉栓塞
- E. 急性阑尾炎

正确答案：D 您选择的答案：

第34题 患者术前诊断为阑尾炎，术中见阑尾正常，回肠末端距回盲部30cm处肠壁有一圆形溃疡穿孔，应首先考虑为

- A. 肠结核
- B. 肠伤寒
- C. 节段性肠炎
- D. 美克尔憩室炎
- E. 痢疾合并肠穿孔

正确答案：B 您选择的答案：

第35题 女性，24岁，反复发作右下腹痛2年，无发热、腹泻便秘等不适。半年前曾发作急性阑尾炎，经保守治疗后好转。体检：右下腹麦氏点固定压痛，无反跳痛及肌紧张。X线钡剂灌肠显示阑尾充盈缺损。诊断考虑

- A. 回盲部结核
- B. 阑尾癌
- C. 克罗恩病
- D. 慢性阑尾炎
- E. 慢性附件炎

正确答案：D 您选择的答案：

第36题 女性，28岁，孕32周，右中腹痛伴发热10小时。体检：体温38.1，右中腹偏外侧固定压痛，无反跳痛及肌紧张。血常规白细胞 $15.7 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞0.85。诊断为妊娠期急性阑尾炎，治疗首选

- A. 严密观察，尽量少用药
- B. 大量抗生素并引产
- C. 大量抗生素并安胎
- D. 腹腔穿刺引流
- E. 尽早行阑尾切除术

正确答案：E 您选择的答案：

第37题 男性，41岁，右下腹痛伴发热1天，术前诊断急性阑尾炎，急诊手术治疗，术中见阑尾肿胀明显，浆膜高度充血，表面覆有少量脓性渗出物，阑尾周围渗出物量少。阑尾切除后正确的处理是

- A. 残端不能包埋
- B. 阑尾周围渗出液用纱布多次蘸净，不用盐水冲洗
- C. 大量盐水冲洗腹腔
- D. 大量抗生素盐水冲洗腹腔
- E. 大量盐水冲洗腹腔并留置腹腔引流管

正确答案：B 您选择的答案：

第38题 女性，59岁，右下腹痛1天余，诊断阑尾炎行阑尾切除术，术中见阑尾化脓穿孔，手术经过较顺利，术后第3天患者诉切口跳痛。体检：体温38.5℃，打开敷料见切口局部发红，肿胀，有淡黄色。此为何种并发症

- A. 出血
- B. 切口感染
- C. 粘连性肠梗阻
- D. 急性阑尾残株炎
- E. 粪瘘

正确答案：B 您选择的答案：

第39题 女性，33岁，右下腹痛6小时，全腹痛2小时。体检：神志淡漠，四肢湿冷，血压80/60mmHg(10.7/8kPa)，全腹压痛，反跳痛，肌紧张，以右下腹为著，移动性浊音阳性。血常规白细胞 $9.6 \times 10^9/L$ ，血红蛋白75g/L，尿HCG(+)。末次月经在70天前。诊断为

- A. 右侧卵巢黄体破裂
- B. 消化性溃疡穿孔
- C. 急性阑尾炎穿孔
- D. 右侧输卵管妊娠破裂
- E. 右侧输尿管结石

正确答案：D 您选择的答案：

第40题 男性，27岁，低热1周，右下腹痛4小时。体检：体温38.4℃，右下腹压痛，有反跳痛，肌紧张，移动性浊音可疑。术中探查见阑尾正常，回肠末端距回盲部20cm处肠壁一单发圆形溃疡穿孔，诊断首先考虑为

- A. 肠结核
- B. 肠伤寒
- C. 克罗恩病
- D. 慢性阑尾炎穿孔
- E. 消化性溃疡穿孔

正确答案：B 您选择的答案：

第41题 男性，印岁，2天前上腹持续性胀痛，12小时后右下腹痛，阵发加剧，腹胀。近4年来常有饭前上腹灼痛，常在冬春季发作。查体：38℃，脉搏120次/分，血压150/90mmHg。腹稍胀，满腹有压痛，但右下腹更明显，有肌紧张及反跳痛，肝浊音界存在，肠鸣音未听到白细胞 $13 \times 10^9/L$ ，中性88%。右下腹穿刺抽得黄色混浊液2ml，镜检：脓细胞(++)高倍镜。最可能的诊断是

- A. 胃十二指肠溃疡穿孔
- B. 阑尾炎穿孔并弥漫性腹膜炎
- C. 急性胰腺炎
- D. 绞窄性肠梗阻
- E. 伤寒肠穿孔

正确答案：B 您选择的答案：

三、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第42-44题

男性，49岁，右下腹持续疼痛伴发热约1周。体检：体温38.2℃，右下腹饱满，扪及一约5cm×4cm压痛性包块，边界不清，固定。血常规白细胞 $14 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞0.80

1. 最可能的诊断是

- A. 回盲部肿瘤
- B. 回盲部结核
- C. 急性化脓性阑尾炎
- D. 阑尾周围脓肿
- E. 肠套叠

2. 此时最适宜的处理是

- A. 急诊行阑尾切除术
- B. 急诊手术切开引流
- C. 暂不手术，足量抗生素治疗
- D. 回盲部切除、脓肿清除、回肠与结肠端端吻合
- E. 回盲部切除、脓肿清除、回肠外置、结肠近端封闭，二期端侧吻合

3. 该患者经非手术治疗治愈，为防止复发应作何处理

- A. 延长抗生素使用时间
- B. 如再次急性发作，行手术
- C. 治愈后3个月左右择期手术切除阑尾
- D. 治愈后1年左右择期手术切除阑尾
- E. 不用任何处理

正确答案：DCC 您选择的答案：

第45-47题

男性，30岁，脐周痛，转移至右下腹痛2天，突发全腹痛5小时，排气排便停止。体检：体温38.4℃，腹部稍膨隆，全腹压痛，反跳痛及肌紧张，以右下腹为著，肠鸣音弱。血常规白细胞 $15 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞0.85。

1. 诊断为

- A. 绞窄性肠梗阻
- B. 麻痹性肠梗阻
- C. 机械性肠梗阻
- D. 急性阑尾炎穿孔并弥漫性腹膜炎
- E. 肠扭转

2. 该患者手术切口宜选择

- A. 右下腹麦氏切口
- B. 右下腹横切口
- C. 右下腹经腹直肌探查切口
- D. 中下腹正中切口

- E. 中上腹正中切口
- 3. 手术后最常见的并发症是
- A. 腹腔出血
- B. 腹腔残余脓肿
- C. 阑尾残株炎
- D. 粘连性肠梗阻
- E. 切口感染

正确答案：DCE 您选择的答案：

第48-51题

男患，30岁，转移性右下腹痛10小时，并恶心、呕吐，吐物为胃内容，量少并发热，体温约38.2℃，脉搏98次/分，右下腹压痛，反跳痛肌紧张，血WBC为 $1.2 \times 10^{10}/L$ ，中性90%，尿常规WBC 8~10/HP，红细胞2~3/HP

1. 该患者最可能诊断是
- A. 急性胆囊炎
- B. 消化性溃疡穿孔
- C. 急性化脓性阑尾炎
- D. 急性胰腺炎
- E. 急性肠梗阻
2. 该患者最佳治疗方法为
- A. 观察
- B. 急诊行手术治疗
- C. 抗炎补液
- D. 中药治疗
- E. 对症治疗
3. 该患者可能出现的最严重并发症为
- A. 门静脉炎
- B. 肠梗阻
- C. 化脓性腹膜炎
- D. 腹腔脓肿
- E. 水、电解质紊乱
4. 该患者手术后最常出现的并发症为
- A. 肠粘连梗阻
- B. 肠瘘
- C. 腹腔残余脓肿
- D. 腹腔出血
- E. 切口感染

正确答案：CBAE 您选择的答案：

第52-54题

女性，68岁，下午起脐周隐痛，至晚上，渐渐转移并固定于右下腹部，腹痛持续性加重。体检：体温37.8℃，血压150/100mmHg(20/13.3kPa)，体胖，腹膨隆，右下腹麦氏点压痛明显，肌紧张且有反跳痛。

1. 应考虑为
- A. 克罗恩病
- B. 肠结核
- C. 阑尾炎
- D. 结肠癌
- E. 盆腔炎
2. 该病手术最常见的术后并发症是
- A. 切口感染
- B. 腹膜炎
- C. 粪瘘
- D. 阑尾残株炎
- E. 粘连性肠梗阻
3. 发生此种并发症应如何处置
- A. 剪去缝线，扩大切口，排出脓液
- B. 清除异物并充分引流
- C. 全身应用抗生素
- D. 加强营养
- E. 以上各项均适宜

正确答案：CAE 您选择的答案：

第55-58题

男，30岁，转移性右下腹痛24小时，伴恶心、呕吐、发热，体温38.5℃，脉搏88次/分，右下腹压痛、反跳痛、肌紧张。血白细胞 $13 \times 10^9/L$ ，中性0.86，尿常规白细胞1~2/高倍视野，红细胞2~3/高倍视野

1. 该患者最可能的诊断是
- A. 急性胆囊炎
- B. 消化性溃疡穿孔
- C. 急性胰腺炎
- D. 急性化脓性阑尾炎
- E. 急性肠梗阻
2. 该患者最佳治疗方法为
- A. 观察
- B. 手术治疗
- C. 补液抗炎
- D. 对症治疗
- E. 中药治疗
3. 该患者可能出现的最严重的并发症为
- A. 肠梗阻
- B. 化脓性腹膜炎
- C. 水电解质紊乱

- D. 腹腔脓肿
- E. 门静脉炎
- 4. 患者手术后最常见的并发症为
- A. 肠瘘
- B. 腹腔残余脓肿
- C. 腹腔出血
- D. 切口感染
- E. 肠粘连

正确答案：DBEE 您选择的答案：

四、A4型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第59-62题

女性，55岁，上腹部痛1天余，右下腹痛12小时，伴发热、恶心。体检：体温37.7℃，全腹压痛，反跳痛及肌紧张，以右下腹为著，肠鸣音弱。血常规白细胞 13×10^9 ，中性粒细胞0.80。

1. 如该患者行腹部X线平片检查发现膈下游离气体，诊断应为

- A. 消化性溃疡穿孔
- B. 急性阑尾炎穿孔
- C. 肠伤寒穿孔
- D. 急性胆囊炎穿孔
- E. 绞窄性肠梗阻

2. 若行剖腹探查，见仍为阑尾炎穿孔伴腹膜炎，行阑尾切除术，阑尾周围较多脓液，盲肠水肿，该患者阑尾残端该如何处理

- A. 单纯结扎
- B. 单纯包埋
- C. 结扎，荷包埋入缝合
- D. 结扎，残端U字缝在结肠带上
- E. 石炭酸烧灼

3. 如术后10天，病人仍发热并感腹胀，大便每日5~6次，伴里急后重，体温38.7℃，血白细胞 17×10^9 ，中性粒细胞

0.81，此时考虑

- A. 并发盆腔炎
- B. 肠间积液
- C. 盆腔脓肿
- D. 阑尾残株炎
- E. 并发肠梗阻

4. 此时对该患者最有效的治疗是

- A. 剖腹探查
- B. 胃肠减压
- C. 根据药物敏感试验调整抗生素
- D. 后穹窿穿刺引流
- E. 高锰酸钾溶液坐浴

正确答案：ADCD 您选择的答案：

五、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第63-65题

- A. 大网膜发育不全，病情发展快且较重，右下腹体征不典型，穿孔率高
- B. 阑尾向右上腹移位，炎症阑尾刺激不到壁层腹膜使体征不明显，大网膜难以包裹使腹膜炎易扩散
- C. 对疼痛感觉迟钝，腹肌薄弱，防御功能减退，临床表现轻而病理改变却很重
- D. 肝肿大，剑突下痛，轻度黄染，寒战、高热
- E. 反复发作右下腹痛，右下腹有位置较固定的压痛

1. 老年人急性阑尾炎

2. 小儿急性阑尾炎

3. 妊娠期急性阑尾炎

正确答案：CAB 您选择的答案：

第66-68题

- A. 急性阑尾炎
- B. 急性胆囊炎
- C. 急性胰腺炎
- D. 消化性溃疡穿孔
- E. 右侧输尿管结石

1. 转移性右下腹痛

2. 上腹刀割样痛

3. 右下腹绞痛向会阴部放射

正确答案：ADE 您选择的答案：

第69-72题

A. 阑尾轻度肿胀，浆膜充血并失去正常光泽，表面有少量纤维索性渗出物

B. 阑尾各层均有水肿和中性粒细胞浸润、黏膜表面有小溃疡和出血点

C. 阑尾肿胀明显，浆膜高度充血，有脓性渗出物附着

D. 阑尾管壁坏死或部分坏死；呈暗紫色或黑色

E. 大网膜移至右下腹部，将阑尾包裹并形成粘连，出现炎性肿块

1. 急性化脓性阑尾炎

2. 坏疽性及穿孔性阑尾炎

- 3. 阑尾周围脓肿
- 4. 急性单纯性阑尾炎

正确答案：CDEA 您选择的答案：

第73-75题

- A 急性胆囊炎
- B 急性阑尾炎
- C 胃十二指肠溃疡穿孔
- D 急性胰腺炎
- E 右输尿管结石

- 1. 转移性右下腹痛
- 2. 上腹部束带状疼痛，多呈持续性
- 3. 右腰部阵发性绞痛向会阴部扩散

正确答案：BDE 您选择的答案：

习题集 外科学 胃、十二指肠疾病

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 胃迷走神经切断术的基本要求是术后

- A 神经性胃酸分泌完全消失
- B 胃蛋白酶分泌完全消失
- C 胃相所致的胃酸分泌消失
- D 非壁细胞的分泌完全消失
- E 肠相所致的胃酸分泌消失

正确答案：A 您选择的答案：

第2题 十二指肠球部溃疡并发大出血通常受侵蚀的血管是

- A 腹腔动脉
- B 胃右动脉
- C 胃网膜右动脉
- D 胰十二指肠上动脉
- E 脾动脉

正确答案：D 您选择的答案：

第3题 上消化道大出血最常见的原因是

- A 胃十二指肠溃疡
- B 门脉高压症
- C 肝内局限性感染，肝脓肿及外伤
- D 出血性胃炎
- E 胃癌

正确答案：A 您选择的答案：

第4题 上消化道大出血最常见的原因是

- A 食管胃底静脉曲张
- B 胃癌
- C 消化性溃疡
- D 出血性胃炎
- E 胃穿孔

正确答案：C 您选择的答案：

第5题 下列哪项不是胃癌根治术的禁忌证

- A 血性腹水
- B 癌肿固定
- C 腹膜广泛转移
- D 锁骨上淋巴结广泛转移
- E 肝左叶孤立转移性肿块

正确答案：E 您选择的答案：

第6题 毕Ⅱ式胃大部分切除术吻合口近端空肠位置必须高于远端空肠是为了避免发生

- A 内疝
- B 食物向近端空肠逆流
- C 吻合口远端空肠梗阻
- D 吻合口梗阻
- E 近端空肠梗阻

正确答案：B 您选择的答案：

第7题 可适用于各种情况的胃十二指肠溃疡的手术方式是

- A 毕Ⅱ式胃大部切除术
- B 选择性迷走神经切断加引流术
- C 选择性胃迷走神经切断加胃窦切除术
- D 毕Ⅰ式胃大部切除术
- E 高选择性迷走神经切断术

正确答案：D 您选择的答案：

第8题 提高胃癌治愈率的关键是

- A 早期诊断
- B 根治性手术
- C 早期应用抗癌药物
- D 术后放疗
- E 综合治疗

正确答案：A 您选择的答案：

第9题 十二指肠溃疡伴有幽门不全梗阻者应选择的治疗方法是

- A 胃管减压，输液疗法
- B 胃大部切除术
- C 高选择性迷走神经切断术
- D 选择性迷走神经切断术加幽门成形
- E 胃空肠吻合术

正确答案：B 您选择的答案：

第10题 胃癌好发于

- A 胃小弯

- B 胃大弯
- C 胃窦
- D 胃底
- E 胃体

正确答案：C 您选择的答案：

第11题 胃穿孔具有特征性的X线影像是哪项

- A 胃泡增大影像
- B 膈下游离气体征像
- C 气液平面像
- D 两侧膈肌升高像
- E 肠管膨胀像

正确答案：B 您选择的答案：

第12题 胃术后近端空肠综合征的主要表现为

- A 呕吐胆汁及食物
- B 呕吐大量胆汁
- C 呕吐食物不伴胆汁
- D 上腹部疼痛
- E 黄疸

正确答案：B 您选择的答案：

第13题 下列哪项可判断为早期胃癌

- A 病灶局限于胃窦内
- B 病灶局限于粘膜或粘膜下层
- C 病灶直径在2cm以内
- D 无淋巴结转移
- E 病灶局限于胃小弯

正确答案：B 您选择的答案：

第14题 因溃疡病作胃大部切除术，适当的胃切除是

- A 30% ~ 40%
- B 40% ~ 50%
- C 50% ~ 60%
- D 60% ~ 70%
- E 70% ~ 80%

正确答案：C 您选择的答案：

第15题 胃穿孔特征性X线表现是

- A 胃扩张像
- B 胃停止蠕动
- C 膈下游离气体
- D 气液平面
- E 膈肌抬高

正确答案：C 您选择的答案：

第16题 胃、十二指肠溃疡急性穿孔非手术治疗最关键的措施是

- A 胃肠减压
- B 使用抗生素
- C 抑酸
- D 营养支持
- E 补液

正确答案：A 您选择的答案：

第17题 胃癌在下列哪种情况下不能行根治性手术

- A 肝总动脉淋巴结有转移时
- B 腹腔动脉淋巴结有转移时
- C 肝，腹膜，肠系膜广泛转移时
- D 癌浸润到横结肠或脾脏时
- E 肝左外叶局限性癌浸润时

正确答案：C 您选择的答案：

第18题 胃癌最常发生的转移途径

- A 直接蔓延
- B 血行转移
- C 种植转移
- D 淋巴转移
- E 沿肠管转移

正确答案：D 您选择的答案：

第19题 胃溃疡的好发部位是

- A 胃底部
- B 胃大弯
- C 贲门部
- D 胃后壁
- E 胃小弯

正确答案：E 您选择的答案：

第20题 胃十二指肠急性穿孔施行非手术疗法最关键的治疗措施为

- A 禁食

- B 胃肠减压
- C 补液，输血
- D 针灸，中药
- E 选用抗生素

正确答案：B 您选择的答案：

第21题 幽门梗阻的主要特征是

- A．上腹部广泛压痛
- B．肛门停止排气排便
- C．频繁反酸，嗝气
- D．呕吐宿食，不含胆汁
- E．钡餐检查呈十二指肠球部畸形

正确答案：D 您选择的答案：

第22题 胃大部切除手术治疗十二指肠溃疡的原因是

- A 切除溃疡病变
- B 预防癌变
- C 阻断迷走神经刺激
- D 降低胃酸分泌
- E 预防穿孔

正确答案：D 您选择的答案：

第23题 十二指肠球部后壁溃疡并发大出血，血管多来自

- A 胃右动脉
- B 胃网膜右动脉
- C 腹腔动脉
- D 脾动脉的分支
- E 胰十二指肠上动脉

正确答案：E 您选择的答案：

第24题 关于胃十二指肠大出血，下列哪项正确

- A 肠鸣音减弱或消失
- B 可有移动性浊音
- C 出现休克，说明失血量至少超过1500ml
- D 胃小弯溃疡出血，常来自胃左、右动脉
- E 十二指肠后壁出血来自胰十二指肠下动脉

正确答案：D 您选择的答案：

第25题 溃疡病穿孔后，最早出现的体征是

- A 脉搏增加
- B 高热
- C 血压升高
- D 满腹强直
- E 膈下游离气体

正确答案：D 您选择的答案：

第26题 胃十二指肠急性穿孔最易形成

- A 右侧膈下脓肿
- B 左侧膈下脓肿
- C 盆腔脓肿
- D 肠间脓肿
- E 肝脓肿

正确答案：A 您选择的答案：

第27题 上消化道出血可表现为呕血或黑便，最重要取决于

- A 出血的部位
- B 出血的量和速度
- C 病变的性质
- D 凝血机制
- E 胃肠蠕动情况

正确答案：B 您选择的答案：

第28题 早期胃癌是指

- A．癌灶仅侵及黏膜层
- B．癌灶仅侵及黏膜或黏膜下层
- C．癌灶直径 0.5cm
- D．未侵及浆膜层
- E．无淋巴结转移

正确答案：B 您选择的答案：

第29题 治疗十二指肠溃疡欲达到消除神经性胃分泌，而不引起胃滞留、保留幽门括约肌的功能和正常胃容积，下列哪项手术方式为首选

- A．高选择性胃迷走神经切断术
- B．迷走神经干切断术
- C．选择性胃迷走神经切断术
- D．胃窦部切除加胃十二指肠吻合术
- E．选择性胃迷走神经切断术加幽门成形术

正确答案：A 您选择的答案：

第30题 毕 式胃大部切除术后碱性反流性胃炎的治疗宜采用

- A 药物治疗
- B 饮食调整
- C 再行胃切除术
- D 胃迷走神经切断
- E 改行空肠Y型吻合术

正确答案：E 您选择的答案：

第31题 胃溃疡急性穿孔，最理想的治疗方法是

- A 非手术治疗(包括胃肠减压)
- B 穿孔修补术
- C 溃疡楔形切除术
- D 胃大部切除术
- E 迷走神经切断和穿孔修补术

正确答案：D 您选择的答案：

第32题 胃窦部肿块型癌肿，5cm×4cm×3cm大小，侵及浆膜层，左肝外侧叶有3cm大小转移灶一个，胰腺正常，其治疗应选择

- A 不宜切除，只能作胃空肠吻合术
- B 不宜手术，只能作全身化疗
- C 根治性胃大部切除+左肝外侧叶切除
- D 根治性胃大部切除+肝动脉插管化疗
- E 根治性胃大部切除+全身化疗

正确答案：C 您选择的答案：

第33题 胃癌的主要转移途径是

- A 肝转移
- B 肺转移
- C 骨转移
- D 淋巴转移
- E 腹腔种植转移

正确答案：D 您选择的答案：

第34题 瘢痕性幽门梗阻伴频繁呕吐时患者最易出现的水电解质紊乱是

- A 代谢性酸中毒，高钾、高钠、高氯
- B 代谢性酸中毒，低钾、低钠、低氯
- C 代谢性碱中毒，低钾、低钠、低氯
- D 代谢性碱中毒，高钾、低钠、低氯
- E 代谢性碱中毒，高钾、高钠、高氯

正确答案：C 您选择的答案：

第35题 胃大部切除术后吻合口溃疡好发于

- A 吻合口的空肠侧
- B 吻合口的胃侧
- C 胃小弯
- D 近端空肠
- E 远端空肠

正确答案：A 您选择的答案：

第36题 胃大部切除术后并发倾倒综合征的病因是

- A 胃切除过多
- B 胃快速排空
- C 胰岛素分泌过量
- D 胃排空延迟
- E 输入段梗阻

正确答案：B 您选择的答案：

第37题 毕 式与毕 式胃大部分切除术的主要区别是

- A 切断十二指肠
- B 切除胃的多少
- C 胃肠吻合口的部位
- D 近端空肠与胃小弯的关系
- E 结肠前或结肠后胃肠吻合

正确答案：C 您选择的答案：

第38题 胃癌的治疗方法哪项正确

- A 早期化疗
- B 扪到肿块者作全胃切除
- C 化疗+放疗
- D 早期胃癌作胃癌根治术
- E 早期胃癌作胃大部切除术

正确答案：D 您选择的答案：

第39题 胃迷走神经切断术有时加幽门成形术的目的是

- A 进一步降低胃酸
- B 防止术后腹泻
- C 有利于消化功能
- D 减低溃疡复发率
- E 解除胃潴留

正确答案：E 您选择的答案：

第40题 胃癌最常见的转移途径是

- A. 直接蔓延
- B. 腹腔种植
- C. 血行转移
- D. 淋巴转移
- E. 手术污染

正确答案：D 您选择的答案：

第41题 溃疡病行胃大部切除的范围在

- A. 30% ~ 40%
- B. 40% ~ 50%
- C. 50% ~ 60%
- D. 60% ~ 70%
- E. 70% ~ 80%

正确答案：C 您选择的答案：

第42题 胃溃疡手术治疗常采用的术式是

- A. 毕 式胃切除术
- B. 毕 式胃切除术
- C. 迷走神经干切断术
- D. 选择性迷走神经切断术
- E. 高选择性迷走神经切断术

正确答案：A 您选择的答案：

第43题 一患者诊断为胃十二指肠溃疡急性穿孔，在送往医院途中，患者体位应为

- A. 平卧位
- B. 左侧卧位
- C. 俯卧位
- D. 右侧卧位
- E. 半卧位

正确答案：B 您选择的答案：

第44题 胃大部切除术后吻合口溃疡好发于

- A. 吻合口的残胃大弯侧
- B. 吻合口的残胃小弯侧
- C. 十二指肠侧
- D. 输入段空肠
- E. 输出段空肠

正确答案：E 您选择的答案：

第45题 胃溃疡首选的手术方法是

- A. 毕 式胃大部分切除术
- B. 毕 式胃大部切除术
- C. 选择性迷走神经切断术
- D. 高选择性迷走神经切断术
- E. 胃空肠吻合术

正确答案：A 您选择的答案：

第46题 胃溃疡最常发生的部位

- A. 贲门旁
- B. 胃后壁
- C. 胃小弯
- D. 胃大弯
- E. 幽门前壁

正确答案：C 您选择的答案：

第47题 十二指肠溃疡并发急性穿孔，下列哪一项适用于非手术治疗

- A. 顽固性溃疡穿孔
- B. 饮食后穿孔
- C. 单纯性小穿孔
- D. 伴有幽门梗阻
- E. 伴有大出血

正确答案：C 您选择的答案：

第48题 幽门梗阻的主要特征是

- A. 有长期溃疡病史
- B. 上腹部广泛压痛
- C. 频繁反酸，嗝气
- D. 呕吐宿食，不含胆汁
- E. 钡餐检查者呈十二指肠球部畸形

正确答案：D 您选择的答案：

第49题 胃癌好发于

- A. 胃体大弯侧
- B. 胃体小弯侧
- C. 胃窦
- D. 幽门
- E. 胃底

正确答案：C 您选择的答案：

第50题 早期胃癌指

- A 局限于胃窦部
- B 局限于粘膜或粘膜下层
- C 直径在2cm以内
- D 尚无淋巴转移
- E 尚未侵及浆膜层

正确答案：B 您选择的答案：

第51题 提高早期胃癌诊断率的三项关键性手段是

- A 纤维胃镜检查，胃液细胞学检查，X线钡餐检查
- B 纤维胃镜检查，胃液酸碱度检查，X线钡餐检查
- C 胃液细胞学检查，粪便隐血试验，X线钡餐检查
- D 胃液细胞学检查，粪便隐血试验，纤维胃镜检查
- E 纤维胃镜检查，粪便隐血试验，X线钡餐检查

正确答案：A 您选择的答案：

第52题 下列术式中哪种最易发生吻合口溃疡

- A 毕 式胃切除术
- B 毕 式胃切除术
- C 胃空肠吻合术
- D 全胃切除术
- E 选择性迷走神经切断加胃窦切除术

正确答案：C 您选择的答案：

第53题 十二指肠后壁溃疡大出血，如果病人条件允许，最好的术式为

- A 高选择性迷走神经切断术
- B 包括溃疡在内的胃大部分切除术
- C 贯穿缝扎出血动脉主干
- D 单纯缝扎出血点
- E 结扎出血点加胃大部分切除术

正确答案：B 您选择的答案：

第54题 必须手术治疗的胃十二指肠溃疡并发症是

- A 出血
- B 穿孔
- C 痉挛性幽门梗阻
- D 水肿性幽门梗阻
- E 疤痕性幽门梗阻

正确答案：E 您选择的答案：

第55题 溃疡病外科治疗的理论基础最终在于

- A 消除分泌胃蛋白酶元-主细胞
- B 消除分泌胃酸-壁细胞
- C 消除分泌胃泌素-G细胞
- D 切除溃疡病灶
- E 阻断神经和体液对胃酸的调节

正确答案：E 您选择的答案：

第56题 倾倒综合征常发生于

- A 迷走神经干切断术后
- B 毕 式胃切除术后
- C 毕 式胃切除术后
- D 幽门成形术
- E 高选择性胃迷走神经切断术后

正确答案：C 您选择的答案：

第57题 溃疡病合并瘢痕性幽门梗阻，频繁呕吐，最易出现

- A 代谢性酸中毒
- B 代谢性碱中毒
- C 低镁血症
- D 低钙血症
- E 高渗性脱水

正确答案：B 您选择的答案：

第58题 胃、十二指肠溃疡急性穿孔，最常见于

- A 胃或十二指肠后壁的穿透性溃疡
- B 幽门附近的胃或十二指肠前壁溃疡
- C 胃小弯前壁或十二指肠球部外侧壁溃疡
- D 胃窦部或十二指肠球部内侧壁溃疡
- E 高位胃溃疡或球后壁溃疡

正确答案：B 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第59题 男性，45岁，上腹隐痛，便潜血阳性，钡餐见胃窦小弯侧粘膜纹理紊乱，胃壁僵直，首先考虑

- A 慢性胃炎
- B 胃溃疡
- C 胃癌

D 胃淋巴瘤
E 萎缩性胃炎

正确答案：C 您选择的答案：

第60题 女性，40岁，有消化性溃疡病史，今日出现呕血及黑粪，病人出冷汗，脉搏细速，呼吸浅促，血压下降，估计出血量为

- A 400～500ml
- B 500～600ml
- C 600～700ml
- D >800ml
- E 700～800ml

正确答案：E 您选择的答案：

第61题 男性，50岁，十二指肠球部溃疡多年。近2月来，餐后上腹胀满，呕吐宿食。体格检查：消瘦，脱水征，上腹稍膨隆，偶见胃型，有振水声，治疗首先选择

- A 使用抗酸，解痉药物治疗
- B 胃肠减压，补液，温氯化钠液洗胃后行胃大部切除术
- C 急诊胃大部切除术
- D 选择性迷走神经切断+幽门成形术
- E 补液，洗胃继续观察

正确答案：B 您选择的答案：

第62题 男性，62岁，十二指肠球部溃疡出血，行旷置式胃大部切除术，术后当晚，胃管流出大量鲜血，血压下降，心率加快，出血原因可能是

- A 吻合口出血
- B 小弯侧胃断端出血
- C 旷置的十二指肠溃疡出血
- D 术后残胃出血
- E 血小板减少引起出血

正确答案：C 您选择的答案：

第63题 男性，40岁，因十二指肠溃疡出血住院抢救，6小时内已输血600ml，测血压10/6kPa，脉率120次/分，肠鸣音活跃，此时宜作哪项治疗

- A 输血加甲氧咪胍静点
- B 输血加去甲肾上腺素冰盐水口服
- C 输血加垂体后叶素静点
- D 输血加胃大部切除术
- E 输血加迷走神经切断术

正确答案：D 您选择的答案：

第64题 男性，46岁，胃痛十余年，近半年症状加重持续上腹痛，尚能进食，上腹部偏右可扪及5cm×6cm肿块，移动浊音阳性，肛诊检查，直肠前壁触及质坚硬节，临床诊断胃癌，下列哪种治疗是合理的

- A 胃癌根治术
- B 胃大部切除术
- C 姑息性胃癌切除术
- D 胃、空肠吻合术
- E 不宜手术

正确答案：E 您选择的答案：

第65题 男性，72岁，餐后呕吐，全身情况差。有关检查提示瘢痕性幽门梗阻。该病例宜采取的处理措施是

- A 迷走神经切断术
- B 胃次全切除术
- C 胃空肠吻合术
- D 加强营养，改善全身情况
- E 迷走神经切断加幽门成形术

正确答案：C 您选择的答案：

第66题 男性，49岁，胃镜显示胃窦部溃疡直径2cm，经内科治疗6周无效，拟行手术，最佳术式为

- A 毕Ⅰ式胃切除术
- B 毕Ⅱ式胃切除术
- C 溃疡修补术
- D 胃大部切除术加选择性迷走神经切断术
- E 高选择性迷走神经切断术

正确答案：B 您选择的答案：

第67题 女性，39岁，因十二指肠溃疡行毕Ⅱ式胃大部切除术，术后恢复尚可。术后2周进食甜豆浆20分钟后出现无力、头晕、心慌、大汗淋漓、面色苍白。此患者是出现了

- A 体位性低血压
- B 输入段梗阻
- C 输出段梗阻
- D 早期倾倒综合征
- E 晚期倾倒综合征

正确答案：D 您选择的答案：

第68题 男性，32岁，上腹隐痛半年，无节律性，钡餐检查，见胃角部有2.5cm突出腔外的龛影，近3天来每天排成形黑粪2次，量不多，血压正常，血红蛋白95g/L最可能的诊断是

- A 慢性浅表性胃炎
- B 十二指肠球部溃疡
- C 胃角溃疡
- D 胃癌

E 胃粘膜脱垂

正确答案：C 您选择的答案：

第69题 男性，61岁，餐后上腹部胀痛10余年，服药可缓解，近3个月来上腹痛加重，服药不缓解，消瘦，大便颜色深。体检：轻度贫血貌，上腹部压痛，未触及包块，移动性浊音阴性。诊断首先考虑为

- A．活动性溃疡
- B．慢性胃炎急性发作
- C．胃溃疡恶变
- D．胃溃疡出血
- E．十二指肠溃疡出血

正确答案：C 您选择的答案：

第70题 男性，40岁，腹胀、呕吐3天，呕吐物中有宿食。十二指肠溃疡病史7年，行内科治疗，症状反复。诊断首先考虑为

- A．急性胃扩张
- B．急性胃肠炎
- C．疤痕性幽门梗阻
- D．肥大性幽门梗阻
- E．高位小肠梗阻

正确答案：C 您选择的答案：

第71题 男性，60岁，溃疡穿孔单纯修补术后7天，体温38℃，右上腹痛，肝区叩痛，右肺下野呼吸音弱，X线右膈升高，可能并发

- A 右下肺炎
- B 急性胆囊炎
- C 再穿孔
- D 右膈下脓肿
- E 急性胰腺炎

正确答案：D 您选择的答案：

第72题 男性，34岁，有多年消化性溃疡病史，近半年来发生瘢痕性幽门梗阻，在出现的临床特点中，哪项不符合实际情况

- A 呕吐量大，多发生于傍晚
- B 呕吐物中含有食物和胆汁
- C 呕吐物中有酸臭味和宿食
- D 有胃型和胃蠕动波
- E 消瘦，脱水，低氯低钾性碱中毒

正确答案：B 您选择的答案：

第73题 男性，38岁，因十二指肠溃疡大出血急诊行胃大部切除毕Ⅱ式，术后第5天突感右上腹剧痛，向右放射，伴高热，呼吸急促，体检右上腹明显压痛，伴肌紧张，未扪及肿块，肝浊音界存在，胸腹透视右膈肌抬高，活动减弱，右肋膈角模糊，膈下未见游离气体，白细胞数 $2.4 \times 10^9/L$ ，最可能的诊断是

- A 急性胰腺炎
- B 急性胆囊炎
- C 右下肺炎
- D 右膈下感染
- E 十二指肠线端漏

正确答案：E 您选择的答案：

第74题 男性，41岁，饱餐后突发上腹痛，迅速蔓延至全腹。体检：急性病容，腹肌强直，全腹压痛反跳痛，以上腹部为甚。立位腹部透视见右膈下新月形气体，可诊断为

- A．膈肌破裂
- B．消化性溃疡穿孔
- C．胆囊炎穿孔
- D．化脓性阑尾炎穿孔
- E．急性胰腺炎

正确答案：B 您选择的答案：

第75题 男性，34岁，饥饿时上腹痛11年，3小时前进食后突感上腹部剧烈疼痛，迅速蔓延至全腹痛，伴有恶心、呕吐。体检：急性病容，板状腹，全腹压痛反跳痛，移动性浊音阳性，肠鸣音消失。此患者最适宜的治疗是

- A．急诊手术
- B．禁食水、胃肠减压
- C．促进胃肠蠕动
- D．抗生素预防感染
- E．补液、营养支持

正确答案：A 您选择的答案：

第76题 男性，50岁，消瘦无力3个月，呕吐宿食，X线钡餐见胃小弯侧胃窦部有充盈缺损，应诊断为

- A 胃溃疡
- B 十二指肠溃疡
- C 胃癌
- D 胃溃疡并幽门梗阻
- E 胃癌幽门梗阻

正确答案：E 您选择的答案：

第77题 男性，35岁，已有胃痛史4年，以往有黑便史，4小时前突发上腹部刀割样疼痛，腹部板样强直，术中证实为十二指肠前壁穿孔，穿孔直径为0.5cm，你认为哪种手术方法最理想

- A 穿孔修补术
- B 胃大部切除术，Billroth I式
- C 胃大部切除术，Billroth II式

D 穿孔修补术加胃、空肠吻合术
E 穿孔修补术加迷走神经切除术
正确答案：C 您选择的答案：

第78题 男性，46岁，上腹部胀痛不适伴呕吐宿食半月余，体检于上腹部可扪及一个3.5cm×3cm之肿块，质地偏硬，活动度小，其最可能的诊断为

- A 胰头癌
- B 十二指肠溃疡伴幽门梗阻
- C 胃窦部癌
- D 胃溃疡
- E 萎缩性胃炎

正确答案：C 您选择的答案：

第79题 女性，60岁，反复黑便，呕吐咖啡色液体一月余，消瘦，腹胀，未触及肿块，血红蛋白5g，白细胞 $6.6 \times 10^9/L$ ，最大可能是

- A 急性胃炎
- B 慢性胃炎
- C 胃癌
- D 胃溃疡
- E 十二指肠溃疡

正确答案：C 您选择的答案：

第80题 男性，20岁，突发上腹刀割样剧痛，迅速波及全腹，腹呈板状硬，右下腹压痛明显，膈下无游离气体，应考虑为

- A 急性阑尾炎
- B 急性胆囊炎
- C 急性肠扭转
- D 肠伤寒穿孔
- E 溃疡病穿孔

正确答案：E 您选择的答案：

第81题 男性，35岁，饱食后突发持续性疼痛，扩散至全腹，X线检查膈下新月形气体，诊断为

- A 急性胰腺炎
- B 绞窄性肠梗阻
- C 胃十二指肠溃疡穿孔
- D 急性阑尾炎穿孔
- E 急性化脓性胆管炎

正确答案：C 您选择的答案：

第82题 男性，42岁，上腹隐痛不适，近一个多月来逐渐加重，服用制酸剂后有所改善，食欲尚可，粪便隐血(++)，胃肠钡餐摄片见胃小弯水平部粘膜纹理紊乱，胃壁僵直不规则，应考的诊断是

- A 胃溃疡
- B 胃窦炎
- C 慢性萎缩性胃炎
- D 胃粘膜脱垂
- E 胃癌

正确答案：E 您选择的答案：

第83题 男性，38岁，3日来上腹隐痛，4小时前突发上腹部剧烈疼痛，持续性无放射，呼吸时加剧，伴恶心，全腹压痛和肌紧张，以上腹部最为明显，肝浊音界缩小，无移动性浊音，应首先考虑

- A 急性胆囊炎
- B 急性胰腺炎
- C 小肠急性扭转
- D 溃疡病急性穿孔
- E 急性阑尾炎

正确答案：D 您选择的答案：

第84题 男性，56岁，餐后上腹胀痛15年，近2个月加重。行胃镜检查见胃窦部溃疡直径约2cm，活检病理显示胃溃疡伴中度不典型增生。该患者如何治疗

- A 继续内科治疗，密切随访
- B 胃大部切除术
- C 迷走神经干切断术
- D 选择性迷走神经切断术
- E 胃癌根治术

正确答案：B 您选择的答案：

第85题 男性，49岁，胃窦部巨大溃疡直径2cm经内科治疗4周无效，拟行手术，首选手术方式为

- A 胃大部切除术，Billroth I式
- B 胃大部切除术，Billroth Ⅱ式
- C 高选择性迷走神经切断术
- D 全胃切除术
- E 胃楔形切除术

正确答案：A 您选择的答案：

第86题 男性，胃大部切除术后4天，突发右上腹剧痛，右侧腹膜炎体征，白细胞 $11 \times 10^9/L$ ，最可能的诊断是

- A 胃肠吻合口破裂
- B 十二指肠残端破裂
- C 急性胆囊炎穿孔
- D 急性胰腺炎
- E 应激性溃疡穿孔

正确答案：B 您选择的答案：

第87题 女性，40岁，上腹部隐痛7个月，发现上腹部包块2个月余。腹部探查见：胃窦部有一6cm×5cm肿块，与胰腺浸润固定，左、右肝叶均可扪及1.5cm×1.5cm大小结节。此病人应行

- A. 姑息性胃肿瘤切除术
- B. 剖腹探查后关腹
- C. 胃癌根治术
- D. 胃空肠吻合术
- E. 胃癌根治及肝叶切除

正确答案：D 您选择的答案：

第88题 男性，39岁，突发上腹剧烈疼痛3小时，既往有饥饿性腹痛史。体检：急性病容，全腹肌紧张，压痛、反跳痛，移动性浊音可疑。急诊行剖腹探查为十二指肠前壁溃疡穿孔，穿孔直径约为0.7cm，应采用何种术式

- A. 穿孔修补术
- B. 穿孔修补加胃、空肠吻合
- C. 溃疡切除、胃十二指肠吻合
- D. 毕Ⅱ式胃切除术
- E. 毕Ⅰ式胃切除术

正确答案：E 您选择的答案：

第89题 男性，45岁，因十二指肠溃疡内科治疗无效行胃大部切除术，毕Ⅱ式，术后第2天突感右上腹剧痛不能忍受。体检：右侧腹部压痛明显，伴肌紧张及反跳痛，以右上腹为著，诊为十二指肠残端漏。应采：取的治疗方案是

- A. 加强抗生素抗感染
- B. 制酸药抑制胃酸分泌
- C. 胃肠减压
- D. 手术引流
- E. 导泻

正确答案：D 您选择的答案：

第90题 男性，46岁，反复上腹部痛4年，近1周上腹胀胀不适、呕吐。呕吐物含隔日所进食物，酸臭味，消化道钡餐24小时后仍有钡剂潴留。不宜选择下列那种治疗措施

- A. 急诊手术
- B. 禁食
- C. 留置较粗胃管以生理盐水洗胃
- D. 静脉营养
- E. 纠正水、电解质紊乱

正确答案：A 您选择的答案：

第91题 男，50岁，上腹胀痛、呕吐宿食半月，上腹可扪及4cm×4cm之肿块，尚活动。该病人最可能的诊断是

- A. 幽门梗阻
- B. 胃癌
- C. 胃窦部胃癌致幽门梗阻
- D. 胰头癌
- E. 横结肠癌

正确答案：A 您选择的答案：

第92题 男性，30岁，2小时前劳动中突发上腹刀割样疼痛，迅速波及全腹，舟状腹，全腹膜刺激征，肝浊音界不清，肠鸣音消失诊断是

- A. 阑尾穿孔腹膜炎
- B. 胃十二指肠溃疡穿孔腹膜炎
- C. 胆囊穿孔腹膜炎
- D. 绞窄性肠梗阻
- E. 急性出血性胰腺炎

正确答案：B 您选择的答案：

第93题 男性，51岁，有溃疡病史7年。半年来上腹隐痛，无规律，进食后加重，钡餐检查示胃粘膜增粗，胃窦部见0.3cm×0.3cm龛影，胃蠕动正常。下列诊断首先考虑的是

- A. 胃溃疡
- B. 复合性溃疡
- C. 胃溃疡恶变
- D. 胃溃疡合并幽门梗阻
- E. 胃溃疡但不排除恶变

正确答案：E 您选择的答案：

第94题 男性，40岁，有胃痛史多年，并向腰背部放射疼痛，经内科药物治疗效果不显著，经胃镜检查诊断为胃角后壁溃疡，向胰腺穿透，病理检查排除癌肿，首选手术方式

- A. 选择性迷走神经切断术
- B. 毕Ⅰ式胃大部切除术
- C. 毕Ⅱ式胃大部切除术
- D. 胃大部切除术，溃疡旷置
- E. 胃空肠吻合术

正确答案：B 您选择的答案：

第95题 男性，40岁，近3日腹胀，呕吐，呕吐物中有宿食，临床诊断首先考虑为

- A. 急性胃炎
- B. 急性胃扩张
- C. 高位小肠梗阻
- D. 幽门梗阻
- E. 肥大型幽门狭窄

正确答案：D 您选择的答案：

第96题 男性，45岁，十二指肠溃疡大出血6小时内输血900ml，脉搏110次/分，血压70/50mmHg，宜进行

- A 输血加静脉滴注甲氧胺
- B 输血，口服去甲肾上腺素10ml
- C 输血，冰水灌洗胃腔
- D 输血，三腔两囊管压迫止血
- E 输血，急行胃大部切除术

正确答案：E 您选择的答案：

第97题 男性，25岁，上腹部刀割样疼痛2小时，并迅速转移至右下腹。查体：全腹压痛，伴反跳痛及肌紧张，肠鸣音消失，肝浊音界缩小。既往无溃疡病史。最可能的诊断是

- A 急性阑尾炎穿孔
- B 十二指肠溃疡穿孔
- C 急性胰腺炎
- D 急性胆囊炎
- E 急性肠梗阻

正确答案：B 您选择的答案：

第98题 男性，35岁，因十二指肠溃疡作胃大部切除，毕式，术后第5天，突然出现上腹部剧烈疼痛，局部压痛，肌紧张及反跳痛，继而发热37.8℃，应先考虑

- A 急性胆囊炎
- B 近侧空肠段梗阻
- C 十二指肠残端破裂
- D 内疝
- E 急性小肠梗阻

正确答案：C 您选择的答案：

第99题 男性，55岁，胃溃疡史三年，今晨突发上腹剧痛，诊断为急性穿孔，理想的手术是

- A 穿孔修补术
- B 大网膜填塞术
- C 胃大部切除术
- D 溃疡楔形切除
- E 穿孔修补加选择性迷走神经切断术

正确答案：C 您选择的答案：

第100题 男性，45岁，5年来有上腹部规律性疼痛，近半年来加剧，厌食消瘦，大便隐血持续阳性，应首先考虑

- A 胃溃疡
- B 胃溃疡恶变
- C 胃溃疡并发出血
- D 胃溃疡伴胃窦炎
- E 慢性萎缩性胃炎

正确答案：B 您选择的答案：

三、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第101-103题

男性，45岁，患十二指肠溃疡反复出血，行胃大部切除术，毕式，术后第三天诉右上腹剧痛不能忍受，右侧腹部压痛明显，伴肌紧张及反跳痛，右上腹较著，诊为十二指肠残端漏

1. 此情况多见于

- A 十二指肠巨大溃疡行胃大部切除术后
- B 胃大弯溃疡行胃大部切除术后
- C 胃底贲门溃疡行胃大部切除术后
- D 胃窦溃疡行胃大部切除术后
- E 胃小弯溃疡行胃大部切除术后

2. 产生这一并发症的原因主要是

- A 胃切除过多
- B 十二指肠残端关闭不严
- C 腹腔未放置引流
- D 胃肠减压失效
- E 未加作迷走神经切断

3. 最佳治疗方法

- A 加强抗生素消炎
- B 胃肠减压
- C 手术引流
- D 补液，观察
- E 中药治疗

正确答案：ABC 您选择的答案：

第104-106题

男性，47岁，半年前开始出现餐后上腹疼痛，经服用甲氧咪呱缓解，一周前又出现此症状，至医院就诊，胃镜发现胃小弯侧溃疡性病变，病理证实良性

1. 如行X线钡透，有何结果

- A 龛影
- B 充盈缺损
- C 胃粘膜紊乱，壁僵直
- D 胃粘膜纹破坏，中断
- E 小弯侧指状压迹

2. 何种治疗方法为首先

- A 内科治疗
 - B 毕I式胃大部切除
 - C 毕Ⅱ式胃大部切除
 - D 迷走神经切断术
 - E 近端胃切除
3. 患者术后第6天, 胃管内流出咖啡色胃液300ml, 最可能是因为

- A 吻合口感染
- B 吻合口瘘
- C 术后正常出血
- D 吻合口部分粘膜坏死脱落
- E 术中止血不确切

正确答案: ABD 您选择的答案:

第107-109题

男性, 髓岁, 近三个月逐渐出现上腹部不适, 进食后饱胀, 暖气, 纤维胃镜发现大弯侧胃壁上1cm大小块状肿物, 与周围组织界限不清, 病理回报恶性

1. 该肿瘤Bormam分型

- A I型
- B Ⅱ型
- C Ⅲ型
- D Ⅳ型
- E V型

2. 如行根治手术, 可以保留的淋巴结为

- A 沿胃小弯淋巴结
- B 肝总动脉周围淋巴结
- C 幽门下区淋巴结
- D 腹主动脉旁淋巴结
- E 贲门左区淋巴结

3. 该疾病治疗最关键的是

- A 彻底清除淋巴结
- B 切除范围距肿瘤边缘6~8cm
- C 术后坚持化疗
- D 早诊早治
- E 设法保留部分胃底

正确答案: ADD 您选择的答案:

第110-113题

男, 38岁, 上腹部隐痛伴吐酸水数年, 今天早上突发上腹剧痛, 呈刀割样。查体: 上腹及右下腹压痛明显, 轻度腹肌紧张, 肠鸣音减弱。血常规: 白细胞及中性粒细胞均升高。

1. 该病人最可能的诊断是

- A. 急性胰腺炎
- B. 急性阑尾炎
- C. 胃十二指肠溃疡穿孔
- D. 急性胆囊炎
- E. 肝脓肿

2. 为明确诊断, 最好的检查方法是

- A. 纤维光束胃镜
- B. 立位腹部平片
- C. X线钡餐检查
- D. B超
- E. CT

3. 最好的治疗方法是

- A. 禁食, 输液, 胃肠减压, 全身使用抗生素
- B. 行胃大部切除术
- C. 中药治疗
- D. 行阑尾切除术
- E. 肌注抗生素

该病人在住院期间, 经过一段时间治疗, 症状、体征不见好转, 反而加重, 应改用手术治疗。

4. 保守观察时间最好是

- A. 72小时
- B. 48~50小时后
- C. 36~48小时后
- D. 24~26小时后
- E. 6~8/小时后

正确答案: CBAE 您选择的答案:

第114-115题

女性, 48岁, 反复黑便1个月余, 1小时前突然呕鲜血2次量约800ml, 头晕、心慌、恶心。患者近10年来经常出现饥饿时上腹痛。体检: 贫血貌, 四肢湿冷, 血压80/60mmHg(10.7/8.0kPa), 脉搏120次/分, 上腹部压痛, 无反跳痛, 移动性浊音阴性, 肠鸣音亢进。

1. 该患者出血原因首先考虑为

- A. 食管胃底静脉曲张破裂
- B. 消化性溃疡大出血
- C. 出血性胃炎
- D. 胆道出血
- E. 胃癌出血

2. 应选用何种治疗措施

- A. 快速补液
- B. 加强药物抑制胃酸分泌
- C. 三腔管压迫止血

D. 胃肠减压
E. 抗休克同时积极准备探查手术
正确答案：BE 您选择的答案：

第116-118题

男性，32岁，饱食后突感右上腹部剧痛，迅速转移到右下腹和下腹部，伴恶心，呕吐不能减轻腹痛。发病6小时来院急诊，体检：痛苦貌，血压12/8kPa，脉搏120次/分，全腹肌紧张，压痛，反跳痛，以上腹和右上腹部为著，肠鸣音消失，肝浊音界存在，白细胞 $16 \times 10^9/L$ ，中性0.9

1. 最可能的诊断是

- A. 肠扭转
- B. 十二指肠溃疡急性穿孔
- C. 急性胆囊炎伴穿孔
- D. 急性胰腺炎
- E. 阑尾炎穿孔致腹膜炎

2. 为明确诊断首先要进行

- A. 血清淀粉酶测定
- B. 急诊钡餐造影
- C. 急性静脉胆道造影
- D. 腹部立位平片
- E. 腹腔穿刺

3. 经检查决定剖腹手术，术前准备中最关键的措施是

- A. 禁食
- B. 插胃管，胃肠减压
- C. 半卧位
- D. 应用抗生素
- E. 补液，输血

正确答案：BDE 您选择的答案：

第119-121题

男性，41岁，近1周每日下午上腹部胀痛，晚间呕吐，呕吐物含宿食，酸臭，呕吐后感舒适。体检，消瘦，轻度脱水貌，上腹部膨隆，可见胃蠕动波，振水音阳性，移动性浊音阴性。

1. 最可能的诊断是

- A. 麻痹性肠梗阻
- B. 十二指肠淤滞症
- C. 十二指肠肿瘤
- D. 瘢痕性幽门梗阻
- E. 贲门失迟缓症

2. 最有助于诊断的检查方法为

- A. 纤维胃镜
- B. 上消化道钡餐
- C. 胃液分析
- D. 腹部X线片
- E. 腹部超声

3. 最有效的治疗是

- A. 胃肠减压
- B. 维持水电解质平衡
- C. 营养支持
- D. 胃大部切除术
- E. 幽门瘢痕狭窄切除

正确答案：DBD 您选择的答案：

四、A4型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第122-126题

男性，54岁，上腹部疼痛不适4个月，食欲差，消瘦，口服药物治疗无明显缓解。体检：消瘦，中上腹轻度压痛，腹部未触及明显包块，移动性浊音阴性。大便潜血试验阳性。

1. 首先考虑的疾病是

- A. 胃癌
- B. 胃溃疡
- C. 慢性胃炎
- D. 食管反流
- E. 十二指肠溃疡

2. 为明确诊断首选哪项检查

- A. 上消化道钡餐
- B. 纤维胃镜并活检送病理
- C. 胃液脱落细胞学检查
- D. 大便脱落细胞学检查
- E. 血液肿瘤标记物

3. 若检查结果显示为胃窦部溃疡性癌，癌肿直径约2cm，术中见肿瘤未侵及浆膜，宜选择的治疗是

- A. 放疗
- B. 静脉化疗
- C. 远端胃大部切除术
- D. 全胃切除术
- E. 胃部分切除术

4. 上述治疗胃切断线距肿瘤肉眼距要求达到

- A. 3cm
- B. 4cm
- C. 5cm

D. 7cm

E. 8cm

5. 如术后病理结果：胃窦部腺癌，肿瘤穿破浆膜，距原发灶边缘3cm内的淋巴结3 / 7转移，3cm以外的淋巴结无转移，未发现远处转移。依据PTNM分期应定为

A.

B.

C. A

D. B

E.

正确答案：ABCCC 您选择的答案：

第127-129题

女性，29岁，反复剑突下疼痛3年，再发约20天，多于进食后3~4小时发作，进食可略缓解。已行4个疗程正规内科治疗，此次发作时服药后仍可缓解，但缓解期变短。胃镜检查十二指肠球前壁见一直径约1.5cm溃疡。

1. 该患者宜选择的治疗是

A. 再次内科治疗一个疗程，药量适当增加

B. 毕式胃大部切除术

C. 毕式胃大部切除术

D. 溃疡楔形切除加幽门成形

E. 单纯胃空肠吻合

2. 假如术后恢复进食后30分钟左右上腹突然胀痛，恶心，喷射状呕吐大量不含食物的胆汁，吐后症状即缓解，此为

A. 残胃蠕动无力

B. 急性完全性输入段梗阻

C. 慢性不完全性输入段梗阻

D. 早期倾倒综合征

E. 晚期倾倒综合征

3. 引起上述并发症的原因为

A. 输入段扭曲系膜牵拉形成索带压迫输入段

B. 输入段过长，穿入输出段系膜与横结肠系膜之间隙空，形成内疝

C. 输入段太长或太短使吻合口处形成锐角，消化液排空不畅

D. 胃快速排空

E. 胰岛素大量释放，低血糖综合征

正确答案：CCC 您选择的答案：

五、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第130-131题

A. 十二指肠球部溃疡

B. 胰源性溃疡

C. 浅表性胃炎

D. 胃窦部溃疡

E. 胃窦癌

1. BUboth 式胃大部切除术适用于

2. Billroth 式胃大部切除术适用于

正确答案：AD 您选择的答案：

第132-134题

A. 呕吐物为食物，无胆汁

B. 呕吐物为胆汁，无食物

C. 呕吐物既有胆汁，又有食物

D. 呕吐物呈酸臭味，有宿食

E. 无呕吐

1. 胃术后远端空肠段梗阻

2. 胃术后低血糖综合征

3. 近端空肠内疝形成

正确答案：CEA 您选择的答案：

第135-137题

A. 急性完全性输入段梗阻

B. 慢性不完全性输入段梗阻

C. 吻合口梗阻

D. 输出段梗阻

E. 碱性反流性胃炎

1. 胃大部切除术后2年，剑突下持续性疼痛，进食后加重，常有胆汁性呕吐，呕吐后仍有疼痛，抗酸剂无效

2. 胃大部切除术后，餐后20分钟上腹部胀痛，随后呕吐大量胆汁，不含食物，呕吐后症状缓解

3. 胃大部切除术后，餐后上腹部饱胀，伴呕吐物既含胆汁，又有食物

正确答案：EBD 您选择的答案：

第138-139题

A. 胃小弯或十二指肠后壁

B. 胃大弯侧

C. 胃小弯侧

D. 幽门或十二指肠球后壁

E. 胃窦幽门管

1. 胃溃疡多发生于

2. 胃癌多发生于

正确答案：CE 您选择的答案：

第140-143题

- A 呕吐物为食物，无胆汁
- B 呕吐物为胆汁，无食物
- C 呕吐物既有胆汁，又有食物
- D 呕吐物呈酸臭味，有宿食
- E 无呕吐
- 1. 胃术后吻合口梗阻
- 2. 胃术后近端空肠段综合征
- 3. 残胃无张力
- 4. 胃术后近端空肠段逆流

正确答案：ABCC 您选择的答案：

第144-148题

- A. 呕吐物为食物，无胆汁
- B. 频繁呕吐少量不含胆汁液体
- C. 喷射状呕吐大量不含食物的胆汁
- D. 呕吐食物和胆汁
- E. 呕吐酸臭宿食
- 1. 瘢痕性幽门梗阻
- 2. 输出段梗阻
- 3. 急性完全性输入段梗阻
- 4. 慢性不全性输入段梗阻
- 5. 吻合口狭窄

正确答案：EDBCA 您选择的答案：

习题集 外科学 腹部损伤

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 腹部最容易受伤的实质性脏器是

- A. 肝脏
- B. 脾脏
- C. 胰腺
- D. 肾脏
- E. 肾上腺

正确答案：B 您选择的答案：

第2题 结肠破裂的诊断哪项错误

- A. 结肠损伤发病率较小肠低
- B. 结肠内容物细菌含量多，腹膜炎发生较早
- C. 一部分结肠位于腹膜后，受伤后容易漏诊
- D. 发病初生命体征多平稳
- E. 血红蛋白不一定下降

正确答案：B 您选择的答案：

第3题 肝脏损伤非手术治疗的指征不包括

- A. 合并胸部损伤
- B. 无腹膜炎体征
- C. 收缩压在90mmHg(12kPa)，脉率低于分
- D. B超确定肝损伤为轻度
- E. 未发现其他内脏合并伤

正确答案：A 您选择的答案：

第4题 哪项对诊断腹部外伤合并内出血价值最大

- A. 收缩压低于90mmHg(12kPa)，脉搏大于100次/分
- B. 腹膜刺激征
- C. 腹腔穿刺抽得不凝固血液
- D. 有左季肋部骨折
- E. 血红蛋白80g/L，红细胞 $2.5 \times 10^{12}/L$

正确答案：C 您选择的答案：

第5题 腹部闭合性损伤诊断的关键在于确定有无

- A. 休克
- B. 内脏损伤
- C. 腹壁损伤
- D. 腹膜后血肿
- E. 颅脑损伤

正确答案：B 您选择的答案：

第6题 腹部最容易受伤的空腔脏器是

- A. 胃
- B. 小肠
- C. 结肠
- D. 直肠
- E. 十二指肠

正确答案：B 您选择的答案：

第7题 严重结肠损伤的治疗最好为

- A. 裂伤缝合
- B. 肠切除，肠吻合术
- C. 肠外置造口术
- D. 肠捷径吻合
- E. 以上都不是

正确答案：C 您选择的答案：

第8题 正常人常温下阻断入肝血流的安全时限约

- A. 10分钟
- B. 15分钟
- C. 30分钟
- D. 45分钟
- E. 60分钟

正确答案：C 您选择的答案：

第9题 确诊为腹膜后血肿之后，在治疗上最要注意的并发症是：

- A. 失血性休克的防治
- B. 肠麻痹的处理
- C. 失水、酸中毒的纠正
- D. 感染的防治
- E. 电解质紊乱的纠正

正确答案：D 您选择的答案：

第10题 腹部外伤合并失血性休克，主要处理原则为

- A. 快速补充液体

- B 给予大量止血药物
 - C 主要为输血以补足血容量
 - D 应用大量抗生素控制感染
 - E 在积极治疗休克的同时手术探查止血
- 正确答案：E 您选择的答案：

第11题 腹部外伤伴有内出血休克，最重要的处理原则是

- A 补充液体
- B 给予镇静药
- C 使用血管活性物质
- D 控制感染
- E 及时手术探查

正确答案：E 您选择的答案：

第12题 对创伤性肝破裂患者的手术处理，下列哪项是错误的

- A 彻底清创
- B 确切止血
- C 清除胆汁溢漏
- D 裂口不深者可直接缝合裂口
- E 止血彻底者可不放置引流物

正确答案：E 您选择的答案：

第13题 腹部最易损伤的空腔脏器是

- A 结肠
- B 胃
- C 小肠
- D 直肠
- E 十二指肠

正确答案：C 您选择的答案：

第14题 腹部损伤行腹腔穿刺抽得不凝血液，应考虑诊断为

- A 空腔脏器破裂
- B 实质脏器破裂
- C 后腹膜血肿
- D 误穿入腹腔血管
- E 前腹壁血肿

正确答案：B 您选择的答案：

第15题 关于脾破裂以下哪项是不正确的

- A 行脾切除术
- B 行脾缝合修补术
- C 待失血性休克好转后手术
- D 可收集腹腔内出血行自家输血
- E 白细胞计数多升高

正确答案：C 您选择的答案：

第16题 腹部闭合性损伤诊断中最关键的问题是确定

- A 是否有内脏损伤
- B 是何种脏器受到损伤
- C 是否为多发性损伤
- D 有无腹膜后脏器损伤
- E 是否合并颅脑损伤

正确答案：A 您选择的答案：

第17题 诊断腹腔内脏器损伤最有价值的方法是

- A 超声波检查
- B 腹部X线平片
- C 腹部CT检查
- D 腹部MRI检查
- E 腹腔穿刺腹腔灌洗术

正确答案：E 您选择的答案：

第18题 在诊断闭合性腹部外伤合并内出血中以下哪项最重要

- A 左季肋部挫伤合并肋骨骨折
- B 血红蛋白80g/L，红细胞 $2.5 \times 10^{12}/L$
- C 左上腹明显压痛及肌紧张
- D 腹腔穿刺抽出不凝固血液
- E 血压80/60mmHg，脉搏110/分

正确答案：D 您选择的答案：

第19题 诊断腹部闭合性损伤胃破裂，最有意义的是

- A 白细胞计数及中性粒细胞数增高
- B 腹部肌紧张及反跳痛
- C 有固定压痛点
- D 膈下游离气体
- E 超声波测出腹腔内有积液

正确答案：D 您选择的答案：

第20题 结肠破裂的诊断，哪项是错误的

- A 结肠损伤比小肠损伤机会少

B 一部分结肠位于腹膜后，伤后易漏诊
C 结肠内液体成分少而细菌多，故腹膜炎出现的较早
D WBC总数增高
E Hb，RBC不一定下降
正确答案：C 您选择的答案：

第21题 诊断腹腔内脏损伤最有价值的方法是

A 超声波检查
B 腹腔穿刺腹腔灌洗术
C 腹部压痛
D X线检查
E 同位素扫描
正确答案：B 您选择的答案：

第22题 当腹部闭合性损伤尚未明确，在观察期间下列哪项措施是不恰当的

A 不随便搬动患者，以免加重伤情
B 不给饮食，以防消化道穿孔者腹腔污染加重
C 注射止痛剂，以防止创伤性休克
D 注射广谱抗生素，预防和治疗可能存在的感染
E 胃肠减压，减轻腹胀
正确答案：C 您选择的答案：

第23题 诊断外伤性脾破裂下列哪项最重要

A 左上腹有外伤史
B 有早期休克表现
C 腹部有压痛而且逐渐扩大
D 有进行性贫血
E 诊断性腹腔穿刺，有不凝固血液
正确答案：E 您选择的答案：

第24题 回肠小穿孔早期查无腹膜刺激症状，因为

A 临近肠管紧贴穿孔，堵塞穿孔
B 肠腔空虚内无粪便
C 机体防御能力强，反应迟钝
D 肠管痉挛，粘膜外翻，血凝块堵塞
E 肠麻痹，肠蠕动消失，肠内容物不外漏
正确答案：D 您选择的答案：

第25题 肝脏破裂腹膜炎症状较重的原因是

A 肝包膜破裂疼痛
B 出血量大
C 出血容易蔓延至全腹
D 胆汁溢入腹腔
E 易撕裂十二指肠
正确答案：D 您选择的答案：

第26题 下列哪项不是腹部闭合性损伤的手术适应证

A 有失血性休克
B 有急性腹膜炎体征
C 腹腔穿刺有凝固血液
D 腹部有明显移动性浊音
E X线片膈下游离气体
正确答案：C 您选择的答案：

第27题 下列脾破裂的处理，错误的是

A 破裂严重时，可行脾切除
B 破裂小时可行脾修补
C 待失血性休克好转后再行手术
D 可收集腹腔内血液行自身输血
E 输血补液以纠正血容量不足
正确答案：C 您选择的答案：

第28题 关于肝破裂诊断下列哪项是错误的

A 右上腹外伤
B 局部疼痛及压痛
C 血红蛋白值逐渐下降
D 心率加快
E 必须等待腹腔穿刺抽出血液
正确答案：E 您选择的答案：

第29题 凡有创伤史者，遇有下列情况均应疑有腹内脏器损伤，除外

A 伤后早期出现休克征象
B 伤后有明显腹膜刺激征
C Grey-Turner征
D 有气腹表现
E 腹部出现移动性浊音
正确答案：C 您选择的答案：

第30题 腹部损伤行腹腔穿刺抽得不凝血液，诊断应考虑为

A 腹壁血肿或误入腹壁血管

- B. 误穿腹腔血管
- C. 空腔脏器破裂
- D. 实质性脏器破裂
- E. 后腹膜血肿

正确答案：D 您选择的答案：

第31题 腹部外伤合并失血性休克，处理原则是

- A. 大量补充晶体液
- B. 大量补充胶体液
- C. 大量输血补充血容量
- D. 应用广谱抗生素预防感染
- E. 积极抗休克治疗的同时手术探查止血

正确答案：E 您选择的答案：

第32题 腹部闭合性损伤患者，最有价值的症状体征

- A. 腹部压痛
- B. 腹膜刺激征
- C. 肠鸣音亢进
- D. 肠鸣音减弱
- E. 恶心、呕吐

正确答案：B 您选择的答案：

第33题 腹部闭合性损伤诊断尚未明确，下列处理下正确的是

- A. 禁食，输液
- B. 可重复进行诊断性腹腔穿刺或灌洗术
- C. 严密观察生命体征
- D. 定时复查血常规
- E. 注射哌替啶止痛

正确答案：E 您选择的答案：

第34题 小肠破裂最常用的手术方法是

- A. 简单修补
- B. 小肠切除吻合术
- C. 肠外置造口术
- D. 双筒造口术
- E. 以上都不是

正确答案：A 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第35题 一体操运动员，练习时翻高低杠折腹，突然上腹疼痛，两小时后疼痛加剧，疼痛主要位于右上腹，且有对应部位背部疼痛，曾有血性呕吐物，X线见腹膜后有气体，应考虑诊断

- A. 肝破裂
- B. 胆囊破裂
- C. 右肾破裂
- D. 十二指肠破裂
- E. 腹膜后血管破裂

正确答案：D 您选择的答案：

第36题 患者40岁，胸腹部摔伤，呼吸困难，腹痛，呕吐，血压90/70mmHg，右肺呼吸音弱，右上腹压痛，腹肌紧张，反跳痛明显，腹部无明显移动性浊音，肠鸣音弱，X线光检查，右侧膈肌升高，活动受限，右7、8、9肋骨骨折，诊断

- A. 胃破裂
- B. 肠破裂
- C. 脾破裂
- D. 肝破裂
- E. 损伤性气胸

正确答案：D 您选择的答案：

第37题 男性，14岁，体育课翻单杠时上腹撞击单杠，突发上腹痛，且对应部位背痛，呕吐血性物一次。腹部X线片显示右肾周围有气体集聚。诊断应考虑

- A. 肝破裂
- B. 胆囊破裂
- C. 右肾破裂
- D. 十二指肠破裂
- E. 胰腺破裂

正确答案：D 您选择的答案：

第38题 女性，35岁，车祸外伤后全腹痛。体检：血压60/40mmHg(8/5.3kPa)，心率120次/分。诊断尚不明确，抗休克治疗同时剖腹探查，探查中发现腹膜后血肿、胆汁染色和捻发音。患者最可能的损伤是

- A. 肝破裂
- B. 胆囊破裂
- C. 肾破裂
- D. 十二指肠损伤
- E. 腹膜后血管破裂

正确答案：D 您选择的答案：

第39题 女性，26岁，擦窗户时不慎自三楼坠下，左侧身体着地，被立即送往医院。体检：面色苍白-口唇色淡，血

压60 / 40mmHg (8 / 5, 3kPa), 脉搏110次 / 分, 体温37.8, 全腹腹肌紧张, 压痛, 以上腹部为甚, 诊断性腹腔穿刺抽到不凝固血液, 则最可能的诊断是

- A. 左侧结肠破裂
- B. 脾破裂
- C. 肝破裂
- D. 胃破裂
- E. 上段小肠破裂出血

正确答案: B 您选择的答案:

第40题 男, 35岁, 左下腹被拖拉机压伤后4天入院, 入院时有弥漫性腹膜炎、感染性休克。经积极抗休克治疗后, 行剖腹探查术, 术中见腹腔内有黄色脓液及粪便, 降结肠下段有一0.5cm大小的穿孔, 有粪便溢出。下列术式哪项最妥当

- A. 降结肠修补
- B. 左半结肠切除
- C. 降结肠穿孔处切除端端吻合
- D. 降结肠外置
- E. 穿孔处修补、横结肠造口

正确答案: E 您选择的答案:

第41题 男性, 22岁, 腹部被拳击2小时, 经查体, 化验检查, X线腹透及腹腔穿刺未明确诊断, 现应如何处理为宜

- A. 立即剖腹探查, 免于误诊
- B. 注射杜冷丁止痛
- C. 严密观察腹部体征的变化
- D. 多活动, 使体征明朗化, 便于确诊
- E. 禁饮食补液, 作好术前准备

正确答案: C 您选择的答案:

第42题 患者男性, 30岁, 二天前左胸被自行车把撞伤, 拍片见左7, 8肋骨骨折, 余未见异常, 今日上午下楼梯突然腹痛, 面色苍白, 急送医院, 查BP 50/30mmHg, P 140次 / 分, 弥漫性腹膜炎, 腹穿抽出1ml不凝血, 诊断

- A. 上消化道出血
- B. 外伤后腹膜后血肿破裂
- C. 迟发性脾破裂
- D. 虚脱
- E. 肝被膜下血肿破裂

正确答案: C 您选择的答案:

第43题 男性, 45岁, 司机, 车祸时撞伤右肋及上腹部。腹痛, 烦躁, 口渴。体检: 面色苍白, 唇干, 血压80 / 60mmHg (10.6 / 8kPa), 脉搏100次 / 分, 上腹部压痛, 腹肌紧张。正确的处理措施是

- A. 饮水止渴
- B. 吗啡或哌替啶止痛
- C. 行上腹部CT
- D. 胸腹联合透视
- E. 腹腔穿刺或腹腔灌洗

正确答案: E 您选择的答案:

第44题 患者上腹被汽车撞伤4小时, 面色苍白, 四肢厥冷, 血压60/45mmHg, 脉搏104次/分, 全腹压痛及反跳痛明显, 肠鸣音减弱。应考虑

- A. 胆囊破裂, 胆汁性腹膜炎
- B. 小肠破裂, 弥漫性腹膜炎
- C. 肝脾破裂, 血性腹膜炎
- D. 严重腹壁软组织挫伤
- E. 胰十二指肠破裂, 腹膜炎

正确答案: C 您选择的答案:

第45题 患者被汽车撞伤, 右上腹剧痛, 呼吸36次 / 分, 脉搏100次 / 分, BP 90 / 65-mmHg, 断不明, 禁用

- A. 非那根
- B. 安定
- C. 6-氨基己酸
- D. 吗啡
- E. 鲁米那

正确答案: D 您选择的答案:

第46题 上腹部汽车撞伤四小时, 患者面色苍白, 四肢厥冷, 脉搏140次 / 分, 血压60 / 40mmHg, 全腹轻度压痛, 肌紧张及反跳痛, 首先应考虑为

- A. 胃破裂
- B. 十二指肠破裂
- C. 肝脾破裂
- D. 严重的腹壁软组织损伤
- E. 腹膜后血肿

正确答案: C 您选择的答案:

第47题 男, 28岁, 汽车司机, 因车祸腹部被汽车方向盘撞伤后腹痛3小时入院, 伴有呕吐。查体: 痛苦表情, 血压115/75mmHg, 脉搏98次/分, 腹平, 腹肌紧张, 全腹压痛及反跳痛明显。最可能的诊断是

- A. 肝破裂
- B. 肠系膜大血管损伤
- C. 胰腺损伤
- D. 腹内空腔脏器损伤
- E. 腹膜后巨大血肿

正确答案: D 您选择的答案:

第48题 腹部闭合性损伤，未明确诊断时，下述观察，处理哪项是错误的

- A 绝对卧床休息
- B 禁饮食，输液
- C 注射吗啡止痛
- D 定时测定血压，脉搏
- E 反复检查腹部体征

正确答案：C 您选择的答案：

第49题 腹部闭合性损伤，腹痛，烦躁，口渴，血压下降，诊断尚未确定。应给予处理是

- A 吗啡止痛
- B 给水止渴
- C 鲁米那镇静
- D 扶持患者去放射线科透视
- E 以上都不对

正确答案：E 您选择的答案：

第50题 腹部闭合性损伤，持续腹痛，血压80 / 60mmHg，脉搏120次/分，诊断尚未确定，应给予处置是

- A 吗啡止痛
- B 给水止渴
- C 鲁米那镇静
- D 扶持患者去放射科透视
- E 积极补充血容量，抗休克

正确答案：E 您选择的答案：

第51题 男，19岁，从7m高处坠落后腹痛30分钟查体：面色苍白，血压60/45mmHg，脉搏120次/分，全腹压痛及反跳痛。为明确有无内脏损伤，下列哪项检查应最先进行

- A．胸腹部X线摄片
- B．腹部B超
- C．腹部CT
- D．诊断性腹腔穿刺
- E．血红蛋白及红细胞比容检查

正确答案：D 您选择的答案：

第52题 男性，22岁，上腹部被拳击伤3小时，腹痛。体检：血压110 / 80mmHg(14 . 7 / 10 . 6kPa)，心率100次 / 分，上腹部压痛，肌紧张，无反跳痛。腹部

CT显示肝包膜下出血，腹腔无积液积气。现应如何处理

- A．立即剖腹探查
- B．抗休克治疗同时剖腹探查
- C．禁食水，术前准备
- D．严密观察腹部体征和生命体征
- E．注射哌替啶止痛

正确答案：D 您选择的答案：

第53题 乙状结肠破裂，立位腹部X线平片，下列部位出现半月形气影，哪个正确

- A 右侧腹部
- B Dauglas腔
- C 回盲部
- D 膈下
- E 左侧腹

正确答案：D 您选择的答案：

第54题 上腹部损伤后，出现右上腹痛及背部疼痛，呕吐物为血性，X线性检查发现腹膜后积气。应怀疑

- A．肝或胆囊破裂
- B．右半结肠损伤
- C．右肾损伤
- D．胃损伤
- E．十二指肠损伤

正确答案：E 您选择的答案：

第55题 第9，10肋闭合性骨折，肝破裂，脉搏106次 / 分，血压90 / 60mmHg，血红蛋白9 . 0g%，适当的治疗是

- A 吸氧，输血，观察
- B 抗休克，病情好转后手术
- C 抗休克同时开腹手术
- D 先抗休克2 ~ 3小时，不好转一面抗休克一面手术
- E 肋骨骨折处封闭及橡皮膏固定后手术

正确答案：C 您选择的答案：

三、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第56-57题

男性，24岁，腹部闭合性损伤后2小时，血压120 / 80mmHg，脉搏96次 / 分，全腹压痛，反跳痛，肌紧张，移动性浊音不明显，肠音消失，尿无异常

- 1．应诊断为
- A 腹腔内实质脏器损伤
- B 腹腔内空腔脏器损伤
- C 泌尿系损伤
- D 胰腺损伤
- E 肝破裂

2. 应如何处置

- A 立即手术
- B 观察12小时后手术
- C 非手术治疗
- D 抗炎, 补液, 如血压脉搏异常则手术
- E 补液2000ml 后手术

正确答案: BA 您选择的答案:

第58-59题

患者车撞伤4小时; 右上腹痛, 查血压80/60mmHg, 脉搏120次/分, 右肋见皮擦伤, 右上腹压痛明显, 全腹轻度肌紧张, 移动性浊音阳性, 肠音弱, 尿色正常

1. 应首先进行下列哪项检查

- A 腹部CT
- B 腹部B超
- C 腹部X线
- D 尿常规
- E 腹腔穿刺

2. 应诊断为

- A 肝破裂失血性休克
- B 脾破裂失血性休克
- C 肾破裂失血性休克
- D 胃破裂失血性休克
- E 胰腺破裂失血性休克

正确答案: EA 您选择的答案:

第60-62题

男性, 50岁, 民工, 建筑时自三楼坠落, 左侧身体撞击地面砖块, 腹痛。体检: 血压80/60mmHg(10.6/8kPa), 脉搏110次/分, 上腹部肌紧张压痛, 移动性浊音阳性。

1. 最重要的诊断措施是

- A 腹部CT检查
- B 尿常规
- C 血常规
- D 腹腔穿刺或灌洗
- E 直肠指检

2. 最可能的诊断是

- A 肝脏破裂、失血性休克
- B 脾脏破裂、失血性休克
- C 肾脏破裂、失血性休克
- D 胰腺破裂、失血性休克
- E 小肠破裂、化学性腹膜炎

3. 应采取的治疗原则是

- A 血管活性药物使血压升高
- B 大量输注晶体液并使用止血药物
- C 大量输血
- D 抗休克同时手术治疗
- E 保守治疗

正确答案: DBD 您选择的答案:

第63-64题

腹部闭合性损伤患者伴休克, 腹穿抽出不凝固血液

1. 在尚未手术前应采用的最主要治疗环节是

- A 保持安静
- B 止痛
- C 防治休克
- D 胃肠减压
- E 应用抗生素

2. 应采取的治疗原则是

- A 输血补液, 并用升压药物抗休克
- B 抗休克待血压好转后手术
- C 先抗休克后手术
- D 抗休克同时手术
- E 用大量止血药物不手术

正确答案: CD 您选择的答案:

第65-69题

一创伤病人, 伴恶心、呕吐、腹痛入院。查体: 面色苍白, 脉搏微弱, 左下胸可见皮肤瘀斑, 胸廓挤压征(+), 左肺呼吸音减弱, 移动性浊音(+), 无明显腹膜炎体征。

1. 首选的检查方法是

- A 腹腔穿刺
- B 腹腔灌洗
- C 选择性脾动脉造影
- D 腹部B超
- E 胸腹X线摄片

2. 下面哪项诊断可不予考虑

- A 肝破裂
- B 脾破裂
- C 膈疝
- D 胰腺挫伤
- E 肠系膜血管损伤

3. 首先考虑的诊断是

- A. 左肋骨骨折
 - B. 左肋骨骨折，左胸膜腔积血
 - C. 左胸膜腔积血
 - D. 脾破裂，左多发性肋骨骨折，左胸膜腔积血
 - E. 脾破裂，左肾挫伤
 - 4. 最适合的抢救措施是
 - A. 抗休克
 - B. 抗休克治疗后进一步检查
 - C. 抗休克，肋骨骨折固定
 - D. 在抗休克的同时剖腹探查后行胸腔穿刺引流
 - E. 抗休克，左胸膜腔穿刺引流后剖腹探查
 - 5. 剖腹探查术中，发现为脾蒂及脾门破裂，其术式为：
 - A. 脾切除、腹腔引流
 - B. 脾修补
 - C. 脾部分切除
 - D. 脾部分切除加脾修补
 - E. 脾切除
- 正确答案：ADDDA 您选择的答案：

第70-71题

女性，27岁，腹部闭合性损伤后1小时，腹痛，未呕吐，无血尿、便血。体检，血压120 / 80mmHg(16 / 10 . 6kPa)，心率100次 / 分，全腹肌紧张压痛，反跳痛，移动性浊音阴性，肠鸣音消失。

- 1. 诊断应考虑为
 - A. 腹壁软组织损伤
 - B. 腹腔内实质性脏器损伤
 - C. 腹腔内空腔脏器损伤
 - D. 泌尿系统损伤
 - E. 腹膜后损伤
 - 2. 正确的处理应选择
 - A. 抗感染治疗
 - B. 补液治疗
 - C. 观察24小时再手术治疗
 - D. 积极术前准备，手术治疗
 - E. 待诊断完全明确后再行手术
- 正确答案：CD 您选择的答案：

四、A4型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第72-75题

男性，33岁，车祸中方向盘撞击右上腹部2小时，腹痛。体检：神志淡漠，面色苍白，血压90 / 60mmHg(12 / 8kPa)，全腹肌紧张压痛、反跳痛，右上腹明显，移动性浊音阳性。

- 1. 最可能的诊断是
 - A. 腹壁软组织损伤
 - B. 肺挫裂伤
 - C. 肝脏破裂
 - D. 胰腺损伤
 - E. 胃或十二指肠损伤
 - 2. 对腹腔内实质脏器破裂诊断意义最大的是
 - A. 腹部CT
 - B. 腹部B超
 - C. 腹部X线平片
 - D. 腹腔穿刺
 - E. 以上都不是
 - 3. 治疗原则为
 - A. 大量输液
 - B. 脑细胞保护
 - C. 输血
 - D. 抗休克治疗同时手术探查
 - E. 待诊断明确后再处理
 - 4. 假如手术探查过程中发现肝右叶一个约3cm深裂口，裂口内有肝组织碎块，腹腔内未探及其他损伤，最合适的手术方案应选择
 - A. 肝脏单纯缝合修补
 - B. 带蒂大网膜填入肝创口，肝创缘缝合
 - C. 彻底清创止血，带蒂大网膜填入肝创口，肝创缘缝合
 - D. 肝右叶切除
 - E. 肝门结扎止血
- 正确答案：CDDC 您选择的答案：

五、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第76-79题

- A. 十二指肠损伤断裂
- B. 肝破裂
- C. 胃破裂
- D. 胰腺损伤断裂

E. 乙状结肠严重损伤断裂

1. 较大裂伤可在彻底止血后，放置引流不予缝合的是

2. 在修补术后，行胃部分切除，胃空肠吻合术。术后胃肠减压7~10天，是指

3. 外置肠造口术适用于

4. 近端裂伤可缝合，远端严重裂伤可切除，是指

正确答案：BAED 您选择的答案：

第80-83题

A. 右肩放射性痛

B. 左肩放射性痛

C. 膈下游离气体

D. 腹膜后积气

E. 直肠指检指套染血

1. 脾脏损伤

2. 肝脏损伤

3. 胃破裂

4. 直肠损伤

正确答案：BACE 您选择的答案：

第84-86题

A. 左肩放射性痛

B. 尿淀粉酶升高

C. 膈下游离气体

D. 腹膜后积气

E. 腹部外伤后直肠指检指套染血

1. 直肠破裂

2. 脾破裂

3. 胃破裂

正确答案：EAC 您选择的答案：

习题集 外科学 乳房疾病

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 乳癌最早表现为

- A 乳房多发肿块
- B 乳房疼痛
- C 乳房单发小肿块
- D 皮肤呈“桔皮样”改变
- E 乳头内陷

正确答案：C 您选择的答案：

第2题 下列哪项不是乳癌的临床表现

- A 肿块生长速度较快
- B 癌块表面皮肤凹陷
- C 肿块表面光滑，活动度良好
- D 桔皮样外观
- E 最早表现为无痛，单发小肿块

正确答案：C 您选择的答案：

第3题 急性乳房炎的重要病因是

- A 全身和局部抵抗力下降
- B 乳汁淤积加细菌入侵
- C 乳腺组织发育不良
- D 哺乳次数增多
- E 乳腺分泌障碍

正确答案：B 您选择的答案：

第4题 下列哪项是乳癌出现表面桔皮征的机制

- A 乳房皮下淋巴管被癌细胞堵塞
- B 癌肿侵入乳管使其收缩
- C 癌肿侵犯Cooper韧带使其收缩
- D 癌细胞浸润大片皮肤
- E 以上都不是

正确答案：A 您选择的答案：

第5题 Paget乳腺癌又称为

- A 导管内癌
- B 髓样癌
- C 腺样囊性癌
- D 炎性乳腺癌
- E 乳头湿疹样乳腺癌

正确答案：E 您选择的答案：

第6题 下列哪一项常可提示早期乳癌

- A 月经周期紊乱
- B 乳房周期性胀痛
- C 乳房局限性肿痛
- D 乳房内多个小肿块
- E 乳房内单个无痛性肿块

正确答案：E 您选择的答案：

第7题 预后最差的乳癌局部表现是

- A 乳头湿疹样表现
- B 皮肤“橘皮样”改变
- C 皮肤出现“酒窝征”
- D 乳房急性炎症性改变
- E 乳头内陷、偏向一侧

正确答案：D 您选择的答案：

第8题 关于乳腺囊性增生病，下述哪项是错误的

- A 与内分泌功能失调有关
- B 25~40岁妇女多见
- C 常见于两侧乳房
- D 可以发生癌变
- E 基本病变是乳腺腺泡的增生

正确答案：E 您选择的答案：

第9题 预后最差的乳癌局部表现是

- A 乳头湿疹样表现
- B 乳房皮肤急性炎症表现
- C 乳房皮肤桔皮样表现
- D 乳房皮肤局限凹陷
- E 乳头牵缩

正确答案：B 您选择的答案：

第10题 乳腺癌癌瘤长径约4cm，该肿瘤属

- A T₁S

- B. T1
- C. T2
- D. T3
- E. T4

正确答案：C 您选择的答案：

第11题 乳头上方的癌肿常使乳头

- A. 上移
- B. 下移
- C. 内陷
- D. 内移
- E. 外移

正确答案：A 您选择的答案：

第12题 关于乳腺脓肿的治疗原则，下列哪项是错误的

- A. 切开引流时取放射状切口
- B. 乳晕下脓肿应沿乳晕边缘作弧形切口
- C. 切开引流时，应避免切开脓肿隔膜
- D. 乳房后脓肿应沿乳房下缘作弧形切口
- E. 乳房深部脓肿需先穿刺后切开

正确答案：C 您选择的答案：

第13题 急性乳腺炎最常见于

- A. 妊娠期妇女
- B. 初产哺乳的妇女
- C. 哺乳半年后的妇女
- D. 长期哺乳的妇女
- E. 乳头凹陷的妇女

正确答案：B 您选择的答案：

第14题 关于乳房脓肿切开引流的说法错误的是

- A. 为避免损伤乳管形成乳瘘，应做放射状切开
- B. 乳晕下脓肿应沿乳晕边缘做弧形切口
- C. 乳房后脓肿应沿乳房下缘做弧形切口、经乳房后间隙引流
- D. 脓肿切开后以手指分离脓肿的多房间隔，以利引流
- E. 脓腔较大时，可在脓腔的较高部位另加切口做对口引流

正确答案：E 您选择的答案：

第15题 乳癌最常见的部位是指乳房的

- A. 内上象限
- B. 外上象限
- C. 内下象限
- D. 外下象限
- E. 乳晕区

正确答案：B 您选择的答案：

第16题 与乳腺癌发病无关的是

- A. 雌酮和雌二醇
- B. 月经初潮年龄早
- C. 绝经年龄晚
- D. 一级亲属中有乳腺癌病史者
- E. 吸烟

正确答案：E 您选择的答案：

第17题 乳腺囊性增生病通常的处理手段是

- A. 手术切除局部增生肿块
- B. 药物治疗
- C. 雌、孕激素治疗
- D. 放射治疗
- E. 全乳腺切除

正确答案：B 您选择的答案：

第18题 乳腺癌最常发于乳房

- A. 内上象限
- B. 外上象限
- C. 内下象限
- D. 外下象限
- E. 乳晕区

正确答案：B 您选择的答案：

第19题 乳腺癌皮肤出现"橘皮样"改变的机制是

- A. 癌肿侵犯乳管使其收缩
- B. 癌肿侵犯Cooper韧带使其收缩
- C. 癌细胞堵塞皮下淋巴管使淋巴回流障碍
- D. 侵犯局部皮肤
- E. 癌肿使皮下脂肪变性

正确答案：C 您选择的答案：

第20题 关于乳腺囊性增生病说法错误的是

- A. 多见于青少年女性

- B. 本病系内分泌障碍性增生病
 - C. 是乳腺实质的良性增生
 - D. 突出表现为乳房胀痛和肿块
 - E. 疼痛往往与月经周期有关
- 正确答案：A 您选择的答案：

第21题 乳腺囊性增生病患者，出现以下哪种情况时应考虑行乳腺单纯切除术

- A. 经药物治疗后，疼痛不缓解
 - B. 由周期性胀痛改为持续性疼痛
 - C. 出现乳头溢液
 - D. 活检发现上皮细胞增生活跃
 - E. 活检证实为乳癌
- 正确答案：D 您选择的答案：

第22题 乳头鲜红色血性溢液多见于

- A. 乳管内癌
 - B. 乳管内乳头状瘤
 - C. 乳腺囊性增生病
 - D. 急性乳房炎
 - E. 乳房纤维腺瘤
- 正确答案：B 您选择的答案：

第23题 乳房蜂窝织炎而未形成脓肿时主要治疗为

- A. 切开引流
 - B. 使用广谱抗生素
 - C. 局部热敷
 - D. 吸空乳汁
 - E. 局部注射抗生素
- 正确答案：B 您选择的答案：

第24题 关于乳房纤维腺瘤说法错误的是

- A. 约占乳房良性肿瘤的3 / 4
 - B. 好发于20 ~ 25岁女性
 - C. 发病原因与乳腺小叶内纤维细胞对雌激素的敏感性异常增高有关
 - D. 好发于乳房外上象限
 - E. 月经周期对肿块大小影响较大
- 正确答案：E 您选择的答案：

第25题 急性乳腺炎的首发症状常为

- A. 患侧乳房局部硬结
 - B. 体温升高
 - C. 乳房扪及局限波动
 - D. 乳房肿胀疼痛
 - E. 患侧腋窝有肿大淋巴结
- 正确答案：D 您选择的答案：

第26题 急性乳房炎脓肿形成后的主要治疗措施

- A. 全身应用抗生素
 - B. 局部热敷，理疗
 - C. 局部注射抗生素
 - D. 促使乳汁排出通畅
 - E. 切开排脓
- 正确答案：E 您选择的答案：

第27题 对急性乳腺炎的处理中，下列哪项不正确

- A. 形成脓肿前，给广谱抗生素
 - B. 如感染不重，可允许婴儿吸乳
 - C. 水肿明显者可用25%硫酸镁湿热敷
 - D. 尽早使用药物使乳汁停止分泌
 - E. 抗生素治疗后如无明显改善，应反复穿刺以证明有无脓肿形成
- 正确答案：D 您选择的答案：

第28题 乳腺囊性增生病的处理是

- A. 药物治疗
 - B. 放射治疗
 - C. 肾上腺皮质激素治疗
 - D. 全乳腺切除
 - E. 增生部位局部切除术
- 正确答案：A 您选择的答案：

第29题 有关乳房纤维腺瘤治疗说法正确的是

- A. 手术切除是治疗的唯一有效办法
 - B. 可用疏肝理气、调和冲任的中药治疗
 - C. 可用雌激素补充治疗
 - D. 可用雌激素拮抗剂治疗
 - E. 可用孕激素补充治疗
- 正确答案：A 您选择的答案：

第30题 确定乳房肿块性质最可靠的方法是

- A. 乳房X线检查

- B. 乳房B超检查
- C. 活组织切片检查
- D. 乳房溢液涂片
- E. 近红外扫描检查

正确答案：C 您选择的答案：

第31题 乳腺癌治疗方法不包括

- A. 手术治疗
- B. 化学药物治疗
- C. 雌激素补充治疗
- D. 放射治疗
- E. 免疫治疗

正确答案：C 您选择的答案：

第32题 确定乳房肿块性质最可靠的方法为

- A. 临床表现
- B. 溢液涂片
- C. 乳房X线检查
- D. 活组织切片检查
- E. B超断层仪检查

正确答案：D 您选择的答案：

第33题 关于乳房扪诊说法正确的是

- A. 病人一般取平卧位
- B. 指尖触觉敏感，所以扪诊多用指尖
- C. 应循序对乳头、内上、内下、外上、外下做检查
- D. 先查患侧，再查健侧
- E. 乳房肿块较大检查其与深部组织关系时可以让病人双手叉腰使胸肌紧张

正确答案：E 您选择的答案：

第34题 乳头鲜红色血性溢液多见于

- A. 乳腺囊性增生病
- B. 急性乳房炎
- C. 乳管内癌
- D. 乳房纤维腺瘤
- E. 乳房肉瘤

正确答案：C 您选择的答案：

第35题 急性乳房炎的首发症状为

- A. 局部硬块
- B. 发热
- C. 搏动性疼痛
- D. 患侧腋窝淋巴结肿大
- E. 乳房肿胀疼痛

正确答案：E 您选择的答案：

第36题 急性乳房炎脓肿未形成前的主要治疗方法是

- A. 应用广谱抗生素
- B. 促使乳汁通畅排出
- C. 局部注射抗生素
- D. 切开引流
- E. 局部热敷

正确答案：D 您选择的答案：

第37题 乳腺癌根治术切除范围不包括

- A. 胸大肌
- B. 胸小肌
- C. 腋窝淋巴结
- D. 锁骨下淋巴结
- E. 胸骨旁淋巴结

正确答案：E 您选择的答案：

第38题 腋窝淋巴结不包括

- A. 中央组
- B. 肩胛下组
- C. 胸肌组
- D. 锁骨上组
- E. 锁骨下组

正确答案：D 您选择的答案：

第39题 乳腺癌最常见的发生部位通常是乳房的

- A. 内上象限
- B. 外上象限
- C. 内下象限
- D. 外下象限
- E. 乳晕区

正确答案：B 您选择的答案：

第40题 有乳头溢血的乳晕深部肿块最多见的是

- A. 乳癌

- B. 乳腺囊性增生病
- C. 乳房结核
- D. 乳管内乳头状瘤
- E. 乳房脓肿

正确答案：D 您选择的答案：

第41题 乳房脓肿切开引流最常用的切口是

- A. "+"字形切口
- B. "抖"字形切口
- C. 轮辐放射方向切口
- D. 乳房下弧形切口
- E. 平行肋骨斜切口

正确答案：C 您选择的答案：

第42题 随月经周期疼痛的乳腺肿块可能是

- A. 乳腺癌
- B. 导管内乳头状瘤
- C. 乳房囊性增生病
- D. 乳腺纤维腺瘤
- E. 乳房脂肪坏死

正确答案：C 您选择的答案：

第43题 乳腺癌淋巴转移最初多见于

- A. 锁骨上
- B. 锁骨下
- C. 腋窝
- D. 胸骨旁
- E. 腹膜后

正确答案：C 您选择的答案：

第44题 急性乳腺炎局部脓肿形成的治疗原则为

- A. 全身应用抗生素
- B. 局部应用抗生素
- C. 排空乳汁
- D. 切开引流
- E. 暂停哺乳

正确答案：D 您选择的答案：

第45题 乳癌患者，术中发现同侧腋下及胸骨旁有淋巴结转移，且一般情况尚可，首宜行

- A. 单纯乳房切除术
- B. 乳癌根治术
- C. 扩大乳癌根治术
- D. 改良根治术
- E. 放疗加化疗

正确答案：C 您选择的答案：

第46题 属于乳腺癌二级预防的是

- A. 分子生物学研究明确发病机制
- B. 流行病学进行病因调查
- C. 乳腺癌普查早期发现
- D. 乳腺癌手术治疗
- E. 乳腺癌术前化疗

正确答案：C 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第47题 女性，55岁，发现右乳房肿块1周。查体：右乳房外上象限可及1.5cm×1.0cm质硬肿物，活动度小。确定肿块性质最可靠的方法是

- A. 针吸细胞学检查
- B. 钼靶X线法检查
- C. B型超声波检查
- D. 同位素扫描检查
- E. 活组织冷冻切片检查

正确答案：E 您选择的答案：

第48题 中老年妇女，一侧乳房单一无症状肿块，对侧正常，诊断首先需考虑

- A. 乳腺囊性增生病
- B. 乳腺纤维腺瘤
- C. 乳腺癌
- D. 乳腺炎
- E. 乳房囊肿

正确答案：C 您选择的答案：

第49题 女性，45岁，右乳外上象限乳腺癌，癌瘤长径约4cm，同侧腋窝可触及2个直径约1cm肿大淋巴结，可推动，临床各检查未发现远处转移，该患者乳腺癌应属于

- A. 0期
- B. Ⅰ期
- C. Ⅱ期

D. 期
E. 期

正确答案：C 您选择的答案：

第50题 女性，48岁，发现左乳房外上象限肿块1个月，单发，不疼痛，最可能的诊断是

- A. 乳腺纤维腺瘤
- B. 乳腺囊性增生病
- C. 乳腺癌
- D. 乳腺炎
- E. 乳房肉瘤

正确答案：C 您选择的答案：

第51题 女性，32岁，左乳房外上象限扪及一3cm×2cm大小肿块，与皮肤轻微粘连，左腋窝可触及一肿大淋巴结，尚可推动，临床诊断为左乳癌，按TNM(国际抗癌协会，1988)分期法，应为

- A. T1N2Mo
- B. T2N2Mo
- C. T3N1Mo
- D. T4N1Mo
- E. TisN1M1

正确答案：D 您选择的答案：

第52题 女性，22岁，左乳房外上象限单发肿块，无其他不适症状，肿块表面光滑，易推动，可能的诊断为

- A. 乳腺囊性增生病
- B. 乳腺炎
- C. 乳腺囊肿
- D. 乳腺纤维腺瘤
- E. 乳腺癌

正确答案：D 您选择的答案：

第53题 女性，45岁，乳腺癌伴腋窝淋巴结转移，病理显示ER(+)，行根治手术，术后辅助治疗首选

- A. 放射治疗
- B. 放射治疗或化疗+雌激素治疗
- C. 放射治疗或化疗+孕激素治疗
- D. 放射治疗或化疗+三苯氧胺治疗
- E. 中药治疗

正确答案：D 您选择的答案：

第54题 40岁女性，右乳房内上象限有4cm×4.5cm肿块，皮肤略回缩，基底不固定，腋下触及2.5cm×1.5cm和2.0cm×1.5cm淋巴结两个，质硬，尚活动，细胞学检查为硬癌，你认为病情应属于哪一期

- A. 第一期
- B. 第二期
- C. 第三期
- D. 第四期
- E. 第二期与第三期之间

正确答案：B 您选择的答案：

第55题 20岁，女，乳房肿块，边缘清晰，活动度大，生长缓慢，无压痛，应诊断为

- A. 乳管内乳头状瘤
- B. 乳腺结核
- C. 乳腺炎性肿块
- D. 乳腺纤维性腺瘤
- E. 乳腺囊性增生病

正确答案：D 您选择的答案：

第56题 患者行乳癌根治术时已发现有转移，应手术后2~3周行放疗，其目的是

- A. 防止瘤细胞扩散
- B. 抑制乳癌及其转移物生长
- C. 防止局部复发
- D. 提高机体免疫力
- E. 以上都不是

正确答案：C 您选择的答案：

第57题 女，26岁，产后第3周出现右乳胀痛，皮肤红肿，伴发热，体温38℃，查体时无波动感。此时最好的治疗是：

- A. 停止哺乳，局部热敷
- B. 全身用抗生素
- C. 暂停哺乳，用吸乳器吸尽乳汁，局部理疗，全身应用抗生素
- D. 继续哺乳，全身使用抗生素
- E. 切开引流

正确答案：C 您选择的答案：

第58题 女性，24岁，右乳内上象限单发无痛性肿块，与月经周期无关，体检见肿块约3cm×3cm，光滑，触之有弹性感，易于推动，治疗应选择

- A. 手术切除肿块
- B. 乳癌根治术
- C. 热敷
- D. 中药治疗
- E. 抗生素治疗

正确答案：A 您选择的答案：

第59题 女性, 30岁, 左乳内上象限肿块, 胀痛, 与月经周期无明显关系, 对该患者最恰当的处理是

- A. 乳癌根治术
- B. 肿块切除并送快速病理检查
- C. 肿块切取活检
- D. 细针穿刺活检
- E. 粗针穿刺活检

正确答案: B 您选择的答案:

第60题 女性, 40岁, 右侧乳房肿痛并可触及肿块, 疼痛在月经前加重, 诊断最可能为

- A. 急性乳腺炎
- B. 慢性乳腺炎
- C. 乳腺囊肿
- D. 乳腺囊性增生病
- E. 乳腺癌

正确答案: D 您选择的答案:

第61题 哺乳期妇女, 发现左侧乳房有一约3cm大小硬结, 疼痛2天, 体检两侧乳腺均明显增大, 左乳外下象限皮肤充血, 发红, 扪之发硬、发热, 诊断首先考虑

- A. 急性乳腺炎
- B. 纤维腺瘤
- C. 乳腺囊肿
- D. 炎性乳癌
- E. 乳房囊性增生病

正确答案: A 您选择的答案:

第62题 女性, 30岁, 右乳头反复溢血性液体1年余, 查体: 右乳头下可扪及直径约为1.0cm大小的肿块, 稍活动。应首先考虑

- A. 乳腺结核
- B. 乳腺纤维腺瘤
- C. 乳腺囊性增生病
- D. 乳管内乳头状瘤
- E. 乳管内乳头状癌

正确答案: D 您选择的答案:

第63题 女性, 26岁, 乳房肿块分界不清, 月经来潮时乳房疼痛, 多提示

- A. 腺癌
- B. 慢性乳腺炎
- C. 乳腺囊性增生病
- D. 乳腺管内乳头状瘤
- E. Paget病

正确答案: C 您选择的答案:

第64题 女性, 51岁, 乳腺癌根治术后, T2N1M0, 术后2周开始放疗, 其目的是

- A. 提高机体免疫力
- B. 防止癌细胞扩散
- C. 癌细胞远处转移
- D. 防止癌肿局部复发
- E. 以上都是

正确答案: D 您选择的答案:

第65题 乳癌直径4cm腋下扪及3个淋巴结, 其治疗原则是

- A. 乳腺单纯切除
- B. 单纯切除+放疗
- C. 仅用化疗
- D. 单纯切除+化疗
- E. 乳癌根治术

正确答案: E 您选择的答案:

第66题 一哺乳患者, 右乳内发现4cm大硬块, 疼痛已两天, 多为

- A. 乳癌
- B. 炎性乳癌
- C. 急性乳房炎
- D. 肉瘤
- E. 乳房囊性增生病

正确答案: C 您选择的答案:

第67题 哺乳期妇女, 左乳红肿疼痛1周, 可触及波动, 穿刺抽得脓液, 治疗最重要的是

- A. 全身使用抗生素
- B. 局部注射抗生素
- C. 穿刺抽脓
- D. 切开引流
- E. 保持乳汁通畅排出

正确答案: D 您选择的答案:

第68题 女性, 右乳房内肿块4cm~3cm, 皮肤略回缩, 基底不固定, 右腋下2.5cm×1.5cm活动的淋巴结两个, 质硬, 病理证实为乳癌腋淋巴结转移, 按国际标准, 应属于

- A. T2N1M0
- B. T1N1M0
- C. T3N2M0
- D. T3N3M0

E T2N2MO

正确答案：A 您选择的答案：

第69题 初产妇，27岁，左乳外上象限红肿、疼痛，穿刺未抽得脓液，此时治疗宜选择

- A. 全身应用抗生素
- B. 局部应用抗生素
- C. 沿乳晕边缘弧形切开
- D. 放射状切开引流
- E. 另在红肿最低点切开对位引流

正确答案：A 您选择的答案：

第70题 女性，35岁，经产妇，乳头溢液污染内衣1年余，暗色，乳腺未触及肿块，诊断可能为

- A. 炎性乳腺癌
- B. 急性乳房炎
- C. 乳管内乳头状瘤
- D. 乳房纤维腺瘤
- E. 乳房肉瘤

正确答案：C 您选择的答案：

第71题 中老年妇女，一侧乳房内单一无症状包块，对侧阴性，最可能的诊断是

- A. 乳房囊性增生病
- B. 纤维腺瘤
- C. 乳房结核
- D. 乳癌
- E. 积乳囊肿

正确答案：D 您选择的答案：

第72题 患者，女，49岁，发现右乳外上象限肿块，无痛单发，最常见的疾病是

- A. 纤维腺瘤
- B. 乳腺癌
- C. 乳管内乳头状瘤
- D. 乳腺结核
- E. 乳腺炎

正确答案：B 您选择的答案：

第73题 女性，30岁，发现右乳内上象限直径2cm无痛性肿块，为明确诊断可选择

- A. X线检查
- B. 超声波检查
- C. 切取活检
- D. 细针穿刺活检
- E. 粗针穿刺活检

正确答案：D 您选择的答案：

第74题 患者，26岁，初产妇，右乳外上象限红肿，压痛，有波动，该处抽出脓汁，下列处置哪项是错的

- A. 不要分离脓肿隔膜以防扩散
- B. 切口应按轮辐方向
- C. 切口应达到引流通畅
- D. 必要时作对口引流
- E. 手术治疗

正确答案：A 您选择的答案：

第75题 26岁女性，左乳房外上象限内3cm圆形光滑肿块已8个月，质韧，活动佳，可能为

- A. 早期乳癌
- B. 纤维腺瘤
- C. 柏哲乳头病
- D. 乳房囊性增生病
- E. 结核

正确答案：B 您选择的答案：

第76题 45岁女性，乳腺硬癌伴腋窝淋巴结转移，ER(+)，行根治术后，辅助治疗应选

- A. 放射治疗
- B. 放射治疗或化疗+雌激素治疗
- C. 放射治疗或化疗+雄激素治疗
- D. 放射治疗或化疗+双侧卵巢切除
- E. 抗癌药物治疗

正确答案：C 您选择的答案：

第77题 女性，右乳房内肿块4cm×3cm，皮肤略回缩，基底不固定，右腋下2.5cm×1.5cm活动的淋巴结2个，质硬，病理证实为乳癌淋巴结转移。按国际标准，应属于

- A. T2、N1、M0
- B. T1、N1、M0
- C. T9、N1、M0
- D. T3、N3、M0
- E. T3、N2、M0

正确答案：A 您选择的答案：

三、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第78-79题

女性，50岁，右乳外上象限肿物，1.5cm×1.5cm，质硬，活动差，腋淋巴结未触及

1. 假设诊断为乳腺癌应为哪期

- A. T2N1Mo
- B. T1N1Mo
- C. T1NoMo
- D. T2NoMo
- E. T1N2m9

2. 应如何治疗

- A. 病灶切除术
- B. 乳癌根治术
- C. 局部放疗
- D. 生物治疗
- E. 化疗

正确答案：CB 您选择的答案：

第80-82题

女性，25岁，产后20天，左乳胀痛伴发热。查体：体温39.0，左乳外上象限皮温高，红肿，有一痛性肿块，直径约4cm，有波动感

1. 最可能的诊断是

- A. 炎性乳癌
- B. 乳房脂肪液化
- C. 急性乳腺炎
- D. 乳房脓肿
- E. 积乳症

2. 进一步明确诊断应首选的检查方法是

- A. X线(钼靶)照片检查
- B. B超检查
- C. 穿刺检查
- D. CT检查
- E. 细胞学检查

3. 最恰当的治疗原则是

- A. 行乳癌根治术
- B. 手术切除坏死液化组织
- C. 对症治疗、大量抗菌药物控制感染
- D. 即行切开引流排脓
- E. 疏通乳管、中医中药

正确答案：DCD 您选择的答案：

第83-84题

初产妇，25岁，左乳红肿疼痛1周，体检，体温39.1，左乳外上象限发红，触之有波动感，穿刺抽得脓液。

1. 该患者诊断为

- A. 左乳腺蜂窝织炎
- B. 左乳腺脓肿
- C. 左乳腺癌
- D. 左乳腺囊肿
- E. 左乳腺结核

2. 最重要的治疗措施是

- A. 全身使用广谱抗生素
- B. 局部使用抗生素
- C. 脓肿穿刺抽脓
- D. 脓肿切开引流
- E. 抗结核治疗

正确答案：BD 您选择的答案：

第85-87题

女性，45岁，发现左乳房肿块10个月，近日发现左腋下淋巴结肿大而来就诊。体检：左乳房外上象限可扪及一5cm×5cm×4cm大小的肿块，质硬，推不动，乳房皮肤表面呈橘皮样，左侧腋窝可触及直径约1.5cm肿大淋巴结2个，无压痛，可移动。

1. 首先应考虑哪种疾病

- A. 乳房纤维腺瘤
- B. 乳腺癌
- C. 乳腺囊性增生病
- D. 乳房结核
- E. Paget病

2. 此病变为哪一期

- A. 0期
- B. Ⅰ期
- C. Ⅱ期
- D. Ⅲ期
- E. Ⅳ期

3. 应选择哪项手术方案

- A. 乳癌根治切除术
- B. 扩大乳癌根治切除术
- C. 单纯左乳房切除术
- D. 改良乳癌根治切除术
- E. 保留乳房的乳腺癌切除

正确答案：BDA 您选择的答案：

第88-89题

产后10天，左乳胀痛发热，查体：体温38.7，左乳外上象限皮温升高，红肿有压痛，肿块约5cm×5cm大小，中心有波动感

1. 最可能诊断是左乳

- A 炎性乳癌
 - B 脂肪坏死液化
 - C 急性乳腺炎未成脓
 - D 乳腺脓肿
 - E 积乳癌
2. 最恰当的治疗方法是
- A 收入院行乳腺癌治疗
 - B 手术切除坏死液化脂肪组织
 - C 大量抗生素应用
 - D 立即切开引流排脓
 - E 疏通乳管

正确答案：DD 您选择的答案：

第90-91题

女性55岁，发现右乳腺肿物1周，查右乳外上象限肿物1.5cm×1.0cm，质硬，活动度小

1. 如想确定肿物性质最可靠的方法是

- A 针吸细胞学
 - B 钼靶X线
 - C B超
 - D 同位素扫描
 - E 活组织冰冻切片
2. 最可能的诊断是

- A 乳腺癌
- B 乳腺囊性增生病
- C 乳腺纤维腺病
- D 乳腺结核
- E 乳腺炎

正确答案：EA 您选择的答案：

第92-94题

女性，42岁，偶尔发现左乳包块半月余，无自觉症状，未见增大。检查，左乳外上象限有一约2.0cm×1.5cm×1.5cm包块，质地硬、无压痛。与皮肤有轻度粘连。左腋下可扪及直径1cm大小结节。

1. 该病例最可能的诊断是

- A. 乳腺囊性增生病
- B. 乳管内乳头状瘤
- C. 乳房脓肿
- D. 乳腺癌
- E. 乳腺结核

如：B超检查发现左乳外上象限肿块直径1.5cm，呈分叶状，与周围组织边界不清，腋下淋巴结肿大1.0cm×1.5cm，提示左乳肿块，乳癌可能

2. 首先应进一步的检查是

- A. 乳腺钼靶X线摄片检查
- B. 结核菌素试验
- C. 乳房包块穿刺活检
- D. 乳房包块切除活检
- E. 放射性核素扫描

如：术中病理检查证实为左乳浸润性导管癌

3. 最合适的治疗方法是

- A. 乳房部分切除术
- B. 乳房单纯切除术
- C. 简化乳癌切除术
- D. 乳癌根治术
- E. 放射性核素扫描

正确答案：DDD 您选择的答案：

第95-96题

女性，23岁，发现左乳外上象限肿块半年，无疼痛，生长缓慢，大小与月经周期无关，体检见肿块约2cm×2cm，光滑，可推动。

1. 最可能诊断是

- A. 乳腺囊性增生病
- B. 乳腺纤维腺瘤
- C. 乳腺癌
- D. 乳腺囊肿
- E. 乳腺结核

2. 宜选择的手术治疗方法为

- A. 只需简单切除肿瘤
- B. 将肿瘤连同包膜整块切除，周围包裹少量正常乳腺组织
- C. 左侧乳腺切除
- D. 肿瘤切除+左侧腋窝淋巴结清扫
- E. 肿瘤切除+左侧腋窝淋巴结清扫+胸骨旁淋巴结清扫

正确答案：BB 您选择的答案：

第97-99题

哺乳期妇女，左乳房红肿疼痛3天，体检，体温38.9，左乳外上象限发红，肿胀，压痛，无明显波动感，于压痛最明显处穿刺未抽得脓液。

1. 此时诊断为

- A. 乳腺蜂窝织炎
 - B. 乳腺脓肿形成
 - C. 慢性乳腺炎
 - D. 炎性乳腺癌
 - E. 湿疹样乳腺癌
2. 最常见的感染细菌为
- A. 绿脓杆菌
 - B. 大肠杆菌
 - C. 金黄色葡萄球菌
 - D. 溶血性链球菌
 - E. 结核杆菌
3. 经验性用药宜选择
- A. 青霉素
 - B. 庆大霉素
 - C. 氯霉素
 - D. 四环素
 - E. 甲硝唑

正确答案：ACA 您选择的答案：

第100-101题

女性，52岁，发现右乳外上象限肿块1周，查肿块约2.0cm×1.5cm，质硬，活动度小。

1. 对诊断最有价值的检查方法为

- A. 细针穿刺细胞学
 - B. 钼靶X线
 - C. 超声波
 - D. 肿块切除冰冻切片病理
 - E. 核素扫描
2. 最可能的诊断是
- A. 乳腺囊性增生病
 - B. 乳腺癌
 - C. 乳腺纤维腺瘤
 - D. 乳腺炎
 - E. 乳腺囊肿

正确答案：DB 您选择的答案：

四、A4型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第102-104题

某患者产后10天，左乳胀痛发热1天；体检：体温38.5，左乳外上象限发红，压痛，范围约2cm×2cm，无明显波动感。

1. 此时治疗宜选择

- A. 全身使用广谱抗生素
- B. 局部使用抗生素
- C. 使乳汁停止分泌
- D. 切开引流
- E. 使用解热镇痛药

2. 若治疗5天后，乳房胀痛发热加重。体检：体温39.3，红肿疼痛范围约5cm×5cm，中心有波动感，为明确诊断需行

- A. 钼靶X线检查
- B. 乳房B超
- C. 胸部CT
- D. 穿刺抽脓并送细菌培养
- E. 核素扫描

3. 假如明确诊断为乳房脓肿形成，此时处理错误的是

- A. 切口应按放射状切开
- B. 切口应达到引流通畅
- C. 不要分离脓肿隔膜以防脓肿扩散
- D. 必要时作对口引流
- E. 给予敏感抗生素治疗

正确答案：ADC 您选择的答案：

第105-108题

女性，35岁，发现右乳外上象限无痛性肿块1个月。体检：双乳皮肤无发红、水肿、凹陷，肿块约3cm×3cm，质地较硬，与周围组织无明显界限，可移动，腋窝淋巴结无肿大。

1. 诊断首先需考虑

- A. 乳腺囊性增生病
- B. 乳腺纤维腺瘤
- C. 乳腺癌
- D. 乳腺囊肿
- E. 急性乳腺炎

2. 此时最恰当的处理为

- A. 钼靶X线检查
- B. 胸部CT检查
- C. 肿块切除并送冰冻活检
- D. 细针穿刺活检
- E. 粗针穿刺活检

3. 若快速病理检查提示乳腺癌，此时应行

- A. 单纯切除肿块

- B. 切除肿块及包膜，连带周围少许乳腺组织
 - C. 全乳切除
 - D. 乳腺癌改良根治术
 - E. 乳腺癌扩大根治术
4. 如果术后病理未发现淋巴结转移，该患者应属于
- A. 0期
 - B. Ⅰ期
 - C. Ⅱ期
 - D. Ⅲ期
 - E. Ⅳ期

正确答案：CCDC 您选择的答案：

五、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第109-111题

- A. 周期性疼痛
- B. 肿块边界清楚，活动，增大缓慢
- C. 肿块巨大，活动，淋巴结不大，有肺部转移
- D. 肿块固定，腋窝淋巴结肿大
- E. 肿块具有明显压痛

- 1. 乳癌
- 2. 乳腺纤维腺瘤
- 3. 急性乳房炎

正确答案：DBE 您选择的答案：

第112-115题

- A. 乳腺囊性增生病
 - B. 乳腺纤维腺瘤
 - C. 急性乳腺炎
 - D. 乳房结核
 - E. 乳腺癌
- 1. 多发于初产妇的是
 - 2. 乳房胀痛和肿块，疼痛与月经周期有关系的是
 - 3. 好发于年轻女性，生长缓慢，与月经周期无关系的是
 - 4. 生长迅速，常伴有腋窝淋巴结肿大者为

正确答案：CABE 您选择的答案：

第116-120题

- A. 非浸润性癌
- B. 早期浸润性癌
- C. 浸润性特殊癌
- D. 浸润性非特殊癌
- E. 罕见癌

- 1. 鳞状细胞癌
- 2. 导管内癌
- 3. 乳头状癌
- 4. 小叶原位癌
- 5. 腺癌

正确答案：CACAD 您选择的答案：

第121-123题

- A. 乳头血性溢液
 - B. 棕褐色溢液
 - C. 黄色或黄绿色溢液
 - D. 乳白色溢液
 - E. 浆液性五色溢液
- 下列情况下乳房常见溢液分别为上述哪项？

- 1. 乳管内乳头状瘤
- 2. 乳房囊性增生病
- 3. 有阻塞的乳管内乳头状瘤

正确答案：ACB 您选择的答案：

习题集 外科学 复苏

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 如你在路上遇一老年男性突然晕倒，为判断情况首先采取下列哪一步骤

- A．检查有无颈动脉搏动
- B．捶击心前区
- C．口对口人工呼吸
- D．开始胸外按摩
- E．以上同步进行

正确答案：A 您选择的答案：

第2题 两人进行心肺复苏，一人做人工呼吸，另一人做心脏挤压，其比例是

- A 4次心脏挤压，1次人工呼吸
- B 5次心脏挤压，1次人工呼吸
- C 8次心脏挤压，1次人工呼吸
- D 10次心脏挤压，1次人工呼吸
- E 15次心脏挤压，1次人工呼吸

正确答案：B 您选择的答案：

第3题 胸外心脏挤压的正确按压部位是

- A 胸骨左缘第四肋间
- B 胸骨下1/2
- C 胸骨上、中1/3交界处
- D 胸骨中、下1/3交界处
- E 胸骨左缘第四肋间腋中线上

正确答案：B 您选择的答案：

第4题 成人胸外心脏除颤采用

- A 5~50瓦秒电能
- B 20~80瓦秒电能
- C 200瓦秒电能
- D 2瓦秒/kg
- E 500瓦秒电能

正确答案：C 您选择的答案：

第5题 防治室性早搏或阵发性心动过速的首选药物

- A 利多卡因
- B 碳酸氢钠
- C 阿托品
- D 氯化钙
- E 溴苄胺

正确答案：A 您选择的答案：

第6题 两人进行心肺复苏，一人做人工呼吸，另一人做脏挤压，其比例是

- A．4次心脏按压，1次人工呼吸
- B．5次心脏按压，1次人工呼吸
- C．8次心脏按压，1次人工呼吸
- D．10次心脏按压，1次人工呼吸
- E．15次心脏按压，1次人工呼吸

正确答案：B 您选择的答案：

第7题 成人在下列何种情况下应行人工呼吸

- A．潮气量小于150ml
- B．肺活量小于500ml
- C．呼吸频率小于20次/分或大于35次/分
- D．15~20秒
- E．20秒

正确答案：E 您选择的答案：

第8题 心肺脑复苏中，为防止脑水肿最常用的方法和措施是

- A．降温、脱水治疗
- B．维持循环，呼吸功能稳定
- C．纠正酸中毒
- D．抗感染治疗
- E．激素治疗

正确答案：A 您选择的答案：

第9题 循环骤停施行胸外心脏按压时正确的方法是

- A．按压左胸部使心脏受到挤压
- B．在右侧胸部加压
- C．在胸骨上段按压
- D．在胸骨中下1/3交界处、压力要使胸骨下沉3~4cm
- E．在剑突下向心脏方向按压

正确答案：D 您选择的答案：

第10题 治疗高血钾引起的心跳停止

- A 阿托品

- B 肾上腺素
- C 溴苄胺
- D 氯化钙
- E 氯化钾

正确答案：D 您选择的答案：

第11题 心脏复苏的首选药物

- A 肾上腺素
- B 去甲肾上腺素
- C 异丙肾上腺素
- D 溴苄胺
- E 阿托品

正确答案：A 您选择的答案：

第12题 循环骤停进行复苏时最有效的药物是

- A 肾上腺素
- B 异丙肾上腺素
- C 去甲肾上腺素
- D 间羟胺
- E 多巴胺

正确答案：A 您选择的答案：

第13题 心肺复苏时最常用的药物是

- A 异丙肾上腺素
- B 阿托品
- C 利多卡因
- D 氯化钙
- E 肾上腺素

正确答案：E 您选择的答案：

第14题 脑复苏时，为防止脑组织发生不可逆损伤，脑循环血量最低应保持在

- A 25%
- B 20%
- C 15%
- D 10%
- E 5%

正确答案：C 您选择的答案：

第15题 心跳呼吸停止后，最容易出现的继发性病理改变是

- A 肾小管坏死
- B 心肌损伤
- C 脑缺血缺氧性改变
- D 肺水肿
- E 肝坏死

正确答案：C 您选择的答案：

第16题 心跳停止时间是指从循环停止到

- A 意识恢复
- B 自主呼吸恢复
- C 心脏自动节律恢复
- D 重建有效人工循环
- E 呼吸心跳恢复正常

正确答案：D 您选择的答案：

第17题 心肺脑复苏中，为防止，脑水肿最常用的方法和措施是

- A 降温，脱水治疗
- B 维持循环，呼吸功能稳定
- C 纠正酸中毒
- D 抗感染治疗
- E 激素治疗

正确答案：A 您选择的答案：

第18题 一经确定为心跳停止，紧急处理必须争取在几分钟内重建氧化血循环

- A 1分钟
- B 6分钟
- C 9分钟
- D 3分半钟
- E 12分钟

正确答案：D 您选择的答案：

第19题 心跳停止时间是指从循环停止到

- A 意识恢复
- B 自主呼吸恢复
- C 心脏自主节律恢复
- D 重建有效人工循环
- E 呼吸心跳恢复正常

正确答案：C 您选择的答案：

第20题 施行口对口人工呼吸时，操作者深吸后用力吹气时，吹出气中氧浓度是

- A 10%

- B. 12%
- C. 14%
- D. 16%
- E. 18%

正确答案：D 您选择的答案：

第21题 循环骤停是指心脏不能搏出有效的血液供给主要脏器的需要，下列叙述哪项与其不符

- A. 心脏完全停搏
- B. 心机械分离，心电图有心室复合波
- C. 心室颤动
- D. 一侧心室颤动而另一侧心室完全停搏
- E. 心跳微弱

正确答案：E 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第22题 中年女性，在硬膜外麻醉下行胆囊切除术，于T_{7~8}穿刺，首次给1.33%利多卡因30ml，给药后20分钟医生划刀时发现血色发紫，刀口不渗血，诊断心跳骤停，应进行哪种抢救措施

- A. 头部降温
- B. 脱水治疗
- C. 胸内心脏挤压
- D. 气管插管及胸外心脏挤压
- E. 口对口人工呼吸

正确答案：D 您选择的答案：

第23题 男性，78岁，既往有冠心病病史。在全麻下行左肺切除术，术中处理肺门时突然出现心室颤动，下述哪种处理方法正确

- A. 胸外心脏挤压
- B. 胸外电除颤
- C. 胸内心脏挤压
- D. 静注利多卡因1mg/kg
- E. 胸内电除颤

正确答案：E 您选择的答案：

第24题 一名冠心病病人在全麻下行左肺切除术，术中处理肺门时突然出现心室颤动，请你判定哪种方法正确

- A. 胸外心脏挤压
- B. 胸外电除颤
- C. 胸内心脏挤压
- D. 静注利多卡因1mg/kg
- E. 胸内电除颤

正确答案：E 您选择的答案：

第25题 一名溺水游客被救出水后，神志不清，呼吸停止，口唇发绀，需口对口人工呼吸的先决条件是

- A. 清除口咽分泌物，保持呼吸道通畅
- B. 病人置于仰卧位
- C. 每次吹入800ml气体
- D. 确定呼吸停止
- E. 每分钟吹气几次

正确答案：A 您选择的答案：

第26题 一病人在硬膜外麻醉下行胆囊切除术，胸_{7~8}穿刺，首次给1.33%利多卡因30ml，给药后20分钟医生划刀时发现血色发紫，刀口不渗血，诊断心跳停止，应进行哪种抢救措施

- A. 头部降温
- B. 脱水治疗
- C. 胸内心脏挤压
- D. 气管插管及胸外心脏挤压
- E. 口对口人工呼吸

正确答案：D 您选择的答案：

第27题 一个电工在带电进行线路检查时，突然大叫一声，摔倒在地无任何反应，请你如何判定病人呼吸心跳停止

- A. 无自主呼吸
- B. 神志消失
- C. 大动脉无搏动
- D. 去医院心电图检查
- E. 听诊心音

正确答案：C 您选择的答案：

三、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第28-30题

某溺水游客，被救出水后，神志不清，呼吸停止，口唇发绀。

1. 如何判定患者心跳停止

- A. 立即测血压
- B. 立即呼喊病人看其是否清醒
- C. 立即观察呼吸是否停止
- D. 立即摸股动脉搏动

- E. 立即做心电图
 - 2. 需立即采取的处理措施是
 - A. 清除口咽分泌物，保持呼吸道通畅
 - B. 测量血压
 - C. 紧急送往医院抢救
 - D. 气管切开
 - E. 掐按人中，促其苏醒
 - 3. 单人进行心肺复苏时，人工呼吸与心脏按压的比例是
 - A. 5次心脏按压，1次人工呼吸
 - B. 10次心脏按压，2次人工呼吸
 - C. 10次心脏按压，1次人工呼吸
 - D. 15次心脏按压，2次人工呼吸
 - E. 15次心脏按压，1次人工呼吸
- 正确答案：DAD 您选择的答案：

四、A4型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第31-33题

患儿，男，4岁。正坐在病房沙发上看电视，突遭电击，神志丧失，呼吸不规则。

- 1. 以下措施不正确的是
- A. 立即断电使病人脱离电击源
- B. 立即将病人平卧于沙发上开始胸外按压
- C. 立即托起下颌并清除口内异物
- D. 立即开始人工呼吸
- E. 擂击心前区数下以期其自动复跳
- 2. 若经心电图检查示室颤，拟行胸外电除颤，下列错误的是
- A. 首先保证呼吸供氧
- B. 如心电图为细颤应将其转为粗颤
- C. 尽量纠正酸中毒
- D. 两电极板分别置于胸骨左、右缘第四肋间
- E. 应在呼气末放电
- 3. 若患儿体重为15kg，首次电除颤所需电能是
- A. 20J
- B. 30J
- C. 40J
- D. 50J
- E. 60J

正确答案：BDB 您选择的答案：

五、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第34-36题

- A. 肾上腺素
 - B. 阿托品
 - C. 利多卡因
 - D. 氯化钙
 - E. 碳酸氢钠
 - 1. 心肺复苏的首选药物是
 - 2. 常用于治疗室性早搏或阵发性室性心动过速的药物是
 - 3. 对窦性心动过缓有较好疗效的药物是
- 正确答案：ACB 您选择的答案：

习题集 外科学 肿瘤

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 有关恶性肿瘤的临床表现，下列哪项是错误的

- A．疼痛为初发症状
 - B．常易出血和形成溃疡
 - C．局部不一定扪及肿块
 - D．可出现淋巴道和血道转移
 - E．消瘦、乏力、发热常为晚期表现
- 正确答案：A 您选择的答案：

第2题 特异性免疫治疗药物为

- A．卡介苗
 - B．转移因子
 - C．肿瘤免疫核糖核酸
 - D．左旋咪唑
 - E．干扰素
- 正确答案：C 您选择的答案：

第3题 普查原发性肝癌最简单有效的方法是

- A．B超检查
 - B．AFP定性检查
 - C．肝CT检查
 - D．肝MRI
 - E．同位素肝扫描
- 正确答案：B 您选择的答案：

第4题 来源于间叶组织的恶性肿瘤称为

- A．癌
 - B．肉瘤
 - C．母细胞瘤
 - D．瘤
 - E．白血病
- 正确答案：B 您选择的答案：

第5题 癌瘤广泛骨转移时可出现

- A 血钙升高
 - B 血钙降低
 - C 血镁升高
 - D 血镁降低
 - E 血磷升高
- 正确答案：A 您选择的答案：

第6题 因消化道恶性肿瘤转移最早受累的是

- A 肺
 - B 肾
 - C 肝
 - D 脾
 - E 胰
- 正确答案：C 您选择的答案：

第7题 下列肿瘤的诊断中，哪项是错误的

- A．X线检查对肿瘤的诊断有帮助
 - B．放射性核素扫描可显示出各种大小不等的肿瘤
 - C．超声波检查对肿瘤的部位、性质及范围有一定的参考价值
 - D．免疫学检查对早期肿瘤的诊断价值高
 - E．同工酶与癌胚抗原同时测定可提高癌的诊断率
- 正确答案：B 您选择的答案：

第8题 提高恶性肿瘤疗效的关键在于

- A．综合治疗
 - B．早期治疗
 - C．手术治疗
 - D．免疫治疗
 - E．中西医结合疗法
- 正确答案：B 您选择的答案：

第9题 下列哪种病变不属于癌前病变

- A．胆囊胆固醇息肉
 - B．肠道腺瘤样息肉
 - C．慢性萎缩性胃炎
 - D．慢性迁延性乙型肝炎
 - E．乳腺囊性增生症伴上皮增生
- 正确答案：A 您选择的答案：

第10题 下列哪项癌不符合联合应用抗肿瘤药物的原则

- A．联合用药越多越好

B. 给药程序和疗程应符合细胞动力学
C. 药物的毒性尽可能不重复
D. 原则上选用单独应用也有效的药物
E. 选择对细胞增殖周期作用不同、影响DNA合成不同时相的药物
正确答案：A 您选择的答案：

第11题 下列属于恶性肿瘤的是

- A. 脂肪瘤
- B. 纤维黄色瘤
- C. 精原细胞瘤
- D. 海绵状血管瘤
- E. 皮肤乳头状瘤

正确答案：C 您选择的答案：

第12题 目前诊断肿瘤准确性较高的方法是

- A. 脱落细胞学
- B. 病理组织学
- C. 超声波检查
- D. X线检查
- E. 核素检查

正确答案：B 您选择的答案：

第13题 直肠癌病人出现血尿及膀胱刺激症状，检查后认为是癌肿转移，这种转移属于

- A. 淋巴道转移
- B. 血道转移
- C. 直接浸润
- D. 种植性转移
- E. 直肠膀胱癌

正确答案：C 您选择的答案：

第14题 肿瘤诊断最重要的依据是

- A. 病程短、发展快
- B. 肿块质硬、固定
- C. 血清酶学及免疫学检查
- D. X线、放射性核素或超声波检查
- E. 病理学检查

正确答案：E 您选择的答案：

第15题 下列良性肿瘤的特点中，哪项是错误的

- A. 细胞分化程度高
- B. 多呈膨胀性生长
- C. 永不威胁生命
- D. 有包膜与周围有明显界限
- E. 少数可以恶变

正确答案：C 您选择的答案：

第16题 鉴别良、恶性肿瘤主要依靠

- A. 内镜检查
- B. 同位素检查
- C. 超声波检查
- D. 免疫学检查
- E. 细胞学检查

正确答案：E 您选择的答案：

第17题 对临界性肿瘤最有效的治疗方法是

- A. 手术治疗
- B. 放射治疗
- C. 化学治疗
- D. 中医治疗
- E. 免疫疗法

正确答案：A 您选择的答案：

第18题 下列各项中错误的是

- A. 恶性肿瘤可以直接侵犯邻近的脏器
- B. 恶性肿瘤淋巴转移都是由远到近
- C. 胃癌可种植到盆腔
- D. 结肠癌可转移到肝脏
- E. 乳癌可血行转移至骨骼

正确答案：B 您选择的答案：

第19题 下列良性肿瘤的特点中，错误的是

- A. 细胞分化程度高
- B. 多呈膨胀性生长，不发生转移
- C. 永不危及生命
- D. 有包膜与周围组织明显界限
- E. 少数可以恶变

正确答案：C 您选择的答案：

第20题 癌前病变转变为原位癌一般约需

- A. 30年

- B. 20年
- C. 10年
- D. 5年
- E. 2年

正确答案：C 您选择的答案：

第21题 下列属乳腺癌第 期的TNM临床分期是

- A. T1NoMo
- B. T1NoM1
- C. ToN1Mo
- D. T1N2Mo
- E. T1N1M1

正确答案：C 您选择的答案：

第22题 恶性肿瘤早期常有

- A 消瘦
- B 无力
- C 食欲不振
- D 贫血
- E 以上都不对

正确答案：E 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第23题 男性，53岁，发现背部：肿物3天 + 体检：背部可及一肿块，约2cm ~ 3cm大小，质软，分叶状，边界不清，与皮肤有粘连，活动度小，无压痛，皮肤无红肿，最可能为

- A. 皮脂腺囊肿
- B. 皮肤癌
- C. 脂肪瘤
- D. 纤维瘤
- E. 神经纤维瘤

正确答案：C 您选择的答案：

第24题 男性，55岁，直肠癌病人，2个月来常感腹部胀痛，排便困难。手术探查见直肠上段有一巨大肿块与盆壁明显固定，直肠可容小指尖通过，肠系膜及腹主动脉旁有多枚肿大淋巴结，肝右叶有结节2枚，此时较合适的治疗方法是

- A. 直肠癌根治术
- B. 直肠癌根治术并左肝叶切除
- C. 肿瘤局部切除
- D. 乙状结肠造口
- E. 关腹改用化疗或放疗

正确答案：D 您选择的答案：

第25题 女性，21岁，左乳房内可扪及一0.8cm×0.7cm肿块，质坚韧，表面光滑，可推动，疑为乳腺纤维瘤，应采取的治疗方法是

- A. 切除乳房
- B. 观察
- C. 切除肿块活检
- D. 乳腺导管造影
- E. 乳房X线摄片

正确答案：C 您选择的答案：

第26题 男性，40岁，上腹胀痛2年，有嗝气，无反酸，血清胃泌素14pg/ml，胃镜见胃窦部萎缩性胃炎，病理结果为慢性粘膜炎症，伴重度不典型增生。最理想的治疗方法为

- A. 手术治疗
- B. 应用H2-受体阻滞剂
- C. 应用抗多巴胺受体阻滞剂
- D. 应用胰酶制剂
- E. 应用肾上腺皮质激素

正确答案：A 您选择的答案：

第27题 男性，41岁，左面部一直径1cm圆形肿物；有时增大疼痛。肿物与皮肤有粘连，基底活动，无压痛，不硬，肿物皮肤表面有一黑点状物与肿物相连。诊断为

- A. 脂肪瘤
- B. 血管瘤
- C. 表皮样囊肿
- D. 皮脂腺囊肿
- E. 痣

正确答案：D 您选择的答案：

第28题 男性，46岁，上腹胀痛、乏力、消瘦、食欲下降5个月。查体：腹肌稍紧张，腹部有移动性浊音，贫血。直肠指诊于膀胱直肠窝扪及结节状硬块，无压痛，不活动。应考虑

- A. 直肠息肉
- B. 前列腺癌
- C. 盆腔脓肿
- D. 胃癌盆腔种植转移
- E. 直肠癌

正确答案：D 您选择的答案：

第29题 男性，50岁，直肠癌病人，2个月来常腹痛，排便困难。手术探查：直肠上端有巨大肿块与盆壁明显固定，直肠可容小指尖通过，肠系膜及腹主动脉旁有多枚肿大淋巴结，肝右叶有结节2枚。此时较合适的治疗方法是

- A．直肠癌根治术
- B．直肠癌根治术并左肝叶切除
- C．肿瘤局部切除
- D．乙状结肠造口
- E．关腹改用化疗或放疗

正确答案：D 您选择的答案：

第30题 女性，20岁，右乳房内可扪及一0.9cm×0.7cm肿块，质坚韧，表面光滑，可推动，疑为乳腺纤维瘤，应采取的治疗方法是

- A．切除乳房
- B．观察
- C．切除肿块活检
- D．乳腺导管造影
- E．乳房X线摄片

正确答案：C 您选择的答案：

第31题 女性，42岁，上腹胀痛3年，有嗝气，无反酸。查血清胃泌素14pg/m1，胃镜见胃窦部萎缩性胃炎，病理结果为慢性黏膜炎症，伴重度不典型增生，最理想的治疗方法是

- A．手术治疗
- B．H2受体阻滞剂
- C．抗多巴胺受体阻滞剂
- D．胰酶制剂
- E．肾上腺皮质激素

正确答案：A 您选择的答案：

第32题 男性，45岁，上腹胀痛、乏力、消瘦、食欲下降7个月。体检：贫血貌。腹肌稍紧张，腹部有移动性浊音。直肠指诊于膀胱直肠窝扪及结节状硬块，无压痛，不活动

- A．直肠息肉
- B．前列腺癌
- C．盆腔脓肿
- D．胃癌盆腔种植转移
- E．直肠癌

正确答案：D 您选择的答案：

三、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第33-34题

女性，38岁，左乳发现一无痛性肿块，约“黄豆”大小，质较软，可推动，挤压乳头时有血性液体流出，X线摄片检查未见异常。

- 1．首先要考虑的诊断是
 - A．乳房囊性增生病
 - B．乳癌
 - C．乳管内乳头状瘤
 - D．乳房纤维腺瘤
 - E．乳房结核
- 2．首选的治疗方法有
 - A．全乳房切除
 - B．乳癌根治术
 - C．乳癌扩大根治术
 - D．乳腺区段切除术
 - E．乳癌改良根治术

正确答案：CD 您选择的答案：

第35-36题

某女性患者，37岁，发现左侧颈部肿块4年余，自觉无任何不适，未曾就诊。近日来出现左颈部肿块疼痛，肿块较前增大。体检：左颈部扪及4cm×3cm肿块，质较硬，边界清楚，随吞咽上下活动，局部轻度压痛，无红肿。B超检查提示左甲状腺囊性占位性病变。

- 1．最可能的诊断是
 - A．甲状腺腺瘤囊性变并囊内出血
 - B．甲状腺腺瘤恶性变
 - C．急性甲状腺炎
 - D．亚急性甲状腺炎
 - E．桥本病
- 2．最佳治疗方案是
 - A．止血治疗
 - B．抗感染治疗
 - C．理疗
 - D．碘剂治疗
 - E．手术治疗

正确答案：AE 您选择的答案：

第37-38题

男性，45岁，出现皮肤、巩膜黄染1个月余，并进行性加重。无发热、腹痛。粪便呈陶土色，成形，尿外观呈“浓茶”样。

- 1．最可能的诊断是

- A. 胆囊颈结石压迫胆总管
 - B. 壶腹周围癌
 - C. 胆总管下端结石嵌顿
 - D. 癌肿压迫肝总管
 - E. 硬化性胆管炎致胆汁淤滞
2. 以下哪项检查对诊断最有帮助
- A. 肝功能检查
 - B. 上腹部CT检查
 - C. 甲胎蛋白检查
 - D. 胆管造影
 - E. 尿三杯检查
- 正确答案：BB 您选择的答案：

第39-40题

男性，48岁，皮肤、巩膜黄染1个月余，并进行性加重。无发热、腹痛。粪便呈白陶土色，成形，尿外观呈“浓茶”样。

1. 最可能的诊断是
- A. 胆囊颈结石压迫胆总管
 - B. 壶腹周围癌
 - C. 胆总管下端结石嵌顿
 - D. 癌肿压迫肝总管
 - E. 硬化性胆管炎致胆汁淤滞
2. 以下哪项检查对诊断最有帮助
- A. 肝功能检查
 - B. 上腹部CT检查
 - C. 甲胎蛋白检查
 - D. 胆管造影
 - E. 尿三杯检查
- 正确答案：BB 您选择的答案：

第41-42题

慢性肝病患者，普查发现甲胎蛋白3次阳性，肝功能正常，肝区触诊无异常，诊断为早期肝癌

1. 下列哪项检查对定位最有帮助
- A. 选择性肝动脉造影
 - B. 放射性核素扫描
 - C. 超声波断层扫描
 - D. X线断层扫描
 - E. 以都不是
2. 理想的治疗方法是
- A. 力争手术切除
 - B. 局部外照射
 - C. 联合化疗
 - D. 免疫疗法
 - E. 中医治疗
- 正确答案：DA 您选择的答案：

第43-44题

女性，35岁，发现右侧颈部肿块5年余，自觉无任何不适，未曾就诊。近日来出现右颈部肿块疼痛，肿块较前增大。查体：右颈部扪及3cm×3cm肿块，质较硬，边界清楚，随吞咽上下活动，局部轻度压痛，无红肿。B超检查提示右甲状腺囊性占位性病变

1. 最可能的诊断是
- A. 甲状腺腺瘤囊性变并囊内出血
 - B. 甲状腺腺瘤恶性变
 - C. 急性甲状腺炎
 - D. 亚急性甲状腺炎
 - E. 桥-本病
2. 最佳治疗方案为
- A. 止血治疗
 - B. 抗感染治疗
 - C. 理疗
 - D. 碘剂治疗
 - E. 手术治疗
- 正确答案：AE 您选择的答案：

第45-46题

女性，52岁，发现右乳外上象限肿块3个月，约3cm×2.5cm大小，同侧腋窝触及肿大、质硬淋巴结，全身情况良好

1. 为确诊肿块性质最好采用
- A. 红外线摄影
 - B. 钼靶X线摄影
 - C. 穿刺活检
 - D. 切除活检
 - E. 切取活检
2. 如确诊为乳癌，较理想的治疗方案为
- A. 乳癌根治术
 - B. 乳癌根治术加放射治疗
 - C. 乳癌根治术加免疫治疗
 - D. 乳癌根治术加中医治疗
 - E. 乳癌根治术加内分泌治疗
- 正确答案：DB 您选择的答案：

四、A4型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第47-48题

女性，53岁，发现左乳外上象限肿块4个月。体检：左乳外上象限可触及一包块，约3cm×3cm大小。同侧腋窝触及肿大、质硬淋巴结，全身情况良好。

1. 为确诊肿块性质最好采用

- A. 红外线摄影
- B. 钼靶X线摄影
- C. 穿刺活检
- D. 切除活检
- E. 乳腺B超检查

2. 若确诊为乳腺癌，较理想的治疗方案为

- A. 乳癌根治术
- B. 乳癌根治术加放射治疗
- C. 乳癌根治术加免疫治疗
- D. 乳癌根治术加中医治疗
- E. 乳癌根治术加内分泌治疗

正确答案：DB 您选择的答案：

五、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第49-51题

- A. 血行转移
- B. 直接蔓延
- C. 淋巴转移
- D. 种植转移
- E. 胃肠道管腔内转移

- 1. 直肠癌转移到肝为
- 2. 胃癌转移到盆腔为
- 3. 直肠癌转移到膀胱为

正确答案：ADB 您选择的答案：

第52-54题

- A. 内镜检查
- B. 脱落细胞检查
- C. 超声波断层检查
- D. 甲胎蛋白定量测定
- E. 选择性动脉造影
- 1. 可发现局限粘膜的早期食管癌
- 2. 判断肝癌的疗效及预后
- 3. 是一种非侵入性检查方法

正确答案：BDC 您选择的答案：

习题集 外科学 烧伤

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 烧伤抗休克期的补液量应根据下列各项计算，但要除外

- A. Ⅱ度烧伤面积
- B. Ⅲ度烧伤面积
- C. Ⅰ度烧伤面积
- D. 体重
- E. 一个常数

正确答案：A 您选择的答案：

第2题 深Ⅱ度烧伤的临床表现，下列错误的是

- A. 有时在大腿可见树枝状栓塞血管
- B. 创面多有水泡
- C. 创面痛觉迟钝
- D. 如无感染、创面3~4周愈合
- E. 愈合后多有增生性瘢痕

正确答案：A 您选择的答案：

第3题 在全国通用的烧伤补液公式中，下列正确的是

- A. 面积是Ⅱ、Ⅲ度烧伤面积之和
- B. 胶体液首选是全血
- C. 第一个8小时应输入总量的1/3
- D. 基础水分量是2500ml
- E. 胶体液和电解质溶液的比例是0.5:1，重者1:1

正确答案：E 您选择的答案：

第4题 大面积烧伤早期发生的休克，多为

- A. 神经源性休克
- B. 心源性休克
- C. 低血容量性休克
- D. 过敏性休克
- E. 感染性休克

正确答案：C 您选择的答案：

第5题 烧伤休克期补液时，调节补液量及速度的指标不包括

- A. 尿量
- B. 血pH和CO₂CP，红细胞比容
- C. 自觉症状，有无口干、烦躁
- D. 心率、血压、中心静脉压
- E. 末梢循环，甲床毛细血管充血反应

正确答案：B 您选择的答案：

第6题 烧伤病人在早期口渴，最适饮下列哪种液体

- A. 大量冷开水
- B. 大量糖水
- C. 少量多次饮盐水
- D. 大量茶水
- E. 大量橘子水

正确答案：C 您选择的答案：

第7题 电烧伤的首先处理是

- A. 补液
- B. 清创
- C. 应用抗生素
- D. 心肺复苏
- E. 切断电源

正确答案：E 您选择的答案：

第8题 烧伤后病人出现休克症状时，最早的治疗措施中，下列哪项是错误的

- A. 立即转往有条件的医院治疗
- B. 镇静止痛
- C. 立即静脉输液
- D. 保护创面，防止再损伤
- E. 注意合并伤的诊断及处理

正确答案：A 您选择的答案：

第9题 用九分法计算成人烧伤面积，下列错误的是

- A. 头颈部9%
- B. 两上肢18%
- C. 躯干27%
- D. 两臀部9%
- E. 双下肢41% (不含臀部)

正确答案：D 您选择的答案：

第10题 关于电烧伤，错误的是

- A. 电流通过人体有入口和出口

- B. 出口处较入口处重
- C. 入口处常炭化
- D. 损伤范围常外小内大
- E. 烧伤常达肌肉、骨

正确答案：B 您选择的答案：

第11题 判断烧伤创面深度的主要依据是

- A. 创面的肿胀程度
- B. 创面有无水泡
- C. 创面疼痛情况
- D. 创面渗出情况
- E. 创面残存上皮的有无和多少

正确答案：E 您选择的答案：

第12题 用九分法计算成人烧伤面积，下列错误的是

- A. 颈部3%
- B. 双手6%
- C. 双上臂7%
- D. 躯干前13%
- E. 双大腿21%

正确答案：B 您选择的答案：

第13题 度烧伤，下列正确的是

- A. 痛觉迟钝
- B. 有水疱
- C. 有栓塞的小血管枝
- D. 没有焦痂形成
- E. 留有瘢痕

正确答案：E 您选择的答案：

第14题 下列烧伤急救原则中，正确的是

- A. 凡有呼吸道烧伤，一律做气管切开
- B. 凡有烧伤者，一律用哌替啶止痛
- C. 热液烫伤者，不能用较干净冷水浸泡
- D. 应就地给予清创
- E. 立即消除烧伤原因

正确答案：E 您选择的答案：

第15题 浅度烧伤的局部损害深度达

- A. 表浅层，生发层健在
- B. 真皮深层，有皮肤附属器残留
- C. 真皮浅层，部分生发层存在
- D. 皮肤全层
- E. 皮肤下脂肪

正确答案：C 您选择的答案：

第16题 大面积烧伤病人第一个8小时的晶、胶体输入量为

- A. 是第一个24小时总入量的1/4
- B. 是第一个24小时总入量的1/3
- C. 是第一个24小时总入量的1/2
- D. 是第一个24小时总入量的2/3
- E. 是第一个24小时总入量的3/4

正确答案：C 您选择的答案：

第17题 深度烧伤20%属于

- A. 轻度烧伤
- B. 中度烧伤
- C. 重度烧伤
- D. 特重烧伤
- E. 小面积烧伤

正确答案：B 您选择的答案：

第18题 烧伤后病人出现休克症状时，最早的治疗措施中，下列哪项错误

- A. 立即转往有条件的医院治疗
- B. 镇静止痛
- C. 立即静脉输液
- D. 保护创面，防止再损伤
- E. 注意合并伤的诊断及处理

正确答案：A 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第19题 男性，42岁。度烧伤面积5%，局部创面处理应选用

- A. 湿润烧伤膏
- B. 新洁尔灭
- C. 碘伏
- D. 2%碘酊
- E. 75%乙醇

正确答案：C 您选择的答案：

第20题 女性，42岁。 度烧伤50%， 度烧伤5%。用青霉素、链霉素治疗4天后，骤起寒战、高热。伴烦躁、腹胀。体检：体温40.0，血压75/50mmHg(10/6.67kPa)。血常规示白细胞 $34 \times 10^9/L$ ，分类见中幼与晚幼粒细胞。应考虑可能为

- A. 链球菌所致脓毒症
- B. 大肠杆菌所致脓毒症
- C. 金黄色葡萄球菌所致脓毒症
- D. 绿脓杆菌所致脓毒症
- E. 真菌所致脓毒症

正确答案：C 您选择的答案：

第21题 男性，15岁。右手电烧伤，入口处(右拇指)皮肤炭化，出口处不明显。入院后采用暴露疗法，每日消毒皮肤2~3次。手术探查日期应选在伤后

- A. 1天
- B. 2~3天
- C. 4~9天
- D. 10~12天
- E. 13~15天

正确答案：B 您选择的答案：

第22题 患儿，男，15岁。右足和右小腿被开水烫伤，有水泡伴剧痛。创面基底肿胀、发红。该病人烧伤面积和深度的诊断为

- A. 5%浅 度
- B. 5%深 度
- C. 10%浅 度
- D. 10%深 度
- E. 15%浅 度

正确答案：C 您选择的答案：

第23题 男性，35岁，体重60kg。烧伤总面积为60%。伤后第一个8小时所需晶、胶体量是

- A. 1700ml
- B. 2700ml
- C. 3400ml
- D. 3600ml
- E. 5400ml

正确答案：B 您选择的答案：

第24题 女性，23岁，体重50kg。 度烧伤面积80%。正确的处理原则是

- A. 彻底清创
- B. 采用包扎疗法
- C. 全身应用抗生素
- D. 第一个24小时补液8000ml
- E. 保持清洁，防避再损伤

正确答案：E 您选择的答案：

三、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第25-27题

男，10岁，头面部，四肢及会阴部火焰烧伤4小时，烧伤总面积50%BSA，深 度20%， 度30%，烦躁不安，手足湿冷，心率160次/分，呼吸25次/分，伤后无尿。

1. 首选的诊断是

- A. 火焰烧伤
 - B. 烧伤休克
 - C. 急性肾功能衰竭
 - D. 呼吸道吸入性损伤
 - E. 大面积特重度烧伤
2. 实验室检查最可能的发现是
- A. 血白细胞总数增高，血小板低
 - B. 血电解质检查异常
 - C. 红细胞比容增高
 - D. 血CO₂CP降低，尿素氮增高
 - E. 尿蛋白阳性，有血红蛋白尿

3. 首选的紧急处理是

- A. 立即吸氧
- B. 迅速建立静脉输液通路
- C. 气管切开
- D. 无痛下清创
- E. 及时使用抗生素

正确答案：ECB 您选择的答案：

第28-29题

陈某，男，40岁，体重50kg，烧伤后3小时入院。入院时患者诉疼痛剧烈，特别在面颈部和胸腹部，感口渴。查：面色苍白，四肢发冷，烦躁不安、心率150次/分，血压85/65mmHg，发声无嘶哑，呼吸平稳，两肺听诊闻干、湿性啰音，尿检阴性。局部创面情况：整个面部、颈部肿胀、头皮完好、面颈部皮肤可见大小水泡，胸、腹、背和会阴部也布满大小不等水泡，部分水泡破溃，可见潮红创面。两上肢除右手背无潮红无水疱外，余创面苍白，部分成焦黄色，无水疱，毛发易拔除，无痛觉。两下肢及臀部未烧伤

1. 该病员 度、 度烧伤面积各为

- A. 度30.5%、度17%
 - B. 度35%、度17.5%
 - C. 度33%、度17%
 - D. 度33%、度22%
 - E. 度30%、度15%
2. 其中三度创面的常规处理原则是
- A. 休克纠正后切痂植皮
 - B. 休克纠正后8~14天,分次切痂植皮
 - C. 休克纠正后切痂,分次植皮
 - D. 休克纠正后3~7天,分次切痂植皮
 - E. 休克纠正后1~2天,分次切痂植皮
- 正确答案: CD 您选择的答案:

第30-32题

患儿,男性,9岁。头面部、四肢及会阴部火焰烧伤4小时,烧伤总面积占体表面积50%,深度20%,度30%。伤后无尿。烦躁不安,手足湿冷。心率160次/分,呼吸25次/分。

1. 首先考虑的诊断是
- A. 火焰烧伤
 - B. 烧伤休克
 - C. 急性肾功能衰竭
 - D. 呼吸道吸入性损伤
 - E. 大面积特重度烧伤
2. 实验室检查最可能的发现是
- A. 血白细胞总数增高,血小板低
 - B. 血电解质检查异常
 - C. 红细胞压积增高
 - D. 血CO₂CP降低,尿素氮增高
 - E. 尿蛋白阳性,有血红蛋白尿
3. 首选的紧急处理是
- A. 立即吸氧
 - B. 迅速建立静脉输液通路
 - C. 气管切开
 - D. 无痛下清创
 - E. 及时使用抗生素

正确答案: ECB 您选择的答案:

第33-35题

成人,体重60kg,烧伤,于下午4时,送入医院急诊室,检查:意识清,能合作,心率100次/分,血压16.0/11.2kPa(120/84-mmHg),面部、胸、腹部,两前臂、两手及两小腿和足部、度烧伤,下午5时开始静脉输液,6时入手术室、清创,晚上8时送病房

1. 烧伤总面积为
- A. 47%
 - B. 48%
 - C. 49%
 - D. 50%
 - E. 51%
2. 输液计划起算时间
- A. 下午2时
 - B. 下午4时
 - C. 下午5时
 - D. 下午6时
 - E. 下午8时
3. 烧伤后第一个24h应补给胶、晶液体计算量为
- A. 5600ml
 - B. 6200ml
 - C. 6800ml
 - D. 5400ml
 - E. 6000ml

正确答案: ABB 您选择的答案:

第36-38题

男,29岁,酒后室内煤炉取暖入睡后火焰烧伤3小时,烧伤总面积80%,其中深度30%,度50%,伤后无尿,心率148次/分,呼吸32次/分,伤后头8小时输液4500ml(其中胶体1800ml)后仍无尿

1. 针对无尿首先应
- A. 加快补液速度
 - B. 用利尿剂
 - C. 查血电解质、尿素氮及肌酐
 - D. 进一步询问病史,了解伤前情况
 - E. 检查膀胱区及导尿管
2. 还应选择下列哪项措施以利诊断及治疗
- A. 肝肾功能的相关检查
 - B. 血气分析
 - C. 补充询问患者伤前及伤时病史
 - D. 氧合血红蛋白测定
 - E. 催吐或洗胃伤后第9天,体温39.8,心率148次/分,呼吸36次/分,创面潮湿焦痂下积脓,感染向邻近健康组织侵袭,血培养阴性
3. 最可能的原因是
- A. 由于大剂量抗生素使用出现假阴性
 - B. 烧伤创面脓毒症
 - C. 培养条件不宜细菌生长

D. 烧伤败血症合并脓毒症

E. 脓毒血症

正确答案：ECB 您选择的答案：

四、A4型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第39-41题

女性，32岁。深度烧伤面积10%，度烧伤面积30%，伤后注射止痛针后转院治疗，途中1小时，入院体检：血压70/40mmHg(9.33/5.33kPa)，脉搏130次/分。

1. 发生的休克是

A. 神经源性

B. 过敏性

C. 心源性

D. 低血容量性

E. 感染性

2. 若病人体重60kg，第一个8小时应补给液体总量为

A. 2000ml

B. 2200ml

C. 2800ml

D. 4400ml

E. 5600ml

3. 若病人经3天治疗后情况逐渐稳定，下一步要考虑的治疗是

A. 加大抗生素剂量，预防创面感染

B. 创面湿敷使焦痂软化脱落

C. 有计划安排分期切除焦痂及削痂，植异体皮嵌入自体皮

D. 立即一次切除全部焦痂及削去所有深度坏死组织，植自体皮

E. 尽一切努力保护焦痂及痂皮，等待蚕食脱落并植自体皮

正确答案：DCC 您选择的答案：

五、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第42-43题

A. 败血症

B. 菌血症

C. 创面脓毒症

D. 脓毒血症

E. 真菌败血症

1. 男，32岁，度烧伤40%，伤后10天，体温40℃，心率140次/分，呼吸36次/分，创面湿，灶性积脓，创周炎症明显，血白细胞计数 $20 \times 10^9/L$ ，血培养无菌生长

2. 女，6岁，烧伤50%，度20%，体温37℃，心率136次/分，呼吸36次/分，创面可见坏死斑，血培养为阴沟杆菌

正确答案：CA 您选择的答案：

第44-46题

A. 皮肤损害

B. 肌肉、神经和血管损害

C. 肝肾损害

D. 肺部损害

E. 心脏损害

1. 220V电压接触伤时可发生

2. 高压电基础伤时可发生

3. 电弧伤时可发生

正确答案：EBA 您选择的答案：

第47-49题

A. 气管切开

B. 气管插管

C. 鼻饲给氧

D. 静脉切开或静脉穿刺插管

E. 静脉穿刺下列病例首选治疗方案是上述哪项

1. 男，32岁，火焰烧伤全身3小时，烧伤总面积95%，其中度80%，伤后无尿，未行其他任何处理

2. 男，28岁，室内液化气火焰烧伤6小时，烧伤总面积60%，面颈及双上肢为深度至度烧伤，鼻毛烧焦，声嘶，近1小时来患者出现进行性呼吸困难，目前患者神志不清，心率120次/分，呼吸4~8次/分，呈叹息样

3. 男，33岁，火焰烧伤面颈部及双手3小时，面颈部为度烧伤，体温37℃，心率96次/分，呼吸36次/分，声嘶，咽部红肿

正确答案：DBA 您选择的答案：

习题集 外科学 创伤和战伤

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 一车祸伤员送至急诊时，诉呼吸困难，腹部剧痛，检查发现左胸有一伤口，有气泡与血液从伤口涌出，右上腹皮肤

有伤痕，神志清楚，血压60/30mmHg，心率110次/分，呼吸40次/分，B超发现有肝破裂。此伤员应属于

- A．多发伤
- B．联合伤
- C．复合伤
- D．胸腹伤
- E．混合伤

正确答案：A 您选择的答案：

第2题 两个以上解剖部位的较严重创伤，即使单独存在也属于严重创伤，应称为

- A．联合伤
- B．多处伤
- C．多发伤
- D．挤压伤
- E．复合伤

正确答案：C 您选择的答案：

第3题 创伤性休克的急救，主要措施是

- A．制止出血，补充血容量
- B．及时手术
- C．分级后送
- D．应用抗休克药物
- E．尽快包扎伤口

正确答案：A 您选择的答案：

第4题 关于伤员搬运法则，下列哪项是错误的

- A．火线上伤员搬运，必须防避敌人火力
- B．缺乏搬运工具时，必须就地取材
- C．对骨折、尤以脊柱损伤者，必须保持伤处稳定，切勿弯曲和扭曲
- D．不可双手徒手抬送伤员
- E．对昏迷伤员，搬运时必须保持呼吸道通畅

正确答案：D 您选择的答案：

第5题 复合性创伤病人出现以下列情况，应首先抢救

- A．休克
- B．开放性气胸
- C．四肢开放性创伤
- D．昏迷
- E．肾挫裂伤

正确答案：B 您选择的答案：

第6题 下列哪一种损伤易引起急性肾功能衰竭

- A．肝、脾破裂
- B．多发肋骨骨折
- C．肾挫裂伤
- D．挤压伤
- E．多发性骨折伴休克

正确答案：D 您选择的答案：

第7题 刀刺伤18小时，伤口处红肿，有渗出液，最恰当的治疗措施是

- A．清创缝合
- B．用抗生素
- C．理疗
- D．换药
- E．局部固定

正确答案：D 您选择的答案：

第8题 高速弹丸击中人体后只有入口而无出口者称

- A．贯通伤
- B．盲管伤
- C．切线伤
- D．反跳伤
- E．冲击伤

正确答案：B 您选择的答案：

第9题 火器伤清创术中下列哪项是错误的

- A．用1%的双氧水清洗伤口
- B．切除失去生机的肌肉
- C．肌腱必须一期缝合
- D．扩大切口
- E．去除伤口内血块、脱落的组织碎片、异物

正确答案：C 您选择的答案：

第10题 伴有窒息的伤员，现场急救首要的措施是

- A．通畅气道，必要时人工呼吸
- B．立即送医院
- C．抗休克
- D．应用抗菌药物
- E．立即包扎伤口

正确答案：A 您选择的答案：

第11题 严重损伤后需及时处理的代谢变化是

- A．代谢性碱中毒
- B．呼吸性碱中毒
- C．早期混合性碱中毒
- D．代谢性酸中毒
- E．混合性酸中毒

正确答案：D 您选择的答案：

第12题 贯通伤是指

- A．创伤后深部体腔与外界相通
- B．开放性创伤
- C．投射物击中人体，造成一个入口和一个出口
- D．一般是指开放性颅脑损伤
- E．可等同于穿透伤

正确答案：C 您选择的答案：

第13题 刺伤的特点是

- A．伤道内污染较轻
- B．伤情一般不重
- C．伤口的大小一般可以反映伤情的轻重
- D．伤口小，伤道深，可能伤及深部内脏
- E．不会造成大出血

正确答案：D 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第14题 女性，35岁。房屋倒塌，胸部以上被压伤30分钟，呼吸困难，无腹痛、呕吐。体检：血压140 / 110mmHg (18.67 / 14.67kPa)，脉搏110次 / 分，呼吸34次 / 分。神志清楚，两眼结合膜有出血，颈静脉怒张，前胸及肩部有散在的出血点，尿常规阴性。最可能的诊断是

- A．挤压伤综合征
- B．创伤性休克
- C．创伤性窒息
- D．广泛软组织挫伤
- E．眼外伤

正确答案：C 您选择的答案：

第15题 男性，22岁。手枪子弹射中左股根部2天。体检发现伤口红肿，有少许脓性分泌物，且子弹只有入口没有出口。应采取的治疗措施是

- A．立即取出子弹
- B．清创
- C．清创缝合
- D．引流
- E．换药

正确答案：D 您选择的答案：

第16题 某车祸伤员，男性，34岁。送至急诊时，诉呼吸困难，腹部剧痛。体检发现左胸有一伤口，有气泡与血液从伤口涌出，右上腹皮肤有伤痕。神志清楚，测血压60 / 30mmHg (8 / 4kPa)，心率110次 / 分，呼吸40次 / 分。查

B超发现有肝破裂。此伤员应属于

- A．多发伤
- B．联合伤
- C．复合伤
- D．胸腹伤
- E．混合伤

正确答案：A 您选择的答案：

三、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第17-18题

一患者车祸后2小时送至医院，诉咳嗽、胸部疼痛。查T36.5℃，P130次/分，R30次/分，BP90/60mmHg，神清，右胸部压痛明显，右肺呼吸音低，右下肢骨折征。胸片示：右侧液气胸

- 1．拟诊为
- A．联合伤
- B．混合伤
- C．多发伤
- D．多处伤
- E．复合伤

2．首先应采取的处理是

- A．止痛

- B. 骨折固定
- C. 镇静
- D. 胸腔闭式引流
- E. 吸氧

正确答案：CD 您选择的答案：

第19-21题

某男性，29岁，因车祸外伤急送医院急诊。咯血、口鼻均有鲜血外溢，呼吸困难。体检：心率100次/分，血压130/90mmHg(17.33/12kPa)，神志模糊，烦躁不安。左侧胸壁严重擦伤，肿胀。四肢活动尚可，左大腿中下段中度肿胀，有瘀斑和严重擦伤。

1. 此时最紧迫的抢救措施是

- A. 请胸外科医师会诊处理
- B. 清除上呼吸道异物，保持呼吸道通畅
- C. 输血
- D. 吸氧
- E. 左下肢夹板固定

2. 下列哪项诊断可不予考虑

- A. 颅脑创伤
- B. 鼻骨骨折
- C. 肋骨骨折
- D. 左股骨骨折
- E. 血气胸

3. 下列不必紧急做的是

- A. 吸氧
- B. 颅脑与胸部、左股骨X线摄片
- C. 多科会诊
- D. 左下肢包扎固定
- E. 输血

正确答案：BDE 您选择的答案：

第22-23题

患者男性，40岁，8小时前因塌方砸伤双下肢，伤后排尿一次，红茶色，体检：神清，血压140/90mmHg，心率62次/分，心律不齐，肢体肌张力低

1. 此病人不应选择下列哪项治疗

- A. 输入甘露醇
- B. 输入碳酸氢钠
- C. 输血
- D. 口服离子交换树脂
- E. 输入葡萄糖加胰岛素如患者急查血电解质示血清钾为6.0mmol/L

2. 此时应采取的措施是

- A. 血液透析
- B. 输入碳酸氢钠
- C. 输入葡萄糖酸钙
- D. 口服离子交换树脂
- E. 利尿

正确答案：CB 您选择的答案：

第24-26题

男性，19岁，车祸致伤，即来院急诊，神志朦胧、咯血、口鼻均有泥砂夹血外溢，呼吸困难、烦躁不安。左胸侧严重擦伤，肿胀，心率98次/分，血压16/12kPa(120/90-mmHg)，四肢活动尚可，左大腿中下段中度肿胀，有瘀斑和严重擦伤

1. 此时最紧迫的抢救措施是

- A. 请胸外科医师会诊处理
- B. 清除上呼吸道异物，保持呼吸道通畅
- C. 输血
- D. 吸氧
- E. 左下肢夹板固定

2. 下列哪项诊断可不予考虑

- A. 颅脑创伤
- B. 鼻骨骨折
- C. 肋骨骨折
- D. 左股骨骨折
- E. 血气胸

3. 下列处理中不必紧急做的是

- A. 吸氧
- B. 颅脑与胸部、左股骨X线摄片
- C. 多科会诊处理
- D. 左下肢包扎固定
- E. 输血

正确答案：BDE 您选择的答案：

四、A4型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第27-29题

男性，34岁。被汽车撞伤下腹部及会阴部。测血压70/50mmHg(9.33/6.67kPa)。体检及辅助检查发现骨盆骨折、腹膜后血肿、后尿道损伤。

1. 首先的处理是

- A. 骨盆牵引固定

- E. 清创
 - C. 抗休克
 - D. 处理尿道损伤
 - E. 清除腹膜后血肿
 - 2. 若合并直肠损伤，应采取的措施是
 - A. 直肠修补
 - B. 清创
 - C. 乙状结肠造瘘
 - D. 直肠造瘘
 - E. 引流
 - 3. 如伤后2~3天疼痛无缓解，反而加剧，应首先考虑
 - A. 并发感染加重
 - B. 组织缺血
 - C. 神经系统受损
 - D. 感觉过敏
 - E. 病情好转
- 正确答案：CCA 您选择的答案：

五、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第30-32题

- A. 切口分类及愈合记录为"I / 甲"
 - B. 切口分类及愈合记录为" / 丙"
 - C. 切口分类及愈合记录为" / 甲"
 - D. 切口分类及愈合记录为" / 乙"
 - E. 切口分类及愈合记录为" / 甲"
 - 1. 腹股沟疝修补术，切口愈合良好
 - 2. 右胫腓骨开放骨折，清创内固定后切口愈合良好
 - 3. 腰椎结核伴椎旁冷脓肿病灶清除术，切口愈合良好
- 正确答案：ACE 您选择的答案：

第33-35题

- A. 清创及一期缝合
 - B. 清创后暂不予缝合
 - C. 清创及植皮
 - D. 清创后引流
 - E. 局部消毒包扎
 - 1. 大面积皮肤剥脱伤需
 - 2. 受伤6~8小时内的战地伤口应
 - 3. 浅表小伤口需
- 正确答案：CBE 您选择的答案：

第36-37题

- A. 清创及一期缝合
 - B. 清创后不予缝合
 - C. 清创及植皮
 - D. 清创后缝合
 - E. 清创后不植皮
 - 1. 大面积皮肤剥脱伤需
 - 2. 受伤6~8小时内的战地伤口应
- 正确答案：CB 您选择的答案：

习题集 外科学 外科感染

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 不能引起菌血症的细菌是

- A. 葡萄球菌
- B. 链球菌
- C. 大肠杆菌
- D. 破伤风杆菌
- E. 绿脓杆菌

正确答案：D 您选择的答案：

第2题 能引起转移性脓肿的细菌是

- A. 葡萄球菌
- B. 链球菌
- C. 大肠杆菌
- D. 绿脓杆菌
- E. 变形杆菌

正确答案：A 您选择的答案：

第3题 下列哪项不属于预防性应用抗生素的适应证

- A. 开放性骨折
- B. 上消化道溃疡穿孔
- C. 胃迷走神经切断术
- D. 结肠手术前肠道准备
- E. 接受激素或抗癌治疗的病人需做手术时

正确答案：C 您选择的答案：

第4题 下列感染不属于外科感染的是

- A. 急性阑尾炎
- B. 肝脓肿
- C. 急性化脓性蜂窝织炎
- D. 菌痢
- E. 膈下脓肿

正确答案：D 您选择的答案：

第5题 破伤风病人使用破伤风抗毒素的目的是

- A. 中和游离毒素
- B. 中和已与神经组织结合的毒素
- C. 获得自动免疫
- D. 获得被动免疫
- E. 控制和解除痉挛

正确答案：A 您选择的答案：

第6题 伤口附近出现“红线”是

- A. 浅层静脉炎
- B. 深层静脉炎
- C. 网状淋巴管炎
- D. 浅层管状淋巴管炎
- E. 深层管状淋巴管炎

正确答案：D 您选择的答案：

第7题 对指甲下脓肿应采取的最佳措施是

- A. 理疗
- B. 热敷
- C. 用抗生素
- D. 拔除指甲
- E. 在甲沟处切开引流

正确答案：D 您选择的答案：

第8题 脓血症的主要特点是

- A. 寒战
- B. 高热
- C. 病情发展迅速
- D. 白细胞计数明显增高
- E. 转移性脓肿

正确答案：E 您选择的答案：

第9题 疔病常见于

- A. 糖尿病病人
- B. 肝炎病人
- C. 胃癌病人
- D. 胃溃疡病人
- E. 血管病病人

正确答案：A 您选择的答案：

第10题 手部化脓性感染的手术原则应除外

- A. 手术时宜应用区域组织阻滞麻醉

B. 脓液应作细菌培养及药敏试验
C. 伤口不应置引流物，以免影响功能
D. 应用抗菌药物
E. 炎症消退后，早期进行功能锻炼
正确答案：C 您选择的答案：

第11题 引起气性坏疽的病原菌是

- A. 金黄色葡萄球菌
- B. 厌氧性链球菌
- C. 变形杆菌
- D. 梭状芽胞杆菌
- E. 大肠杆菌

正确答案：D 您选择的答案：

第12题 深部脓肿的特点是

- A. 局部红、肿、热、痛明显
- B. 局部波动感明显
- C. 全身中毒症状不明显
- D. 局部仅有水肿现象，但无压痛
- E. 局部水肿、压痛明显，穿刺可抽到脓液

正确答案：E 您选择的答案：

第13题 破伤风最初出现典型的肌肉强烈收缩是

- A. 咬肌
- B. 面肌
- C. 颈项肌
- D. 背腹肌
- E. 四肢肌

正确答案：A 您选择的答案：

第14题 不能引起败血症的细菌是

- A. 葡萄球菌
- B. 链球菌
- C. 大肠杆菌
- D. 破伤风杆菌
- E. 绿脓杆菌

正确答案：D 您选择的答案：

第15题 气性坏疽伤口处有淡红色液体渗出并有气泡，最重要的处理措施是

- A. 急诊清创
- B. 继续使用抗生素
- C. 理疗
- D. 全身支持治疗
- E. 高压氧治疗

正确答案：A 您选择的答案：

第16题 关于深部脓肿，下列哪项是错误的

- A. 局部有疼痛与压痛
- B. 有凹陷性水肿
- C. 可扪及波动感
- D. 有明显全身症状
- E. 穿刺有脓

正确答案：C 您选择的答案：

第17题 破伤风最先出现的症状是

- A. 苦笑面容
- B. 颈项强直
- C. 张口困难
- D. 角弓反张
- E. 手足抽搐

正确答案：C 您选择的答案：

第18题 下列有关外科感染的问题，错误的是

- A. 疖是毛囊与邻近皮脂腺的化脓性感染
- B. 痈是多数散在不相关联的疖
- C. 丹毒是皮内网状淋巴管的炎性病变
- D. 急性蜂窝织炎是皮下结缔组织的感染
- E. 脓肿是急性感染的局限性脓液聚集

正确答案：B 您选择的答案：

第19题 化脓性感染形成脓肿后，外科治疗的基本原则是

- A. 全身加大抗生素剂量
- B. 改用其他抗生素
- C. 加用肾上腺皮质激素
- D. 配合局部物理治疗
- E. 立即切开引流

正确答案：E 您选择的答案：

第20题 引起气性坏疽的致病菌是

- A. 大肠杆菌

- B. 梭状芽孢杆菌
- C. 类杆菌
- D. 链球菌
- E. 克雷伯杆菌

正确答案：B 您选择的答案：

第21题 关于外科感染，正确的是

- A. 大部分是由几种细菌引起的
- B. 一种细菌可以引起几种不同的感染
- C. 常需手术治疗
- D. 多数局部症状明显
- E. 以上都正确

正确答案：E 您选择的答案：

第22题 诊断丹毒最有意义的临床表现是

- A. 头面、畏寒、高热
- B. 好发部位
- C. 色鲜红界限清楚
- D. 局部发生水泡
- E. 所属淋巴结肿大

正确答案：C 您选择的答案：

第23题 气性坏疽的临床特点是

- A. 局部红、肿、热、痛不明显
- B. 一般白细胞不升高
- C. 体温正常
- D. 休克发生早
- E. 局部肌坏死，有血性分泌物，恶臭

正确答案：E 您选择的答案：

第24题 气性坏疽的早期诊断依据是

- A. 受伤史和临床所见
- B. 血培养培养出革兰氏阳性杆菌
- C. 渗出物涂片找到革兰氏阳性杆菌
- D. 严重的败血症和溶血性贫血
- E. 伤口部位培养出厌氧性梭状芽孢杆菌

正确答案：A 您选择的答案：

第25题 外科感染的发生最重要的原因为

- A. 伤口的存在
- B. 致病菌入侵人体
- C. 局部组织血液循环不良
- D. 贫血
- E. 未及时应用抗菌药物

正确答案：B 您选择的答案：

第26题 预防手术后感染的最重要的措施是

- A. 提高机体抵抗力
- B. 术前、术中、术后大量应用抗生素
- C. 避免休克发生
- D. 术后早期离床活动
- E. 严格遵守无菌操作的原则

正确答案：E 您选择的答案：

第27题 破伤风引起病人一系列临床症状和体征的主要因素是

- A. 痉挛毒素
- B. 内毒素
- C. 溶血毒素
- D. 破伤风杆菌
- E. 破伤风杆菌的芽孢

正确答案：A 您选择的答案：

第28题 能引起转移性脓肿的是

- A. 葡萄球菌
- B. 链球菌
- C. 大肠杆菌
- D. 绿脓杆菌
- E. 变形杆菌

正确答案：A 您选择的答案：

第29题 破伤风病人的治疗原则

- A. 预防和抢救休克
- B. 早期行气管切开术
- C. 高压氧治疗
- D. 应用破伤风类毒素
- E. 清除毒素来源，中和毒素，控制和解除痉挛

正确答案：E 您选择的答案：

第30题 预防破伤风最有效、最可靠的方法是

- A. 彻底清创

B. 应用青霉素
C. 注射TAT
D. 注射破伤风类毒素
E. 注射人体破伤风免疫球蛋白
正确答案：D 您选择的答案：

第31题 治疗小腿丹毒应首选

A. 土霉素
B. 红霉素
C. 庆大霉素
D. 氨苄青霉素
E. 青霉素
正确答案：E 您选择的答案：

第32题 破伤风最先发生收缩的肌肉是

A. 面肌
B. 咬肌
C. 颈项肌
D. 背腹肌
E. 四肢肌
正确答案：B 您选择的答案：

第33题 脓性指头炎切开引流的最佳切口是

A. 侧面横切口
B. 侧面纵切口
C. 掌面横切口
D. 掌面纵切口
E. 鱼口形切口
正确答案：B 您选择的答案：

第34题 痛常见于

A. 心脏病病人
B. 高血压病人
C. 肺结核病人
D. 糖尿病病人
E. 肾炎病人
正确答案：D 您选择的答案：

第35题 为提高脓毒症病人血培养阳性率，抽血时间最好在

A. 寒战开始时
B. 寒战结束时
C. 发热开始时
D. 发热结束时
E. 预计寒战发热前
正确答案：E 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第36题 女性，50岁，10天前做胆道手术。近2日来时有突然寒战，体温38～39℃。间歇期体温接近正常。查血常规示白细胞 $8.5 \times 10^9/L$ ，中性0.70。血培养阳性。考虑为

A. 真菌所致全身性感染
B. 革兰阴性细菌所致全身性感染
C. 无芽孢厌氧菌所致全身性感染
D. 革兰阳性细菌所致全身性感染
E. 以上都不是
正确答案：B 您选择的答案：

第37题 男，27岁。右足癣处红肿热痛5天，天后出现右小腿5条纵行红线，有压痛。考虑诊断为

A. 急性淋巴管炎
B. 丹毒
C. 急性蜂窝织炎
D. 急性淋巴结炎
E. 气性坏疽
正确答案：A 您选择的答案：

第38题 患儿，男，6岁。左足跟部被铁钉扎伤今天。2年前曾注射过百日咳、白喉、破伤风疫苗。为预防破伤风，此次应

A. 注射破伤风类毒素0.5ml
B. 注射破伤风类毒素1ml
C. 注射破伤风免疫球蛋白
D. 注射破伤风抗毒素
E. 注射青霉素
正确答案：A 您选择的答案：

第39题 女，46岁。右小指被鱼刺刺伤后肿胀、疼痛2天。体检：小指呈半屈位，被动伸直小指时剧痛。诊断为

A. 化脓性腱鞘炎
B. 尺侧化脓性滑囊炎
C. 桡侧化脓性滑囊炎

- D. 掌深间隙感染
- E. 鱼际间隙感染

正确答案：A 您选择的答案：

第40题 男，20岁。子弹射入股内侧，12小时后被送入医院。患处胀裂样剧痛。体检：患处皮肤水肿、苍白，在患处可触及捻发音，伤口处肌肉成紫黑色。治疗时首选抗生素是

- A. 青霉素
- B. 链霉素
- C. 甲硝唑
- D. 丁胺卡那霉素
- E. 复方新诺明

正确答案：A 您选择的答案：

第41题 男，47岁，右臂红肿热痛1周，发热38.9℃，红肿局限。近2天来寒战，高热40.5℃。查血常规示白细胞 $20.3 \times 10^9/L$ ，中性0.9。血培养阳性。考虑为

- A. 无芽孢厌氧菌所致全身性感染
- B. 革兰阴性细菌所致全身性感染
- C. 真菌所致全身性感染
- D. 革兰阳性细菌所致全身性感染
- E. 以上都不是

正确答案：D 您选择的答案：

三、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第42-44题

患者，女性，23岁。右足癣并感染1周。2天前开始出现右小腿有片状红疹。体检见右小腿片状红疹，颜色鲜红，中间较淡，边缘清楚。右腹股沟淋巴结肿大。

1. 该病例诊断为

- A. 疖
- B. 痈
- C. 急性蜂窝织炎
- D. 丹毒
- E. 急性管状淋巴管炎

2. 该病致病菌是

- A. 金黄色葡萄球菌
- B. 溶血性链球菌
- C. 埃希杆菌
- D. 变形杆菌
- E. 绿脓杆菌

3. 首选抗生素是

- A. 青霉素
- B. 链霉素
- C. 环丙沙星
- D. 甲硝唑
- E. 庆大霉素

正确答案：DBA 您选择的答案：

第45-47题

女性，30岁，背部肿块，红、肿、疼痛3天，寒战、发热39℃，查体：背部肿物3cm×5cm，触之有波动感

1. 当病灶做局部引流和全身应用抗生素后，仍有寒战、高热，最合适的治疗措施是

- A. 联合应用抗生素，并加大剂量
- B. 尽快明确细菌种类和药敏试验
- C. 寻找有无其他感染病灶
- D. 使用抗霉菌药物治疗
- E. 加用肾上腺皮质激素

2. 为了提高病人血培养的阳性率，最好的抽血时间是

- A. 发热开始时
- B. 寒战开始时
- C. 发热最高峰时
- D. 寒战结束时
- E. 预计寒战发热时

3. 根据临床表现，该患者有脓血症征象，其主要特点是

- A. 寒战后，高热呈稽留热
- B. 白细胞计数 $30 \times 10^9/L$
- C. 休克出现早
- D. 肝、肾功能损害
- E. 转移性脓肿

正确答案：CEE 您选择的答案：

第48-50题

男性，8岁，额部多发性疖肿，未治红肿，扩大，弛张性高热，4天后臀部皮下又发现一肿块，疼痛，压痛明显，且有波动感

1. 进一步确诊的方法

- A. 头部X线摄片
- B. 臀部肿块B超检查
- C. 臀部X线摄片
- D. 查血象
- E. 臀部肿块穿刺抽脓

2. 诊断应考虑

- A. 菌血症
- B. 败血症
- C. 毒血症
- D. 寒性脓肿
- E. 脓毒血症

3. 治疗方案为

- A. 醇浴退热
- B. 额部疖肿换药
- C. 臀部脓肿切开引流及抗生素治疗
- D. 加强营养, 增强抵抗力
- E. 综合应用多种抗生素

正确答案: EEC 您选择的答案:

第51-53题

男, 8岁, 额部多发性疖肿, 不慎碰伤额部, 致使局部红肿扩大, 弛张性高热, 4天后臀部皮下又发现一肿块, 疼痛、压痛明显, 且有波动感

1. 进一步确诊的方法是

- A. 胸部X线摄片检查
- B. 臀部肿块B超检查
- C. 臀部X线摄片检查
- D. 血白细胞检查
- E. 臀部肿块穿刺抽脓

2. 诊断应考虑为

- A. 菌血症
- B. 败血症
- C. 毒血症
- D. 脓毒血症
- E. 冷脓肿

3. 治疗方案为

- A. 醇浴(30%酒精)退热
- B. 额部疖肿换药
- C. 臀部脓肿切开引流及抗菌药物治疗
- D. 加强营养, 增加抵抗力
- E. 综合应用多种抗菌药物

正确答案: EDC 您选择的答案:

第54-56题

男性, 27岁。右足底被铁钉刺伤10天后突然出现张口困难, 继之出现苦笑面容, 角弓反张, 每次发作数秒钟。声响及触碰病人时均可诱发上述症状, 发作间歇期肌肉仍不能完全松弛, 神志一直清楚, 无发热

1. 该病诊断为

- A. 气性坏疽
- B. 化脓性脑膜炎
- C. 破伤风
- D. 狂犬病
- E. 瘰病

2. 预防该病发生的关键是

- A. 早期彻底清创, 改善局部循环
- B. 中和游离毒素
- C. 控制和解除痉挛
- D. 保持呼吸道通畅
- E. 防治并发症

3. 该病病程一般为

- A. 1~2周
- B. 3~4周
- C. 5~6周
- D. 7~8周
- E. 9~10周

正确答案: CAB 您选择的答案:

四、A4型题: 以下提供若干个案例, 每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息, 在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第57-59题

男性, 32岁。四肢、躯干烧伤, 面积70%, 其中 度占20%, 深 度占50%。由于初期抗休克治疗及创面治疗不当, 6天后高热、谵妄, 周身皮疹, 创面有较多黄稠脓性分泌物。

1. 此时考虑为

- A. 金葡菌感染
- B. 链球菌感染
- C. 大肠杆菌感染
- D. 绿脓杆菌感染
- E. 真菌感染

2. 假如该病人经支持疗法, 联合应用大量广谱抗生素, 病情好转, 但仍有低热。抗生素一直持续应用, 15天后病人又突发寒战, 高热达40℃, 神志淡漠, 嗜睡, 休克。查血常规示白细胞 $25.4 \times 10^9/L$ 。此时应考虑并发

- A. 中毒性休克
- B. 革兰阳性细菌脓毒症
- C. 革兰阴性细菌脓毒症
- D. 绿脓杆菌脓毒症
- E. 真菌性脓毒症

3. 若病人经血、尿检查及培养，上述并发症诊断成立，此时应如何处理

- A. 加大已应用的广谱抗生素量
- B. 输血抗休克治疗
- C. 药物降温
- D. 停止使用原抗生素，改用抗真菌药物
- E. 人工冬眠治疗

正确答案：AED 您选择的答案：

第60-62题

女性，45岁。右肩背部肿痛4天，伴发热。体检：体温39.5，右肩背部有多个脓栓，中央部坏死呈火山口状。

1. 最可能的诊断是

- A. 疔
- B. 痈
- C. 急性蜂窝织炎
- D. 丹毒
- E. 急性管状淋巴管炎

2. 若行病灶切开引流，并全身应用抗生素治疗2周后，患处红肿明显好转。1天前开始突然出现寒战、高热，测体温40.0，并出现神志淡漠。查血常规示白细胞 $25.0 \times 10^9/L$ 。考虑病人是

- A. 全身性炎症反应性综合征
- B. 革兰阴性细菌所致全身性感染
- C. 真菌所致全身性感染
- D. 革兰阳性细菌所致全身性感染
- E. 多器官功能不全综合征

3. 若病灶做局部引流和全身应用抗生素后，仍有高热，最适合的处理措施是

- A. 联合应用抗生素，并加大剂量
- B. 尽快明确细菌种类和药敏试验
- C. 寻找有无其他感染病灶
- D. 使用抗真菌药物治疗
- E. 加用肾上腺皮质激素

正确答案：BCC 您选择的答案：

五、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第63-64题

- A. 肌注破伤风抗毒素1500U
- B. 肌注破伤风抗毒素3000U
- C. 肌注破伤风抗毒素1000U
- D. 肌注破伤风抗毒素1ml
- E. 肌注破伤风抗毒素750U

- 1. 5岁儿童下肢皮肤撕裂伤后
- 2. 伤口污染严重者，受伤已超过12小时应

正确答案：AC 您选择的答案：

第65-67题

- A. 脓液稀薄，淡黄，量较多
- B. 脓液稠厚，黄色，不臭
- C. 脓液淡绿，有甜腥臭
- D. 脓液有特殊恶臭
- E. 脓液稠厚有粪臭

- 1. 金黄色葡萄球菌感染，其脓液特点是
- 2. 绿脓杆菌感染的脓液特点是
- 3. 大肠杆菌和其它致病菌引起的混合感染脓液特点是

正确答案：BCE 您选择的答案：

第68-70题

- A. 革兰阴性细菌败血症
- B. 革兰阳性细菌败血症
- C. 脓血症
- D. 真菌性败血症
- E. 毒血症

1. 男性，48岁，因右臂红肿热痛1周，发热38.9，红肿局限，2天来寒战，高热40.5，白细胞数为 $20.3 \times 10^9/L$ ，中性0.9，血培养阳性，考虑为

2. 女性，50岁，10天前作胆道手术，近几天来时有突然寒战，体温38~39，有时体温接近正常，白细胞计数 $8.5 \times 10^9/L$ ，中性0.70，血培养阳性，考虑为

3. 男性，16岁，因咽喉疼痛5天，昨天感寒战，发热39.5，白细胞数为 $18.5 \times 10^9/L$ ，中性0.90，血培养阴性，考虑为

正确答案：BAE 您选择的答案：

第71-73题

- A. 皮肤及网状淋巴管的急性炎症
- B. 皮下、筋膜下蜂窝组织急性炎症
- C. 皮下淋巴管及其周围的急性炎症
- D. 一个毛囊及其所属皮脂腺急性化脓性感染
- E. 多个相邻毛囊及其所属皮脂腺急性化脓性感染

- 1. 疔
- 2. 痈
- 3. 丹毒

正确答案：DEA 您选择的答案：

第74-76题

- A. 皮肤及网状淋巴管的急性炎症
 - B. 皮下、筋膜下蜂窝组织急性炎症
 - C. 皮下淋巴管及其周围的急性炎症
 - D. 一个毛囊及其所属皮脂腺急性化脓性感染
 - E. 多个相邻毛囊及其所属皮脂腺急性化脓性感染
1. 疖
 2. 痈
 3. 丹毒

正确答案：DEA 您选择的答案：

习题集 外科学 外科营养

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 肠内营养与输入速度及溶液浓度有关的并发症是

- A．误吸
- B．腹胀、腹泻
- C．肠炎
- D．高血糖
- E．胆囊结石

正确答案：B 您选择的答案：

第2题 肠内营养制剂自空肠造瘘管滴入速度一般不超过

- A．40ml / 小时
- B．60ml / 小时
- C．100ml / 小时
- D．140ml / 小时
- E．200ml / 小时

正确答案：C 您选择的答案：

第3题 清蛋白低于多少表示重度营养不良

- A．35g / L
- B．29g / L
- C．25g / L
- D．21g / L
- E．15g / L

正确答案：D 您选择的答案：

第4题 正常人每日需能量为

- A 5000kJ
- B 6325kJ
- C 7535kJ
- D 8000kJ
- E 9735kJ

正确答案：C 您选择的答案：

第5题 有关肠内营养(EN)下列哪项描述是不恰当的

- A．EN符合生理、并发症少
- B．只要肠道有功能，尽量采取EN支持
- C．营养液的温度应接近体温
- D．营养液输入初始应缓慢、低浓度
- E．昏迷病人不能用EN支持

正确答案：E 您选择的答案：

第6题 比标准体重减少多少为营养不良

- A 5%
- B 15%
- C 20%
- D 25%
- E 10%

正确答案：B 您选择的答案：

第7题 长期肠外营养常见的并发症是

- A．胆囊结石
- B．胃癌
- C．肝硬化
- D．Crohn病
- E．肝癌

正确答案：A 您选择的答案：

第8题 长期采用全胃肠外营养，理想静脉为

- A 颈内或锁骨下静脉
- B 颈外静脉
- C 头静脉
- D 大隐静脉
- E 上肢静脉

正确答案：A 您选择的答案：

第9题 清蛋白低于多少表示重度营养不良

- A 35g / L
- B 29g / L
- C 25g / L
- D 15g / L
- E 21g / L

正确答案：E 您选择的答案：

第10题 下列关于全胃肠外营养的适应证，不正确的是

- A．短肠综合征

- B. 高位肠瘘
- C. 乙状结肠瘘
- D. 坏死性胰腺炎
- E. 急性肾功能衰竭

正确答案：C 您选择的答案：

第11题 创伤感染后的营养代谢变化，下列描述哪项是错误的

- A. 能量代谢增大
- B. 能量需求增加
- C. 可导致水、电解质及酸碱失衡
- D. 蛋白质分解与合成代谢减少
- E. 脂肪分解加大

正确答案：D 您选择的答案：

第12题 长期肠外营养支持者，宜选用下列哪种血管穿刺置管

- A. 颈内静脉
- B. 大隐静脉
- C. 颈外静脉
- D. 足背静脉网
- E. 桡动脉

正确答案：A 您选择的答案：

第13题 体重减轻到低于标准体重多少为营养不良

- A. 5%
- B. 15%
- C. 20%
- D. 25%
- E. 10%

正确答案：B 您选择的答案：

第14题 正常成人每天每公斤体重静息能量消耗(BEE)为

- A. 15kcal
- B. 20kcal
- C. 25kcal
- D. 30kcal
- E. 35kcal

正确答案：C 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第15题 男性，35岁，体重50kg。因毕H式胃大部切除术后十二指肠残端瘘入院。需给予总热量1500kcal的静脉营养支持，下列哪一项配方理论上是正确的

- A. 10%葡萄糖溶液1880ml，20%脂肪乳417ml，10%复合氨基酸500ml
- B. 50%葡萄糖溶液750ml，10%复合氨基酸500ml
- C. 50%葡萄糖溶液375ml，10%脂肪乳834ml，10%复合氨基酸750ml
- D. 50%葡萄糖溶液525ml，20%脂肪乳250ml，10%复合氨基酸500ml
- E. 10%葡萄糖溶液1380ml，20%脂肪乳417ml，10%复合氨基酸500ml

正确答案：E 您选择的答案：

第16题 女性，23岁，因阑尾切除术后残端瘘入院。测体重为40kg，身高160cm。消瘦明显。查血清清蛋白为24g /

L。考虑该患者营养状况为

- A. 轻度营养不良
- B. 中度营养不良
- C. 重度营养不良
- D. 营养状况良好
- E. 营养状况无法评估

正确答案：B 您选择的答案：

三、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第17-18题

男性，78岁，体重60kg。全胃切除术后6天，大量肠液自腹腔引流管引出，左上腹疼痛。体检：左上腹轻压痛，无肌紧张。

1. 首选的治疗措施是

- A. 急诊手术
- B. 给肠外营养液
- C. 要素饮食
- D. 普通饮食
- E. 输血

2. 该病人热量每天基本需要量是

- A. 800kcal
- B. 1200kcal
- C. 1500kcal
- D. 2000kcal
- E. 2500kcal

正确答案：BC 您选择的答案：

四、A4型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第19-21题

女性，37岁，因短肠综合征入院。入院后经颈内静脉插管行全胃肠外营养支持。3周后突然出现寒战、高热，无咳嗽、咳痰。体检，腹部无压痛和反跳痛。

1. 最有可能的诊断是

- A. 肺部感染
- B. 导管性脓毒症
- C. 气胸
- D. 高渗性非酮性昏迷
- E. 导管折断

2. 若发生上述症状后，观察8小时仍有高热，应采取的措施是

- A. 肠外营养液中增加胰岛素
- B. 用抗生素
- C. 胸腔穿刺抽气
- D. 拔除中心静脉导管
- E. 更换中心静脉导管

3. 若24小时后发热仍不退，应采取

- A. 肠外营养液中增加胰岛素
- B. 用抗生素
- C. 胸腔穿刺抽气
- D. 拔除中心静脉导管
- E. 更换中心静脉导管

正确答案：BDB 您选择的答案：

五、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第22-24题

- A. 1kcal
- B. 4kcal
- C. 7kcal
- D. 9kcal
- E. 11kcal

1. 每克碳水化合物能产热量为

2. 每克蛋白质能产热量为

3. 每克脂肪能产热量为

正确答案：BBD 您选择的答案：

习题集 外科学 手术前准备和手术后处理

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 切口裂开常发生于术后

- A. 4天
- B. 7天
- C. 10天
- D. 12天
- E. 14天

正确答案：B 您选择的答案：

第2题 手术后早期恶心、呕吐常见的原因是

- A. 颅内压增高
- B. 麻醉反应
- C. 术后腹胀
- D. 肠梗阻
- E. 低血钾

正确答案：B 您选择的答案：

第3题 下列哪种手术不属择期手术？

- A. 胃十二指肠溃疡的胃大部分切除术
- B. 甲状腺功能亢进的甲状腺次全切除术
- C. 下肢静脉曲张高位结扎术
- D. 先心病房间隔缺损修补术
- E. 贲门癌根治术

正确答案：E 您选择的答案：

第4题 术后腹部切口裂开的预防措施中，下列哪项是错误的

- A. 术前提高营养状况
- B. 术中必要时作皮肤减张缝合
- C. 术后及时处理腹胀
- D. 咳嗽时最好取高坡卧位
- E. 腹带作适当的腹部包扎

正确答案：D 您选择的答案：

第5题 创伤、感染后的神经-内分泌反应，导致下列何种激素分泌减少

- A. 胰岛素
- B. 肾上腺素
- C. 胰高糖素
- D. 去甲肾上腺素
- E. 抗利尿激素

正确答案：A 您选择的答案：

第6题 一阑尾炎穿孔并弥漫性腹膜炎患者，急诊手术后于右下腹放置烟卷式引流条一根，下列处理措施中哪项正确

- A. 放置1~2天后即可拔除
- B. 每次换药时旋转拔出约1~2cm，术后1~2天即可拔除
- C. 每次换药时旋转并拔出约1~2cm，术后3~5天即可拔除
- D. 视引流情况，至术后6~7天方可拔除
- E. 应于术后1周方可拔除

正确答案：C 您选择的答案：

第7题 肠外营养发生导管性脓毒症时，应立即采取的措施为

- A. 大剂量抗生素
- B. 更换营养液
- C. 镇静、退热
- D. 拔除导管
- E. 局部清洁、换药

正确答案：D 您选择的答案：

第8题 器械浸泡在70%酒精或0.1%新洁尔灭溶液中需要多少时间方可使用

- A. 15分钟
- B. 30分钟
- C. 60分钟
- D. 90分钟
- E. 120分钟

正确答案：B 您选择的答案：

第9题 轻度或中度高血压病人，术前要求血压

- A. 降至正常
- B. 维持原水平
- C. 降至原水平低点
- D. 降至正常水平点
- E. 以上都不是

正确答案：B 您选择的答案：

第10题 非胃肠道手术，术前禁食时间是

- A. 4小时

- B. 6小时
- C. 8小时
- D. 12小时
- E. 14小时

正确答案：D 您选择的答案：

第11题 关于戴无菌手套，脱污染手套，下述描述哪项是错误的

- A. 戴无菌手套时，注意勿触及手套外面
- B. 脱污染手套时，手套外面不能触及皮肤
- C. 常规洗手后，如用干手套，先穿手术衣后戴手套
- D. 常规洗手后，如用湿手套，先带手套后穿手术衣
- E. 常规洗手后，如用干手套，先戴手套后穿手术衣

正确答案：E 您选择的答案：

第12题 下列哪项不属切口感染的预防措施

- A. 术前、术后注意提高病人抵抗力，纠正贫血、低蛋白血症等
- B. 术中严格无菌技术
- C. 及时局部理疗
- D. 避免异物存留
- E. 避免切口内血肿

正确答案：C 您选择的答案：

第13题 切口感染常发生于术后

- A. 1~2天
- B. 3~4天
- C. 5~6天
- D. 7~8天
- E. 9~10天

正确答案：B 您选择的答案：

第14题 减张缝合拆线应是术后

- A. 10天
- B. 12天
- C. 14天
- D. 20天
- E. 30天

正确答案：C 您选择的答案：

第15题 下列各项中不对的是

- A. 营养不良病人术前应尽可能给予补充，最好达到正氮平衡
- B. 血压过高者，术前应使用降压药物待血压正常后再行手术
- C. 水、电解质平衡紊乱病人术前需纠正
- D. 贫血病人术前应少量多次输血纠正
- E. 对偶发室性期前收缩，一般不需特殊处理

正确答案：B 您选择的答案：

第16题 下列哪项防治术后尿潴留的措施不妥

- A. 术前练习卧床小便
- B. 术前或术后常规放置导尿管
- C. 及时恰当地镇静、止痛
- D. 下腹部热敷
- E. 情况允许可坐起或站立小便

正确答案：B 您选择的答案：

第17题 腹部外科中，预防性使用抗生素的最佳时间为

- A. 手术前2天开始
- B. 手术开始前1小时
- C. 手术开始时
- D. 手术中发生感染时
- E. 手术结束时

正确答案：B 您选择的答案：

第18题 关于术后病人的体位，下列哪项是错误的

- A. 颅脑手术后，如无休克或昏迷，取15°~30°头高脚低斜坡卧位
- B. 颈胸手术后，取高半坐卧位
- C. 腹部手术后，取低半坐卧位
- D. 脊柱或臀部手术后，取俯卧或仰卧位
- E. 休克病人，应取头低胸高卧位

正确答案：E 您选择的答案：

第19题 对呼吸功能障碍者的术前准备，下列哪项是不妥当的

- A. 停止吸烟2周，鼓励病人多练习深呼吸和咳嗽
- B. 应用支气管扩张剂及雾化吸入等
- C. 对经常发作哮喘者给予地塞米松以减轻支气管粘膜水肿
- D. 对合并感染者，在应用抗生素的同时施行手术
- E. 麻醉前给药量要少，以免呼吸抑制和咳嗽困难

正确答案：D 您选择的答案：

第20题 关肠内营养(EN)下列哪项描述是不恰当的

- A. EN符合生理、并发症少

B. 只要肠道有功能，尽量采取EN支持
C. 昏迷病人不能用EN支持
D. 营养液输入初始应缓慢、低浓度
E. 营养液的温度应接近体温
正确答案：C 您选择的答案：

第21题 手术当日早晨体温 >38.5 的择期手术患者，首先处理的原则是
A. 予退热药物
B. 物理降温
C. 暂停手术
D. 应用抗生素
E. 不用特殊处理
正确答案：C 您选择的答案：

第22题 正常状态下，人体最大的能源贮备是
A. 蛋白质
B. 糖原
C. 维生素
D. 脂肪
E. 电解质
正确答案：D 您选择的答案：

第23题 手术区皮肤消毒的范围最少距手术切口
A. 5cm
B. 10cm
C. 15cm
D. 20cm
E. 30cm
正确答案：C 您选择的答案：

第24题 高压灭菌后的物品一般可保留
A. 4天
B. 一周
C. 二周
D. 三周
E. 一个月
正确答案：C 您选择的答案：

第25题 糖尿病病人施行大手术前，血糖要求控制在
A. 5.6mmol/L 以下
B. $5.6\sim 11.2\text{mmol/L}$
C. $11.3\sim 16.2\text{mmol/L}$
D. 18mmol/L 以下
E. 20mmol/L 以下
正确答案：B 您选择的答案：

第26题 属于择期手术的疾病是
A. 肝癌
B. 胃溃疡
C. 脾破裂
D. 急性阑尾炎
E. 嵌顿疝
正确答案：B 您选择的答案：

第27题 术前常规禁食的时间是
A. 禁食4小时，禁水2小时
B. 禁食6小时，禁饮2小时
C. 禁食10小时，禁饮3小时
D. 禁食10小时，禁饮3小时
E. 禁食12小时，禁饮4小时
正确答案：E 您选择的答案：

第28题 结、直肠手术口服肠道制菌药物应在术前
A. 1天
B. 2~3天
C. 4~6天
D. 7~8天
E. 9~10天
正确答案：B 您选择的答案：

第29题 心力衰竭病人行择期手术应在心衰控制几周后进行
A. 1~2周
B. 3~4周
C. 5~6周
D. 7~8周
E. 9~10周
正确答案：B 您选择的答案：

第30题 关于术前胃肠道准备，下列哪项是错误的
A. 胃肠道手术病人，术前1~2天始进流质饮食

B. 术前12小时始禁食, 2小时始禁水
C. 一般性手术术前1天作肥皂水灌肠
D. 结肠或直肠手术应行清洁灌肠及口服肠道抑菌剂
E. 必要时可作胃肠减压
正确答案: B 您选择的答案:

第31题 对于心肌梗死, 择期手术的适合时机是
A. 2~3个月, 无心绞痛发作
B. 3~4个月, 无心绞痛发作
C. 4~5个月, 无心绞痛发作
D. 5~6个月, 无心绞痛发作
E. 6个月以上, 无心绞痛发作
正确答案: E 您选择的答案:

第32题 对肾疾病患者, 术前准备和对手术耐受性的估计, 下列哪项是错误的
A. 凡有肾病者, 都应作肾功能检查
B. 轻至中度肾功能损害者, 经适当内科治疗, 都能较好地耐受手术
C. 重度损害者, 即使在有效的透析疗法处理下, 仍不能安全地耐受手术
D. 术前应避免使用对肾有损害的药物
E. 术前应尽可能避免使用肾血管收缩药物
正确答案: C 您选择的答案:

第33题 下列哪项对确诊腹部手术后腹腔内出血意义最大
A. 腹胀逐渐加重
B. 病人烦躁不安
C. 中心静脉压 $<50\text{mmH}_2\text{O}$ (0.4kPa)
D. 尿量 $<25\text{ml}/\text{小时}$
E. 诊断性腹腔穿刺
正确答案: E 您选择的答案:

第34题 有关手术后腹胀的处理措施, 下列哪一项是错误的
A. 留置肛管排气
B. 必要时肌注阿托品 $0.5\text{mg}/6\text{h}$
C. 高渗液低压灌肠
D. 留置胃管持续减压
E. 有肠麻痹时适当补钾盐
正确答案: B 您选择的答案:

第35题 对糖尿病人的术前术后处理, 下列哪项是错误的
A. 术前应适当控制血糖
B. 术前应纠正水电解质代谢紊乱和酸中毒
C. 术前应维持血糖于 $+ \sim + +$
D. 手术应在当天尽早施行, 以缩短术前禁食时间, 避免酮生成
E. 术后尿糖 $+$, 可用胰岛素 5U
正确答案: E 您选择的答案:

第36题 有关手术后早期活动, 下列哪一项是错误的
A. 改善血液循环
B. 避免腹胀及尿潴留
C. 可影响切口愈合
D. 减少肺部并发症
E. 防止下肢静脉血栓形成
正确答案: C 您选择的答案:

第37题 正常成人每天每公斤体重静息能量消耗(REE)为
A. 63kJ (15kcal)
B. 84kJ (20kcal)
C. 105kJ (25kcal)
D. 126kJ (30kcal)
E. 147kJ (35kcal)
正确答案: C 您选择的答案:

第38题 长期采用全胃肠外营养, 理想的静脉为
A. 颈内或锁骨下静脉
B. 颈外静脉
C. 头静脉
D. 大隐静脉
E. 上肢静脉
正确答案: A 您选择的答案:

第39题 下列哪项对确诊腹部手术后腹腔内出血意义最大
A. 腹胀逐渐加重
B. 病人烦躁不安
C. 中心静脉压 $<0.4\text{kPa}$ ($50\text{mmH}_2\text{O}$)
D. 尿量 $<25\text{ml}/\text{h}$
E. 诊断性腹腔穿刺
正确答案: E 您选择的答案:

第40题 关于手术后拆线时间, 下列哪一项不正确
A. 四肢 $10\sim12$ 天

- B. 下腹部5~6天
- C. 减张缝合2周
- D. 胸、上腹部7~8天
- E. 头、颈部4~5天

正确答案：B 您选择的答案：

第41题 诊断术后肺不张较有意义的体征是

- A. 术后早期发热，呼吸及心率增快
- B. 白细胞及中性粒细胞增高
- C. 胸部叩诊呈浊音或实音
- D. 听诊有局限性湿性啰音
- E. 呼吸音减弱、消失或为支气管呼吸音

正确答案：E 您选择的答案：

第42题 下列哪项是肠外营养最严重的技术并发症

- A. 局部出血
- B. 气胸
- C. 空气栓塞
- D. 损伤胸导管
- E. 臂丛神经损伤

正确答案：C 您选择的答案：

第43题 创伤感染后的营养代谢变化，下列描述哪项是错误的

- A. 能量代谢增大
- B. 能量需求增加
- C. 可导致水、电解质及酸碱失衡
- D. 蛋白质分解与合成代谢减少
- E. 脂肪分解加大

正确答案：D 您选择的答案：

第44题 术前常规禁食的主要目的是

- A. 避免胃膨胀而妨碍手术
- B. 防止术后腹胀
- C. 防止围手术期的呕吐及误吸
- D. 防止术后肠麻痹
- E. 防止术后便秘

正确答案：C 您选择的答案：

第45题 在没有心力衰竭的条件下，对手术耐受力最差的是

- A. 非紫绀型先天性心脏病
- B. 风湿性心脏病
- C. 高血压性心脏病
- D. 冠状动脉硬化性心脏病
- E. 急性心肌病

正确答案：E 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第46题 男性，36岁。因急性化脓性阑尾炎穿孔伴弥漫性腹膜炎行急诊手术。术后于右下腹放置烟卷式引流条一根，下列处理措施中哪项正确

- A. 放置1~2天后即可拔除
- B. 每次换药时旋转拔出约1~2cm，术后1~2天即可拔除
- C. 每次换药时旋转拔出约1~2cm，术后3~5天即可拔除
- D. 视引流情况，至术后6~7天方可拔除
- E. 应于术后1周方可拔除

正确答案：C 您选择的答案：

第47题 男性，78岁，全胃切除术后6天，大量肠液自腹腔引流管引出，左上腹疼痛，查体：左上腹轻压痛，无肌紧张，首选治疗措施是

- A. 急诊手术
- B. 全胃肠外营养
- C. 要素饮食
- D. 普通饮食
- E. 输血

正确答案：B 您选择的答案：

第48题 男性，24岁。因化脓性阑尾炎行阑尾切除术，术后3天切口红肿，有脓性分泌物。10天后清创缝合而愈合，切口愈合类型应记录为

- A. /乙
- B. /丙
- C. /甲
- D. /乙
- E. /丙

正确答案：E 您选择的答案：

第49题 男性，65岁，因阑尾穿孔切除术后8小时感下腹部胀痛，躁动不安，未解小便。根据病史，首先应想到的原因是

- A. 腹腔内出血

- B. 膀胱炎
- C. 尿潴留
- D. 腹腔感染
- E. 肠粘连, 肠麻痹

正确答案: C 您选择的答案:

第50题 女性, 65岁, 上午在全麻下行食管癌切除吻合术。晚8时突然出现发热, 测体温 39.0°C , 最可能的诊断为

- A. 切口感染
- B. 切口裂开
- C. 肺不张
- D. 下肢深静脉血栓形成
- E. 吻合口瘘

正确答案: C 您选择的答案:

第51题 女性, 32岁, 既往有消化性溃疡病史, 全麻下行胆囊切除术。术后当晚病人面色苍白, 烦躁, 呼吸急促, 上腹饱胀, 呕吐频繁。吐出咖啡色胃内容物, 查潜血试验阳性。体检: 全腹胀隆, 有压痛, 无反跳痛。最可能的诊断为

- A. 溃疡继发穿孔
- B. 膈下感染
- C. 急性胃扩张
- D. 粘连性肠梗阻
- E. 溃疡所致幽门梗阻

正确答案: C 您选择的答案:

第52题 男性, 65岁, 因急性化脓性阑尾炎穿孔行阑尾切除术后8小时感下腹部胀痛, 躁动不安, 未解小便。根据病史, 首先应想到的原因是

- A. 腹腔内出血
- B. 膀胱炎
- C. 尿潴留
- D. 腹腔感染
- E. 肠粘连, 肠麻痹

正确答案: C 您选择的答案:

第53题 女性, 29岁。阑尾切除术后5天, 体温一直 $38.5 \sim 39.2^{\circ}\text{C}$, 并出现腹泻10次/日, 有里急后重。应考虑可能并发

- A. 切口感染
- B. 切口裂开
- C. 盆腔脓肿
- D. 手术后出血
- E. 尿路感染

正确答案: C 您选择的答案:

第54题 男性, 20岁, 因高位小肠瘘1天入院, 入院后经颈内静脉插管滴入全胃肠外营养液, 2周后突然出现寒战、高热, 无咳嗽咳痰, 腹部无压痛及反跳痛, 最有可能的诊断是

- A. 高渗性非酮性昏迷
- B. 肺部感染
- C. 气胸
- D. 导管性脓毒症
- E. 导管折断

正确答案: D 您选择的答案:

第55题 男性, 54岁, 既往有冠心病史, 因急性阑尾炎拟急诊手术。测血压 $160/90\text{mmHg}$ ($17/12\text{kPa}$), 脉搏45次/分, 术前准备可选择

- A. 西地兰 0.4mg 加入25%葡萄糖溶液20ml, 静脉缓推
- B. 硝酸甘油 5mg 加入5%葡萄糖溶液500ml, 静脉点滴
- C. 阿托品 0.5mg 术前皮下注射
- D. 地高辛 0.25mg , 每日1~2次口服
- E. 硝普钠静脉点滴, 快速降压

正确答案: C 您选择的答案:

第56题 男性, 47岁, 因胃溃疡行胃大部切除术。术后出现顽固性呃逆, 应首先考虑

- A. 手术造成膈神经损伤
- B. 术后肠粘连
- C. 腹膜后血肿刺激腹腔神经丛
- D. 粘连引起胃扭转
- E. 膈下感染

正确答案: E 您选择的答案:

三、A3型题: 以下提供若干个案例, 每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息, 在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第57-58题

男性患者, 18岁, 因固定性右下腹痛18小时急诊行阑尾切除术。术中证实为化脓性阑尾炎伴局限性坏疽。术后6小时, 病人仍感腹痛, 躁动不安, 未解小便, 查体: $T38.2^{\circ}\text{C}$, $BP80/60\text{mmHg}$, 面色稍苍白, 皮肤湿冷, 心率108次/分, 较弱, 腹部稍胀, 脐周及下腹压痛, 轻度肌紧张, 肠鸣音变弱, 依据上述情况

1. 该患者目前应考虑最可能的情况是

- A. 肠麻痹, 肠梗阻
- B. 腹腔内感染
- C. 急性尿潴留
- D. 阑尾残端瘘

- E. 腹腔内出血
 - 2. 如诊断正确, 应采取何种措施
 - A. 持续胃肠减压
 - B. 剖腹探查
 - C. 输血、输液
 - D. 留置导尿管
 - E. 镇静、止痛、抗感染治疗
- 正确答案: EB 您选择的答案:

第59-61题

男性, 68岁, 因胃癌入院。既往有糖尿病史12年, 测血糖14mmol / L, 24小时肌酐清除率40ml / min, 血尿素氮17mmol / L。

- 1. 该病人术前血糖应控制在
- A. 5.6mmol / L以下
- B. 5.6 ~ 11.2mmol / L
- C. 11.3 ~ 16.2mmol / L
- D. 18mmol / L以下
- E. 20mmol / L以下
- 2. 此时尿糖应是
- A. 阴性
- B. +
- C. + ~ ++
- D. +++
- E. ++++
- 3. 该病人肾功能损害的程度是
- A. 轻度
- B. 中度
- C. 重度
- D. 极重度
- E. 无损害

正确答案: BCB 您选择的答案:

第62-64题

男性, 18岁, 因转移性右下腹痛12小时入院, 诊断为"急性阑尾炎", 当晚行阑尾切除术, 病理为坏疽性阑尾炎。自术后次晨起, 患者表现为腹痛, 烦躁不安, 未解小便, 体查: 面色较苍白, 皮肤湿冷, 心率110次 / 分, 较弱, 血压10.67 / 8kPa (80 / 60-mmHg), 腹稍胀, 全腹压痛, 轻度肌紧张, 肠鸣音减弱

- 1. 该患者目前情况, 应考虑为何种可能
- A. 术后肠麻痹
- B. 术后疼痛所致
- C. 术后尿潴留
- D. 术后腹腔内出血
- E. 机械性肠梗阻
- 2. 为明确诊断, 最好选择采取何种措施
- A. 继续观察病情变化
- B. 腹部X线透视
- C. 腹部B超
- D. 诊断性腹腔穿刺
- E. 导尿
- 3. 诊断明确后, 应采取何种治疗方法
- A. 镇静、止痛治疗
- B. 留置导尿管
- C. 输液输血治疗
- D. 持续胃肠减压
- E. 剖腹探查术

正确答案: DDE 您选择的答案:

第65-67题

男性, 77岁, 胆囊切除术后第2天, 自觉憋气、痰多、发热、腹痛。体检: 心率100次 / 分, 心电图无特殊发现。查血常规示白细胞 $17 \times 10^9 / L$ 。

- 1. 为进一步诊断, 应做的检查是
- A. 站立位腹部平片
- B. 胸片
- C. 痰培养
- D. 心肌酶谱
- E. 腹穿
- 2. 最可能的诊断是
- A. 心肌梗死
- B. 肺部感染
- C. 胸腔积液
- D. 胆瘘
- E. 心力衰竭
- 3. 最关键的治疗措施是
- A. 使用西地兰
- B. 应用抗生素
- C. 协助患者排痰
- D. 给予硝酸甘油
- E. 给予利尿剂

正确答案: BBC 您选择的答案:

第68-69题

男性，60岁，嗜烟，平时经常轻微咳嗽，因溃疡病大出血行急性胃大部切除术，术后痰多而稀，但无力咳出，术后1天逐渐出现烦躁不安，呼吸急促。检查：体温37.8℃，脉率95次/分，呼吸31次/分，血压正常，无发绀，心脏无特殊，右肺下部呈实音，呼吸音消失，血白细胞 $10.5 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞0.78

1. 诊断首先考虑

- A 肺炎
- B 肺不张(早期)
- C 脓胸
- D 胸腔积液
- E 肺不张(晚期)

2. 即时重要治疗措施

- A 气管切开
- B 蒸气吸入
- C 胸腔穿刺放液
- D 脓胸引流
- E 橡皮导管吸痰

正确答案：BE 您选择的答案：

四、A4型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第70-72题

女性，51岁。因急性梗阻性化脓性胆管炎行急诊胆总管切开取石、T形管引流术。术后3天肛门排气后拔除胃管，第4天开始出现腹胀、呕吐。体检：全腹膨隆，全腹轻压痛，无反跳痛。查血常规示白细胞 $9.0 \times 10^9/L$ ，血生化示血清钠135mmol/L，血清钾2.5mmol/L。

1. 该病人术后并发了

- A. 腹腔脓肿
- B. 术后出血
- C. 肠麻痹
- D. 胆瘘
- E. 切口感染

2. 若病人切口愈合处红肿、硬结，其切口愈合情况应记录为

- A. /甲
- B. /乙
- C. /丙
- D. /甲
- E. /乙

3. 若术后1周病人剧烈咳嗽时，大量淡红色液体自切口处流出，该病人并发了

- A. 腹腔脓肿
- B. 术后出血
- C. 切口裂开
- D. 肠梗阻
- E. 切口感染

正确答案：CBC 您选择的答案：

五、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第73-76题

- A. 4~5天
- B. 6~7天
- C. 7~9天
- D. 10~12天
- E. 14天

1. 上腹部手术拆线时间

2. 四肢手术拆线时间

3. 头部手术拆线时间

4. 下腹部手术拆线时间

正确答案：CDAB 您选择的答案：

第77-79题

- A 不必特殊处理
- B 西地兰0.4mg加入25%葡萄糖20ml，静脉缓慢推注
- C 皮下注射阿托品0.5mg
- D 口服地高辛0.25mg，每日一次
- E 少量多次输血

1. 偶发性期外收缩的病人手术前

2. 冠心病人心室率每分钟50次以下者手术前

3. 心房纤颤病人心室率在每分钟100次以上者手术前

正确答案：ACB 您选择的答案：

第80-81题

A. 多在1~2周内发生

B. 通常24小时内发生

C. 早期有出血症状

D. 引流管有鲜血外溢

E. 血红蛋白及血压偏低

1. 手术后早期出血的含义是指

2. 手术后继发性出血的含义是指

正确答案：BA 您选择的答案：

习题集 外科学 多器官功能不全综合征

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 急性肾衰无尿或少尿期早期，发生水中毒的常见原因是

- A．不当输入过多水分
- B．低蛋白血症
- C．内生水过多
- D．抗利尿激素增加
- E．钠潴留

正确答案：A 您选择的答案：

第2题 库欣(Cushing)溃疡是指

- A．重度烧伤后继发胃、十二指肠溃疡
- B．脑外伤后继发胃、十二指肠溃疡
- C．重度休克后继发胃、十二指肠溃疡
- D．脓毒血症继发胃、十二指肠溃疡
- E．服用阿司匹林、吲哚美辛(消炎痛)继发胃、十二指肠溃疡

正确答案：B 您选择的答案：

第3题 应激性溃疡突出的症状是

- A．上腹剧痛
- B．反酸嗝气
- C．心窝部烧灼感
- D．突然发生上消化道出血或穿孔
- E．频繁恶心呕吐

正确答案：D 您选择的答案：

第4题 急性肾性肾功能衰竭主要病理损害形式是

- A．急性肾小球坏死
- B．急性肾小管坏死
- C．急性肾髓质坏死
- D．急性肾缺血
- E．以上都不是

正确答案：B 您选择的答案：

第5题 急性肾功能衰竭少尿诊断标准为成人24小时尿量少于

- A．500ml
- B．400ml
- C．300ml
- D．200ml
- E．100ml

正确答案：B 您选择的答案：

第6题 关于急性肝衰竭的病因，下列哪项是错误的

- A．严重的病毒性肝炎
- B．某些化学物中毒
- C．妊娠反应
- D．在阻塞性黄疸、胆道感染基础上，经手术、麻醉、创伤、休克而诱发
- E．肝囊肿

正确答案：E 您选择的答案：

第7题 急性肾功能衰竭少尿期电解质紊乱的表现是

- A．高钾、高镁、高磷、低钠、低氯、低钙
- B．高钾、低镁、高磷、低钠、低氯、低钙
- C．高钾、高镁、低磷、低钠、低氯、高钙
- D．高钾、低镁、高磷、低钠、低氯、高钙
- E．高钾、高镁、高磷、低钠、低氯、高钙

正确答案：A 您选择的答案：

第8题 关于急性肾衰多尿期的叙述下列哪项是正确的

- A．当24小时尿量增加至800ml以上，即进入多尿期
- B．多尿期尿量增加，血尿素氮、肌酐和血钾持续下降
- C．多尿期一般历时7天
- D．进入多尿期，尿毒症症状即开始改善
- E．当肾功能逐渐恢复，尿量增加后，可出现低血钾、低血钠、低血钙和脱水等现象

正确答案：E 您选择的答案：

第9题 急性肝衰竭的治疗措施下，下列哪项不可取

- A．腹膜透析
- B．抗感染治疗
- C．利用甘露醇，降低颅内压
- D．限制水分摄入，调整电解质、酸碱失衡
- E．选用泻剂或乳果糖，限制蛋白摄入

正确答案：A 您选择的答案：

第10题 以下哪项不属多器官功能不全综合征的高危因素

- A．创伤与大手术

- B. 出血坏死性胰腺炎
- C. 脓毒血症
- D. 心跳呼吸骤停复苏后
- E. 慢性胃病

正确答案：E 您选择的答案：

第11题 急性肾功能衰竭血液净化技术的应用指标是

- A. 血肌酐超过 $440\mu\text{mol/L}$ ，血钾超过 6.0mmol/L
- B. 血肌酐超过 $440\mu\text{mol/L}$ ，血钾超过 6.5mmol/L
- C. 血肌酐超过 $442\mu\text{mol/L}$ ，血钾超过 6.0mmol/L
- D. 血肌酐超过 $442\mu\text{mol/L}$ ，血钾超过 6.5mmol/L
- E. 血肌酐超过 $445\mu\text{mol/L}$ ，血钾超过 6.5mmol/L

正确答案：D 您选择的答案：

第12题 一个出血性休克患者，经手术止血并补充血容量，纠正休克，使用速尿无效。以后补液方案应是

- A. 随意口服液体
- B. 每天静脉途径给予 $2000\sim 2500\text{ml}$ 液体
- C. 3天内不补液
- D. 不补液，仅口服山梨醇导泻
- E. 按“显性失水+不显性失水-内生水”公式补液

正确答案：E 您选择的答案：

第13题 急性肝衰竭的治疗措施，下列哪项不可取

- A. 腹膜透析
- B. 抗感染治疗
- C. 利用甘露醇，降低颅内压
- D. 限制水分摄入，调整电解质、酸碱失衡
- E. 选用泻剂或乳果糖，限制蛋白摄入

正确答案：A 您选择的答案：

第14题 急性肾衰少尿期最主要的死亡原因是

- A. 低氯血症
- B. 低钠血症
- C. 高血钾
- D. 水中毒
- E. 酸中毒

正确答案：C 您选择的答案：

第15题 临床各类器官移植中疗效最稳定最显著的是

- A. 肝移植
- B. 肾移植
- C. 心脏移植
- D. 骨髓移植
- E. 肺移植

正确答案：B 您选择的答案：

第16题 下列哪些疾病在遭受创伤、烧伤等急性损害后更易发生多器官功能不全综合征

- A. 冠心病
- B. 慢性肾病
- C. 糖尿病
- D. 肝硬化
- E. 以上都是

正确答案：E 您选择的答案：

第17题 急性肾功能衰竭无尿诊断标准为成人24小时尿量少于

- A. 500ml
- B. 400ml
- C. 300ml
- D. 200ml
- E. 100ml

正确答案：E 您选择的答案：

第18题 供移植器官的保存原则是

- A. 常温保存
- B. 低温原则
- C. 延长热缺血时间
- D. 变冷缺血为热缺血
- E. 中断血流后不应立即降温

正确答案：B 您选择的答案：

第19题 多器官功能不全综合征中的一期速发型是指

- A. 原发急症发病24小时内有两个或更多的器官系统同时发生功能障碍
- B. 原发急症发病48小时后有两个或更多的器官系统同时发生功能障碍
- C. 原发急症发病24小时后有两个或更多的器官系统同时发生功能障碍
- D. 原发急症发病12小时后有两个或更多的器官系统同时发生功能障碍
- E. 原发急症发病12小时内有两个或更多的器官系统同时发生功能障碍

正确答案：C 您选择的答案：

第20题 关于应激性溃疡的叙述，下列哪项是正确的

A. 一般溃疡较小, 大多直径在2.0cm以下
B. Curling溃疡继发于脑外伤
C. 应激性溃疡所引起的出血伴有腹痛, 多呈间歇性
D. 很多应激性溃疡由于出血少, 也不发生穿孔, 故在尸检时才发现
E. 选择性胃左动脉造影是最可靠的检查方法
正确答案: D 您选择的答案:

第21题 外科疾病五大类中下列哪项是错的

- A. 损伤
- B. 感染
- C. 外伤
- D. 肿瘤
- E. 其他性质的疾病

正确答案: C 您选择的答案:

第22题 下列损伤易引起肾功能衰竭的是

- A. 肝破裂
- B. 多发性肋骨骨折
- C. 肾挫裂伤
- D. 挤压伤
- E. 以上均不是

正确答案: D 您选择的答案:

第23题 应激性溃疡一旦发生, 有较高的死亡率。最高可达

- A. 50%
- B. 60%
- C. 70%
- D. 80%
- E. 90%

正确答案: A 您选择的答案:

第24题 超急排斥反应发生在何时

- A. 术后3天内
- B. 术后一个月内
- C. 术后24小时内
- D. 术后12天内
- E. 术后12周内

正确答案: C 您选择的答案:

第25题 发生多器官功能不全综合征的急性病症共同病理生理变化是

- A. 微循环障碍
- B. 组织缺血一再灌注和(或)全身炎症反应
- C. 血压下降
- D. DIC
- E. 大量血浆渗出

正确答案: B 您选择的答案:

第26题 多器官功能不全综合征是指急性疾病过程中

- A. 两个系统的功能障碍或衰竭
- B. 同时或序贯继发两个或更多的重要器官的功能障碍或衰竭
- C. 一个系统两个器官的功能障碍或衰竭
- D. 一个系统三个器官的功能障碍或衰竭
- E. 以上都不是

正确答案: B 您选择的答案:

第27题 急性肾功能衰竭进入多尿期的标志是成人24小时尿量多于

- A. 100ml
- B. 200ml
- C. 300ml
- D. 400ml
- E. 500ml

正确答案: D 您选择的答案:

第28题 引起急性肾衰的物质中, 下列哪项应除外

- A. 四氯化碳、铋、汞、磺胺
- B. 庆大霉素
- C. X线造影剂
- D. 蛇毒
- E. 青霉素

正确答案: E 您选择的答案:

第29题 以下哪项不是急性肝衰竭的发病基础

- A. 病毒性肝炎
- B. 化学药物中毒
- C. 休克
- D. 妊娠期
- E. 甲状腺功能亢进

正确答案: E 您选择的答案:

第30题 下列哪项是血液透析的禁忌证

- A. 休克
- B. 血清钾 $> 6.5 \text{ mmol/L}$
- C. 血清肌酐 $> 908 \text{ mmol/L}$
- D. 严重酸中毒
- E. $\text{BUN} > 30 \text{ mmol/L}$

正确答案：A 您选择的答案：

第31题 某肝病患者，半个月来出现肝臭、黄疸，近3天来嗜睡，但可唤醒。其症状属：

- A. 肝性脑病 度
- B. 肝性脑病 度
- C. 肝性脑病 度
- D. 肝性脑病 度
- E. 不属肝性脑病

正确答案：C 您选择的答案：

第32题 关于应激性溃疡的叙述，下列哪项是正确的

- A. 一般较小，大多直径在 2.0 cm 以下
- B. 柯林(Curling)溃疡继发于脑外伤
- C. 应激性溃疡所引起的出血伴有腹痛，多呈间歇性
- D. 很多应激性溃疡由于出血少，也不发生穿孔，故在尸检时才发现
- E. 选择性胃左动脉造影是最可靠的检查方法

正确答案：D 您选择的答案：

第33题 急性肾衰无尿或少尿期早期，发生水中毒的常见原因是

- A. 低蛋白血症
- B. 内生水过多
- C. 抗利尿激素增加
- D. 钠潴留
- E. 不适当输入过多水分

正确答案：E 您选择的答案：

第34题 应激性溃疡一旦发生有较高的死亡率，最高可达

- A. 50%
- B. 60%
- C. 70%
- D. 80%
- E. 90%

正确答案：A 您选择的答案：

第35题 下列哪项措施不适用于肝衰竭的治疗

- A. 静滴葡萄糖
- B. 静滴脂肪乳
- C. 静滴醋谷胺(乙酰谷酰胺)
- D. 静滴左旋多巴
- E. 口服甲硝唑

正确答案：B 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第36题 某患者创伤后休克30小时，经抢救后血压恢复正常，但一直未排尿液，导尿获尿液100ml。为确定是否为急性肾衰，应作何检查

- A. 中心静脉压测定
- B. 尿钠测定
- C. 红细胞比容
- D. PSP试验
- E. 血常规

正确答案：B 您选择的答案：

第37题 男性，34岁，因左肱骨及股骨开放性骨折手术，4天后突发腹胀痛，呕鲜血500ml，上腹部轻压痛，无溃疡病和肝炎史，应考虑为

- A. 胃穿孔
- B. 应激性溃疡
- C. 十二指肠溃疡出血
- D. 食管胃底静脉曲张破裂出血
- E. 胃癌出血

正确答案：B 您选择的答案：

第38题 男性，34岁，因左肱骨及股骨开放性骨折手术，4天后突发腹胀痛，呕鲜血500ml，上腹部轻压痛，无溃疡病和肝炎史，应考虑为

- A. 胃穿孔
- B. 应激性溃疡
- C. 十二指肠溃疡出血
- D. 食管胃底静脉曲张破裂出血
- E. 胃癌出血

正确答案：B 您选择的答案：

第39题 某肝病患者，女性，42岁，半个月来出现肝臭、黄疸，近3天来嗜睡，但可唤醒。其症状属于

- A. 肝性脑病Ⅰ度

- B. 肝性脑病 度
- C. 肝性脑病 度
- D. 肝性脑病 度
- E. 不属于肝性脑病

正确答案：C 您选择的答案：

第40题 男性，25岁，创伤后休克30小时。经抢救后血压恢复正常，但一直未排尿液，导尿获尿液100ml。为确定是否急性肾衰，应做何检查

- A. 中心静脉压测定
- B. 尿钠测定
- C. 红细胞比容
- D. PSP试验
- E. 血常规

正确答案：B 您选择的答案：

第41题 男性，34岁，发热5天，尿少入院。体检：脉搏99次/分，血压145/90mmHg(19.33/12.0kPa)，体温38.5，呼吸23次/分。神志尚清，烦躁。双下肢凹陷性水肿。急查血生化示Cr560μmol/L，BUN32.0mmol/L，K⁺6.8mmol/L，Na⁺123mmol/L，Cl⁻91mmol/L。动脉血气示pH7.2，BE-6.5mmol/L目前应首选的最佳治疗为

- A. 舌下含服心痛定(硝苯地平)片10mg
- B. 速尿(呋塞米)注射剂20mg静推
- C. 紧急扩容补液
- D. 急诊血液透析
- E. 静脉滴注抗生素控制感染

正确答案：D 您选择的答案：

第42题 男性，37岁，因出血性休克入院。经手术止血并补充血容量，纠正休克，使用速尿(呋塞米)无效。以后补液方案应是

- A. 随意口服液体
- B. 每天静脉途径给予2000~2500ml液体
- C. 3天内不补液
- D. 不补液，仅口服山梨醇导泻
- E. 按"显性失水+不显性失水-内生水"公式补液

正确答案：E 您选择的答案：

第43题 某患者，男性，32岁，采食野生蘑菇后无尿3天入院。巩膜黄染。双下肢凹陷性浮肿。考虑为

- A. 肾前性尿闭
- B. 肾后性尿闭
- C. 肾性尿闭
- D. 去肾性尿闭
- E. 慢性肾功能不全

正确答案：C 您选择的答案：

三、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第44-45题

男性，45岁，因呕吐、腹泻入院，每日静脉途径给予庆大霉素24万单位，共9天。近5天来无尿，眼结膜水肿，腹水，下肢水肿。血生化示BUN42.0mmol/L，Cr1040μmol/L，K⁺6.8mmol/L。

- 1. 应考虑为
- A. 庆大霉素过敏反应
- B. 庆大霉素肾中毒，导致急性肾衰
- C. 双输尿管结石梗阻
- D. 前列腺肥大
- E. 原发病导致失水
- 2. 最好的治疗方法是
- A. 5%碳酸氢钠溶液静注
- B. 10%葡萄糖酸钙溶液静注
- C. 离子交换树脂及山梨醇保留灌肠
- D. 大剂量速尿(呋塞米)静注
- E. 透析疗法

正确答案：BE 您选择的答案：

第46-47题

男，45岁，因上吐下泻住某医院，每天静脉途径给庆大霉素24万U共9天，近5天来无尿，眼结膜水肿，腹水，下肢水肿。实验室检查：BUN42mmol/L，血清肌酐1.04mmol/L，血清钾6.8mmol/L。

- 1. 应诊断为
- A. 庆大霉素过敏反应
- B. 庆大霉素肾中毒，导致急性肾衰
- C. 双输尿管结石梗阻
- D. 前列腺肥大
- E. 原发病导致失水
- 2. 最好的治疗方法是
- A. 5%碳酸氢钠溶液静注
- B. 10%葡萄糖酸钙溶液静注
- C. 离子交换树脂及山梨醇保留灌肠
- D. 大剂量速尿静注
- E. 透析疗法

正确答案：BE 您选择的答案：

第48-49题

男性，40岁，服用4个生鱼胆治疗目疾后无尿4天入院。脉搏96次/分，血压139/92mmHg(18.53/12.27kPa)，体温37.5℃，呼吸21次/分。神志不清，烦躁。巩膜黄染。双下肢凹陷性水肿。急查血生化示Cr632μmol/L，BUN41.0mmol/L，K⁺6.7mmol/L，Na⁺125mmol/L，Cl⁻87mmol/L。动脉血气示pH7.23，BE-5.7mmol/L。

1. 考虑患者为
 - A. 肾前性尿闭
 - B. 肾性尿闭
 - C. 肾后性尿闭
 - D. 去肾性尿闭
 - E. 慢性肾功能不全
 2. 目前的治疗应首选
 - A. 离子交换树脂及山梨醇保留灌肠
 - B. 大剂量速尿(呋塞米)静注
 - C. 紧急扩容补液
 - D. 急诊血液透析
 - E. 5%碳酸氢钠溶液静注
- 正确答案：BD 您选择的答案：

四、A4型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第50-52题

女性，39岁。因车祸导致双下肢广泛软组织挫伤。入院查心率110次/分，血压115/65mmHg(15.33/8.67kPa)。急诊行手术清创。

1. 术中最佳输液原则是
 - A. 扩容以纠酸
 - B. 扩容，碱化尿液
 - C. 输血
 - D. 输血浆代用品
 - E. 输葡萄糖
 2. 若术后第3天病人尿量减少至20ml/以下，经补液不见好转，为进一步明确诊断，下列哪项检查最有价值
 - A. X线摄片
 - B. 血尿素氮、肌酐检查
 - C. 血生化检查
 - D. 动脉血气分析
 - E. 尿常规及细菌培养
 3. 此时最先需要采取的治疗措施是
 - A. 扩容补碱
 - B. 严格控制补液量
 - C. 吗啡镇痛
 - D. 使用利尿剂
 - E. 用大剂量抗生素控制感染
- 正确答案：BBB 您选择的答案：

五、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第53-56题

- A. 限制水、钠摄入
 - B. 5%碳酸氢钠溶液静注
 - C. 保持水电解质平衡，增加营养预防感染
 - D. 10%葡萄糖溶液静滴
 - E. 血液滤过
 1. 急性肾功能不全少尿期应
 2. 急性肾功能不全多尿期应
 3. 急性肾功能不全血钾超过5.5mmol/L应
 4. 严重酸中毒治疗的最佳方案是
- 正确答案：ACBE 您选择的答案：

第57-59题

- A. 肾前性尿闭
 - B. 肾后性尿闭
 - C. 肾性尿闭
 - D. 去肾性尿闭
 - E. 慢性肾功能不全
 1. 某村民误食野生青草后无尿3天，巩膜黄染
 2. 某村民服用4个生鱼胆治目疾后无尿4天
 3. 某患儿在某医院行盆腔肿块切除，术后3天无尿，B超双肾区未探及肾脏，切下的标本病理检查为肾脏
- 正确答案：CCD 您选择的答案：

第60-61题

- A. 肾前性尿闭
- B. 肾后性尿闭
- C. 肾性尿闭
- D. 去肾性尿闭
- E. 慢性肾功能不全

1. 某村民采食野生毒蕈后无尿3天，巩膜黄染

2. 某患儿在某医院行盆腔肿块切除，术后3天无尿，B超双肾区未探及肾，切下的标本病理检查为肾

正确答案：CD 您选择的答案：

习题集 外科学 外科休克

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 有效循环血量一般不依赖下列哪项

- A. 充足的血容量
- B. 通畅的微循环
- C. 有效的心排出量
- D. 良好的周围血管张力
- E. 正常的心功能

正确答案：B 您选择的答案：

第2题 应根据下列哪项来合理选择血管活性药物

- A. 血压的高低
- B. 心跳的快慢
- C. 休克的类型和阶段
- D. 病人的神志情况
- E. 尿量的多少

正确答案：C 您选择的答案：

第3题 决定休克病补液量较可靠的依据是

- A. 血压
- B. 尿量
- C. 中心静脉压
- D. 脉搏
- E. 精神状态

正确答案：C 您选择的答案：

第4题 诊断休克的主要依据

- A. 临床表现
- B. 脉率变快
- C. 血压下降
- D. 动脉氧分压 $< 60\text{mmHg}$
- E. 尿少

正确答案：A 您选择的答案：

第5题 休克的治疗原则应除外

- A. 尽早去除引起休克的原因
- B. 尽快恢复有效血容量
- C. 增加心脏功能
- D. 纠正微循环障碍
- E. 及时应用血管收缩剂

正确答案：E 您选择的答案：

第6题 休克的根本问题是

- A. 组织细胞受累
- B. 低血压
- C. 酸中毒
- D. 心功能不全
- E. 尿少

正确答案：A 您选择的答案：

第7题 休克时的重要代谢障碍为

- A. 酸中毒，高血钾
- B. 碱中毒，低血钾
- C. 低渗性脱水，低镁血症
- D. 低钙，低血糖
- E. 呼吸窘迫综合征

正确答案：A 您选择的答案：

第8题 关于休克代偿期微循环的变化，下列哪项是错误的

- A. 动静脉短路开放
- B. 直捷通路开放
- C. 微动脉收缩
- D. 微静脉收缩
- E. 毛细血管内血液淤积

正确答案：D 您选择的答案：

第9题 各类休克的共同点为

- A. 血压下降
- B. 有效循环血量急剧减少
- C. 皮肤苍白
- D. 四肢湿冷
- E. 烦躁不安

正确答案：B 您选择的答案：

第10题 循环骤停的临界时间是

- A. 1分钟

- B 2分钟
- C 4分钟
- D 8分钟
- E 10分钟

正确答案：C 您选择的答案：

第11题 休克病人早期尿的变化哪些是错的

- A 尿量少
- B 尿比重高
- C 尿钠高
- D 尿pH值下降
- E 尿钾改变不明显

正确答案：C 您选择的答案：

第12题 休克时最能反应组织细胞是否缺氧、缺氧程度及休克是否好转或恶化的主要实验室检查为

- A 动脉血二氧化碳结合力
- B 动脉血pH值
- C 动脉血乳酸含量
- D 血清钾离子浓度
- E 血清乳酸脱氢酶含量

正确答案：C 您选择的答案：

第13题 休克病人早期尿的变化哪项是错的

- A 尿量少
- B 尿比重高
- C 尿钠高
- D 尿pH值下降
- E 尿钾改变不明显

正确答案：C 您选择的答案：

第14题 休克指数是指

- A 脉率 + 脉压 - 111
- B 脉率 / 舒张压
- C 脉率 / 收缩压
- D 舒张压 / 脉率
- E 收缩压 / 脉率

正确答案：C 您选择的答案：

第15题 KRDs常发生在

- A 休克稳定后8小时内
- B 休克稳定后12小时内
- C 休克稳定后24小时内
- D 休克稳定后36小时内
- E 休克期内或稳定后48~72小时内

正确答案：E 您选择的答案：

第16题 血容量不足时中心静脉压往往低于多少(cmH₂O)

- A 14
- B 12
- C 10
- D 8
- E 5

正确答案：E 您选择的答案：

第17题 胃溃疡穿孔36小时，病人处于中毒性休克状态最佳处理措施是

- A 纠正休克同时及早行穿孔修补术
- B 纠正休克同时及早行胃大部切除术
- C 立即胃大部切除术
- D 静脉滴注碳酸氢钠，静脉应用抗生素
- E 静脉补充血容量

正确答案：A 您选择的答案：

第18题 休克失代偿期的微循环变化主要为

- A 微循环收缩期
- B 微循环扩张期
- C 微循环衰竭期
- D 直接通道开放
- E 动静脉短路开放

正确答案：C 您选择的答案：

第19题 代谢性酸中毒是

- A 原发性HCO₃减少
- B 继发性HCO₃减少
- C 原发性H₂CO₃减少
- D 原发性H₂CO₃增多
- E 继发性H₂CO₃减少

正确答案：A 您选择的答案：

第20题 下列哪项是各类休克的共同点

- A 血压下降

- B. 后负荷降低
- C. 前负荷降低
- D. 皮肤温度下降
- E. 以上都是

正确答案：C 您选择的答案：

第21题 诊断休克的主要依据为

- A. 临床表现
- B. 脉率变快
- C. 血压下降
- D. 动脉氧分压<60mmHg
- E. 尿少

正确答案：A 您选择的答案：

第22题 休克时应用血管活性药物的主要目的是

- A. 提高心脏前负荷
- B. 增加心脏后负荷
- C. 增加心脏收缩力
- D. 提高组织的血液灌流量
- E. 降低组织代谢

正确答案：D 您选择的答案：

第23题 失血性休克时应立即予扩容治疗，首先应补充

- A. 右旋糖酐溶液
- B. 全血
- C. 血浆
- D. 平衡盐溶液
- E. 5%葡萄糖溶液

正确答案：D 您选择的答案：

第24题 休克时反映生命器官血液灌流最简单、最可靠的指标是

- A. 神志
- B. 肢体温度
- C. 血压
- D. 脉率
- E. 尿量

正确答案：E 您选择的答案：

第25题 失血性休克代偿期估计失血量为

- A. 400ml 以下
- B. 600ml 以下
- C. 800ml 以下
- D. 1000ml 以下
- E. 1200ml 以下

正确答案：C 您选择的答案：

第26题 从病理生理角度看，休克的本质是

- A. 低血压
- B. 交感-肾上腺系统兴奋
- C. 组织和细胞缺氧
- D. 酸中毒
- E. 心血管功能紊乱

正确答案：C 您选择的答案：

第27题 肱动脉收缩压下降至多少kPa以下时肾小球滤过基本停止

- A. 8.0kPa
- B. 9.0kPa
- C. 10.0kPa
- D. 11.0kPa
- E. 12.0kPa

正确答案：A 您选择的答案：

第28题 成人每24小时排尿量不足多少为无尿

- A. 50ml
- B. 100ml
- C. 110ml
- D. 120ml
- E. 10ml

正确答案：B 您选择的答案：

第29题 无尿是指成人24小时尿量少于

- A. 50ml
- B. 100ml
- C. 110ml
- D. 120ml
- E. 10ml

正确答案：B 您选择的答案：

第30题 ARDS最早期的症状是

- A. 呼吸加快窘迫感

- B 明显的呼吸困难
- C 病人发绀
- D 呼吸道分泌物增多
- E 肺部听诊有哮音

正确答案：A 您选择的答案：

第31题 所谓有效循环血量是指

- A．在微循环内的总血量
- B．全身总血量
- C．单位时间内通过心血管系统进行循环的血量
- D．在动脉内的血量
- E．在静脉内的血量

正确答案：C 您选择的答案：

第32题 在治疗失血性休克中补充血容量时，最优越的晶体液为

- A．5%葡萄糖溶液
- B．5%葡萄糖盐水
- C．平衡盐溶液
- D．10%葡萄糖溶液
- E．4%苏打溶液

正确答案：C 您选择的答案：

第33题 感染性休克补充血容量时，主要是用

- A．全血
- B．血浆
- C．10%葡萄糖溶液
- D．平衡盐溶液
- E．生理盐水

正确答案：D 您选择的答案：

第34题 下列哪种休克的微循环变化和内脏继发性损害比较严重

- A．心源性休克
- B．低血容量性休克
- C．感染性休克
- D．过敏性休克
- E．神经源性休克

正确答案：C 您选择的答案：

第35题 决定心肌微循环灌注量的主要因素是

- A 动脉收缩压
- B 动脉舒张压
- C 外周血管阻力
- D 心脏每搏量
- E 心肌收缩力

正确答案：B 您选择的答案：

第36题 休克经处理后，临床上微循环改善的最重要指标是

- A．血压回升
- B．尿量增多
- C．肢端温度上升
- D．皮肤颜色较红
- E．神志恢复清楚

正确答案：B 您选择的答案：

第37题 休克病人经补液后，血压仍低，中心静脉压不高，5～10分钟内经静脉注入等渗盐水250ml，如血压升高，而中心静脉压不变，提示

- A 心功能不全
- B 血容量过多
- C 血容量不足
- D 血管张力过高
- E 以上均不是

正确答案：C 您选择的答案：

第38题 休克病人采取何种体位最为合理

- A．头低15°，足高25°
- B．平卧位
- C．头躯干抬高20°～30°，下肢抬高15°～20°
- D．侧卧位
- E．下肢低垂10°～15°

正确答案：C 您选择的答案：

第39题 中心静脉压正常值为

- A．0.098～0.392kPa(1～4cmH₂O)
- B．0.490～0.981kPa(5～10cmH₂O)
- C．1.079～1.471kPa(11～15cmH₂O)
- D．1.569～1.961kPa(16～20cmH₂O)
- E．2.059～2.452kPa(21～25cmH₂O)

正确答案：B 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答

案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第40题 男性，24岁，患支气管扩张，突然一次咯血700ml病人烦躁，面色苍白，皮肤湿冷。测血压110/94mmHg(14.67/12.53kPa)，脉搏98次/分。应判断为

- A. 尚未发生休克
- B. 休克失代偿期
- C. 休克代偿期
- D. 中度休克
- E. 重度休克

正确答案：C 您选择的答案：

第41题 男性，67岁。右下腹痛8天，伴呕吐，体温35.0℃。脉搏120次/分，血压80/50mmHg(10.7/6.67kPa)，神志不清，烦躁不安，全腹压痛、反跳痛，四肢冰冷、青紫呈花斑发绀，尿量<25ml/小时。3年前有陈旧性心肌梗死。考虑该病人是

- A. 心源性休克
- B. 低血容量性休克(中度)
- C. 低血容量性休克(重度)
- D. 感染中毒性休克(冷休克)
- E. 感染中毒性休克(暖休克)

正确答案：D 您选择的答案：

第42题 女，48岁，行胃大部分切除术，输血150ml后，出现寒战，肌肉注射异丙嗪25mg，继续输血，半小时后，体温39.7℃，血压70/60mmHg，脉搏160次/分，发绀，意识不清，烦躁不安，可能原因

- A. 输血后出血倾向
- B. 发热反应
- C. 溶血反应
- D. 细菌污染反应
- E. 输血传染疟疾

正确答案：D 您选择的答案：

第43题 男性，38岁，因休克入院。经补液后，血压仍低，中心静脉压不高，5~10分钟内经静脉注入等渗盐水250ml，如血压升高，而中心静脉压不变，提示

- A. 心功能不全
- B. 血容量过多
- C. 血容量不足
- D. 血管张力过高
- E. 以上均不是

正确答案：C 您选择的答案：

第44题 男，60岁，外伤后测得中心静脉压为0.294kPa(3cmH₂O)，外周动脉血压在正常范围，该病人可能是以下哪种情况

- A. 心功能不全
- B. 血容量不足
- C. 血容量过多
- D. 容量血管过度收缩
- E. 容量血管过度扩张

正确答案：B 您选择的答案：

第45题 女性，70岁，急性心梗，查血压83/60mmHg(11.07/8.0kPa)，中心静脉压20cmH₂O，应首先采取哪项措施

- A. 速尿(呋塞米)
- B. 西地兰
- C. 激素
- D. 适当补液
- E. 继续观察

正确答案：D 您选择的答案：

第46题 女，70岁，急性心梗，查血压83/60mmHg，中心静脉压1.961kPa(20cmH₂O)，应首先采取哪项措施

- A. 应用速尿
- B. 应用西地兰
- C. 应用激素
- D. 适当补液
- E. 继续观察

正确答案：D 您选择的答案：

三、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第47-50题

女性，52岁，有胆管结石病史，近2天来右上腹痛，体温37.8℃，2小时前突然畏寒、寒战，体温达40℃，精神紧张兴奋、口渴、面色苍白、脉搏98次/分，有力，血压14.7/12.8kPa(110/96mmHg)，尿量每小时26ml

1. 病人处于何种情况

- A. 急性胆管炎，无休克
- B. 休克代偿期
- C. 中度休克
- D. 重度休克
- E. 高排低阻型休克

2. 下列哪一项不是其微循环变化的特征

- A. 微动脉、微静脉收缩

- B 动静脉短路开放
 - C 直捷通道开放
 - D 组织灌流减少
 - E 静脉回心血量减少
3. 为排除发生弥散性血管内凝血的可能作了多项检查，下列哪项监测检查结果是无意义的
- A 血小板计数低于 $80 \times 10^9 / L$
 - B 纤维蛋白原少于 $1.5g / L$
 - C 凝血酶原时间较正常延长3秒以上
 - D 副凝固试验阳性
 - E 凝血时间明显缩短
4. 下列哪项治疗原则是错误的
- A 积极补充血容量
 - B 联合应用抗菌药物
 - C 尽早做胆管引流
 - D 纠正酸中毒
 - E 静脉滴注间羟胺
- 正确答案：BEEE 您选择的答案：

第51-52题

男，25岁，因被人用刀刺伤背部，伤口流血，2小时后抬来医院。查体：神志尚清楚，诉口渴，皮肤苍白，稍冷，脉搏110次/分，血压90～70mmHg，脉压小，表浅静脉塌陷，尿少

1. 此病人休克达何种程度
- A. 中度
 - B. 轻度
 - C. 重度
 - D. 晚期
 - E. 代偿期
2. 你估计此病人失血量约占全身血容量的百分之几
- A. 20%左右
 - B. 50%左右
 - C. 40%左右
 - D. 20%～40%左右
 - E. <20%

正确答案：AD 您选择的答案：

第53-55题

男，25岁，背部刀伤，伤口流血2小时，体查：神志尚清楚，诉口渴，皮肤苍白，稍冷，脉搏110次/分，血压12/9.33kPa(90/70mmHg)，脉压小，表浅静脉塌陷，尿少

1. 此病人休克达何种程度
- A 中度
 - B 轻度
 - C 重度
 - D 晚期
 - E 代偿期
2. 估计此病人失血量约占全身血容量的多少
- A <20%
 - B 20%
 - C 20%～40%
 - D 40%左右
 - E 50%左右
3. 应采取何种措施
- A 门诊观察
 - B 胸部X线摄片
 - C 全血细胞计数
 - D 收住院手术治疗
 - E 输血

正确答案：ACD 您选择的答案：

第56-58题

男性，25岁，背部刀伤，伤口流血2小时。诉口渴，尿少。体检：脉搏110次/分，血压90/70mmHg(12.0/9.33kPa)，神志尚清楚，皮肤苍白，稍冷，表浅静脉塌陷。此病人。

1. 休克属于
- A. 中度
 - B. 轻度
 - C. 重度
 - D. 晚期
 - E. 代偿期
2. 估计此病人失血量约占全身血容量的多少
- A. <20%
 - B. 20%
 - C. 20%～40%
 - D. 40%左右
 - E. 50%左右
3. 应采取何种措施
- A. 门诊观察
 - B. 胸部X线摄片
 - C. 全血细胞计数
 - D. 收住院手术治疗
 - E. 输血

正确答案：ACD 您选择的答案：

四、A4型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第59-61题

男性，60岁，腹痛伴发热和黄疸3天。烦躁，有上腹压痛，反跳痛，肌紧张不明显。血象WBC $3.5 \times 10^9/L$ ，NO 85。血尿淀粉酶正常。

1. 首先考虑的诊断是

- A. 慢性胆囊炎
- B. 急性胰腺炎
- C. 急性化脓性胆管炎
- D. 十二指肠溃疡穿孔
- E. 右下肺炎

2. 若经抗菌治疗第2天症状不缓解，病人神志淡漠，血压75/60mmHg(7.5/8.0kPa)，尿量减少。此时病人合并有

- A. 低血容量性休克
- B. 心源性休克
- C. 过敏性休克
- D. 神经源性休克
- E. 感染性休克

3. 若病人血小板计数复查2次均在 $50 \times 10^9/L$ 左右，但无皮肤出血点及消化道出血。血小板低的原因是

- A. 脾功能亢进
- B. 血小板消耗过多
- C. 肝功能障碍
- D. 骨髓抑制
- E. 药物反应

正确答案：CED 您选择的答案：

五、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第62-63题

- A. 休克可疑
- B. 休克抑制期
- C. 已有休克
- D. 尚无休克
- E. 休克晚期

1. 男，24岁，受伤后出现精神兴奋，烦躁不安，出冷汗，心率100次/分，脉压缩小，尿量减小

2. 病人口渴不止，神智淡漠，反应迟钝，皮肤苍白，出冷汗，四肢凉，呼吸浅快，脉搏细速，收缩压降至90mmHg以下，尿少。

正确答案：CB 您选择的答案：

第64-66题

- A. 血容量严重不足
- B. 血容量不足
- C. 心功能不全或血容量相对过多
- D. 容量血管过度收缩
- E. 心功能不全或血容量不足

1. 中心静脉压低，血压低时提示

2. 中心静脉压高，血压正常时提示

3. 中心静脉压正常，血压低时提示ADE

正确答案：ADE 您选择的答案：

第67-69题

- A. 中心静脉压很低，尿量多
- B. 中心静脉压偏低，尿量少
- C. 中心静脉压偏低，尿量多
- D. 中心静脉压偏高，尿量多
- E. 中心静脉压很高，尿量少

1. 提示血容量不足

2. 说明液体量已补充足

3. 可能有心功能不全存在

正确答案：BDE 您选择的答案：

第70-71题

- A. 加快输血
- B. 应用血管扩张剂
- C. 应用血管收缩剂
- D. 加快输液
- E. 强心剂

1. 休克病人，脸色苍白，皮肤湿冷及瘀斑，紫绀，经输液补血无改善，血压仍低，中心静脉压1.765kPa(180mmH₂O)，此时采用哪项治疗为最佳

2. 如仍未见效，必要时可加用上述哪项治疗

正确答案：BE 您选择的答案：

习题集 外科学 输血

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 有关输血的适应证，正确的是

- A．出血补充血容量
- B．纠正贫血或低蛋白血症
- C．严重感染输入抗体补体
- D．凝血异常补充各种凝血因子
- E．以上均正确

正确答案：E 您选择的答案：

第2题 麻醉中的手术病人输入几十毫升血后即出现手术区渗血和低血压，应考虑

- A．出血倾向
- B．变态反应
- C．过敏反应
- D．细菌污染反应
- E．溶血反应

正确答案：E 您选择的答案：

第3题 大量输注库存血后引起的并发症不包括

- A．溶血反应
- B．高血钾症
- C．氨中毒
- D．肺梗塞
- E．心律失常

正确答案：A 您选择的答案：

第4题 健康成人一次失血量不超过多少毫升可通过人体的代偿使之逐渐恢复而不用输血

- A．300ml
- B．500ml
- C．800ml
- D．1000ml
- E．1500ml

正确答案：B 您选择的答案：

第5题 下列哪种成分最适合需要多次输血而有发热的贫血病人

- A．浓缩红细胞
- B．全血
- C．冷冻红细胞
- D．少浆血
- E．洗涤红细胞

正确答案：E 您选择的答案：

第6题 下列哪种病不是由输血传染的

- A．肝炎
- B．疟疾
- C．梅毒
- D．巨细胞病毒感染
- E．猫抓热

正确答案：E 您选择的答案：

第7题 引起输血发热反应，最常见的原因是

- A 细菌污染
- B 致热原
- C 血型不合
- D 红细胞破坏
- E 过敏物质

正确答案：B 您选择的答案：

第8题 下列哪项不是输血后发热反应的原因

- A．配制的血液保存液不纯
- B．受血者有过敏体质
- C．采血输血用具不洁
- D．致热原
- E．免疫反应

正确答案：B 您选择的答案：

第9题 成分输血的优点不包括

- A．减轻输注全血所致的血液循环负担
- B．减少各种免疫抗体的产生
- C．减少传染肝炎的机会
- D．节约用血，避免浪费
- E．减少肺梗塞的发生率

正确答案：E 您选择的答案：

第10题 库存枸橼酸钠血，一般超过几周不宜再用

- A 3周

- B 4周
- C 6周
- D 8周
- E 12周

正确答案：A 您选择的答案：

第11题 溶血反应的早期特征是

- A. 腰背部疼痛，心前区压迫感
- B. 恶心、呕吐
- C. 寒战、高热、面部潮红
- D. 出现荨麻疹
- E. 皮肤有淤斑及出血点

正确答案：A 您选择的答案：

第12题 预防大量快速输血引起的出血反应，可采用

- A. 碱化尿液
- B. 换血治疗
- C. 每输库存血3~5U，应补充鲜血1U
- D. 加热库存血
- E. 地塞米松5mg静脉注射治疗

正确答案：C 您选择的答案：

第13题 失血量达到下列哪项指标时，就应该及时输血

- A. 400ml
- B. 500ml
- C. 500~800ml
- D. 1000ml
- E. 1500ml

正确答案：D 您选择的答案：

第14题 下列哪项不是输血的禁忌证

- A. 充血性心力衰竭
- B. 急性肺水肿
- C. 恶性高血压
- D. 严重感染
- E. 肾功能衰竭

正确答案：D 您选择的答案：

第15题 以下哪项不是输血的禁忌证

- A. 充血性心力衰竭
- B. 急性肺水肿
- C. 恶性高血压
- D. 严重感染
- E. 肾功能衰竭

正确答案：D 您选择的答案：

第16题 以下哪项不是输血的适应证

- A. 烧伤
- B. 大手术出血
- C. 出血性疾病
- D. 肾功能衰竭
- E. 血液中毒

正确答案：D 您选择的答案：

第17题 最常见的早期输血并发症是

- A. 溶血反应
- B. 发热反应
- C. 细菌污染反应
- D. 出血倾向
- E. 酸中毒

正确答案：B 您选择的答案：

第18题 输血反应不包括

- A. 发热反应
- B. 过敏反应
- C. 血液中毒
- D. 溶血反应
- E. 细菌污染中毒

正确答案：C 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第19题 男性，35岁。因上消化道大出血入院。入院后输血4000ml后突然出现全身抽搐。体检：血压135 / 90mmHg(18 / 12kPa)，瞳孔等大等圆，对光反射正常，脑神经无异常。实验室检查：血清钾3.8mmol / L、钠150mmol / L，动脉血pH7.4。最可能的诊断是

- A. 高钾血症
- B. 低钾血症
- C. 高钙血症

- D. 低钙血症
- E. 高钠血症

正确答案：D 您选择的答案：

第20题 女性，20岁，输血后5分钟出现寒战、高热、腰背剧痛，心前区有压迫感，血浆呈粉红色，血压为80 / 50mmHg(10.7 / 6.67kPa)。有关该病人的治疗，正确的是

- A. 立即停止输液
- B. 给予苯海拉明25mg口服
- C. 碳酸氢钠溶液静脉滴注
- D. 给予地塞米松5mg静注
- E. 以上均不是

正确答案：E 您选择的答案：

三、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第21-22题

男性，40岁，输血3分钟后即出现咳嗽、喘憋，神志不清，呼吸困难，血压80 / 40mmHg(10.7 / 5.33kPa)。

- 1. 拟诊为
- A. 发热反应
- B. 溶血反应
- C. 过敏反应
- D. 变态反应
- E. 以上均不是

2. 下列治疗中不妥的是

- A. 立即停止输血
- B. 给予异丙嗪25mg肌注
- C. 碳酸氢钠溶液静脉滴注
- D. 给予地塞米松5mg静注
- E. 必要时行气管切开

正确答案：CC 您选择的答案：

四、A4型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第23-26题

女性，46岁。3个月前因胆石症在当地医院行胆总管十二指肠吻合，1天前突然出现右上腹痛、寒战、高热，呕血约1000ml，入院后立即输血。当输血10ml时，突然心前区出现压迫感，腰背部酸痛并出现血红蛋白尿，血压70 / 50mmHg(9.33 / 6.67kPa)。

- 1. 该病人可能发生
 - A. 发热反应
 - B. 循环超负荷
 - C. 变态反应
 - D. 溶血反应
 - E. 细菌污染反应
2. 治疗该病人应采取的最佳措施是
- A. 抗休克：碱化尿液
 - B. 抗休克、碱化尿液、利尿
 - C. 抗休克
 - D. 碱化尿液
 - E. 利尿

3. 如果经上述治疗病人血压升到120 / 75mmHg(16 / 10kPa)，应进一步采取的最佳措施是

- A. 抗休克
- B. 利尿
- C. 碱化尿液
- D. 抗休克、碱化尿液
- E. 抗休克、碱化尿液、利尿

4. 如果病人出现无尿，血清钾7.0mmol / L，应采取的措施是

- A. 予5%碳酸氢钠
- B. 予葡萄糖酸钙
- C. 予葡萄糖加胰岛素
- D. 用阳离子交换树脂
- E. 血液透析

正确答案：DABE 您选择的答案：

五、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第27-28题

- A. 非溶血性发热反应
- B. 循环超负荷
- C. 变态反应
- D. 溶血反应
- E. 细菌污染反应

1. 发生在输血后1~2小时内的反应是

2. 输血时同时输入低渗液体时可发生

正确答案：AD 您选择的答案：

习题集 外科学 颅内肿瘤

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 癫痫发作常见于

- A．额叶、顶叶、颞叶肿瘤
- B．枕叶、额叶、颞叶肿瘤
- C．额叶、顶叶、小脑肿瘤
- D．额叶、鞍区、顶叶肿瘤
- E．额叶、颞叶、松果体区肿瘤

正确答案：A 您选择的答案：

第2题 下列哪一项不是大脑半球肿瘤的主要临床表现

- A．精神症状
- B．癫痫发作
- C．感觉障碍
- D．失语
- E．内分泌功能紊乱

正确答案：E 您选择的答案：

第3题 精神症状常见于

- A．顶叶肿瘤
- B．枕叶肿瘤
- C．额叶肿瘤
- D．颞叶肿瘤
- E．小脑肿瘤

正确答案：C 您选择的答案：

第4题 颅内肿瘤导致患者死亡的直接原因常为

- A．肿瘤出血
- B．脑疝
- C．肿瘤囊性变
- D．癫痫发作
- E．精神症状

正确答案：B 您选择的答案：

第5题 脑肿瘤中患者最容易出现精神症状的是肿瘤位于

- A．顶叶
- B．枕叶
- C．额叶
- D．颞叶
- E．岛叶

正确答案：C 您选择的答案：

二、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第6-7题

- A．精神症状
 - B．运动障碍
 - C．感觉障碍
 - D．失语症
 - E．视野缺损
- 1．顶叶肿瘤出现

2．颞叶深部或枕叶肿瘤出现

正确答案：CE 您选择的答案：