

习题集 妇产科学 女性生殖系统解剖

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 子宫动脉来自

- A 髂外动脉
- B 腹下动脉
- C 腹主动脉
- D 臂上动脉
- E 肾动脉

正确答案：B 您选择的答案：

第2题 维持子宫正常位置的是

- A 骨盆底肌肉及其上下筋膜支托作用
- B 膀胱和直肠的支柱作用
- C 子宫4对韧带及盆底肌肉筋膜的支托作用
- D 腹腔压力作用
- E 子宫4对韧带的作用

正确答案：C 您选择的答案：

第3题 维持子宫正常位置是

- A 盆底肌肉及筋膜的支托作用
- B 膀胱和直肠的支托
- C 子宫韧带和盆底肌肉筋膜的支托
- D 子宫四对韧带的作用
- E 腹腔压力作用

正确答案：C 您选择的答案：

第4题 下列哪对韧带维持着子宫体处于前倾前屈的位置

- A 子宫圆韧带
- B 子宫阔韧带
- C 子宫主韧带
- D 宫骶韧带
- E 以上四对的共同作用

正确答案：E 您选择的答案：

第5题 卵巢囊肿发生蒂扭转时，其蒂的组成是

- A 骨盆漏斗韧带，输卵管，卵巢固有韧带，圆韧带
- B 骨盆漏斗韧带，输卵管，卵巢固有韧带
- C 骨盆漏斗韧带，卵巢韧带，圆韧带
- D 骨盆漏斗韧带，输卵管，圆韧带
- E 输卵管，卵巢韧带

正确答案：B 您选择的答案：

第6题 维持子宫前倾位置的主要韧带是

- A 阔韧带
- B 子宫圆韧带
- C 卵巢固有韧带
- D 主韧带
- E 子宫骶骨韧带

正确答案：B 您选择的答案：

第7题 由子宫颈到骨盆侧壁的韧带是

- A 圆韧带
- B 卵巢固有韧带
- C 骨盆漏斗韧带
- D 子宫骶骨韧带
- E 主韧带

正确答案：E 您选择的答案：

第8题 卵巢的形态学特征正确的是

- A 成年妇女卵巢重约5~6g
- B 卵巢表面有腹膜覆盖
- C 卵巢白膜是一层平滑肌组织
- D 髓质内含数以万计的原始卵泡
- E 卵巢内侧以骨盆漏斗韧带与子宫相连

正确答案：A 您选择的答案：

第9题 下列哪项不属于盆底外(浅)层结构

- A 球海绵体肌
- B 坐骨海绵体肌
- C 会阴浅横肌
- D 会阴深横肌
- E 肛门外括约肌

正确答案：D 您选择的答案：

第10题 关于子宫峡部下列哪项是错误的

- A 峡部上端为解剖学内口

- B. 峡部下端为组织学内口
  - C. 峡部下端为解剖学内口
  - D. 子宫体与子宫颈之间最狭窄部
  - E. 子宫峡部于妊娠晚期伸展为子宫下段
- 正确答案：C 您选择的答案：

- 第11题 关于子宫，正确的是
- A. 成年的子宫长7~8cm，宽4~5cm，厚4~5cm
  - B. 子宫体与子宫颈的比例，成年人为1:2
  - C. 子宫体与子宫颈之间形成最狭窄的部分为子宫峡部
  - D. 子宫峡部的上端是组织学内口
  - E. 产妇的子宫颈外口是圆形
- 正确答案：C 您选择的答案：

- 第12题 子宫峡部是
- A. 子宫颈阴道部
  - B. 子宫颈阴道上部
  - C. 子宫颈管最狭窄部分
  - D. 子宫颈与子宫体之间最狭窄部分
  - E. 子宫体最狭窄部分
- 正确答案：D 您选择的答案：

- 第13题 下列哪项为骨盆测量的正常值
- A. 对角径10~11cm
  - B. 坐骨棘间径9cm
  - C. 坐骨切迹<2指
  - D. 耻骨弓角度90°
  - E. 骨盆倾斜度80°
- 正确答案：D 您选择的答案：

- 第14题 有关女性生殖系统的淋巴回流，下列哪项是错误的
- A. 外阴淋巴大部分汇入腹股沟淋巴结
  - B. 阴道下1/3段淋巴汇入腹股沟浅淋巴结
  - C. 腹股沟浅淋巴结大部分汇入腹股沟深淋巴结
  - D. 宫颈淋巴汇入腹股沟深淋巴结
  - E. 子宫体淋巴汇入腰淋巴及腹股沟浅淋巴结
- 正确答案：D 您选择的答案：

- 第15题 关于子宫颈的解剖学，下列哪项不正确
- A. 子宫颈分为阴道上部和阴道部
  - B. 宫颈峡部下端是组织学内口
  - C. 宫颈管粘膜上皮在组织学内口处由柱状上皮变为鳞状上皮
  - D. 宫颈粘膜上皮有分泌腺液功能
  - E. 青春期宫颈宫体之比为1:2
- 正确答案：C 您选择的答案：

- 第16题 关于女性生殖器官的描述，以下哪项是错误的
- A. 阴道后穹窿较深，与子宫膀胱陷凹相邻，在临床上具有重要意义
  - B. 子宫为精子到达输卵管的通道
  - C. 输卵管为精子与卵子相遇的场所
  - D. 卵巢产生卵子
  - E. 子宫内膜是卵巢激素的靶器官
- 正确答案：A 您选择的答案：

- 第17题 成年妇女子宫形态学特征正确的是
- A. 重约150g
  - B. 宫腔容量约10ml
  - C. 长度7~8cm
  - D. 宫体:宫颈=1:2
  - E. 下部较上部宽
- 正确答案：C 您选择的答案：

- 第18题 子宫动脉来自
- A. 髂外动脉
  - B. 髂内动脉
  - C. 腹主动脉
  - D. 肾动脉
  - E. 髂总动脉
- 正确答案：B 您选择的答案：

- 第19题 外生殖器不包括
- A. 阴阜
  - B. 大小阴唇
  - C. 阴道
  - D. 尿道口
  - E. 阴蒂
- 正确答案：C 您选择的答案：

- 第20题 子宫最狭窄的部分是
- A. 组织学内口

- B 解剖学内口
- C 子宫峡部
- D 子宫颈管
- E 子宫颈外口

正确答案：B 您选择的答案：

第21题 骨盆出口横径指哪项

- A 坐骨结节中段外侧缘之间的距离
- B 坐骨结节前端内侧缘之间的距离
- C 坐骨结节后端外侧缘之间的距离
- D 坐骨结节后端内侧缘之间的距离
- E 坐骨结节前端外侧缘之间的距离

正确答案：B 您选择的答案：

第22题 骨盆界限的组成应是

- A 耻骨联合上缘、髂耻缘及骶岬中部的连线
- B 耻骨联合下缘、髂耻缘及骶岬上缘的连线
- C 耻骨联合上缘、髂棘及骶岬上缘的连线
- D 耻骨联合上缘、髂耻缘及骶岬上缘的连线
- E 耻骨联合下缘、髂棘及骶岬上缘的连线

正确答案：D 您选择的答案：

第23题 骨盆底的组成，下列哪项不正确

- A 骨盆底分内、中、外三层，中层又称尿生殖膈
- B 盆隔由肛提肌及其筋膜组成，是支托盆内脏器的最主要成分
- C 尿生殖膈由两层筋膜及一对会阴深横肌组成
- D 骨盆底外层包括肛门外括约肌
- E 会阴体不属盆底组成部分

正确答案：E 您选择的答案：

第24题 髂内动脉前干分支不直接供血的是

- A 卵巢
- B 子宫
- C 阴道
- D 膀胱
- E 输卵管

正确答案：A 您选择的答案：

第25题 有关女性生殖系统解剖正确的是

- A 子宫体与子宫颈的淋巴主要汇入闭孔及髂内外淋巴结
- B 正常成人子宫颈体的比是2:1
- C 卵巢动脉自髂内动脉分出
- D 输尿管在距离宫颈口水平2cm处与子宫动脉交叉，而达子宫侧缘
- E 外生殖器主要由阴部神经支配，内生殖器则由植物神经支配

正确答案：E 您选择的答案：

第26题 右卵巢动脉是从哪条动脉分支来的

- A 髂内动脉
- B 髂外动脉
- C 肾动脉
- D 腹主动脉
- E 髂总动脉

正确答案：D 您选择的答案：

第27题 作子宫切除时，下列注意事项哪项是错误的

- A 推离膀胱腹膜反折时，避免损伤膀胱
- B 推离直肠子宫腹膜反折时，避免损伤直肠
- C 切除子宫骶骨韧带时，避免损伤输尿管
- D 切除阔韧带时，避免损伤膀胱
- E 切断子宫动脉时，注意勿损伤输尿管

正确答案：D 您选择的答案：

第28题 做全子宫及单侧附件切除术时，切断下列哪项最不易损伤输尿管

- A 骨盆漏斗韧带
- B 卵巢固有韧带
- C 子宫骶骨韧带
- D 子宫动脉
- E 主韧带

正确答案：B 您选择的答案：

第29题 内生殖器不包括

- A 子宫
- B 卵巢
- C 输卵管
- D 阴道前庭
- E 阴道

正确答案：D 您选择的答案：

第30题 自输卵管伞端延伸至盆壁的韧带是

- A 主韧带

- B. 阔韧带
- C. 骨盆漏斗韧带
- D. 子宫骶骨韧带
- E. 圆韧带

正确答案：C 您选择的答案：

第31题 有关输卵管的构造，正确的是

- A. 由浆膜层，肌层，粘膜下层及粘膜层四层构成
- B. 内膜上皮为低柱状上皮，有纤毛
- C. 壶腹部是管腔最狭窄的部分
- D. 子宫角部是管壁最厚的部位
- E. 平滑肌蠕动方向是自内向外

正确答案：D 您选择的答案：

第32题 左侧卵巢动脉来自

- A. 髂外动脉
- B. 髂内动脉
- C. 髂总动脉
- D. 肾动脉
- E. 子宫动脉

正确答案：D 您选择的答案：

第33题 左侧卵巢动脉不同于右侧卵巢动脉，还可以来自

- A 髂外动脉
- B 髂内动脉
- C 腹主动脉
- D 肾动脉
- E 以都不是

正确答案：D 您选择的答案：

第34题 右侧卵巢动脉来自

- A. 髂外动脉
- B. 髂内动脉
- C. 髂总动脉
- D. 腹主动脉
- E. 肾动脉

正确答案：D 您选择的答案：

第35题 关于输卵管各部，正确的是

- A 通入子宫壁内的为间质部
- B 间质部外侧的为壶腹部
- C 峡部比间质部的管腔窄
- D 漏斗部(伞部)为输卵管宽大部分
- E 以上都不是

正确答案：A 您选择的答案：

第36题 有关女性生殖器淋巴解剖学下列哪项是错误的

- A. 分为外生殖器及内生殖器淋巴
- B. 外生殖器淋巴分为深浅两部分淋巴组
- C. 浅淋巴结位于腹股沟韧带下方，阔筋膜上面，约10~20个淋巴结
- D. 内生殖器淋巴分为髂淋巴组，腰淋巴组，骶前淋巴组
- E. 外生殖器有感染、肿瘤时，可直接传导到腰淋巴结，然后注入胸乳糜池

正确答案：D 您选择的答案：

第37题 子宫动脉来自

- A. 腹主动脉
- B. 髂总动脉
- C. 髂外动脉
- D. 髂内动脉
- E. 肾动脉

正确答案：D 您选择的答案：

第38题 骨盆对角径的正常值是

- A 9cm
- B 110cm
- C 11cm
- D 12cm
- E 13cm

正确答案：E 您选择的答案：

第39题 输卵管的组织解剖及生理作用是

- A 长6~8cm
- B 峡部为输卵管腔最狭窄部
- C 伞部有"拾卵"作用
- D 内膜为复层柱状上皮
- E 输卵管粘膜不受性激素影响

正确答案：C 您选择的答案：

第40题 固定宫颈位置的主要韧带是

- A. 圆韧带

- B. 主韧带
- C. 骨盆漏斗韧带
- D. 阔韧带
- E. 宫骶韧带

正确答案：B 您选择的答案：

第41题 右侧卵巢动脉来自

- A 髂外动脉
- B 髂内动脉
- C 腹主动脉
- D 肾动脉
- E 以上都不是

正确答案：C 您选择的答案：

第42题 关于骨盆哪项是正确的

- A. 骨盆由骶骨、尾骨、左右两块髌骨组成
- B. 骨盆入口平面是由耻骨联合上缘、髂耻缘及骶岬上缘连线围成的平面
- C. 真骨盆呈前深后浅的形态，它的形状、径线直接影响胎儿的分娩
- D. 坐骨结节位于真骨盆的中部，肛诊或阴道检查时可触到
- E. 假骨盆也是胎儿娩出的通道，是骨产道的一部分

正确答案：B 您选择的答案：

第43题 妇科手术在处理下列组织时最易损伤输尿管的部位，正确的是

- A. 骨盆漏斗韧带、主韧带、圆韧带
- B. 主韧带、骨盆漏斗韧带、子宫动脉
- C. 子宫动脉、宫骶韧带、卵巢固有韧带
- D. 输卵管系膜、卵巢固有韧带、子宫动脉
- E. 圆韧带、宫骶韧带、子宫动脉

正确答案：B 您选择的答案：

第44题 卵巢囊肿发生蒂扭转时，其蒂的组成是

- A. 骨盆漏斗韧带、输卵管、卵巢固有韧带、圆韧带
- B. 骨盆漏斗韧带、输卵管、圆韧带
- C. 骨盆漏斗韧带、输卵管、圆韧带
- D. 骨盆漏斗韧带、卵巢韧带、圆韧带
- E. 输卵管、卵巢韧带

正确答案：E 您选择的答案：

第45题 加强盆底托力的肌肉是

- A. 球海绵体肌
- B. 坐骨海绵体肌
- C. 会阴浅横肌
- D. 会阴深横肌
- E. 肛提肌

正确答案：E 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第46题 女，15岁，于高处不慎摔下，呈骑跨式，伤及外阴，疼痛难忍。最易出现外阴血肿的部位在

- A. 小阴唇
- B. 大阴唇
- C. 阴阜部
- D. 阴蒂部
- E. 会阴部

正确答案：B 您选择的答案：

第47题 一女性3天前外阴部发现囊肿前来就诊，经检查发现囊肿位于大阴唇后部，前庭后方小阴唇与处女膜之间的沟内，最可能的诊断是

- A. 外阴肿瘤
- B. 外阴上皮肉瘤样病变
- C. 外阴癌
- D. 外阴良性肿瘤
- E. 前庭大腺囊肿

正确答案：E 您选择的答案：

第48题 女，38岁，因月经过多且经期延长、贫血，血红蛋白仅56g/L，而决定行子宫切除术。术前主刀医师在考虑手术各步注意事项时，下列哪项可不必考虑

- A. 推离膀胱反折腹膜时避免损伤膀胱
- B. 推离直肠子宫腹膜反折时，避免损伤直肠
- C. 切断子宫骶骨韧带时，避免损伤输尿管
- D. 切断圆韧带时，避免损伤输尿管
- E. 切断子宫动脉时，注意勿损伤输尿管

正确答案：D 您选择的答案：

第49题 女，38岁。于高处取物时不慎摔下，呈骑跨式，伤及外阴部位，疼痛难忍，出现外阴血肿最易发生的部位是

- A 大阴唇
- B 小阴唇
- C 阴阜部

- D 阴蒂部  
E 会阴部

正确答案：A 您选择的答案：

第50题 女，35岁。因月经过多且经期延长，贫血，血红蛋白仅56g/L，而决定行全子宫切除术。术前主刀医师在考虑手术各步注意事项时，下列哪项可不必顾虑

- A 推离膀胱腹膜反折时，避免损伤膀胱  
B 推离直肠子宫腹膜反折时，避免损伤直肠  
C 切断子宫骶骨韧带时，避免损伤输尿管  
D 切断圆韧带时，避免损伤输尿管  
E 切除子宫动脉时，注意勿损伤输尿管

正确答案：D 您选择的答案：

第51题 孕妇，25岁，G1P0，40周妊娠，宫口开全，胎儿偏大，接产时需做会阴侧切术，术前行局部阻滞麻醉，阻滞哪条神经

- A．直肠下神经  
B．会阴神经  
C．阴部神经  
D．阴唇后神经  
E．坐骨神经

正确答案：C 您选择的答案：

第52题 孕妇，27岁，G1P0，20周妊娠。骨盆外测量25.0-26.0-18.5-9.0cm。阴道检查：骶岬不突，骶骨弧度中等，坐骨棘平伏，坐骨切迹宽，耻骨弓100°。该孕妇骨盆属于哪种类型

- A．女型骨盆  
B．男型骨盆  
C．扁平型骨盆  
D．均小骨盆  
E．漏斗型骨盆

正确答案：A 您选择的答案：

三、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第53-56题

女，35岁。G1P0，孕39+6周，上午6时起宫缩32~37秒/4~5分钟，强度(++)~(+++)，胎心率140次/分，LOA，上午8时入院，入院时肛查：宫口开1cm，先露S-1，于下午8时，宫缩20~25秒/7~8分，强度(++)~(+++)，宫口开大8cm，胎心率155次/分，阴道检查：坐骨切迹，切迹<2指，骶凹平坦，坐骨结节间径7.5cm

1. 可能的诊断是

- A 高龄初产  
B 骨盆入口狭窄  
C 骨盆入口和出口狭窄  
D 出口狭窄  
E 中骨盆和出口狭窄

2. 下列哪项处理不恰当

- A 胎心监测(OCT)  
B 吸氧  
C 静滴催产素  
D 重新估计胎儿体重  
E 检查耻骨联合上方是否有压痛

3. 随产程时间延长，下列哪种体征不会出现

- A OCT提示胎心率减速  
B 羊水清亮  
C 宫缩减弱  
D 胎心突然消失  
E 耻骨联合上方压痛

4. 尽快结束分娩的措施是

- A 急诊剖宫产  
B 胎头吸引术  
C 产钳助产  
D 静待自然分娩  
E 待宫口开全后再讨论分娩方式

正确答案：ECBA 您选择的答案：

四、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第57-60题

- A．圆韧带  
B．阔韧带  
C．主韧带  
D．宫骶韧带  
E．骨盆漏斗韧带

1. 为一对翼形的腹膜皱襞由子宫两侧开始，达到骨盆壁  
2. 横行于宫颈两侧和骨盆侧壁之间，为一对坚韧的平滑肌与结缔组织纤维束  
3. 起于子宫双角的前面、输卵管近端的下方终止于大阴唇前端  
4. 从宫颈后面的上侧方，向两侧绕过直肠到达第2、3骶椎前面的筋膜

正确答案：BCAD 您选择的答案：

第61-64题

- A. 卵巢动脉
- B. 子宫动脉
- C. 阴道动脉
- D. 阴部内动脉
- E. 会阴动脉

1. 自腹主动脉分出(左侧可来自左肾动脉)
2. 为髂内动脉前干的分支,于距宫径内口水平约3cm处横跨输尿管而达子宫侧缘
3. 为髂内动脉前干的分支,有许多小分支分布于阴道中下段前后面及膀胱顶、膀胱颈
4. 为髂内动脉的终支,经坐骨大孔的梨状肌下孔穿出骨盆腔,随即绕过坐骨棘背面,再经坐骨小孔到达会阴及肛门

正确答案: ABCD 您选择的答案:

第65-69题

- A. 类人猿型骨盆
- B. 扁平型骨盆
- C. 漏斗型骨盆
- D. 男型骨盆
- E. 女型骨盆

1. 骨盆入口略呈三角形,两侧壁内聚,坐骨棘突出,耻骨弓较窄,骶骨较直而前倾,致后矢状径较短
2. 骨盆入口各径线均在正常范围,中骨盆及骨盆出口狭窄
3. 骨盆入口略呈圆形,入口横径较前后径略长,耻骨弓较宽,两侧坐骨棘间径 10cm
4. 骨盆入口呈卵圆形,入口前后径较横径长,骶坐切迹较宽,坐骨棘较突出,耻骨弓较窄
5. 骨盆前后径短而横径长,耻骨弓宽,骶骨弯曲,故骶骨短而骨盆浅,骶坐切迹宽

正确答案: DCEAB 您选择的答案:

第70-72题

- A 9cm
  - B 10cm
  - C 11cm
  - D 12cm
  - E 13cm
1. 坐骨棘间径平均是
  2. 后矢状径是
  3. 骨盆对角径是

正确答案: BAE 您选择的答案:

第73-74题

- A. 女性骨盆
- B. 扁平型骨盆
- C. 类人猿型骨盆
- D. 男型骨盆
- E. 均小骨盆

1. 骨盆入口呈横椭圆形,髂骨翼宽而浅,入口横径较前后径稍长,耻骨较宽,两侧坐骨棘间径 10cm
2. 骨盆入口略呈三角形,两侧壁内聚,坐骨棘突出,耻骨弓较窄,骶坐切迹窄呈高弓型,骶骨较直而前倾,出口后矢状径较短

正确答案: AD 您选择的答案:

第75-79题

- A. 子宫静脉
  - B. 右卵巢静脉
  - C. 左卵巢静脉
  - D. 子宫动脉
  - E. 卵巢动脉
1. 来自髂内动脉的前干
  2. 汇入髂内静脉
  3. 汇入下腔静脉
  4. 来自腹主动脉
  5. 汇入左肾静脉

正确答案: DABEC 您选择的答案:

第80-82题

- A. 阴阜
  - B. 阴蒂
  - C. 前庭球
  - D. 阴道前庭
  - E. 大阴唇
1. 外伤时易形成血肿的是
  2. 耻骨联合前面隆起的脂肪垫
  3. 两侧小阴唇之间的菱形区

正确答案: EAD 您选择的答案:

习题集 妇产科学 女性生殖系统生理

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 子宫内膜由增殖期变为分泌期，主要受哪种激素的作用

- A. 雌激素
- B. 孕激素
- C. 促卵泡成熟激素(FSH)
- D. 促黄体素(LH)
- E. 促性腺激素释放激素(GnRH)

正确答案：B 您选择的答案：

第2题 关于子宫内膜在月经周期中的引化，下述何项是错误的

- A. 子宫内膜有功能层和基底层
- B. 功能层受卵巢激素影响而呈周期性变化
- C. 基底层是孕卵种植的部分
- D. 雌激素使子宫内膜呈增生期变化
- E. 孕激素使增生期子宫内膜转化为分泌期内膜

正确答案：C 您选择的答案：

第3题 正确月经来潮是由于

- A. 体内雌孕激素撤退性出血
- B. 体内雌激素的撤退性出血
- C. 体内孕激素的突破性出血
- D. 体内雌孕激素的突破性出血
- E. 体内孕激素的撤退性出血

正确答案：A 您选择的答案：

第4题 关于月经下列哪项是正确的

- A. 月经周期的长短主要与卵泡期有关
- B. 月经血可凝固，多伴有小血块
- C. 月经来潮表明有排卵，且未发生受精和孕卵着床
- D. 子宫内膜从基底部剥脱
- E. 正常月经量约100ml

正确答案：A 您选择的答案：

第5题 关于卵泡发育与成熟的描述，正确的是

- A. 临近青春期，颗粒细胞增生，细胞表面的FSH受体增多
- B. 在FSH的作用下，颗粒细胞逐渐增厚形成两层卵泡膜细胞
- C. 卵泡膜细胞内的芳香化酶将雄激素转化为雌激素
- D. 颗粒细胞层血管丰富，产生雌二醇直接进入血循环
- E. 孕激素分泌在排卵后达高峰

正确答案：A 您选择的答案：

第6题 关于性周期的描述下述何项是错误的

- A. 月经是子宫内膜周期性变化的临床表现
- B. 子宫内膜的周期性变化受卵巢激素的影响
- C. 卵巢周期性变化直接受垂体，下丘脑的控制
- D. 孕激素对下丘脑产生正负反馈的作用
- E. 雌激素对下丘脑同样产生正负反馈调节

正确答案：D 您选择的答案：

第7题 卵子自卵巢排出后未受精，黄体开始萎缩是在排卵后的

- A. 4~5天
- B. 9~10天
- C. 11~12天
- D. 13~14天
- E. 15~16天

正确答案：B 您选择的答案：

第8题 月经周期为32天的妇女，其排卵时间一般在

- A. 本次月经来潮后16天左右
- B. 本次月经干净后14天左右
- C. 下次月经来潮前14天左右
- D. 两次月经来潮中间
- E. 下次月经来潮前16天左右

正确答案：C 您选择的答案：

第9题 垂体激素中哪3种激素受下丘脑RH / LH的双重调节

- A. FSH、LH、PRL
- B. FSH、PRL、ACTH
- C. GH、ACTH、TSH
- D. GH、PRL、MSH
- E. MSH、FSH、ACTH

正确答案：D 您选择的答案：

第10题 卵巢排卵后形成黄体，此时孕激素分泌旺盛，其高峰在月经周期的

- A. 第7~8天



- B. 第12~13天
- C. 第17~18天
- D. 第22~23天
- E. 第25~26天

正确答案：D 您选择的答案：

第11题 下列哪项描述与月经周期相符(28天周期)

- A. 月经第7天在E2较低水平，卵巢中卵泡发育成熟，子宫内膜增殖期，宫颈黏液见羊齿状结晶
- B. 月经第14天血E2、FSH、LH均有高峰，卵巢排卵，子宫内膜分泌晚期，宫颈黏液见椭圆体，BBT出现高温相
- C. 月经第14天血E2、P均有高峰，卵巢排卵，子宫内膜增殖期，宫颈黏液见羊齿状结晶，BBT出现高温相
- D. 月经第21天，血E2、P均有高峰，卵巢黄体形成，子宫内膜分泌期，宫颈黏液见椭圆体，BBT出现高温相
- E. 月经第25天，血E2、P低水平，卵巢白体形成，子宫内膜分泌晚期，宫颈黏液椭圆体，BBT出现高温相

正确答案：D 您选择的答案：

第12题 子宫内膜腺上皮细胞的核下开始出现含糖原小泡，相当于子宫内膜周期中的

- A. 增生期中期
- B. 增生期晚期
- C. 分泌期早期
- D. 分泌期中期
- E. 分泌期晚期

正确答案：C 您选择的答案：

第13题 关于雌激素、孕激素的周期性变化，下列哪项正确

- A. 雌激素有1个高峰
- B. 孕激素有2个高峰
- C. 雌激素仅在排卵后7~8天出现一高峰
- D. 孕激素在排卵前2天出现一高峰
- E. 孕激素在排卵后7~8天出现一高峰

正确答案：E 您选择的答案：

第14题 32岁，妇女。14岁初潮，月经周期为34天，预测排卵期大约在周期的哪一天

- A. 第14天
- B. 第15天
- C. 第16天
- D. 第20天
- E. 第24天

正确答案：D 您选择的答案：

第15题 下丘脑-垂体-卵巢轴的调节存在反馈作用，错误的是

- A. 下丘脑分泌促性腺激素释放激素，作用于垂体
- B. 卵泡期的雌激素高峰对下丘脑产生正反馈
- C. FSH有刺激卵泡发育的功能
- D. 下丘脑通过门脉循环与垂体前叶密切联系
- E. LH在月经中期有一个分泌高峰，卵泡在高峰时排卵

正确答案：B 您选择的答案：

第16题 关于月经周期中宫颈粘液的变化下列何项是错误的

- A. 雌激素使宫颈粘液分泌量增多，稀薄而透明
- B. 孕激素使宫颈粘液分泌减少，但伸展性增强
- C. 雌激素使宫颈粘液拉丝度在10cm以上
- D. 孕激素使宫颈粘液中结晶逐步模糊
- E. 排卵期雌激素对宫颈分泌物影响达高峰

正确答案：B 您选择的答案：

第17题 雌激素的生理作用，下列何项是正确的

- A. 使宫颈口松弛，粘液分泌增加，稀薄，拉丝度增长
- B. 使子宫肌肉对催产素的敏感性下降
- C. 使阴道上皮细胞脱落
- D. 对下丘脑只有负反馈
- E. 有升高胆固醇，不利于冠心病

正确答案：A 您选择的答案：

第18题 关于性轴的描述下列哪项是错误的

- A. FSH在整个周期中都产生
- B. FSH、LH在下丘脑产生的激素控制下分泌
- C. 卵巢周期性变化直接受下丘脑和垂体控制
- D. 孕激素在月经周期中出现两个峰值，第二个峰值较高
- E. 雌激素的第二个峰值较第一个平坦

正确答案：D 您选择的答案：

第19题 关于内分泌对生殖系统的影响中下列哪项是错误的

- A. 肾上腺皮质为女性雄激素的主要来源
- B. 少量雄激素是妇女的阴毛、腋毛发育所必须的
- C. 雄激素有抗雌激素的作用
- D. 甲亢可引起月经过多
- E. 甲减可引起闭经或卵巢萎缩

正确答案：D 您选择的答案：

第20题 关于月经的特点下列哪项是正确的

- A. 有排卵才有月经

- B. 排卵在两次月经中间
  - C. 月经期基础体温呈高温相
  - D. 排卵发生在下次月经来潮前14天
  - E. 排卵发生在月经周期第14天
- 正确答案：D      您选择的答案：

第21题 孕激素的生理作用下述何项是正确的

- A. 使子宫肌肉对催产素的敏感性增强
  - B. 使阴道上皮角化，糖原增加
  - C. 单独使子宫内膜呈分泌期变化
  - D. 使宫颈口闭合，粘液减少变稠，拉丝度减少
  - E. 促进骨中钙的沉积
- 正确答案：D      您选择的答案：

第22题 关于卵巢的功能下列哪项是错误的

- A. 卵巢分泌雌、孕激素和雄激素
  - B. 新生儿的卵巢内含有200多万个始基卵泡
  - C. 妇女一生中有400个左右卵泡发育成熟而排卵
  - D. 卵巢每月有数个卵泡发育但只有一个卵泡发育成熟而排卵
  - E. 青春期可有排卵和月经
- 正确答案：B      您选择的答案：

第23题 关于性轴的描述下列何项是错误的

- A. FSH在整个周期中都产生，但在排卵前1~2日有峰值
  - B. FSH, LH在下丘脑产生的激素控制下分泌
  - C. 卵巢周期性变化，直接受下丘脑和垂体控制
  - D. 孕激素在月经周期中出现二个峰值，后面峰值较高
  - E. 雌激素在月经周期中表现为排卵后的峰值比前面平坦
- 正确答案：D      您选择的答案：

第24题 月经初潮意味着

- A. 下丘脑性中枢发育成熟
  - B. 垂体前叶开始分泌促性腺激素
  - C. 卵巢开始排卵和性激素分泌
  - D. 甲状腺和肾上腺功能建立
  - E. 下丘脑-垂体-卵巢-子宫轴功能抑制被解除
- 正确答案：E      您选择的答案：

第25题 雌激素对丘脑下部及脑垂体前叶的反馈是

- A. 雌激素-负反馈，孕激素-正反馈
  - B. 雌激素-正反馈，孕激素-负反馈
  - C. 雌激素-负反馈，孕激素-负反馈
  - D. 雌激素-正负反馈，孕激素-负反馈
  - E. 雌激素-负反馈，孕激素-正负反馈
- 正确答案：D      您选择的答案：

第26题 正常月经来潮是由于

- A. 体内雌孕激素撤退性出血
  - B. 体内雌激素撤退性出血
  - C. 体内孕激素的突破性出血
  - D. 体内雌孕激素的突破性出血
  - E. 体内孕激素撤退性出血
- 正确答案：A      您选择的答案：

第27题 使子宫内膜从增生期转化为分泌期的主要因素是

- A. 下丘脑分泌FSH-RH和LH-RH的作用
  - B. 垂体分泌促性腺激素的作用
  - C. 卵巢分泌雌激素和孕激素共同作用
  - D. 卵巢分泌雌激素的作用
  - E. 卵巢分泌孕激素的作用
- 正确答案：E      您选择的答案：

第28题 关于激素的代谢下述何项是正确的

- A. 卵巢主要合成雌二醇和雌酮二种雌激素
  - B. 雌酮是雌二醇的降解产物
  - C. 雌三醇由雌酮降解而来
  - D. 卵巢分泌的孕激素主要是孕二醇
  - E. 孕二醇的降解产物是孕酮
- 正确答案：A      您选择的答案：

第29题 性激素的周期性变化中下述何项是正确的

- A. 孕激素在排卵前有一低峰，排卵后才有高峰
  - B. 雌激素有两峰值，排卵后的峰值较平坦
  - C. 雌、孕激素的峰值在排卵后第10天形成
  - D. 黄体分泌雌激素和孕激素，如不受精20天后退化
  - E. 在月经周期中均有较大量的雌孕激素
- 正确答案：B      您选择的答案：

第30题 下列关于月经和月经期临床表现的叙述中哪项不正确

- A. 月经是卵巢内卵泡成熟、排卵和黄体形成，同时子宫内膜从增生到分泌变化的结果

- B. 月经周期从出血的第一日算起  
C. 正常月经周期是28~30天加减3天  
D. 经血一般不凝是由于其中缺乏某种凝血因子  
E. 经血中含有子宫内膜碎片、宫颈黏液及脱落的阴道上皮细胞  
正确答案：D 您选择的答案：

第31题 更年期的特点中下述哪项是正确的

- A. 更年期就是绝经期  
B. 更年期卵巢中卵泡已耗尽  
C. 更年期是无排卵功血的最好发时期  
D. 更年期一般是在55岁以上  
E. 更年期是恶性肿瘤的好发时期  
正确答案：C 您选择的答案：

第32题 宫颈粘液最丰富，伸展性最大，羊齿状结晶最高出现在正常月经周期中的哪一期

- A. 增生早期  
B. 增生中期  
C. 排卵期  
D. 分泌早期  
E. 分泌中期  
正确答案：C 您选择的答案：

第33题 WHO规定的青春期为

- A. 10~13岁  
B. 13~15岁  
C. 10~19岁  
D. 15~20岁  
E. 20岁  
正确答案：C 您选择的答案：

第34题 排卵性月经来潮是由于

- A. 雌激素撤退  
B. 孕激素撤退  
C. 雌、孕激素撤退  
D. 雄激素撤退  
E. 雌、孕、雄激素撤退  
正确答案：C 您选择的答案：

第35题 月经周期的长短取决于下列哪项因素

- A. 增生期的长短  
B. 分泌期的长短  
C. 经期的长短  
D. 黄体的寿命  
E. 黄体退化成白体的时间  
正确答案：A 您选择的答案：

第36题 下列哪种激素促进卵泡的募集和生长

- A. FSH  
B. LH  
C. PRL  
D. PG  
E. GnRH  
正确答案：A 您选择的答案：

第37题 关于卵泡的发育哪项是错误的

- A. 未发育的卵泡称为原始卵泡  
B. 妇女一生中约有400~500个卵泡发育成熟  
C. 排卵一般发生在月经周期第14天  
D. 排卵后卵泡壁塌陷，残留的颗粒细胞变大，积聚类脂质，形成黄体  
E. 排卵后7~8天，黄体发育达高峰，称为成熟黄  
正确答案：C 您选择的答案：

第38题 关于卵巢生理的描述，正确的是

- A. 卵泡期一般固定  
B. 随着卵泡的逐渐发育成熟，宫颈黏液量由多变少  
C. 在孕激素的作用下，阴道上皮细胞大量脱落  
D. 排卵后由于雌激素的作用基础体温呈高温相  
E. 输卵管的周期性变化只有形态学方面的变化  
正确答案：C 您选择的答案：

第39题 婴儿出生时卵巢内的始基卵泡数目为

- A. 5万~10万  
B. 10万~15万  
C. 15万~20万  
D. 15万~50万  
E. 50万  
正确答案：D 您选择的答案：

第40题 关于月经的叙述，下列哪项正确

- A. 初潮时多为有排卵性月经

- B. 两次月经的间隔时间为1个月经周期
  - C. 月经周期的长短主要取决于分泌期的长短
  - D. 正常月经失血量不少于80ml
  - E. 月经血是凝固的，至少有小血块
- 正确答案：B      您选择的答案：

- 第41题 关于卵泡生长与发育哪项是错误的
- A. 原始卵泡包含1个卵母细胞与周围一层梭形细胞
  - B. 新生儿有10万个始基卵泡，一生中只有400~500个发育成熟
  - C. 颗粒细胞分泌粘多糖在卵泡周围形成透明带
  - D. 卵母细胞与周围颗粒细胞组成放射冠
  - E. 卵丘内含有卵细胞
- 正确答案：D      您选择的答案：

- 第42题 关于月经下列哪项是错误的
- A. 月经周期从月经来潮第一天算起
  - B. 经血一般不凝，是由于缺乏凝血因子
  - C. 一次月经出血量约30~50ml
  - D. 正常月经周期是28~30天加減3天
  - E. 经血中含有子宫内膜碎片、宫颈黏液及脱落的阴道细胞
- 正确答案：B      您选择的答案：

- 第43题 卵巢内类固醇激素合成的途径为
- A. 胆固醇 孕激素 雄激素 雌激素
  - B. 胆固醇 孕激素 雌激素 雄激素
  - C. 胆固醇 雄激素 雌激素 孕激素
  - D. 胆固醇 雌激素 雄激素 孕激素
  - E. 胆固醇 雄激素 孕激素 雌激素
- 正确答案：A      您选择的答案：

- 第44题 关于卵巢的功能，下述何项是错误的
- A. 卵巢分泌雌孕激素和雄激素
  - B. 新生儿的卵巢内含有10万多个原始 卵泡
  - C. 妇女一生中有400个左右卵泡发育成熟而排卵
  - D. 卵巢每月有数个卵泡发育，但只有一个卵泡发育成熟排卵
  - E. 青春期有排卵并有月经来潮
- 正确答案：E      您选择的答案：

- 第45题 性激素的合成与分泌，下述何项正确的
- A. 孕激素是雌激素和雄激素的前身
  - B. 雌酮是雌二醇的前身
  - C. 雄激素主要来源于卵巢门
  - D. 排卵后的黄体只分泌孕激素
  - E. 排卵前卵泡内膜细胞分泌雌激素和少量孕激素
- 正确答案：A      您选择的答案：

- 第46题 子宫内膜厚达10mm，间质非常疏松、水肿、螺旋小动脉迅速增长超出内膜的厚度，也更弯曲，同时血管管腔也扩大，此现象是发生在
- A. 子宫内膜增生期早期
  - B. 子宫内膜增生期中期
  - C. 子宫内膜增生期晚期
  - D. 子宫内膜分泌期早期
  - E. 子宫内膜分泌期晚期
- 正确答案：E      您选择的答案：

- 第47题 下列哪项是青春期开始的重要标志
- A. 出现周期性排卵
  - B. 第一次来月经
  - C. 卵泡开始发育
  - D. 第二性征开始出现
  - E. 体格发育第二高峰出现
- 正确答案：B      您选择的答案：

- 第48题 下列哪项不是孕激素的作用
- A. 促进乳腺腺管发育成熟
  - B. 促进宫颈口闭合，减少黏液分泌
  - C. 抑制输卵管肌节律性收缩的振幅
  - D. 增强子宫平滑肌对宫缩剂的敏感性
  - E. 负反馈作用于下丘脑-垂体引起促性腺激素降低
- 正确答案：D      您选择的答案：

- 第49题 下列哪项不是前列腺素的生理作用
- A. 抗早孕和避孕作用
  - B. 促进卵泡发育、排卵和激素分泌
  - C. PGF<sub>2d</sub>引起子宫平滑肌松弛，缓解痛经
  - D. 诱导下丘脑-垂体释放GnRH-Gn
  - E. 溶黄体作用，促进子宫内膜血管收缩，诱导月经来潮
- 正确答案：C      您选择的答案：

- 第50题 有关卵巢周期性变化，下列哪项是错误的

A. 卵泡发育到一定程度自行退化, 称为卵泡闭锁  
B. 每一次月经周期中, 只有一个卵泡发育成熟  
C. 排卵多发生在下次月经来潮前14天左右  
D. 排卵后9~10天黄体开始萎缩  
E. 萎缩衰退后1~2周细胞变性形成白体  
正确答案: E 您选择的答案:

第51题 围绝经期的特点中下列哪项是正确的  
A. 围绝经期就是绝经期  
B. 围绝经期卵巢中卵泡已近耗尽  
C. 围绝经期是有排卵功能失调性子宫出血的好发时期  
D. 围绝经期一般在55岁以上  
E. 围绝经期是恶性肿瘤的好发时期  
正确答案: B 您选择的答案:

第52题 下列哪项属于孕激素的生理作用  
A. 使增生期子宫内膜转化为分泌期内膜  
B. 促使子宫发育及肌层变厚  
C. 使乳腺腺管增生  
D. 促使阴道上皮细胞增生、角化  
E. 促使钠、水潴留  
正确答案: A 您选择的答案:

第53题 下列哪项不是雄激素的作用  
A. 参与女性青春期发育调节  
B. 参与女性阴毛发育的调节  
C. 参与女性代谢功能的调节  
D. 参与女性性功能的调节  
E. 抑制阴蒂、阴唇和阴阜的发育  
正确答案: E 您选择的答案:

第54题 关于性周期的描述下列哪项是错误的  
A. 月经是子宫内膜周期性变化的临床表现  
B. 子宫内膜的周期性变化受卵巢的影响  
C. 卵巢的周期性变化直接受垂体、下丘脑的控制  
D. 孕激素对下丘脑产生正负反馈调节  
E. 雌激素对下丘脑产生正负反馈调节  
正确答案: D 您选择的答案:

第55题 排卵性月经周期雌激素分泌高峰分别出现于  
A. 卵泡早期  
B. 排卵期  
C. 黄体中期  
D. 黄体期  
E. 围排卵期和黄体中期  
正确答案: E 您选择的答案:

第56题 下列哪项不是雌激素的作用  
A. 促进子宫内膜增生  
B. 促进骨骼闭合  
C. 促进钠、水排泄  
D. 促进第二性征发育  
E. 促进子宫、子宫颈和输卵管的发育  
正确答案: C 您选择的答案:

第57题 关于月经的特点下述何项是正确的  
A. 有排卵才有月经  
B. 排卵发生在两次月经之间  
C. 月经期基础体温是上升的  
D. 排卵发生在下次月经来潮前14天  
E. 排卵发生在月经来潮后第14天  
正确答案: D 您选择的答案:

第58题 关于卵巢黄体的形成与萎缩, 以下哪项是错误的  
A. 排卵后, 卵泡壁塌陷, 卵泡膜血管壁破裂, 血液流入腔内凝成血块称为血体  
B. 排卵后7~8天, 黄体发育达高峰  
C. 排卵后9~10天, 黄体开始萎缩, 黄体期平均14天  
D. 黄体萎缩后月经来潮  
E. 黄体萎缩完成其退化的全过程约为2~3周, 细胞变性, 组织纤维化, 称为白体  
正确答案: E 您选择的答案:

第59题 促进排卵和黄体生成的激素为  
A. FSH  
B. LH  
C. PRL  
D. PG  
E. GnRH  
正确答案: B 您选择的答案:

第60题 月经周期中正反馈作用于下丘脑-垂体系统的激素为

- A. 雌激素
- B. 孕激素
- C. 雄激素
- D. 前列腺素
- E. 促性腺激素

正确答案：A 您选择的答案：

第61题 关于性激素的作用机制下，下述何项是错误的

- A. 雌二醇是雌激素中生物活性最高的一种
- B. 雌激素的大部分与血浆蛋白结合，小部为游离状态产生生物活性，二者之间处于动态平衡
- C. 雌激素与胞浆受体结合后才能发挥生理作用

- D. 雌激素使孕激素受体含量升高
- E. 孕激素使雌激素受体含量升高

正确答案：E 您选择的答案：

第62题 关于激素的代谢下列哪项是正确的

- A. 卵巢主要合成雌酮和雌二醇
- B. 雌酮是雌二醇的降解产物
- C. 雌三醇由雌酮降解而来
- D. 卵巢分泌的孕激素主要为孕二醇
- E. 孕二醇的降解产物是孕酮

正确答案：C 您选择的答案：

第63题 下列哪项是雌激素的作用

- A. 促进阴道上皮脱落
- B. 促进宫颈黏液的分泌
- C. 促进增生内膜分泌化
- D. 降低子宫平滑肌对宫缩剂的敏感性
- E. 兴奋下丘脑体温中枢引起体温升高

正确答案：B 您选择的答案：

第64题 正常黄体期为

- A. 6天
- B. 8天
- C. 10天
- D. 12天
- E. 14天

正确答案：E 您选择的答案：

第65题 造成宫颈粘液涂片干后镜下见羊齿状结晶的激素是

- A. 雌激素
- B. 孕激素
- C. 雄激素
- D. 催乳激素
- E. 甲状腺素

正确答案：A 您选择的答案：

第66题 下列哪项属于雌激素的生理作用

- A. 降低妊娠子宫对缩宫素的敏感性
- B. 使子宫内膜增生
- C. 使宫颈粘液减少，变稠，拉丝度减少
- D. 使阴道上皮细胞脱落加快
- E. 通过中枢神经系统产生升温作用

正确答案：B 您选择的答案：

第67题 排卵性月经周期孕激素分泌高峰出现于

- A. 卵泡早期
- B. 卵泡晚期
- C. 排卵期
- D. 黄体早期
- E. 黄体中期

正确答案：E 您选择的答案：

第68题 卵巢功能检查不包括

- A. 基础体温测定
- B. 生殖内分泌激素测定
- C. B超检查
- D. 子宫内膜病理检查
- E. X线检查

正确答案：E 您选择的答案：

第69题 关于雄激素，下述何项是错误的

- A. 肾上腺皮质是产生女性雄激素的主要来源
- B. 雄激素是合成雌激素的前体
- C. 雄激素不是维持女性生殖功能的激素
- D. 雄激素在维持女性阴毛、腋毛中起一定的作用
- E. 雄激素在青春期的体格发育过程中有一定影响

正确答案：C 您选择的答案：

第70题 宫颈粘液开始出现羊齿状结晶，相当于月经周期的

- A. 第6~7天
- B. 第9~10天
- C. 第12~13天
- D. 第15~16天
- E. 第18~19天

正确答案：A 您选择的答案：

第71题 下列哪一项是孕激素的生理作用

- A. 增强子宫收缩力，增强子宫平滑肌对催产素的敏感性
- B. 使宫颈口闭合、黏液减少，变稠，拉丝度减少
- C. 使阴道上皮增生和角化
- D. 使乳腺管增生，乳头、乳晕着色
- E. 加强输卵管节律性收缩的振幅

正确答案：B 您选择的答案：

第72题 关于子宫内膜在月经周期中的变化下列哪项是错误的

- A. 子宫内膜有功能层和基底层
- B. 功能层受卵巢激素影响而呈周期性变化
- C. 基底层是孕卵种植的部位
- D. 雌激素使子宫内膜呈增生期改变
- E. 孕激素使增生期子宫内膜转化为分泌期内膜

正确答案：C 您选择的答案：

第73题 正常月经周期的妇女，宫颈黏液开始出现羊齿状结晶是在

- A. 月经周期第6~7日
- B. 月经周期第8~10日
- C. 月经周期第11~14日
- D. 月经周期第15~18日
- E. 月经周期第19~21日

正确答案：A 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第74题 女，50岁。月经周期紊乱两年，现停经40天，基础体温单相，宫颈粘液羊齿状结晶呈高度影响，此时下列何项为相应的子宫内膜表现

- A. 增生期图像
- B. 分泌期图像
- C. 萎缩图像
- D. 分泌早期图像
- E. 增生过长图像

正确答案：E 您选择的答案：

第75题 女，50岁，月经周期紊乱两年，现停经40天，基础体温单相，宫颈粘液羊齿状结晶呈高度影响，此时下列哪一项为相应的子宫内膜表现

- A. 增生期图像
- B. 分泌期图像
- C. 萎缩期图像
- D. 分泌早期图像
- E. 增生过长图像

正确答案：E 您选择的答案：

第76题 女，26岁。结婚3年未孕，月经周期素来规则而正常，作宫颈粘液涂片检查，见大量椭圆体结晶，判断此时应为月经周期的第几天

- A. 第3~5天
- B. 第10~12天
- C. 第14~15天
- D. 第18~20天
- E. 第22~27天

正确答案：E 您选择的答案：

第77题 女，29岁，子宫内膜病理检查显示：子宫内膜腺上皮细胞底部出现糖原小泡，相当于子宫内膜周期中哪一期

- A. 排卵期
- B. 分泌早期
- C. 分泌晚期
- D. 月经前期
- E. 月经期

正确答案：B 您选择的答案：

第78题 女，27岁。结婚2年未孕(不分居)，未避孕，作为了解卵巢功能的一个方法，决定作阴道组织学涂片检查，医生在考虑采样和分析结果时，下列何项考虑不对

- A. 阴道粘膜受雌孕激素的变化而改变
- B. 阴道粘膜的变化在阴道中1/3处最明显
- C. 排卵前在雌激素作用下增生，角化
- D. 排卵前阴道细胞富含糖原，并被阴道杆菌分解而呈酸性
- E. 排卵后在孕激素作用下上皮细胞大量脱落

正确答案：B 您选择的答案：

第79题 一35岁妇女因不规则阴道流血行刮宫检查，病理诊断为分泌期晚期，下列哪项错误

- A. 子宫内膜厚达10mm并呈海绵状
- B. 内膜腺体开口面向宫腔，有糖原溢出
- C. 细胞内的糖原溢出腺体称顶浆分泌
- D. 表面上皮下的间质分化为肥大的蜕膜样细胞
- E. 螺旋小动脉迅速增长超出内膜厚度

正确答案：C 您选择的答案：

第80题 妇女，32岁，14岁初潮，月经周期34天，预测排卵期大约在周期的哪一天

- A. 第14天
- B. 第15天
- C. 第16天
- D. 第20天
- E. 第24天

正确答案：D 您选择的答案：

第81题 女，27岁，结婚2年未孕(同居、未避孕)。作为了解排卵功能的一个方法，决定做阴道细胞学涂片检查，医生在考虑采样和分析结果时，下列哪项是错误的

- A. 阴道黏膜受雌孕激素的变化而改变
- B. 阴道黏膜的变化在阴道中1/3处最明显
- C. 排卵前在雌激素作用下增生角化
- D. 排卵前阴道细胞富含糖原，并被阴道杆菌分解而呈酸性
- E. 排卵后在孕激素作用下上皮细胞大量脱落

正确答案：B 您选择的答案：

三、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第82-84题

女，45岁，既往月经正常，近一年来经期延长10~15天，量多，此次停经50天，后有阴道出血20天，血红蛋白80g/L，盆腔检查(-)，基础体温单相

1. 为排除宫体癌应该进行下列何项辅助诊断

- A. CA125测定
- B. 腹腔镜检查并作活检
- C. 分段诊刮并送病理
- D. 超声检查
- E. 子宫输卵管造影

2. 如通过检查排除宫体癌后，应考虑为

- A. 子宫粘膜下肌瘤
- B. 子宫内膜炎
- C. 子宫内膜息肉
- D. 无排卵型功血
- E. 排卵型功血

3. 对该病人最佳治疗方案是

- A. 雌激素周期疗法，以调整周期
- B. 雌-孕激素联合周期治疗
- C. 促排卵药以调整周期
- D. 雌-孕激素序贯疗法
- E. 月经周期后半期应用孕激素

正确答案：CDE 您选择的答案：

四、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第85-89题

- A. 经前诊刮子宫内膜呈分泌反应不良
- B. 月经期第5天诊刮子宫内膜为混合型
- C. 经前诊刮子宫内膜呈增生型
- D. 经前诊刮子宫内膜呈分泌型
- E. 子宫内膜为蜕膜

- 1. 无排卵型功血
- 2. 黄体功能不全
- 3. 早孕
- 4. 有排卵正常月经
- 5. 黄体萎缩不全或称子宫内膜不规则脱落

正确答案：CAEDB 您选择的答案：

第90-92题

- A. 卵泡刺激素
- B. 黄体生成激素
- C. 雌激素
- D. 孕激素
- E. 泌乳素

- 1. 卵泡早期分泌量少，其后逐渐增高，排卵前达高峰，以后降低，黄体期再度增高
- 2. 卵泡前半期分泌量少，以后逐步上升，排卵前24小时迅速升高出现分泌陡峰，24小时后骤降，黄体期维持低水平
- 3. 卵泡早期血含量甚微，排卵后分泌量开始增加，排卵后7~8天分泌量达最高峰，以后逐渐下降

正确答案：CBD 您选择的答案：



第93-95题

- A. FSH
- B. LH
- C. 雌激素
- D. 孕激素
- E. 雄激素

1. 使宫颈口松弛，宫颈黏液分泌量增加，质变稀薄，易拉成丝状
2. 使宫颈口闭合，黏液变少、变稠，拉丝度减少
3. 由垂体产生，在其作用下卵巢内每月均有一些原始卵泡发育

正确答案：CDA 您选择的答案：

第96-98题

- A. 颗粒细胞
- B. 放射冠
- C. 卵泡外膜
- D. 卵泡内膜
- E. 卵丘

1. 血管丰富，细胞呈多边形，较颗粒细胞大
2. 无血管存在，细胞呈立方形，营养来自外围细胞
3. 突出于卵泡腔，卵细胞深藏其中

正确答案：DAE 您选择的答案：

第99-100题

- A. 使阴道上皮细胞增生角化
- B. 使阴道上皮细胞脱落加快
- C. 促进阴毛和腋毛的生长
- D. 使卵泡开始发育
- E. 促黄体形态变化

1. 孕激素
2. 雌激素

正确答案：BA 您选择的答案：

第101-103题

- A. 使阴道上皮细胞增生角化
- B. 使阴道上皮细胞脱落加快
- C. 促进阴毛与腋毛的生长
- D. 能直接控制卵巢的周期性变化
- E. 刺激泌乳

1. 雄激素
2. 孕激素
3. 雌激素

正确答案：CBA 您选择的答案：

习题集 妇产科学 妊娠生理

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 下列哪一项检测结果表明胎儿或胎儿器官已成熟

- A. B超测得胎头双顶径值为8cm
- B. 羊水中卵磷脂 / 鞘磷脂为1.8
- C. 羊水中肌酐值为180 $\mu$ mol / L
- D. 羊水中胆红素类物质值为0.05
- E. 羊水中淀粉酶值为400U / L

正确答案：C 您选择的答案：

第2题 下列哪项不是妊娠期正常乳房变化

- A. 乳房增大，充血明显
- B. 乳头增大变黑，易勃起
- C. 乳房较坚硬，可触及肿块，是乳汁淤积所致
- D. 孕妇自觉乳房发胀或偶有刺痛，浅静脉明显可见
- E. 乳晕变黑，外围有散在的结节状小隆起，称为蒙氏结节

正确答案：C 您选择的答案：

第3题 妊娠期易患右侧急性肾盂肾炎的机制，下列哪项是错误的

- A. 右侧输尿管受右旋子宫压迫
- B. 输尿管增粗、蠕动减弱，尿流缓慢
- C. 妊娠中期以后肾盂及输尿管呈轻度扩张
- D. 受雌激素影响泌尿系统平滑肌张力降低
- E. 妊娠期尿中葡萄糖含量增加，有利于细菌生长

正确答案：D 您选择的答案：

第4题 正常妊娠期间泌尿系统的改变，哪项是正确的

- A. 仰卧位尿量减少
- B. 夜尿量少于日尿量
- C. 肾血流量增加，肾小球滤过率增加
- D. 孕妇易患肾盂肾炎，以左侧多见
- E. 肾小管对葡萄糖的再吸收能力与肾小球滤过率相应增加

正确答案：C 您选择的答案：

第5题 关于受精卵的发育，下述哪项是正确的

- A. 受精卵在受精后2日分裂成囊胚
- B. 受精卵第4日进宫腔，第5日开始着床
- C. 子宫内膜发生蜕膜变化后受精卵方能着床
- D. 蜕膜不参与胎盘构成
- E. 与卵子相遇时的精子已经是获能精子，而卵子也已是次级卵母细胞

正确答案：E 您选择的答案：

第6题 脐带中的脐动脉有

- A. 5根
- B. 4根
- C. 3根
- D. 2根
- E. 1根

正确答案：D 您选择的答案：

第7题 孕妇血容量达高峰的时间是

- A. 孕12~19周
- B. 孕20~28周
- C. 孕28~30周
- D. 孕32~34周
- E. 孕38~40周

正确答案：D 您选择的答案：

第8题 关于正常脐带下列哪项是错误的

- A. 常呈螺旋迂曲状
- B. 血管周围为华通氏胶
- C. 脐带受压可导致胎儿缺氧
- D. 断面可见2条脐静脉、1条脐动脉
- E. 一端连于胎儿腹壁脐轮，另一端附于胎盘胎儿面

正确答案：D 您选择的答案：

第9题 垂体分泌的激素在妊娠期增加的有

- A. 促性腺激素
- B. 垂体生乳素
- C. 促甲状腺素
- D. 生长素
- E. 促肾上腺皮质激素

正确答案：B 您选择的答案：

第10题 一妇女正常阴道分娩刚结束，检查脐带时符合下列哪种情况才正确

- A. 一条脐动脉，二条脐静脉

- B. 二条脐动脉，一条脐静脉
  - C. 一条脐静脉，一条脐动脉
  - D. 二条脐静脉，二条脐动脉
  - E. 一条脐动脉，三条脐静脉
- 正确答案：B 您选择的答案：

第11题 妊娠早期卵巢变化的特征是

- A. 妊娠期间卵巢仍可排卵
  - B. 卵巢不断增大，黄体持续发育
  - C. 妊娠黄体在妊娠8周时开始萎缩
  - D. 孕12周后由胎盘取代妊娠黄体功能
  - E. 妊娠10周前，妊娠黄体产生雌、孕激素维持妊娠
- 正确答案：E 您选择的答案：

第12题 尿妊娠试验用于下述哪项诊断容易失败

- A. 早期妊娠
- B. 过期妊娠
- C. 宫外孕
- D. 先兆流产
- E. 葡萄胎

正确答案：B 您选择的答案：

第13题 关于妊娠期外阴、阴道的变化，下列哪项不正确

- A. 外阴部充血，皮肤增厚
  - B. 阴道脱落细胞增加，分泌物增多呈白色糊状
  - C. 阴道pH值降低，有利于，致病菌生长而易感染
  - D. 阴道黏膜充血、水肿呈紫蓝色，皱襞增加，伸展性增加
  - E. 大小阴唇色素沉着，大阴唇内血管增多及结缔组织变松软
- 正确答案：C 您选择的答案：

第14题 母体子宫动脉的血氧分压为

- A. 85~100mmHg
- B. 95~100mmHg
- C. 70~90mmHg
- D. 60~80mmHg
- E. 40mmHg

正确答案：B 您选择的答案：

第15题 关于妊娠期母体内分泌系统的变化正确的是

- A. 腺垂体不增大
- B. 促黑素细胞激素减少
- C. 甲状腺功能低下
- D. 皮质醇轻度减少
- E. 垂体催乳激素增多

正确答案：E 您选择的答案：

第16题 关于妊娠期循环系统的生理改变，下列哪项是错误的

- A. 孕妇心电图常出现电轴左偏
  - B. 多数孕妇心尖区可闻及1/6~2/6级柔和吹风样舒张期杂音，产后逐渐消失
  - C. 妊娠32周时心排量达高峰
  - D. 孕妇若长时间仰卧，能引起回心血量减少，心排量随之而减少使血压下降，称仰卧位低血压
  - E. 孕妇下肢、外阴及直肠静脉压增高，容易发生下肢、外阴静脉曲张和痔
- 正确答案：B 您选择的答案：

第17题 关于胎儿脐带血管氧含量，下列哪项是错误的

- A. 脐静脉含氧量较高
- B. 胎儿下腔静脉血为混合血
- C. 脐动脉含氧量最高
- D. 胎儿主动脉氧含量较少
- E. 胎儿肺静脉氧含量较少

正确答案：C 您选择的答案：

第18题 乳汁形成与分泌的机制，下列哪项是错误

- A. 雌激素促进乳腺管发育，孕激素刺激乳腺泡发育
- B. 大量雌激素抑制乳汁生成
- C. 催乳素在产后是促使乳汁排出的主要激素
- D. 大量孕激素抑制乳汁生成
- E. 催产素是产后促使乳汁排出的主要激素

正确答案：E 您选择的答案：

第19题 绒毛膜促性腺激素的分泌量达高峰的时间

- A. 停经11~15天
- B. 停经8~10周
- C. 妊娠16周
- D. 妊娠32~34周
- E. 临产时

正确答案：B 您选择的答案：

第20题 下述哪项产生绒毛膜促性腺激素

- A. 蜕膜

- B 羊膜
- C 合体滋养细胞
- D 细胞滋养细胞
- E 以上均不是

正确答案：C 您选择的答案：

第21题 孕妇尿中与胎儿胎盘单位功能关系密切的激素是

- A 雌酮
- B 雌二醇
- C 雌三醇
- D 孕酮
- E 睾酮

正确答案：C 您选择的答案：

第22题 关于羊水的叙述，下列哪项正确

- A 在羊膜腔内静止不动
- B 中性偏酸
- C 若含肌酐应视为病态
- D 妊娠38周时羊水量最多
- E 羊水于妊娠末期呈无色透明

正确答案：D 您选择的答案：

第23题 关于胎膜的描述，下述哪项是错误的

- A 胎膜由绒毛膜与羊膜组成
- B 妊娠14周末羊膜腔占据整个子宫腔，并随妊娠进展逐渐增大
- C 平滑绒毛膜至妊娠晚期与羊膜相贴，不能与羊膜完全分开
- D 胎膜的内层为羊膜
- E 胎膜与胎盘激素代谢有关

正确答案：C 您选择的答案：

第24题 妊娠期乳腺的生理变化，下列哪项正确

- A 胎盘分泌雌激素刺激腺泡发育
- B 胎盘分泌孕激素刺激腺管发育
- C 乳腺发育只需泌乳素的作用
- D 妊娠期直至胎儿娩出前，挤压乳房不应有乳汁溢出
- E 妊娠晚期无乳汁分泌与母体雌、孕激素水平高有关

正确答案：E 您选择的答案：

第25题 绒毛膜促性腺激素(HCG)于妊娠期间分泌量达高峰的时间是

- A 妊娠5~7周
- B 妊娠8~10周
- C 妊娠11~13周
- D 妊娠14~15周
- E 妊娠17~19周

正确答案：B 您选择的答案：

第26题 关于羊水的功能错误的是

- A 使胎儿在宫内不受挤压
- B 防止胎体畸形
- C 防止肢体粘连
- D 保持恒温
- E 保持一定量羊水的相对恒定

正确答案：E 您选择的答案：

第27题 妊娠期子宫的变化，正确的是

- A 妊娠足月，子宫容量约5000ml
- B 妊娠足月，子宫重约500g
- C 子宫肌细胞于早期增生，数目增多
- D 子宫下段临产时，伸展至5~10cm
- E 子宫下段孕后期增长速度最快

正确答案：A 您选择的答案：

第28题 关于羊水的叙述正确的是

- A 胎儿尿液是孕早期羊水的主要来源
- B 妊娠中期以后羊水主要由母体血清经胎膜进入羊膜腔的透析液形成
- C 胎儿的消化道是吸收羊水的重要部位
- D 脐带华通胶不能吸收羊水
- E 妊娠中期以后，羊水逐渐变为高渗

正确答案：C 您选择的答案：

第29题 关于妊娠期母体生殖系统的变化错误的是

- A 妊娠早期，子宫呈球型
- B 妊娠12~14周，子宫出现不规则无痛性收缩称BraxtonHicks收缩
- C 接近临产时，宫颈管变短并出现轻度扩张
- D 妊娠期阴道粘膜变软
- E 妊娠期间有乳汁分泌

正确答案：E 您选择的答案：

第30题 于妊娠期血液系统的变化，下列哪项是错误的

- A 妊娠期处于高凝状态

- B. 妊娠期出现血液稀释
  - C. 孕妇红细胞沉降率减慢
  - D. 妊娠期间纤溶活性降低
  - E. 妊娠期血容量增加，于32~34周达高峰
- 正确答案：C      您选择的答案：

第31题 关于妊娠期母体血液变化错误的是

- A. 妊娠32~34周，血容量增加达高峰
- B. 血容量约增加30%~45%
- C. 血浆增加多于红细胞增加
- D. 血容量于妊娠8~10周开始增加
- E. 血浆约增加1000ml

正确答案：D      您选择的答案：

第32题 妊娠子宫颈的变化，下列哪项是错误的

- A. 妊娠早期宫颈肥大
- B. 宫颈呈紫蓝色，并变软
- C. 接近临产时宫颈管变短，并出现轻度扩张
- D. 宫颈鳞柱上皮交接部内移，出现假性糜烂
- E. 宫颈管内腺体肥大，宫颈黏液分泌形成黏液栓

正确答案：D      您选择的答案：

第33题 绒毛膜促性腺激素的作用

- A. 使绒毛发生水泡样变
- B. 刺激毛发生长发育
- C. 刺激雌激素分泌
- D. 促进胎儿生长发育
- E. 维持妊娠黄体

正确答案：E      您选择的答案：

第34题 妊娠期不参与母体乳腺发育的激素有

- A. 雌激素
- B. 孕激素
- C. 促性腺激素释放激素
- D. 甲状腺素
- E. 垂体催乳激素

正确答案：C      您选择的答案：

第35题 关于羊水错误的是

- A. 妊娠早期的羊水，主要是母体血清经胎膜进入羊膜腔的透析液
- B. 胎膜、胎儿消化道吸收羊水
- C. 妊娠足月羊水含有胎脂、胎儿脱落上皮细胞、毳毛、少量白细胞等
- D. 羊水呈弱酸性
- E. 羊水的功能为保护胎儿与母体

正确答案：D      您选择的答案：

第36题 有关妊娠期凝血因子的变化，下述哪项是错误的

- A. 血小板计数增加
- B. 红细胞沉降率增加
- C. 凝血因子Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅷ、Ⅸ均增加
- D. 凝血因子Ⅹ降低
- E. 血浆纤维蛋白原含量比非孕妇女增加40~50%

正确答案：A      您选择的答案：

第37题 直接与母血接触的是

- A. 细胞滋养细胞
- B. 合体滋养细胞
- C. 绒毛中的血管壁
- D. 绒毛间质
- E. 基底膜

正确答案：B      您选择的答案：

第38题 下列哪项不是妊娠期子宫变化

- A. 妊娠之初，子宫增大以前后径为最明显
- B. 早期妊娠，子宫峡部变软最显著
- C. 妊娠后期，子宫大多有不同程度右旋
- D. 妊娠中期引起子宫肌壁逐渐增厚直至足月
- E. 足月妊娠时子宫下段可伸长至7~10cm

正确答案：D      您选择的答案：

第39题 关于胎盘的功能，下列哪项是错误的

- A. 防御功能
- B. 产生羊水
- C. 合成激素和酶
- D. 排除胎儿代谢产物
- E. 胎儿营养物质的供应及母儿气体交换

正确答案：B      您选择的答案：

第40题 关于胎盘的描述，下述哪项是错误的

- A. 胎盘由羊膜、叶状绒毛膜、真蜕膜构成

- B. 叶状绒毛膜构成胎盘的胎儿部分
  - C. 胎盘的主要结构为绒毛
  - D. 包蜕膜不参与胎盘构成
  - E. 胎盘分为母体面与子体面
- 正确答案：A      您选择的答案：

第41题 正常妊娠期间肾功能应有下列哪项变化(较非孕时)

- A. 肾血流量增加，肾小球滤过率增加
  - B. 肾血流量增加，肾小球滤过率不变
  - C. 肾血流量不变，肾小球滤过率增加
  - D. 肾血流量不变，肾小球滤过率略降低
  - E. 肾血流量减少，肾小球滤过率增加
- 正确答案：A      您选择的答案：

第42题 卵子从卵巢排出后，正常受精部位在

- A. 输卵管峡部
  - B. 输卵管峡部与壶腹部连接处
  - C. 输卵管伞部
  - D. 输卵管间质部
  - E. 子宫腔
- 正确答案：B      您选择的答案：

第43题 关于妊娠期内分泌系统的变化，下列哪项是错误的

- A. 脑垂体增加
  - B. 大量雌激素促使卵泡发育，但无成熟排卵
  - C. 垂体生乳素随妊娠进展而增加，到分娩前达到高峰
  - D. 胎盘分泌大量雌、孕激素对丘脑下部及脑垂体产生负反馈作用，促性腺激素分泌减少
  - E. 由于胎盘的功能和胎儿肝脏以及肾上腺的作用雌三醇大量合成
- 正确答案：B      您选择的答案：

第44题 卵子自卵巢排出后，正常受精部位在

- A. 输卵管峡部
  - B. 输卵管峡部与壶腹部连接处
  - C. 输卵管伞部
  - D. 输卵管间质部
  - E. 子宫腔
- 正确答案：B      您选择的答案：

第45题 晚期囊胚透明带消失后，相当于受精后第几日开始着床

- A. 2~3天
  - B. 4~5天
  - C. 6~7天
  - D. 8~9天
  - E. 10~11天
- 正确答案：C      您选择的答案：

第46题 孕妇血容量增加达高峰的时间是

- A. 孕12~19周
  - B. 孕20~28周
  - C. 孕28~30周
  - D. 孕32~34周
  - E. 孕36~38周
- 正确答案：D      您选择的答案：

第47题 下列哪项不是受精卵着床的必备条件

- A. 透明带消失
  - B. 合体滋养细胞形成
  - C. 子宫内膜蜕膜变
  - D. 囊胚和子宫内膜的发育必须同步
  - E. 有足量的孕酮支持
- 正确答案：C      您选择的答案：

第48题 临床常用的诊断早期妊娠的特异性指标是

- A. HCGa
  - B. HCGp
  - C. HCG
  - D. HPL
  - E. PSpI G
- 正确答案：B      您选择的答案：

第49题 受精后第几天，晚期囊胚透明带消失之后开始着床

- A. 第3天
  - B. 第4天
  - C. 第5~6天
  - D. 第6~7天
  - E. 第8~10天
- 正确答案：D      您选择的答案：

第50题 胎盘的组成包括

- A. 羊膜、包蜕膜、底蜕膜

- B. 羊膜、底蜕膜、真蜕膜
  - C. 包蜕膜、底蜕膜、真蜕膜
  - D. 羊膜、叶状绒毛膜、真蜕膜
  - E. 羊膜、叶状绒毛膜、底蜕膜
- 正确答案：E 您选择的答案：

第51题 关于受精的叙述，下列哪项正确

- A. 卵子停留在输卵管峡部等待受精
  - B. 精子获能的主要部位是阴道
  - C. 精子与卵子相遇时发生顶体反应
  - D. 精子与卵子相遇，标志受精过程已开始
  - E. 精原核与卵原核相融合，标志受精过程即将完成
- 正确答案：C 您选择的答案：

第52题 妊娠期母体心脏的变化错误的是

- A. 心脏容量从孕早期至末期约增加10%
  - B. 心率于孕晚期约增加10~15次
  - C. 心尖部可闻及 ~ 级柔和吹风样收缩期杂音
  - D. 心电图出现轴左偏
  - E. 心脏向左下移位
- 正确答案：E 您选择的答案：

第53题 绒毛膜促性腺激素的作用是

- A. 使绒毛发生水泡样变
  - B. 刺激毛发生长
  - C. 促进胎儿生长发育
  - D. 刺激雌激素分泌
  - E. 维持妊娠黄体
- 正确答案：E 您选择的答案：

第54题 妊娠早期卵巢变化的特征是

- A. 卵巢不断增大，黄体持续发育
  - B. 卵巢滤泡囊肿维持
  - C. 双侧卵巢黄体囊肿存在
  - D. 双侧卵巢妊娠黄体形成
  - E. 妊娠黄体功能在孕10周后由胎盘取代
- 正确答案：E 您选择的答案：

第55题 妊娠后半期羊水的重要来源是

- A. 羊膜的透析
  - B. 胎儿皮肤的透析
  - C. 胎儿呼吸道粘膜的透析
  - D. 胎儿尿液
  - E. 脐带表面的透析
- 正确答案：D 您选择的答案：

第56题 正常妊娠38周的羊水量约为

- A. 600ml
  - B. 800ml
  - C. 1000ml
  - D. 1200ml
  - E. 1500ml
- 正确答案：C 您选择的答案：

第57题 关于妊娠期母体泌尿系统的变化正确的是

- A. 肾小管对葡萄糖再吸收能力相应增加
  - B. 夜尿量少于日尿量
  - C. 泌尿系统平滑肌张力降低
  - D. 输尿管蠕动增加
  - E. 孕妇易患急性左肾盂肾炎
- 正确答案：C 您选择的答案：

第58题 关于妊娠子宫血液供应，下列哪项是错误的

- A. 随着妊娠进展，子宫动脉及子宫胎盘血管床阻力越来越低
  - B. 妊娠晚期左侧卧位子宫胎盘血流供应最好
  - C. 子宫收缩时子宫血流量减少
  - D. 妊娠期间子宫动脉血流在舒张末期亦不断地向前流
  - E. 剖宫术前麻醉情况下，由于子宫呈松弛状态因而子宫血流量并不减少
- 正确答案：E 您选择的答案：

第59题 关于滋养层发育正确的是

- A. 滋养层外层是细胞滋养细胞
  - B. 细胞滋养细胞是由合体滋养细胞分化而来的
  - C. 合体滋养细胞是分裂生长的细胞
  - D. 细胞滋养细胞是执行功能的细胞
  - E. 滋养层内层为基底膜，有胎盘屏障作用
- 正确答案：E 您选择的答案：

第60题 关于妊娠期子宫及其变化的描述错误的是

- A. 孕卵着床后，子宫内膜因受孕激素的影响而发生蜕膜变

- B. 妊娠后期子宫多有不同程度的右旋  
C. 妊娠后期子宫体部增长最快  
D. 妊娠中期开始, 子宫峡部伸展变长, 逐渐形成子宫下段  
E. 子宫的血流量在妊娠后期受体位的影响  
正确答案: C 您选择的答案:

第61题 孕妇妊娠后期子宫的哪一部分增长速度最慢

- A. 子宫底部  
B. 子宫体部  
C. 子宫下段  
D. 子宫颈  
E. 子宫各部的增长速度基本相同  
正确答案: D 您选择的答案:

第62题 关于绒毛膜促性腺激素正确的是

- A. 由绒毛细胞滋养细胞产生  
B. 分子量约为5万  
C. 有与黄体生成激素相似的生物活性  
D. 为糖蛋白激素, 糖分子量占70%  
E. 至妊娠14~16天达高峰, 持续1~2周后下降  
正确答案: C 您选择的答案:

第63题 胎盘合成的激素中, 哪一种含有特异性 $\beta$ 亚基

- A. 胎盘激素  
B. 绒毛膜促性腺激素  
C. 雌激素  
D. 孕激素  
E. 绒毛膜促甲状腺素  
正确答案: B 您选择的答案:

第64题 妊娠期乳腺的生理变化, 下列哪项正确

- A. 胎盘分泌雌激素刺激腺泡发育  
B. 胎盘分泌孕激素刺激腺管发育  
C. 乳腺发育只需泌乳素的作用  
D. 妊娠期无乳汁分泌与雌、孕激素水平高有关  
E. 妊娠期直至胎儿娩出前, 挤压乳房不应有乳汁分泌  
正确答案: D 您选择的答案:

第65题 下列哪项不是受精卵着床的条件

- A. 透明带消失  
B. 滋养细胞分化出合体滋养细胞  
C. 囊胚与子宫内膜必须同步发育  
D. 必须有足够的孕酮  
E. 子宫内膜发生蜕膜变  
正确答案: E 您选择的答案:

第66题 关于胎膜的叙述错误的是

- A. 胎膜含甾体激素代谢所需的多种酶活性  
B. 含多量花生四烯酸的磷脂  
C. 含催化磷脂生成游离花生四烯酸的溶酶体  
D. 胎膜在分娩中起到一定作用  
E. 胎膜与羊膜不能分开  
正确答案: E 您选择的答案:

第67题 了解胎儿成熟度最常用的检查项目是

- A. 检测羊水中卵磷脂/鞘磷脂比值  
B. 检测羊水中肌酐值  
C. 检测羊水中胆红素类物质  
D. 检测羊水中淀粉酶值  
E. B型超声检查胎儿双顶径值  
正确答案: E 您选择的答案:

二、A2型题: 每一道考题是以一个小案例出现的, 其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第68题 女, 29岁, 月经周期28天, 末次月经时间为8月8日, 下列哪项是错误的

- A. 排卵期约在8月22日  
B. 若受孕, 孕卵着床时间约在8月25日  
C. B超可能发现妊娠环的最早日期约在9月12日  
D. B超开始观察到原始心管搏动的时间约在10月4日  
E. 预产期在第二年5月15日  
正确答案: B 您选择的答案:

第69题 女, 26岁。月经规则, 周期为28天, 末次月经为4月1日, 下列哪项是错误的

- A. 排卵期约在4月15日  
B. 若受孕, 孕卵着床时间约在4月18日  
C. B超下可能发现妊娠环的最早日期在5月5日后  
D. B超开始能观察到原始胎儿搏动的时间在5月20日后



E 预产期应在1月8日

正确答案：B 您选择的答案：

第70题 一年轻妇女正常阴道分娩刚结束，检查胎盘和脐带时，应注意符合下列哪种情况才是正常的

- A 一条动脉，一条静脉
- B 一条动脉，二条静脉
- C 二条动脉，一条静脉
- D 二条动脉，二条静脉
- E 以上都不是

正确答案：C 您选择的答案：

第71题 一年轻妇女正常阴道分娩刚结束，检查脐带血管，下列哪项是正确的

- A 一条动脉，一条静脉
- B 一条动脉，两条静脉
- C 两条动脉，一条静脉
- D 两条动脉，两条静脉
- E 以上都不是

正确答案：C 您选择的答案：

第72题 女，停经35天，疑为早孕，下列哪项与之不符

- A 胃脘部略胀，乏力
- B 乳房胀感
- C 检查发现子宫偏软略大
- D B超发现子宫增大，以横径为主
- E 阴道分泌物增多

正确答案：D 您选择的答案：

三、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第73-74题

- A 孕8周
- B 孕16周
- C 孕20周
- D 孕24周
- E 孕28周

1. 胎儿体重 1000g
2. 胎儿身长16cm，体重约100g，外生殖器可确定性别

正确答案：DB 您选择的答案：

第75-77题

- A Hegar征
- B Montgomery结节
- C BraxtonHicks收缩
- D Meigs征
- E 仰卧位低血压综合征

1. 乳头乳晕着色，乳晕上的皮脂腺肥大形成散在的结节状小隆起
2. 孕12~14周起，子宫出现不规则的无痛性收缩
3. 妊娠早期宫颈变软，子宫峡部极软，感觉宫颈与宫体似不相连

正确答案：BCA 您选择的答案：

第78-80题

- A 蒙氏结节
- B Braxton Hicks收缩
- C 蜕膜斑
- D Hegar征
- E 仰卧位低血压综合征

1. 乳晕变黑，乳晕外周的皮脂腺肥大形成散在的结节小隆起
2. 自妊娠12~14周起，子宫出现不规则，无痛性收缩
3. 妊娠期卵巢略增大，停止排卵，卵巢表面呈现小的而散在的不规则红色突起

正确答案：ABC 您选择的答案：

第81-82题

- A Hegar征
- B 蜕膜斑
- C Montgomery结节
- D Braxton Hicks收缩
- E 仰卧位低血压综合征

1. 乳头乳晕着色，乳晕上皮脂腺肥大形成一个个小隆起
2. 孕12~14周起，子宫出现不规则的无痛性收缩

正确答案：CD 您选择的答案：

第83-86题

- A 羊膜、叶状绒毛膜和底蜕膜
  - B 合体滋养细胞
  - C 胎儿肾上腺和胎儿肝
  - D 胎膜
  - E 脐带血
1. 胎盘合成雌三醇的主要来源是

2. 孕8~10周后孕激素的主要来源
3. 妊娠妇女血清催产素酶的产生部位
4. 组成胎盘的组织结构是

正确答案：CBBA 您选择的答案：

习题集 妇产科学 妊娠诊断

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 正常妊娠24周末，子宫底高度在

- A．脐下2指
- B．脐下1指
- C．平脐
- D．脐上1指
- E．脐上2指

正确答案：D 您选择的答案：

第2题 孕妇尿妊娠试验，开始出现阳性反应，一般是在末次月经后的

- A 31～40天
- B 41～50天
- C 51～60天
- D 61～70天
- E 以上都不是

正确答案：B 您选择的答案：

第3题 胎方位是指

- A 胎儿长轴与母体长轴的关系
- B 胎儿顶骨与母体骨盆的关系
- C 最先进入骨盆入口的胎儿部分与母体骨盆的关系
- D 胎儿先露部的指示点与母体骨盆的关系
- E 以上都不是

正确答案：D 您选择的答案：

第4题 早孕出现最早及最重要的症状是

- A 尿频
- B 恶心呕吐
- C 停经史
- D 腹痛
- E 乳房胀痛

正确答案：C 您选择的答案：

第5题 Hegar征是指

- A 子宫前倾前屈位
- B 子宫增大变软
- C 子宫峡部柔软，宫颈与宫体似不相连
- D 子宫颈充血变软，呈紫蓝色
- E 乳头和乳晕色素加深，乳头周围有多个褐色小结节

正确答案：C 您选择的答案：

第6题 关于胎盘功能，下述各项中哪项是不正确的

- A 促进葡萄糖经胎盘的转移
- B 游离脂肪酸不能通过胎盘屏障
- C 胎盘以扩散与主动转运方式吸收氨基酸
- D 胎盘催乳素(HPL)阻碍孕妇对葡萄糖的利用
- E 氨基酸可能从孕妇血浆浓缩

正确答案：B 您选择的答案：

第7题 早期妊娠的确诊依据是

- A．停经史
- B．早孕反应
- C．尿妊娠试验
- D．黑加征
- E．B型超声检查

正确答案：E 您选择的答案：

第8题 早期妊娠的诊断，下列哪项最为准确

- A 停经伴恶心、呕吐
- B 阴道充血变软，呈紫蓝色
- C 子宫增大
- D B超探及胎心管搏动
- E 自觉胎动

正确答案：D 您选择的答案：

第9题 妊娠28周末的宫底高度约为

- A．脐下2横指
- B．脐下1横指
- C．脐上3横指
- D．脐上1横指
- E．脐上2横指

正确答案：C 您选择的答案：

第10题 关于检查胎位四步触诊法的描述，下列哪项是错误的

- A 用以了解子宫的大小，胎先露，胎方位

B 第一步是双手置于宫底部，了解宫底高度，并判断是胎头还是胎臀  
C 第二步是双手分别置于腹部两侧，辨别胎背方向  
D 第四步，双手插入骨盆入口，进一步检查先露部，并确定入盆程度  
E 第三步，双手置于耻骨联合上方，弄清先露部为头还是臀  
正确答案：E 您选择的答案：

第11题 足月妊娠时，胎心率正常的范围是每分钟

- A . 100 ~ 140次
- B . 110 ~ 150次
- C . 120 ~ 160次
- D . 130 ~ 170次
- E . 140 ~ 180次

正确答案：C 您选择的答案：

第12题 下列哪项不能作为确诊中期妊娠之依据

- A 听诊胎儿音清晰可闻
- B 自觉胎动
- C 扪诊有胎头浮球感
- D A型超声示有胎心及胎动反射
- E B超示胎儿骨骼影

正确答案：B 您选择的答案：

第13题 下述哪项作为推算预产期的根据虽不准确

- A 早期妇查
- B 末次月经
- C 妊娠反应
- D 初觉胎动
- E 体重

正确答案：E 您选择的答案：

第14题 个体性别取决于下列因素，其中哪项不是正确的

- A 遗传性
- B 生殖腺性别
- C 接触放射致畸剂
- D 内生殖器的形态学
- E 抗原的性别与性别作用

正确答案：C 您选择的答案：

第15题 哪项诊断不用尿妊娠试验

- A 早期妊娠
- B 异位妊娠
- C 过期妊娠
- D 先兆流产
- E 葡萄胎

正确答案：C 您选择的答案：

第16题 胎儿姿势是指

- A . 最先进入骨盆入口的胎儿部分
- B . 胎儿先露部的指示点与母体骨盆的关系
- C . 胎体纵轴与母体纵轴的关系
- D . 胎儿身体各部的相互关系
- E . 以上都不是

正确答案：D 您选择的答案：

第17题 初孕妇初感胎动时间一般在

- A 12 ~ 16周
- B 16 ~ 18周
- C 18 ~ 20周
- D 20 ~ 22周
- E 22 ~ 26周

正确答案：C 您选择的答案：

第18题 早孕出现最早及最重要的症状是

- A . 停经
- B . 恶心呕吐
- C . 尿频
- D . 腹痛
- E . 乳房胀痛

正确答案：A 您选择的答案：

第19题 每小时胎动次数为

- A . 5 ~ 8次
- B . 3 ~ 5次
- C . 10 ~ 12次
- D . 8 ~ 10次
- E . 1 ~ 3次

正确答案：B 您选择的答案：

第20题 纵产式占足月妊娠分娩总数的

- A . 90 . 75%

- B. 91.75%
- C. 92.75%
- D. 96.75%
- E. 99.75%

正确答案：E 您选择的答案：

第21题 头先露中最常见的是

- A. 枕先露
- B. 前囟先露
- C. 面先露
- D. 额先露
- E. 颞先露

正确答案：A 您选择的答案：

第22题 诊断早孕的辅助检查方法首选

- A. 阴道脱落细胞学检查
- B. 基础体温测定
- C. 尿妊娠试验
- D. 黄体酮试验
- E. 宫颈粘液涂片干燥后镜检

正确答案：C 您选择的答案：

第23题 下列哪种方法诊断妊娠最可靠

- A. 停经史，胎动感，腹部渐膨隆
- B. 早孕反应，双合诊子宫增大，尿HCG阳性
- C. 停经史，双合诊子宫增大，B超宫内见妊娠囊
- D. 停经史，早孕反应，B超宫内见光团
- E. 停经史，早孕反应，子宫增大

正确答案：C 您选择的答案：

第24题 关于胎先露的指示点不正确的是

- A. 枕先露以枕骨
- B. 面先露以颜面部
- C. 臀先露以骶骨
- D. 肩先露以肩胛骨
- E. 额先露以额骨

正确答案：B 您选择的答案：

第25题 初孕妇于妊娠几周开始自觉胎动

- A. 6~8周
- B. 9~10周
- C. 10~12周
- D. 13~16周
- E. 18~20周

正确答案：E 您选择的答案：

第26题 关于早期妊娠，正确的是

- A. 已婚生育年龄妇女，平时月经规则，一旦月经过期10日以上应疑为妊娠
- B. 月经过期未来潮，黄体酮试验阴性，应疑为妊娠
- C. 哺乳期妇女月经尚未恢复，不会再次妊娠
- D. 停经6周左右都具有早孕反应
- E. 子宫增大变软是确定早孕的最可靠的依据

正确答案：A 您选择的答案：

第27题 关于早期妊娠的反应一般出现在

- A. 妊娠5周左右
- B. 妊娠6周左右
- C. 妊娠7周左右
- D. 妊娠8周左右
- E. 妊娠9周左右

正确答案：B 您选择的答案：

第28题 以下哪项不符合早孕的诊断

- A. 停经
- B. 早孕反应
- C. 尿频
- D. 妊娠试验阳性
- E. 自觉胎动

正确答案：E 您选择的答案：

第29题 正常妊娠于12周时，子宫底于

- A. 腹部不能触及
- B. 耻骨联合上刚能触及
- C. 耻骨联合上2~3横指
- D. 脐耻之间
- E. 以上都不是

正确答案：C 您选择的答案：

第30题 决定骨盆入口平面大小的主要径线是

- A. 入口前后径

- B 粗隆间径
- C 髂棘间径
- D 髂嵴间径
- E 骨棘间径

正确答案：A 您选择的答案：

第31题 在孕妇腹壁上听诊与母体心率一致的是

- A. 胎心音
- B. 子宫杂音
- C. 脐带杂音
- D. 胎动音
- E. 肠蠕动音

正确答案：B 您选择的答案：

第32题 在孕妇腹壁上听诊，与母体心率一致的音响是

- A 胎心音
- B 脐带杂音
- C 腹主动脉血管杂音
- D 胎动音
- E 以上都不对

正确答案：C 您选择的答案：

第33题 初孕妇自觉胎动，多数开始于

- A. 妊娠12~14周
- B. 妊娠15~17周
- C. 妊娠18~20周
- D. 妊娠21~23周
- E. 妊娠24~26周

正确答案：C 您选择的答案：

第34题 下列哪项不能作为确诊中期妊娠的依据

- A. 18~20周开始自觉胎动
- B. 胎心音每分钟120~160次
- C. 妊娠20周后可触及胎体
- D. 子宫明显增大
- E. 出现尿频

正确答案：E 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第35题 初孕妇，24岁。末次月经记不清，行产科检查，量腹围94cm，宫高33cm(宫底在脐与剑突之间)，胎头入盆，胎心位于脐右下方，其孕周为

- A 孕40周
- B 孕28周
- C 孕32周
- D 孕36周
- E 孕24周

正确答案：A 您选择的答案：

第36题 女性，26岁，已婚。月经规律，周期28天，末次月经4月1日，下列哪项正确

- A 优势卵泡的选择发生在4月7日
- B 排卵期约在4月5日
- C B超下能观察到原始胎心搏动的时间约在6月1日
- D 若受孕，孕卵着床时间约在4月18日
- E 预产期约在次年1月8日

正确答案：E 您选择的答案：

第37题 29岁妇女，停经44天，有早孕反应，妇科检查：宫颈呈紫蓝色，子宫体正常大小，双侧附件正常，首选的处理方法是

- A. B型超声检查
- B. 黄体酮肌肉注射
- C. 保胎治疗
- D. 尿妊娠试验
- E. 基础体温测定

正确答案：A 您选择的答案：

第38题 女，25岁，已婚，既往月经正常，月经过期7天前来就诊，要求明确是否怀孕，下列哪项检查对确诊最有帮助

- A. B超检查
- B. 酶联免疫法测定p-HCG
- C. 基础体温
- D. 宫颈黏液涂片镜检
- E. 孕酮撤退试验

正确答案：B 您选择的答案：

第39题 女性，25岁。月经过期1周。结婚6个月从未用过避孕药，既往月经正常。宫颈软，着色，子宫正常大小，双附件(-)。下列哪项是诊断妊娠的最早方法

- A B型超声

- B 放射免疫测定 $\beta$ -hCG
- C 基础体温
- D 听胎心
- E 尿hCG测定

正确答案：B 您选择的答案：

第40题 女，27岁，已婚。以往月经正常，因月经过期7天，前来就诊，要求明确是否怀孕，下列哪项检查对确诊帮助最大

- A B型超声
- B 酶联免疫法测定 $\beta$ -hCG
- C 基础体温
- D 宫颈粘液涂片镜检
- E 孕酮撤退试验

正确答案：B 您选择的答案：

第41题 31岁妇女，婚后4年未孕，月经周期28日一次，现停经50天，停经31日时尿HCG阴性，给安宫黄体酮4mg，2次/日，连用5日，停药7日，无撤退性出血，最可能的诊断是

- A 多囊卵巢综合征
- B 宫外孕
- C 早孕
- D 闭经
- E 高泌乳素血症

正确答案：C 您选择的答案：

第42题 一女性，33岁，孕32周，经产妇，来院产前检查，宫底在脐与剑突之间，胎心140次/分，胎位LOA，诊断为几个月妊娠

- A 6个月
- B 7个月
- C 8个月
- D 9个月
- E 10个月

正确答案：C 您选择的答案：

第43题 28岁妇女，停经4个月，检查：子宫体大于停经月份，为鉴别正常妊娠，多胎妊娠，异常妊娠，最佳方法为

- A 超声多普勒
- B AFP
- C B型超声
- D 腹部X线摄片
- E 胎儿心电图

正确答案：C 您选择的答案：

第44题 女，24岁，已婚，来门诊检查，主诉停经77天，下列哪项检查不恰当

- A 基础体温
- E 腹部X线摄片
- C 妊娠试验
- D 黄体酮试验
- E B型超声波检查

正确答案：B 您选择的答案：

第45题 女，28岁，已婚。平时月经尚规则，现停经50天。停经32天尿乳胶凝集抑制试验阴性，第33天，肌注黄体酮5天，停药后无撤退性出血，基础体温维持在37℃左右，已近5周，下列哪种诊断最可能

- A I度闭经
- B II度闭经
- C 早孕
- D 多囊卵巢综合征
- E 高泌乳素血症

正确答案：C 您选择的答案：

三、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第46-49题

- A 孕5周时
- B 孕6周时开始
- C 孕18~20周开始
- D 孕20周后
- E 孕24周
- 1. 子宫出现Hegar征
- 2. 宫底在脐上一横指
- 3. 自觉胎动开始
- 4. B超可见妊娠环

正确答案：BECA 您选择的答案：

第50-53题

- A 胎方位
- B 胎先露
- C 胎产式
- D 骨盆轴

E 胎体轴

1. 胎儿身体纵轴与母体纵轴的关系称为
2. 胎儿先露部指示点与母体骨盆的关系称为
3. 最先进入骨盆入口平面的胎儿部分为
4. 胎儿通过的骨盆各假想平面中点的连线代表

正确答案：CABD 您选择的答案：

第54-57题

- A. 胎体纵轴与母体纵轴的关系
  - B. 最先进入骨盆入口的胎儿部分
  - C. 胎儿先露部的指示点与母体骨盆的关系
  - D. 胎头俯屈，颈部接近胸壁，脊柱略弯曲，四肢屈曲交叉胸前
  - E. 胎儿位置与母体骨盆的关系
1. 胎产式
  2. 胎先露
  3. 胎儿姿势
  4. 胎方位

正确答案：ABDC 您选择的答案：

第58-61题

- A. 胎方位
  - B. 胎先露
  - C. 胎产式
  - D. 骨盆轴
  - E. 产道
1. 胎儿身体纵轴与母体纵轴的关系
  2. 胎儿先露部指示点与母体骨盆的关系
  3. 最先进入母体骨盆的胎儿部分
  4. 胎儿通过的骨盆各假想平面中点的连线

正确答案：CABD 您选择的答案：

第62-65题

- A. 子宫底高度在脐耻之间
  - B. 子宫底高度在脐上1横指
  - C. 子宫底高度在脐上3横指
  - D. 子宫底高度在脐与剑突之间
  - E. 子宫底高度在剑突下2横指
1. 妊娠16周末
  2. 妊娠28周末
  3. 妊娠32周末
  4. 妊娠36周末

正确答案：ACDE 您选择的答案：

第66-67题

- A. LOA
  - B. ROA
  - C. ROT
  - D. LOP
  - E. ROP
1. 胎头矢状缝在骨盆入口右斜径上，小囟门在骨盆的左前方
  2. 胎头矢状缝在骨盆入口左斜径上，大囟门在骨盆的右前方

正确答案：AD 您选择的答案：



习题集 妇产科学 不孕症

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 诱发排卵的药物是

- A 克罗米酚
- B 绝经促性素(hMG)
- C 黄体生成激素释放激素(LHRH)
- D 溴隐亭
- E 以上都是

正确答案：E 您选择的答案：

第2题 正常情况下，未避孕夫妇在1年内妊娠者占

- A . 50%
- B . 60%
- C . 70%
- D . 85% ~ 90%
- E . >95%

正确答案：B 您选择的答案：

第3题 为受孕应具备的条件中，下列哪项是错误的

- A . 卵巢排出正常的卵子
- B . 精液正常并含有正常的精子
- C . 卵子和精子能够在输卵管峡部相遇结合成为受精卵
- D . 受精卵能顺利的进入宫腔
- E . 子宫内膜为受精卵着床做好充分准备

正确答案：C 您选择的答案：

第4题 女性不孕最常见的因素是

- A 不排卵
- B 输卵管因素
- C 子宫因素
- D 宫颈因素
- E 阴道因素

正确答案：B 您选择的答案：

第5题 精子在进入宫腔后，能存活

- A 6小时
- B 12小时
- C 2~3天
- D <24小时
- E 3~5天

正确答案：C 您选择的答案：

第6题 只就精子数量而言，哪一项具备正常生育能力

- A . 精子数在1500万~2500万/ml
- B . 精子数在2500万~3500万/ml
- C . 精子数在3500万~4500万/ml
- D . 精子数在4500万~6000万/ml
- E . 精子数超过6000万/ml

正确答案：E 您选择的答案：

第7题 下列哪项不属于辅助生育技术

- A . 人工周期
- B . AIH
- C . AID
- D . IVF-ET
- E . GIFT

正确答案：A 您选择的答案：

第8题 为治疗输卵管因素不孕，下列哪项是错误的

- A . IVF-ET
- B . 宫腔配子移植
- C . 人工授精
- D . 输卵管造口或输卵管吻合术
- E . 输卵管注药通液术

正确答案：B 您选择的答案：

第9题 精子进入宫腔后，能存活时间

- A . 1天
- B . 1~2天
- C . 2天
- D . 2~3天
- E . 5天

正确答案：D 您选择的答案：

第10题 与精子产生无关的因素是

- A 双侧隐睾引起曲细精管萎缩

- B 慢性中毒(吸烟、酗酒)
- C 过度精神紧张
- D 幼年腮腺炎并发睾丸炎
- E 输精管结核

正确答案：E 您选择的答案：

第11题 卵子自卵巢排出后受精能力最强时间是在排卵后

- A . 12小时内
- B . 24小时内
- C . 2天内
- D . 3天内
- E . 5天内

正确答案：B 您选择的答案：

第12题 不孕症是指婚后未避孕同居

- A . 3个月未孕者
- B . 6个月未孕者
- C . 12个月未孕者
- D . 18个月未孕者
- E . 24个月未孕者

正确答案：A 您选择的答案：

第13题 试管婴儿是指

- A . 人工授精
- B . 配子输卵管内移植
- C . 宫腔配子移植
- D . 体外授精与胚胎移植
- E . 胚胎移植

正确答案：D 您选择的答案：

第14题 女性不孕症监测有无排卵时，下列哪项检查不必要

- A . 阴道细胞学检查
- B . 宫颈黏液涂片检查
- C . 基础体温测定
- D . 经前诊刮或子宫内膜活检
- E . 腹腔镜检查

正确答案：E 您选择的答案：

第15题 不孕症是指婚后有正常的性生活，未避孕同居时间达下列哪项而未孕者

- A 1年
- B 1年半
- C 2年
- D 3年
- E 4年

正确答案：C 您选择的答案：

第16题 据统计正常情况下，婚后2年初孕率为

- A 60%
- B 70%
- C 80%
- D 90%
- E 95%

正确答案：E 您选择的答案：

第17题 关于精液正常值下述哪项是错误的

- A 精液量为2ml ~ 6ml，平均3 ~ 4ml
- B pH为7 . 5 ~ 7 . 8
- C 精子数 > 6000万/ml
- D 活动 > 60%
- E 异常精子数 < 30%

正确答案：E 您选择的答案：

第18题 不孕症是指婚后未避孕同居

- A . 3个月未孕者
- B . 6个月未孕者
- C . 12个月未孕者
- D . 18个月未孕者
- E . 24个月未孕者

正确答案：E 您选择的答案：

第19题 排卵后在体内卵子的寿命是

- A 24小时
- B 8小时
- C 2天
- D 3天
- E < 8小时

正确答案：A 您选择的答案：

第20题 排卵后，由于孕激素对体温中枢的作用，基础体温可持续上升

- A 16 ~ 18天

- B 12~14天
- C 10~12天
- D 8~10天
- E 6~8天

正确答案：B 您选择的答案：

第21题 精液常规检查中正常精液的指标下列哪项是错误的

- A. 精液量2~6ml
- B. 精液pH值为7.8~8.7
- C. 液化时间在30分钟内
- D. 精子数>6000万 / ml
- E. 活动率>60%

正确答案：B 您选择的答案：

第22题 试管婴儿是指

- A. 人工授精
- B. 配子输卵管内移植
- C. 宫腔配子移植
- D. 体外受精与胚胎移植
- E. 胚胎移植

正确答案：D 您选择的答案：

第23题 下列哪项不属于生殖医学技术

- A 人工周期
- B AID
- C AIH
- D IVF / ET
- E GIFT

正确答案：A 您选择的答案：

第24题 在我国引起输卵管梗阻性不孕的重要因素为

- A. 输卵管炎症
- B. 输卵管畸形
- C. 子宫内膜异位症
- D. 子宫肌瘤的压迫
- E. 生殖器结核

正确答案：A 您选择的答案：

第25题 不孕症是指婚后未避孕，有正常性生活，同居几年未受孕

- A. 1年
- B. 2年
- C. 3年
- D. 半年
- E. 1年半

正确答案：B 您选择的答案：

第26题 试管婴儿是

- A 人工授精
- B 配子输卵管内移植
- C 宫腔配子移植
- D 体外授精与胚胎移植
- E 胚胎移植

正确答案：D 您选择的答案：

第27题 女性不孕症最常见的因素是

- A. 输卵管
- B. 卵巢
- C. 子宫
- D. 宫颈
- E. 阴道

正确答案：A 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第28题 某妇，32岁，孕0产0，婚后不孕3年，月经3~5 / 20~30天，妇查：左侧穹隆稍增厚，余正常。进一步检查首先考虑

- A 月经前诊断性刮宫
- B 输卵管通液
- C 子宫输卵管造影
- D 宫腔镜
- E 腹腔镜

正确答案：A 您选择的答案：

第29题 某女，31岁，原发不孕3年，月经正常，量中等，无痛经，妇查未发现异常，进一步检查首选

- A. 输卵管通液
- B. B超检查
- C. 性交后试验
- D. 腹部平片

E. 诊断性刮宫

正确答案：A 您选择的答案：

第30题 28岁，不孕3年，月经5~6天/20~50天，量中等，无痛经，妇科检查未见异常。进一步检查应首选

A. 输卵管通液

B. B超

C. 性交后试验

D. 腹部平片

E. 经前或月经来潮12小时内诊刮

正确答案：E 您选择的答案：

第31题 某妇，28岁。孕1产0。继发不孕2年，月经5~6天/28~30天，妇查：宫颈光滑，宫体大小常，宫旁左侧及后方有粘连及压痛，右侧附件可及，进一步处理首选

A. 人工周期

B. 全身抗炎治疗

C. 氯底酚胺

D. 输卵管通液

E. 宫颈扩张

正确答案：B 您选择的答案：

第32题 某妇，30岁，原发不孕3年，月经5~6/20+~50+天，量中等，无痛经，妇查未发现特殊症状。进一步检查应首选

A. 输卵管通液

B. B型超声

C. 性交后试验

D. X线腹部平片

E. 经前或见红12小时内诊刮

正确答案：E 您选择的答案：

三、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第33-34题

某妇，33岁。孕3产0，最后一次妊娠至今已5年，未采取任何避孕措施，妇查：宫体正常大小，双侧附件区压痛明显，可触及不规则片状物

1. 此患者最可能的诊断是

A. 继发不孕+附件炎

B. 绝对不孕+附件炎

C. 继发不孕

D. 原发不孕

E. 原发不孕+附件炎

2. 此患者的最佳治疗方案是

A. 人工周期

B. 宫颈扩张

C. 全身抗炎治疗+输卵管通液

D. 氯底酚胺

E. F/ET

正确答案：AC 您选择的答案：

第35-36题

女，30岁，结婚6年未孕，月经规则，基础体温双相型。近3年进行性痛经。妇科检查：宫颈轻度糜烂，子宫后位，固定，子宫骶骨韧带触痛性结节。子宫输卵管碘油造影未见异常。排卵期宫颈黏液黄色透明，配偶精子数2300万/ml。

1. 考虑不孕与下列哪组原因有关

A. 精子缺乏，宫颈黏液异常，后位子宫

B. 宫颈黏液异常，子宫内膜异位症，后位子宫

C. 精子缺乏症，子宫内膜异位症，宫颈黏液异常

D. 宫颈黏液异常，宫腔粘连，精子缺乏症

E. 排卵异常

2. 治疗采取以下哪种措施

A. 治疗宫颈炎，并用丹那唑治疗6个月后人工授精

E. 人工授精

C. 试管婴儿

D. 促排卵

E. 中药活血化瘀

正确答案：CA 您选择的答案：

四、A4型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第37-40题

女，30岁，孕2产0，最后1次流产至今3年未孕，未避孕，妇科检查：宫体正常大小，双侧附件增厚、压痛明显。

1. 此患者可能的诊断是

A. 继发不孕+附件炎

B. 原发不孕+附件炎

C. 附件炎

D. 绝对不孕

E. 原发不孕

2. 此患者下一步应做哪项辅助检查确诊

- A. 诊刮
- B. 配偶精液检查
- C. 性激素测定
- D. 输卵管通液
- E. 基础体温测定

3. 其治疗措施首选

- A. 人工周期
- B. 中药活血化瘀+输卵管内注药
- C. 人工授精
- D. 试管婴儿
- E. 溴隐亭治疗

4. 若经上述治疗2午后输卵管仍不通, 进一步的治疗措施为

- A. 促排卵治疗
- B. 人工授精
- C. 试管婴儿
- D. 溴隐亭治疗
- E. GnRHa治疗

正确答案: ADBC 您选择的答案:

五、B1型题: 以下提供若干组考题, 每组考题共用在前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第41-44题

- A. 凡婚后未避孕, 有正常性生活, 同居2年以上而未妊娠者
- B. 婚后未避孕且从未妊娠者
- C. 曾有过妊娠而后来未避孕连续2年不孕者
- D. 夫妇一方在先天或后天解剖生理方面的缺陷, 无法纠正而不能受孕者
- E. 夫妇一方因某种原因阻碍受孕, 导致暂时不孕, 一旦得到纠正仍能受孕者
- 1. 继发不孕
- 2. 原发不孕
- 3. 绝对不孕
- 4. 相对不孕

正确答案: CADE 您选择的答案:

第45-48题

- A. 原发不孕
- B. 继发不孕
- C. 绝对不孕
- D. 相对不孕
- E. 不孕症
- 1. 凡婚后未避孕、有正常性生活、同居2年而未受孕者
- 2. 婚后未避孕而从未妊娠者
- 3. 夫妇一方有先天或后天解剖生理方面的缺陷, 无法纠正而不能妊娠者
- 4. 夫妇一方因某种因素阻碍受孕, 导致暂时不孕, 而一旦纠正仍能受孕者

正确答案: EACD 您选择的答案:

第49-51题

- A. 凡婚后未避孕, 有正常性生活, 同居2年以上而未妊娠者
- B. 婚后未避孕且从未妊娠者
- C. 曾有过妊娠而后来未避孕连续2年不孕者
- D. 夫妇一方在先天或后天解剖生理方面的缺陷, 无法纠正而不能妊娠者
- E. 夫妇一方因某种原因阻碍受孕, 导致暂时不孕, 一旦得到纠正仍能受孕者
- 1. 继发不孕
- 2. 绝对不孕
- 3. 相对不孕

正确答案: CDE 您选择的答案:

习题集 妇产科学 女性生殖器损伤性疾病

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 度子宫脱垂患者，阴道掉出物的特点是

- A. 呈茄子状，末端为子宫颈外口
- B. 有长蒂与肿物相连
- C. 肿物呈球形，两侧见输卵管开口
- D. 肿物表面呈暗红色海绵状
- E. 肿物呈囊性位于阴道前壁，表面为阴道粘膜

正确答案：A 您选择的答案：

第2题 重度子宫脱垂(度)常伴有

- A. 宫颈溃疡
- B. 膀胱直肠膨出
- C. 张力性尿失禁
- D. 阴道壁溃疡
- E. 以上都是

正确答案：B 您选择的答案：

第3题 下列哪项是导致尿瘘的主要原因

- A. 产伤
- B. 放疗引起
- C. 晚期癌肿侵及膀胱
- D. 膀胱结核
- E. 尿路感染

正确答案：A 您选择的答案：

第4题 下列哪项损伤与子宫脱垂的发生无关

- A. 主韧带
- B. 子宫骶韧带
- C. 阔韧带
- D. 肛提肌
- E. 卵巢固有韧带

正确答案：E 您选择的答案：

第5题 哪一对韧带对防止子宫脱垂最重要

- A. 圆韧带
- B. 骨盆漏斗韧带
- C. 阔韧带
- D. 子宫卵巢韧带
- E. 主韧带

正确答案：E 您选择的答案：

第6题 度重型以上子宫脱垂患者的主要临床表现为

- A. 下腹坠胀感
- B. 外阴部有肿物脱出
- C. 排尿困难
- D. 排便困难
- E. 张力性尿失禁

正确答案：B 您选择的答案：

第7题 患者用力屏气时，子宫颈脱出阴道口外，临床诊断

- A. 膀胱膨出
- B. 子宫脱垂I度
- C. 子宫脱垂 轻
- D. 子宫脱垂 重
- E. 子宫脱垂 度

正确答案：C 您选择的答案：

第8题 度重型以上子宫脱垂患者的主要临床表现是

- A. 下腹坠胀感
- B. 外阴部有肿物脱出
- C. 排尿困难
- D. 排便困难
- E. 张力性尿失禁

正确答案：B 您选择的答案：

第9题 子宫脱垂最主要的原因是

- A. 分娩损伤和产褥早期体力劳动
- B. 长期慢性咳嗽
- C. 长期便秘
- D. 盆底组织先天发育不良
- E. 盆底组织退行性变

正确答案：A 您选择的答案：

第10题 重度子宫脱垂(度)常伴有

- A. 宫颈溃疡

- B 膀胱、直肠膨出
- C 张力性尿失禁
- D 阴道壁溃疡
- E 以上都是

正确答案：E 您选择的答案：

第11题 防止子宫脱垂的最重要的韧带是

- A．子宫主韧带
- B．子宫圆韧带
- C．子宫阔韧带
- D．骨盆漏斗韧带
- E．卵巢固有韧带

正确答案：A 您选择的答案：

第12题 子宫脱垂最主要的病因是

- A 长期腹压增加
- B 先天发育异常
- C 分娩损伤和产褥早期体力劳动
- D 长期慢性咳嗽
- E 缺乏雌激素

正确答案：C 您选择的答案：

第13题 下列疾病，哪一项常与子宫脱垂相混淆

- A 膀胱膨出
- B 子宫粘膜下肌瘤或宫颈肌瘤
- C 单纯阴道前后壁膨出或阴道壁囊肿
- D 子宫内翻
- E 以上都是

正确答案：C 您选择的答案：

第14题 张力性尿失禁易并发于下列何种疾病

- A．子宫粘膜下肌瘤
- B．子宫后壁膨出
- C．阴道壁囊肿
- D．膀胱膨出
- E．子宫内翻

正确答案：D 您选择的答案：

第15题 子宫脱垂最常见的原因

- A．长期腹压增加
- B．分娩损伤
- C．盆底发育不良
- D．盆底退行性变
- E．产褥期过度劳累

正确答案：B 您选择的答案：

第16题 一农妇，56岁，诉阴道一物脱出3年，妇查：宫颈已脱出至阴道口外，子宫体在阴道内，双附件正常，应该诊断子宫脱垂几度

- A I度轻
- B I度重
- C 度轻
- D 度重
- E 度

正确答案：C 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第17题 女，68岁，孕5产4，阴道脱出一物6年。妇科检查：宫颈、宫体全部脱出于阴道口外，阴道前后壁有小溃疡，其最有效的治疗方法为

- A．子宫托
- B．曼氏手术
- C．经阴子宫全切术
- D．阴道前后壁修补术
- E．经阴子宫全切术+阴道前后壁修补术

正确答案：E 您选择的答案：

第18题 52岁妇女，绝经3年，阴道口脱出肿物1年，妇检：会阴 度陈旧性裂伤，阴道前壁有球形膨出，子宫稍大，双侧附件阴性，诊断子宫脱垂 度轻。处理为

- A．开腹行子宫全切术
- B．曼氏手术
- C．阴道纵隔成形术
- D．阴道前后壁修补
- E．阴式子宫切除+阴道前后壁修补

正确答案：E 您选择的答案：

第19题 27岁，妇女，无职业。孕2产2，产后阴道脱出一物2年，日渐加重而来就诊。查：一般状态良好，妇查：加腹压时见宫颈及部分宫体脱出阴道口外，宫颈长4cm，阴道前后壁膨出，其处理应是

- A 使用子宫托

- B 行曼氏手术  
C 阴式子宫全切+阴道前后壁修补术  
D 行宫颈部分切除术  
E 经腹行子宫全切术  
正确答案：B 您选择的答案：

第20题 63岁妇女，孕5产3，诉阴道掉出物六个月，伴小便困难。查：外阴经产型，子宫萎缩，宫颈外口及部分子宫脱出阴道口外，阴道前壁膨出和阴道后壁轻度膨出。诊断为

- A. 子宫脱垂 度重  
B. 子宫脱垂 度轻伴阴道前后壁膨出  
C. 子宫脱出 度伴阴道前后壁膨出  
D. 子宫脱垂 度重伴阴道前后壁膨出  
E. 宫颈延长伴阴道前后壁膨出  
正确答案：D 您选择的答案：

第21题 一妇女，78岁。爱人已故，一般状态差，妇查：宫颈光滑，子宫颈和宫体全部脱出阴道口外，细胞涂片未发现变异细胞，其治疗方法应是

- A 子宫托  
B 曼氏手术  
C 阴道纵隔形成术  
D 阴式子宫全切术  
E 腹式子宫全切术  
正确答案：C 您选择的答案：

第22题 女，孕3产2，用力屏气时子宫颈及部分子宫体脱出于阴道口外，临床诊断为

- A. 膀胱膨出  
B. 子宫脱垂Ⅰ度  
C. 子宫脱垂 度轻  
D. 子宫脱垂 度重  
E. 子宫脱垂 度  
正确答案：D 您选择的答案：

第23题 59岁妇女，孕5产4，阴道脱出一物已4年，妇查：宫颈及宫体全部脱出至阴道口外，阴道前后壁有小溃疡，其最有效的治疗方法

- A 子宫托  
B 曼氏手术  
C 阴式子宫全切术  
D 阴道前后壁修补术  
E 经阴道全子宫切除+阴道前后壁修补术  
正确答案：E 您选择的答案：

三、A3型题：以下提供若干案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第24-25题

某妇女，33岁。孕3产1，主诉大便时阴道脱出一物，妇查：用力时阴道壁膨出，宫颈外口距阴道口约2cm，宫体及附件正常

1. 该病人的诊断为  
A 单纯阴道膨出  
B 子宫Ⅰ度脱垂合并膀胱膨出  
C 子宫 度脱垂  
D 子宫 度脱垂合并膀胱膨出  
E 子宫Ⅰ度脱垂  
2. 该病人适合治疗为  
A 子宫托保守治疗  
B 阴道壁修补术  
C 阴式子宫切除术  
D 腹式子宫全切术  
E 阴式子宫切除术+阴道壁修补  
正确答案：BA 您选择的答案：

第26-27题

女性，65岁，孕5产5，绝经14年。发现阴道口有块状物脱出3年就诊。妇科检查：外阴经产式，阴道前后壁轻度膨出，宫颈及部分宫体脱出于阴道口外，子宫较正常略大，双附件无异常。

1. 该患者的诊断是  
A. 子宫脱垂Ⅰ度轻，伴阴道前后壁轻度膨出  
B. 子宫脱垂Ⅱ度重，伴阴道前后壁轻度膨出  
C. 子宫脱垂 度轻，伴阴道前后壁轻度膨出  
D. 子宫脱垂 度重，伴阴道前后壁轻度膨出  
E. 子宫脱垂 度，伴阴道前后壁轻度膨出  
2. 其治疗宜选择  
A. 口服补中益气丸  
B. 经腹子宫全切术及阴道前后壁修补术  
C. 宫颈部分切除术及阴道前后壁修补术  
D. 经阴子宫全切术及阴道前后壁修补术  
E. 阴道闭合术  
正确答案：DD 您选择的答案：

四、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与



问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第28-30题

- A. 子宫颈外口在坐骨棘平面以下和阴道口之间
- B. 宫颈在阴道外口，宫体在阴道内
- C. 宫颈及部分宫体均在阴道外
- D. 宫颈和宫体均在阴道外
- E. 宫颈在坐骨棘水平上，宫体在盆腔

- 1. 子宫脱垂I度
- 2. 子宫脱垂重度
- 3. 子宫正常位置

正确答案：ACE 您选择的答案：

第31-32题

- A. 阴式子宫全切术及前后壁修补术
- B. 曼氏手术
- C. 纯阴道前后壁修补术
- D. 阴道纵隔形成术
- E. 腹式子宫全切术

- 1. 关于子宫脱垂的术式选择： 、 度子宫脱垂并发阴道前后壁膨出
- 2. 、 度子宫脱垂，年轻、宫颈较长，需保留生育功能者

正确答案：AB 您选择的答案：

第33-35题

- A. 子宫脱垂 度轻
- B. 子宫脱垂 度重
- C. 子宫脱垂 度轻
- D. 子宫脱垂 度重
- E. 子宫脱垂 度

- 1. 宫颈达处女膜缘，但未超出该缘
- 2. 宫颈及部分宫体脱出阴道口
- 3. 宫颈及宫体全部脱出阴道口

正确答案：BDE 您选择的答案：

第36-38题

- A. 1~3个月待炎症消失局部血供恢复正常后行修补
- B. 3~6个月待炎症消失局部血供恢复正常后行修补
- C. 6~12个月待炎症消失局部血供恢复正常后行修补
- D. 12个月待炎症消失局部血供恢复正常后行修补
- E. 立即修补

- 1. 产道长时间压迫引起的尿瘘，最佳手术时间
- 2. 手术直接损伤的尿瘘最佳修补时间
- 3. 手术过度剥离输尿管所致缺血坏死型尿瘘最佳手术时间

正确答案：BEB 您选择的答案：

习题集 妇产科学 子宫内膜异位症和子宫腺肌病

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 异位子宫内膜可出现在身体不同部位，其中最常见于

- A．宫骶韧带
- B．直肠子宫陷凹
- C．卵巢
- D．子宫后壁
- E．宫颈

正确答案：C 您选择的答案：

第2题 关于子宫内膜异位症下述哪项是错误的

- A 多见于生育年龄妇女，以30岁～40岁居多
- B 发病与卵巢的周期性变化有关
- C 子宫内膜出现和生长在子宫肌层
- D 具有类似恶性肿瘤的远处转移和种植能力
- E 一般极少发生恶变

正确答案：C 您选择的答案：

第3题 子宫内膜异位症最常发生的部位是

- A 子宫直肠陷凹
- B 卵巢
- C 子宫骶骨韧带
- D 输卵管
- E 卵巢悬韧带

正确答案：B 您选择的答案：

第4题 与子宫内膜增生过长无关的疾病是

- A 多囊卵巢
- B 子宫肌瘤
- C 子宫内膜痛
- D 卵巢颗粒细胞瘤
- E 卵巢子宫内膜异位囊肿

正确答案：E 您选择的答案：

第5题 子宫内膜异位症的临床表现，哪项是正确的

- A．卵巢子宫内膜异位囊肿越大，疼痛越重
- B．盆腔腹膜上小的子宫内膜异位结节病灶，不导致痛经
- C．凡患子宫内膜异位症，都有痛经
- D．疼痛不放射到阴道、会阴、肛门或大腿
- E．疼痛的程度与病灶大小并不一定成正比

正确答案：E 您选择的答案：

第6题 下列药物治疗子宫内膜异位症最有效的是

- A．雄激素
- B．雌激素
- C．孕激素
- D．避孕药
- E．丹那唑

正确答案：E 您选择的答案：

第7题 下列哪项是诊断子宫内膜异位症的最直接依据

- A．进行性痛经
- B．CA125测定值升高
- C．超声检查
- D．腹腔镜检查并做组织活检
- E．子宫后方触及痛性结节

正确答案：D 您选择的答案：

第8题 子宫内膜异位症最主要的临床特点是

- A 月经失调
- B 不孕症发生率高达40%
- C 痛经和持续性下腹痛
- D 咳血
- E 腹痛，腹泻或便秘

正确答案：C 您选择的答案：

第9题 子宫内膜异位症痛经的特点是

- A 痛经发生于月经前期
- B 痛经发生于月经前，经期加重，经后缓解
- C 痛经与月经周期无关
- D 痛经经期较微，经后加重
- E 痛经多为原发性痛经

正确答案：B 您选择的答案：

第10题 有关子宫腺肌病，下述表达正确的是

- A 多数合并外在性子宫内膜异位症

B 多发生在初产妇  
C 病灶中子宫内膜对卵巢激素敏感  
D 假孕疗法有效  
E 月经量增多，经期延长，继发痛经，子宫均增大和质较硬  
正确答案：E 您选择的答案：

第11题 子宫内膜异位症多见于

- A. 直肠子宫陷凹
- B. 宫颈
- C. 腹膜
- D. 输卵管
- E. 卵巢

正确答案：E 您选择的答案：

第12题 关于子宫腺肌症的症状，下列哪项是最典型的

- A. 月经过多
- B. 不孕
- C. 进行性痛经
- D. 经期延长
- E. 白带增多

正确答案：C 您选择的答案：

第13题 关于子宫内膜异位症引起不孕的原因下列哪项是错误的

- A. 自身免疫反应干扰受精和着床
- B. 盆腔的广泛粘连及输卵管蠕动减弱
- C. 黄体功能不足
- D. 子宫后位
- E. LUFS

正确答案：D 您选择的答案：

第14题 子宫腺肌症最应和下列那种疾病鉴别

- A. 妊娠子宫
- B. 子宫肌瘤
- C. 子宫内膜异位症
- D. 盆腔炎性包块
- E. 子宫肉瘤

正确答案：B 您选择的答案：

第15题 关于子宫内膜异位症的预防，以下哪项错误

- A. 防止经血倒流
- B. 月经期应避免不必要的妇科检查
- C. 避免手术操作时引起的内膜种植
- D. 人工流产时不要突然降低负压
- E. 输卵管通液术应在月经前进行

正确答案：E 您选择的答案：

第16题 关于子宫腺肌病，下列哪项是正确的

- A. 多数合并子宫内膜异位症
- B. 多发生于初产妇
- C. 病灶中子宫内膜对卵巢激素敏感
- D. 假孕疗法有效
- E. 月经量增多、经期延长、继发痛经，子宫均匀增大，质较硬

正确答案：E 您选择的答案：

第17题 治疗子宫内膜异位症，需切除子宫保留卵巢功能的手术适用于

- A. 年龄在45岁以下，无生育要求者
- B. 年龄在30岁以下，要求生育者
- C. 年轻患者病变严重者
- D. 年轻尚未生育的妇女
- E. 近绝经的症状较重的患者

正确答案：A 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第18题 女，26岁，痛经3年逐渐加重，月经量增多，本次行经10日，血仍未止，2年前因不孕做过输卵管通液治疗，子宫较正常略大，后位，不活动，右侧触及4cm×4cm×3cm大的韧性包块与子宫粘连；左侧附件增厚，双宫骶韧带均触及豆粒大痛性结节，本病首先考虑为

- A. 陈旧性宫外孕
- B. 生殖器结核
- C. 慢性盆腔炎
- D. 子宫内膜异位症
- E. 输卵管卵巢囊肿

正确答案：D 您选择的答案：

第19题 女，32岁，子宫下段剖宫产术后6年，近6年痛经，已逐渐加剧。妇科检查：子宫后位，活动欠佳，正常大小，后穹窿可触及多个质硬小结节，触痛明显。其诊断首先考虑

- A. 慢性盆腔炎
- B. 卵巢癌

- C. 盆腔结核
- D. 子宫内膜异位症
- E. 子宫腺肌病

正确答案：D 您选择的答案：

第20题 33岁，妇女。婚后7年未孕，痛经逐年加重，妇查：宫底韧带处可触及黄豆大结节2个，触痛明显，右侧附件可及一5cm×6cm大小包块活动差，半囊半实，最有效的确诊方

- A B超
- B 诊断性刮宫
- C 宫腔镜检查
- D 腹腔镜+组织病检
- E CA125

正确答案：D 您选择的答案：

第21题 40岁妇女，人工流产术后10年未孕，近3年来，月经量多，经期腰腹坠痛加重，妇查：子宫鹅卵大，球形，硬，附件正常，首选诊断是

- A 子宫肌瘤
- B 子宫腺肌病
- C 盆腔炎性肿物与子宫粘连
- D Asherman综合征
- E 子宫内膜癌

正确答案：B 您选择的答案：

第22题 某妇女，38岁，子宫下段剖宫产术后10年，近4年痛经，且逐年加剧，妇查：子宫活动欠佳，后穹隆可触及多个小结节，其诊断首先考虑为

- A 慢性盆腔炎
- B 卵巢癌
- C 子宫内膜异位症
- D 子宫腺肌病
- E 多发性浆膜下肌瘤

正确答案：C 您选择的答案：

第23题 32岁经产妇，近3年痛经并逐渐加重，伴经量多，需服止痛药。子宫后倾，大如妊娠8周，质硬。痛经逐渐加重的原因最可能是

- A. 子宫内膜结核
- B. 功能性痛经
- C. 子宫腺肌病
- D. 子宫粘膜下肌瘤
- E. 子宫内膜癌

正确答案：C 您选择的答案：

第24题 29岁妇女，痛经3年，婚后2年未孕，妇检：子宫鸭卵大，常硬后位，活动受限，后穹隆可触及多个小结节，未经治疗，应首选哪种治疗方法

- A 甲基睾丸素长期应用
- B 高效孕激素类药物
- C 保留生育功能手术
- D 克罗米酚
- E hCG诱发排卵

正确答案：B 您选择的答案：

第25题 30岁已婚未孕妇女，近3年痛经逐渐加重。子宫后屈，活动受限，后穹隆有多个触痛结节，附件区未及异常。该患者的治疗方案是

- A. 止痛对症
- B. 消炎
- C. 达那唑
- D. 病灶切除
- E. 根治手术

正确答案：C 您选择的答案：

第26题 35岁，进行性痛经10年，婚后6年未孕。妇科检查：宫骶韧带处可触及花生米大触痛结节3个，连接成片，右附件区可触及一5cm×5cm大小囊性包块，活动差，最有效的确诊方法是

- A. B超
- B. 诊刮
- C. 宫腔镜
- D. 腹腔镜检查+组织病理学检查
- E. CA125

正确答案：E 您选择的答案：

三、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第27-28题

29岁妇女原发不孕5年，进行性痛经。妇科检查：子宫大小正常，后位，活动差，后壁可触及2个黄豆粒大小痛性结节，左侧附件区可触及3cm大小的囊性包块，不活动，有触痛，右附件区增厚。

1. 其诊断应首先考虑为

- A. 慢性盆腔炎
- B. 结核性盆腔炎
- C. 子宫内膜异位症
- D. 卵巢癌

- E. 子宫肌瘤
  - 2. 其治疗应首选
  - A. 剖腹探查
  - B. 卵巢肿瘤根治术
  - C. 雄激素治疗
  - D. 丹那唑治疗
  - E. 子宫肌瘤挖除术+卵巢肿瘤剔除术
- 正确答案：DC 您选择的答案：

第29-30题

28岁妇女，原发不孕进行性痛经5年，妇查：子宫大小正常，后倾，欠活动，后壁有2个黄豆大小痛性结节，左侧附件可扪及直径约3cm大小的囊性包块，不活动，右侧附件增厚

- 1. 其诊断考虑为
  - A. 慢性盆腔炎
  - B. 结核性盆腔炎
  - C. 子宫内膜异位症
  - D. 双侧附件炎性包块
  - E. 卵巢恶性肿瘤
  - 2. 其处理应首选
  - A. 双侧附件切除术
  - B. 卵巢子宫内膜病灶切除术
  - C. 丹那唑治疗
  - D. 雄激素治疗
  - E. 根治术
- 正确答案：CC 您选择的答案：

四、A4型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第31-33题

女，34岁，曾生育1子，并流产3次，近2年来痛经有日渐加重趋势。妇科检查：左侧附件可触及直径6cm的囊性包块，张力高，推之不动，有粘连感，追问病史，1年前肿块直径仅4cm。

- 1. 考虑此肿块最可能为以下哪种疾病
  - A. 卵巢恶性肿瘤
  - B. 慢性盆腔炎
  - C. 卵巢子宫内膜异位囊肿
  - D. 结核性盆腔炎
  - E. 卵巢良性肿瘤
  - 2. 3天前月经来潮，昨天突然腹痛加重伴恶心、呕吐。体检：体温39℃，全腹压痛，子宫后位，大小不清，后方可及巨大结节，右侧触及直径6cm囊性包块，触痛明显。白细胞 $15 \times 10^9/L$ ，中性0.92。下列哪项诊断最为可能
  - A. 慢性盆腔炎急性发作
  - B. 子宫肌瘤红色变性
  - C. 卵巢囊肿扭转
  - D. 卵巢囊肿破裂
  - E. 卵巢子宫内膜异位囊肿破裂
  - 3. 若患者要求手术治疗，你认为下列那种治疗方案较好
  - A. 全子宫切除+清除异位病灶+患侧卵巢切除
  - B. 粘连分解+切除异位病灶+卵巢囊肿剥出术
  - C. 全子宫切除+清除异位病灶+患侧卵巢切除
  - D. 全子宫切除+双侧附件切除术
  - E. 全子宫切除+卵巢囊肿穿刺抽液后肌注无水酒精
- 正确答案：CEB 您选择的答案：

五、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第34-36题

- A. 期待疗法
  - B. 药物疗法
  - C. 保守手术
  - D. 保留卵巢功能手术
  - E. 根治性手术
  - 1. 症状和病变均严重的无生育要求的子宫内膜异位症患者可考虑
  - 2. 年轻无继续生育要求的重症内膜异位症患者可采用
  - 3. 有生育要求的轻度内膜异位症患者宜采用
- 正确答案：EDB 您选择的答案：

第37-39题

- A. 保留卵巢功能手术
  - B. 观察
  - C. 性激素治疗
  - D. 病灶清除
  - E. 根治术
  - 1. 病变不严重，症状轻微者
  - 2. 无子女迫切要求生育，病变累及卵巢者
  - 3. 年轻无生育要求
- 正确答案：BDA 您选择的答案：

第40-43题

A 高效孕激素疗法

B 假孕疗法

C 假绝经疗法

D 内美通疗法

E 药物性卵巢切除疗法

1. Kistner最先提出

2. GnRH-a是哪种疗法的用药

3. 有肝功损害者不宜用

4. 具有较强的雌激素和孕激素作用效果与达那唑相同，是哪种疗法

正确答案：BECD 您选择的答案：

第44-47题

A 腹腔镜下剥出异位囊肿后随访

B 保留卵巢功能的手术

C 保留生育功能的手术辅以药物治疗

D 根治手术

E 药物保守治疗

1. 女，32岁，婚后3年未孕，有轻度痛经史，腹腔镜检查发现左侧卵巢子宫内膜异位囊肿，直径4cm

2. 女，48岁，进行性痛经20余年，经量增多。妇科检查：贫血貌，宫颈中度糜烂，宫体后位略大固定，子宫后方可及多数散在结节，触痛明显，腹腔镜诊断为子宫内膜异位症 期，药物治疗无效

3. 女，30岁，进行性痛经5年，服用止痛药能缓解，婚后3年不孕，月经正常。妇科检查：宫颈轻度糜烂，宫体后位，正常大，活动受限，于子宫后方可及散在结节，触痛(+)，附件未及异常

4. 女，44岁，孕1产1，下腹疼痛，经来加重已多年，经期长，经量多，药物治疗无效。妇科检查：宫颈光滑，宫体后位、活动、增大，如孕8周大，右角结节状突起、质硬、轻压痛

正确答案：ADEB 您选择的答案：

第48-50题

A 子宫肌瘤

B 子宫腺肌病

C 子宫内膜异位症

D 慢性盆腔炎

E 卵巢癌

1. 女，36岁，已婚，因月经量增多伴进行性痛经3年来就诊。妇科检查：宫颈轻度糜烂，子宫2个月大小，质硬，活动度差，两侧附件增厚，B型超声检查提示：子宫增大，回声不均。其诊断应考虑为

2. 女，29岁，结婚4年不孕来就诊。月经规律，伴进行性痛经及肛门坠胀感。妇科检查：宫颈轻度糜烂，子宫后位，正常大，后壁扪及不规则触痛小结节，左侧附件扪及4cm直径包块，固定，右侧附件增厚。其诊断考虑为

3. 女，绝经10年，腹胀2个月来就诊。妇科检查：宫颈萎缩，子宫似正常大小，边界欠清，后壁触及后陷凹不规则结节，两侧附件区扪及硬块达盆壁。绝经后无阴道流血、发热、腰痛等。其诊断考虑为

正确答案：BCE 您选择的答案：

习题集 妇产科学 月经失调

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 子宫内膜脱落不全的临床特征是

- A. 月经间隔时间不规则
- B. 经期5~7天
- C. BBT单相型
- D. 月经第5~6天，内膜切片中尚有分泌反应
- E. 黄体期9~10天

正确答案：D 您选择的答案：

第2题 关于无排卵型功血下列哪项是错误的

- A. 基础体温单相
- B. 好发于青春期和围绝经期
- C. 阴道涂片示中高度雌激素影响
- D. 青春患者内分泌测定示FSH持续低水平，LH无高峰形成，雌激素水平不稳定，无孕激素
- E. 子宫内膜病理示分泌不良

正确答案：E 您选择的答案：

第3题 与子宫内膜癌的癌前病变关系密切的是

- A. 子宫内膜腺囊性增生过长
- B. 子宫内膜腺瘤性增生过长
- C. 分泌期子宫内膜
- D. 萎缩型子宫内膜
- E. 增生期子宫内膜

正确答案：B 您选择的答案：

第4题 为确定病人为子宫内膜脱落不全时，取子宫内膜行镜检的最合适时间是

- A. 月经来潮12小时内
- B. 排卵期前后
- C. 月经来潮第5~6天
- D. 月经前期
- E. 月经期任何时间

正确答案：C 您选择的答案：

第5题 关于排卵型功血，下述哪项正确

- A. 多见于青春期、更年期
- B. 基础体温呈单相
- C. 周期短，规律，经量多少不定
- D. 月经中期缺LH高峰
- E. 月经前刮宫，内膜无分泌反应

正确答案：C 您选择的答案：

第6题 闭经病人作垂体兴奋试验(+)，表示

- A. 雌激素水平不足
- B. 有排卵
- C. Truner综合征
- D. 垂体性闭经
- E. 丘脑下部性闭经

正确答案：E 您选择的答案：

第7题 黄体功能不足型功血正确的是

- A. 青春期多见
- B. 月经周期正常，月经期延长
- C. 基础体温单相型
- D. 基础体温双相型，高温相持续9~10天
- E. 月经第5天刮宫，子宫内膜可见分泌期子宫内膜

正确答案：D 您选择的答案：

第8题 未婚女青年闭经，检查其卵巢功能简便易行的方法是

- A. 阴道脱落细胞检查
- B. 基础体温测定
- C. 宫颈粘液检查
- D. 子宫内活体组织检查
- E. 尿中雌孕激素测定

正确答案：B 您选择的答案：

第9题 闭经是指月经停止

- A. 至少3个月
- B. 至少6个月
- C. 至少2年
- D. 至少12个月
- E. 至少3年

正确答案：B 您选择的答案：

第10题 青春期与更年期功能性子宫出血的治疗原则，下列哪一项不同

- A. 止血

- B. 调整周期
- C. 减少经量
- D. 改善全身状况
- E. 恢复卵巢功能

正确答案：E 您选择的答案：

第11题 下列哪一项属于卵巢性闭经

- A Asherman综合征
- B Sheehan综合征
- C Tumer综合征
- D 空蝶鞍综合征
- E 多囊卵巢综合征

正确答案：C 您选择的答案：

第12题 Asheman综合征是指

- A 先天性染色体异常闭经
- B 闭经溢乳综合征
- C 垂体功能损害所致的闭经
- D 先天性无子宫
- E 子宫内膜损伤宫腔粘连的闭经

正确答案：E 您选择的答案：

第13题 子宫内膜脱落不全功血，正确的是

- A. 经前宫颈黏液出现羊齿状结晶
- B. 月经周期缩短，经期正常
- C. 基础体温呈双相型，但上升缓慢
- D. 月经第5天刮宫，子宫内膜可见分泌期子宫内膜
- E. 月经来潮6小时内刮宫，子宫内膜分泌反应不足

正确答案：D 您选择的答案：

第14题 卵巢性闭经时

- A. FSH升高
- B. LH升高
- C. PRL升高
- D. E<sub>2</sub>、P升高
- E. FSH、LH升高

正确答案：E 您选择的答案：

第15题 功血与子宫内膜息肉最好的鉴别诊断方法是

- A. 阴道脱落细胞涂片
- B. 基础体温
- C. 诊断性刮宫，内膜组织送病理
- D. 子宫输卵管碘油造影
- E. 根据病史及妇科检查鉴别

正确答案：C 您选择的答案：

第16题 功能失调性子宫出血是指

- A 生育年龄的子宫异常出血
- B 青春期子宫异常出血
- C 更年期子宫异常出血
- D 生殖器无器质性病变的出血
- E 伴有轻度子宫内膜非特异性炎症的子宫出血

正确答案：D 您选择的答案：

第17题 无排卵型功血正确的是

- A 子宫内膜为混合型内膜
- B 多发生在青春期和更年期
- C 出血主要取决于孕激素撤退
- D 基础体温双相
- E 产后哺乳期为最见的发生时间

正确答案：B 您选择的答案：

第18题 导致青春期无排卵型功血的原因是

- A. 不能形成正常月经周期中的FSH和LH峰状分泌
- B. 雌激素水平低落
- C. 黄体功能不全
- D. 内膜前列腺素含量过高
- E. 雌、孕激素水平均低落

正确答案：A 您选择的答案：

第19题 关于闭经的诊断，下列哪项是错误的

- A 孕激素试验(+)--卵巢能分泌雌激素
- B 雌激素试验(-)--原因在子宫
- C 刮取内膜检查可确定闭经类型
- D 女性第二性征发育良好--原因在子宫
- E 基础体温双相--原因在子宫

正确答案：C 您选择的答案：

第20题 更年期内分泌最早变化的是

- A 卵巢功能衰退



B 下丘脑功能退化  
C 垂体功能退化  
D 雌激素分泌增多  
E 促性腺激素分泌下降  
正确答案：A 您选择的答案：

第21题 闭经时孕激素试验(+)表示  
A 用孕激素后无撤药性出血  
B 子宫内膜有雌激素影响  
C 病变在子宫内膜  
D 卵巢无性激素分泌  
E 下丘脑下部-垂体-卵巢轴尚有功能  
正确答案：B 您选择的答案：

第22题 黄体萎缩不全所致的功血，哪项是错误的  
A 生育年龄妇女居多  
B 月经周期正常而经期延长  
C 阴道脱落细胞检查有助诊断  
D 基础体温双相，但不典型，体温下降延迟  
E 于月经第5天刮宫，见有分泌反应  
正确答案：C 您选择的答案：

第23题 卵巢性闭经时  
A 促卵泡素降低  
B 黄体生成素降低  
C 雌激素降低  
D 孕激素升高  
E 雄激素升高  
正确答案：C 您选择的答案：

第24题 垂体泌乳素瘤引起的疾病是  
A 多囊卵巢综合征  
B 闭经-泌乳综合征  
C 性早熟  
D 席汉征  
E 卵巢早衰  
正确答案：B 您选择的答案：

第25题 功能失调性子宫出血是指  
A 子宫肌瘤引起出血  
B 子宫内膜异位症引起月经过多  
C 子宫内膜息肉出血  
D 下丘脑-垂体-卵巢轴功能紊乱  
E 妊娠并发症引起出血  
正确答案：D 您选择的答案：

第26题 Asherman综合征是指  
A 先天性无子宫内膜  
B 产后大出血引起的闭经  
C 睾丸女性化综合征  
D 人流手术操作不当、造成宫腔粘连性闭经  
E 垂体肿瘤所致闭经  
正确答案：D 您选择的答案：

第27题 下列各项中，哪项为子宫性闭经  
A 给予孕酮--有子宫出血  
B 给予孕酮--无子宫出血  
C 雌孕激素序贯用药--有子宫出血  
D 雌孕激素序贯用药--无子宫出血  
E 给予促性腺激素--有子宫出血  
正确答案：D 您选择的答案：

第28题 关于功能失调性子宫出血，下列哪项说法正确  
A 常表现为月经周期正常，月经量过多，经期缩短  
B 是由于神经内分泌调节紊乱引起的异常子宫出血，内外生殖器无器质性病变  
C 卵巢功能性肿瘤所致的不规则阴道出血  
D 月经第5天刮宫，子宫内膜可见分泌期子宫内膜无排卵性功血多见于生育期妇女  
E 无排卵性功血一定表现为月经周期紊乱  
正确答案：B 您选择的答案：

第29题 关于子宫内膜的病理变化，下列说法错误的是  
A 增生期子宫内膜是月经周期中的增生期的正常变化  
B 无排卵型功血也可出现增生期子宫内膜  
C 子宫内膜腺瘤型增生过长是一种癌前病变  
D 子宫内膜腺囊型增生过长是无排卵性功血的表现  
E 萎缩型子宫内膜是无排卵性功血的表现  
正确答案：E 您选择的答案：

第30题 功血最常见于下列哪种情况  
A 服短效避孕药后

B 人工流产后  
C 急性子宫内膜炎  
D 颗粒细胞瘤  
E 卵巢性激素对下丘脑、垂体失去正常反馈作用  
正确答案：E 您选择的答案：

第31题 下述哪项与痛经无关

- A 子宫内膜异位症
- B 子宫腺肌瘤
- C 子宫颈管狭窄
- D 盆腔炎症
- E 无排卵型功血

正确答案：E 您选择的答案：

第32题 最简单而可靠的子宫性闭经诊断方法是

- A 子宫输卵管碘油造影
- B 阴道涂片
- C 孕激素试验
- D 雌激素试验
- E 诊断刮宫

正确答案：D 您选择的答案：

第33题 无排卵型功血最见的症状是

- A 出血时伴有下腹痛
- B 不规则子宫出血
- C 月经周期缩短
- D 经期延长
- E 贫血及全身不适

正确答案：B 您选择的答案：

第34题 关于无排卵性功能失调性子宫出血的临床表现，下列哪项说法不正确

- A 月经过多
- B 腹部肿块
- C 月经频发
- D 子宫不规则出血
- E 月经周期紊乱

正确答案：B 您选择的答案：

第35题 功能性月经失调促进排卵的最好方法是

- A 人工周期疗法
- B 雌激素周期方法
- C 氯米芬治疗
- D 黄体生成素释放激素
- E 刮宫

正确答案：C 您选择的答案：

第36题 月经后3~7天，下列哪项检查或治疗不适当

- A 取子宫内膜检查，确定是否有分泌期改变
- B 放置节育器
- C 腹腔镜
- D 剖腹探查术
- E 子宫输卵管造影术

正确答案：A 您选择的答案：

第37题 为确诊子宫内膜脱落不全时，诊刮最合适的时间是

- A 月经来潮12小时内
- B 排卵前后
- C 月经来潮5~6天
- D 月经前期
- E 任何时间

正确答案：C 您选择的答案：

第38题 无排卵型功血常见于

- A 产后
- B 流产后
- C 不育患者
- D 育龄期
- E 青春期及围绝经期

正确答案：E 您选择的答案：

第39题 功能性月经失调促进排卵的最好方法有

- A 人工周期疗法
- B 雌激素周期治疗
- C 氯底酚胺治疗
- D 黄体生成素释放激素
- E 刮宫

正确答案：C 您选择的答案：

第40题 无排卵月经的临床诊断及病理特征是

- A 多见于生育年龄妇女

B 月经量少而持续点滴状出血  
C 基础体温呈单相  
D 内膜腺上皮高柱状，有核下空泡  
E 间质细胞肥大，呈多边形  
正确答案：C 您选择的答案：

第41题 下列哪项应考虑为功血  
A 月经过多+进行性痛经  
B 月经周期紊乱+贫血  
C 月经过多+甲低  
D 月经过多+子宫增大不平  
E 月经不调+卵巢囊肿  
正确答案：B 您选择的答案：

第42题 最为常见的闭经是  
A 丘脑下部性闭经  
B 垂体性闭经  
C 卵巢性闭经  
D 子宫性闭经  
E 以上都不是  
正确答案：A 您选择的答案：

第43题 鉴别功血和子宫内膜息肉的最好方法是  
A 阴道脱落细胞检查  
B 基础体温测定  
C 诊刮、内膜活检  
D 子宫、输卵管造影  
E 由病史及妇科检查鉴别  
正确答案：C 您选择的答案：

第44题 40岁患功血，下述哪种变化以手术切除子宫为佳  
A 增殖期子宫内膜  
B 萎缩型子宫内膜  
C 子宫内膜腺瘤型增生过长  
D 子宫内膜腺囊型增生过长  
E 子宫内膜剥脱不全  
正确答案：C 您选择的答案：

第45题 更年期功能性子宫出血的激素变化是  
A . LH水平低  
B . FSH水平低  
C . FSH及LH均低  
D . FSH及LH均高  
E . 孕激素水平高  
正确答案：D 您选择的答案：

第46题 Sheehan综合征最常见的原因是  
A 胎盘早期剥离  
B 输卵管妊娠  
C 前置胎盘  
D 产后失血性休克  
E 不全流产大出血  
正确答案：D 您选择的答案：

第47题 复杂型增生的病理特征  
A . 瑞士干酪样外观  
B . 背靠背现象  
C . 腺上皮细胞层次增多  
D . 月经期仍表现为增生期形态  
E . 腺体少而小  
正确答案：B 您选择的答案：

第48题 生育期和围绝经期妇女功血时采用哪种止血方法最佳  
A . 大剂量雌激素反馈止血  
B . 一般止血药物止血  
C . 刮宫止血并送病理检查  
D . 中草药止血  
E . 肌注麦角新碱，促子宫收缩止血  
正确答案：C 您选择的答案：

第49题 诊断黄体萎缩不全功血的可靠依据是  
A 孕激素分泌量少  
B 月经第5天内膜有分泌反应  
C 雌激素分泌过多  
D 宫颈粘液呈椭圆体型  
E 基础体温呈双相  
正确答案：B 您选择的答案：

第50题 关于痛经，下列哪项是错误的  
A 原发性痛经在青少年期常见

B 前列腺素E2升高  
C 疼痛多自月经来潮后开始  
D 有时伴恶心、呕吐  
E 妇科检查无异常  
正确答案：B 您选择的答案：

第51题 正常的月经出现最可能为  
A．雌激素撤退性出血  
B．雌激素突破性出血  
C．雌孕激素撤退性出血  
D．孕激素突破性出血  
E．雌激素与孕激素突破性出血  
正确答案：C 您选择的答案：

第52题 下列哪项用孕激素治疗有效  
A 结核性子宫内膜炎  
B 子宫内膜萎缩  
C 子宫内膜对雌激素不起反应  
D 子宫内膜已受雌激素影响者  
E 垂体性闭经  
正确答案：D 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第53题 患者，35岁。继发闭经1年，雌激素试验(+)，FSH、LH值均，5U/L，多次重复垂体兴奋试验无反应，闭经的原因在  
A 丘脑下部  
B 卵巢  
C 垂体前叶  
D 子宫  
E 垂体后叶  
正确答案：C 您选择的答案：

第54题 病例28岁，继发闭经4个月。妇科检查：子宫无增大，双侧附件正常，尿妊娠试验阴性。肌肉注射黄体酮10mg，每日1次；共5天，停药后4天有撤退性流血。再行垂体兴奋试验，注药后45分钟黄体生成素增高8倍。引起此病例闭经的病变位于  
A．丘脑下部  
B．垂体前叶  
C．卵巢  
D．肾上腺皮质  
E．子宫  
正确答案：A 您选择的答案：

第55题 患者，X岁。自初潮后表现为月经开始前1天腹痛，时有恶心，子宫、附件正常，最可能是  
A 盆腔炎  
B 子宫内膜异位症  
C 盆腔结核  
D 宫颈炎  
E 原发性痛经  
正确答案：E 您选择的答案：

第56题 15岁少女，月经周期延长，2~3个月来潮一次，经量多导致贫血，现阴道流血已8日，量仍多。为止血目的，应采取的措施是  
A．肌注黄体酮注射液  
B．口服小剂量雌激素  
C．口服大剂量雌激素  
D．肌注丙酸睾酮  
E．静脉滴注缩宫素  
正确答案：C 您选择的答案：

第57题 患者26岁，婚后3年不孕，月经周期不规则。妇科检查无异常发现，基础体温呈单相型。应考虑为  
A．无排卵性功血  
B．有排卵性功血  
C．黄体发育不全  
D．黄体萎缩不全  
E．生殖器官畸形  
正确答案：A 您选择的答案：

第58题 56岁，月经紊乱1年，月经15~25/40~60天，经量时多时少。此次闭经50天后持续出血半月。体检：子宫稍大、软，宫颈光滑，附件阴性。应行哪项检查  
A．分段诊刮  
B．白带常规  
C．超声检查  
D．阴道涂片  
E．腹腔镜  
正确答案：A 您选择的答案：

第59题 30岁，月经4~5/24~25天，习惯性流产3次，基础体温呈双相，高温相持续8~10天，应诊断为

- A 黄体功能不足
- B 子宫内膜不规则脱落
- C 无排卵型功血
- D 有排卵功血，月经过少
- E 正常月经

正确答案：A 您选择的答案：

第60题 人流后1年未见月经来潮，子宫、附件均正常，孕激素试验(-)，基础体温双相，人工周期治疗3个月仍不见月经，其闭经原因可能是

- A 子宫内膜损伤
- B 卵巢病变
- C 垂体病变
- D 下丘脑病变
- E 高催乳素血症

正确答案：A 您选择的答案：

第61题 患者，26岁。分娩后出现产后出血，现产后2年，无月经，伴毛发脱落，最可能为

- A Swyer综合征
- B Asherman综合征
- C Sheehan综合征
- D Turner综合征
- E Stein-Leventhal综合征

正确答案：C 您选择的答案：

第62题 黄体功能不足患者，基础体温双相，周期缩短，应给下述何种治疗

- A 雌一孕激素序贯疗法
- B 排卵后肌注黄体酮10mg/d 10~14日
- C 低温相时给绒毛膜促性腺激素(hCG)
- D 低温相时给雌激素
- E 低温相时给孕激素

正确答案：B 您选择的答案：

第63题 28岁，产后8个月，月经周期延长，基础体温呈双相，但高温相下降迟缓，诊断为

- A 妊娠
- B 无排卵型功血
- C 黄体功能不足
- D 子宫内膜不规则脱落
- E 稽留流产

正确答案：D 您选择的答案：

第64题 48岁，大量阴道出血伴重度贫血，第3次住院刮宫止血，内膜病理为子宫内膜不典型增生，血红蛋白60g/L，白细胞正常，血压130/80mmHg。下一步治疗用何方法好

- A 孕激素周期疗法
- B 雌孕激素疗法
- C 止血药
- D 手术切除子宫
- E 放疗

正确答案：D 您选择的答案：

第65题 未婚青年，原发性闭经，第二性征发育正常，孕激素试验(-)，下一步应作的检查

- A FSH，LH，PRL放免测定
- B 垂体兴奋试验
- C 雌激素试验
- D 基础体温测定
- E 宫颈粘液结晶检查

正确答案：C 您选择的答案：

第66题 患者，45岁。停经42天开始阴道流血持续2周，基础体温单相，首选的措施是

- A 止血敏
- B 大量孕激素止血
- C 大量雌激素止血
- D 促排卵
- E 诊刮+病理

正确答案：E 您选择的答案：

第67题 45岁，月经4~9/18~30天，量多，基础体温呈单相，诊断为

- A 无排卵型功血
- B 黄体功能不足
- C 子宫内膜不规则脱落
- D 先兆流产
- E 正常月经

正确答案：A 您选择的答案：

第68题 患者，37岁。闭经半年，雌激素试验(+)，FSH>40U/L，闭经诊断为

- A 垂体性
- B 卵巢性
- C 子宫性
- D 下丘脑性
- E 肾上腺性

正确答案：B 您选择的答案：

第69题 30岁，月经周期为8~10/28天，基础体温呈双相，但高温相下降迟缓，月经第5天刮宫病理应为

- A 变性坏死的子宫内膜
- B 晚期分泌期子宫内膜
- C 增殖早期及具有分泌反应的腺体
- D 增生期子宫内膜
- E 蜕膜样组织

正确答案：C 您选择的答案：

第70题 雌激素试验(+)，FSH、LH均<5U/L，应用何种试验确定病变在垂体或下丘脑

- A 孕激素试验
- B 垂体兴奋试验
- C 雌孕激素测定
- D 甲状腺功能检查
- E 基础体温测定

正确答案：B 您选择的答案：

第71题 月经不调患者基础体温双相，但高温相持续时间为10天，应给治疗是

- A 雌-孕激素序贯疗法
- B 低温相时给雌激素
- C 低温相时给hCG
- D 月经第5天给克罗米酚
- E 月经后期给黄体酮肌注

正确答案：E 您选择的答案：

第72题 患者，34岁。继发闭经1年，伴有潮热，出汗，心烦，血FSH，40U/L，闭经原因可能是

- A 卵巢功能早衰
- B 子宫内膜结核
- C 垂体性闭经
- D 下丘脑性闭经
- E 精神因素

正确答案：A 您选择的答案：

第73题 26岁，继发性闭经4年。检查：卵巢正常大，孕激素试验阳性，再行GnRH试验，注射45分钟LH增高3倍。此病例的病变部位是

- A 丘脑下部
- B 垂体
- C 卵巢
- D 子宫
- E 肾上腺

正确答案：A 您选择的答案：

第74题 21岁，未婚，18岁初潮，量少，3~6个月一次，末次月经8个月前，经量更少。追问病史，不食肥肉，每日饭量2~3两及少量蔬菜。检查：形体消瘦，乳房发育尚可，阴毛稀少，外阴未婚式。肛查：子宫略小，双附件正常。此病人治疗首选

- A 小剂量雌激素周期治疗
- B 补充多种维生素
- C 用HCG诱发排卵
- D 纠正全身健康营养状况
- E 脉冲式微量GnRH促进垂体功能

正确答案：D 您选择的答案：

第75题 16岁，主诉月经初潮后一直紊乱1年半，本次月经持续1周不止。检查：面色苍白，阴毛稀少，阴道口可见鲜红色血块，子宫稍小于正常，双侧附件正常。为止血首选的处理是

- A 雌激素止血
- B 孕激素止血
- C 雌孕激素合并使用
- D 其他止血药
- E 诊刮止血

正确答案：C 您选择的答案：

第76题 34岁，闭经4个月，孕激素试验阳性，闭经的原因最不可能为

- A 垂体性
- B 下丘脑性
- C 卵巢性
- D 子宫性
- E 以上都不对

正确答案：D 您选择的答案：

第77题 患者30岁，半年来月经不规则，为9~10/28~29天，经量开始淋漓然后增多。妇科检查未发现异常，基础体温为双相型。应考虑为

- A 无排卵型功能性子宫出血
- B 黄体萎缩不全
- C 正常月经
- D 宫颈息肉
- E 慢性盆腔炎

正确答案：B 您选择的答案：

第78题 25岁原发不孕，月经周期不规则，妇科检查正常，基础体温呈单相，诊断为

- A 黄体功能不足

- B 无排卵型功血
- C 子宫内膜不规则脱落
- D 有排卵型功血
- E 排卵型功血，月经过多

正确答案：B 您选择的答案：

第79题 15岁，月经周期7~10/15~20天，量多，此次月经持续10余天未净，量多，基础体温单相，采用下列哪种止血较合适

- A 诊断性刮宫
- B 孕激素20mg/d×5肌注
- C 克罗米酚
- D 大量雌激素止血后逐渐减量，2周后加用孕激素
- E 止血芳酸

正确答案：D 您选择的答案：

第80题 48岁，G3P2，主诉18年前人流1次，现月经紊乱1年，末次月经10天前至今，近常感面部潮热。妇科检查：外阴、阴道正常，宫颈光滑，子宫正常大小，质中，无触痛，双附件正常，基础体温单相型，最可能的诊断是

- A 子宫内膜炎
- B 结核性腹膜炎
- C 老年性阴道炎
- D 子宫内膜癌
- E 无排卵性功血

正确答案：E 您选择的答案：

三、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第81-83题

15岁，14岁月经初潮，5天/24~30天。近半年痛经，伴恶心、呕吐，以月经第1天为重。检查未发现器质性病变。

1. 其诊断最可能为
  - A 原发性痛经
  - B 继发性痛经
  - C 子宫内膜异位症
  - D 子宫腺肌症
  - E 附件炎
2. 其病因可能为
  - A 前列腺素可使子宫平滑肌收缩引起痛经
  - B 经血中PG含量较正常高，尤其是PGE2上升使子宫平滑肌收缩
  - C 经血中PGF2<sub>2</sub>升高，致使子宫收缩而引起痛经
  - D 痛经常伴有宫颈管长而狭窄
  - E 分泌型子宫内膜PG含量明显低于增生期子宫内膜
3. 其治疗考虑下列哪种方案最合理
  - A 宫颈扩张，以利经血排出
  - B 月经来潮即用前列腺素合成酶抑制剂或PG拮抗剂
  - C 周期应用性激素
  - D 周期应用雄激素
  - E 应用止痛效果好的哌替啶或吗啡类

正确答案：BCB 您选择的答案：

第84-86题

患者，37岁。闭经，伴有潮热，出汗，查体：子宫、附件无异常所见，曾做雌激素试验(+)。

1. 该患的诊断首先考虑为
  - A 子宫性闭经
  - B 下丘脑性闭经
  - C 垂体性闭经
  - D 多囊卵巢综合征
  - E 卵巢功能早衰
2. 上述患者血化验的结果应为
  - A hCG
  - B LH-RH
  - C LH, FSH
  - D LH, FSH
  - E E
3. 上述患者下一步治疗应为
  - A 雌-孕激素序贯
  - B 促排卵
  - C 大剂量雌激素
  - D 大剂量孕激素
  - E 雄激素

正确答案：ECA 您选择的答案：

第87-89题

患者，47岁。近二年月经周期紊乱，血量多，此次又阴道流血20余天，伴头晕，心悸，查体：轻度贫血外观，子宫、附件正常

1. 该患首先考虑的诊断是
  - A 子宫肌瘤
  - B 宫颈息肉
  - C 无排卵功血
  - D 有排卵功血

- E 子宫腺肌症  
 2. 对上述病人，下步处置应为  
 A 止血芳酸  
 B 大量雌激素  
 C 大剂量雄激素  
 D 诊刮  
 E 大量孕激素  
 3. 假如该病人病理结果为子宫内膜重度不典型增生，下一步治疗应为  
 A 观察经过  
 B 全子宫切除  
 C 再次刮宫  
 D 放疗  
 E 全子宫+双附件+盆腔淋巴结切除  
 正确答案：CDB 您选择的答案：

#### 第90-92题

25岁，已婚妇女。婚后2年不孕，月经尚规律，停经45天后，阴道出血1个月，量少，无腹痛，妇检：宫颈充血，较软，子宫稍大，亦较软，附件(-)，宫颈粘液涂片为羊齿状结晶，尿妊娠试验(-)

1. 应诊断为  
 A 宫外孕  
 B 稽留流产  
 C 葡萄胎  
 D 功血  
 E 以上都不是  
 2. 上述病例该患下步的诊疗措施应为  
 A 诊刮  
 B 黄体酮20mg / d × 5肌注  
 C 避孕药口服  
 D 大量雌激素止血  
 E 子宫切除  
 3. 为同时解决不孕问题，同步进行治疗应为  
 A 雌-孕激素合并疗法  
 B 克罗米酚50mg / d × 5，月经第5天口服  
 C hCG于月经来潮前肌注  
 D 口服避孕药  
 E 人工授精  
 正确答案：DAB 您选择的答案：

#### 第93-95题

患者女性，27岁，婚后3年未孕，且出现月经不规律，近半年出现闭经、发胖

1. 最可能的诊断是  
 A. 闭经-溢乳综合征  
 B. 卵巢早衰  
 C. 子宫性闭经  
 D. 下丘脑性闭经  
 E. 多囊卵巢综合征  
 2. 最重要的辅助检查是  
 A. 腹腔镜检查  
 B. 内分泌检查  
 C. B超检查  
 D. MRI 检查  
 E. 头部CT  
 3. 下列哪项不是应有的内分泌特征  
 A. 雄激素过多  
 B. LH升高  
 C. FSH水平低  
 D. 胰岛素过少  
 E. LH/FSH > 2 ~ 3  
 正确答案：EBD 您选择的答案：

#### 第96-97题

35岁，曾生育2女孩，近半年来月经失调，8~12 / 26天，基础体温双相，月经第6天刮出子宫内膜病理为：仍可见分泌期内膜

1. 应考虑什么诊断  
 A 更年期月经紊乱  
 B 不全流产  
 C 黄体发育不全  
 D 黄体萎缩不全  
 E 无排卵型功血  
 2. 上述病例，该病人的下步治疗应为  
 A 月经前半期给雌激素  
 B 月经后第5天给克罗米酚  
 C 下次月经前8~10天给孕激素  
 D 雌-孕激素序贯  
 E 雌孕激素联合  
 正确答案：DC 您选择的答案：

四、A4型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。



第98-101题

女，26岁，肥胖，闭经，拟诊为多囊卵巢综合征。

1. 关于多囊卵巢综合征，妇科检查时最明显的阳性特征为

- A. 子宫明显增大
- B. 单侧卵巢增大
- C. 双侧卵巢增大
- D. 子宫与双侧卵巢均增大
- E. 阴毛稀疏

2. 最常见的临床表现是

- A. 间隔出现月经过多与闭经
- B. 原发性闭经
- C. 继发性月经稀发或闭经
- D. 进行性痛经
- E. 月经周期紊乱，经期长而淋漓不净

3. 内分泌测定其变化应为

- A. LH呈高水平持续分泌，无LH峰值
- B. FSH呈持续高水平，无FSH峰
- C. LH/FSH比值  $>3$
- D. 雄激素上升主要是硫酸脱氢表雄酮增加
- E. 雌酮/雌二醇比值低于正常周期

4. 如果确诊为多囊卵巢综合征，其治疗方案下列哪项不必考虑

- A. 抗雄激素治疗
- B. 抗雌激素治疗
- C. 促排卵治疗
- D. 卵巢楔形切除术
- E. HMG/HCG治疗

正确答案：CCAB 您选择的答案：

第102-105题

女性，49岁，近1年来月经紊乱，1个月2次或2~3个月1次，量多。妇科检查：宫颈光滑，子宫正常大小。拟诊为更年期功能失调性子宫出血。

1. 抽血做激素测定，其变化为

- A. LH水平降低
- B. FSH水平降低
- C. FSH及LH水平均降低
- D. FSH及LH水平均升高
- E. 孕激素水平升高

2. 若测其基础体温为单相型，患者应考虑为

- A. 无排卵性功能失调性子宫出血
- B. 有排卵性功能失调性子宫出血
- C. 黄体发育不全
- D. 黄体萎缩不全
- E. 黄体发育正常

3. 若行刮宫术取子宫内膜送病理检查，其报告下列哪项是错误的

- A. 增生期内膜
- B. 分泌期内膜
- C. 子宫内膜轻度增生过长
- D. 子宫内膜腺囊型增生过长
- E. 子宫内膜腺瘤型增生过长

4. 若子宫内膜病理检查报告为轻度增生过长，其治疗原则下列哪项是不需要的

- A. 止血
- B. 调整月经周期
- C. 减少经量
- D. 改善全身状况
- E. 恢复卵巢排卵功能

正确答案：DABE 您选择的答案：

第106-109题

女，39岁，已婚，闭经2年，黄体酮试验和雌激素试验均为阳性。妇科检查：子宫后位，较正常稍小，双附件正常。

1. 请问还需作哪项辅助检查

- A. 子宫内膜病理检查
- B. 腹腔镜检查
- C. 测血FSH、LH、PRL、E2
- D. 宫腔镜检查
- E. 阴道镜检查

2. 假如该患者的血FSH 100U/L，LH 80U/L，E2 182pmol/L，PRL 5μg/L。最可能的闭经原因是

- A. 大脑皮质功能障碍
- B. 下丘脑性
- C. 垂体性
- D. 卵巢性
- E. 子宫性

3. 如果造成闭经的原因是卵巢功能早衰，导致卵巢功能早衰的原因可能有下列几项，除外

- A. 自身免疫性疾病
- B. 产后大出血或感染引起的垂体前叶功能减退
- C. 手术或放射线影响卵巢血液循环
- D. 吸烟过度
- E. 遗传因素

4. 其治疗方法可选用

- A. 溴隐亭治疗
- B. 卵巢楔形切除术
- C. HMG / HCG治疗
- D. 性激素替代治疗
- E. 氯米芬促排卵

正确答案：CDBD 您选择的答案：

五、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第110-112题

- A. 任何时间均可
- B. 月经来潮12小时内
- C. 预测排卵日
- D. 预测排卵日的10天后
- E. 月经来潮第5天

1. 25岁，月经不规则，特别是经期长，为证实有无黄体萎缩不全，其刮宫最好安排在
2. 48岁，月经周期紊乱已1年，2~3个月来潮一次不等，经期长，经量多，伴血块，为排除子宫内膜癌做诊刮，刮宫时间最好安排在
3. 不孕症病人要求了解有无排卵，其刮宫时间安排在

正确答案：EAB 您选择的答案：

第113-115题

- A. 月经间隔时间正常，但经期延长9~10天，量多
- B. 月经周期紊乱，经期长短不一，出血时多时少
- C. 月经周期缩短，月经频发
- D. 月经周期正常，量多
- E. 月经中期出血，量少

1. 无排卵型功血
2. 子宫内膜脱落不全
3. 黄体功能不全

正确答案：BAC 您选择的答案：

第116-118题

- A. 经前诊刮子宫内膜分泌不足
- B. 经期第5天子宫内膜为混合型
- C. 经前诊刮子宫内膜呈增殖期
- D. 经前诊刮子宫内膜为分泌期
- E. 子宫内膜为蜕膜

1. 子宫内膜不规则脱落
2. 黄体功能不足
3. 无排卵型功血

正确答案：BAC 您选择的答案：

第119-120题

- A. 无排卵型功血
- B. 黄体功能不全
- C. 子宫内膜脱落不全
- D. 排卵型功血
- E. 排卵型月经过多

1. 基础体温单相型
2. 月经来潮前24小时取子宫内膜，病理示分泌不良

正确答案：AB 您选择的答案：

第121-123题

- A. 诊刮
- B. 大量雌激素使内膜迅速修复
- C. 大量孕激素以药物性刮宫
- D. 大量雄激素以减少出血
- E. 大量止血药以减少出血

1. 16岁，停经2个月，大量阴道出血伴重度贫血
2. 56岁，停经2个月，大量阴道出血伴重度贫血
3. 38岁，停经2个月，尿HCG(-)，大量阴道出血伴重度贫血

正确答案：BAA 您选择的答案：

第124-128题

- A. 子宫性闭经
- B. 卵巢性闭经
- C. 垂体性闭经
- D. 下丘脑性闭经
- E. 原发性闭经

1. 女性，18岁，第二性征已发育五月经来潮
2. 女性，24岁，人流后7个月无月经来潮，有周期下腹痛
3. 最常见的一类闭经
4. 女性，32岁，肥胖、多毛、闭经4年、不孕、LH/FSH > 2
5. 产后大出血休克，现产后两年，闭经、无乳、性欲减退、毛发脱落

正确答案：EADBC 您选择的答案：

第129-131题

- A 宫腔粘连
- B 性染色体异常
- C 39岁绝经
- D 产后出血休克
- E 闭经及乳汁分泌
- 1. Asherman综合征
- 2. Turnar综合征
- 3. Sheehan综合征

正确答案：ABD 您选择的答案：

习题集 妇产科学 滋养细胞疾病

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 下述哪项能否定完全性葡萄胎的诊断

- A 停经后阴道出血
- B 子宫大于妊娠月份
- C 妊娠试验(+)
- D 超声多普勒诊断(+)
- E 卵巢黄素囊肿

正确答案：D 您选择的答案：

第2题 葡萄胎，侵葡可靠的鉴别点是

- A 子宫增大的速度
- B 有无黄素囊肿
- C 尿妊娠试验稀释倍数
- D 阴道有无转移病灶
- E 阴道流血量多少

正确答案：D 您选择的答案：

第3题 关于滋养细胞肿瘤下述哪项是正确的

- A 侵葡发生于流产、足月产后
- B 绒癌可发生于流产、足月产后
- C 异位妊娠后不可能发生滋养细胞肿瘤
- D 合体细胞性子宫内膜炎是恶性改变
- E 绒癌尿妊娠试验均(+)

正确答案：B 您选择的答案：

第4题 女性41岁，已生育，诊断为葡萄胎，子宫超过孕14周大，首选治疗是

- A 清除宫内容物
- B 手术切除子宫
- C 先清宫再切除子宫
- D 化疗
- E 先化疗再清宫

正确答案：C 您选择的答案：

第5题 绒毛膜癌的治疗，以下哪项是最恰当的

- A 单纯切除子宫
- B 免疫疗法
- C 广泛性全子宫切除术加盆腔淋巴结清除术
- D 单纯中药治疗
- E 以化疗为主的综合治疗

正确答案：E 您选择的答案：

第6题 绒癌与侵蚀性葡萄胎的主要鉴别依据是

- A 尿HCG阳性
- B X线胸片有棉团状阴影
- C 不规则阴道流血
- D 阴道有紫蓝色转移结节
- E 病理检查无绒毛结构

正确答案：E 您选择的答案：

第7题 葡萄胎在清宫后血p-HCG通常几周降至正常水平

- A 2~4周
- B 4~8周
- C 8~12周
- D 12~14周
- E 14~16周

正确答案：D 您选择的答案：

第8题 侵蚀性葡萄胎可以发生在

- A 流产以后
- B 足月产以后
- C 葡萄胎以后
- D 异位妊娠后
- E 过期流产后

正确答案：C 您选择的答案：

第9题 葡萄胎的确诊依据是

- A 子宫增大已4个月，听不到胎心音
- B 阴道排出物中有水泡状组织
- C 血清β-HCG超过100kU/L，持续不降
- D 子宫大于相应妊娠月份
- E B型超声波检查见宫腔内充满弥漫光点和小囊样无回声区

正确答案：B 您选择的答案：

第10题 侵袭性葡萄胎多在葡萄胎几个月内发生

- A. 3个月
- B. 6个月
- C. 8个月
- D. 10个月
- E. 12个月

正确答案：B 您选择的答案：

第11题 关于葡萄胎随访概念中，下述哪项是正确的

- A. 葡萄胎有50%的恶变率
- B. 葡萄胎排出后，基础体温双相，恶变机会很大
- C. 葡萄胎排出8周内，妊娠试验持续(+)，恶变可能大
- D. 葡萄胎排出后持续(+)，恶变可能性小
- E. 葡萄胎排出后，应随访2年

正确答案：E 您选择的答案：

第12题 葡萄胎处理，下述哪项是错误的

- A. 一经确诊，应尽快清宫
- B. 必要的第二次刮宫
- C. 宫腔内刮出物病理检查
- D. 术后严密随访至妊娠试验(-)为止
- E. 嘱患者术后避孕二年

正确答案：D 您选择的答案：

第13题 处理葡萄胎时，最常用的方法是

- A. 刮宫术清除内容物
- B. 吸宫术清除内容物
- C. 全子宫切除术
- D. 催产素(缩宫素)引产
- E. 化疗

正确答案：B 您选择的答案：

第14题 葡萄胎随访期间最好的避孕方法是

- A. 安全期
- B. 工具
- C. 带避孕环
- D. 药物
- E. 绝育术

正确答案：B 您选择的答案：

第15题 部分胎盘水泡样变性是

- A. 绒毛呈退行性改变
- B. 绒毛滋养细胞增生
- C. 绒毛朗格汉斯细胞增生
- D. 绒毛间质在血管内扩张
- E. 绒毛间质高度水肿

正确答案：A 您选择的答案：

第16题 下列哪项组合是错误的

- A. 子宫内膜异位症—假孕疗法
- B. 子宫内膜癌晚期—孕酮治疗
- C. 卵巢黄素囊肿—手术切除
- D. 子宫内膜萎缩型功血—雌激素治疗
- E. 青春期无排卵功血—雌孕激素序贯疗法

正确答案：C 您选择的答案：

第17题 确诊侵葡和绒癌主要取决于

- A. 距良性葡萄胎后发生时间的长短
- B. hCG水平的高低
- C. 子宫大小程度不同
- D. 有无黄素囊肿
- E. 有无绒毛结构

正确答案：E 您选择的答案：

第18题 葡萄胎清宫后应避孕的时间为

- A. 6个月
- B. 1~2年
- C. 2~3年
- D. 0.5~1年
- E. 10个月

正确答案：B 您选择的答案：

第19题 绒癌最常见的转移部位依次是

- A. 肺、脑、肝、阴道
- B. 阴道、肺、肝、脑
- C. 肺、阴道、脑、肝
- D. 肝、脑、阴道、肺
- E. 肝、肺、阴道、脑

正确答案：C 您选择的答案：

第20题 侵葡的特点是

- A 小泡样组织局限宫腔
  - B 葡萄胎未排出前不会转变为侵葡
  - C 可无葡萄胎史
  - D 不发生宫旁、肺及阴道转移
  - E 葡萄胎组织侵入子宫肌层
- 正确答案：E 您选择的答案：

第21题 关于滋养细胞肿瘤下列哪项是正确的

- A 侵袭性葡萄胎发生于流产、足月产后
- B 绒癌可发生于流产、足月产后
- C 异位妊娠后不可能发生滋养细胞肿瘤
- D 合体细胞性子宫内膜炎是恶性改变
- E 绒癌尿妊娠试验均(+)

正确答案：B 您选择的答案：

第22题 下列各项哪项是错误的

- A 侵葡病理检查无绒毛结构
- B 子宫颈息肉极少恶变
- C 子宫脱垂多伴有膀胱膨出
- D 卵巢实质性肿瘤多是恶性
- E 长期用广谱抗生素，易引起霉菌性阴道炎

正确答案：A 您选择的答案：

第23题 葡萄胎最可靠的辅助诊断手段是

- A B型超声
- B CT检查
- C  $\beta$ -HCG定量
- D 阴道检查
- E 宫腔镜检查

正确答案：A 您选择的答案：

第24题 侵蚀性葡萄胎及绒毛膜癌最常见的转移部位是

- A 骨转移
- B 肝转移
- C 肺转移
- D 脑转移
- E 盆腔转移

正确答案：C 您选择的答案：

第25题 绒癌最常见的死亡原因是

- A 肺转移
- B 脑转移
- C 肾转移
- D 肠道转移
- E 肝转移

正确答案：B 您选择的答案：

第26题 对于葡萄胎的诊断价值最大的是

- A 子宫大于妊月
- B 停经后阴道流血
- C B型超声
- D 妊娠试验
- E 出现妊高征征象

正确答案：C 您选择的答案：

第27题 下列诊断依据哪项对葡萄胎最有意义

- A 妊娠5个月摸不到胎体
- B B超示落雪状图像
- C 血HCG  $> 100\text{IU/L}$
- D 阴道排出水泡状组织
- E 停经后阴道流血

正确答案：D 您选择的答案：

第28题 关于葡萄胎下述哪项是错误的

- A 葡萄胎患者较早出现妊高征征象
- B 葡萄胎及侵葡多合并黄素囊肿
- C 子宫小于妊娠月份可排除葡萄胎
- D 子宫体积异常增大与妊月不符
- E 阴道出血多发生在停经2~4月

正确答案：C 您选择的答案：

第29题 葡萄胎重要的病理特征是

- A 黄素化囊肿
- B 绒毛构型完好
- C 滋养细胞增生
- D 绒毛间质水肿
- E 间质内胚源性血管消失

正确答案：C 您选择的答案：

第30题 关于葡萄胎随访，下述哪项不需要

- A 定期做阴道细胞学涂片检查
- B 避孕措施不可采取上环
- C 相当时期内指导避孕
- D 定期作hCG定量检查
- E 必要时作胸部x线检查

正确答案：A 您选择的答案：

第31题 完全性葡萄胎的染色体基因组来源于

- A 母系
- B 父系
- C 母系和父系
- D 母系合子代
- E 父系合子代

正确答案：B 您选择的答案：

第32题 化疗对下述哪种肿瘤疗效最好

- A 卵巢上皮癌
- B 子宫内膜癌
- C 绒癌
- D 子宫颈癌
- E 内胚窦瘤

正确答案：C 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第33题 27岁已婚妇女，停经13周时出现不规则阴道出血，持续10余天，量不多，暗色，妇查：子宫新生儿头大，张力较大，两侧附件均可触及手拳大、活动好、光滑的肿物，最可能的诊断为

- A 妊娠合并卵巢囊肿
- B 妊娠合并子宫肌瘤及卵巢囊肿
- C 先兆流产
- D 葡萄胎
- E 胎妊娠

正确答案：D 您选择的答案：

第34题 患者，38岁。10年前曾患葡萄胎，无诱因开始阴道流血，持续2个月，量时多时少，诊刮病理报告结果为：见滋养细胞增生活跃，未见绒毛结构，最可能诊断

- A 绒癌
- B 子宫内膜癌
- C 侵葡
- D 功血
- E 子宫肌瘤

正确答案：A 您选择的答案：

第35题 上述病人化疗治疗方案首选

- A 5-FU+KSM
- B MTX(氨甲蝶呤)
- C 顺铂
- D 5-FU(5-氟尿嘧啶)
- E KSM(更生霉素)

正确答案：A 您选择的答案：

第36题 某患者产后5个月，突然抽搐，CT证实为颅内占位，手术后病理为绒癌脑转移，为进一步治疗，鞘内注射化疗药首选

- A 5-FU
- B MTX
- C KSM
- D CTX
- E VCR

正确答案：B 您选择的答案：

第37题 患者，26岁。人流术后半年，阴道不规则流血，近一个月开始厌食、恶心、肝区疼，肝脏超声，见多个异常回声，血hCG明显增高，诊断为绒癌肝转移，其分期为

- A Ⅰ期
- B Ⅱa期
- C Ⅱb期
- D Ⅲ期
- E Ⅳ期

正确答案：E 您选择的答案：

第38题 24岁女性，停经35天，阴道流血1天，血HCG > 100IU/L，最可能的诊断是

- A 早期妊娠
- B 多胎妊娠
- C 先兆流产
- D 异位妊娠
- E 葡萄胎

正确答案：E 您选择的答案：

第39题 停经10周，阴道流血3天，伴轻微下腹痛，首选检查应为

- A hCG定量
- B 尿妊娠试验
- C 腹平片
- D B超
- E A超

正确答案：D 您选择的答案：

第40题 患者产后四个月，突然抽搐，CT证实为颅内占位，手术后病理为绒癌脑转移，为进一步治疗，鞘内注射化疗药应首选

- A 5-FU
- B MTX
- C KSM
- D CTX
- E VCR

正确答案：B 您选择的答案：

第41题 42岁女性，末次妊娠人流后8年，现停经3月，阴道流血3天，子宫增大，但小于停经月份，血HCG > 100KIU/L。最可能的诊断是

- A. 先兆流产
- B. 宫外孕
- C. 葡萄胎
- D. 侵蚀性葡萄胎
- E. 绒癌

正确答案：E 您选择的答案：

第42题 患者23岁，停经3个月，阴道流血2周，查子宫大小超过妊周，阴道可见2cmX2cm紫蓝结节，宫旁无异常，侵蚀的分期为

- A I期
- B a
- C b
- D a
- E b

正确答案：C 您选择的答案：

第43题 患者，32岁。人流后1年，近日咳嗽，咳血丝痰，肺片示肺多个结节影，血hCG定量明显升高，诊断：绒癌肺转移，下步治疗为

- A 理疗
- B 抗炎
- C 肺叶切除
- D 放疗
- E 化疗

正确答案：E 您选择的答案：

第44题 40岁妇女，近1年来月经欠规则，7~10/40~60天，进行性头痛2+月，突然偏瘫，失语，抽搐，继之昏迷3小时，5年前患过葡萄胎。查：子宫较大，稍软，附件正常，下步需行什么检查

- A 脑脊液检查
- B 脑血管造影
- C 妊娠试验
- D 宫腔镜
- E 诊刮

正确答案：C 您选择的答案：

第45题 49岁妇女，人工流产后3个月，阴道中等量流血2周，尿妊娠试验(+)，子宫常大，稍软，胸部平片见双肺散在粟粒状阴影，诊断为

- A 葡萄胎
- B 侵葡
- C 绒癌
- D 吸宫不全
- E 合体细胞性子宫内膜炎

正确答案：C 您选择的答案：

第46题 女，26岁，人流术后半年，阴道不规则流血，近1个月开始厌食、恶心、肝区痛，肝脏超声见多个异常回声，血HCG明显增高，诊断为绒癌肝转移，其分期为

- A. I
- B. a
- C. b
- D.
- E.

正确答案：E 您选择的答案：

第47题 女，葡萄胎二次清宫术后6个月，阴道断续流血，妇科检查：阴道口5点处见2cm紫蓝色隆起物，宫颈光滑，子宫稍大，软，双附件正常。胸片未见异常，尿妊娠试验(+)，挖除阴道病灶病理组织学切片见到成堆高度增生滋养细胞及血块，无绒毛阴影，最可能的诊断是

- A. 子宫复旧不良
- B. 流产
- C. 吸宫不全
- D. 绒毛膜癌
- E. 侵蚀性葡萄胎

正确答案：D 您选择的答案：



第48题 42岁妇女，闭经3个月，宫底脐下2指，阴道不规则出血1周，咳血3天，今日突然出现剧烈腹痛，血压下降，查：腹肌紧张，压痛、反跳痛均(+)，有移动浊音，尿妊娠试验(+)，诊断是

- A 葡萄胎
- B 绒癌穿孔
- C 侵葡穿孔
- D 妊娠合并肌瘤红色变性
- E 妊娠合并卵巢囊肿蒂扭转

正确答案：C 您选择的答案：

第49题 患者，25岁。停经11周，阴道少量流血，检查：子宫底耻上三横指，子宫壁张力较大，B超示宫腔内为落雪状回声，最可能的诊断为

- A 先兆流产
- B 葡萄胎
- C 侵葡
- D 绒癌
- E 难免流产

正确答案：B 您选择的答案：

三、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第50-51题

患者，29岁。产后3个月，阴道持续少量流血，近日伴咳嗽，咳血丝痰，检查：子宫正常大小，软，附件正常，血hCG值明显增高

1. 首先考虑的诊断是

- A 合体细胞性子宫内膜炎
- B 盆腔结核
- C 绒癌
- D 产后子宫复旧不良
- E 子宫肌瘤

2. 该患者下步的诊疗措施

- A 诊刮
- B 化疗
- C 子宫切除
- D 放疗
- E 抗结核治疗

正确答案：CB 您选择的答案：

第52-54题

患者，27岁。停经3个月，阴道流血1周，血量不多，伴有轻微腹胀，查体：轻度贫血外观，腹部宫底脐下2指，未闻及胎心音

1. 下述哪样检查首选

- A 血hCG
- B 尿hCG
- C X线平片
- D B超
- E A超

2. 上述患者诊断为葡萄胎，下步处置应为

- A 葡萄胎清宫术
- B 化疗
- C 催产素引产
- D 刮宫术
- E 利凡诺尔引产

3. 上述患者，术后3个月，仍有阴道流血，子宫大，hCG值无下降，伴有咳嗽，进一步治疗应为

- A 观察经过
- B 化疗
- C 抗结核
- D 抗炎
- E 手术行子宫切除

正确答案：DAB 您选择的答案：

第55-57题

43岁，女，3个月前曾因葡萄胎行清宫术，随访HCG持续阳性

1. 目前最可能的诊断是

- A 葡萄胎残留
- B 持续性葡萄胎
- C 黄素化囊肿
- D 妊娠
- E 侵蚀性葡萄胎

2. 为鉴别诊断，目前最适宜的辅助检查是

- A 血HCG
- B 组织学检查
- C 分段诊刮
- D 子宫输卵管碘油造影
- E B型超声

3. 目前最适宜的处理方法是

- A 预防性化疗
- B 联合化疗

- C. 手术治疗
- D. 切除子宫
- E. 继续随访观察

正确答案：EEA 您选择的答案：

第58-59题

27岁，女性，停经3个月，阴道不规则流血10余天，量时多时少，无腹痛，查体：轻度贫血貌，宫底脐下1横指，未触及胎体，未闻及胎心

1. 首要诊断是

- A. 双胎妊娠
- B. 先兆流产
- C. 葡萄胎
- D. 羊水过多
- E. 前置胎盘

2. 如需鉴别诊断，首选哪项辅助检查

- A. 血HCG
- B. 组织学检查
- C. B型超声
- D. 分段诊刮
- E. X线检查

正确答案：CC 您选择的答案：

第60-62题

患者24岁，药物流产后2个月，阴道持续少量流血，查体：肺平片正常，腹软。内诊：阴道无异常所见，子宫前位，正常大小，软，于子宫左侧可及一包块约5cm×4cm×6cm，活动不良，与子宫分不开

1. 为进一步诊断应行

- A. 盆腔CT
- B. 胃肠钡透
- C. 血hCG+B超
- D. A超
- E. 诊刮

2. 该患诊断绒癌，分期为

- A. I期
- B. a期
- C. b期
- D. a期
- E. b期

3. 上述患者的下步治疗应为

- A. 剖腹探查行子宫切除
- B. 化疗
- C. 腹腔镜
- D. 二次刮宫
- E. 宫腔镜

正确答案：CBB 您选择的答案：

四、A4型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第63-65题

女，30岁，停经3个月，阴道少量流血1周，伴轻微腹胀。体检：轻度贫血貌，宫底脐下2指，未闻及胎心音。

1. 下列哪项检查首选

- A. 血HCG
- B. 尿HCG
- C. X线平片
- D. B超
- E. 诊刮

2. 若患者诊断为葡萄胎，下一步处理应为

- A. 葡萄胎清宫术
- B. 化疗
- C. 催产素(缩宫素)引产
- D. 刮宫术
- E. 全子宫切除术

3. 若患者术后3个月，仍有阴道流血，子宫大，HCG值无下降，伴有咳嗽，进一步治疗应为

- A. 随访观察
- B. 化疗
- C. 抗结核
- D. 抗炎
- E. 手术行子宫切除

正确答案：DAB 您选择的答案：

五、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第66-69题

- A. 空卵受精
- B. HCG特异性链
- C. 一个空卵与双精子受精
- D. LH、FSH和TSH共有链

E. 一个正常卵子与双精子受精

1.  $\alpha$ 链

2.  $\beta$ 链

3. 完全性葡萄胎

4. 部分性葡萄胎

正确答案：DBCE 您选择的答案：

第70-74题

A. 子宫腔内存在妊娠囊

B. 绒毛结构存在，并远处转移

C. 子宫腔内充满小囊样无回声，伴黄素化囊肿

D. 癌灶内存在两种类型的肿瘤细胞、出血坏死

E. 绒毛水肿、滋养细胞增生、间质内可见血管

1. 绒癌

2. 先兆流产

3. 完全性葡萄胎

4. 部分性葡萄胎

5. 侵蚀性葡萄胎

正确答案：DACEB 您选择的答案：

第75-77题

A. 葡萄胎

B. 侵蚀性葡萄胎

C. 绒癌

D. 胎盘部位滋养细胞肿瘤

E. 胎盘残留

1. 病理切片中见到绒毛结构的疾病不是

2. 由葡萄胎发展而来的疾病是

3. 流产后不规则流血，子宫内容物组织学检查为成团的滋养细胞，未见绒毛结构，诊断为

正确答案：CBE 您选择的答案：

习题集 妇产科学 女性生殖器肿瘤

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 子宫内膜癌的首选治疗方法是

- A．手术治疗
- B．手术、放射联合治疗
- C．放射治疗
- D．激素治疗
- E．化学治疗

正确答案：A 您选择的答案：

第2题 子宫肌瘤红色变性常发生在

- A．肌瘤扭转时
- B．性功能活跃时
- C．妊娠期
- D．分娩期
- E．月经期经量多时

正确答案：C 您选择的答案：

第3题 属于卵巢良性肿瘤的是

- A．内胚窦瘤
- B．颗粒细胞瘤
- C．库肯勃瘤
- D．卵泡膜细胞瘤
- E．无性细胞瘤

正确答案：D 您选择的答案：

第4题 卵巢上皮癌最常用的化疗药物是

- A 氮芥
- B 顺铂
- C 丝裂霉素
- D 5-氟尿嘧啶
- E 氨甲蝶呤

正确答案：B 您选择的答案：

第5题 子宫内膜癌镜检分型

- A 腺癌
- B 腺棘皮癌
- C 鳞腺癌
- D 透明细胞癌
- E 以上都是

正确答案：E 您选择的答案：

第6题 下列哪项不是黏膜下肌瘤的临床表现

- A．易出现白带增多
- B．月经周期缩短
- C．不规则阴道出血
- D．双合诊易触及肌瘤
- E．易继发感染

正确答案：D 您选择的答案：

第7题 关于子宫原位癌，下列哪项是错误的

- A 好发部位为宫颈鳞-柱上皮的交界区
- B 异型细胞不穿透基底膜，限于上皮层，无间质浸润
- C 不能用阴道镜检查来区别镜下早期浸润癌与原位癌
- D 与重度不典型增生较难区分
- E 有时有淋巴结转移

正确答案：E 您选择的答案：

第8题 关于卵巢肿瘤的治疗，正确的是

- A．卵巢囊肿<8cm者可观察
- B．卵巢肿瘤应立即剖腹探查
- C．Ic期应切除子宫、双附件及大网膜
- D．上皮性肿瘤对放疗不敏感
- E．妊娠合并卵巢肿瘤可等待至足月

正确答案：C 您选择的答案：

第9题 卵巢肿瘤最常见的并发症是

- A．扭转
- B．破裂
- C．感染
- D．出血
- E．恶变

正确答案：A 您选择的答案：

第10题 适用于各期宫颈癌而疗效较好的是

- A．手术治疗

- B. 放射治疗
- C. 化学疗法
- D. 手术及放射综合治疗
- E. 放疗及化疗综合治疗

正确答案：B 您选择的答案：

第11题 下列疾病中，哪种不容易发生生殖器异常出血

- A. 颗粒细胞瘤
- B. 黄体萎缩不全
- C. 老年性阴道炎
- D. 卵巢纤维瘤
- E. 子宫内膜异位症

正确答案：D 您选择的答案：

第12题 雄激素治疗子宫肌瘤应注意

- A. 大剂量
- B. 月用量<300mg
- C. 间断用药
- D. 月用量300~600mg
- E. 用于生育年龄

正确答案：B 您选择的答案：

第13题 子宫内膜癌局限于子宫体临床分期为

- A. 0期
- B. Ⅰ期
- C. Ⅱ期
- D. Ⅲ期
- E. Ⅳ期

正确答案：B 您选择的答案：

第14题 宫颈癌的确诊方法下列哪项最可靠

- A. 阴道镜检查
- B. 宫颈刮片细胞学检查
- C. 临床表现
- D. 宫颈多点活检病理切片
- E. 碘试验

正确答案：D 您选择的答案：

第15题 最常用于诊断卵巢肿瘤的辅助手段为下列何项

- A. CT检查
- B. B型超声
- C. 腹部平片
- D. 腹腔镜检查
- E. 细胞学检查

正确答案：B 您选择的答案：

第16题 关于宫颈癌早期症状下列哪项正确

- A. 阴道大量排液
- B. 接触性出血
- C. 反复阴道流血
- D. 大腿及腰骶部疼痛
- E. 排尿困难

正确答案：B 您选择的答案：

第17题 诊断性刮宫刮出多量豆腐渣样组织时，应高度怀疑

- A. 无排卵型功能失调性子宫出血
- B. 有排卵型功能失调性子宫出血
- C. 不全流产
- D. 子宫内膜癌
- E. 子宫肉瘤

正确答案：D 您选择的答案：

第18题 下列哪项依据不属于子宫内膜癌的治疗原则

- A. 子宫的大小
- B. 子宫肌层和颈管是被浸润或累及
- C. 癌细胞的分化程度
- D. 患者是否已绝经
- E. 患者全身健康状况

正确答案：D 您选择的答案：

第19题 宫颈癌初程淋巴转移不包括

- A. 宫颈旁淋巴
- B. 骶前淋巴
- C. 闭孔淋巴
- D. 髂内淋巴
- E. 髂外淋巴

正确答案：B 您选择的答案：

第20题 关于子宫肌瘤，下述哪项是错误的

- A. 粘膜下肌瘤较常发生月经量过多与不规则出血

B 浆膜下肌瘤较少出现月经过多  
C 膀胱充盈时，较大肌瘤可升至腹部，病人因此就医  
D 较大浆膜下肌瘤可发生蒂扭转  
E 浆膜下肌瘤最易引起不孕  
正确答案：E 您选择的答案：

第21题 子宫壁间肌瘤最主要的症状为

- A 月经不調
- B 绝经后出血
- C 月经过多
- D 接触性出血
- E 不规则阴道出血

正确答案：C 您选择的答案：

第22题 宫颈癌的好发部位是

- A 宫颈鳞状上皮
- B 宫颈柱状上皮
- C 宫颈鳞状上皮化区
- D 宫颈鳞、柱状上皮交接处
- E 宫颈鳞状上皮化生区

正确答案：D 您选择的答案：

第23题 下列哪种类型子宫内膜与子宫内膜癌关系最密切

- A 子宫内膜腺囊型增生过长
- B 子宫内膜腺型增生过长
- C 子宫内膜腺型增生过长伴细胞不典型增生
- D 增生期子宫内膜
- E 萎缩型子宫内膜

正确答案：C 您选择的答案：

第24题 子宫肌瘤最多见的发病年龄为

- A >35岁
- B <20岁
- C 30~50岁
- D 18~35岁
- E 40~50岁

正确答案：E 您选择的答案：

第25题 卵巢癌最常见的转移途径是

- A 血行转移到肝、肺
- B 沿卵巢淋巴管转移到髂内外淋巴结
- C 沿圆韧带转移到髂外及腹股沟淋巴结
- D 腹腔镜检查或腹壁穿刺抽腹水引起局部转移
- E 直接蔓延累及邻近器官及腹腔种植

正确答案：E 您选择的答案：

第26题 宫颈鳞状上皮化生，下列哪项不正确

- A 鳞状上皮化生是宫颈糜烂愈合的过程
- B 鳞状上皮化生代替了糜烂的柱状上皮和腺上皮
- C 如化生的鳞状上皮在排列、形态上有异常时，应诊断为不典型增生
- D 化生的鳞状上皮来自柱状上皮的基底细胞
- E 化生后的鳞状上皮是有可逆性，再成为糜烂面

正确答案：C 您选择的答案：

第27题 早期发现宫颈癌的最佳方法是

- A 阴道镜检查
- B 碘试验
- C 宫颈刮片细胞学检查
- D 宫颈活体组织检查
- E 宫颈锥形切除

正确答案：C 您选择的答案：

第28题 宫颈活检的病理报告为“鳞状上皮化生”，临床上应认为是

- A 无病变
- B 良性病变
- C 癌前病变
- D 低度恶性病变
- E 高度恶性病变

正确答案：B 您选择的答案：

第29题 早期确诊子宫内膜癌的主要方法是

- A 诊断性刮宫
- B 分段诊断性刮宫
- C 阴道脱落细胞检查
- D 宫腔冲洗液细胞检查
- E 宫腔镜

正确答案：B 您选择的答案：

第30题 宫颈癌癌前病变的病理变化是

- A 宫颈鳞状上皮化生

- B. 宫颈鳞状上皮化
- C. 宫颈腺体囊肿
- D. 宫颈重度糜烂
- E. 宫颈上皮内瘤样病变

正确答案：E 您选择的答案：

第31题 浆膜下子宫肌瘤最常见的症状是

- A. 月经量过多
- B. 血性白带
- C. 痛经
- D. 继发性贫血
- E. 下腹部包块

正确答案：E 您选择的答案：

第32题 关于卵巢恶性肿瘤的手术原则，下列哪项是错误的

- A. 肿瘤包膜破裂，不应行大网膜切除
- B. 一经疑为恶性应及早剖腹探查
- C. 交界性或低度恶性肿瘤，临床Ia期，年轻未生育，可考虑保留对侧卵巢，术后定期随访
- D. Ⅱ期及其以上者宜行肿瘤细胞减灭术
- E. 化疗、放疗可用于辅助治疗

正确答案：A 您选择的答案：

第33题 下列哪项不是子宫内膜癌的高危因素

- A. 肥胖
- B. 未婚
- C. 糖尿病
- D. 少产
- E. 性生活紊乱

正确答案：E 您选择的答案：

第34题 子宫内膜癌 期的治疗原则是

- A. 放疗
- B. 化疗
- C. 子宫根治术+盆腔淋巴结清除术
- D. 子宫全切术+双附件切除术
- E. 孕酮类治疗

正确答案：C 您选择的答案：

第35题 某患者48岁，体检时发现子宫肌瘤6个月。月经周期正常，经量偏少。妇科检查：子宫前位，如孕2个月大小，表面不平，有结节状突起，质硬。超声检查结果为多发性肌瘤，肌瘤大小与半年前比较无明显变化。该病例应采用下列哪项处理对策

- A. 随访观察
- B. 肌瘤挖除术
- C. 全子宫切除+双侧附件切除术
- D. 子宫次广泛切除术
- E. 雄激素治疗

正确答案：A 您选择的答案：

第36题 患者48岁，月经周期正常，月经量多5年。体检：血压120/75mmHg，心率98次/分，贫血貌，子宫如孕2个半月大小，表面不平，宫体左侧可扪及直径约5cm大小包块，质硬，与子宫体分不开，无压痛。该病人应首先考虑为

- A. 多发性子宫肌瘤
- B. 卵巢实质性肿瘤
- C. 子宫腺肌瘤
- D. 盆腔炎性包块
- E. 子宫内膜异位囊肿

正确答案：A 您选择的答案：

第37题 依子宫肌瘤与子宫肌层的关系分类，子宫肌瘤可分为

- A. 宫体肌瘤与宫颈肌瘤
- B. 带蒂肌瘤与无蒂肌瘤
- C. 粘膜下肌瘤、浆膜下肌瘤、壁间肌瘤
- D. 宫体肌瘤与阔韧带肌瘤
- E. 平滑肌瘤与纤维瘤

正确答案：C 您选择的答案：

第38题 宫颈癌的病因主要为

- A. 早婚、早育、多产
- B. 包皮垢的影响
- C. 单纯疱疹病毒 Ⅱ型及人类乳头状瘤病毒感染
- D. 慢性宫颈炎及宫颈裂伤
- E. 以上多种因素的协同作用

正确答案：E 您选择的答案：

第39题 宫颈癌最重要的转移途径是

- A. 血行转移
- B. 淋巴转移
- C. 直接蔓延和淋巴转移
- D. 播散种植
- E. 淋巴、血行转移为主，直接蔓延次之

正确答案：C 您选择的答案：

第40题 诊断子宫内膜癌最常用的方法是

- A. 宫腔镜检查
- B. 细胞学检查
- C. 分段诊刮
- D. B超检查
- E. CT检查

正确答案：C 您选择的答案：

第41题 麦格综合征见于哪种卵巢肿瘤

- A. 颗粒细胞瘤
- B. 卵泡膜细胞瘤
- C. 纤维瘤
- D. 无性细胞瘤
- E. 内胚窦瘤

正确答案：C 您选择的答案：

第42题 宫颈鳞状上皮化提示为

- A. 宫颈原位癌
- B. 宫颈上皮内瘤样病变
- C. 宫颈未分化储备细胞增生
- D. 宫颈糜烂愈合过程
- E. 人乳头状瘤病毒感染

正确答案：D 您选择的答案：

第43题 子宫内膜癌的病理类型哪一种最多见

- A. 内膜样腺癌
- B. 黏液性腺癌
- C. 浆液性腺癌
- D. 透明细胞癌
- E. 腺癌伴扁平上皮分化

正确答案：A 您选择的答案：

第44题 子宫肌瘤与经血量增多关系密切的是

- A. 肌瘤的大小
- B. 肌瘤的数目
- C. 肌瘤生长的部位
- D. 肌瘤与子宫肌层的关系
- E. 发生的年龄

正确答案：C 您选择的答案：

第45题 粘膜下子宫肌瘤最常见的症状是

- A. 下腹包块
- B. 痛经
- C. 月经过多，经期延长
- D. 白带过多
- E. 不育

正确答案：C 您选择的答案：

第46题 卵巢恶性肿瘤的特点是

- A. 肿瘤生长迅速
- B. 常为单侧性
- C. 血沉一般正常
- D. 病程较长
- E. 肿瘤表面光滑

正确答案：A 您选择的答案：

第47题 晚期子宫内膜癌患者，为暂时控制病情进展，应选用

- A. 放疗
- B. 化疗
- C. 放疗+手术治疗
- D. 孕酮类药物治疗
- E. 睾酮治疗

正确答案：D 您选择的答案：

第48题 下列哪种情况不是良性肿瘤的常见鉴别诊断

- A. 卵巢瘤样病变
- B. 子宫肌瘤
- C. 子宫内膜异位症
- D. 妊娠子宫
- E. 充盈的膀胱

正确答案：C 您选择的答案：

第49题 晚期卵巢癌的首选治疗方法是

- A. 肿瘤切除术
- B. 肿瘤细胞减灭术+化学治疗
- C. 激素治疗
- D. 化学治疗
- E. 放射治疗

正确答案：B 您选择的答案：



第50题 子宫内膜癌癌前病变是

- A. 增生期子宫内膜
- B. 子宫内膜单纯型增生
- C. 子宫内膜复杂型增生
- D. 子宫内膜不典型增生
- E. 萎缩型子宫内膜

正确答案：D 您选择的答案：

第51题 宫颈癌的早期临床表现不包括

- A. 接触性出血
- B. 绝经后阴道出血
- C. 阴道排液
- D. 消瘦、发热、乏力
- E. 可无症状

正确答案：D 您选择的答案：

第52题 宫颈癌的临床表现不包括

- A. 绝经后阴道出血
- B. 阴道排液
- C. 接触性阴道出血
- D. 不孕
- E. 血性白带

正确答案：D 您选择的答案：

第53题 下列哪项不是子宫肌瘤的临床表现

- A. 继发性贫血
- B. 下腹部包块
- C. 月经增多
- D. 压迫直肠导致便秘
- E. 压迫膀胱出现尿频

正确答案：D 您选择的答案：

第54题 子宫内膜癌与哪个因素无关

- A. 与雌激素的长期刺激有关
- B. 腺瘤型增生过长
- C. 不典型增生过长
- D. 腺囊型增生
- E. 多产

正确答案：E 您选择的答案：

第55题 确诊宫颈癌最可靠的方法是

- A. 宫颈刮片细胞学检查
- B. 阴道镜检查
- C. 碘试验
- D. 宫颈及颈管活体组织检查
- E. 分段诊刮

正确答案：D 您选择的答案：

第56题 下列关于外阴鳞状细胞癌的叙述中，错误的是

- A. 是最常见的一种外阴癌
- B. 外阴上皮不典型增生是外阴鳞状细胞癌的一种癌前病变
- C. 外阴上皮不典型增生不能逆转，将继续发展成原位癌、浸润癌
- D. 以直接浸润和淋巴转移较为多见
- E. 手术是主要的治疗手段

正确答案：C 您选择的答案：

第57题 子宫颈癌直接蔓延途径中最为常见的是

- A. 沿子宫下端肌壁间向上蔓延
- B. 沿阴道黏膜向下蔓延
- C. 沿宫旁两侧向盆壁蔓延
- D. 沿宫颈前方向膀胱蔓延
- E. 沿宫颈后方向直肠蔓延

正确答案：B 您选择的答案：

第58题 下列哪项属于宫颈癌淋巴结转移的二级组

- A. 腹股沟浅淋巴结
- B. 输尿管旁淋巴结
- C. 髂外淋巴结
- D. 闭孔淋巴结
- E. 宫旁淋巴结

正确答案：A 您选择的答案：

第59题 最常见的卵巢肿瘤是

- A. 浆液性囊腺瘤
- B. 粘液性囊腺瘤
- C. 畸胎瘤
- D. 库肯勃瘤
- E. 颗粒细胞瘤

正确答案：A 您选择的答案：

第60题 子宫颈癌的好发部位是

- A. 子宫颈管内
- B. 宫颈阴道部
- C. 宫颈阴道上部
- D. 鳞-柱上皮交界区
- E. 柱状上皮处

正确答案：D 您选择的答案：

第61题 肌瘤变性中，下面哪种最常见

- A. 玻璃样变
- B. 囊性变
- C. 红色变
- D. 肉瘤变
- E. 钙化

正确答案：A 您选择的答案：

第62题 子宫内膜癌术后2年内随访的时间为

- A. 2周1次
- B. 4周1次
- C. 2~3个月1次
- D. 3~6个月1次
- E. 6~12个月1次

正确答案：D 您选择的答案：

第63题 不引起阴道不规则出血及异常排液的生殖器官肿瘤是

- A. 子宫内膜癌
- B. 宫颈管癌
- C. 原发性输卵管癌
- D. 子宫黏膜下肌瘤
- E. 卵巢浆液性囊腺癌

正确答案：E 您选择的答案：

第64题 宫颈癌的临床分期是根据

- A. 有无淋巴结转移
- B. 术后所见修订分期
- C. 肉眼所见病灶大小
- D. 病灶累及的范围
- E. 临床症状严重程度

正确答案：D 您选择的答案：

第65题 子宫颈癌的预后主要与哪项因素有关

- A. 及时放疗
- B. 早期诊断、早期治疗
- C. 一般状态
- D. 是否贫血，能否耐受化疗
- E. 发热，白细胞高

正确答案：B 您选择的答案：

第66题 卵巢恶性肿瘤的转移途径主要是

- A. 直接蔓延和腹腔种植
- B. 腹腔种植
- C. 淋巴转移
- D. 血行转移
- E. 血行与淋巴转移为主

正确答案：A 您选择的答案：

第67题 易恶变的卵巢良性上皮肿瘤是

- A. 粘液性囊腺瘤
- B. 浆液性囊腺瘤
- C. 子宫内膜样瘤
- D. 纤维上皮瘤
- E. 透明细胞瘤

正确答案：B 您选择的答案：

第68题 关于子宫内膜癌的临床分期 期是指

- A. 子宫腔 ≤8cm
- B. 子宫腔>8cm
- C. 病灶局限于子宫腔内
- D. 病灶已侵及子宫颈
- E. 病灶已侵及直肠或膀胱

正确答案：D 您选择的答案：

第69题 适合随访观察的子宫肌瘤是

- A. 围绝经期
- B. 症状明显
- C. 肌瘤较大
- D. 生长较快
- E. 单发肌瘤

正确答案：A 您选择的答案：

第70题 下列哪项是宫颈原位癌

- A. 病变局限于上皮内，未突破基底膜，间质无浸润
- B. 病变局限于上皮内，异型细胞侵犯上皮的下2/3
- C. 异型细胞侵犯腺体，突破腺体基底膜
- D. 病变局限于上皮内，异型细胞侵犯上皮的下1/3
- E. 病变局限于宫颈

正确答案：A 您选择的答案：

第71题 下述哪项是早期宫颈癌的症状

- A. 阴道大量排液
- B. 反复阴道出血
- C. 接触性阴道出血
- D. 大腿及腰骶部疼痛
- E. 恶病质

正确答案：C 您选择的答案：

第72题 关于子宫肌瘤下述哪项正确

- A. 浆膜下肌瘤较粘膜下肌瘤发病率低
- B. 肌瘤组织中雌激素含量少
- C. 子宫肌瘤患者药物治疗效果差，均需手术
- D. 发生肉瘤变者少见
- E. 宫颈部位一般不会发生肌瘤

正确答案：D 您选择的答案：

第73题 子宫肌瘤的手术哪项最不恰当

- A. 粘膜下肌瘤可使用宫腔镜切除
- B. 希望保留生育功能的行肌瘤切除术
- C. 年龄45岁，肌瘤直径>10cm行子宫加双侧附件切除
- D. 突出脱于阴道的肌瘤，可经阴道切除
- E. 肌瘤较大不需要保留生育功能的行子宫切除

正确答案：C 您选择的答案：

第74题 卵巢癌最佳治疗措施是

- A. 化疗
- B. 放疗
- C. 手术切除
- D. 手术+化疗
- E. 化疗+放疗

正确答案：D 您选择的答案：

第75题 子宫颈癌的临床分期是根据

- A. 有无淋巴结转移
- B. 手术后所见修订分期
- C. 病理分级
- D. 病灶侵犯范围
- E. 临床症状的严重程度

正确答案：D 您选择的答案：

第76题 女性生殖器官中最常见的良性肿瘤是

- A. 外阴乳头状瘤
- B. 子宫肌瘤
- C. 卵巢良性畸胎瘤
- D. 卵巢浆液性囊腺瘤
- E. 卵巢粘液性囊腺瘤

正确答案：B 您选择的答案：

第77题 子宫肌瘤最常见的并发症是

- A. 红色变性
- B. 继发性贫血
- C. 浆膜下肌瘤蒂扭转
- D. 肌瘤压迫输尿管引起肾盂积水
- E. 肌瘤恶变

正确答案：B 您选择的答案：

第78题 卵巢肿瘤蒂扭转的主要症状是

- A. 急性腹痛
- B. 发热
- C. 恶性呕吐
- D. 白细胞升高
- E. 休克

正确答案：A 您选择的答案：

第79题 关于子宫内膜癌下列哪项是错误的

- A. 子宫内膜发生的癌，绝大多数为腺癌
- B. 为女性生殖道常见三大恶性肿瘤之一
- C. 多见于老年妇女
- D. 占女性生殖道恶性肿瘤的20%~30%
- E. 在我国其发生率也明显下降

正确答案：E 您选择的答案：

第80题 卵巢的良性肿瘤是

- A 尤性细胞瘤
- B 卵泡膜细胞瘤
- C 颗粒细胞瘤
- D 库肯勃瘤
- E 内胚窦瘤

正确答案：B 您选择的答案：

第81题 宫颈癌直接蔓延最常见的方式有

- A 向下至阴道粘膜
- B 向上至子宫内膜
- C 向前侵犯膀胱
- D 向后侵犯直肠
- E 向左右至主韧带

正确答案：A 您选择的答案：

第82题 卵巢良性囊性畸胎瘤最常见的并发症是

- A. 蒂扭转
- B. 破裂
- C. 感染
- D. 出血
- E. 恶性变

正确答案：A 您选择的答案：

第83题 关于分段刮宫哪项错误

- A. 是确诊子宫内膜癌最常用最可靠的方法
- B. 先用小刮匙环刮宫颈管，再进宫腔刮内膜
- C. 刮出物分瓶标记送病理检查
- D. 必须进行全面、彻底刮宫
- E. 当刮出多量豆渣样组织时应高度怀疑内膜癌

正确答案：D 您选择的答案：

第84题 成年人最常见的卵巢癌为

- A 浆液性囊腺瘤
- B 粘液性囊腺瘤
- C 子宫内膜样癌
- D 透明细胞癌
- E 转移性癌

正确答案：A 您选择的答案：

第85题 关于卵巢肿瘤的治疗，正确的是

- A. 卵巢瘤样病变以手术治疗为主
- B. 良性肿瘤无需手术治疗可定期观察
- C. 恶性肿瘤应行全子宫+双附件切除术
- D. 上皮性癌对化疗敏感，术后应化疗
- E. 卵巢囊肿直径<8cm可观察

正确答案：D 您选择的答案：

第86题 下述何项不属宫颈癌术后并发症

- A 心衰
- B 感染
- C 淋巴囊肿
- D 尿潴留
- E 输尿管瘘

正确答案：A 您选择的答案：

第87题 子宫肌瘤短期内迅速增大或伴有阴道出血应考虑

- A 感染
- B 囊性变
- C 红色变性
- D 脂肪样变
- E 肉瘤变

正确答案：E 您选择的答案：

第88题 关于粘膜下肌瘤的临床表现下列哪项是错误的

- A 不规则阴道出血
- B 发生症状较早较重
- C 易发生蒂扭转
- D 白带增多
- E 子宫呈均匀增大

正确答案：C 您选择的答案：

第89题 子宫内膜癌 期患者，首选的治疗措施应是

- A. 放射治疗
- B. 放疗后行全子宫及双附件切除术
- C. 行扩大子宫全切及双附件切除术
- D. 子宫广泛切除及盆腔淋巴结清扫术
- E. 大剂量孕激素类药物治疗

正确答案：D 您选择的答案：

第90题 关于卵巢肿瘤，下述哪项是正确的

- A 实质性肿瘤多为恶性
- B 卵巢恶性肿瘤的分期在手术前确定
- C 伴有腹水的卵巢肿瘤不适合手术
- D 无性细胞瘤多发生于更年期
- E 粘液性囊腺癌对放疗敏感性高

正确答案：A 您选择的答案：

第91题 子宫内膜癌的手术分期，腹腔细胞学检查阳性应为

- A. b
- B. a
- C. b
- D. c
- E. b

正确答案：B 您选择的答案：

第92题 子宫内膜癌侵犯宫颈首选治疗

- A. 全子宫双附件切除术
- B. 广泛性子宫切除及盆腔淋巴结清除术
- C. 子宫全切术
- D. 孕酮治疗
- E. 放射治疗

正确答案：B 您选择的答案：

第93题 内膜癌的癌前病变是

- A 萎缩型子宫内膜
- B 增生期子宫内膜过长
- C 子宫内膜腺瘤型增生
- D 子宫内膜腺囊型增生
- E 子宫内膜分泌反应不良

正确答案：C 您选择的答案：

第94题 子宫肌瘤合并妊娠易发生卜述哪种变性

- A 玻璃样变性
- B 囊性变
- C 坏死感染
- D 红色变性
- E 肉瘤变

正确答案：D 您选择的答案：

第95题 与子宫内膜癌发病有关的因素是

- A. 早婚，过早性生活
- B. 性生活紊乱
- C. 病毒感染
- D. 未育或少育
- E. 多次宫腔手术创伤

正确答案：D 您选择的答案：

第96题 卵巢恶性肿瘤手术保留对侧卵巢的条件下包括

- A. 年轻有生育要求
- B. 临床早期，肿瘤分化好
- C. 肿瘤为交界性或低度恶性
- D. 术中剖视对侧卵巢未发现肿瘤
- E. 术后有条件严密随访者

正确答案：B 您选择的答案：

第97题 最常用的普查宫颈癌的方法是

- A. 白带涂片检查
- B. 宫颈刮片检查
- C. 宫颈活组织检查
- D. 阴道镜检查
- E. 碘试验检查

正确答案：B 您选择的答案：

第98题 子宫肌瘤的症状与下述何项关系密切

- A 肌瘤的大小
- B 肌瘤生长的部位(宫体、宫颈)
- C 发生年龄
- D 肌瘤与肌层的关系(粘膜下、浆膜下、壁间)
- E 肌瘤之数目

正确答案：D 您选择的答案：

第99题 宫体癌综合征表现为

- A 肥胖
- B 高血压
- C 糖尿病
- D 未婚、少产
- E 以上都是

正确答案：E 您选择的答案：

第100题 卵巢肿瘤的并发症不包括

- A. 蒂扭转
- B. 破裂
- C. 感染
- D. 恶变
- E. 转移

正确答案：E 您选择的答案：

第101题 应用抗癌药物疗效最佳的是

- A. 原发性卵巢癌
- B. 卵巢转移癌
- C. 子宫颈癌
- D. 子宫内膜癌
- E. 绒毛膜癌

正确答案：E 您选择的答案：

第102题 能合成甲胎蛋白的卵巢肿瘤是

- A. 纤维瘤
- B. 内胚窦瘤
- C. 成熟畸胎瘤
- D. 库肯勃瘤
- E. 颗粒细胞瘤

正确答案：B 您选择的答案：

第103题 下列哪项不是卵巢瘤的并发症

- A. 蒂扭转
- B. 囊肿破裂
- C. 红色变性
- D. 感染
- E. 恶性变

正确答案：C 您选择的答案：

第104题 子宫内膜癌的转移途径，错误的是

- A. 可直接蔓延至宫颈管，侵犯宫颈及阴道
- B. 初起时癌灶沿子宫内膜生长扩散
- C. 位于宫体上段或宫底部的病灶可转移至腹主动脉旁淋巴结
- D. 癌灶扩散至宫颈管后可转移至盆腔淋巴结
- E. 血行转移较多见

正确答案：E 您选择的答案：

第105题 子宫内膜癌的高危因素不包括

- A. 长期服用孕激素
- B. 肥胖
- C. 高血压
- D. 糖尿病
- E. 绝经延迟

正确答案：A 您选择的答案：

第106题 最常用于诊断卵巢肿瘤的辅助手段为下列哪项

- A. CT检查
- B. B超
- C. 腹部平片
- D. 腹腔镜检
- E. 细胞学检查

正确答案：B 您选择的答案：

第107题 关于子宫内膜的手术分期， b是指癌组织

- A. 侵犯肌层 $>1/2$
- B. 侵犯阴道穹窿
- C. 侵犯宫颈间质
- D. 侵犯附件
- E. 侵犯直肠黏膜

正确答案：C 您选择的答案：

第108题 子宫肌瘤的手术指征包括

- A. 肌瘤数目多
- B. 需要妊娠生育
- C. 肌瘤8周妊娠大小
- D. 药物治疗肌瘤体积不缩小
- E. 合并继发贫血药物治疗效果差

正确答案：B 您选择的答案：

第109题 下列哪种肌瘤不易早期出现症状

- A. 浆膜下肌瘤
- B. 黏膜下肌瘤
- C. 肌壁间肌瘤
- D. 宫颈肌瘤
- E. 肌瘤红色变性

正确答案：A 您选择的答案：

第110题 恶性度最高的子宫内膜癌是

- A. 腺癌
- B. 角化腺癌
- C. 鳞腺癌
- D. 透明细胞癌
- E. 腺棘皮癌

正确答案：C 您选择的答案：

第111题 恶性卵巢肿瘤的主要治疗手段为

- A 手术治疗
- B 手术加化疗
- C 手术加放疗
- D 化疗
- E 手术加免疫治疗

正确答案：B 您选择的答案：

第112题 能引起子宫内膜增生过长的卵巢肿瘤是

- A. 成熟囊性畸胎瘤
- B. 卵泡膜细胞瘤
- C. 内膜样肿瘤
- D. 内胚窦瘤
- E. 浆液性囊腺瘤

正确答案：B 您选择的答案：

第113题 I期子宫内膜癌选择的手术方式

- A. 子宫次全切保留双附件
- B. 筋膜内子宫切除+双附件切除
- C. 次广泛子宫切除+双附件切除
- D. 广泛子宫切除+双附件切除
- E. 筋膜内子宫切除保留双附件

正确答案：C 您选择的答案：

第114题 宫颈痛晚期死亡的主要原因

- A 出血
- B 感染
- C 尿毒症
- D 恶病质
- E 以上都是

正确答案：E 您选择的答案：

第115题 能产生雌激素的肿瘤是

- A. 颗粒细胞瘤
- B. 纤维瘤
- C. 内胚窦瘤
- D. 成熟畸胎瘤
- E. 库肯勃瘤

正确答案：A 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第116题 40岁妇女，孕5产1，阴道不规则出血达8个月，妇查：宫颈肥大，可见凿陷样溃疡，边缘硬。左侧宫颈旁组织厚而硬，双穹(-)宫颈活检为鳞状上皮癌。其分期

- A 颈癌 a期
- B 颈癌 b期
- C 颈癌 a期
- D 颈癌 b期
- E 颈癌IVa期

正确答案：B 您选择的答案：

第117题 15岁女孩，剖腹手术中快速冰冻病理切片回报：左卵巢颗粒细胞瘤低度恶性。肉眼所见：右卵巢略大，左卵巢未见异常，探查盆腹腔未见其他异常，应行何手术

- A. 左附件切除
- B. 双附件切除
- C. 子宫全切+左附件切除
- D. 子宫次全切+左附件切除
- E. 左附件切除+放疗

正确答案：E 您选择的答案：

第118题 51岁妇女，绝经3年，阴道流血3个月，阴道细胞学检查结果巴氏 级，进一步处理：

- A 切除子宫
- B 子宫次广泛切除
- C 阴道镜检查
- D 诊断性刮宫+宫颈活体组织检查
- E 宫颈锥形切除术

正确答案：D 您选择的答案：

第119题 宫颈癌患者，64岁，肥胖，查宫颈肥大，结节状，硬，表面呈糜烂状外观，阴道无浸润，子宫正常大小，

双附件正常，最佳治疗方案是  
A 广泛性子宫切除+盆腔淋巴结清除术  
B 次广泛性子宫切除  
C 全子宫切除  
D 放疗  
E 化疗  
正确答案：D 您选择的答案：

第120题 45岁女性，接触性阴道流血5个月，查宫颈重度糜烂状，宫体前位，正常大小，宫旁主韧带增厚，未达盆壁。为确定诊断应作哪项检查  
A 宫颈刮片细胞学检查  
B 阴道镜检查  
C 宫颈活组织检查  
D 宫颈锥形切除术  
E 碘试验  
正确答案：C 您选择的答案：

第121题 22岁妇女，婚检发现：子宫后位，大小正常，直肠窝扪及一孕2+月大小半囊半实包块，活动，无压痛，x线盆腔检查右侧可见钙化点，下述哪项是正确的  
A 包块可能为恶性  
B 包块通常由单胚层细胞构成  
C 常为双侧  
D 发病高峰年龄是40岁  
E 最易发生扭转  
正确答案：E 您选择的答案：

第122题 13岁女孩右下腹包块3个月，肛诊子宫右侧触及约12cm×10cm×8cm囊性肿物，光滑，活动佳，腹部平片右下腹有3个大小不等钙化点，其诊断是  
A 无性细胞瘤  
B 良性囊性畸胎瘤  
C 内胚窦瘤  
D 胀大的膀胱  
E 颗粒细胞瘤  
正确答案：B 您选择的答案：

第123题 58岁女性，绝经5年，少许阴道流血2个月，妇科检查：外阴丰满，阴道可见粘膜皱襞，分泌物多，应疑为  
A 卵巢无性细胞瘤  
B 卵巢颗粒细胞瘤  
C 卵巢纤维瘤  
D 卵巢内胚窦瘤  
E 睾丸母细胞瘤  
正确答案：B 您选择的答案：

第124题 42岁妇女，阴道不规则出血1年，白带有味，妇查：宫颈可见乳头样增生，触及出血，表面多量白色分泌物呈黄绿色，宫旁结节状增厚，未达盆壁，阴道穹隆部硬，可见小溃疡，宫颈活检为鳞状上皮癌，其治疗原则为  
A 全子宫及双附件切除术  
B 子宫根治术+盆腔淋巴结清除术  
C 放疗+手术治疗  
D 放射治疗  
E 化疗  
正确答案：C 您选择的答案：

第125题 50岁妇女，细胞学已证实为子宫内膜癌，宫腔长8cm，宫颈无癌侵犯，腹腔冲洗液无癌细胞，应选用  
A 单纯手术  
B 放疗  
C 化疗  
D 孕激素治疗  
E 放疗+手术  
正确答案：A 您选择的答案：

第126题 女，20岁，发现腹胀，食欲下降2个月，检查发现：腹膨隆，肛查子宫正常大，右下腹包块如婴儿头颅大，活动，剖腹探查：腹水淡黄，清，约2000ml，子宫正常大小，双输卵管，左卵巢，大网膜，阑尾外观未见异常，右卵巢包块直径10cm，表面呈结节状，切面似脑组织，质脆，冰冻切片示：右卵巢未成熟性畸胎瘤，手术范围最佳应为  
A 右卵巢切除术  
B 右附件切除+子宫全切术  
C 双附件切除+子宫切除术  
D 双附件切除+子宫切除+大网膜切除  
E 双附件+子宫+大网膜+阑尾切除  
正确答案：E 您选择的答案：

第127题 55岁女性，绝经5年，近3个月阴道水样白带，近半个月出现阴道间断少量流血。查宫颈光滑，宫体稍大且软，附件未扪及。诊刮出多量质脆内膜。本例最可能的诊断为  
A 颈管腺癌  
B 子宫内膜增生过长  
C 子宫内膜息肉  
D 子宫内膜癌  
E 输卵管癌  
正确答案：D 您选择的答案：

第128题 52岁女性，绝经2年后出现水样白带半年，阴道不规则少量流血1周。妇科检查：宫颈光滑，宫体正常大



小，双附件未触及异常；分段诊刮：宫颈未刮出组织，宫腔8cm，刮出较多似豆渣样组织，病理诊断为宫体腺癌。应如何处理

- A．子宫广泛切除术，盆腔淋巴结清扫术
- B．子宫次广泛切除术，盆腔淋巴结清扫术
- C．子宫次广泛切除术
- D．放射治疗
- E．孕酮治疗

正确答案：B 您选择的答案：

第129题 56岁妇女，绝经7年又出现少量不规则阴道流血，于子宫右侧可触及一能与子宫分开，手拳大小的实质性肿物，诊断性刮宫为子宫内膜呈腺囊型增生，本例最可能诊断是

- A 卵巢纤维瘤
- B 子宫内膜癌前期病变
- C 卵巢颗粒细胞瘤
- D 卵巢成熟"实性"畸胎瘤
- E 以上都不是

正确答案：C 您选择的答案：

第130题 左下腹肿块多年，28岁妇女，妇查：子宫正常大小，左侧可触及约3个月妊娠子宫大小的囊性肿物，在解大便后突然感到左下腹持续疼痛，拒按。这一征象表明

- A 囊肿破裂
- B 囊肿蒂扭转
- C 囊内感染
- D 囊内出血
- E 恶性变

正确答案：B 您选择的答案：

第131题 17岁女孩，下腹包块2个月，增大迅速，查体：肿物如妊娠6个月大小，质块不均匀，实性，血性腹水，血清AFP测定阳性，最可能诊断是

- A 浆液性囊腺癌
- B 无性细胞瘤
- C 内胚窦瘤
- D 颗粒细胞瘤
- E 粘液性囊腺癌

正确答案：C 您选择的答案：

第132题 60岁妇女，绝经11年，阴道流血2个月，一般状态尚好。妇检：子宫约孕8周大小，质软，分段诊刮病理汇报：子宫内膜癌腺癌累及宫颈。胸片(-)，心电图正常，其最佳手术方式是

- A 子宫全切术
- B 子宫全切术+双附件切除术
- C 子宫根治术
- D 子宫根治术+双侧盆腔淋巴结清除术
- E 子宫次全切除术

正确答案：D 您选择的答案：

第133题 15岁少女，腹部叩诊移动性浊音(+)。肛诊左附件区触及新生儿头大实质肿瘤，血清甲胎蛋白值明显升高。本例最可能的诊断是

- A．卵巢未成熟畸胎瘤
- B．卵巢内胚窦瘤
- C．卵巢浆液性囊腺瘤
- D．卵巢颗粒细胞瘤
- E．卵巢纤维瘤伴腹水

正确答案：B 您选择的答案：

第134题 32岁，妇女，不规则阴道出血半年，妇查：阴道内可扪及自宫颈口脱出的4cm×5cm肿物，最适宜的处理

- A 推至宫腔内后，立即开腹切除子宫
- B 经阴道摘除送病理检查
- C 抗感染，待其自然还纳
- D 行开腹探查术
- E 行分段诊刮送病理检查

正确答案：B 您选择的答案：

第135题 45岁女性，体检时发现宫颈中度糜烂，子宫正常大小，双附件未触及异常，宫颈活检示宫颈原位癌，应

- A．子宫全切除术
- B．宫颈锥形切除术
- C．子宫全切除术及双侧附件切除术
- D．子宫全切除术、双侧附件切除术及盆腔淋巴结清扫术
- E．放疗

正确答案：A 您选择的答案：

第136题 29岁妇女，孕5产0，白带中有血丝，曾患外阴尖锐湿疣，现已治愈。妇查：子宫正常大小，宫颈中度糜烂，子宫活动好，附件(-)，双穹(-)，宫颈刮片检查1次阳性。阴道镜下宫颈活检，宫颈原位癌，该患者要求保留生育功能，应采取何种治疗方法

- A 子宫全切术
- B 扩大子宫切除术
- C 宫颈锥切术，术后密切定期随访
- D 子宫根治术
- E 子宫根治术+盆腔淋巴结清扫术

正确答案：C 您选择的答案：

第137题 女，54岁，绝经2年，阴道流血1个月，外阴、阴道萎缩不明显，宫颈光滑，子宫正常大，右侧触及8cm×6cm×4cm大小韧性椭圆形包块，稍活动，左附件正常，阴道细胞涂片提示雌激素水平高度影响，分段诊断性刮宫，子宫内膜活检病理为子宫内膜腺囊性增生，颈管内膜未见异常，此病首先应考虑为

- A．功能失调性子宫出血
- B．卵巢皮样囊肿
- C．卵巢子宫内膜异位囊肿
- D．卵巢颗粒细胞瘤
- E．子宫内膜癌

正确答案：D 您选择的答案：

第138题 女，50岁，阴道镜检宫颈取材病理所见为异型上皮达到上皮全层，采取哪种治疗最合适

- A．激光治疗
- B．电熨治疗
- C．冷冻治疗
- D．宫颈锥形切除
- E．全子宫切除术

正确答案：E 您选择的答案：

第139题 53岁妇女，孕3产1，月经不规则2年，周期长短不一，经量多少不定，白带有时带血。妇查：外阴阴道(-)，宫颈光滑，宫体稍大，质软，双穹(-)，哪项措施最恰当

- A 口服避孕药1号
- B 使用甲基睾丸素
- C 使用孕酮
- D 分段诊刮
- E 宫腔镜检查

正确答案：D 您选择的答案：

第140题 54岁妇女，10年前右下腹部有一手拳大肿物，逐渐增大，现已达妊娠足月大小，仍能进行轻微家务活动。本例卵巢肿瘤最可能是

- A．良性囊性畸胎瘤
- B．浆液性囊腺瘤
- C．粘液性囊腺瘤
- D．无性细胞瘤
- E．卵泡膜细胞瘤

正确答案：C 您选择的答案：

第141题 28岁女性，妊娠6个月，有接触性阴道流血及白带增多，窥器下见宫颈外观呈菜花状，宫颈活组织检查除外癌变，最可能的诊断是

- A．宫颈糜烂
- B．宫颈息肉
- C．宫颈乳头状瘤
- D．宫颈结核
- E．宫颈囊肿

正确答案：C 您选择的答案：

第142题 48岁妇女，绝经1年，阴道少许接触出血，查：子宫颈中度糜烂，宫体稍小，子宫颈刮片检查2次均阳性，阴道镜下宫颈活检阳性，应选择哪种方法排除子宫颈癌

- A 分段诊刮
- B 随访
- C 染色体检查
- D 子宫颈锥形切除
- E 子宫腔冲洗液诊断

正确答案：A 您选择的答案：

第143题 女，65岁，主诉血性白带，妇科检查：子宫颈无糜烂，宫体稍大，后穹窿分泌物涂片检查找到癌细胞。进一步处理最佳方案是

- A．B超检查
- B．碘试验
- C．阴道镜检查
- D．分段诊断性刮宫
- E．宫颈荧光检查

正确答案：D 您选择的答案：

第144题 女，45岁，白带多，性交后出血已3个月，检查宫颈呈糜烂状外观，接触性出血，为明确诊断采用何种检查最适宜

- A．宫颈涂片细胞检查
- B．宫颈多点活检
- C．阴道镜检查
- D．宫颈锥切检查
- E．宫颈上皮的碘油染色

正确答案：B 您选择的答案：

第145题 女，49岁，绝经1年，子宫稍小，右侧附件区触及6cm×6cm×4cm囊实性不均肿物，活动欠佳，左附件正常，剖腹探查见少量血性腹水，细胞学检查找到可疑癌细胞，卵巢肿瘤切除快速切片组织学检查，提示为腺癌，最恰当的治疗是

- A．全子宫+右侧附件切除术
- B．全子宫+双侧附件切除术
- C．全子宫+双附件切除+盆腔淋巴结清除术
- D．全子宫+双侧附件+大网膜切除术
- E．全子宫+双侧附件+大网膜切除术，术后化疗

正确答案：E 您选择的答案：

第146题 女，58岁，绝经8年，阴道流淘米水样物3个月，宫颈后唇菜花样突起，后穹窿黏膜粗糙，子宫较正常小，水平位，双附件正常，双侧主韧带均增厚，未达盆壁，宫颈活检组织切片，鳞状上皮癌 Ⅱ级，选用哪种方法最正确

- A．子宫根治术
- B．子宫根治术及盆腔淋巴结清除术
- C．放射治疗
- D．子宫根治术，术后放射治疗
- E．放射治疗后行子宫根治术

正确答案：C 您选择的答案：

第147题 48岁妇女，绝经1年，阴道少许接触性出血。妇查：宫颈中度糜烂，宫体大小正常，宫颈刮片二次均为阴性，若进一步确诊，应选下述哪项检查

- A 宫腔镜检查
- B 染色体检查
- C 宫腔冲洗液细胞学检查
- D 分段诊刮
- E 随访

正确答案：D 您选择的答案：

第148题 女，右下腹阵发性绞痛伴恶心呕吐5天，6个月前上环时发现左侧卵巢囊性肿物4cm×5cm×5cm。检查：体温38℃，右下腹压痛(+)，子宫正常大，其右侧触及一8cm×6cm×6cm囊性肿物，张力较大，压痛，活动受限，左侧附件正常。白细胞12.0×10<sup>9</sup>/L，中性0.90，最可能的诊断是

- A．卵巢囊肿扭转
- B．卵巢囊肿扭转合并感染
- C．肾盂积水
- D．宫外孕
- E．子宫浆膜下肌瘤扭转

正确答案：B 您选择的答案：

第149题 18岁少女，2小时前突然左下腹剧烈疼痛。恶心呕吐2次，体温37.4℃。肛查：子宫左侧有手拳大、稍活动、触痛明显的包块。本例最可能的诊断是

- A．盆腔炎症性包块
- B．输卵管结核
- C．卵巢子宫内异位囊肿破裂
- D．子宫浆膜下肌瘤扭转已卵巢肿瘤蒂扭转
- E．卵巢肿瘤蒂扭转

正确答案：E 您选择的答案：

第150题 42岁妇女，扪及下腹有肿块半年，并有月经不规则。近3年来，经常感觉胃区不适，妇查：子宫正常大小，活动，无压痛，双附件均触及实性包块，呈肾形，约孕2个月子宫大小，活动，其诊断可能是

- A 卵巢颗粒细胞瘤
- B 库肯勃瘤
- C 胚胎性瘤
- D 黄素囊肿
- E 卵巢囊腺瘤

正确答案：B 您选择的答案：

第151题 32岁，妇女，孕3产0，自然流产3次，B超：子宫前壁可探及9cm×12cm×10cm大小的强回声光团，附件正常，最适宜的治疗方法

- A 药物保守治疗
- B 肌瘤切除术
- C 子宫全切术
- D 子宫次全切除术
- E 诊断性刮宫

正确答案：B 您选择的答案：

第152题 某妇女，30岁。孕1产0，宫内妊娠20周，合并子宫壁间肌瘤，主诉：下腹痛7天，合并低热，无阴道流血。WBC：9×10<sup>9</sup>/L。最可能的诊断是

- A 子宫肌瘤合并感染
- B 子宫肌瘤红色变性
- C 子宫肌瘤囊性变
- D 子宫肌瘤蒂扭转
- E 妊娠合并阑尾炎

正确答案：B 您选择的答案：

第153题 48岁妇女，绝经5年，腹胀，腹部长大3个月，妇检：宫颈光滑，子宫水平位稍小于正常，右附件扪及10cm×8cm×6cm大小实质性包块，活动，腹穿抽出清亮腹水；胸片：双侧胸腔少量积液，下述哪种卵巢瘤可能性最大

- A 纤维瘤
- B 颗粒细胞瘤
- C 内胚窦瘤
- D Krukenberg瘤
- E 浆液性囊腺瘤

正确答案：A 您选择的答案：

第154题 35岁女性，性交后阴道流血2个月，妇科检查见宫颈中度糜烂状，宫颈活组织检查示异型细胞占据上皮层的下1/3～2/3，应如何处置

- A．可暂时按炎症处理
- B．应行子宫全切除术
- C．可行激光、冷凝等治疗，术后定期随访

D. 应行子宫全切及双侧附件切除术  
E. 暂时不需处理, 随访观察  
正确答案: C 您选择的答案:

第155题 38岁初孕妇, 妊娠2个月, 合并半拳大小的卵巢囊肿, 何时可手术治疗

- A. 足月时行剖宫产术时同时
  - B. 人流后立即手术
  - C. 立即手术同时作保胎治疗
  - D. 1个月后肿瘤不缩小或反增大, 可行手术或保胎治疗
  - E. 产后再考虑手术
- 正确答案: D 您选择的答案:

第156题 女, 32岁, 孕3个月, 阴道出血, 妇科检查宫颈糜烂中度, 刮片示巴氏细胞学 级, 活检诊断为宫颈原位癌, 治疗方案为

- A. 立即体外照射, 胎儿自然流产后行子宫全切术
  - B. 严密观察至足月, 剖宫产结束分娩
  - C. 立即剖宫取胎, 同时行全子宫切除术
  - D. 妊娠与分娩均可使癌症扩散, 应直接行扩大子宫全切术
  - E. 严密观察至足月, 剖宫产同时行全子宫切除术
- 正确答案: B 您选择的答案:

第157题 48岁妇女, 孕3产2, 接触性出血3月, 既往有慢性支气管炎病史, 妇检: 宫颈重度糜烂, 较硬, 碘试验不着色, 阴道穹隆部变硬, 子宫正常大小, 双附件(-), X线胸片显示肺动脉段明显凸出, 心电图显示电轴右偏, 室上性心动过速: 宫颈活检: 宫颈鳞状上皮癌, 妇科治疗首选

- A. 放疗
  - B. 子宫根治术
  - C. 化疗
  - D. 宫颈锥切
  - E. 激素治疗
- 正确答案: A 您选择的答案:

第158题 52岁女性, 因月经不规则2年就诊, 当地医院诊断为"功血", 给予人工周期治疗, 效果欠佳。妇科检查: 外阴阴道(-), 宫颈光滑, 子宫稍大, 略软, 双侧附件未触及异常。下述诊疗措施哪项最恰当

- A. 口服避孕药1号
  - B. 应用甲基睾丸素
  - C. 应用孕酮
  - D. 分段诊刮
  - E. 阴道镜检查
- 正确答案: D 您选择的答案:

第159题 50岁妇女, 白带带血1月。妇查, 宫颈中度糜烂, 易出血, 子宫大小质地正常, 附件正常, 阴道镜下多点活检报告为"重度不典型增生"其处理下述哪项恰当

- A. 子宫全切术
  - B. 子宫根治术
  - C. 诊断性刮宫
  - D. 定期随访
  - E. 激光治疗
- 正确答案: A 您选择的答案:

三、A3型题: 以下提供若干个案例, 每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息, 在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第160-161题

54岁女性, 因白带增多、阴道不规则流血检查发现宫颈肥大, 表面呈糜烂状, 阴道前穹隆变浅, 近宫颈处质硬, 子宫大小、质地正常, 宫旁主韧带无增厚及短缩, 宫颈活检为宫颈鳞癌

- 1. 其诊断为
  - A. 宫颈鳞癌 b期
  - B. 宫颈鳞癌 a期
  - C. 宫颈鳞癌 b期
  - D. 宫颈鳞癌 a期
  - E. 宫颈鳞癌 a期
- 2. 本病例最佳治疗方案为
  - A. 广泛子宫切除术及盆腔淋巴结清扫术
  - B. 放射治疗
  - C. 化学治疗
  - D. 全子宫切除术+双附件切除术
  - E. 放疗后行手术治疗

正确答案: BA 您选择的答案:

第162-164题

62岁妇女, 绝经后12年, 出现阴道不规则出血, 此人, 体胖, 患有高血压, 21 / 12kPa(158 / 98mmHg), 尿蛋白(-), 尿糖(+), 妇查: 外阴阴道(-), 宫颈(+), 糜烂质中, 无出血, 宫体平位稍大, 稍软, 形态正常, 活动好, 附件(-), 双穹(-)

- 1. 该患者的诊断首先
  - A. 子宫肌瘤
  - B. 子宫肌炎
  - C. 功血
  - D. 子宫体癌
  - E. 子宫颈癌

2. 进一步确诊宜选用

- A B超
- B 阴道镜
- C 宫颈活检
- D 分段诊刮+病检
- E 诊断性治疗

3. 最佳治疗方是

- A 子宫全切
- B 子宫全切+双附件切除术
- C 化疗
- D 放疗
- E 广泛子宫全切+盆腔淋巴清除术

正确答案：DDB 您选择的答案：

第165-167题

患者40岁，1年来阴道不规则出血，分泌物臭，宫颈呈菜花样，右侧宫旁组织增厚，但未达盆壁，阴道上1/3质硬，不平。

1. 为确定诊断应行

- A. 阴道脱落细胞检查
- B. 碘试验
- C. 阴道镜检查
- D. 宫颈活检
- E. 宫腔镜检查

2. 临床分期正确的是

- A. I期
- B. Ia
- C. Ib
- D. a期
- E. b期

3. 其处理正确的是

- A. 全子宫、双附件、大网膜切除术
- B. 广泛性子宫切除加盆腔淋巴清除术
- C. 放疗
- D. 全子宫加双附件切除术
- E. 腹腔内化疗

正确答案：DEC 您选择的答案：

第168-169题

女，50岁，月经频发8个月，不规则阴道少量出血20天。妇科检查：子宫前壁肌瘤(直径8cm)，子宫约3个月妊娠大，血红蛋白90g/L。

1. 首先需进行的处理是

- A. 应用止血药物
- B. 宫腔镜切除子宫内膜
- C. 输全血或红细胞
- D. 诊断性刮宫
- E. 中药治疗，住院等待手术

2. 进一步处理正确的是

- A. 药物止血
- B. 宫腔镜电切除子宫内膜
- C. GnRHa治疗
- D. 全子宫切除
- E. 根据病理确定手术方式

正确答案：DE 您选择的答案：

第170-171题

49岁妇女，少许接触性出血3个月，妇查，宫颈重度糜烂，宫体前位，大小正常，宫旁浸润达盆壁，宫颈刮片 级，活检报告为鳞癌 级

1. 其临床分期为

- A a期
- B b期
- C a期
- D b期
- E IV期

2. 最恰当的治疗是

- A 子宫全切术
- B 扩大性子宫全切术
- C 广泛子宫全切术+盆腔淋巴结清扫术
- D 放射治疗
- E 扩大性子宫切除术+盆腔淋巴结清扫术

正确答案：DD 您选择的答案：

第172-173题

32岁妇女，孕3产2，阴道排液及接触性出血3月。一般状态良好，妇查：宫颈轻糜，宫体前位，大小正常，活动好，双附件(-)，宫颈活检为，宫颈鳞痛细胞呈泪滴状向间质浸润，深度<5mm，无病灶融合及脉管侵犯

1. 其诊断应为

- A 0期
- B a
- C b
- D a
- E a

2. 应采用何种治疗方法

- A 宫颈锥形切除术
- B 经腹子宫切除术
- C 放射治疗
- D 广泛性子宫切除术+盆腔淋巴结清扫术
- E 扩大性子宫切除术

正确答案：BE 您选择的答案：

第174-175题

55岁女性，有短暂婚姻史，未生育。绝经2年后出现血水样白带2周。体格检查：身高155cm，体重75kg，血压150/95mmHg，外阴、阴道无异常，宫颈光滑正常大小，宫体稍大，质软，活动良好。双侧附件未见异常

1. 该病人最可能的诊断是

- A 功能失调性子宫出血
- B 子宫肉瘤
- C 子宫肌瘤
- D 子宫内膜炎
- E 子宫内膜癌

2. 应首选哪种辅助检查方法以明确诊断

- A B超检查
- B 宫颈刮片病理检查
- C 阴道镜检查
- D 分段诊刮检查
- E 血清CA125测定

正确答案：DB 您选择的答案：

第176-177题

40岁经产妇，近2年痛经并逐渐加重，伴经量增多及经期延长，届时需服强止痛药。妇科检查：子宫均匀增大如孕8周，质硬，有压痛，经期压痛明显。

1. 痛经逐渐加重的原因最可能是

- A 功能性痛经
- B 子宫腺肌病
- C 子宫内膜结核
- D 子宫内膜癌
- E 子宫粘膜下肌瘤

2. 本例确诊后的处置应选择

- A 镇痛药物治疗
- B 性激素治疗
- C 化学药物治疗
- D 手术治疗
- E 放射治疗

正确答案：BD 您选择的答案：

第178-181题

35岁妇女，孕3产2，普查发现盆腔包块3天就诊，无特殊不适，查外阴阴道(-)，宫颈光滑，大小质地正常，子宫前位，稍大，右侧扪及一个孕3个月大小包块，有囊性感，活动尚可

1. 为进一步确诊下述哪项检查无意义

- A B型超声
- B 血沉
- C 腹部平片
- D 乳酸脱氢酶
- E 细胞学检查

2. B超检查发现：子宫正常大小，子宫右侧有一12cm×14cm×9cm大小液性暗区，中有强光团，血清LDH54IU/L(0.9μmol·S<sup>-1</sup>/L)，哪项诊断最佳

- A 卵巢畸胎瘤
- B 子宫浆膜下肌瘤
- C 卵巢子宫内膜异位症
- D 卵巢纤维瘤
- E 无性细胞瘤

3. 诊断确定后，病人要求及时治疗，下述哪项治疗最恰当

- A 子宫全切右附件切除术
- B 单纯右侧附件切除术
- C 单纯右侧肿块切除术
- D 右侧肿块剔除术
- E 双附件切除术

4. 如果病人卵巢肿瘤合并妊娠时，又需要小孩，其处理原则下述哪项不恰当

- A 宜孕3个月后再手术
- B 3个月可以短时间观察
- C 孕晚期发现可等足月
- D 如确诊为恶性应及早手术
- E 如足月临产，即剖宫产加肿瘤切除

正确答案：BACE 您选择的答案：

第182-184题

女，43岁，自己触及下腹部肿块达脐下10个月，尿频12个月，月经周期正常，经期延长3个月，下腹部坠胀感明显，体力劳动时心悸，停经40天后出现下腹部疼痛，阴道流血较多，内混有膜样组织，并伴有恶心、呕吐、发热和尿频、尿急。妇科检查：子宫14周妊娠大，宫体前壁高低不平，可触及直径约8cm结节。

1. 鉴别诊断首要的辅助检查是

- A 尿常规
- B B超检查

- C. 血放免p-HCG
  - D. X线透视或CT
  - E. 尿酶联免疫HCO
  - 2. 该病例的主要诊断是
  - A. 子宫肌瘤
  - B. 尿路留并感染
  - C. 卵巢畸胎瘤扭转
  - D. 巨大巧克力囊肿
  - E. 子宫间质部妊娠先兆流产
  - 3. 该病例的治疗原则应为
  - A. 导尿、急症手术
  - B. 抗生素治疗、输血
  - C. 保守治疗、择期手术
  - D. 征求患者同意腹腔镜探查
  - E. 诊断性刮宫、介入栓塞治疗
- 正确答案：EAC 您选择的答案：

#### 第185-187题

45岁妇女，接触性出血1个月，月经规律，妇查：宫颈重度糜烂，宫体后倾，大小正常，活动好，双附件(-)，宫颈细胞学涂片高度可疑，阴道镜下活检报告为鳞细胞突破基底膜5mm以内，有淋巴管侵犯及病灶融合

- 1. 该病人诊断应该是
- A. 宫颈原位癌
- B. 宫颈癌 a期
- C. 宫颈癌 b期
- D. a期
- E. a期
- 2. 最佳处理是
- A. 宫颈锥形切除病灶
- B. 子宫全切
- C. 扩大全子宫切除术
- D. 广泛性子宫切除术盆腔淋巴结清除术
- E. 激光治疗
- 3. 若要清扫淋巴结，下列哪组不是清扫范围
- A. 髂外
- B. 腹股沟
- C. 髂总
- D. 髂内
- E. 闭孔

正确答案：CDB 您选择的答案：

#### 第188-191题

女，43岁，自己触及下腹部肿块达脐下10个月，尿频12个月，月经周期正常，经期延长3个月，下腹部坠胀感明显，体力劳动时心悸，停经40天后出现下腹部疼痛，阴道流血较多，内混有膜样组织，并伴有恶心、呕吐、发热和尿频、尿急。妇科检查：子宫14周妊娠大，宫体前壁高低不平，可触及直径约8cm结节。

- 1. 应补充哪些病史
- A. 治疗情况
- B. 生育史
- C. 避孕情况
- D. 外院诊治情况
- E. 以上都需要
- 2. 首先选择哪项辅助检查有助于诊断
- A. CA125
- B. 血常规
- C. 血生化
- D. B型超声检查
- E. 阴道后穹窿穿刺
- 3. 还需进行哪项辅助检查
- A. 妇科检查
- B. 血液常规
- C. 腹腔镜检查
- D. B超
- E. 探测宫腔深度
- 4. 首先应鉴别的疾病是
- A. 卵巢肿瘤
- B. 大量腹水
- C. 子宫腺肌病
- D. 肌瘤红色变性
- E. 子宫肌瘤合并不全流产

正确答案：EABE 您选择的答案：

#### 第192-194题

50岁女性，孕5产5，绝经3年，阴道不规则流血1月。妇科检查：外阴阴道正常，宫颈肥大、糜烂、触之易出血，子宫后屈、稍大，双侧附件未见异常。

- 1. 该病人绝经后最可能的出血原因是
- A. 宫颈炎
- B. 子宫颈癌
- C. 子宫内膜癌
- D. 子宫颈尖锐湿疣
- E. 子宫内膜炎
- 2. 进一步确诊时需做

- A. B型超声检查
  - B. 宫颈涂片细胞学检查
  - C. 宫颈活组织检查
  - D. 子宫碘试验
  - E. 阴道镜检查
3. 若以上检查未发现可疑病灶，下一步最恰当的处理是
- A. 分段刮宫
  - B. 子宫镜+子宫内膜活检
  - C. 宫颈激光
  - D. 宫颈锥切术
  - E. 3~6个月后复查

正确答案：BCA 您选择的答案：

#### 第195-196题

61岁女性，较胖，绝经10年后阴道流血2周，妇科检查阴道、宫颈、子宫及双附件均未见异常

1. 应先行何种检查
- A. 血常规
  - B. 超声
  - C. 分段诊刮
  - D. 宫颈刮片
  - E. 宫腔镜下活检
2. 若进一步辅助检查发现空腹血糖10.7mmol/L，则该患者最可能患有哪种妇科疾病
- A. 子宫内膜癌
  - B. 卵巢肿瘤
  - C. 老年性子官内膜炎
  - D. 输卵管癌
  - E. 子宫肉瘤

正确答案：CA 您选择的答案：

#### 第197-199题

女，59岁，绝经7年，腹胀、消瘦1个月。体检：全腹膨隆，下腹压痛，未触及明显包块。妇科检查：外阴、阴道萎缩，宫颈光滑，后穹窿触及大小不等质硬结节，子宫触诊不满意。B超见大量腹水，右侧附件区见12cm×10cm×7cm大小包块，实性、不规则、边界欠清晰。

1. 为进一步诊断，哪项是错误的
- A. 立即剖腹探查
  - B. 抽腹水，行脱落细胞学检查
  - C. 腹腔镜检查
  - D. 抗原标志物
  - E. 肿瘤标志物
2. 可能的诊断为
- A. 肝硬化
  - B. 肾功衰竭
  - C. 盆腔结核
  - D. 卵巢肿瘤破裂
  - E. 卵巢恶性肿瘤
3. 其处理正确的是
- A. 全子宫、双附件、大网膜切除术
  - B. 全子宫、双附件、大网膜切除术加肿瘤细胞减灭术
  - C. 门脉分流术
  - D. 全子宫加双附件切除术
  - E. 腹腔内化疗

正确答案：AEB 您选择的答案：

#### 第200-201题

40岁妇女，月经量增多5年，月经周期正常，经量多时如小便样外流，妇查：子宫如孕3个月妊娠大小，表面凹凸不平，子宫左侧可扪及鸭卵大小包块，质硬与子宫分不开，无压痛，Hb60g/L

1. 该妇女患有何种疾病
- A. 子宫内膜异位症
  - B. 卵巢实质性肿瘤
  - C. 多发性子宫肌瘤
  - D. 盆腔炎性包块
  - E. 巧克力囊肿
2. 该妇女应进行的治疗为
- A. 药物保守治疗
  - B. 肌瘤挖除术
  - C. 单附件切除术
  - D. 子宫全切术
  - E. 广泛根治术

正确答案：CD 您选择的答案：

#### 第202-203题

有一左卵巢囊肿病人住院等待手术期间，某晚在大便后突然左下腹持续疼痛，随后肿块逐渐增大

1. 这一征象表明
- A. 囊肿破裂
  - B. 瘤蒂扭转
  - C. 囊内出血
  - D. 囊内感染
  - E. 恶变
2. 该患应如何处理
- A. 继续观察



- B. 立即开腹探查
  - C. 抗炎治疗
  - D. 止痛治疗
  - E. 暂时对症处理，不好转再手术
- 正确答案：BB 您选择的答案：

#### 第204-207题

40岁女性，月经规律，性生活后阴道有少量流血2个月，无腹痛等其它不适症状

1. 该患者首先考虑的诊断可能是
    - A. 子宫内膜癌
    - B. 子宫颈癌
    - C. 卵巢肿瘤
    - D. 输卵管癌
    - E. 子宫肌瘤
  2. 妇科检查发现：宫颈正常大小，其表面内1/3面积有颗粒状糜烂，触血(+)，子宫前位正常大小，双附件区未触及异常，为确定诊断，应作何种检查
    - A. 彩色超声检查
    - B. 宫颈刮片检查
    - C. 宫颈活组织检查
    - D. 分段诊刮
    - E. 阴道镜检查
  3. 若宫颈活检证实为宫颈原位癌，应如何处置
    - A. 宫颈锥形切除术
    - B. 全子宫切除术
    - C. 宫颈电熨术
    - D. 子宫根治术
    - E. 放射治疗
  4. 若宫颈活检报告为：宫颈上皮细胞分化不良，排列紊乱，细胞核异常，有丝分裂增加，异型细胞局限上皮层的下1/3，该如何处置
    - A. 子宫全切术
    - B. 可暂按炎症处理，每3~6个月随访一次
    - C. 宫颈电熨术
    - D. 子宫根治术
    - E. 宫颈锥形切除术
- 正确答案：BCBB 您选择的答案：

四、A4型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

#### 第208-210题

女，50岁，不规则阴道出血伴下腹胀痛及脓性白带1个月余。妇科检查：阴道内无异常，宫颈光滑，子宫体略大，质软，双附件正常。

1. 此患者最可能的诊断是
    - A. 更年期功血
    - B. 子宫颈癌
    - C. 子宫内膜癌
    - D. 子宫肉瘤
    - E. 卵巢癌
  2. 若入院后行分段诊断性刮宫，术中刮出少许脆烂内膜组织，宫腔深度8cm，正确的临床分期是
    - A. I期
    - B. Ia
    - C. Ib
    - D. 0期
    - E. 期
  3. 若此患者确定诊断后行开腹术，术中取腹水找到癌细胞，其处理正确的是
    - A. 全子宫加双侧附件切除术
    - B. 广泛全子宫切除及双侧盆腔淋巴结清除术
    - C. 子宫全切及双侧附件切除后，腹腔灌注化疗
    - D. 子宫全切及双侧附件切除术后加用放疗
    - E. 子宫全切及双侧附件切除术后加用高效孕激素
- 正确答案：CBD 您选择的答案：

#### 第211-213题

28岁，婚后5年，计划妊娠10周，下腹部坠胀5天，妇科检查：子宫14周妊娠大，宫体前壁高低不平，可触及多个结节，B超显示符合10周妊娠合并多发性子宫肌瘤。

1. 该病例的处理原则是
  - A. 观察随访
  - B. 肌注黄体酮20mg / 天
  - C. 肌注HCG1000U / L
  - D. 口服硫酸舒喘灵2.4mg / 6小时
  - E. 人流后行肌瘤切除
2. 如果该患者继续妊娠至34周时出现急性下腹痛，伴发热37.6℃，恶心、呕吐。体检：子宫38周妊娠大，前壁肌瘤突出明显且有压痛，胎心158次 / 分，NST反应良好。其发生的变性为
  - A. 玻璃样变
  - B. 囊性变
  - C. 肉瘤变
  - D. 纤维样变
  - E. 红色变
3. 其处理应为

- A. 剖宫取胎并切除肌瘤
  - B. 补液、抗生素镇静支持疗法
  - C. 剖宫产并挖出肌瘤
  - D. 切除肌瘤后继续妊娠
  - E. 剖宫取胎后行子宫次全切
- 正确答案：AEB 您选择的答案：

#### 第214-216题

女，35岁，G1P1AOL1，女儿6岁，月经周期正常，经量明显增多1年，妇科检查及超声检查提示单发性子宫肌瘤(直径10cm)。血红蛋白70g/L，MCV65fl，MCHC28%。

1. 最恰当的治疗是
  - A. 药物治疗如GnRHa
  - B. 雄激素治疗，观察随访
  - C. 经腹肌瘤切除或腹腔镜肌瘤切除
  - D. 经阴道子宫切除或经阴道肌瘤切除
  - E. 全子宫切除，保留双附件
2. 如选择手术治疗，术前应
  - A. 诊断性刮宫
  - B. 雄激素治疗
  - C. 诱导绝经
  - D. 双侧子宫动脉栓塞
  - E. 纠正贫血
3. 如选择手术治疗，术中最应注意的问题是
  - A. 腹部切口尽量小
  - B. 切除肌瘤送快速冷冻病理检查
  - C. 尽量减少术中出血
  - D. 压脉带阻断子宫、卵巢血供
  - E. 使用高频电刀或超声刀

正确答案：CEB 您选择的答案：

五、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

#### 第217-218题

- A. 分段诊断性刮宫
  - B. 诊断性刮宫
  - C. 阴道镜取材活检
  - D. 宫颈刮片细胞学检查
  - E. 超声波B型显像法
1. 诊断子宫颈癌哪种方法最合适
  2. 诊断子宫内膜癌哪种方法最合适
- 正确答案：CA 您选择的答案：

#### 第219-222题

- A. 皮样囊肿
  - B. 粘液性囊腺瘤
  - C. 浆液性囊腺瘤
  - D. 纤维瘤
  - E. 库肯勃瘤
1. 梅格斯征
  2. 最易发生蒂扭转
  3. 为转移性癌
  4. 常为巨大卵巢囊肿
- 正确答案：DAEB 您选择的答案：

#### 第223-226题

- A. 观察
  - B. 阴式肌瘤剝除术
  - C. 肌瘤剝除术
  - D. 子宫全切术
  - E. 子宫全切+双附件切除术
1. 肌瘤小，无明显症状
  2. 肌瘤，3个月妊娠大小
  3. 肌瘤有肉瘤变
  4. 单个浆膜下肌瘤，要求生育者
- 正确答案：ADEC 您选择的答案：

#### 第227-230题

- A. 浆液性囊腺瘤
  - B. 黏液性囊腺瘤
  - C. 颗粒细胞瘤
  - D. 卵巢畸胎瘤
  - E. 纤维瘤
1. 产生麦格征
  2. 最易发生蒂扭转
  3. 其上皮与宫颈上皮相似，常为多房
  4. 其上皮与输卵管黏膜相似，肿瘤常为单房
- 正确答案：EDBA 您选择的答案：

第231-233题

- A 月经来潮前1周或来潮6~12小时内
- B 立即
- C 先用抗生素控制感染
- D 月经周期第5天
- E 先口服乙烯雌酚5天
- 1. 刮宫时机选择：证实或排除子宫内膜癌
- 2. 疑为子宫内膜结核
- 3. 过期流产

正确答案：BAE 您选择的答案：

第234-236题

- A. 浆液性囊腺瘤
- B. 卵巢恶性畸胎瘤
- C. 颗粒细胞瘤
- D. 卵巢黄素囊肿
- E. 纤维瘤
- 1. 发生于体腔上皮者
- 2. 发生于生殖细胞者
- 3. 发生于性索间质者

正确答案：ABC 您选择的答案：

第237-239题

- A. 是最常见的卵巢良性肿瘤
- B. 有恶性程度的逆转倾向
- C. HCG升高
- D. CA125升高
- E. 具有男性化作用
- 1. 卵巢未成熟畸胎瘤
- 2. 卵巢浆液性囊腺癌
- 3. 卵巢皮样囊肿

正确答案：BDA 您选择的答案：

第240-241题

- A 轻度非典型增生
- B 重度非典型增生
- C 镜下早浸癌
- D 浸润癌Ib期
- E 浸润癌 a合并心脏病
- 1. 广泛性子官切除术+盆腔淋巴结清扫术
- 2. 扩大广泛性子官切除术
- 3. 全子宫切除术
- 4. 激光或冷冻治疗并随访

正确答案：DE 您选择的答案：

第242-245题

- A 体腔上皮性肿瘤
- B 生殖细胞瘤
- C 特异性索间质肿瘤
- D 非特异性间质瘤
- E 胃肠粘膜肿瘤
- 1. 畸胎瘤
- 2. 颗粒细胞瘤
- 3. 纤维瘤
- 4. 库肯勃瘤

正确答案：BCCE 您选择的答案：

第246-249题

- A 皮样囊肿
- B 粘液性囊腺瘤
- C 浆液性囊腺瘤
- D 纤维瘤
- E 库肯勃瘤
- 1. 产生麦格征
- 2. 最易发生蒂扭转
- 3. 其上皮与子宫颈上皮相似常为多房
- 4. 其上皮与输卵管粘膜上皮相似，肿瘤常为单房

正确答案：DABC 您选择的答案：

第250-253题

- A. 子宫颈管呈桶状
- B. 绝经后阴道不规则出血
- C. 月经周期缩短、经期延长
- D. 雌激素治疗恰当、有效
- E. 阵发性腹痛伴阴道流液
- 1. 子宫颈癌
- 2. 输卵管癌
- 3. 子宫内膜癌
- 4. 子宫黏膜下肌瘤

正确答案：AEBC 您选择的答案：

第254-257题

- A 库肯勃瘤
  - B 卵泡膜细胞瘤
  - C 卵巢支持细胞-间质细胞瘤
  - D 绒毛膜癌
  - E 内胚窦瘤
  - 1. 能合成AFP
  - 2. 能分泌hCG
  - 3. 能分泌雄激素
  - 4. 镜下见分泌粘液的印戒样细胞
- 正确答案：EDCA 您选择的答案：

第258-262题

- A. 雌激素升高
  - B. AFP升高
  - C. CA125明显升高
  - D. HCG升高
  - E. 17酮17羟类固醇升高
  - 1. 卵巢绒毛膜上皮癌
  - 2. 卵巢卵泡膜细胞瘤
  - 3. 卵巢睾丸母细胞瘤
  - 4. 卵巢浆液性囊腺癌
  - 5. 内胚窦瘤
- 正确答案：DAECB 您选择的答案：

第263-264题

- A 黄体囊肿
  - B 黄素囊肿
  - C 多囊卵巢
  - D 卵巢囊肿
  - E 卵泡囊肿
  - 1. 绒毛膜促性腺激素刺激引起
  - 2. 促卵泡素刺激引起
- 正确答案：BE 您选择的答案：

第265-269题

- A a
  - B a
  - C b
  - D a
  - E a
  - 1. 宫颈癌临床分期：宫颈癌临床分析有明显宫旁浸润，未达盆壁
  - 2. 镜下早期浸润癌
  - 3. 侵犯阴道上2/3，无宫旁浸润
  - 4. 侵犯阴道下1/3宫旁浸润未达盆壁
  - 5. 侵犯膀胱
- 正确答案：CABDE 您选择的答案：

第270-273题

- A. 经腹手术治疗
  - B. 宫腔镜治疗
  - C. 大剂量孕激素治疗
  - D. 大剂量抗孕激素治疗
  - E. 腔内+体外放射治疗
  - 1. 子宫纵隔
  - 2. 卵巢癌 b
  - 3. 子宫颈癌 b
  - 4. 子宫内膜癌 b术后
- 正确答案：BAEC 您选择的答案：

第274-277题

- A 0期
  - B Ⅰ期
  - C Ⅱ期
  - D Ⅲ期
  - E Ⅳ期
  - 1. 关于子宫内膜癌分期：侵犯颈管
  - 2. 局限在子宫体部
  - 3. 侵犯附件
  - 4. 侵犯膀胱
- 正确答案：CBDE 您选择的答案：

第278-281题

- A 宫颈癌
- B 子宫内膜癌
- C 外阴癌
- D 绒毛膜癌
- E 卵巢癌
- 1. 发病率最高

- 2. 最难早期发现
- 3. 化疗效果好
- 4. 预防措施较得力

正确答案：AEDA 您选择的答案：

第282-284题

- A. 放疗敏感
- B. 分泌雌激素
- C. AFP高
- D. HCG(+)
- E. 甲亢

- 1. 无性细胞瘤
- 2. 颗粒细胞瘤
- 3. 内胚窦瘤

正确答案：ABC 您选择的答案：

习题集 妇产科学 女性生殖系统炎症

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 下列何项不是急性盆腔炎的手术指征

- A 药物治疗48~72小时体温不降，中毒症状加重或肿块增大者
- B 脓肿破裂引起全身中毒症状
- C 脓肿形成，药物治疗病情缓解，肿块局限化，但不消失
- D 药物治疗，病情缓解，双侧附件虽未及肿块，但有增厚感和压痛
- E 病情有所控制，但脓肿形成，并向阴道后穹隆突出

正确答案：D 您选择的答案：

第2题 外阴白色病变的诊断，下列何项是错误的

- A 活检病理诊断是最可靠的诊断依据
- B 应在病变区作多点活检
- C 活检应选在皮肤有破裂、溃疡、隆起、硬结和粗糙等不同部位取材，方能作出病理分类
- D 用碘涂染病变区，皮肤出现不着色区，作多点活检准确率高
- E 由于病变不恒定，活检不仅要多点取材，还要定期随访才能提高准确率

正确答案：D 您选择的答案：

第3题 梅毒的实验室诊断，下列哪项是正确的

- A 血清学试验敏感性高，在感染后即为阳性
- B 性病研究室试验可作定量、定性试验，易于操作，敏感性高，结果快，目前应用最广泛
- C 一期梅毒时硬下疳表面的渗出物中含大量梅毒螺旋体，但到二期梅毒时肿大的淋巴结抽出液中已找不到螺旋体
- D 血清液试验在感染后出现阳性，到二期时为阴性
- E 黑地映光法找梅毒螺旋体已废用

正确答案：B 您选择的答案：

第4题 盆腔炎的合并症和后遗症极少是

- A 输卵管妊娠
- B 输卵管积水
- C 继发性不孕
- D 粘连性子宫后屈
- E 弥漫性腹膜炎

正确答案：D 您选择的答案：

第5题 关于人免疫缺陷病毒(HIV)感染的临床表现，下列哪项是正确的

- A 潜伏期一般2个月~半年
- B 多数病人前驱症状明显
- C 感染后6个月可出现抗体阳性
- D 一旦感染，将出现腹泻、发热、体重下降，全身乏力，食欲减退等细胞免疫缺陷症状
- E 感染症状很少表现在性器官，症状无特异性，很难诊断，故检测HIV抗体是必要的诊断手段

正确答案：E 您选择的答案：

第6题 新生儿感染尖锐湿疣主要通过

- A 宫内垂直传播
- B 软产道
- C 乳汁
- D 羊水
- E 尿布

正确答案：B 您选择的答案：

第7题 尖锐湿疣的治疗，下列哪项是错误的

- A 药物治疗应用于小的病灶
- B 常用药物为33%~50%的三氯醋酸
- C 5-Fu适用于外阴、肛周疾病
- D 免疫调节剂既抗病毒又增强机体免疫功能
- E 激光、冷冻等物理疗法疗效不佳

正确答案：E 您选择的答案：

第8题 下列所述哪项不是淋病的好发部位

- A 尿道
- B 尿道旁腺
- C 前庭大腺
- D 子宫颈管
- E 子宫内膜

正确答案：E 您选择的答案：

第9题 关于白色念珠菌性阴道炎，以下哪项是错误的

- A 白色念珠菌在弱碱性环境下易繁殖
- B 白带呈稠厚豆渣样
- C 多见于糖尿病
- D 可用抗真菌药物治疗
- E 妊娠期可加重

正确答案：A 您选择的答案：

第10题 急性盆腔炎出现下列症状宜行手术治疗，除了

- A 并发急性子宫肌炎

- B. 药物治疗2~3天无效,患者中毒症状加重
- C. 经药物治疗2~3天无效,且原有肿块增大
- D. 出现输卵管积液或输卵管卵巢囊肿
- E. 可疑脓肿破裂

正确答案:A 您选择的答案:

第11题 关于获得性免疫缺陷综合征,下列哪项是错误的

- A. 是由人免疫缺陷病毒引起
- B. HIV感染主要通过性行为直接传播
- C. HIV可通过胎盘传给胎儿
- D. HIV感染后潜伏很短,患病后很快死亡
- E. 输入有感染的供血者的血制品,同样可致病

正确答案:D 您选择的答案:

第12题 滴虫性阴道炎的治愈标准是

- A. 白带悬滴法检查滴虫转阴性
- B. 临床症状消失
- C. 连续3次月经期后检查滴虫阴性
- D. 连续3次月经期前检查滴虫阴性
- E. 全身及局部治疗3个疗程治愈

正确答案:C 您选择的答案:

第13题 治疗前庭大腺囊肿简单而有效的方法是

- A. 高锰酸钾坐浴
- B. 局部热敷
- C. 针刺吸囊内容
- D. 造口术
- E. 囊肿挖出术

正确答案:D 您选择的答案:

第14题 女性生殖器结核的病理变化,正确的是

- A. 输卵管结核多为双侧性,由子宫内膜结核蔓延而来
- B. 卵巢结核通常是卵巢深部形成结节和干酪样坏死
- C. 子宫内膜结核可使子宫腔粘连、变形、缩小
- D. 宫颈结核在生殖道结核中最常见
- E. 盆腔腹膜结核分粘连型和渗出型,粘连型不易形成瘘管

正确答案:C 您选择的答案:

第15题 关于滴虫性阴道炎的临床表现,以下正确的是

- A. 外阴瘙痒,红肿
- B. 悬滴法找到白细胞增多
- C. 阴道pH值4.5
- D. 阴道黏膜上附着白膜,擦拭后露出红肿黏膜面
- E. 稀薄泡沫状白带增多

正确答案:E 您选择的答案:

第16题 关于白色念珠菌性阴道炎的病因,以下哪项是错误的

- A. 糖尿病
- B. 妊娠
- C. 长期用抗生素
- D. 月经后
- E. 使用避孕套避孕

正确答案:E 您选择的答案:

第17题 关于慢性宫颈炎下述哪项是正确的

- A. 宫颈糜烂是宫颈癌的前期病变
- B. 诊断宫颈糜烂应同时表示糜烂的面积和深度
- C. 宫颈锥形切除是最彻底的治疗方法
- D. 慢性宫颈炎的治疗以全身和局部并重
- E. 宫颈糜烂是不孕的主要原因

正确答案:B 您选择的答案:

第18题 老年性阴道炎的治疗可在阴道内放置少量

- A. 孕激素
- B. 雌激素
- C. 雄激素
- D. 糖皮质激素
- E. 促性腺激素

正确答案:B 您选择的答案:

第19题 关于盆腔炎的传染途径,下列哪项是正确的

- A. 产褥及流产后感染主要是血行性播散
- B. 结核性盆腔炎主要是沿粘膜上行性感染
- C. 沙眼衣原体是沿生殖器粘膜上行蔓延
- D. 阑尾炎等消化道炎症可通过淋巴系统蔓延到内生殖器
- E. 淋球菌是通过性接触后先入侵泌尿系统后再蔓延到生殖道

正确答案:C 您选择的答案:

第20题 较大的前庭大腺囊肿采用的治疗方法是

- A. 药物坐浴

- B. 应用抗生素
- C. 局部热敷
- D. 囊肿造口术
- E. 切开囊肿引流

正确答案：D 您选择的答案：

第21题 下列哪项不是淋病的临床表现

- A. 淋病的潜伏期为二周
- B. 淋病早期局限于生殖道泌尿道，表现为尿频、尿痛、排尿困难，黄色脓性白带
- C. 淋球菌沿生殖道粘膜上行传播，易引起尿道旁腺炎，前庭大腺炎，颈管炎
- D. 淋病可上行引起子宫内膜炎、急性输卵管炎、输卵管卵巢囊肿、盆腔脓肿、弥漫性腹膜炎以至中毒休克
- E. 淋球菌可经血行播散引起全身性淋病

正确答案：A 您选择的答案：

第22题 下列哪项不是女性生殖器的自然防御功能

- A. 阴道杆菌分解糖原使阴道呈酸性环境
- B. 盆底肌肉的作用使阴道口闭合，防止外界的污染
- C. 阴道上皮在雌激素作用下增生变厚，增加对病原体侵入的抵抗力
- D. 子宫内膜周期性剥脱
- E. 阴道内同时寄居需氧菌、厌氧菌，形成一种平衡的生态

正确答案：E 您选择的答案：

第23题 诊断子宫内膜结核最可靠的依据是

- A. 结核菌素试验呈阳性
- B. 结核菌培养
- C. 腹腔镜检查
- D. 子宫内膜病理检查
- E. 盆腔X线平片检查

正确答案：C 您选择的答案：

第24题 宫颈糜烂患者，活组织检查报告鳞状上皮化，提示

- A. 癌前病变
- B. 不典型增生
- C. 原位癌
- D. 糜烂愈合过程
- E. 宫颈息肉

正确答案：D 您选择的答案：

第25题 关于异常白带，下列哪项是错误的

- A. 正常白带呈白色糊状或蛋清样
- B. 细菌性阴道病白带色黄或黄绿，黏稠，多有臭味
- C. 白色或灰黄色白带为滴虫性阴道炎的特征
- D. 凝乳状白带为念珠菌性阴道炎特征
- E. 晚期宫颈癌伴感染一般为淘米水样白带

正确答案：B 您选择的答案：

第26题 急性盆腔腹膜炎应采取的体位是

- A. 平卧位
- B. 半卧位
- C. 侧卧位
- D. 俯卧位
- E. 膝胸卧位

正确答案：B 您选择的答案：

第27题 妊娠早期淋菌感染对胎儿影响

- A. 流产
- B. 皮疹
- C. 楔状齿
- D. 神经性耳聋
- E. 肝脾肿大

正确答案：A 您选择的答案：

第28题 淋菌感染的潜伏期为

- A. 1~14日
- B. 1个月
- C. 2个月
- D. 3个月
- E. 半年

正确答案：A 您选择的答案：

第29题 早期梅毒治疗首选

- A. 青霉素
- B. 红霉素
- C. 庆大霉素
- D. 喹诺酮类
- E. 林可霉素

正确答案：A 您选择的答案：

第30题 滴虫阴道炎的白带性状呈

- A. 稠厚豆渣样



- B. 血性
- C. 脓性
- D. 稀薄泡沫状
- E. 白色均匀稀薄

正确答案：D 您选择的答案：

第31题 绝经后妇女出现血性白带，除生殖器恶性肿瘤外，最常见的疾病是

- A. 宫颈糜烂
- B. 宫颈息肉
- C. 宫颈粘膜炎
- D. 官腔积液
- E. 老年性阴道炎

正确答案：E 您选择的答案：

第32题 慢性宫颈炎出现腰骶部疼痛时说明

- A. 乳突状糜烂
- B. 重度糜烂
- C. 炎症扩散到盆腔
- D. 宫颈息肉
- E. 宫颈腺体囊肿形成

正确答案：C 您选择的答案：

第33题 对孕期生殖道衣原体感染，下列哪项是首选治疗方案

- A. 因沙眼衣原体感染会引起胎儿发育异常，应立即终止妊娠
- B. 因沙眼衣原体感染者在分娩时会导致新生儿感染，孕期应积极药物治疗
- C. 因沙眼衣原体感染者对胎儿无致命威胁，不必治疗，产后再行治疗
- D. 因沙眼衣原体感染者在治疗中药物对胎儿造成不利影响，故不宜药物治疗
- E. 为防止药物对下一代不良影响故孕期不必治疗，足月时常规采取剖宫产结束分娩

正确答案：B 您选择的答案：

第34题 关于梅毒的治疗，下列哪项是错误的

- A. 青霉素是首选药物
- B. 对青霉素过敏者可用四环素、红霉素
- C. 母亲患有梅毒可经胎盘传染给胎儿而引起流产、早产、死胎，因此孕期应积极治疗
- D. 因药物不足治疗不彻底，可转为潜伏梅毒，亦无传染性
- E. 孕妇对青霉素过敏可选用红霉素，忌用四环素

正确答案：E 您选择的答案：

第35题 下述哪一部位不是淋病的好发部位

- A. 尿道
- B. 尿道旁腺
- C. 前庭大腺
- D. 子宫颈管
- E. 子宫内膜

正确答案：D 您选择的答案：

第36题 关于淋病的描述，下列哪项是错误的

- A. 淋病是当前发生率最高的STD
- B. 淋病侵袭泌尿生殖道的粘膜和外阴皮肤
- C. 淋球菌离体后在干燥下2小时即灭活
- D. 一般消毒剂与肥皂均可使其迅速灭活
- E. 淋病在潮湿环境中可生存较长时间

正确答案：B 您选择的答案：

第37题 细菌性阴道病正确的是

- A. 阴道分泌物为粘稠白带
- B. 阴道pH值接近中性
- C. 阴道粘膜充血明显
- D. 病理特征无炎症改变
- E. 加入10%KOH于阴道分泌物中无臭味

正确答案：D 您选择的答案：

第38题 对于阴道炎的治疗，下列哪项是不恰当的

- A. 滴虫性阴道炎的治愈标准，是在滴虫转阴后每次月经后复查白带，三次阴性为治愈
- B. 念珠菌性阴道炎反复发作应查尿糖、血糖，以了解是否伴有糖尿病
- C. 老年性阴道炎的治疗原则是增加阴道抵抗力及抑制细菌生长
- D. 阴道炎病人在应用药物控制炎症外，宣传个人卫生和公共卫生，防止交叉感染
- E. 阴道炎的治疗必须在局部用药外加全身抗炎治疗

正确答案：E 您选择的答案：

第39题 滴虫阴道炎的治愈标准是

- A. 临床症状消失
- B. 局部用药3个疗程
- C. 连续3次月经后检查滴虫阴性
- D. 连续3次月经前检查滴虫阴性
- E. 治疗后悬滴法检查滴虫阴性

正确答案：C 您选择的答案：

第40题 下列哪种情况不是急性生殖器炎症后病变

- A. 输卵管积水

- B 输卵管卵巢囊肿
- C 卵巢巧克力囊肿
- D 慢性盆腔结缔组织炎
- E 慢性输卵管卵巢炎

正确答案：C 您选择的答案：

第41题 对梅毒的治疗，下列哪项是错误的

- A 青霉素是首选药物
- B 对青霉素过敏者可用四环素、红霉素
- C 母亲患有梅毒可经过胎盘传给胎儿而引起流产、早产、死胎，因此孕期应积极治疗
- D 因药物不足治疗不彻底，可转为潜伏梅毒，亦无传染性
- E 孕妇对青霉素过敏可选用红霉素，忌用四环素

正确答案：D 您选择的答案：

第42题 关于急性宫颈炎，下列何项是正确的

- A 急性宫颈炎常见病因是淋球菌感染
- B 淋球菌引起的急性宫颈炎侵入较深，通过淋巴管引起蜂窝组织管炎
- C 链球菌、葡萄球菌引起的急性宫颈炎多见于感染性流产或产褥感染呈浅表扩散
- D 急性宫颈炎的治疗措施是局部用药或冷冻术
- E 急性宫颈炎不伴全身症状

正确答案：A 您选择的答案：

第43题 下列哪项与出血性白带无关

- A 宫颈癌
- B 安放宫内节育器
- C 子宫内膜癌
- D 宫颈息肉
- E 卵巢癌

正确答案：E 您选择的答案：

第44题 老年性阴道炎正确的是

- A 常见于围绝经期妇女
- B 阴道壁常有较深溃疡
- C 窥器见阴道粘膜大片出血斑
- D 口服尼尔雌醇有效
- E 局部用药前应先用碱性液体洗涤

正确答案：D 您选择的答案：

第45题 淋病奈色菌感染沿下列哪条途径扩散

- A 经淋巴系统蔓延
- B 经血液循环传播
- C 直接蔓延
- D 沿生殖器黏膜上行蔓延
- E 以上都不是

正确答案：D 您选择的答案：

第46题 正常白带组成，下列哪项是错误的

- A 宫颈管腺体分泌
- B 阴道黏膜腺体分泌
- C 阴道黏膜渗出
- D 子宫内膜腺体分泌物
- E 宫颈及阴道黏膜脱落细胞

正确答案：B 您选择的答案：

第47题 最常见的盆腔炎症是

- A 子宫内膜炎
- B 子宫肌炎
- C 输卵管炎及输卵管卵巢炎
- D 盆腔结缔组织炎
- E 盆腔腹膜炎

正确答案：C 您选择的答案：

第48题 为确诊有无衣原体感染，下列哪项检查最敏感

- A 分泌物涂片找包涵体
- B 组织培养法
- C 聚合酶链反应法(PCR)
- D 黑地映光显微镜检查
- E 免疫学诊断，检测局部衣原体抗体

正确答案：C 您选择的答案：

第49题 关于淋病，下列何项是正确的

- A 淋病是仅次于沙眼衣原体的性传播疾病
- B 淋球菌侵袭粘膜，以生殖、泌尿系统粘膜的柱状上皮移行上皮为主
- C 淋球菌可存在于生殖道分泌物中，但不能长期潜伏在生殖道粘膜腺体
- D 孕妇感染淋球菌最好终止妊娠以防引起胎儿畸形
- E 性接触系淋病传染方式，但不是主要方式

正确答案：B 您选择的答案：

第50题 慢性宫颈炎与宫颈癌早期肉眼难以鉴别，确诊方法应是

- A 宫颈刮片细胞学检查

- B. 宫颈碘试验
  - C. 氮激光肿瘤固有荧光诊断法
  - D. 阴道镜检查
  - E. 宫颈及宫颈管活组织检查
- 正确答案：E 您选择的答案：

第51题 关于淋病下列哪项是正确的

- A. 淋病是仅次于沙眼衣原体的性传播疾病
  - B. 淋球菌侵袭黏膜，以生殖、泌尿系统黏膜的柱状上皮、移行上皮为主
  - C. 淋球菌可存在于生殖道分泌物中，但不能长期潜伏在生殖道黏膜腺体
  - D. 孕妇感染淋球菌最好终止妊娠
  - E. 性接触系淋病传染的方式，但不是主要方式
- 正确答案：B 您选择的答案：

第52题 关于生殖道病毒感染，下列哪项是错误的

- A. 生殖道病毒感染以单纯疱疹病毒、巨细胞病毒及人乳头瘤病毒感染较为常见
  - B. 生殖道病毒感染可致流产、死胎，胎儿致畸并使新生儿感染
  - C. 下生殖道感染途径往往是通过直接接触
  - D. 尖锐湿疣由病毒引起，在帅中仅次于淋病，占第二位
  - E. 妊娠任何时期一旦确诊有生殖道病毒感染应立即终止妊娠
- 正确答案：E 您选择的答案：

第53题 甲硝唑是下列哪种疾病治疗时的首选药物

- A. 滴虫性阴道炎
  - B. 细菌性阴道炎
  - C. 念球菌阴道炎
  - D. 淋病
  - E. 老年性阴道炎
- 正确答案：A 您选择的答案：

第54题 盆腔炎的合并症或后遗症极少见的是

- A. 输卵管卵巢囊肿
  - B. 输卵管积水
  - C. 弥漫性腹膜炎
  - D. 输卵管妊娠
  - E. 粘连性子宫后屈
- 正确答案：C 您选择的答案：

第55题 生殖道结核的病理，下列哪项是正确的

- A. 女性生殖器结核中以输卵管结核占多数，多为双侧性
  - B. 输卵管结核常由子宫内膜结核蔓延而来
  - C. 卵巢结核表现为卵巢深部干酪样坏死
  - D. 宫颈结核占生殖器结核第二位，与宫颈癌难鉴别
  - E. 盆腔腹膜结核分粘连型与渗出型，以粘连型为主要形式
- 正确答案：A 您选择的答案：

第56题 慢性宫颈炎最常见的病变是

- A. 宫颈糜烂
  - B. 宫颈肥大
  - C. 宫颈息肉
  - D. 宫颈腺囊肿
  - E. 宫颈粘膜炎
- 正确答案：A 您选择的答案：

第57题 关于梅毒，下列哪项是正确的

- A. 梅毒是一种全身病变的性传染病
  - B. 梅毒螺旋体抵抗力较强，对化学消毒剂不敏感
  - C. 梅毒螺旋体不耐热，加热到50℃ 1分钟内死亡
  - D. 梅毒主要由性行为传播，不能通过接触病人污染的衣物而间接传染
  - E. 梅毒可经产道传播，而不能通过胎盘
- 正确答案：A 您选择的答案：

第58题 下列哪项属于子宫颈炎愈合过程

- A. 非典型增生轻度
  - B. 非典型增生中度
  - C. 非典型增生重度
  - D. 非典型鳞状上皮化生
  - E. 鳞状上皮化生
- 正确答案：E 您选择的答案：

第59题 关于梅毒下列哪项是正确的

- A. 梅毒是一种全身病变的性传染病
  - B. 梅毒螺旋体抵抗力较强，对化学消毒剂不敏感
  - C. 梅毒螺旋体不耐热，加热到50℃，1分钟内死亡
  - D. 梅毒主要由性行为传播，不能通过接触病人污染的衣物而间接传染
  - E. 梅毒可经产道传播，而不能通过胎盘
- 正确答案：A 您选择的答案：

第60题 关于阴道炎，下述哪是正确的

- A. 妊娠后不易发生滴虫性阴道炎

B 滴虫性阴道炎夫妻间不会相互传染  
C 绝经后雌激素水平降低易引起老年性阴道炎  
D 滴虫性阴道炎用灭滴灵治疗，足量用药，一次就可彻底治愈  
E 合并霉菌性阴道炎时为避免影响胎儿，不应用药物治疗  
正确答案：C 您选择的答案：

第61题 关于外阴白色病变，下列何项是正确的

A 外阴白色病变的病因是念珠菌感染  
B 硬化型苔藓型营养不良的病因与遗传，自身免疫，男性素不足可能有关  
C 增生型和混合型营养不良常继发癌变  
D 外阴白色病变病理变化恒定，任何病变区域一次活检均能作出诊断  
E 治疗原则以手术切除为宜  
正确答案：B 您选择的答案：

第62题 老年妇女患阴道炎的原因是

A 卵巢功能衰退，雌激素水平降低  
B 阴道壁萎缩，黏膜变薄  
C 上皮细胞内糖原含量减少  
D 阴道内pH值上升，局部抵抗力降低  
E 以上均是  
正确答案：A 您选择的答案：

第63题 下列哪一项与阴道的自净作用无关

A 雌激素  
B 阴道内乳酸杆菌  
C 阴道pH值  
D 宫颈黏液pH值  
E 阴道黏膜上皮糖原含量  
正确答案：D 您选择的答案：

第64题 关于滴虫性阴道炎的治疗，下列哪项是错误的

A 顽固者夫妻双方应同时口服甲硝唑治疗  
B 妊娠早期不宜口服甲硝唑治疗  
C 甲硝唑不能通过胎盘进入胎儿体内  
D 局部用药效果较佳  
E 阴道放药前先用酸性溶液冲洗可提高疗效  
正确答案：C 您选择的答案：

第65题 子宫输卵管碘油造影能诊断的疾病是

A 子宫腺肌病  
B 子宫内膜异位症  
C 多囊卵巢综合征  
D 子宫浆膜下肌瘤  
E 输卵管结核  
正确答案：E 您选择的答案：

第66题 关于尖锐湿疣，下列哪项是错误的

A 尖锐湿疣在性传播疾病中的发病率仅次于淋病  
B 尖锐湿疣的病原体为HPV  
C HPV主要感染上皮细胞，它与外阴癌、宫颈癌的发病有关  
D 尖锐湿疣的潜伏期为1~3周，症状不明显，可有瘙痒，烧灼感  
E 免疫功能低下和雌激素的影响可使病灶迅速发展  
正确答案：D 您选择的答案：

第67题 与滴虫性阴道炎发病原因有直接关系的是

A 阴道内湿度改变  
B 阴道内pH值改变  
C 月经中期最易发病  
D 阴道细胞内糖原合成增加  
E 滴虫寄生于阴道内  
正确答案：B 您选择的答案：

第68题 女性生殖器结核最先累及的部位是

A 子宫内膜  
B 子宫颈  
C 输卵管  
D 卵巢  
E 盆腔腹膜  
正确答案：C 您选择的答案：

第69题 关于生殖道结核，下列何项是正确的

A 常继发于身体其他部位的结核  
B 宫颈结核为最常见  
C 是继发不孕的主要原因  
D 好发于更年期妇女  
E 子宫内膜结核由宫颈结核上行蔓延而来  
正确答案：A 您选择的答案：

第70题 下列何组为我国法定报告性病

A 淋病、梅毒、艾滋病、沙眼衣原体

- B 淋病、梅毒、艾滋病、性病性淋巴肉芽肿  
C 淋病、梅毒、软下疳  
D 淋病、梅毒、性病性淋巴肉芽肿  
E 淋病、梅毒、艾滋病  
正确答案：E 您选择的答案：

第71题 慢性盆腔炎病变主要存在于

- A．子宫内膜及输卵管  
B．子宫肌层及输卵管  
C．子宫旁结缔组织及输卵管、卵巢  
D．子宫旁结缔组织及输卵管  
E．盆腔腹膜及输卵管、卵巢  
正确答案：C 您选择的答案：

第72题 关于淋病的治疗，下列哪项是错误的

- A 淋病的首选药物为青霉素，大剂量一次治愈  
B 对青霉素过敏可选用四环素、红霉素、多西环素、淋得治等  
C 淋球菌性输卵管积液，输卵管卵巢脓肿经药物治疗3天病情不改善应手术治疗  
D 孕妇感染淋病对胎儿危害极大，而且妊娠期用药对胎儿不利，应终止妊娠  
E 重型淋菌性盆腔炎应用水剂青霉素，头孢他林加庆大霉素、甲硝唑  
正确答案：D 您选择的答案：

第73题 直接影响阴道上皮细胞自净作用的激素是

- A．FSH-RH，LH-RH  
B．FSH  
C．LH  
D．雌激素  
E．孕激素  
正确答案：D 您选择的答案：

第74题 关于阴道炎，下列哪项是正确的

- A．妊娠后不易发生滴虫性阴道炎  
B．滴虫性阴道炎夫妻间不会相互传染  
C．绝经后雌激素水平降低易引起老年性阴道炎  
D．滴虫性阴道炎用灭滴灵治疗，足量用药，一次就可彻底治愈  
E．孕妇合并霉菌性阴道炎时为避免影响胎儿，不用药物治疗  
正确答案：C 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第75题 女，25岁，人流后1个月发热、腹痛，阴道分泌物多，虽经抗炎治疗，上述症状却日益加重，伴大便感。妇科检查：后穹窿触及囊性肿块张力高，触痛明显，子宫难触清，拟诊急性盆腔炎，盆腔脓肿形成，下列哪项是最佳治疗方案

- A．抗生素静脉、肌肉同时给药  
B．给予抗生素，取半卧位  
C．立即剖腹探查切除子宫及脓肿，保留附件  
D．给予抗生素，后穹窿切开引流  
E．立即经腹手术切除脓肿并给予抗生素  
正确答案：D 您选择的答案：

第76题 32岁，妇女，婚后五年不孕2年来月经量少，近3个月闭经经常低热，妇科检查见子宫小，欠活动双侧宫旁组织增厚，左侧有3cm×2cm×3cm肿物，轻压痛(+)，血沉1小时30mm，取子宫内膜时感宫腔不规则，刮出组织少，子宫输卵管碘油造影示输卵管不通，有串珠改变，诊为

- A 子宫内膜异位症  
B 慢性盆腔炎  
C 化脓性输卵管炎  
D 宫腔粘连  
E 生殖器结核  
正确答案：E 您选择的答案：

第77题 女，35岁。腹痛，腹部肿块伴发热一周。不孕症十年(原发)，查：T38.5，消瘦，心肺(-)，下腹部可触及质韧肿块，压痛(+)，活动欠佳。妇检：子宫常大，偏右，于子宫左可及新生儿头大肿块，触痛(+)。曾用抗生素一周，体温及症状无缓解，如何处理：

- A 抗生素静脉、肌肉同时给药  
B 抗生素应用剖腹探查切除脓肿  
C 立即剖腹探查  
D 应用退热药(激素等)手术治疗  
E 经阴道穿刺排脓  
正确答案：B 您选择的答案：

第78题 女，35岁，白带多，脓性。体检：宫颈、阴道充血，分泌物脓性，宫颈呈颗粒型糜烂，中度，下列哪项治疗方案最佳

- A．物理疗法  
B．局部药物腐蚀+全身消炎  
C．局部药物消炎  
D．宫颈锥形切除  
E．局部消炎后物理疗法  
正确答案：E 您选择的答案：

第79题 52岁，妇女，盆浴后，白带多，外阴痒伴尿频，阴道粘膜有散在出血点，后穹有多量黄色泡沫状分泌物，诊断为

- A 老年性阴道炎
- B 霉菌性阴道炎
- C 淋球菌性阴道炎
- D 滴虫性阴道炎
- E 细菌性阴道炎

正确答案：D 您选择的答案：

第80题 44岁已婚妇女，白带多伴有外阴痒2周。查外阴皮肤有抓痕，检查见阴道后穹隆处有多量稀薄泡沫状分泌物，阴道粘膜有多处多个散在红色斑点。该患最可能的诊断是

- A 念珠菌阴道炎
- B 滴虫阴道炎
- C 老年性阴道炎
- D 细菌性阴道炎
- E 慢性宫颈炎

正确答案：B 您选择的答案：

第81题 女，30岁。继发不孕5年，经后4天突起高热、寒战，下腹痛，右侧甚，血压110/80mmHg，脉搏120次/分，体温39℃，白细胞 $18 \times 10^9/L$ ，中性80%，下腹轻压痛。妇查：宫颈稍大稍软，有压痛(+)，双侧附件增厚，压痛，诊断为

- A 急性阑尾炎
- B 急性盆腔结缔组织炎
- C 急性盆腔腹膜炎
- D 急性子宫内膜炎
- E 以上均不是

正确答案：B 您选择的答案：

第82题 女，28岁，已婚，停经60天，阴道流血10余天，量较月经多，下腹痛伴发热3天。体检：体温39.0℃，血压80/60mmHg，心率100次/分，宫颈口有组织物堵塞，子宫增大如孕2个月大，压痛明显，附件区增厚，压痛，下列哪项治疗措施是正确的

- A 抗生素同时取出大块组织以减少出血，待炎症控制后行清宫术
- B 抗生素同时行清宫术
- C 大剂量抗生素治疗
- D 抗生素控制炎症后行清宫术
- E 抗生素同时给予催产素(缩宫素)促进组织物排出

正确答案：A 您选择的答案：

第83题 女，32岁。白带多，外阴痒，查：宫颈、阴道充血，分泌物呈脓性，宫颈颗粒型糜烂，重度，下列哪项治疗方案最佳

- A 物理疗法
- B 局部活检+局部药物腐蚀+全身消炎
- C 局部药物消炎
- D 宫颈锥形切除术
- E 局部消炎后，局部活检，若为阴性，则物理疗法

正确答案：E 您选择的答案：

第84题 女，36岁，白带多，外阴痒，白带稀薄，灰黄色。妇科检查：阴道宫颈充血，阴道内多量稀薄泡沫状白带，其诊断为

- A 滴虫性阴道炎
- B 细菌性阴道炎
- C 念珠菌阴道炎
- D 淋病
- E 老年性阴道炎

正确答案：A 您选择的答案：

第85题 女，26岁，人流后体温39.0℃，小腹疼痛据按，呈脓性，白细胞 $18 \times 10^9/L$ ，中性0.92，下列治疗方案哪项最佳

- A 为尽快去除感染病灶，防止今后复发，宜行刮宫治疗
- B 为防止反复发作，对盆腔炎病人的丈夫应同时治疗
- C 做细菌培养+药敏试验以选用适宜药物
- D 宜选用广谱抗生素配以抗厌氧菌药物，等药敏结果出来后再适当调整
- E 宜选用广谱抗生素配以抗厌氧菌药物，同时作阴道冲洗，局部抗炎治疗

正确答案：D 您选择的答案：

第86题 某女，21岁，未婚，因白带多、外阴疼痛、尿痛2天就诊，既往健康，月经正常，未生育过，一周来与一商人同居，妇查前庭充血，阴道有大量绿色脓性分泌物，挤压阴道前壁尿道口有脓流出，宫颈充血水肿，有脓性分泌物流出，子宫前位，大小正常，活动好，附件(-)。首选的检查是

- A 抽血查ESR
- B 尿常规
- C 宫颈细胞学涂片防癌检查
- D 宫颈分泌物涂片革兰氏染色及淋菌培养
- E 滴虫霉菌检查

正确答案：D 您选择的答案：

第87题 女性，25岁，孕21周，白带多，白带呈豆渣样，外阴奇痒，检查见小阴唇内侧及阴道黏膜上附着白色膜状物，其诊断为

- A 滴虫性阴道炎
- B 细菌性阴道炎

- C. 念球菌阴道炎
- D. 淋病
- E. 老年性阴道炎

正确答案：C 您选择的答案：

第88题 30岁女性，主诉白带增多，检查宫颈外观呈细颗粒状红色区，占整个宫颈面积的2/3，本例恰当处置应是

- A. 局部活检+局部药物腐蚀+全身消炎
- B. 阴道放置药物
- C. 物理疗法
- D. 宫颈锥形切除
- E. 局部消炎后，局部活检，若为阴性，则物理疗法

正确答案：E 您选择的答案：

第89题 患者32岁，结婚5年不育，两年来月经量少，近3个月闭经，经常低热。妇科检查：子宫稍小，活动欠佳，两侧宫旁组织增厚，右侧有4cm×4cm×6cm肿物，轻度压痛，血沉30mm/小时，子宫输卵管碘油造影呈串珠样改变，首选的治疗措施是

- A. 丹那唑口服
- B. 中药活血化瘀
- C. 静脉点滴青霉素
- D. 系统抗结核治疗
- E. 开腹探查术

正确答案：D 您选择的答案：

三、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第90-93题

某女24岁，农民，因结婚四年未孕求诊，结婚前后从未来过月经，过去健康状况尚可，妇检：子宫小，活动受限，双附件增厚。子宫输卵管碘油造影见子宫狭小畸形，双输卵管均不通，僵直，有多处狭窄，盆腔有散在钙化点

1. 不宜做下列哪项检查

- A. 雌激素试验
- B. 染色体检查
- C. 基础体温检查
- D. 男方精液常规检查
- E. 输卵管通水

2. 下列哪项检查不具特异性

- A. 胸部X线平片
- B. 盆腔X线平片
- C. ESR和PPD-IgG
- D. 诊断性刮宫
- E. 结核菌培养

3. 若作诊断性刮宫，下列注意事项哪项是错误的

- A. 应于经前1周或月经来潮12小时内刮宫
- B. 术前3天，术后4天，每天肌注链霉素1g
- C. 应注意刮取子宫角部内膜
- D. 将全部刮出物送病理检查
- E. 病理切片上找不到典型结核结节，就可排除结核

4. 若作诊断性刮宫时，探宫腔长6cm，未刮出组织；宫腔镜检查见内膜苍白，疤痕化，有粘连。则下述诊断哪项可排除

- A. 子宫内膜结核
- B. 输卵管结核
- C. 原发性不孕
- D. 盆腔结核
- E. 先天性子宫输卵管畸形

正确答案：EAEE 您选择的答案：

第94-95题

女，20岁，未婚，身高162cm，体重52kg，乳房、外阴发育良好，至今月经未来潮，无任何不适，超声检查内生殖器发育正常。童年曾患结核性腹膜炎。

1. 此患者闭经最可能的诊断是

- A. 先天性卵巢缺如
- B. 先天性子宫缺陷
- C. 子宫内膜结核
- D. 处女膜闭锁
- E. 垂体瘤

2. 为明确诊断需做哪项辅助检查

- A. 腹腔镜检查并取腹腔液作结核菌培养
- B. 子宫输卵管碘油造影见到典型结核特征
- C. 染色体检查
- D. 诊断性刮宫
- E. 剖腹探查

正确答案：CA 您选择的答案：

第96-98题

32岁，外阴瘙痒伴分泌物多4~5天，妇科检查：阴道粘膜散在红色斑点，阴道内多量脓性泡沫状分泌物，有臭味

1. 对此病人进行检查时，不正确操作是

- A. 取分泌物前不能做双合诊
- B. 取分泌物前先行碱性液体冲洗
- C. 取分泌物行悬滴法检查

- D 可疑病人多次悬滴法阴性时做培养  
E 检查标本应注意保暖  
2. 此病人确切诊断为  
A 细菌性阴道病  
B 霉菌阴道炎  
C 滴虫阴道炎  
D 淋球菌阴道炎  
E 外阴瘙痒症  
3. 此病人，治疗应首选  
A 局部用药即可达治愈  
B 全身及局部同时用药效果最佳  
C 使用碱性液冲洗阴道可提高疗效  
D 症状消失复查分泌物转阴即停药  
E 男方不易感染，无需用药治疗  
正确答案：BCB 您选择的答案：

#### 第99-100题

40岁，近三日白带多，伴外阴痒就诊，查外阴粘膜充血，阴道壁充血，分泌物黄色，中等量，呈泡沫状，宫颈充血

1. 此病人应进行的辅助检查是  
A 血常规  
B 尿常规  
C 阴道分泌物细菌培养及药敏试验  
D 悬滴法阴道分泌物查滴虫  
E 阴道细胞学检查  
2. 此病人确切诊断为  
A 霉菌性阴道炎  
B 滴虫阴道炎  
C 老年性阴道炎  
D 阿米巴性阴道炎  
E 外阴瘙痒  
正确答案：DB 您选择的答案：

#### 第101-102题

女，36岁。阴道分泌物多，伴腰酸，妇科检查：宫颈肥大，呈颗粒突起，波及面积不到2/3

1. 该病人可能诊断  
A 颗粒型E，轻度  
B 乳突状E，轻度  
C 颗粒型E，中度  
D 颗粒型E，重度  
E 乳突型E，中度  
2. 对此病人最佳治疗为  
A 宫颈锥切术  
B 局部药物腐蚀、消炎  
C 全身抗炎  
D 物理治疗  
E 手术切除子宫  
正确答案：CD 您选择的答案：

四、A4型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

#### 第103-106题

女22岁，未婚，身高159cm，体重55kg，乳房发育好，至今月经未来，无任何不适，超声检查内生殖器发育正常。追问病史，童年曾患结核性腹膜炎，经治疗而愈。

1. 闭经最可能的诊断是  
A 先天性子宫缺如  
B 子宫内膜结核  
C 处女膜闭锁  
D 垂体瘤  
E 先天性无阴道  
2. 如果怀疑内生殖器结核，为获得诊断依据，下列哪项辅助检查最合适  
A 腹腔镜检查并取腹腔液作结核菌培养  
B 子宫输卵管碘油造影见到典型结核特征  
C X线片见到盆腔钙化灶  
D 取子宫内膜作结核菌培养  
E 血沉测定  
3. 如果该患者是处女膜闭锁，下列哪项不是其诊断依据  
A 第二性征发育良好  
B 可有周期性腹痛或下腹不适感  
C 妇检处女膜呈紫蓝色，向外膨隆  
D 经血流入腹腔而出现急腹痛  
E 肛查可扪及阴道膨隆呈球状压向直肠  
4. 假设该患者26岁婚后2年未孕，为确诊下列哪项检查是错误的  
A 子宫内膜病理检查  
B 腹腔镜检查  
C 子宫输卵管碘油造影  
D 盆腔X线平片检查  
E 阴道分泌物培养  
正确答案：BCDE 您选择的答案：



五、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第107-108题

- A 滴虫阴道炎
- B 霉菌性阴道炎
- C 老年阴道炎
- D 幼女阴道炎
- E 淋球菌阴道炎

1. 妊娠、糖尿病患者及接受大量雌激素治疗者易于发生
2. 白带呈脓性泡沫状，用酸性液体冲洗阴道可提高疗效

正确答案：BA 您选择的答案：

第109-110题

- A 子宫颈糜烂
- B 子宫颈息肉
- C 子宫颈肥大
- D 子宫颈腺体囊肿
- E 子宫颈炎

1. 慢性炎症刺激，增生的宫颈粘膜向宫口外突出形成
2. 宫颈深部组织发炎，表层鳞状上皮细胞脱落，由增生的柱状上皮覆盖

正确答案：BA 您选择的答案：

第111-113题

- A. 大剂量青霉素
- B. 淋必治
- C. 盐酸四环素
- D. 庆大霉素
- E. 红霉素

1. 无合并症的淋菌感染首选
2. 对青霉素耐药的淋病患者选用
3. 对青霉素过敏的淋病患者选用

正确答案：ABE 您选择的答案：

第114-115题

- A. 单纯型中度糜烂
- B. 颗粒型中度糜烂
- C. 乳突型重度糜烂
- D. 乳突型中度糜烂
- E. 颗粒型重度糜烂

1. 女，30岁，白带多，呈淡黄色黏稠状。妇科检查：宫颈表面糜烂平坦，占宫颈面积 $1/3 \sim 2/3$ ，其诊断为
2. 女，33岁，白带多，呈淡黄色，脓性，时有性交后出血，感腰骶部酸痛。妇科检查：宫颈肥大，充血，糜烂面呈颗粒状，占宫颈面积大于 $2/3$ ，其诊断为

正确答案：AE 您选择的答案：

第116-117题

- A. 滴虫性阴道炎
- B. 霉菌性阴道炎
- C. 老年性阴道炎
- D. 细菌性阴道炎
- E. 阿米巴阴道炎

1. 育龄妇女阴道pH值升高时容易发生
2. 糖尿病患者及长期使用广谱抗生素患者易发生

正确答案：AB 您选择的答案：

第118-119题

- A 滴虫性阴道炎
- B 霉菌性阴道炎
- C 细菌性阴道炎
- D 老年性阴道炎
- E 幼女性阴道炎

1. 用2%~4%碳酸氢钠冲洗阴道
2. 因吞噬精虫可引起不孕

正确答案：BA 您选择的答案：

第120-121题

- A 高热、子宫两侧压痛明显，白细胞升高
- B 停经、恶心呕吐，阴道少量出血
- C 痛经逐渐加重，盆腔有肿块
- D 不孕，输卵管碘油造影呈串珠样
- E 停经，压痛及反跳痛，后穹窿饱满

1. 生殖器结核是
2. 急性盆腔炎是

正确答案：DA 您选择的答案：

第122-123题

- A 较大子宫壁间肌瘤
- B 输卵管炎症

- C 子宫颈
- D 宫颈原位癌
- E 子宫内膜异位症
- 1. 不孕症最常见的原因
- 2. 月经过多原因

正确答案：BA 您选择的答案：

第124-125题

- A 卵巢囊肿蒂扭转
- B 急性盆腔炎
- C 急性阑尾炎
- D 宫外孕
- E 卵巢巧克力囊肿
- 1. 高热、腹痛、触诊宫旁两侧片状增厚，诊为
- 2. 经期腹痛，子宫一侧或双侧可及肿物，活动受限，诊为

正确答案：BE 您选择的答案：

第126-127题

- A. 甲硝唑栓
- B. 1：500高锰酸钾溶液冲洗
- C. 制霉菌素栓
- D. 6%小苏打液冲洗
- E. 2%醋酸溶液冲洗
- 1. 外阴瘙痒，白带呈灰黄色泡沫状，阴道黏膜散在充血点，局部用
- 2. 外阴奇痒，白带呈白色豆渣样，阴道黏膜红肿，局部用

正确答案：AC 您选择的答案：

第128-129题

- A. 滴虫性阴道炎
- B. 霉菌性阴道炎
- C. 老年性阴道炎
- D. 幼女性阴道炎
- E. 淋球菌性阴道炎
- 1. 妊娠、糖尿病患者及接受大剂量雌激素治疗者
- 2. 白带呈脓性泡沫状，用酸性液体冲洗阴道可提高疗效

正确答案：BA 您选择的答案：

第130-131题

- A 甲硝唑
- B 土霉素
- C 2%醋酸冲洗
- D 制霉菌素
- E 5%碳酸氢钠冲洗
- 1. 外阴瘙痒白带呈泡沫状，阴道粘膜散在红斑点，局部用
- 2. 外阴瘙痒，白带呈豆渣状，阴道粘膜红肿，局部

正确答案：AD 您选择的答案：

习题集 妇产科学 外阴白色病变

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 属于癌前病变的外阴白色病变是

- A．增生型营养不良
- B．硬化苔癣型营养不良
- C．混合型营养不良
- D．营养不良伴有上皮不典型增生
- E．白癜风

正确答案：D 您选择的答案：

第2题 外阴白色病变的诊断下列哪项是错误的

- A 活检作病理诊断是最可靠的诊断依据
- B 应在病变区作多点活检
- C 活检应选在皮肤有皲裂、溃疡、隆起、硬结和粗糙等不同部位取材，方能作出病理分类
- D 用碘涂病变区，皮肤不着色区活检
- E 由于病变不恒定，活检不仅要多点取材，还要定期随访，才能提高准确率

正确答案：D 您选择的答案：

第3题 外阴白色病变的诊断下列哪项是错误的

- A．活检作病理诊断是最可靠的诊断依据
- B．应在病变区做多点活检
- C．活检应选在皮肤有皲裂、溃疡、隆起、硬结和粗糙等不同部位取材，方能作出病理分类
- D．用碘涂病变区，皮肤出现不着色区，做多点活检准确率高
- E．由于病变不恒定，活检不仅要多点取材，还要定期随访，才能提高准确率

正确答案：D 您选择的答案：

第4题 外阴色素减退性疾病又称

- A．外阴癌前病变
- B．外阴不典型增生
- C．外阴白色病变
- D．外阴癌
- E．非特异性外阴炎

正确答案：C 您选择的答案：

第5题 关于外阴瘙痒下列哪项是正确的

- A．外阴瘙痒是外阴癌的早期表现
- B．外阴瘙痒最常见的原因是蛲虫病
- C．外阴瘙痒严重时用肥皂液清洗会有所好转
- D．外阴瘙痒经治疗无效应作单纯性外阴切除术
- E．外阴瘙痒不是一种疾病而是多种疾病可引起的一种症状

正确答案：E 您选择的答案：

第6题 外阴硬化性苔癣的早期病理改变是

- A．表层细胞过度角化
- B．表层细胞增生
- C．真皮乳头层水肿
- D．毛囊角质栓塞
- E．底层细胞增生

正确答案：C 您选择的答案：

第7题 女，32岁。新婚一周，性生活困难。妇检：外阴粘膜变薄、干燥，可见破裂口，皮肤无弹性，阴蒂萎缩，小阴唇平坦消失。阴道口挛缩狭窄，仅容指尖，该患者的治疗应选用

- A 手术治疗
- B 全身+局部药物
- C 活检出现非典型增生时手术治疗
- D 雄激素制剂局部上药以缓解症状
- E 以上都不是

正确答案：D 您选择的答案：

第8题 女，50岁。因外阴瘙痒而就医，组织病理为增生型，营养不良，下列治疗中哪项是正确的

- A 因有恶变趋向，应及早手术治疗
- B 全身治疗
- C 补充多量维生素
- D 活检有非典型增生时手术治疗
- E 全身+局部治疗

正确答案：D 您选择的答案：

第9题 外阴硬化苔癣型营养不良的治疗，目前不主张采用的方法是

- A．口服脱敏药物
- B．手术治疗
- C．禁用刺激性药物擦洗
- D．激光治疗
- E．局部用药

正确答案：B 您选择的答案：

第10题 关于外阴色素减退疾病下列哪项是正确的

- A. 外阴色素减退疾病的病因是念珠菌感染
- B. 硬化性苔藓的病因与遗传、自身免疫、雄激素不足可能有关
- C. 增生型和混合型营养不良常继发癌变
- D. 外阴白色病变病理变化恒定，任何病变区域一次活检均能作出诊断
- E. 治疗原则以手术切除为宜

正确答案：B 您选择的答案：

第11题 女，37岁。外阴奇痒，分泌物不多。妇检：两侧小阴唇增厚，外阴粘膜不红，阴道畅，皱襞正常，无异常分泌物，宫颈柱状，光滑，I°肥大，子宫前位，常大，双附件(-)，为确诊应选用

- A. 外阴活检
- B. 阴道分泌物涂片
- C. 宫颈涂片(CGT)
- D. 阴道镜
- E. 盆腔B超

正确答案：A 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第12题 女性，40岁，近1个月发现外阴部色素减退，已行外阴活检。下列哪种病变是外阴癌的癌前病变

- A. 外阴增生型营养不良
- B. 外阴硬化苔藓型营养不良
- C. 外阴混合型营养不良
- D. 外阴白化病
- E. 外阴增生型或混合型营养不良伴上皮不典型增生

正确答案：E 您选择的答案：

第13题 女，50岁，外阴奇痒难忍，分泌物不多，热水洗后暂时缓解，外院诊断为外阴白斑和外阴白色病变。前来咨询。妇科检查：外阴皮肤增厚、色素减退、湿疹样变，下列哪项回答是正确的

- A. 凡外阴皮肤黏膜变白、变厚或萎缩，在组织病理检查前统称为外阴白魔
- B. 外阴白斑和外阴白色病变是两种不同的疾病
- C. 外阴白斑是一种癌前病变，应及早手术
- D. 外阴白色病变是指外阴皮肤和黏膜发生变性及色素改变的一种慢性疾病，恶变率低，主张非手术治疗
- E. 外阴白色病变久治无效是恶变先兆，应手术治疗

正确答案：D 您选择的答案：

第14题 女性，42岁，已婚。因外阴白色病变而做外阴活检，病理报告为“外引上皮非典型轻度增生”，是指下列哪种情况

- A. 外阴上皮增生性营养不良
- B. 外阴上皮硬化苔藓性营养不良
- C. 外阴上皮混合型营养不良
- D. 异型细胞局限于表层浅部下1/3
- E. 异型细胞局限于表层深部下1/3

正确答案：E 您选择的答案：

第15题 女，50岁，因外阴瘙痒而就医，组织病理学诊断为外阴白色病变，下列治疗措施中哪项是错误的

- A. 保守治疗，久治无效者手术治疗
- B. 病变部位出现重度非典型增生者手术治疗
- C. 病变局部出现溃疡结节时手术治疗
- D. 为防癌变及早手术治疗
- E. 全身+局部药物治疗

正确答案：D 您选择的答案：

三、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第16-17题

女性，54岁，已婚，因外阴反复瘙痒5年就诊。检查：外阴双侧大、小阴唇上端、肛门周围及阴蒂皮肤色素减退，局部粗糙、增厚。

1. 其诊断为
  - A. 外阴白癬
  - B. 外阴增生性营养不良
  - C. 外阴萎缩性营养不良
  - D. 外阴苔藓硬化性营养不良
  - E. 外阴佩吉特病

2. 其处理首选

- A. 外阴活检
- B. 局部药物治疗
- C. 局部物理治疗
- D. 局部激光治疗
- E. 手术切除

正确答案：BA 您选择的答案：

第18-19题

女性，58岁，因外阴瘙痒2年就诊。妇科检查：外阴大小阴唇1/2区及会阴后联合处色素减退，局部皮肤增厚、粗糙。外阴活检报告为“表皮角化过度，棘皮：层不规则增厚，上皮脚向下延伸，非典型增生占表皮深部下2/3层”。

1. 其诊断为
  - A. 外阴白癬

B. 外阴白色病变  
C. 外阴原位癌  
D. 外阴增生性营养不良伴中度非典型增生  
C. 外阴萎缩性营养不良伴中度非典型增生  
2. 其最佳治疗宜选择  
A. 局部药物治疗  
B. 激素治疗  
C. 手术治疗  
D. 激光治疗  
E. 放射治疗  
正确答案：DC 您选择的答案：

第20-21题

女性，45岁，已婚，外阴瘙痒3年。检查，双侧大阴唇及后联合处色素减退，局部皮肤增厚、粗糙、隆起，并有湿疹样变。

1. 其诊断应考虑为  
A. 外阴炎  
B. 外阴湿疹  
C. 外阴神经性皮炎  
D. 外阴白色病变  
E. 外阴白斑  
2. 宜选择哪种处理  
A. 地塞米松软膏外用  
B. 外阴活检  
C. 激光治疗  
D. 局部物理治疗  
E. 外阴切除  
正确答案：DB 您选择的答案：

四、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第22-24题

A. 多见于50岁以前的中年妇女，外阴瘙痒为主要症状  
B. 可发生于任何年龄妇女，以40岁左右发病率最高，晚期病例有阴道口挛缩狭窄  
C. 青春期发病者居多，外阴色素减退，但皮肤光滑润泽、弹性正常  
D. 常见于绝经后的老年妇女，阴道分泌物增多及外阴瘙痒是主要症状  
E. 常见于5岁以下的幼女主要表现为阴道分泌物增加，呈脓性  
1. 外阴白癜风表现为  
2. 外阴硬化性苔藓表现为  
3. 外阴扁平上皮细胞增生表现为  
正确答案：CBA 您选择的答案：

习题集 妇产科学 妇科病史及检查

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 下列检查卵巢功能准确性最高的方法是

- A B超检查
- B 阴道细胞学检查
- C 基础体温测定
- D 子宫内膜病理检查
- E X线检查

正确答案：D 您选择的答案：

第2题 妇科检查时，下述哪项是不对的

- A 盆腔检查前应首先排空膀胱
- B 每检查一个病人应更换臀垫
- C 查内诊前应消毒外阴
- D 避免月经期内诊检查
- E 未婚者禁内诊检查

正确答案：E 您选择的答案：

第3题 关于妇科检查的操作，下列哪项是错误的

- A．凡有阴道流血者均不应做妇科检查
- B．一般妇科检查取膀胱截石位
- C．妇科检查前应排空膀胱
- D．未婚女性一般禁做双合诊及窥器检查
- E．每检查一人，应更换置于臀部下面的垫单

正确答案：A 您选择的答案：

第4题 对于未婚者，应采取的检查方法为

- A．双合诊
- B．三合诊
- C．肛诊
- D．阴道扪诊
- E．都不对

正确答案：C 您选择的答案：

第5题 关于妇科检查的描述，以下哪项是错误的

- A．正常输卵管不能扪及
- B．拨动宫颈时患者感觉疼痛称为宫颈举痛
- C．正常卵巢偶可扪及
- D．"倾"是子宫纵轴与宫颈纵轴的关系
- E．三合诊可弥补双合诊的不足

正确答案：D 您选择的答案：

第6题 一般盆腔检查时应取体位是

- A．平卧
- B．侧卧
- C．俯卧
- D．膀胱截石位
- E．膝胸卧位

正确答案：D 您选择的答案：

第7题 关于妇科检查哪项是不正确的

- A．双合诊是盆腔检查中最重要的项目
- B．双合诊的目的是摸清宫颈、宫体的位置
- C．三合诊弥补双合诊的不足
- D．直肠—腹部诊一般用于未婚、阴道闭锁等不宜行双合诊的患者
- E．双手指放入阴道患者感疼痛不适时，可单用示指替代双指进行检查

正确答案：B 您选择的答案：

第8题 关于盆腔检查的基本要求，下列描述错误的是

- A．除尿失禁患者外，检查前应排空膀胱
- B．月经期可行盆腔检查
- C．对未婚患者禁作双合诊及阴道窥器检查
- D．每检查一人，应更换置于臀部的垫单或纸单
- E．一般盆腔检查时均取膀胱截石位

正确答案：B 您选择的答案：

第9题 男医生为未婚者检查时

- A．需要上级医生在场
- B．需要女医生在场
- C．需要病人家属在场
- D．需要其他医护人员在场
- E．单独一个亦可

正确答案：D 您选择的答案：

第10题 采集妇产科病史时，应避免

- A．可询问病人家属

- B. 遇病人有难言之隐，单独询问病人  
C. 结合辅助检查，了解病史  
D. 索取外院病情记录  
E. 暗示，臆测

正确答案：E 您选择的答案：

第11题 发现子宫后壁直肠子宫陷凹，宫骶韧带病变选用

- A 双合诊  
B 三合诊  
C 直肠腹部诊  
D 腹部扪诊  
E 肛诊

正确答案：B 您选择的答案：

第12题 下列哪项检查不能反映雌激素分泌水平

- A 宫颈粘液干燥后形成羊齿状结晶  
B 尿雌三醇测定  
C 子宫内膜呈增殖期变化  
D 阴道脱落细胞中大部分为角化细胞  
E 基础体温高温相

正确答案：E 您选择的答案：

第13题 采集妇科病史时，下列哪项是不恰当的

- A. 不管病情轻重缓急，必须在完全了解和掌握病情后才能开始抢救  
B. 对外院转诊者，应阅读病情介绍，作为重要参考资料  
C. 对患者可以启发，但应避免暗示  
D. 主诉应简单明确地指出主要症状和发病时间  
E. 对有鉴别诊断意义的阴性症状应列入现病史中

正确答案：A 您选择的答案：

第14题 反映卵巢有排卵功能的检查为

- A 基础体温单相型  
B 阴道脱落细胞反映为轻度雌激素影响  
C 宫颈粘液有羊齿状结晶  
D 子宫内膜呈增殖期变化  
E 子宫内膜呈分泌期变化

正确答案：E 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第15题 女，26岁。月经规律，现停经45天，阴道少量出血7天，时有阵阵腹痛或腰酸。妇科检查：宫颈软，摇摆痛(+)，少量血染，宫体略大而软，附件(-)，对此病例首先考虑何种疾病

- A 子宫内膜癌  
B 先兆流产  
C 宫外孕  
D 孕卵型功血  
E 无排卵型功血

正确答案：C 您选择的答案：

第16题 女，46岁。以往月经规律，近两年月经不规律。且月经量增多。本次停经2个月余出血已15天，量仍多伴头晕。妇检查：宫颈光滑，宫体前位，正常大小，附件未及，阴道内多量鲜血和血块。贫血貌。对此患者首选下列何项诊疗措施

- A 止血药加静脉抗生素  
B 止血药加补充铁剂  
C 大量雌激素止血并支持疗法  
D 诊断性刮宫，支持疗法  
E 大量孕激素并支持疗法

正确答案：D 您选择的答案：

第17题 女，36岁。孕3个月自然流产后7天，阴道出血不多，但分泌物呈脓血性，有气味，发热伴小腹疼痛5天，今晨疼痛加剧。体检：体温39.6℃，痛苦病容，腹痛拒按，子宫略大而软，压痛，右侧附件区压痛明显，触及一边界不清囊性肿块，约5cm×6cm×4cm大小，左侧轻压痛，白细胞 $1.5 \times 10^9/L$ ，中性0.9，血红蛋白10g，诊为

- A 急性盆腔炎，盆腔脓肿形成  
B 右侧卵巢囊肿继发感染  
C 流产诱发急性阑尾炎  
D 异位妊娠  
E 卵巢囊肿蒂扭转

正确答案：A 您选择的答案：

第18题 女，65岁。绝经8年，近两年白带增多，时而呈血性，最近半年来反复阴道少量出血，色红，不伴腹痛。妇科检查：宫颈光，子宫正常大小，未见明显萎缩，附件(-)，对此病例首先考虑

- A 子宫内膜炎  
B 老年性阴道炎  
C 颗粒细胞瘤  
D 子宫内膜癌  
E 子宫颈管癌

正确答案：D 您选择的答案：

第19题 女，30岁。外阴肿物疼痛一周，加剧5小时。查：右侧前庭腺红肿，触痛(+)，波动(+)，应如何处理

- A 全身抗生素治疗+支持疗法
- B 脓肿挖出术+抗生素应用
- C 脓肿切开引流并造口术+抗生素
- D 脓肿切开引流+抗生素应用
- E 局部抗生素应用+全身支持疗法

正确答案：C 您选择的答案：

第20题 女性，阴道分泌物不多，外阴瘙痒。妇科检查：外阴充血，阴道内见多量豆渣样分泌物粘膜红肿。下列何种疾病可能最大

- A 念珠菌阴道炎
- B 滴虫性阴道炎
- C 细菌性阴道炎
- D 淋病性阴道炎
- E 沙眼衣原体阴道炎

正确答案：A 您选择的答案：

三、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第21-22题

少女，16岁。诉腹部日渐增大，无明显不适。月经不规律。腹部隆起如孕6个月，可及边界不清肿块，囊性无压痛。

外阴视诊：发育良好。

1. 考虑可能的疾病中，下列哪项应首先排除

- A 晚期卵巢癌伴腹水
- B 妊娠
- C 尿潴留
- D 卵巢巨大囊肿
- E 子宫肌瘤变性

2. 为明确诊断，首选下列哪项检查措施

- A 常规妇科三合诊检查
- B 双合诊检查
- C 超声多普勒检查
- D 产科四部触诊，听胎心
- E 阴道窥器检查

正确答案：CA 您选择的答案：



习题集 妇产科学 异常产褥

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 晚期产后出血的治疗中，哪项是错误的

- A．阴道大量出血，立即行子宫全切术
- B．少量或中等量子宫出血给予足量广谱抗生素、宫缩剂等治疗
- C．疑有胎盘、胎膜、蜕膜残留行刮宫术
- D．产后滋养细胞肿瘤可行化疗术
- E．大量出血者应备血

正确答案：A 您选择的答案：

第2题 产褥病率的定义是

- A 指分娩24小时内每小时测体温，测量4次，体温有2次达到或超过38
- B 产褥期内有两次体温达到或超过38 者
- C 产后24小时以后的10日内用口表每日测量4次，体温有2次达到或超过38
- D 产后24小时以后一周内用口表每日测量4次体温，有2次达到或超过38
- E 产后24小时以后的1个月内用口表每日测量4次，体温有2次达到或超过38

正确答案：C 您选择的答案：

第3题 产褥感染处理原则，错误的是

- A．选用有效的抗生素
- B．纠正全身一般情况
- C．半卧位以利引流
- D．禁用宫缩剂，避免感染扩散
- E．胎盘残留者，应控制感染后清宫

正确答案：D 您选择的答案：

第4题 产褥感染最常见的是

- A．急性子宫内膜炎
- B．急性盆腔结缔组织炎
- C．急性输卵管炎
- D．急性腹膜炎
- E．栓塞性静脉炎

正确答案：A 您选择的答案：

第5题 下列哪一种产褥感染严重时可形成“冰冻骨盆”

- A．急性子宫内膜炎
- B．急性子宫肌炎
- C．急性输卵管炎
- D．急性盆腔腹膜炎
- E．急性盆腔结缔组织炎

正确答案：E 您选择的答案：

第6题 有关产褥感染下列哪项是正确的

- A．指产后生殖器官感染后，引起局部和全身的炎性变化
- B．多为单种细菌感染
- C．凡产褥期体温升高均为生殖器感染所致
- D．产后未发生产褥感染，宫腔内培养不出细菌
- E．以上都不是

正确答案：A 您选择的答案：

第7题 产褥感染的来源，错误的是

- A．产妇产道或肠道的细菌
- B．妊娠末期性交
- C．医务人员呼吸道
- D．产科手术器械
- E．注射催产素(缩宫素)

正确答案：E 您选择的答案：

第8题 在产褥病率的原因中，最常见的是

- A．产褥感染
- B．乳腺炎
- C．急性上呼吸道感染
- D．急性胃肠炎
- E．泌尿系感染

正确答案：A 您选择的答案：

第9题 关于产褥感染的细菌及病原，哪项是错误的

- A 大肠埃希菌是外源性感染的主要菌种
- B 葡萄球菌中以金黄色葡萄球菌致病力最强
- C 支原体和衣原体不是产褥感染的病原体
- D 厌氧性链球菌与大肠埃希菌混合感染，有异常臭气味
- E B族链球菌产生外毒素与溶组织酶，使其致病力，毒力，播散能力较强可引起严重感染

正确答案：C 您选择的答案：

第10题 产褥感染中最常见的病原菌是

- A．溶血性链球菌

- B. 厌氧链球菌
- C. 大肠杆菌
- D. 葡萄球菌
- E. 产气荚膜杆菌

正确答案：B 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第11题 某产妇，产钳助产分娩后10天，左下肢肿胀，有痛感，活动后加重，体温37.2，检查：左下肢周径比右侧粗2cm，最可能的诊断是

- A. 下肢血栓性静脉炎
- B. 盆腔腹膜炎
- C. 子宫内膜炎
- D. 盆腔血栓性静脉炎
- E. 左侧宫旁结缔组织炎

正确答案：D 您选择的答案：

第12题 剖宫产后8天，寒战、高热，下腹持续性疼痛1天，恶露量多，头晕、乏力，体温39.5，脉搏110次/分，血压80/60mmHg。宫底脐上1横指，子宫体软。其诊断为

- A. 急性外阴、阴道、宫颈炎
- B. 急性子宫内膜炎
- C. 急性盆腔结缔组织炎
- D. 急性盆腔腹膜炎
- E. 血栓性静脉炎

正确答案：B 您选择的答案：

第13题 产妇，26岁。孕38周时胎膜早破入院，48小时后因持续性枕横位以产钳术助娩一活男婴3300g，术后3天发热达39，检查发现咽部轻度充血，乳房胀满疼痛，局部皮肤不红，按之无波动感。宫底脐下一横指，宫体有压痛，下腹壁无反跳痛，恶露混浊，稍有异味。该病人最可能的诊断是

- A. 急性子宫内膜炎
- B. 急性子宫内膜及肌炎
- C. 上呼吸道感染
- D. 乳腺炎
- E. 盆腔腹膜炎

正确答案：B 您选择的答案：

第14题 产妇，32岁。剖宫产一男活婴，产后一周，寒战，高热，左下肢持续性疼痛一天，恶露量多，头晕，乏力，体温39.5，脉搏120次/分，血压110/70mmHg，此病人最可能的诊断是

- A. 子宫肌炎
- B. 盆腔结缔组织炎
- C. 血栓性静脉炎
- D. 盆腔腹膜炎
- E. 败血症

正确答案：C 您选择的答案：

三、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第15-16题

足月产后10天，恶露不多。夏季，天气闷热，产妇感口渴、胸闷、心悸，体温38.9，脉搏116次/分，呼吸28次/分，血压80/50mmHg。

1. 此产妇的诊断是
  - A. 急性子宫内膜炎
  - B. 急性盆腔结缔组织炎
  - C. 产褥中暑
  - D. 败血症
  - E. 感染性休克
2. 以下处理哪项是不恰当的
  - A. 立即改变高温和不通气环境
  - B. 立即物理降温
  - C. 4 葡萄糖盐水1000~1500ml 静滴，药物降温
  - D. 纠正酸中度及电解质紊乱
  - E. 抗生素预防感染

正确答案：CB 您选择的答案：

第17-19题

产妇，37岁。C1Po，胎膜已破3天，临产2天，胎动消失半天，由乡卫生院转来。体检：体温39.9，脉搏124次/分，血压12.0/9.0kPa(90/60mmHg)，胎位LOA，先露+2，胎心110次/分。胎儿监测晚期减速。宫体压痛，尿色清，宫口开张2cm，血象：白细胞 $2.2 \times 10^9/L$ ，中性0.95，淋巴0.05

1. 下列诊断，哪项是错误的
  - A. 高龄初产
  - B. 胎膜早破
  - C. 产时感染
  - D. 先兆子宫破裂
  - E. 胎儿宫内窘迫
2. 下列处理哪项是错误的
  - A. 吸氧

- B 静脉抗生素
- C 高渗葡萄糖+维生素C静滴
- D 静注催产素促进阴道分娩
- E 刮宫产

3. 产后24小时，产妇寒颤，高热，体温高41℃，心率140次/分，血压6.0/2.0kPa(45/15mmHg)，子宫压痛，下腹反跳痛，用升压药无效，即刻处理哪项最恰当

- A 静滴抗生素以抗感染
- B 使用肾上腺皮质激素以抗休克
- C 纠正酸中毒和抗感染
- D 抗休克抗感染同时输注白蛋白
- E 抗休克抗感染同时行子宫切除术

正确答案：DDE 您选择的答案：

四、A4型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

#### 第20-23题

某产妇，30岁，妊娠41周，自然分娩1男婴，体重4100g，胎盘娩出后，阴道大量出血，为暗红色，量约500ml。检查胎盘胎膜完整，胎膜破口距胎盘边缘8cm。

1. 此时最可能的诊断是

- A. 前置胎盘
- B. 胎盘早剥
- C. 软产道损伤
- D. 子宫收缩乏力
- E. 胎盘残留

2. 首选的处理是

- A. 子宫全切
- B. 按摩子宫并注射宫缩剂
- C. 注射止血药物
- D. 子宫填塞纱布
- E. 清宫术

3. 若产后4天，该产妇腹痛、寒战，体温高达39℃，脉搏120次/分，血压60/40mmHg，血象：白细胞 $12 \times 10^9/L$ ，中性0.98。体检：下腹部压痛、反跳痛，恶露量不多，恶臭。最可能的诊断是

- A. 心力衰竭
- B. 出血性休克
- C. 感染性休克
- D. DIC
- E. 酸中毒

4. 下列处理哪项不必要

- A. 抗感染
- B. 积极抢救休克
- C. 支持疗法
- D. 肾上腺皮质激素
- E. 保守治疗无效行子宫切除

正确答案：DBCE 您选择的答案：

五、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

#### 第24-25题

- A 葡萄球菌
- B β-溶血性链球菌
- C 大肠杆菌
- D 淋球菌
- E 厌氧性链球菌

1. 致病性最强，可产生多种毒性物质，导致严重败血症

2. 产生内毒素最易发生菌血症，而致感染休克

正确答案：BC 您选择的答案：

习题集 妇产科学 分娩期并发症

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 下列何种现象不能提示胎儿窘迫

- A 胎心率 > 160次 / 分
- B 胎心率 < 120次 / 分
- C 头皮血液pH值 < 7.2
- D 头位时羊水含胎粪
- E 宫缩时出现早期减速

正确答案：E 您选择的答案：

第2题 下述哪项不是抢救羊水栓塞的措施

- A 抗循环衰竭
- B 抗呼吸衰竭
- C 纠正DIC及继发纤溶
- D 在第一产程者应加强催产素应用，促使其尽早分娩
- E 在第二产程发生者可根据情况经阴道助产

正确答案：D 您选择的答案：

第3题 下述脐带异常最易引起分娩时胎儿发生宫内窘迫的是

- A . 脐带过长
- B . 脐带先露
- C . 脐带过短
- D . 脐带假结
- E . 脐带扭转

正确答案：C 您选择的答案：

第4题 出现产后出血不易被立即发现的是

- A . 胎盘滞留
- B . 胎盘嵌顿
- C . 胎盘植入
- D . 胎盘粘连
- E . 胎盘剥离不全

正确答案：B 您选择的答案：

第5题 关于先兆子宫破裂的诊断依据，错误的是

- A . 宫缩频强，先露部下降受阻，产程延长
- B . 可见到病理缩复环
- C . 血红蛋白下降
- D . 下腹剧痛
- E . 明显血尿

正确答案：C 您选择的答案：

第6题 胎儿娩出后，随即阴道大量出血，最佳的处理方法是

- A 立即人工剥离胎盘，并注射宫缩剂
- B 抽血做交叉配血
- C 阴道检查有无软产道裂伤
- D 检查凝血功能
- E 立即静脉输入生理盐水

正确答案：A 您选择的答案：

第7题 引起产后出血的原因哪种最多见

- A . 子宫收缩乏力
- B . 胎盘因素
- C . 软产道裂伤
- D . 感染
- E . 凝血功能障碍

正确答案：A 您选择的答案：

第8题 关于产后出血的预防，下列哪项是错误的

- A 对具有较高产后出血危险的产妇做好及早处理的准备工作如配血
- B 第一产程要避免产妇过度疲劳
- C 第二产程时要指导产妇适时及正确使用腹压
- D 双胎妊娠，在第一胎肩部娩出后应肌注麦角新碱0.2mg
- E 产后2小时内应在产房内观察宫缩及阴道流血情况

正确答案：D 您选择的答案：

第9题 关于产后出血的定义正确的是

- A . 胎儿娩出后的24小时内阴道流血 > 500ml
- B . 胎盘娩出后阴道出血 > 500ml
- C . 胎儿娩出后阴道流血 > 500ml
- D . 分娩过程中的失血量 > 500ml
- E . 产后24小时后到产后42天阴道流血 > 500ml

正确答案：A 您选择的答案：

第10题 出现先兆子宫破裂时应立即

- A . 吸氧

- B. 补液
- C. 剖宫产
- D. 行穿颅术
- E. 行产钳术

正确答案：C 您选择的答案：

第11题 下列胎盘因素中哪项不会引起出血表现

- A. 胎盘剥离不全
- B. 胎盘剥离后滞留
- C. 胎盘嵌顿
- D. 完全胎盘粘连
- E. 胎盘胎膜残留

正确答案：D 您选择的答案：

第12题 宫缩乏力性产后出血临床表现正确的是

- A. 出血多为持续性，血色鲜红
- B. 胎盘未剥离前即出血
- C. 宫缩时出血量多
- D. 宫体软，轮廓不清
- E. 阴道流血量不多，可排除宫缩乏力性产后出血

正确答案：D 您选择的答案：

第13题 羊水进入母体循环最常见的途径为

- A. 子宫颈管粘膜的静脉
- B. 子宫体部内膜静脉
- C. 不正常开放的子宫血管
- D. 胎盘附着处的血窦
- E. 剖宫产子宫切口处开放的血管

正确答案：A 您选择的答案：

第14题 下列哪项提示胎儿宫内窘迫

- A. 胎心率130次/分
- B. 妊娠近足月时，胎动，20次/24小时
- C. 孕妇尿雌三醇值15mg/24小时
- D. 头位，羊水胎粪污染
- E. 雌激素/肌苷(E/C)比值>15

正确答案：D 您选择的答案：

第15题 羊水栓塞最早出现的症状是

- A. 急性左心衰竭
- B. 急性肝功能衰竭
- C. 急性肾功能衰竭
- D. 急性呼吸衰竭
- E. 急性DIC

正确答案：D 您选择的答案：

第16题 产后出血最常见的原因是

- A. 宫颈裂伤
- B. 胎盘部分剥离
- C. 胎盘残留
- D. 子宫收缩乏力
- E. 凝血机制障碍

正确答案：D 您选择的答案：

第17题 关于产后出血预防正确的是

- A. 宫口开全肌注催产素10u
- B. 应在宫缩较强时娩出胎头
- C. 双胎妊娠，在第一胎肩部娩出后肌注催产素
- D. 胎儿娩出后，应用手按摩子宫帮助胎盘娩出
- E. 产后观察宫缩及阴道流血情况2小时

正确答案：E 您选择的答案：

第18题 胎儿娩出后立即出现的大量阴道出血，最佳的处理方法是

- A. 立即手取胎盘
- B. 检查有无软产道裂伤
- C. 抽血做交叉配血
- D. 检查凝血功能
- E. 立即输新鲜血

正确答案：B 您选择的答案：

第19题 产后出血是指胎儿娩出后24小时内出血量超过

- A. 200ml
- B. 300ml
- C. 400ml
- D. 500ml
- E. 600ml

正确答案：D 您选择的答案：

第20题 下列疾病中哪项不易发生因DIC导致的产后出血

- A. 死胎

- B 重度妊高征
- C 羊水栓塞
- D 过期妊娠
- E 妊娠合并肝炎

正确答案：D 您选择的答案：

第21题 下列先兆子宫破裂不符合的是

- A 发现血尿
- B 发现病理缩复环
- C 子宫下段压痛明显
- D 胎心节律不齐
- E 已下降的胎儿先露部分上升，宫颈口回缩

正确答案：E 您选择的答案：

第22题 病理性缩复环最常见于

- A 高张性宫缩乏力
- B 妇女型骨盆
- C 软产道损伤
- D 头盆不称
- E 枕后位

正确答案：D 您选择的答案：

第23题 臀位妊娠时，胎儿宫内窘迫的诊断依据是

- A 胎动频，40次 / 24小时
- B 破水可见羊水胎粪污染
- C 胎心监护示：早期减速
- D 胎心听诊120 ~ 150次 / 分
- E 胎动时胎心率加速不明显，基线变异小于3次 / 分

正确答案：E 您选择的答案：

第24题 下述哪项不是产后出血的原因

- A 双胎妊娠
- B 滞产
- C 子宫畸形
- D 多次刮宫人流术后
- E 胎膜早破

正确答案：E 您选择的答案：

第25题 抢救羊水栓塞的首要措施是

- A 纠正DIC及继发纤溶
- B 纠正呼吸循环衰竭
- C 纠正肾功衰竭
- D 立即终止妊娠
- E 切除子宫

正确答案：B 您选择的答案：

第26题 下列哪种情况可出现病理性缩复环

- A 羊水过多
- B 梗阻性难产
- C 双胎
- D 胎盘早剥
- E 瘢痕子宫

正确答案：B 您选择的答案：

第27题 下述何项不是胎儿缺氧的表现

- A 晚期减速
- B 胎动记数 < 10次 / 12小时
- C 羊水黄绿色
- D 胎儿头皮血pH值7 . 28
- E CST示早期减速

正确答案：E 您选择的答案：

第28题 关于子宫收缩乏力性产后出血首选的处理是

- A 子宫切除
- B 按摩子宫并注射宫缩剂
- C 双手压迫腹部按摩子宫
- D 压迫腹主动脉
- E 乙醚刺激

正确答案：B 您选择的答案：

第29题 与宫缩乏力性产后出血无关的因素是

- A 产程延长
- B 双胎妊娠
- C 前置胎盘
- D 合并子宫肌瘤
- E 胎盘早剥

正确答案：E 您选择的答案：

第30题 关于产后出血的定义下述哪项是正确的

- A 分娩过程中出现血量，500ml

- B 胎盘娩出后24小时内阴道流血量超过500ml  
C 胎儿娩出后24小时内阴道流血量超过500ml  
D 产后24小时到产后10天阴道出血 > 500ml  
E 胎儿娩出后，阴道流血，500ml  
正确答案：C 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

- 第31题 某初产妇妊娠40周，估计胎儿体重可达4,000g，因宫口开大缓慢，以5%葡萄糖+缩宫素5单位静脉点滴，但产妇烦躁不安，疼痛难忍，腹部检查发现病理缩复环且有压痛，胎心尚在正常范围内，血性尿。其处理方法为  
A. 继续滴缩宫素，待宫口开全后作会阴切开助产  
B. 产钳术助产  
C. 胎头吸引术助产  
D. 会阴切开后头皮钳牵引助产  
E. 停滴缩宫素并立即剖宫产  
正确答案：E 您选择的答案：

- 第32题 34岁经产妇，妊娠40周，宫口近开全，自然破水后，突然咳嗽，随即出现发绀，寒战并呈休克状态，可能的诊断是  
A. 胎盘早剥  
B. 羊水栓塞  
C. 子宫破裂  
D. 前置胎盘  
E. 脑溢血  
正确答案：B 您选择的答案：

- 第33题 孕妇，25岁，妊娠39周。上午8点开始阵发性宫缩，10点胎膜破裂，下午16时肛门检查：宫口已开全，胎头先露，胎位LOA，胎头颅骨最低点在坐骨棘水平以下3cm，胎心率100次/分，羊水呈草绿色，粘稠。应如何处理  
A. 产钳术  
B. 剖宫产  
C. 等待自然分娩  
D. 加腹压  
E. 静点缩宫素  
正确答案：A 您选择的答案：

- 第34题 26岁C1P0孕41周，宫口开大4~5cm时，胎心120次/分，胎心监测示“晚期减速”，胎儿头皮血pH值7.16，最恰当的处理为  
A 产妇左侧卧位，观察产程，等待自然分娩  
B 面罩吸氧提高胎儿血氧供能  
C 静推葡萄糖+维生素C+可拉明，加强胎儿对缺氧的耐受力  
D 立即剖宫产  
E 待宫口开全，阴道助产缩短第二产程  
正确答案：D 您选择的答案：

- 第35题 产妇，25岁，40周妊娠，顺利娩出一男婴，新生儿脐带绕颈2周。出生Apgar I 分钟评分3分。在进行新生儿窒息抢救时，下列哪项程序是正确的  
A. 建立呼吸、清理呼吸道、预防感染、改善血液循环  
B. 清理呼吸道、建立呼吸、改善血液循环、预防感染  
C. 建立呼吸、清理呼吸道、改善血液循环、预防感染  
D. 清理呼吸道、建立呼吸、预防感染、改善血液循环  
E. 预防感染、改善血液循环、清理呼吸道、建立呼吸  
正确答案：B 您选择的答案：

- 第36题 初产妇，急产娩一男婴，体重3900g，胎盘娩出后半小时内有较多量间歇性阴道出血，色红，宫底，宫颈及肌肉已注催产素10单位，再次查看胎盘完整，胎膜有一处见血管中断于胎膜边缘，究竟其出血原因最可能是  
A 胎盘剥离不全  
B 软产道损伤  
C 胎盘残留  
D 产后宫缩乏力  
E 凝血功能障碍  
正确答案：C 您选择的答案：

- 第37题 29岁初产妇，妊娠40周，分娩经过正常，在胎儿娩出后产妇突然气急，呼吸困难，随即昏迷，BP60/40mmHg，最可能的诊断是  
A. 呼吸衰竭  
B. 心脑血管意外  
C. 羊水栓塞  
D. 子宫破裂  
E. 胎盘早剥  
正确答案：C 您选择的答案：

- 第38题 第一胎，足月妊娠临产已6小时，检查宫口开全，先露+2，羊水呈绿色混浊，胎心168次/分，胎先露LOA，无头盆不称征象，应选用何种方式分娩较妥  
A 剖宫产  
B 静脉滴注催产素  
C 产钳助产  
D 前列腺素催产  
E 等待自然分娩

正确答案：C 您选择的答案：

第39题 此病人下述急救措施不恰当的是

- A. 肾上腺素
- B. 正压给氧
- C. 低分子右旋糖酐
- D. 地塞米松
- E. 肝素

正确答案：A 您选择的答案：

第40题 女，25岁。孕40周，初孕，规律宫缩2小时来院，当时宫口扩张4cm，因宫缩强，半小时后宫口开全，第二产程仅15分钟即顺利娩出一男婴，胎儿娩出后即有鲜红血流出，5分钟后胎盘自然娩出。此后出血量仍较多，有血块。此时分析其出血原因最可能为

- A. 子宫收缩乏力
- B. 胎膜残留
- C. 胎盘残留
- D. 宫颈裂伤
- E. 凝血功能障碍

正确答案：D 您选择的答案：

第41题 初孕妇，25岁，低位产钳分娩，胎儿娩出后即出现阴道持续流血400ml，色鲜红，血压14.7/9.33kPa，子宫硬，最适宜的处理是

- A. 注射催产素
- B. 注射麦角新碱
- C. 输液，配血
- D. 开放静脉输液，手取胎盘，检查阴道及宫颈，如有裂伤则缝合
- E. 仔细检查阴道及宫颈，有裂伤即缝合

正确答案：D 您选择的答案：

第42题 初产妇，足月妊娠，胎膜已破24小时，忽略性横位，胎心率140次/分，宫口开全，下腹脐耻之间出现一凹陷，最好的处理方法是

- A. 立即给镇静剂
- B. 立即行毁胎术
- C. 立即行内倒转术
- D. 立即行剖宫产术
- E. 立即将手消毒送回阴道内等待分娩

正确答案：D 您选择的答案：

三、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第43-45题

26岁初产妇，妊娠40周，头位，自然临产，产程顺利，宫口开大8cm，胎头棘下2cm，自然破水，羊水黄绿。破水5分钟后病人自觉呼吸困难，烦躁，紫绀，血压80/40mmHg，心率126次/分，呼吸45次/分，胎心120次/分。

1. 最可能的诊断是
  - A. 哮喘发作
  - B. 羊水栓塞
  - C. 子痫
  - D. 心力衰竭
  - E. 急性肺炎
2. 对病人立即进行处理，以下哪项是错误的
  - A. 正压给氧
  - B. 头低脚高位
  - C. 输血补充血容量
  - D. 速尿静脉推注
  - E. 西地兰静脉推注
3. 应以下述哪种方法终止妊娠
  - A. 立即剖宫产
  - B. 密切观察
  - C. 穿颅术
  - D. 产钳助产
  - E. 缩宫素引产

正确答案：BBA 您选择的答案：

第46-48题

经产妇36岁，孕40周，晨3时突然大量阴道出血，急诊来院，体检：血压16/10kPa(120/75mmHg)，尿蛋白(-)，腹部检查：子宫高35cm，胎头高浮，子宫前壁无压痛。阴道检查：阴道内有手拳大的凝血块，宫颈软，宫口开大一指，先露部未及胎盘组织

1. 请考虑哪项出血原因

- A. 子宫破裂
- B. 宫颈裂伤
- C. 胎盘早剥
- D. 前置胎盘(边缘性)
- E. 正常临产见红

2. 该产妇分娩后5分钟突然发生烦躁不安，寒战，呕吐，咳嗽，呼吸困难，发绀，血压10.7/5.3kPa(80/40mmHg)，脉细弱，首先应考虑下列何种情况

- A. 失血性休克
- B. 脑血管意外
- C. 羊水栓塞



- D 感染与休克  
E 子宫破裂  
3. 即刻应采取的措施中哪一项应除外  
A 加压给氧改善呼吸循环功能  
B 盐酸罂粟碱静脉缓注  
C 抗过敏治疗  
D 抗休克治疗  
E 立即切除子宫  
正确答案：DCE 您选择的答案：

第49-50题

初孕妇，因第二产程延长，行左侧会阴切开+低位产钳助产，娩出4000g一活婴，产后2小时伤口疼痛，肛门坠胀并有便意，大便常规检验正常。体检：贫血貌，血压12 / 8kPa(90 / 60mmHg)，左会阴稍肿，阴道出血不多

1. 下列哪项诊断可能性最大

- A 菌痢  
B 宫颈撕裂  
C 阴道壁血肿  
D 会阴二度破裂  
E 肠胃炎

2. 首先应作下列哪项处理

- A 宫缩剂  
B 阴道镜检查  
C 肛指检查  
D 抗炎  
E 止血剂

正确答案：CC 您选择的答案：

第51-52题

女，32岁。孕40周，妊娠合并子宫肌瘤，阴道分娩胎盘娩出后阴道出血量多，暗红色检查：宫底高，子宫软，产道无裂伤，血白宫腔流出，有血块，检查胎盘完整，血压14.6 / 12kPa(110 / 90mmHg)

1. 最可能诊断为

- A 子宫收缩乏力  
B 凝血功能障碍  
C 胎盘残留  
D 产道损伤  
E 胎盘粘连

2. 除给宫缩剂外首先处理的是

- A 止血剂  
B 抗炎  
C 迅速按摩子宫止血  
D 子宫腔内纱布填塞  
E 髂内动脉结扎

正确答案：AC 您选择的答案：

第53-56题

32岁，初产妇，因第二产程延长行会阴后斜切开术及产钳助产术。产后检查：宫底脐下2指，血压115 / 80mmHg。产后1小时产妇感心悸、恶心、口渴、出冷汗，检查阴道流血不多，色暗红，有血凝块；宫底脐上1横指，软；血压80 / 50mmHg。

1. 首先应考虑

- A 产后虚脱  
B 低血糖休克  
C 羊水栓塞  
D 宫腔内有隐性出血  
E 仰卧位低血压综合征

2. 最可能的原因是

- A 子宫收缩乏力  
B 凝血功能障碍  
C 宫颈裂伤  
D 子宫破裂  
E 产妇疲劳

3. 首先需给的处理是

- A 切除子宫  
B 给止血药物  
C 按摩子宫排出宫腔内积血  
D 注射抗生素  
E 注射催产素(缩宫素)

4. 进一步的处理是

- A 切除子宫  
B 给止血药物  
C 宫腔纱布填塞  
D 注射抗生素  
E 注射催产素(缩宫素)

正确答案：DACE 您选择的答案：

第57-58题

某初孕妇，28岁，34周妊娠，睡眠中突然出现阴道大量流液，此后起床活动时持续流液，因胎膜早破收入院。

1. 确诊该孕妇为胎膜早破的方法有

- A 阴道检查  
B 肛门检查  
C 阴道液pH值不变

- D. 取阴道后穹窿黏液涂片观察到羊齿状结晶
- E. B超观察羊水池深度
- 2. 此时最重要的处理是
- A. 卧床休息
- B. 注意预防感染
- C. 吸氧, 左侧卧位
- D. B超了解胎儿大小
- E. 剖宫产结束妊娠

正确答案: DA 您选择的答案:

#### 第59-61题

某初产妇34岁, 妊娠39周, 规律宫缩2小时, 宫口开大4cm, 给予肌肉注射缩宫素3单位, 宫缩持续不缓解, 胎心率为90~100次/分, 缩复环上升达脐平。

- 1. 应考虑的诊断是
- A. 痉挛性子宫收缩
- B. 胎盘早剥
- C. 子宫收缩过强
- D. 高张性宫缩乏力
- E. 先兆子宫破裂
- 2. 应立即给予的处理
- A. 会阴切开助产
- B. 产钳助产
- C. 胎头吸引
- D. 穿颅术
- E. 立即肌注哌替啶并急诊剖宫产
- 3. 下述哪项是导致胎儿宫内窘迫的根本原因
- A. 胎位判断错误
- B. 缩宫素应用不当
- C. 不符合阴式分娩条件
- D. 产程观察不仔细
- E. 缩复环的出现

正确答案: EEB 您选择的答案:

#### 第62-64题

1. 初产妇, 孕39周, 估计胎儿体重3800g, 临产16小时, 宫口开1cm, 以5%葡萄糖、缩宫素5u静脉点滴, 4小时后宫口开9cm, 但产妇烦躁不安, 疼痛难忍, 腹部检查, 脐下两指处呈环状凹陷, 下段有压痛, 胎心正常, 导尿呈血性。

可能的诊断是

- A. 羊水栓塞
- B. 子宫破裂
- C. 高张性子宫收缩乏力
- D. 精神过度紧张
- E. 先兆子宫破裂
- 2. 最恰当处理方法为
- A. 继续滴缩宫素, 待宫口开全后作会阴切开助产
- B. 立即产钳助产
- C. 停滴缩宫素后观察
- D. 会阴切开后头皮钳牵引助产
- E. 立即停滴缩宫素并急诊剖宫产术
- 3. 导致上述情况的医源性因素可能为
- A. 缩宫素应用不合理
- B. 分娩方式选择不当
- C. 解释安慰工作做的不够
- D. 观察不仔细
- E. 胎位判断错误

正确答案: EEA 您选择的答案:

#### 第65-67题

初产妇, 26岁, 39周妊娠, 顺产一男婴, 体重3500g, ApgarI分钟评分10分。胎盘娩出后5小时, 阵发性阴道流血, 量多, 色暗红。检查: 子宫底高度脐上3指, 质软, 膀胱较膨胀。曾有1次人工流产史。

- 1. 首先的诊断是
- A. 凝血功能障碍
- B. 软产道损伤
- C. 胎盘残留
- D. 子宫收缩乏力
- E. 阴道炎
- 2. 经处理后阴道流血量减少, 但仍持续有少量血液流出。进一步的处理应是
- A. 刮宫术
- B. 缩宫素静滴
- C. 腹壁按摩子宫
- D. 检查软产道
- E. 准备行子宫切除
- 3. 在我国, 引起产妇死亡的首位原因是
- A. 脐带异常
- B. 子宫破裂
- C. 羊水栓塞
- D. 胎膜早破
- E. 产后出血

正确答案: DDE 您选择的答案:

四、A4型题: 以下提供若干个案例, 每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息, 在每一道考题下面的A、

B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第68-72题

产妇25岁，39周妊娠，产前检查无异常发现。临产9小时，宫口开全1小时，羊膜囊突，而行人工破膜术。破膜后产妇突然出现烦躁不安，胸闷、呛咳、呼吸困难、发绀，血压为0。数分钟后死亡。

1. 此患者的诊断为

- A. 子宫破裂
- B. 胎盘早剥
- C. 脑梗塞死
- D. 子痫
- E. 羊水栓塞

2. 下列哪项不是该病的病理生理变化

- A. 肺动脉高压
- B. 过敏性休克
- C. 全身小动脉痉挛
- D. DIC
- E. 多脏器功能衰竭

3. 为明确诊断其检查方法为

- A. 抽取下腔静脉血镜检
- B. B超检查
- C. 胸片
- D. 心电图
- E. 脑电图

4. 假设该孕妇当时经抢救而存活，继而出现全身出血征象。检查：血小板 $60 \times 10^9/L$ ，凝血酶原时间25秒，试管法凝血时间14分钟，纤维蛋白原 $1.5g/L$ 。首选下列哪种药物治疗为宜

- A. 氨甲环酸(止血环酸)
- B. 6-氨基己酸
- C. 纤维蛋白原
- D. 肝素钠
- E. 凝血酶原复合物

5. 下列哪项不是该病的诱因

- A. 胎膜早破
- B. 宫缩过强
- C. 缩宫素应用不当
- D. 胎盘早剥
- E. 高血压

正确答案：ECADE 您选择的答案：

五、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第73-75题

- A. 胎盘残留
- B. 胎盘粘连
- C. 胎盘剥离不全
- D. 胎盘嵌顿
- E. 胎盘植入

1. 第三产程中，子宫不协调性收缩可造成

2. 胎盘未剥离时过早挤揉子宫可造成

3. 胎盘与宫壁界限不清

正确答案：DCE 您选择的答案：

第76-80题

- A. 胎盘剥离后滞留
- B. 胎盘嵌顿
- C. 胎盘粘连
- D. 软产道裂伤
- E. 凝血功能障碍

1. 子宫收缩乏力可致

2. 子宫收缩过强可致

3. 多次人工流产可致

4. 使用宫缩剂不当可致

5. 重型胎盘早剥可致

正确答案：ADCBE 您选择的答案：

第81-83题

- A. 病理性缩复环
- B. 痉挛性缩复环
- C. 撕裂样剧痛后产妇感觉腹痛骤减，宫缩停止
- D. 持续性腹痛，子宫硬如板状，宫底逐渐增高
- E. 持续性腹痛，拒按，但宫底部宫缩不强

1. 子宫破裂表现为

2. 先兆子宫破裂表现为

3. 重型胎盘早剥表现为

正确答案：CAD 您选择的答案：

第84-85题

A 有妊高征病史  
B 突然剧烈腹痛  
C 阴道出血与休克成反比  
D 呼吸困难，咳嗽，发绀等呼吸衰竭状态  
E 子宫呈板状，胎心消失  
1. 羊水栓塞早期相符的症状是  
2. 与重型胎盘早剥症状不相符的是  
正确答案：DD 您选择的答案：

第86-88题

A. 复合先露  
B. 脐带先露  
C. 脐带脱垂  
D. 脐带缠绕  
E. 帆状胎盘  
1. 胎膜未破，脐带位于胎先露以下  
2. 胎膜已破，脐带脱出于宫颈口外或阴道口外  
3. 脐带附于胎膜，血管经胎膜呈扇形分布进入胎盘  
正确答案：BCE 您选择的答案：

第89-92题

A. 胎盘剥离后滞留  
B. 胎盘剥离不全  
C. 胎盘植入  
D. 胎盘、胎膜残留  
E. 胎盘嵌顿  
1. 人工徒手剥离胎盘适用于  
2. 用大号刮匙清宫适用于  
3. 子宫切除应用于  
4. 牵拉脐带，同时按摩子宫用于  
正确答案：BDCA 您选择的答案：

习题集 妇产科学 异常分娩

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 造成子宫收缩乏力的常见原因，错误的是

- A．产妇疲劳过度或受到不良刺激
- B．临产后大剂量使用镇痛、镇静剂
- C．妊娠期子宫肌纤维数目增长缓慢
- D．头盆不称
- E．子宫过度膨胀

正确答案：C 您选择的答案：

第2题 关于子宫痉挛性狭窄环，正确的是

- A．子宫环形肌肉不协调性收缩于胎儿较小部位
- B．破膜后，还可自行消失
- C．此环可随子宫收缩上升
- D．不阻碍胎儿先露下降
- E．若无胎儿窘迫可给予镇静剂或宫缩抑制剂

正确答案：A 您选择的答案：

第3题 分娩时允许进行“试产”的条件是

- A．头先露，骨盆入口轻度狭窄
- B．头先露，骨盆出口轻度狭窄
- C．头先露，中骨盆轻度狭窄
- D．臀先露，骨盆入口轻度狭窄
- E．臀先露，中骨盆轻度狭窄

正确答案：A 您选择的答案：

第4题 下述哪项是正确的

- A 中骨盆狭窄影响胎头内旋转
- B 枕左后位时，胎头矢状缝在右斜径上，大囟在前小囟在后
- C 单臀分娩时，必须用手堵阴道口
- D 初产妇臀位应于28周前作外倒转术
- E 臀位是剖腹产的绝对指征

正确答案：A 您选择的答案：

第5题 不协调性子宫收缩乏力，为使其恢复极性，应给予

- A 剖宫产
- B 静脉滴注催产素
- C 肌注杜冷丁
- D 手术破膜
- E 以上都不是

正确答案：C 您选择的答案：

第6题 临产后胎头迟迟不入盆，应首先作以下哪种检查

- A 耻骨弓角度
- B 坐骨棘间宽
- C 坐骨棘突出程度
- D 坐骨切迹宽度
- E 对角径

正确答案：E 您选择的答案：

第7题 坐骨结节间径7cm，后矢状径7cm，足月妊娠一般应采取何种分娩方式

- A．产钳术
- B．胎吸术
- C．剖宫产
- D．会阴侧切
- E．自然分娩

正确答案：C 您选择的答案：

第8题 坐骨结节间径7cm，后矢状径7cm，足月妊娠应采取何种分娩方式

- A 自然分娩
- B 会阴侧切
- C 胎头吸引
- D 产钳术
- E 剖腹产

正确答案：E 您选择的答案：

第9题 下述哪项不是妇女型骨盆的特点

- A 入口横径较前后径长
- B 切迹较宽阔
- C 坐骨棘向内突出
- D 耻骨弓角度 > 90°
- E 后矢状径较长

正确答案：C 您选择的答案：

第10题 持续性枕后位的特点是

- A．发生原因之一是胎头仰伸

- B. 产妇过早感觉肛门坠胀而使用腹压  
C. 不易发生宫颈水肿  
D. 肛查觉盆腔前部空虚  
E. 阴道检查矢状缝在骨盆斜径上，前囟在骨盆后方  
正确答案：B 您选择的答案：

- 第11题 关于骨盆狭窄正确的是  
A. 胎头低于耻骨联合平面为跨耻征阳性，表示骨盆入口狭窄  
B. 骨盆入口狭窄是引起持续性枕横位的主要原因  
C. 中骨盆狭窄常导致臀位或横位的发生  
D. 骨盆出口狭窄可试产  
E. 骨盆狭窄是导致正常足月胎儿分娩异常的重要因素  
正确答案：E 您选择的答案：

- 第12题 持续性枕后位，枕横位时的第二产程处理，正确的是  
A. 产程进展缓慢时，应行肛门检查  
B. 如胎头已达坐骨棘平面，用手将胎头转成枕前位或枕后位，再以胎头吸引术或产钳术结合分娩  
C. 枕后位娩出时，一般勿须行会阴侧切术  
D. 疑有头盆不称时，宜行剖宫产术  
E. 以上都不是  
正确答案：D 您选择的答案：

- 第13题 下列哪种情况可以试产  
A. 头位，骨盆入口狭窄(相对性)  
B. 头位，骨盆出口狭窄  
C. 横位，骨盆入口狭窄  
D. 臀位，骨盆入口狭窄  
E. 臀位，骨盆出口狭窄  
正确答案：A 您选择的答案：

- 第14题 关于骨盆经线下列哪项是错误的  
A. 对角径小于12cm入口前后径狭窄  
B. 坐骨结节间径与后矢状径之和小于15cm时为出口狭窄  
C. 坐骨棘间径小于9cm为中骨盆狭窄  
D. 测量髂棘间径，可以间接推测中骨盆横径  
E. 耻骨弓角度可反映骨盆出口横径之宽度  
正确答案：D 您选择的答案：

- 第15题 协调性子宫收缩乏力。宫口开大5cm，无头盆不称，正确的处理应是  
A. 人工破膜后催产素静脉滴注  
B. 催产素静脉滴注  
C. 等待产程自然进展  
D. 剖宫产  
E. 催产素静脉推注  
正确答案：A 您选择的答案：

- 第16题 关于协调性宫缩乏力正确的是  
A. 宫缩极性，对称性正常，仅收缩力弱  
B. 多数产妇觉持续腹痛，且产程延长  
C. 容易发生胎儿窘迫  
D. 不易静脉滴注催产素  
E. 不易发生胎盘残留  
正确答案：A 您选择的答案：

- 第17题 臀位阴道分娩时，在产程中处理正确的是  
A. 鼓励产妇产下床活动，加速产程  
B. 宫口开大3cm前给予肥皂水灌肠  
C. 一旦破膜应立即听取胎心  
D. 破膜后若发生脐带脱垂可行脐带还纳术  
E. 宫口开全后仍需继续堵外阴  
正确答案：C 您选择的答案：

- 第18题 关于枕先露的分娩机转，正确的是  
A. 胎头进入骨盆入口时以枕下前囟径衔接  
B. 胎头降至骨盆底时开始俯屈  
C. 当胎头在中骨盆开始内旋转  
D. 宫缩和腹压促使胎头仰伸  
E. 分娩过程中胎头呈持续性下降  
正确答案：C 您选择的答案：

- 第19题 第一产程活跃期是指宫口扩张  
A. 0~3cm  
B. 2~4cm  
C. 3~6cm  
D. 3~9cm  
E. 3~10cm  
正确答案：E 您选择的答案：

- 第20题 关于骨盆狭窄的诊断，哪项是错误的  
A. 入口前后径长<10cm为骨盆入口狭窄

B 骨盆各径线比正常值小1cm为均小骨盆  
C 坐骨棘间径9cm为中骨盆狭窄  
D 耻骨弓 $<80^{\circ}$  可能为骨盆出口狭窄  
E 骨盆出口横径+后矢状径=15cm属于正常范围  
正确答案：B 您选择的答案：

第21题 关于臀位，下述哪项是正确的  
A 骶右前位时，胎臀的粗隆间经衔接于骨盆入口左斜径上  
B 子宫收缩乏力的发生率并不增多  
C 胎臀已进入盆腔，排出胎便是胎儿窘迫的征象  
D 产妇于第一产程期间不宜灌肠  
E 以上都不对  
正确答案：D 您选择的答案：

第22题 妊娠足月胎儿，下列哪种胎位，不可能经阴道分娩  
A 颈后位  
B 枕后位  
C 枕横位  
D 颈前位  
E 臀位  
正确答案：A 您选择的答案：

第23题 初孕妇临产后胎头未入盆，首先应考虑  
A 羊水过多  
B 腹壁松弛  
C 脑积水  
D 头盆不称  
E 宫缩乏力  
正确答案：D 您选择的答案：

第24题 下述哪种宫缩乏力可用催产素(缩宫素)  
A. 头盆不称  
B. 不协调性宫缩乏力  
C. 宫颈水肿  
D. 低张性宫缩乏力  
E. 胎心减慢  
正确答案：D 您选择的答案：

第25题 初产妇临产后胎头未入盆，首先应考虑  
A. 羊水过多  
B. 头盆不称  
C. 宫缩乏力  
D. 脑积水  
E. 腹壁松弛  
正确答案：B 您选择的答案：

第26题 关于急产正确的是  
A. 多见于有人工流产史的初产妇  
B. 易发生软产道裂伤  
C. 常发生胎盘剥离不全  
D. 产妇持续腹痛、烦躁不安  
E. 总产程不足4小时  
正确答案：B 您选择的答案：

第27题 第一产程活跃期停滞是指宫口不再扩张  
A. 0.5小时以上  
B. 1小时以上  
C. 1.5小时以上  
D. 2小时以上  
E. 2.5小时以上  
正确答案：D 您选择的答案：

第28题 下述情况出现宫缩乏力时，可用催产素产的是  
A 头盆不称  
B 子宫不协调收缩  
C 宫颈水肿  
D 低张性宫缩乏力  
E 迟发性胎心减慢  
正确答案：D 您选择的答案：

第29题 有关协调性子宫收缩乏力，下列描述正确的是  
A. 子宫收缩节律性、对称性和极性均正常，仅收缩力弱  
B. 容易发生胎儿宫内窘迫  
C. 不宜静脉点滴缩宫素  
D. 潜伏期不宜应用哌替啶  
E. 多数产妇自觉持续性腹痛，且产程延长  
正确答案：A 您选择的答案：

第30题 子宫病理收缩环是指  
A 子宫上下段之间形成缩窄环并随宫缩渐次上升

- B 子宫某部肌肉呈不协调收缩形成环状狭窄  
C 子宫上下段之间形成环，但不随宫缩而上升  
D 宫缩时硬，子宫松弛时为软  
E 常发生于孕期

正确答案：A 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第31题 妊娠40周，规律性腹痛20小时，破膜6小时，宫底剑下1指，母体腹部右下方触及圆而硬的胎头，胎心位于脐耻之间，手脱出于阴道外口，右肩已入阴道内骶岬前方，胎位最正确的诊断是

- A. 肩右前位  
B. 肩右后位  
C. 肩右横位  
D. 肩左前位  
E. 肩左后位

正确答案：B 您选择的答案：

第32题 初产妇，足月妊娠临产16小时，宫口开全2小时，先露头"+2"，骨产道正常，枕后位，胎心120次/分，最恰当的分娩方式是

- A. 剖宫产  
B. 行会阴侧切产钳助娩  
C. 静滴催产素(缩宫素)  
D. 嘱产妇用力屏气  
E. 继续观察

正确答案：B 您选择的答案：

第33题 初孕妇，26岁。孕1产0，孕40周，阵发性腹痛6小时入院。骶耻外径18cm，坐骨结节间径8cm，查宫高38cm，腹围98cm，胎心140次/分，肛查，宫口开3cm，未破膜，足先露，入院后5小时宫缩30秒/6~7分，产程无进展，其处理哪项最恰当

- A. 静滴催产素  
B. 温肥皂水灌肠  
C. 人工破膜  
D. 不需处理，继续观察  
E. 剖宫产

正确答案：E 您选择的答案：

第34题 初孕35岁，妊41周，足先露，宫缩50秒/3~4分，胎心148次/分，先露浮，宫口3cm，胎儿双顶径10cm，测对角长11cm，最恰当处理是

- A. 静脉滴入稀释催产素  
B. 葡萄糖静注  
C. 宫口开全臀助产术  
D. 宫口开全臀牵引术  
E. 剖腹产

正确答案：E 您选择的答案：

第35题 初孕妇，妊娠足月。已临产2小时。右枕前，胎心良，宫口开大4cm入院。2.5小时后再次肛诊宫口扩张无进展，本病例恰当的诊断是

- A. 潜伏期延长  
B. 活跃期延长  
C. 活跃期停滞  
D. 第二产程延长  
E. 第二产程停滞

正确答案：C 您选择的答案：

第36题 第一胎，孕40周，临产已10小时，ROA，胎心100次/分，胎儿监护见频繁晚期减速波型。下述哪种情况有条件立即行阴道助产术(产钳或胎头负压术)

- A. 先露+2，宫口开8cm，骨盆内测量无异常  
B. 先露-1，宫口开全，阴道检查骨盆无异常，矢状缝已与中骨盆前后径一致，触及大囟门  
C. 先露+3，宫口开全，骨盆内测量无异常，但宫缩乏力  
D. 先露+1，耻骨联合上方母腹触及胎头较大部分  
E. 先露+2，宫口开全，骶骨凹度差，尾骨固定上翘

正确答案：C 您选择的答案：

第37题 初产妇：35岁，孕42周，临产10小时，检查：胎心率120次/分钟，ROA，宫口开大3cm，有水囊感，先露棘平，B超示：双顶径9.1cm，羊水深度2.5cm，下列哪项处理方式最佳

- A. 静脉点滴小剂量缩宫素  
B. 人工破膜  
C. 温肥皂水灌肠  
D. 左侧卧位、吸氧、输液  
E. 立即行剖宫产

正确答案：A 您选择的答案：

第38题 初孕40周，产力正常，胎心140次/分，头位，双顶径10cm，先露浮，宫口2cm，对角径11.5cm，正确处理是

- A. 杜冷丁  
B. 葡萄糖静注  
C. 观察经过  
D. 稀释催产素静点



E 剖腹产

正确答案：E 您选择的答案：

第39题 孕足月，初产妇，24岁，第二产程2小时半，胎盘娩出后，有间歇性阴道流血并有血块排出，量超过500ml。

查：子宫轮廓不清，首先应考虑为

- A. 阴道静脉破裂
- B. 凝血机制障碍
- C. 胎盘残留
- D. 宫颈裂伤
- E. 子宫收缩乏力

正确答案：E 您选择的答案：

第40题 女，26岁。第一胎，分娩中，宫口开全2小时10分钟，先露S+2，胎位LOT，宫缩由强转为中已40分钟，宫缩间隔也由2.5分钟延长为4~5分钟，诊断为第二产程延长。造成这种情况最常见的原因是下列哪一项

- A 宫缩乏力
- B 产妇衰竭
- C 中骨盆平面狭窄
- D 骨盆出口狭窄
- E 胎儿过大

正确答案：C 您选择的答案：

第41题 女，28岁。孕38+周，上午9时有规律宫缩而入院。宫缩中下，35秒，间隔3~4分钟，于19时宫口开一指，先露S-1.5，给予催产素2.5单位加强宫缩使转为中等强度，40秒，间隔2~3分钟，产妇一般情况好，3小时后宫口开4cm，先露为S-1，此时应如何处理

- A 哌替啶(杜冷丁)100mg肌注使休息
- B 阴道检查排除骨产道异常后作人工破膜
- C 剖宫产
- D 宫颈注射阿托品
- E 加大催产素滴注量

正确答案：B 您选择的答案：

第42题 孕37周，初产妇，24岁，来门诊检查，主诉1周前有少量阴道流血，未作处理，自行停止，昨晚阴道再次流血，量多，伴阵发性腹痛。检查血压105/68mmHg(14/9kPa)，胎心率166次/分，臀位。此时最好的处理方法是

- A. 输液+止血药物
- B. 给氧纠正胎儿窘迫
- C. 剖宫产
- D. 期待疗法
- E. 行足牵引压迫胎盘止血

正确答案：C 您选择的答案：

第43题 25岁，孕38周，在门诊检查时主诉自觉胎动减少1天，查胎心率148次/分，为了解胎儿在宫内情况首先应做下列哪项检查

- A. 胎儿心电图
- B. CST试验
- C. 胎儿头皮血pH测定
- D. NST试验
- E. 羊膜镜检查

正确答案：D 您选择的答案：

第44题 初孕，孕39周，估计胎儿3800g，临产10小时入院，查宫底剑下1指，左枕前位胎心好，宫缩强，宫口开大4cm，胎头跨耻征阳性，应采取何项处理

- A 等待自然分娩
- B 观察经过
- C 剖腹产术
- D 催产素静点
- E 三联注射

正确答案：C 您选择的答案：

第45题 初孕30岁，妊40周，女性型骨盆，胎心158次/分，足先露宫口开全，破水后脐带脱垂，最恰当处理是

- A 注射小三联，观察经过
- B 臀位助产
- C 立即行臀牵引术
- D 稀释催产素静点
- E 剖腹产

正确答案：C 您选择的答案：

第46题 初产妇，26岁，39+5周妊娠，阵发性下腹胀14小时，昨晚一夜仅能间断入眠共1小时，今来诊。检查：骨盆外测量正常，LOT，胎心好，宫缩20秒/8~10分钟，宫口开大1cm，先露S-1，胎膜未破，首选下列哪项处理措施

- A. 剖宫产
- B. 人工破膜
- C. 肌注度冷丁
- D. 肌注缩宫素2.5U
- E. 严密观察，等待其自然分娩

正确答案：E 您选择的答案：

第47题 初产妇临产后，产程进展正常，当胎头拨露时，胎心110次/分，应采取什么措施

- A 点滴稀释催产素
- B 立即剖腹产
- C 吸氧等待自然分娩
- D 侧切胎头吸引分娩

E 用胎儿监护仪监测，是否缺氧  
正确答案：D 您选择的答案：

三、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第48-49题

初产妇，40周妊娠规律宫缩18小时，查：宫口开大6cm，宫缩渐弱，20~30秒/6~7分钟，2小时后复查，宫口仍开大6cm，S-1，骨盆外测量正常范围，胎心率130~135次/分钟规律。

1. 该产妇属于下列哪种产程异常

- A. 潜伏期延长
  - B. 活跃期延长
  - C. 活跃期停滞
  - D. 胎头下降延缓
  - E. 第二产程停滞
2. 首选的处理措施是
- A. 缩宫素静脉点滴
  - B. 立即行剖宫产术
  - C. 肌注度冷丁
  - D. 鼓励产妇进食、休息
  - E. 等待其自然分娩

正确答案：CA 您选择的答案：

第50-51题

产妇，26岁，G1P0，39周妊娠，规律性宫缩15小时。全身检查正常，子宫底高34cm，腹围100cm，LOA，胎心率138次/分，估计胎儿重3200g。阴道检查：宫口扩张2cm，胎头"-2"。怀疑有头盆不称。

1. 骨盆外测量哪条径线低于正常值

- A. 髂前上棘间径25cm
- B. 髂嵴间径27cm
- C. 骶耻外径17.5cm
- D. 坐骨结节间径8.5cm
- E. 出口后矢状径8cm

2. 3小时后阴道检查，宫口扩张3cm，胎头"-1"，此时诊断为

- A. 潜伏期延长
- B. 活跃期延长
- C. 活跃期停滞
- D. 滞产
- E. 潜伏期停滞

正确答案：CA 您选择的答案：

第52-54题

产妇，29岁，G1P0，38周妊娠，规律宫缩2小时入院。单臀位，估计胎儿体重3000g，骨盆外测量正常。

1. 该产妇的处理原则哪项是错误的

- A. 初产妇臀位一律行剖宫产
- B. 可经阴分娩
- C. 少做肛查，不灌肠
- D. 注意后出胎头的娩出
- E. 注意胎儿双手上举

2. 臀位易发生的并发症是

- A. 胎儿窘迫
- B. 胎膜早破，脐带脱垂
- C. 产后出血
- D. 产褥感染
- E. 胎足脱出

3. 该产妇经阴道分娩以下哪项处理是错误的

- A. 持续胎心监护
- B. 严密观察产程进展
- C. 阴道口见到胎臀时，需用手掌堵住阴道口，待软产道充分扩张后才让胎臀娩出
- D. 在堵的过程中每隔10~15分钟听胎心一次
- E. 脐部娩出后，应在10分钟内娩出胎头

正确答案：ABE 您选择的答案：

第55-57题

26岁，初产妇，妊娠39周，规律宫缩18小时，肛查宫口8cm，先露0，胎膜未破，腹部触诊为头先露，宫缩时宫体部不硬，持续30秒，间隔5分钟，胎心136次/分，B型超声检查示胎儿双顶径为9.0cm

1. 出现以上情况最可能是

- A. 子宫收缩过强
- B. 胎儿过大
- C. 子宫收缩乏力
- D. 骨盆狭窄
- E. 胎儿畸形

2. 本例首先的处理是

- A. 人工破膜
- B. 立即剖宫产
- C. 静脉滴注缩宫素5u
- D. 肌注度冷丁100mg
- E. 观察1小时后再决定

3. 若破膜后发现羊水为棕黄色，最合适的处理是

- A. 严密观察产程，等待自然分娩

- B. 立即剖宫产
- C. 小剂量滴注催产素
- D. 持续吸氧，等待宫口开全
- E. 产钳助娩

正确答案：CCB 您选择的答案：

#### 第58-60题

女，孕1产0，足月临产14小时，宫口开7cm，产程进展缓慢，胎心140~150次/分，胎头矢状缝与坐骨棘间径一致，枕骨在母体右侧，S+1

1. 其诊断是
  - A 右枕前位
  - B 持续性右枕横
  - C 持续性左枕后
  - D 持续性左枕横
  - E 持续性右枕后

2. 上述产妇临产30小时，查：平脐处可见缩复环，下段压痛，胎心微弱，已破膜，羊水混浊，宫口近开全，先露头，S+1。其诊断考虑为

- A 高张性宫缩乏力
- B 胎盘早剥
- C 先兆子宫破裂
- D 子宫破裂
- E 痉挛性狭窄环

3. 下列处理哪项恰当

- A 立即剖宫产
- B 产钳术
- C 胎头吸引器
- D 穿颅术
- E 待其自然分娩

正确答案：BCA 您选择的答案：

#### 第61-62题

女，34岁，孕40+6周，破膜13小时，上午6时起宫缩30~55秒，间歇3~4分钟，胎心率144次/分，ROA。阴道检查：宫口开大3cm，先露0，于上午8时，宫缩20~30秒，间歇7~8分钟，宫口开大5cm，先露+1，胎心率165次/分，阴道检查：坐骨棘突，切迹<2指，骶凹平坦，坐骨结节间径7.5cm。

1. 可能的诊断是

- A. 高龄初产
- B. 骨盆入口狭窄
- C. 出口狭窄
- D. 中骨盆和出口均狭窄
- E. 过期妊娠

2. 进一步处理下列哪项不正确

- A. 吸氧
- B. 剖宫产
- C. 静滴催产素(缩宫素)
- D. 静滴抗生素
- E. 胎心监护

正确答案：DC 您选择的答案：

#### 第63-64题

某产妇宫口已开全2小时，阴道检查胎头矢状缝与中骨盆横径一致，小囟门在3点，大囟门在9点

1. 是下列何种方位

- A LOT
- B ROT
- C LOA
- D ROA
- E LOP

2. 胎头方位应向哪个方向转动才能正常娩出

- A 逆时针转90度
- B 顺时针转90度
- C 逆时针转45度
- D 顺时针转45度
- E 不需转动

正确答案：AA 您选择的答案：

四、A4型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

#### 第65-68题

孕妇，G1P0，孕38周。骨盆外测量髂前上棘间径23cm，坐骨结节间径7.5cm，出口后矢状径6.5cm，肛诊骶骨弯曲度好，坐骨棘间径9cm，坐骨切迹容1+指，估计胎儿体重3000g，胎头浮，胎心142次/分。

1. 关于骨盆的诊断下述哪项正确

- A. 骨盆入口平面狭窄
- B. 骨盆出口平面狭窄
- C. 中骨盆
- D. 中骨盆及出口平面狭窄
- E. 正常骨盆

2. 正常初产妇胎头衔接多数发生于预产期前

- A. 1~2天
- B. 2~3天

- C. 1周内  
D. 2~3周  
E. 临产时
3. 若此孕妇孕39周规律宫缩4小时入院，胎心134次/分，宫缩20~30秒/5~6分，肛诊：羊膜囊突，宫口开大4cm，胎头“0”，此时正确的处理为  
A. 催产素(缩宫素)静滴加速产程进展  
B. 人工破膜  
C. 灌肠  
D. 拟行第二产程助产  
E. 剖宫产
4. 上述处理的指征为  
A. 宫缩乏力  
B. 胎儿窘迫  
C. 头盆不称  
D. 巨大儿  
E. 过期妊娠
- 正确答案：DDEC 您选择的答案：

#### 第69-72题

产妇，30岁，G1P0，40周妊娠。阵发性腹痛8小时入院。体检：血压正常，骨盆外测量正常，ROA，子宫底高度32cm，胎心144次/分，宫缩25~30秒/5~6分，强度较弱，宫口扩张4cm，羊膜囊突。估计胎儿重3800g。观察2小时后产程无进展。

1. 其诊断为  
A. 潜伏期延长  
B. 正常产程  
C. 活跃期停滞  
D. 继发性宫缩乏力  
E. 滞产
2. 其处理首先为  
A. 立即剖宫产  
B. 静滴催产素(缩宫素)  
C. 温肥皂水灌肠  
D. 人工破膜  
E. 做OCT
3. 若经处理1小时后，宫缩25秒/5~6分，胎心138次/分。阴道检查宫口扩张6cm，胎头“0”。进一步的处理是  
A. 吸氧  
B. 静滴催产素(缩宫素)  
C. 温肥皂水灌肠  
D. 剖宫产  
E. 左侧卧位
4. 若上述处理半小时后，产妇出现持续性腹痛，拒按，烦躁不安，以下处理不恰当的是  
A. 停用催产素  
B. 听胎心  
C. 立即给予宫缩抑制剂  
D. 若有胎儿窘迫征象立即行剖宫产术  
E. 子宫收缩恢复正常后，可阴道助产或等待自然分娩
- 正确答案：CDBC 您选择的答案：

五、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

#### 第73-75题

- A. 8小时  
B. 16小时  
C. 24小时  
D. 3小时  
E. 4小时
1. 急产指总产程小于  
2. 活跃期最大时限  
3. 总产程一般不超过

正确答案：DAC 您选择的答案：

#### 第76-80题

- A. 从规律宫缩开始，经16小时宫口扩张至2cm  
B. 初产妇宫口开全2小时尚未分娩  
C. 宫口在开至5cm后，2小时仍5cm  
D. 8小时前宫口扩张3cm，现宫口尚未开全  
E. 宫口开全已1小时，胎头下降无进展
1. 潜伏期延长  
2. 活跃期延长  
3. 活跃期停滞  
4. 第二产程停滞  
5. 第二产程延长

正确答案：ADCEB 您选择的答案：

#### 第81-83题

- A. 正常产程  
B. 潜伏期延长  
C. 活跃期延长

- D. 活跃期停滞  
E. 第二产程停滞  
1. 临产20小时, 宫口开大2cm  
2. 临产18小时, 宫口开大6cm  
3. 宫口开大6cm, 3小时无进展  
正确答案: BAD 您选择的答案:

第84-85题

- A. 骶耻外径 < 18cm  
B. 粗隆间径和坐骨结节间径过短  
C. 出口横径(坐骨结节间径)过短  
D. 髂棘间径过短  
E. 坐骨结节间径加后矢状径 < 15cm  
1. 骨盆出口狭窄  
2. 漏斗型骨盆  
正确答案: EB 您选择的答案:

第86-89题

- A. 低张性宫缩乏力  
B. 高张性宫缩乏力  
C. 原发性宫缩乏力  
D. 继发性宫缩乏力  
E. 正常子宫收缩乏力  
1. 临产后宫缩一直短而弱, 间歇长, 产程进展慢  
2. 产程进展到一定阶段后, 宫缩减弱, 出现宫缩乏力  
3. 子宫收缩保持正常特性, 仅间歇长, 持续短, 弱而无力  
4. 子宫收缩失去正常特性, 间歇时子宫不放松  
正确答案: CDAB 您选择的答案:

第90-92题

- A. 潜伏期  
B. 活跃期  
C. 第一产程  
D. 第二产程  
E. 第三产程  
1. 自规律性宫缩开始至宫口扩张3cm称  
2. 从宫口扩张3cm开始至宫口开全称  
3. 从规律性宫缩开始至宫口开全称  
正确答案: ABC 您选择的答案:

第93-95题

- A. 8小时  
B. 16小时  
C. 24小时  
D. 3小时  
E. 4小时  
1. 潜伏期一般需  
2. 活跃期一般需  
3. 潜伏期最大时限  
正确答案: AEB 您选择的答案:

第96-98题

- A. 早期减速  
B. 晚期减速  
C. 变异减速  
D. 基线胎心率有变异  
E. 周期性胎心率加速  
1. 枕先露, 先露+2, 胎膜已破, 第二产程末, 胎儿电子监护时可能出现  
2. 疑有脐带受压或脐带绕颈, 胎儿电子监护时可能出现  
3. 过期妊娠, B型超声提示羊水过少, 胎儿电子监护时可能出现  
正确答案: ACB 您选择的答案:

第99-101题

- A. 会阴侧切术  
B. 产钳术  
C. 剖宫产术  
D. 自然分娩  
E. 催产素(缩宫素)静脉点滴下列病例应采取的处理是  
1. 初产妇, 孕40周, 宫口开全1小时40分, 胎头"+2", 胎心率110次/分  
2. 初产妇, 孕39周, 规律宫缩12小时入院, 骨盆外测量正常, 胎儿体重估计3200g, 宫缩25秒/3~4分钟, 宫口扩张2cm, 胎头"-2"cm  
3. 孕39周, 阴道流水2小时入院, 宫高34cm, 腹围102cm, 骨盆外测量坐骨结节间径7cm, 耻骨弓角度<90°  
正确答案: BEC 您选择的答案:

第102-104题

- A. 低张性宫缩乏力  
B. 高张性宫缩乏力  
C. 原发性宫缩乏力  
D. 继发性宫缩乏力  
E. 正常子宫收缩乏力

1. 临产后，宫缩一直短而弱，间歇长，产程进展慢
  2. 产程进展到一定阶段后，宫缩减弱，出现宫缩乏力
  3. 子宫收缩保持正常极性，仅间歇长，持续短，弱而无力
- 正确答案：CDA 您选择的答案：

第105-106题

- A 活跃期延长
- B 活跃期停滞
- C 胎头下降延缓
- D 第二产程停滞
- E 第二产程延长

1. 宫口扩张9cm，1小时后儿头下降0.5cm
  2. 初产妇，规律宫缩5小时，宫口开3+cm，行人工破膜后9小时宫口9cm
- 正确答案：CA 您选择的答案：

习题集 妇产科学 妊娠合并症

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 有关妊娠合并心脏病，下述哪项是错误的

- A 宫口开全后应防止产妇用力屏气
  - B 胎儿娩出后给予镇静剂如杜冷丁或吗啡
  - C 胎儿娩出后，若子宫收缩不佳，可肌注麦角新碱
  - D 如有产后出血，可以输血，但需要注意输血速度
  - E 产前，产时有心力衰竭的产妇产后继续用强心药
- 正确答案：C 您选择的答案：

第2题 促使心脏病孕妇死亡的原因是

- A 孕妇年龄大
  - B 心衰与感染
  - C 产后哺乳致心衰
  - D 产后回心血量增加致心衰
  - E 产程中用力过度致心衰
- 正确答案：B 您选择的答案：

第3题 妊娠合并心脏病孕妇分娩期血流动力学变化，下述哪项是错误的

- A 第一产程，规律宫缩使周围循环阻力增加，回心血量减少
  - B 第二产程，宫缩加上腹压，周围阻力增大
  - C 第二产程，腹压增高使内脏血流涌向心脏，回心血量增加
  - D 第三产程，子宫迅速缩小，腹压减低，大量血液流回内脏血管，回心血量减少
  - E 第三产程，胎儿娩出后子宫胎盘循环停止，大量血液进入体循环，回心血量增加
- 正确答案：A 您选择的答案：

第4题 妊娠合并肝炎，下列处理正确的是

- A 妊娠早期安胎
  - B 妊娠中期终止妊娠
  - C 妊娠晚期及早终止妊娠
  - D 终止妊娠前用维生素
  - E 应以剖宫产终止妊娠
- 正确答案：D 您选择的答案：

第5题 可以妊娠的心脏病妇女是

- A 一般体力活动时有心悸和轻度气短
  - B 在活动量少于一般日常体力活动时即感疲劳，心跳气急
  - C 严重二尖瓣狭窄伴有肺动脉高压的风湿性心脏病
  - D 风湿性心脏病心率快难于控制者
  - E 伴有严重的内科并发症如慢性肾炎，肺结核等
- 正确答案：A 您选择的答案：

第6题 促使心脏病孕妇死亡的主要原因

- A 心脏病病程长
  - B 产程用力过度致心衰
  - C 年龄大
  - D 心衰与感染
  - E 产后哺乳致心衰
- 正确答案：D 您选择的答案：

第7题 重型病毒性肝炎孕妇口服广谱抗菌素的主要目的是

- A 控制肝炎发展
  - B 清除体内病毒
  - C 预防产后出血
  - D 防止DIC
  - E 预防肝昏迷
- 正确答案：E 您选择的答案：

第8题 孕早期心脏病患者，决定是否继续妊娠的最重要依据是

- A 心脏病种类
  - B 心脏病变部位
  - C 心功能分级
  - D 症状严重程度
  - E 有否以往生育史
- 正确答案：C 您选择的答案：

第9题 病毒性肝炎孕妇，凝血酶原时间延长，在妊娠中，晚期预防产后出血的主要措施是

- A 立即剖宫产
  - B 引产终止妊娠
  - C 高蛋白饮食增加营养
  - D 用维生素K、C
  - E 用对羧基苄胺
- 正确答案：D 您选择的答案：

第10题 病毒性肝炎对妊娠的影响，下述哪项是错误的

- A 妊娠早期患肝炎致畸发生率高

- B 妊娠早期患肝炎易发展为急性、亚急性肝炎  
C 妊娠晚期发病易并发妊高征  
D 妊娠中晚期发病易诱发DIC  
E 妊娠期发生病毒性肝炎致围生(产)儿死亡率高  
正确答案：B 您选择的答案：

第11题 孕早期合并心脏病患者，决定能否继续妊娠的重要依据是

- A．心脏病种类  
B．心功能分级  
C．是否有生育史  
D．生育要求是否迫切  
E．孕妇年龄

正确答案：B 您选择的答案：

第12题 正常妊娠时肝功能变化错误的是

- A．由于血液稀释血清总蛋白降低  
B．ALT和AST多在正常范围  
C．AKP在妊娠7个月后可达非孕时的2倍  
D．孕晚期血浆纤维蛋白原可增加50%  
E．孕晚期血清总胆红素值 $>171\mu\text{mol/L}$

正确答案：E 您选择的答案：

第13题 下列哪项是确诊妊娠期病毒性肝炎的根据

- A 蛋白尿和水肿  
B 皮肤瘙痒和黄疸  
C 妊娠晚期上腹部疼痛，吐咖啡样物  
D 黄疸昏迷  
E 血中谷丙转氨酶增高，HBsAg阳性

正确答案：E 您选择的答案：

第14题 妊娠合并肝炎，下述处理哪项正确

- A 妊娠早期安胎  
B 妊娠中期需终止妊娠  
C 妊娠晚期及早终止妊娠  
D 终止妊娠前用维生素K  
E 应以剖宫产终止妊娠

正确答案：D 您选择的答案：

第15题 妊娠合并心脏病，下列哪项不是早期心衰体征

- A．轻微活动后胸闷气急及心悸感  
B．休息时心率超过110次/分  
C．休息时呼吸超过20次/分  
D．肺底有湿啰音，咳后消失  
E．阵发性夜间呼吸困难

正确答案：D 您选择的答案：

第16题 孕早期合并心脏病患者，决定是否能继续妊娠的重要依据是

- A．心脏病种类  
B．心脏病变部位  
C．心功能分级  
D．症状严重程度  
E．以往有否生育史

正确答案：C 您选择的答案：

第17题 孕妇在妊娠晚期合并急性病毒性肝炎，应给予重视和积极治疗，主要是因为

- A 容易合并妊高征及发生子痫  
B 容易发展为重症肝炎，孕产妇死亡率增高  
C 容易发生糖代谢障碍，影响胎儿发育  
D 容易发生早产，胎儿不易存活  
E 容易发生宫缩乏力，产程延长

正确答案：B 您选择的答案：

第18题 妊娠合并肝炎对母儿的影响

- A．发生于妊娠早期时可加重早孕反应  
B．孕早期患病毒性肝炎的胎儿畸形发生率约增高2倍  
C．孕晚期患急性乙型肝炎者，约70%婴儿发生感染  
D．母亲HBsAg阳性，由于母婴传播，新生儿大多数为阳性  
E．产后出血率高

正确答案：D 您选择的答案：

第19题 妊娠晚期及分娩期合并急性病毒性肝炎，对产妇威胁最大的是

- A 易合并妊高征  
B 易发展为重型肝炎，孕产妇死亡率高  
C 易发生宫缩乏力产程延长  
D 易发生产后出血DIC  
E 易发生早产，围产死亡率增加

正确答案：B 您选择的答案：

第20题 促使心脏病孕妇死亡的主要因素是



- A 心脏病病程长
- B 产程中用力过度致心衰
- C 孕妇年龄大
- D 心衰与感染
- E 产后哺乳致心衰

正确答案：D 您选择的答案：

第21题 关于妊娠合并心脏病的处理下列哪项是错误的

- A 发绀型心脏病患者经手术矫治，心功能改善为I～级者，可以妊娠
- B 早孕期有心衰发作者，应于心衰控制后终止妊娠
- C 换瓣手术的心脏病妇女，由于凝血功能的特殊要求，不宜妊娠
- D 单纯因二尖瓣病变而心功能恶化的孕期妇女，可以在孕期作心脏矫治手术后继续妊娠
- E 心功能级以上者，产后不宜哺乳，应予产褥早期回乳

正确答案：C 您选择的答案：

第22题 妊娠合并急性病毒性肝炎之处理，下述何项是错误的

- A 早孕期治疗后行人流产以防畸形
- B 中晚期不宜终止妊娠
- C 注意防止妊娠高血压综合征发生
- D 注意缩短第一、第二产程
- E 应用四环素预防感染

正确答案：E 您选择的答案：

第23题 风湿性心脏病孕妇于分娩时，正确的是

- A 宫口开全后，鼓励孕妇用力屏气尽快结束分娩
- B 胎儿娩出后，在腹部放置砂袋加压
- C 预防产后出血，静脉注射麦角新碱
- D 产后24小时内行输卵管结扎术
- E 产后24小时鼓励下床轻微活动，有助于子宫复旧

正确答案：B 您选择的答案：

第24题 预防妊娠合并心脏病发生心衰的措施，下列哪项不妥当

- A 积极治疗贫血
- B 积极预防妊高征
- C 防治呼吸道感染
- D 充足睡眠
- E 预防性应用洋地黄

正确答案：E 您选择的答案：

第25题 下述何项不属乙型病毒性肝炎母婴传播途径

- A 粪-口传染
- B 娩出时接触母亲产道分泌液或血污染
- C 母婴垂直传染
- D 乳汁传染
- E 密切生活接触传染

正确答案：A 您选择的答案：

第26题 心脏病孕妇最危险的时期

- A 妊娠35～38周
- B 妊娠32～34周
- C 妊娠20～28周
- D 妊娠28～32周
- E 产后7天后

正确答案：B 您选择的答案：

第27题 为降低心脏病孕产妇的死亡率，下列哪项防治措施不适宜

- A 为防止体重加重过多，宜减少脂肪的摄入，并进低蛋白饮食
- B 积极防止并发症及早治疗妊娠期的各种感染尤其是上呼吸道感染
- C 如发现死胎宜行穿颅术尽快结束分娩
- D 当胎儿娩出后，应将沙袋置于孕妇腹部
- E 产后需给广谱抗生素，预防感染

正确答案：A 您选择的答案：

第28题 妊娠合并病毒性肝炎，分娩期的处理哪项是错误的

- A 配血备血
- B 产前注射维生素K
- C 及时注射宫缩剂减少产后出血
- D 注意防止发生DIC
- E 以剖宫产结束分娩为宜

正确答案：E 您选择的答案：

第29题 关于风湿性心脏病孕妇的分娩期处理，正确的是

- A 除有产科指征外，不需作剖宫产术
- B 宫口开全要防止产妇用力屏气
- C 忌用吗啡
- D 无感染征象，不需使用抗生素
- E 肌注麦角新碱，预防产后出血

正确答案：B 您选择的答案：

第30题 心脏病患者早孕，终止妊娠的指征，下列哪项是错误的

- A. 心功能 级或以上
- B. 风湿活动期
- C. 严重心肌损害
- D. 伴有高血压表现者
- E. 有心衰史

正确答案：A 您选择的答案：

第31题 妊娠合并心脏病者，下列哪项不是早期心衰体征

- A. 轻微活动后有胸闷气急及心悸感
- B. 休息时心率>110次/分
- C. 休息时呼吸>20次/分
- D. 肺底有湿啰音，咳嗽后减轻
- E. 阵发性夜间呼吸困难

正确答案：D 您选择的答案：

第32题 妊娠合并风湿性心脏病，下列哪个体征是早期心衰的可靠诊断依据

- A. 心界扩大
- B. 心尖部闻及 级收缩期杂音
- C. 肺底部持续性湿啰音
- D. 休息时心率>110次/分
- E. 下肢凹陷性水肿I度

正确答案：D 您选择的答案：

第33题 妊娠合并心脏病，下列哪项不是预防心衰的方法

- A. 积极治疗贫血
- B. 限制食盐的摄入
- C. 防治呼吸道感染
- D. 常规服用洋地黄
- E. 充足睡眠，每日保证10小时睡眠

正确答案：D 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第34题 女，28岁。初孕，孕36周，近三、四天感乏力，恶心，食欲差，血压16/11kPa，查SGPT为256单位，应予高度重视。其最重要原因是由于

- A. 易发展为重度妊高征
- B. 容易发展为重症病毒性肝炎
- C. 易发生重度胆汁淤积症
- D. 可能发生急性妊娠脂肪肝
- E. 妊娠肝最易致胎儿缺血缺氧

正确答案：B 您选择的答案：

第35题 一风湿性心脏病，病情稳定，心功能 级产妇临产入待产室，医生在考虑对她的处理时，下列何项应不列入考虑之列

- A. 临产即用抗生素，至少维持至产后一周
- B. 可适当应用镇静剂
- C. 若非病变需要，不主张常规使用洋地黄预防心衰
- D. 产程进展慢，估计有头盆不称可能时，早作剖宫产
- E. 产后流血较多时，尽量避免输血

正确答案：E 您选择的答案：

第36题 28岁，初产妇，34周妊娠首次产前检查。下列哪项提示心脏病

- A. 心浊音界轻微扩大
- B. 妊娠晚期轻度憋气
- C. 双下肢水肿，休息后消退
- D. 心尖区柔和的收缩期杂音
- E. 一般劳动后心跳加快且感心悸

正确答案：E 您选择的答案：

第37题 女，30岁，孕34周首次产前检查，下列哪项不属于妊娠生理性变化

- A. 心尖区及肺动脉瓣区柔和的收缩期杂音
- B. 心率加速而有心悸感
- C. 妊娠晚期轻度气短、气喘
- D. 心脏听诊有舒张期杂音
- E. 心浊音界轻微扩大

正确答案：D 您选择的答案：

三、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第38-40题

28岁，孕34周，10天前开始感觉乏力，食欲差，近5天病情加重，伴呕吐，巩膜发黄，神智欠清而入院，血压18.0/12.0kPa(135/90mmHg)，SGPT 35U，胆红素176μmol/L，尿蛋白(-)

1. 首先应选择的检查是

- A. 全血细胞计数
- B. 碱性磷酸酶

- C 胆酸
- D 肝炎病毒抗原抗体七项
- E 血糖

2. 最佳诊断是下列哪项

- A 妊娠脂肪肝
- B 妊娠肝内胆汁淤积症
- C 妊高征肝损害
- D 药物性肝损害
- E 妊娠合并重症肝炎

3. 最不当的治疗是

- A 尽快终止妊娠
- B 防治肝昏迷
- C 积极保肝
- D 使用广谱抗生素
- E 消除黄疸

正确答案：DEA 您选择的答案：

第41-42题

女34岁，二胎，孕30周出现皮肤瘙痒，巩膜黄染1周，无其他不适，血压120 / 80mmHg，第1胎妊娠有相同发作史，产后黄疸自行消退。化验ALT40U。

1. 下列诊断哪种可能性大

- A. 妊高征致肝损害
- B. 急性病毒性肝炎
- C. 妊娠急性脂肪肝
- D. 妊娠期肝内胆汁淤积症
- E. 妊娠期药物性肝损害

2. 下列哪项检验有助于明确诊断

- A. 血清总胆红素+1分钟胆红素
- B. 血胆固醇
- C. 血清胆酸
- D. 尿胆酸
- E. 麝香草酚浊度试验

正确答案：DC 您选择的答案：

第43-44题

女，C1Po，孕32周，感头昏，乏力及食欲差，半月余，查：胎位，胎心及骨盆测量均正常，血红蛋白80g / L，红细胞压积25%

1. 较准确的诊断是

- A 巨幼红细胞性贫血
- B 缺铁性贫血
- C 地中海贫血
- D 再生障碍性贫血
- E 以上都不是

2. 治疗药物应首选

- A 叶酸
- B 硫酸亚铁
- C 少量多次输血
- D 维生素B12肌注
- E 右旋糖酐铁

正确答案：BB 您选择的答案：

第45-47题

35岁，孕22周，家务劳动后感胸闷气短，近1周夜间经常咳嗽、咳痰不能平卧。体检心率120次 / 分，心界向左扩大，心尖区可闻及3 / 6级收缩期杂音，双肺底闻及小水泡音，双下肢水肿(+)。

1. 该患者的诊断是

- A. 心衰
- B. 肺部感染
- C. 妊娠水肿
- D. 支气管哮喘
- E. 妊娠期生理变化

2. 正确的治疗是

- A. 加强产前监护
  - B. 限制食盐摄入
  - C. 立即终止妊娠
  - D. 控制心衰后终止妊娠
  - E. 控制心衰后继续妊娠
3. 产后处理哪一项不正确
- A. 限制输液速度
  - B. 可以使用利凡诺引产
  - C. 严格避孕，不宜再次妊娠
  - D. 宫缩欠佳，可以用催产素(缩宫素)
  - E. 无感染征象不必使用抗生素

正确答案：ADE 您选择的答案：

第48-50题

32岁，第二胎，孕34周，出现皮肤瘙痒，巩膜发黄一周，无其他不适，血压16 / 12kPa，以往妊娠有同样发作史，产后黄疸自行消退；化验SGPT 140单位

1. 下列诊断何项可能性最大

- A 妊高征致肝损
- B 急性病毒性肝炎

- C 妊娠急性脂肪肝
- D 妊娠期肝内胆汁淤积症
- E 药物性肝炎

2. 若要明确是否妊娠期胆汁淤积症, 下列检查应首选何项

- A 血清总胆红素+1分钟胆红素
- B 血胆固醇
- C 血清胆酸
- D 尿胆素
- E 麝香草酚浊度试验

3. 若是传染性肝炎, 一般必定有

- A 黄疸
- B SGPT剧烈升高
- C 胆固醇升高
- D 纳减, 恶心, 呕吐等消化道症状
- E HBSAg(+)

正确答案: DCD 您选择的答案:

四、A4型题: 以下提供若干个案例, 每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息, 在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

#### 第51-53题

28岁, G1P0, 孕38周, 风湿性心脏病, 心功能I~ 级, 胎儿估计2700g, 宫口开全20分, 先露头, 降至+3, 胎位LOT。

1. 分娩时处理正确的是

- A. 剖宫产术
- B. 应用吗啡
- C. 等待自然分娩
- D. 应助产缩短第二产程
- E. 肌注麦角新碱预防产后出血

2. 第二产程心脏负担最重不是由于

- A. 血容量增加
- B. 肺循环压力增高
- C. 周围阻力更为增高
- D. 心排血量及平均动脉压增高
- E. 腹压加大, 内脏血液涌向心脏

3. 若产后2小时内阴道出血量200ml, 子宫轮廓清楚, 心率120次/分, 呼吸26次/分, 双肺可闻及小水泡音, 宫底脐下2指。该患者正确的治疗是

- A. 静脉输液
- B. 肌注宫缩剂
- C. 抗生素治疗
- D. 快速洋地黄化
- E. 毛花苷C0.2mg+50%葡萄糖20ml 静推

正确答案: DAE 您选择的答案:

#### 第54-57题

女, 29岁, 妊娠30周, 恶心、呕吐、食欲不振1周, 既往无肝炎病史。血压130/85mmHg, 血谷丙转氨酶(ALT)300U/L, HbsAg(+), 尿糖(+).

1. 其诊断为

- A. 妊高征
- B. 妊娠合并糖尿病
- C. 妊娠合并急性肝炎
- D. 正常妊娠
- E. 妊娠合并高血压

2. 宜采用下列哪项处理

- A. 隔离, 静脉滴注保肝药物, 继续妊娠
- B. 卧床休息, 口服保肝药物, 继续妊娠
- C. 按传染性肝炎治疗后观察1周, 肝功能无明显改善者, 终止妊娠
- D. 立即隔离, 终止妊娠--引产
- E. 立即剖宫产, 防止肝脏负担继续加重

3. 此孕妇应给予积极治疗的原因主要为

- A. 容易合并妊高征及发生子痛
- B. 容易发生重症肝炎, 致使孕产妇死亡率增高
- C. 容易发生糖代谢紊乱, 影响胎儿发育
- D. 容易发生早产, 胎儿不易存活
- E. 容易发生宫缩乏力, 产程延长

4. 若此孕妇妊娠39周, 规律宫缩4小时入院。B超测胎儿双顶径9.3cm。胎位LOA, 胎心率140次/分。骨盆测量正常。

宫缩强, 胎膜已破, 宫口扩张4cm, 胎头"0"。其以下处理错误的是

- A. 尽可能经阴分娩
- B. 预防产后出血
- C. 立即剖宫产
- D. 防止肝肾功能衰竭
- E. 预防滞产, 缩短第二产程

正确答案: CABCE 您选择的答案:

五、B1型题: 以下提供若干组考题, 每组考题共用在前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第58-59题

- A. 甲型肝炎抗体检测
- B. 血ALT测定
- C. 胆红素测定
- D. 乙型肝炎抗原抗体测定
- E. 肝脏B超检查

1. 孕妇, 32周妊娠, 3周前食用未煮熟的毛蚶后出现恶心、呕吐、食欲不振、小便深黄色。血压140 / 2mmHg。子宫底高度30cm, 胎心144次 / 分。怀疑孕妇患有病毒性肝炎, 首选以上哪种化验

2. 产妇, 28岁, 患慢性乙型肝炎, 40周妊娠剖宫产1男婴, 家属欲确定此新生儿是否感染肝炎病毒, 需行哪种检验确诊

正确答案: AD 您选择的答案:

第60-62题

- A. 轻微活动即有胸闷, 气急, 静息心率114次 / 分, 呼吸22次 / 分
- B. 心悸, 气促, 心界稍扩大, 心尖区可闻及 级柔和收缩期杂音
- C. 气急, 发绀, 不能平卧, 肺底部持续湿啰音, 颈静脉充盈
- D. 心悸, 气急, 心尖区可闻及 级收缩期杂音及舒张期杂音
- E. 心悸, 气短, 自幼即发绀, 从未参加体力劳动, 能平卧, 肺无啰音

- 1. 孕34周, 心脏改变
- 2. 妊娠心力衰竭
- 3. 妊娠并早期心力衰竭

正确答案: BCA 您选择的答案:

第63-65题

- A. 严密监护下继续妊娠
- B. 立即人工流产
- C. 手术助产缩短第二产程
- D. 等待自然分娩
- E. 剖宫产

- 1. 某妇, 38岁, 风心病, 孕10周, 孕前曾心衰一次, 现心率100次 / 分, 呼吸18次 / 分
- 2. 风心病初孕妇, 孕35周, 心衰经治疗以后心率降至110次 / 分, 已能平卧, 胎心音好
- 3. 风心病, 孕38周, 无心衰及头盆不称宫口开大10cm, S+3

正确答案: BEC 您选择的答案:

习题集 妇产科学 高危妊娠

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 羊水甲胎蛋白(AFP)测定，最适宜于诊断

- A 先天愚型
- B 脑积水
- C 开放性神经管缺损
- D Rh同种免疫作用
- E 呼吸窘迫综合征(RDS)

正确答案：C 您选择的答案：

第2题 抽羊水看胎儿成熟度，哪种方法最实用，正确率高

- A 肌酐
- B L/S比值
- C HPL
- D E3
- E 脂肪细胞

正确答案：B 您选择的答案：

第3题 第二产程中，下列哪种情况不需要干预产程

- A 羊水胎粪污染
- B 第二产程已达2小时
- C CST有早期减速(>50%)
- D CST有晚期减速(达50%)
- E CST有典型的变异减速

正确答案：C 您选择的答案：

第4题 判断胎儿成熟度，以下哪项价值最高

- A 孕妇血清肌酐
- B 羊水L/S比值
- C 孕妇血清HPL
- D 孕妇尿E3
- E OCT试验

正确答案：B 您选择的答案：

第5题 羊水甲胎蛋白(AFP)测定，最适宜于诊断

- A 开放性神经管畸形
- B 先天愚型
- C 脑积水
- D 染色体异常
- E 呼吸窘迫综合征

正确答案：A 您选择的答案：

第6题 孕妇，28岁，孕42周入院待产。检查：血压120/80mmHg，宫高35cm，胎位LOA。胎心136次/分，下列哪项表示胎盘功能不足

- A 12小时胎动数 20次
- B B超羊水最大径线 3cm
- C 血清胎盘生乳素 4μg/L
- D NST试验有反应型
- E OCT试验胎心出现连续晚期减速

正确答案：E 您选择的答案：

第7题 关于胎儿成熟度的判定正确的是

- A 超声测量胎头双顶径，足月时为8.5cm
- B 磷脂酰胆碱(卵磷脂)与鞘磷脂的比值(L/S比值)是了解胎儿肺成熟度最准确的方法
- C 肌酐测定，一般以1mg为成熟值
- D 胆红素，0.02(OD450)表示妊娠已超过37周
- E 羊水桔黄细胞 10%表示胎儿已成熟

正确答案：B 您选择的答案：

第8题 测定胎儿胎盘功能下列哪项是当前最常用的方法

- A 测定尿中雌三醇值
- B 测定尿中孕二醇值
- C 测定尿中绒毛膜促性腺激素
- D 测定尿中胎盘生乳素
- E 测定耐热性碱性磷酸酶

正确答案：A 您选择的答案：

第9题 胎盘功能检查不包括

- A 胎动
- B NST试验
- C B超胎儿生物物理评分
- D 孕妇尿E3值
- E 孕妇阴道脱落细胞检查

正确答案：D 您选择的答案：

第10题 初产妇，25岁，孕1产0，41周妊娠，体检：宫高32cm，腹围96cm，LOA，先露固定，胎心136次/分，无宫缩，NST无反应型。应考虑为

- A. 胎头受压
- B. 脐带受压
- C. 过期妊娠
- D. 胎儿储备力下降
- E. 胎儿宫内发育迟缓

正确答案：D 您选择的答案：

第11题 高危妊娠是指

- A. 对胎儿有较高危险性的妊娠
- B. 对孕妇有较高危险性的妊娠
- C. 对新生儿有较高危险性的妊娠
- D. 对孕妇、胎儿有较高危险性的妊娠
- E. 对孕妇、胎儿和新生儿有较高危险性的妊娠

正确答案：E 您选择的答案：

第12题 下述哪项提示胎盘功能低下

- A. 妊娠32周后，尿雌三醇连续多次在10mg(24小时)以下
- B. 催产素激惹试验(OCT)阳性
- C. 妊娠35周后血清胎盘生乳素(HPL)升高
- D. 羊膜镜检查羊水呈白色半透明
- E. 非刺激试验(NST)阴性

正确答案：A 您选择的答案：

第13题 关于胎儿电子监测，提示胎儿缺氧的是

- A. 加速
- B. 早期减速
- C. 变异减速
- D. 晚期减速
- E. 以上都不是

正确答案：D 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第14题 初孕妇，月经周期正常，停经43周，无其他并发症，NST两次无反应，OCT 10分钟内3次宫缩每次持续40~50秒，均出现晚期减速，1周前24小时，尿E3：15mg，现仅8mg。应如何处理

- A. 立即人工破膜引产
- B. 口服雌激素3天
- C. 催产素引产
- D. 立即剖宫产
- E. 1周后复查

正确答案：D 您选择的答案：

第15题 初产妇，26岁。CIPo，孕40周，因胎动减少入院，查宫底耻上32cm，LDA，先露固定，胎心132次/分，无宫缩，入院后测24小时尿E3为6mg，应考虑为

- A. 脐带受压
- B. 胎儿受压
- C. 胎儿先天性畸形
- D. 胎盘功能不全
- E. 过期妊娠

正确答案：D 您选择的答案：

第16题 某妇，30岁，C3Po，妊娠8周，首次来院作产前检查，患者担心新生儿有先天畸形，应在妊娠何时做羊膜穿刺术

- A. 妊娠10~12周
- B. 妊娠8~9周
- C. 妊娠13~15周
- D. 妊娠16~20周
- E. 妊娠20~24周

正确答案：D 您选择的答案：

三、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第17-18题

- A. 胎儿肝脏成熟度
- B. 胎儿肾脏成熟度
- C. 胎儿皮脂成熟度
- D. 胎儿肺脏成熟度
- E. 胎儿胎盘功能

1. 通过E，测定了解

2. 通过羊水中胆红素测定了解

正确答案：EA 您选择的答案：

第19-20题

- A. 胎儿情况良好

B 缺氧，酸中毒

C 胎头受压

D 脐带受压

E 镇静药物影

1. 胎心减慢开始于宫缩高峰后，下降缓慢，持续时间长，恢复亦缓慢

2. 胎心减慢与宫缩关系不恒定，出现时下降迅速，幅度大，恢复也迅速

正确答案：BD 您选择的答案：

第21-23题

A L/S比值

B NST

C 羊水穿刺

D 阴道涂片细胞学检查

E OCT

1. 用于产前诊断

2. 判断胎儿肺成熟度

3. 判断胎儿储备功能

正确答案：CAB 您选择的答案：

第24-25题

A 胎儿心率每分钟持续在150次以上

B 胎儿心率每分钟持续在120次，历时10分钟

C 胎儿心率有基线摆动

D 胎儿心率静止型

E 胎儿心率有变异

1. 胎儿心动过缓

2. 提示胎儿储备功能丧失

正确答案：BD 您选择的答案：

第26-27题

A 迟发性胎心减速

B 晚期减速

C 变异减速

D 散发的，短暂的胎心率加速

E 胎心基线率有变异

1. 足月临产，胎膜破裂流出棕黄色羊水，胎儿监护时可能出现

2. 临产后，由于子宫收缩时脐带受压，兴奋迷走神经，胎儿监护时可能出现

正确答案：BC 您选择的答案：

第28-30题

A. 早期减速

B. 变异减速

C. 晚期减速

D. 催产素(缩宫素)激惹试验(+)

E. 无激惹试验有反应型

1. 胎头受压

2. 脐带受压

3. 胎盘功能减退

正确答案：ABD 您选择的答案：



习题集 妇产科学 妊娠病理

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 前置胎盘出血的特点

- A. 胎先露下降仍不止血
- B. 宫缩时出血量可减少
- C. 出血量与前置胎盘的种类无关
- D. 无痛性阴道流血
- E. 出血时子宫有压痛

正确答案：D 您选择的答案：

第2题 28岁初孕妇，孕32周因全身浮肿及头疼来诊，妊娠前即有面部及下肢浮肿。查血压160/110mmHg，尿蛋白++，可见颗粒管型，经治疗孕37周自然分娩，产后6周，血压降至128/75mmHg，尿蛋白++，浮肿+。下列诊断以哪项可能性大

- A. 先兆子痫
- B. 妊娠合并原发性高血压
- C. 妊娠合并肾炎
- D. 慢性肾炎基础上并发先兆子痫
- E. 原发性高血压基础上并发先兆子痫

正确答案：A 您选择的答案：

第3题 流产是指

- A. 妊娠不足18周，胎儿体重小于500g而终止者
- B. 妊娠不足20周，胎儿体重小于1000g而终止者
- C. 妊娠不足28周，胎儿体重小于1000g而终止者
- D. 妊娠在20~28周之间，胎儿体重小于1000g而终止者
- E. 妊娠在20~28周之间，胎儿体重小于500g而终止者

正确答案：C 您选择的答案：

第4题 关于胎盘早剥的描述，哪项不准确

- A. 常发生于妊高征患者
- B. 附着在子宫下段的胎盘发生剥离而引起临床症状
- C. 重型胎盘早剥提示胎盘剥离面超过1/3
- D. 重型隐性胎盘早剥易诱发DIC
- E. 胎盘早剥一经确诊应迅速结束分娩

正确答案：B 您选择的答案：

第5题 关于胎盘早剥时的处理，正确的是

- A. 纠正休克，大量补液
- B. 确诊为轻型者，可行期待疗法
- C. 经阴道分娩者不宜破膜
- D. 产妇情况恶化，不论胎儿是否存活，均应及时行剖宫产术
- E. 应用肝素治疗凝血功能障碍

正确答案：D 您选择的答案：

第6题 胎盘早剥的严重并发症

- A. 失血性休克
- B. 产后感染
- C. 产后出血
- D. 凝血功能障碍
- E. 子宫卒中

正确答案：D 您选择的答案：

第7题 早期诊断双胎妊娠最可靠的依据

- A. B型超声检查
- B. 多普勒胎儿仪检查
- C.  $\beta$ -hCG
- D. 尿E3值
- E. L/S比值

正确答案：A 您选择的答案：

第8题 下列关于难免流产的叙述中，哪个不正确

- A. 阴道流血增多
- B. 出现阴道流水
- C. 阵发性腹痛加重
- D. 有部分胎盘嵌顿于宫颈口，部分胎盘排出
- E. 子宫大小与停经月份相符或略小

正确答案：D 您选择的答案：

第9题 关于习惯性流产，下列哪项是错误的

- A. 每次流产往往发生在相同妊娠月份
- B. 临床过程和一般流产相同
- C. 自然流产连续发生二次或以上者
- D. 病因之一与染色体异常有关
- E. 晚期习惯性流产常因宫口松弛引起

正确答案：C 您选择的答案：

第10题 应用超声诊断羊水过多的标准为羊水指数大于

- A. 8cm
- B. 15ml
- C. 18ml
- D. 25ml
- E. 30ml

正确答案：C 您选择的答案：

第11题 关于死胎，下列哪项是正确的

- A. 胚胎在宫内死亡称死胎
- B. 胎儿死亡后即开始释放凝血活酶进入母血循环，引起DIC
- C. 羊水中AFP水平降低
- D. 死产也是死胎的一种
- E. 以上均不对

正确答案：C 您选择的答案：

第12题 鉴别诊断输卵管妊娠流产与黄体破裂比较可靠的是

- A. 有无停经史
- B. 后穹窿穿刺
- C. B型超声检查
- D. 血妊娠试验( $\beta$ -CG检查)
- E. 有无阴道流血

正确答案：D 您选择的答案：

第13题 关于流产的治疗原则，下列哪项是错误的

- A. 难免流产应行刮宫术
- B. 不全流产应行刮宫术
- C. 患者自述阴道有组织物从阴道内排出，但阴道流血未见减少，应行刮宫术
- D. 感染性流产出血不多，应抗感染及刮宫同时进行
- E. 子宫内口松弛者，应在妊娠16~22周时行子宫颈内口缝扎术

正确答案：D 您选择的答案：

第14题 确诊前置胎盘首选

- A. 产后检查胎膜破口距胎盘边缘5cm
- B. 腹部正位片，子宫体部无胎盘影
- C. 窥器检查宫颈未见病变
- D. B型超声检查可见胎盘覆盖宫颈内口
- E. 阴道穹窿扪诊可发现宫颈口周围有软组织

正确答案：D 您选择的答案：

第15题 下列哪项不符合前置胎盘的表现

- A. 先露下降受阻
- B. 无痛性阴道流血
- C. 子宫下段闻及胎盘血流音
- D. 子宫张力较高，胎心音不易闻及
- E. 宫底高度与孕周相符

正确答案：D 您选择的答案：

第16题 下列哪项与羊水过多无关

- A. 糖尿病
- B. 多胎妊娠
- C. 胎儿消化道畸形
- D. 胎儿泌尿道畸形
- E. 重度母儿血型不合

正确答案：D 您选择的答案：

第17题 死胎的常见原因不包括

- A. 前置胎盘
- B. 胎盘早剥
- C. IUGR
- D. 头盆不称
- E. 妊高征

正确答案：D 您选择的答案：

第18题 妊高征最常见的产科并发症是

- A. 胎盘早期剥离
- B. 急性肾功能衰竭
- C. 妊高征性心脏病
- D. 视网膜剥离
- E. HELLP综合征

正确答案：A 您选择的答案：

第19题 与前置胎盘的病因无关的是

- A. 子宫内膜炎
- B. 子痫前期
- C. 多胎
- D. 受精卵滋养层发育迟缓
- E. 副胎盘

正确答案：B 您选择的答案：

第20题 下列何项不是重度妊高征的标志

- A 血压  $> 21.3 / 14.7 \text{ kPa} (160 / 110 \text{ mmHg})$
- B 24小时尿蛋白定量  $> 5 \text{ g}$
- C 头痛，视力障碍
- D 下肢水肿(+++)
- E 眼底动脉痉挛伴有视网膜水肿

正确答案：D 您选择的答案：

第21题 硫酸镁用以治疗妊高征时，下述哪项不对

- A 最主要用以解痉和降低神经兴奋性，以预防和控制抽搐
- B 24小时硫酸镁总量不得超过10g
- C 尿量少于25ml / h或呼吸  $< 16$ 次 / 分时停用
- D 膝反射消失者禁用
- E 硫酸镁中毒时，用葡萄糖酸钙缓慢推注治疗之

正确答案：B 您选择的答案：

第22题 习惯性流产的临床特点是

- A 自然流产连续发生3次以上
- B 几次流产一定发生在同一孕周
- C 与一般流产相同
- D 习惯性流产均系母体生殖系统感染所致
- E 有习惯性流产史妇女一旦怀孕即用黄体酮治疗

正确答案：C 您选择的答案：

第23题 各种流产的临床特点，下列哪项描述是正确的

- A 稽留流产--子宫继续增大
- B 完全流产--腹痛，宫口松
- C 难免流产--阴道出血少，未破水
- D 先兆流产--宫口闭，阴道出血量少
- E 不全流产--宫口闭，阴道出血减少

正确答案：D 您选择的答案：

第24题 停经10周的宫颈妊娠，其处理是

- A 刮宫术后注射催产素
- B 刮宫术后宫颈塞纱条
- C 必要时输血
- D 黄体酮肌注及卧床休息
- E 子宫全切除术

正确答案：B 您选择的答案：

第25题 关于母子血型不合，下述哪项不正确

- A 母子Rh血型不合时，第一胎时便可发生新生儿溶血症
- B 母子ABO血型不合时，第一胎便可发生新生儿溶血症
- C 母Rh阳性，父Rh阳性，新生儿一般不会发生溶血
- D 母血型为O，父血型为A或B时，可能发生新生儿溶血
- E 母血型为A，一般不会发生新生儿ABO溶血

正确答案：A 您选择的答案：

第26题 关于输卵管妊娠的诊断哪项是错误的

- A 有时没有停经史诊断仍可成立
- B 后穹窿穿刺抽不出血液可排除异位妊娠
- C 阴道有蜕膜管型排出有助诊断
- D 输卵管妊娠破裂常有晕厥与休克
- E 盆腔检查时宫颈可有举痛

正确答案：B 您选择的答案：

第27题 先兆流产与难免流产的鉴别要点是

- A 出血时间长短
- B 下腹痛的程度
- C 早孕反应是否存在
- D 宫口开大与否
- E 妊娠试验阳性

正确答案：D 您选择的答案：

第28题 羊水过多是指羊水量超过

- A 600ml
- B 700ml
- C 800ml
- D 1000ml
- E 2000ml

正确答案：E 您选择的答案：

第29题 关于子痫，下列哪项是错误的

- A 子痫多发生于妊娠期或临产前
- B 分娩过程中及分娩后均有可能发生子痫
- C 子痫一定是在先兆子痫基础上发展而来
- D 大多数患者抽搐前有头痛、眼花、胸闷及视物模糊
- E 子痫患者抽搐过程中易发生唇舌咬伤、摔伤甚至骨折及吸入性肺炎

正确答案：C 您选择的答案：

第30题 妊高征患者，解痉首选哪种药物

- A. 山莨菪碱(654-2)
- B. 东莨菪碱
- C. 硫酸镁
- D. 安密妥钠
- E. 冬眠I号

正确答案：C 您选择的答案：

第31题 先兆流产与难免流产的主要鉴别要点是

- A. 出血时间长短
- B. 下腹痛的程度
- C. 早孕反应是否存在
- D. 宫口开大与否
- E. 妊娠试验阳性

正确答案：D 您选择的答案：

第32题 关于异位妊娠的诊断下述哪项最重要

- A. 病史
- B. 腹部检查及阴道检查
- C. 后穹窿穿刺
- D. hCG测定
- E. 诊刮

正确答案：C 您选择的答案：

第33题 关于重型胎盘早剥的临床表现的论述，下列不正确的是

- A. 子宫如孕周大小，触诊软，有压痛，以胎盘附着处最为明显
- B. 无或仅有少量阴道流血
- C. 腹痛剧烈，严重时可出现恶心、眼花、面色苍白、血压下降
- D. 持续性腹痛、腰酸、腰痛
- E. 妊高征患者血压可在正常范围

正确答案：A 您选择的答案：

第34题 双胎妊娠最常见的并发症为

- A. 脐带晚垂
- B. 产程延长，产后出血
- C. 产褥感染
- D. 胎头交锁
- E. 胎膜早破

正确答案：B 您选择的答案：

第35题 关于流产，下列哪项正确

- A. 稽留流产是指子宫与停经月份相符
- B. 先兆流产时子宫大小与停经月份不符
- C. 早期流产是指妊娠20周以前发生流产
- D. 习惯性流产是指自然流产连续发生两次者
- E. 流产指妊娠不满28周，胎儿体重不足1000g而终止者

正确答案：E 您选择的答案：

第36题 下列哪项不是羊水过多的临床表现

- A. 常合并胎儿畸形
- B. 糖尿病患者多见
- C. 单胎妊娠多于双胎
- D. 多发生于妊娠20~24周
- E. 羊水超过2000ml以上

正确答案：C 您选择的答案：

第37题 硫酸镁治疗妊高征时，首先出现的中毒现象是

- A. 呼吸抑制
- B. 肌张力减退
- C. 心跳停止
- D. 肾功能不全
- E. 肌腱反射减退或消失

正确答案：E 您选择的答案：

第38题 关于重度妊高征的治疗，下列哪项不适宜

- A. 解痉，镇静，防止抽搐
- B. 在解痉的基础上，扩容利尿
- C. 适时终止妊娠
- D. 严格控制钠盐摄入量，防止水肿加重
- E. 扩容剂的选择，胶体溶液优于晶体溶液

正确答案：D 您选择的答案：

第39题 关于流产的定义，下列哪项是正确的

- A. 妊娠<28周，胎儿体重<1000g
- B. 妊娠<20周，胎儿体重<500g
- C. 妊娠20~27周，胎儿体重<500g
- D. 妊娠20~27周，胎儿体重<1000g
- E. 妊娠12~20周，胎儿体重<500g

正确答案：A 您选择的答案：

第40题 习惯性晚期流产最常见的原因是

- A. 孕卵发育异常
- B. 黄体功能不足
- C. 甲状腺功能不足
- D. 染色体异常
- E. 子宫颈内口松弛

正确答案：E 您选择的答案：

第41题 关于前置胎盘的临床表现下述哪一项是正确的

- A. 妊娠晚期或临产时无痛性阴道流血
- B. 胎盘位置越低，阴道流血出现越晚
- C. 胎先露常如期入盆
- D. 贫血程度与出血量不成正比
- E. 出血量与前置胎盘的类型无明确关系

正确答案：A 您选择的答案：

第42题 关于习惯性流产，下列哪项是错误的

- A. 每次流产往往发生于同一月份
- B. 临床过程和一般流产相同
- C. 自然流产连续发生3次或以上
- D. 病因之一与染色体异常有关
- E. 晚期习惯性流产常与宫口松弛有关

正确答案：A 您选择的答案：

第43题 中央性前置胎盘大出血的治疗方法哪项是正确的

- A. 如为臀位，行足牵引
- B. 催产素引产
- C. 胎头吸引助产
- D. 剖宫产
- E. 人工破膜，头皮钳牵引压迫止血

正确答案：D 您选择的答案：

第44题 前置胎盘指胎盘部分或全部附着于

- A. 子宫体的前壁
- B. 子宫下段或宫颈内口处
- C. 子宫体侧壁
- D. 子宫体后壁
- E. 子宫底部

正确答案：B 您选择的答案：

第45题 下列哪种情况不是重度胎盘早剥的临床表现

- A. 剧烈腹痛后阴道流血
- B. 阴道出血量与全身症状不成正比
- C. 子宫底升高
- D. 子宫板状
- E. 胎位，胎心清晰

正确答案：E 您选择的答案：

第46题 阴道大流血，休克，疑为前置胎盘，以下哪一项检查最合适

- A. 肛诊
- B. 阴道检查
- C. 窥器检查
- D. 超声波胎盘定位
- E. 以上均不恰当

正确答案：D 您选择的答案：

第47题 足月妊娠阴道出血的孕妇，为明确前置胎盘诊断，入院后应即行

- A. 肛门检查
- B. 放射性核素扫描
- C. X线软组织摄影
- D. 超声波定位
- E. 输液备血阴道检查

正确答案：D 您选择的答案：

第48题 8周妊娠，难免流产，首选的治疗原则是

- A. 卧床保胎
- B. 尽快清宫
- C. 肌注催产素
- D. 给予止血药物
- E. 给予大量雌激素

正确答案：B 您选择的答案：

第49题 关于输卵管妊娠，下列哪项正确

- A. 间质部妊娠最常见
- B. 一般子宫增大情况与停经天数相符
- C. 子宫内膜的形态变化与孕卵存活及绒毛的活力有关
- D. 阴道流血量多，易致失血性休克
- E. 后穹窿穿刺阴性可否定输卵管妊娠的可能

正确答案：C 您选择的答案：

第50题 妊高征时24小时尿蛋白定量达到或超过，下述何项列为重度妊高征

- A 1g
- B 3g
- C 5g
- D 10g
- E 15g

正确答案：C 您选择的答案：

第51题 关于过期妊娠，下列哪项是正确的

- A 凡预产期超过2周，尚未临产者均为过期妊娠
- B 妊娠过期越久，胎儿体重越大
- C 过期妊娠易发生胎儿窘迫
- D 与孕妇孕激素相对过少有关
- E 过期妊娠孕妇尿中E3水平正常

正确答案：C 您选择的答案：

第52题 应用超声诊断羊水过少的标准为羊水指数低于

- A 3cm
- B 5cm
- C 8cm
- D 10cm
- E 12cm

正确答案：B 您选择的答案：

第53题 羊水过多时B超测量最大羊水暗区垂直深度超过

- A 9cm
- B 7cm
- C 5cm
- D 3cm
- E 6cm

正确答案：B 您选择的答案：

第54题 流产是指

- A 妊娠<37周，胎儿体重<2500g而终止者
- B 妊娠<28周，胎儿体重<1000g而终止者
- C 妊娠<24周，胎儿体重<1500g而终止者
- D 妊娠<24周，胎儿体重<1000g而终止者
- E 妊娠<20周，胎儿体重<500g而终止者

正确答案：B 您选择的答案：

第55题 输卵管妊娠最常见的原因是

- A 输卵管发育异常
- B 子宫内膜异位症
- C 慢性输卵管炎
- D 输卵管结扎手术后
- E 宫内节育器放置后

正确答案：C 您选择的答案：

第56题 下列哪项处理胎盘早剥是错误的

- A 重度胎盘早剥，不能在短时间内结束分娩者剖宫产
- B 发现子宫胎盘卒中，立即行子宫切除术
- C 轻度胎盘早剥，胎儿存活，胎儿宫内窘迫者剖宫产
- D 破膜后产程无进展，产妇情况恶化，胎儿死亡，亦要行剖宫产
- E 初产妇轻度胎盘早剥，估计短时间能结束分娩者可阴道分娩

正确答案：B 您选择的答案：

第57题 关于HELLP综合征，下列哪项是错误的

- A 溶血
- B 妊高征
- C 肝酶升高
- D 血小板减少
- E 病毒性肝炎

正确答案：E 您选择的答案：

第58题 妊高征最常见的产科并发症是

- A 脑溢血
- B 产后循环衰竭
- C 妊高征心脏病
- D 胎盘早剥
- E 肝被膜下出血

正确答案：D 您选择的答案：

第59题 羊水过少是指妊娠晚期羊水量少于

- A 500ml
- B 400ml
- C 300ml
- D 200ml
- E 100ml

正确答案：C 您选择的答案：

第60题 关于难免流产哪项是错误的

- A 阴道流血增加
- B 下腹痛加剧
- C 有部分胎盘嵌顿于宫颈口，部分胎盘排出
- D 宫口开
- E 子宫体与孕周相符或略小于孕周

正确答案：C 您选择的答案：

第61题 下列哪项不是子痫前期的预测性诊断方法

- A 平均动脉压
- B 翻身试验
- C 血液凝血因子测定
- D 尿钙/肌酐
- E 血液流变学试验

正确答案：C 您选择的答案：

第62题 羊水过少，哪项是错误的

- A 妊娠晚期，羊水量少于300ml为羊水过少
- B 羊水指数法(AFI)以5cm做为诊断羊水过少的绝对值
- C 羊水过少是胎儿宫内发育迟缓的特征之一
- D 常与胎儿畸形无关
- E 产程中常伴有CST变异减速的出现

正确答案：D 您选择的答案：

第63题 胎盘早期剥离的严重并发症

- A 失血性休克
- B 产后出血
- C 产后感染
- D 凝血功能障碍
- E 子宫卒中

正确答案：D 您选择的答案：

第64题 下列不是重度胎盘早剥的临床表现的是

- A 阴道流血、剧烈腹痛
- B 出血量与全身症状不成正比
- C 宫底升高
- D 子宫板状硬
- E 胎位，胎心清楚

正确答案：E 您选择的答案：

第65题 关于羊水过少，下述哪项不正确

- A 是胎儿窘迫的一个征象
- B 是胎儿生物物理评分的一个指标
- C 在产程中常伴有CST变异减速的出现
- D 是胎儿监护中早期减速出现的一个原因
- E 常与胎儿畸形有关

正确答案：D 您选择的答案：

第66题 双胎妊娠胎盘检查发现两个羊膜囊的中隔为2层，受精卵的分裂发生于

- A 囊胚期
- B 桑椹期前
- C 羊膜囊形成后
- D 原始胚盘形成后
- E 受精后13天以上

正确答案：A 您选择的答案：

第67题 异位妊娠是指

- A 受精卵着床于子宫以外
- B 受精卵着床于子宫+附件以外
- C 受精卵着床于子宫体腔以外
- D 受精卵着床于腹腔以外
- E 受精卵着床于宫颈管以外

正确答案：C 您选择的答案：

第68题 关于重度妊高征的治疗，下列哪项是错误的

- A 解痉、镇静，防止抽搐
- B 在解痉的基础上扩容、利尿
- C 适时终止妊娠
- D 扩容剂根据是否有低蛋白血症、贫血、电解质紊乱选择
- E 严格限制钠盐摄入，防止水肿加重

正确答案：E 您选择的答案：

第69题 重度妊高征的产科处理，下述哪项是错误的

- A 孕<36周，经治疗病情好转而稳定，可继续妊娠
- B 孕<36周，积极治疗24~48小时，症状改善，估计胎儿可成活，应考虑终止妊娠
- C 孕36周，经积极治疗24~48小时病情继续恶化，应继续积极治疗至病情稳定后终止妊娠
- D 子痫患者应积极治疗，控制抽搐6~12小时终止妊娠
- E 引产失败应行刮宫术

正确答案：C 您选择的答案：

第70题 关于羊水过多但胎儿正常的处理方法中错误的是

- A．症状严重孕妇，胎龄不足37孕周，应穿刺放羊水
- B．一次放羊水量不超过1500ml
- C．前列腺素合成酶抑制剂一吲哚美辛有抑制利尿的作用，应广泛用于治疗羊水过多
- D．症状较轻可以继续妊娠，注意休息，低盐饮食
- E．妊娠已近37周，在确定胎儿已成熟的情况下行人工破膜

正确答案：C 您选择的答案：

第71题 妊娠晚期羊水过少的诊断标准为少于

- A．100ml
- B．200ml
- C．300ml
- D．400ml
- E．500ml

正确答案：C 您选择的答案：

第72题 输卵管妊娠特征下列哪项是错误的

- A 输卵管峡部妊娠发生破裂的时间较早
- B 输卵管间质部妊娠破裂时，出血最多，后果最严重
- C 输卵管妊娠中以壶腹部妊娠最多见
- D 妊娠试验常(+)
- E 后穹窿穿刺常可抽得正常可凝血液

正确答案：E 您选择的答案：

第73题 妊娠早期流产的主要原因是

- A 生殖器官异常
- B 母体全身疾病
- C 遗传基因缺陷
- D 外界不良因素
- E 免疫因素

正确答案：C 您选择的答案：

第74题 下列诊断输卵管妊娠的辅助检查方法中，最少用的是

- A．阴道后穹窿穿刺
- B．B超检查
- C．血β-HCG
- D．宫腔镜检查
- E．腹腔镜检查

正确答案：D 您选择的答案：

第75题 完全性前置胎盘不可能发生在下述何种情况

- A 胎位LST，单臀，先露未入盆
- B 胎位RSCP
- C 胎位LOP，胎头未入盆
- D 胎位ROA，先露已衔接
- E 胎位LOT，先露高浮

正确答案：D 您选择的答案：

第76题 下述不属于胎盘早期剥离的症状的是

- A．血性羊水
- B．耻骨联合上闻及吹风样杂音
- C．腹痛
- D．贫血
- E．子宫胎盘卒中

正确答案：B 您选择的答案：

第77题 子宫小于孕3个月的稽留流产，其处理原则应是

- A 先给予抗生素行钳手术
- B 立即行宫颈扩张及钳刮术
- C 先给予催产素，后行钳刮术
- D 先给予雌激素，后行钳刮术
- E 药物引产

正确答案：D 您选择的答案：

第78题 孕38周先兆子痫患者，血压150/100mmHg，尿蛋白++，比重1.024，血红蛋白120克/升，红细胞压积40%，宫底剑突下2横指，左枕前位，头半定，胎头及骨盆正常，宫口未开。此时选用下列何组处理恰当

- A．剖宫产
- B．利尿剂
- C．硫酸镁加扩容治疗
- D．降压药
- E．缩宫素静点引产

正确答案：C 您选择的答案：

第79题 下列哪项不是重度妊高征的表现

- A．血压高于160 / 110mmHg
- B．头痛、头晕、视力障碍
- C．下肢水肿(+++)



D. 24小时尿蛋白定量>5g  
E. 眼底动脉痉挛伴视网膜水肿、渗出物及出血  
正确答案：C 您选择的答案：

第80题 下述哪项胎动次数提示胎儿缺氧

- A. 胎动 < 10次 / 12小时
- B. 胎动 < 20次 / 12小时
- C. 胎动 < 15次 / 12小时
- D. 胎动 < 25次 / 12小时
- E. 胎动 < 30次 / 12小时

正确答案：A 您选择的答案：

第81题 异位妊娠常见的着床部位是

- A. 卵巢
- B. 输卵管
- C. 子宫颈
- D. 子宫角
- E. 腹腔

正确答案：B 您选择的答案：

第82题 关于自然流产的症状，下列哪项是错误的

- A. 妊娠12周后，先阴道流血后腹痛
- B. 晚期流产一般出血不多
- C. 妊娠8~12周阴道流血较多
- D. 妊娠8周前出血不多
- E. 妊娠8周后不完全流产较多

正确答案：A 您选择的答案：

第83题 习惯性晚期流产最常见于

- A. 先天性卵巢发育异常
- B. 妊娠合并卵巢囊肿
- C. 宫颈口松弛
- D. 孕卵发育异常
- E. 黄体功能不全

正确答案：C 您选择的答案：

第84题 最易发生DIC的疾病是

- A. 妊高征
- B. 前置胎盘
- C. 胎盘早期剥离
- D. 死胎
- E. 羊水过多症

正确答案：C 您选择的答案：

第85题 前置胎盘病例，仅适用于阴道分娩的是

- A. 部分性前置胎盘而胎儿为头位
- B. 低置胎盘而胎儿为头位
- C. 部分性前置胎盘而胎儿为臀位
- D. 低置胎盘而胎儿为臀位
- E. 以上都不是

正确答案：B 您选择的答案：

第86题 下述与胎盘早剥的发生无关的是

- A. 血管病变
- B. 撞击或外伤
- C. 宫缩过强
- D. 子宫内压突然降低
- E. 子宫的静脉压突然升高

正确答案：C 您选择的答案：

第87题 妊娠近足月患先兆子痫的孕妇，恰当的处理应是

- A. 积极治疗，等待产程发动
- B. 积极治疗24~48小时，症状无明显改善时应终止妊娠
- C. 积极治疗一周后，予以引产
- D. 立即引产
- E. 立即行剖宫术

正确答案：B 您选择的答案：

第88题 与前置胎盘的发生无关的是

- A. 妊娠高血压综合征
- B. 双胎妊娠
- C. 多次刮宫
- D. 胎盘面积过大
- E. 受精卵滋养层发育迟缓

正确答案：A 您选择的答案：

第89题 关于流产，下列哪项是正确的

- A. 完全流产，有腹痛，宫口松
- B. 先兆流产，出血量少，宫口闭
- C. 不全流产，宫口闭，出血少

D 难免流产，宫口闭，出血少  
E 稽留流产，胚胎死亡达4周以上未自然排出  
正确答案：B 您选择的答案：

第90题 子痫前期患者住院后突然出现抽搐时，应首选紧急处理是  
A．移送于暗室，放置开口器  
B．即测血压，查眼底  
C．即行刮宫产  
D．即静脉注射25%硫酸镁10ml及镇静剂  
E．即快速静点20%甘露醇250ml  
正确答案：D 您选择的答案：

第91题 前置胎盘的发生与下列哪项无关  
A．多胎妊娠  
B．副叶胎盘  
C．妊娠高血压综合征  
D．子宫内病变与损伤  
E．受精卵滋养叶发育延迟  
正确答案：C 您选择的答案：

第92题 前置胎盘的正确处理是  
A．有阴道出血即终止妊娠  
B．肛查了解宫口开大情况以决定分娩方式  
C．凡胎儿死亡均从阴道分娩  
D．疑前置胎盘，肛查应轻柔  
E．大出血时，不需阴道检查，即行刮宫产  
正确答案：D 您选择的答案：

第93题 关于羊水过多，下列哪项是错误的  
A 妊娠任何时期内，羊水量超过2000ml为羊水过多  
B 羊水最大暗区(AFD法) > 7cm为羊水过多  
C 羊水最大暗区(AFI法)，18cm为羊水过多  
D 羊水过多合并神经管缺损时，羊水中AFP值明显升高  
E 羊水过多不易引起产后出血  
正确答案：E 您选择的答案：

第94题 下列哪项不符合中央性(完全性)前置胎盘的常见临床表现  
A 胎位不正的发生率高  
B 先露高浮  
C 第一次出血多在孕36周以后  
D 易发生出血性休克  
E 较其他类型前置胎盘易发生胎儿宫内窘迫  
正确答案：C 您选择的答案：

第95题 有关宫外孕，下述哪项是正确的  
A 以间质部分妊娠最常见  
B 一般子宫增大情况与停经天数相符  
C 子宫内膜也发生蜕膜变化  
D 阴道流血多，易致失血性休克  
E 后穹窿穿刺阴性可否定宫外孕  
正确答案：C 您选择的答案：

第96题 关于羊水过少的处理错误的是  
A．妊娠足月者，应尽快破膜引产  
B．若破膜后出现胎儿窘迫的表现，估计短时间内不能结束分娩者，应在除外胎儿畸形后，选择剖宫产  
C．羊膜腔输液防治妊娠中晚期羊水过少  
D．剖宫产比阴道分娩可明显降低围产儿死亡率  
E．羊水过少者一律剖宫产  
正确答案：E 您选择的答案：

第97题 输卵管妊娠破裂或流产手术应遵循  
A．尽快钳夹出血处，切除或保留患侧输卵管  
B．切除子宫  
C．进行对侧输卵管整形术  
D．切除患侧附件  
E．尽量吸出腹腔血液作自家输血  
正确答案：A 您选择的答案：

第98题 双胎妊娠最常见的并发症错误的是  
A．胎膜早破脐带脱垂  
B．产程延长，产后出血  
C．产褥感染  
D．胎头交锁  
E．胎盘功能不全  
正确答案：E 您选择的答案：

第99题 前置胎盘的正确处理是  
A 有阴道出血，即终止妊娠  
B 分娩方式，宫口开，剖腹产  
C 胎儿死亡，均以阴道分娩

D 疑有前置胎盘，肛诊时宜轻柔  
E 大出血时，经阴道检查，作剖腹产  
正确答案：E 您选择的答案：

第100题 妊娠晚期出血的处理哪项不对  
A 在排除前置胎盘之前应禁止肛指检查  
B 有必要用阴道拉钩或窥阴器协助下窥视宫颈有无息肉或糜烂出血  
C 可以作阴道穹隆扪诊以查觉有否前置胎盘  
D 应常规作B超检查  
E 如胎儿已死，原则上尽量阴道分娩  
正确答案：E 您选择的答案：

第101题 在耻骨联合上方听到胎盘杂音时，胎盘应附着在  
A 子宫底部  
B 子宫上段前壁  
C 子宫上段后壁  
D 子宫下段前壁  
E 子宫下段后壁  
正确答案：D 您选择的答案：

第102题 胎盘早剥的正确处理是  
A 一旦确诊后立即终止妊娠  
B 出血不多可作期待疗法  
C 胎儿死亡均取阴道分娩  
D 破膜后可以头皮钳牵引胎头止血  
E 子宫有胎盘卒中可用按摩法促使子宫收缩  
正确答案：A 您选择的答案：

第103题 双胎妊娠的两个胎心率相差  
A . 5次或以上  
B . 10次或以上  
C . 15次或以上  
D . 18次或以上  
E . 20次或以上  
正确答案：B 您选择的答案：

第104题 妊高征中，下列哪项不需要扩容  
A . 红细胞比容0.39  
B . 中心静脉压降低  
C . 尿比重1.025，尿量偏少  
D . 血浆纤维蛋白原增多  
E . 低蛋白性水肿  
正确答案：D 您选择的答案：

第105题 妊高征的诊断方面，下述哪项是正确的  
A 妊娠后期血压有一次在17.3 / 12kPa(130 / 90mmHg)以上  
B 高血压，水肿，蛋白尿三者具备，为中度妊高征  
C 重度妊高征血压必须在24 / 14kPa(180 / 110mmHg)  
D 子痫一般有前驱症状  
E 妊高征大多有后遗症  
正确答案：D 您选择的答案：

第106题 过期流产致严重出血的原因不包括  
A . 胚胎组织机化粘连，刮宫困难易致组织残留  
B . 稽留日久，可发生凝血功能障碍  
C . 刮宫困难易穿孔  
D . 雌激素不足，子宫对缩宫素不敏感，宫缩乏力  
E . 绒毛促性素缺乏  
正确答案：E 您选择的答案：

第107题 初产妇重症胎盘早剥，宫口开大4cm，最佳的处理方法是  
A 人工破膜加静滴催产素  
B 剖腹产  
C 人工破膜加头皮钳牵引  
D 静滴催产素  
E 抗休克同时给予抗凝药  
正确答案：B 您选择的答案：

第108题 硫酸镁治疗妊高征剂量过大时，最先出现的毒性反应是  
A 头晕，血压过低  
B 呼吸减慢  
C 心率减慢  
D 膝反射减退或消失  
E 尿量过少  
正确答案：D 您选择的答案：

第109题 关于感染性流产的处理，下列哪项是错误的  
A . 立即刮宫再给抗生素  
B . 出血多者应在静脉应用抗生素的同时取出大块残留以减少出血，感染控制后再行刮宫  
C . 如出现感染性休克，应积极抗休克

D. 如出现盆腔脓肿应作切开引流术  
E. 原则上先控制感染再刮宫  
正确答案：A 您选择的答案：

第110题 下列哪项不是胎盘早剥发生的原因  
A. 不协调的宫缩过强  
B. 孕妇血管病变  
C. 外伤  
D. 子宫腔内压突然降低  
E. 子宫静脉压突然升高  
正确答案：A 您选择的答案：

第111题 先兆流产与难免流产的主要鉴别要点是  
A. 出血时间长短  
B. 下腹痛的程度  
C. 宫口扩张与否  
D. 妊娠试验是否阳性  
E. 早孕反应是否存在  
正确答案：C 您选择的答案：

第112题 妊娠高血压综合征的基本病变为  
A. 肾素-血管紧张素-前列腺素系统平衡失调  
B. 慢性弥散性血管内凝血  
C. 血液高度浓缩  
D. 水钠严重潴留  
E. 全身小动脉痉挛  
正确答案：E 您选择的答案：

第113题 关于胎盘早剥的处理，正确的是  
A. 纠正休克，大量补液  
B. 确诊为轻型者  
C. 可行期待疗法  
D. 经阴分娩者不宜破膜  
E. 产妇情况恶化，不论胎儿是否存活，均应及时行剖宫产术  
正确答案：E 您选择的答案：

第114题 正常位置胎盘早剥，哪一项是错误的  
A. 附着在子宫下段，胎盘发生剥离  
B. 妊娠晚期腹痛性阴道流血，首先考虑胎盘早剥  
C. 胎盘早剥一旦确诊，应尽快终止妊娠  
D. 症状出现争取6小时内结束分娩  
E. 重症胎盘早剥可诱发DIC  
正确答案：A 您选择的答案：

第115题 关于感染性流产的处理。下列何项是错误的  
A. 立即刮宫以清除宫腔内容物，同时给广谱抗生素  
B. 原则上先抗生素控制感染，再行刮宫  
C. 出血多者在静脉应用抗生素同时取出宫内大块残留，以减少出血。感染控制后再行清宫术  
D. 患者出现感染性休克，应积极抗休克  
E. 如出现盆腔脓肿应作切开引流术  
正确答案：A 您选择的答案：

第116题 羊水过多的诊断标准为超过  
A. 800ml  
B. 1000ml  
C. 1500ml  
D. 2000ml  
E. 2500ml  
正确答案：D 您选择的答案：

第117题 决定对重度妊高征患者实施扩容治疗前，下列何种检查最关键  
A. 眼底检查  
B. 24小时尿蛋白定量  
C. 血浆总蛋白测定  
D. 红细胞比积  
E. 心电图检查  
正确答案：D 您选择的答案：

第118题 疑前置胎盘患者，哪项处理错误  
A. 入院观察  
B. 查血常规  
C. 做好输血准备  
D. 申请超声波检查  
E. 肛诊检查  
正确答案：E 您选择的答案：

第119题 关于妊高征的预测性诊断方法，下列哪项是错误的  
A. 平均动脉压  
B. 转身试验  
C. 血液凝血因子 、 测定

D. 血管紧张素敏感试验

E. 血液流变学试验

正确答案：C 您选择的答案：

第120题 妊娠高血压综合征基本病理变化中最重要的是

A. 肝被膜下出血

B. 全身小动脉痉挛

C. 水钠潴留

D. 胎盘绒毛退行性变

E. 弥散性血管内凝血

正确答案：B 您选择的答案：

第121题 下列何种情况与双胎妊娠无关

A. 胎膜早破

B. 早产

C. 胎位异常

D. 胎盘早剥

E. 胎盘功能不全

正确答案：E 您选择的答案：

第122题 妊娠中期进行妊高征预测试验，下列哪项提示有妊高征倾向

A. 平均动脉压为85mmHg

B. 血细胞比容等于0.30

C. 全血黏度比值等于3.4

D. 尿Ca/Cr比值等于0.05

E. 仰卧位血压较左侧卧位高15mmHg

正确答案：A 您选择的答案：

第123题 输卵管妊娠胚胎死亡的可靠依据是

A. 阴道少量流血

B. 排出蜕膜管型

C. 尿妊娠试验阴性

D. 早孕反应消失

E. 腹痛减轻

正确答案：B 您选择的答案：

第124题 关于过期流产的处理，下述哪项是错误的

A. 刮宫前先作凝血功能检查，防术时因血凝障碍而大出血

B. 刮宫前必须先用雌激素以提高子宫肌肉对催产素的敏感性

C. 刮宫前作好备血，输液准备

D. 力争做到一次刮净，以防因不全而出血

E. 过期流产胎盘机化术中谨防穿孔

正确答案：D 您选择的答案：

第125题 胎盘早剥的主要病理变化是

A. 包蜕膜出血

B. 真蜕膜出血

C. 底蜕膜出血

D. 胎盘边缘出血

E. 以上都不是

正确答案：C 您选择的答案：

第126题 ABO母子血型不合孕妇血清抗A(B)IgG效价为多少可能发生胎婴儿溶血病

A. 1:32

B. 1:64

C. 1:64

D. 1:128

E. 1:128

正确答案：E 您选择的答案：

第127题 下列哪项不属稽留性流产，易致严重出血的原因

A. 妊娠子宫血运丰富特易出血

B. 胎盘机化，粘连宫壁，易致残留

C. 稽留日久，易发生凝血功能障碍

D. 雌激素不足，子宫对催产素不敏感，易宫缩不良

E. 胚胎物粘连宫壁，刮宫易于子宫穿孔

正确答案：A 您选择的答案：

第128题 急性输卵管妊娠破裂或流产手术应遵循哪项原则

A. 尽快钳夹出血处，切除或保留患侧输卵管

B. 切除子宫

C. 进行对侧输卵管整形术

D. 切除患侧附件

E. 尽量吸出腹腔血液作自家输血

正确答案：A 您选择的答案：

第129题 硫酸镁治疗妊高征，下列哪项是错误的

A. 硫酸镁可以消除脑水肿

B. 硫酸镁有扩张血管的作用

C. 镁离子可使血管内皮合成前列腺素增加

D. 镁离子抑制运动神经末梢释放乙酰胆碱，阻断神经肌肉间传导，从而使肌肉松弛  
E. 镁离子可增强中枢神经细胞兴奋性  
正确答案：E 您选择的答案：

第130题 诊断双胎妊娠最常用的方法是

- A. 听胎心
- B. 腹部触诊
- C. X线腹部摄片
- D. B超
- E. 多普勒超声检查

正确答案：A 您选择的答案：

第131题 输卵管妊娠破裂的原因是

- A. 输卵管管壁薄，缺乏蜕膜及粘膜下组织，孕卵植入受限
- B. 孕卵绒毛侵蚀，穿透管壁
- C. 孕卵死亡机化，与周围组织粘连
- D. 胎盘绒毛种植于腹腔脏器
- E. 子宫内膜蜕膜样变，无绒毛

正确答案：B 您选择的答案：

第132题 诊断重型胎盘早期剥离的依据，下列哪项是错误的

- A. 胎盘异常
- B. 胎心听不到
- C. 子宫底不断升高
- D. 少量阴道出血
- E. 凝血功能障碍

正确答案：A 您选择的答案：

第133题 胎盘早剥最严重的并发症是

- A. 子宫卒中
- B. 产后出血
- C. 失血性休克
- D. DIC
- E. 产后感染

正确答案：D 您选择的答案：

第134题 妊高征中，下列哪项不表明需要扩容治疗

- A. 红细胞压积0.39
- B. 中心静脉压降低
- C. 尿比重1.025，尿量偏少
- D. 血浆纤维蛋白原增多
- E. 低蛋白性水肿

正确答案：D 您选择的答案：

第135题 关于子痫，下述哪项不对

- A. 大多数子痫病人抽搐前有头痛，胸闷，视力障碍及呕吐等前驱症状
- B. 子痫的发生以产前期为最多见
- C. 抽搐频繁，昏迷不醒大多病情严重
- D. 终止妊娠是治疗子痫最根本方法，一旦分娩后子痫就不再发生
- E. 子痫发作时易致自伤及胎儿窘迫

正确答案：D 您选择的答案：

第136题 胎盘早剥哪项是正确的

- A. 先期待疗法后考虑终止妊娠
- B. 多无诱因，往往在半夜阴道出血
- C. 易发生产后出血，为软产道损伤所致
- D. 贫血程度与阴道出血量成正比
- E. 子宫坚硬压痛，宫底逐渐升高胎心不清

正确答案：E 您选择的答案：

第137题 某初孕妇，36岁，孕37周，因头痛，眼花及双下肢浮肿3天，突起持续性腹痛3小时入院。查体：贫血貌，血压150/100mmHg，脉搏112次/分，宫高37cm，腹围104cm，子宫体硬，压痛，胎位不清，未听到胎心音，阴道少量流血，宫口未开。诊断错误的是

- A. 宫内孕37周，死胎
- B. 重度子痫前期
- C. 高龄初产妇
- D. 胎盘早剥
- E. 高张性宫缩乏力

正确答案：E 您选择的答案：

第138题 前置胎盘的正确处理是

- A. 有阴道出血即终止妊娠
- B. 分娩方式为剖宫产
- C. 胎儿死亡后可阴道分娩
- D. 疑有前置胎盘，肛诊时宜轻柔
- E. 大出血时，可不经阴道检查，果断行剖宫产

正确答案：D 您选择的答案：

第139题 有关死胎的叙述，下列哪项不正确

- A. 胎死宫内约有一半为胎儿缺氧所致

B 胎死宫内3周以上未娩出可引发血凝障碍  
C 宫底停止升高是死胎最可靠的诊断依据  
D 雌激素能提高死胎患者子宫对催产素的敏感性  
E 颅骨重叠或脊柱成角变曲是死胎的征象  
正确答案：C 您选择的答案：

第140题 妊娠12周，阴道流血7天，体温38℃，白细胞 $12 \times 10^9/L$ ，首先处理方法是

- A 立即刮宫后再给抗生素
- B 立即给抗生素后再刮宫
- C 观察阴道出血时再刮宫
- D 立即给麦角注射
- E 保胎治疗

正确答案：B 您选择的答案：

第141题 输卵管妊娠最常发生于

- A 输卵管伞部
- B 输卵管峡部
- C 输卵管峡部与壶腹部之间
- D 输卵管壶腹部
- E 输卵管间质部

正确答案：D 您选择的答案：

第142题 引起子痫抽搐的主要病理原因是

- A 颅内脑组织散在出血点
- B 颅内小动脉痉挛，脑水肿
- C 血钙低下
- D 代谢性酸中毒
- E 高血压

正确答案：B 您选择的答案：

第143题 输卵管妊娠应立即手术治疗的是

- A 阴道持续出血
- B 休克
- C 后穹窿穿刺抽出血液
- D 妊娠试验阳性
- E 一侧附件扪及包块

正确答案：B 您选择的答案：

第144题 输卵管壶腹部妊娠其多见的结果为

- A 输卵管妊娠流产
- B 输卵管妊娠破裂
- C 胚胎可发育至3个月以上
- D 输卵管妊娠中最危险的一种
- E 胚胎死亡吸收

正确答案：A 您选择的答案：

第145题 下列哪一项不是一双胎妊娠容易发生的并发症

- A IUGR
- B 前置胎盘
- C 过期妊娠
- D 胎儿畸形
- E 产后出血

正确答案：C 您选择的答案：

第146题 羊水过多合并胎儿畸形的处理原则为

- A 终止妊娠
- B 抽取羊水
- C 保胎治疗
- D 期待疗法
- E 观察

正确答案：A 您选择的答案：

第147题 妊高征治疗中，下列哪种情况不必停止静滴硫酸镁

- A 膝反射消失
- B 呼吸12次/分
- C 心率100次/分
- D 尿量20ml/小时
- E 血清镁离子 $3.5 \text{ mmol/L}$

正确答案：C 您选择的答案：

第148题 输卵管妊娠最常见的部位是

- A 输卵管部
- B 输卵管峡部
- C 输卵管间质部
- D 输卵管间质部与峡部之间
- E 输卵管壶腹部

正确答案：E 您选择的答案：

第149题 先兆流产与难免流产的主要鉴别点是

- A 出血时间长短

- B. 下腹痛的程度
- C. 早孕反应是否存在
- D. 宫口开大与否
- E. 妊娠试验阳性与否

正确答案：D 您选择的答案：

第150题 输卵管妊娠，下列哪项是正确的

- A. 输卵管壶腹部妊娠多以破裂为主，一般在妊娠8~12周发病
- B. 输卵管峡部妊娠发病较迟，发病率最高
- C. 输卵管间质部妊娠虽少，但后果严重
- D. 阴道排出蜕膜管型，镜检时常见到滋养细胞
- E. 输卵管妊娠阴道流血量少时不会导致休克

正确答案：C 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第151题 妊高征孕妇，30岁，于妊娠37周出现腹痛伴阴道出血，最可能的诊断是

- A. 胎盘早剥
- B. 前置胎盘
- C. 妊娠合并宫颈息肉
- D. 子宫破裂
- E. DIC

正确答案：A 您选择的答案：

第152题 某25岁初孕妇，妊娠34周，外伤后突然感到剧烈腹痛，无阴道流血，急诊入院。查体：血压85/60mmHg，脉搏118次/分，面色苍白，大汗淋漓，宫底剑突下三横指，胎位不清，胎心听不到，宫体右前壁压痛。最可能的诊断是

- A. 阴道静脉破裂
- B. 子宫破裂
- C. 先兆早产
- D. 胎盘早剥
- E. 前置胎盘

正确答案：D 您选择的答案：

第153题 孕1产0，妊娠35周，因外伤后腹痛，伴少许阴道出血，胎心变快，诊断为胎盘早剥，正确处理是

- A. 进行肛查了解宫口开大情况
- B. 给止痛镇静剂以减轻症状
- C. 立即剖腹产
- D. 立即内诊，根据宫口开大情况，进一步决定分娩方式
- E. 因孕月小，有胎心，尽量等待，保守观察

正确答案：C 您选择的答案：

第154题 初孕妇，确诊为部分性前置胎盘，流血多，BP：90 / 60mmHg，宫口开大4.0cm，胎头棘下2.0cm，胎心尚好，应在输血的同时行

- A. 人工破膜
- B. 头皮钳
- C. 胎头吸引
- D. 剖腹产
- E. 臀位时，牵引胎足压迫止血

正确答案：A 您选择的答案：

第155题 初孕妇，妊娠39周，自述下腹痛及阴道流血已3小时，检查：血压150 / 100mmHg，尿蛋白(+++)，水肿(++)，子宫呈板状硬，胎位不清，胎心弱168次/分。本病例应诊断为

- A. 不协调性子宫收缩乏力
- B. 协调性子宫收缩乏力
- C. 胎盘早期剥离
- D. 前置胎盘
- E. 以上都不是

正确答案：C 您选择的答案：

第156题 28岁妇女，已自然流产2次，现停经4个半月，阴道流血2+月。为保胎一直拒绝妇科检查，此病人应首先检查

- A. 肝肾功能
- B. 心电图
- C. 血尿常规
- D. B超
- E. 激素水平

正确答案：D 您选择的答案：

第157题 妊娠37周患者，早晨醒来时发现躺在血泊中，急诊送入院，查：血压12.0 / 8.0kPa(90 / 60mmHg)，脉搏120次/分，神清，宫高37cm，臀先露，高浮，胎心音160次/分，骨盆正常，阴道少量活动性流血。选哪项处理最恰当

- A. 人工破膜
- B. 期待疗法
- C. 在输血输液同时行剖宫产
- D. 臀位牵引术
- E. 催产素滴注引产

正确答案：C 您选择的答案：



第158题 24岁，初孕妇，孕29周，在急诊室主诉夜间突然阴道流血1小时，量少于月经，伴腹部轻微胀痛。体检：血压105 / 68mmHg，胎心率140次 / 分，胎位LOA，头浮。子宫有不规则收缩，无压痛。最可能诊断是

- A．先兆早产
- B．胎盘早剥
- C．胎盘边缘血窦破裂
- D．前置胎盘
- E．子宫颈息肉出血

正确答案：A 您选择的答案：

第159题 25岁，婚后2年，漏服避孕药3天后停经50天，妊娠试验阳性，阴道流血1周，略少于月经量，时伴有腹痛，她希望有1个健康的孩子，应选择哪项措施最佳

- A 注射黄体酮保胎
- B 口服大量安宫黄体酮
- C 卧床休息，服用鲁米那
- D 行刮宫术
- E 复查妊娠试验

正确答案：D 您选择的答案：

第160题 先兆子痫患者，用硫酸镁治疗中发现病人呼吸14次 / 分，膝反射消失，尿量400ml / 24h。此时应立即首先给

- A 肌注吗啡
- B 吸氧
- C 冬眠合剂全量肌注
- D 停用硫酸镁并静注钙剂
- E 静脉注射安定

正确答案：D 您选择的答案：

第161题 妊娠38周，患者早晨醒来时发现躺在血泊中，急诊入院，查：血压90/60mmHg，脉搏118次/分，神清，宫高36cm，臀先露、高浮、胎心160次/分，骨盆正常，阴道少量活动性流血。最适当的处理是

- A．输血输液同时行剖宫产
- B．人工破膜
- C．期待疗法
- D．臀位牵引术
- E．缩宫素滴注引产

正确答案：A 您选择的答案：

第162题 女，妊娠2个月，出现难免流产，首要治疗原则是

- A．静滴催产素(缩宫素)
- B．保胎
- C．抗生素抗感染
- D．尽快清宫
- E．大量雌激素止血

正确答案：D 您选择的答案：

第163题 女，25岁。妊20周，但下腹膨隆不明显，亦无胎动感。检：宫口闭，无血染，子宫如孕2月余大小，不饱满，超声示胎心，胎动消失，对该孕妇作刮宫前最应重视下列何项检查

- A 凝血功能检查
- B 肝功能检查
- C 血常规检查
- D 肾功有检查
- E 子宫肌肉对催产素敏感试验

正确答案：A 您选择的答案：

第164题 某孕妇，24岁，孕32周时，胎儿双顶径7．0cm，35周时双顶径7．3cm，股骨长5．4cm羊水指数5，胎盘3级钙化。考虑该患为

- A．正常妊娠
- B．胎儿宫内发育受限
- C．小头畸形
- D．孕龄与停经周数不符
- E．无脑儿

正确答案：B 您选择的答案：

第165题 女，24岁。妊娠19周无胎动，下腹膨隆不明显。检查：宫颈口闭，无血染，子宫2+月妊娠大小。B超示胎心消失，入院后应最重视下列哪项化验

- A 凝血功能检查
- B 血肝功能
- C 肌酐
- D 尿蛋白
- E 血红蛋白

正确答案：A 您选择的答案：

第166题 初孕妇，27岁。妊娠39周，枕右前，无原因无痛性阴道流血已3天，流血量达400ml，胎心良好，140次 / 分，无明显宫缩，诊断为前置胎盘。本病例恰当的处理应是

- A 绝对卧床，给镇静药物观察病情变化
- B 立即行人工破膜
- C 静脉滴注催产素引产
- D 行剖腹产术
- E 以上都不是

正确答案：D 您选择的答案：

第167题 27岁，C1Po，孕32周，头位，阴道出血3天，量少，无腹痛，胎心正常，无明显宫缩，诊断为前置胎盘，恰当处理是

- A 绝对卧床，给予镇静剂，观察病情变化
- B 立即行人工破膜
- C 立即行催产素引产，宫口开大后行碎胎术
- D 立即行剖宫产术
- E 立即人工破膜及点滴催产素

正确答案：A 您选择的答案：

第168题 女，28岁。0-0-2-0，停经30天后，腹痛伴阴道出血10天，量少今起腹痛加重而就诊 $\beta$ -hGC(+)。妇检：宫颈提痛(+)，少许血染，子宫正常大小，附件区触及边界不清之块物，压痛(+)。你考虑她最可能是下列何种疾病

- A 难免流产
- B 附件炎
- C 流产继发感染
- D 输卵管妊娠
- E 卵巢囊肿继发感染

正确答案：D 您选择的答案：

第169题 妊娠36周，突然发生剧烈腹痛，面色苍白，血压降至80 / 60mmHg，脉弱，腹部检查子宫硬如板状，有压痛，胎位触不清，胎心听不清，确诊为重型胎盘早期剥离。宫口开大1cm，本病例最恰当的处理是

- A 行剖腹产
- B 静脉滴注催产素
- C 人工破膜后静脉滴注催产素
- D 人工破膜后头皮钳牵引
- E 以上都不是

正确答案：A 您选择的答案：

第170题 重度妊高征，红细胞比积0.41，心率80次 / 分，血红蛋白110g / L，白蛋白28g / L，血钾，钠，氯正常，选用下列何种扩容剂较好

- A 低分子右旋糖酐
- B 白蛋白
- C 全血
- D 平衡液
- E 5%葡萄糖液

正确答案：B 您选择的答案：

第171题 妊娠34周，少量阴道流血不伴腹痛2天入院，入院时宫底脐上3横指，头位，胎心150次/分，骨盆正常，阴道无活动性出血，无宫缩，宫口未开，一般情况良好。恰当处理是

- A. 人工破膜
- B. 立即剖宫产
- C. 期待疗法
- D. 臀位牵引术
- E. 缩宫素滴注引产

正确答案：C 您选择的答案：

第172题 初孕妇，妊娠36周，无痛性阴道少量出血，无贫血外观，血压120 / 80mmHg，臀位，先露浮，胎心：132次 / 分，双顶径8.4cm，超声B型显像确认为前置胎盘，其处理是

- A 立即剖腹产
- B 输血
- C 人工剥膜引产
- D 人工破膜静脉滴注催产素
- E 期待疗法

正确答案：E 您选择的答案：

第173题 初孕妇，孕38周，头痛，呕吐伴自觉胎动减少一天来院。血压24 / 14.4kPa(180 / 110mmHg)，尿蛋白(+)，尿E3：20.82 $\mu$ mol / 24h(<10mg / 24h)，胎心130次 / 分，子宫颈管未消失，OCT呈频繁晚期减速(迟发性减速)，红细胞比积0.41，最适合的处理是

- A 静滴硫酸镁与肼苯达嗪控制病情
- B 硫酸镁+降压+扩容疗法控制病情
- C 积极治疗，48小时未能控制病情则行剖宫产
- D 破膜+静滴催产素引产
- E 积极药物治疗同时立即剖宫产

正确答案：E 您选择的答案：

第174题 29岁，停经10周，下腹部阵发性剧痛，阴道流血超过月经量，子宫颈口1指松，宫体鸭卵大，处置是

- A 黄体酮保胎
- B 卧床休息，口服鲁米那
- C 刮宫术
- D 肌注催产素
- E 等待自然流产

正确答案：C 您选择的答案：

第175题 女，23岁，停经3个月，1个月前有轻微下腹坠痛及少量阴道流血，现又有阴道流血1周，量少，无腹痛，尿妊娠试验(一)，阴道检查子宫似成人拳大小，宫内回声不均匀，如何处理最适宜

- A. 继续观察2周
- B. 刮宫送病理检查
- C. 药物引产
- D. 按先兆流产处理
- E. 先给予雌激素然后行刮宫术

正确答案：E 您选择的答案：

第176题 经产妇，妊娠37周，无原因出现无痛性阴道出血，经卧床休息，给予镇静剂未见明显好转，阴道仍有活动性出血，初步诊断为前置胎盘，为了决定分娩方式，拟确定前置胎盘类型，应进行

- A 输液配血行肛门检查
- B 输液配血行阴道检查
- C 超声胎盘定位检查
- D X线软组织检查
- E 放射线核素扫描法

正确答案：C 您选择的答案：

第177题 26岁，C3P2，停经8周诊断早孕，要求人流，查：子宫50天妊娠大小，右输卵管增粗，明显压痛，WBC  $11.6 \times 10^9/L$ ，N 0.80，下列处理哪项最恰当

- A 立即行吸宫术
- B 抗炎治疗后吸宫流产
- C 抗炎治疗后刮宫流产
- D 不予人流
- E 中药堕胎

正确答案：B 您选择的答案：

第178题 24岁，C2P1，孕30周，阴道流血3天，增多2小时，急诊入院，查血压12.0 / 8.0kPa(90 / 60mmHg)，脉搏：112次 / 分，宫底剑突下三横指，臀先露，LSA，胎心：136次 / 分，有规则宫缩。为进一步确诊，首无下列哪项检查

- A 肛查
- B 阴道检查
- C B型超声检查
- D 颈管内指诊
- E 腹部平片

正确答案：C 您选择的答案：

第179题 风心病，心功Ⅲ级妇女患右侧输卵管妊娠破裂，手术应行

- A 右附件切除
- B 右附件切除，左侧输卵管结扎
- C 右侧卵巢切除
- D 子宫次全切除加右附件切除
- E 右输卵管切除，左输卵管结扎

正确答案：E 您选择的答案：

第180题 27岁初产妇，妊娠23周，近1周来腹部迅速增大，腹胀痛，心悸气促，不能平卧。查体：宫高37cm，腹围105cm，胎心遥远，胎位不清。为明确诊断，首选的辅助检查是

- A B超
- B 腹部X线片
- C 彩色多普勒
- D 羊膜镜检查
- E 腹腔镜检查

正确答案：A 您选择的答案：

第181题 25岁，初孕妇，停经6周，突然出现右下腹痛，伴阴道少量流血，尿妊娠试验阳性，血压50 / 30mmHg，最可能的诊断是

- A 难免流产
- B 先兆流产
- C 妊娠合并急性阑尾炎
- D 输卵管妊娠
- E 卵巢囊肿蒂扭转

正确答案：D 您选择的答案：

第182题 初产妇，宫口开全1.5小时，胎头已达盆底，持续性横左枕位。处理应是

- A 缩宫素静脉滴注
- B 等其自然回转
- C 人工协助顺时针转90°
- D 人工协助逆时针转90°
- E 行会阴后-斜切开术

正确答案：D 您选择的答案：

第183题 32岁，女性，妊娠31周，少量阴道流血，以往曾有3次早产史。主要处理应是

- A 抑制宫缩，促进胎儿肺成熟
- B 左侧卧位
- C 注意休息，并给以镇静剂
- D 任其自然
- E 氧气吸入，给予止血剂

正确答案：A 您选择的答案：

第184题 孕34周，血压160 / 110mmHg，尿蛋白5s / 24h，上腹痛，头晕眼花，应诊断为

- A 妊娠高血压病
- B 先兆子痫
- C 中度妊高征
- D 妊娠合并肝炎
- E 妊娠合并慢性肾炎

正确答案：B 您选择的答案：

第185题 孕8周初孕妇，数日前开始下腹正中隐痛，伴阴道少量出血，至今仍断续出血。妇科检查：宫颈光滑，宫口未开，无提痛，子宫前倾前屈，8周妊娠大小，软，附件(-)，目前最有价值的检查是

- A 尿雌三醇测定
- B 血HPL测定
- C 尿hCG定量(最高)
- D B型超声检查
- E 测甲胎蛋白(AFP)值

正确答案：D 您选择的答案：

第186题 40岁经产妇，妊娠39周，近1周来自觉胎动后腹痛难忍，来院就诊。查体：B超示羊水指数8cm，胎儿先天性肾缺如，下一步应如何处理

- A ．保胎治疗
- B ．剖宫产
- C ．采取引产措施经阴道分娩
- D ．羊膜腔输液
- E ．观察

正确答案：C 您选择的答案：

第187题 30岁，停经16周，1个多月来间有少量阴道出血，检查腹部无明显压痛反跳痛，子宫颈口未开，子宫增大如孕8周。最可能诊断为

- A 先兆流产
- B 难免流产
- C 不全流产
- D 完全流产
- E 稽留流产

正确答案：E 您选择的答案：

第188题 女，30岁。孕8周。近感小腹痛和阴道流血越来越严重，至今出血已10天，为决定妊娠是否再继续，下列何项是首先的辅助诊断

- A 基础体温测定
- B 尿或血 $\beta$ -hCG测定
- C B超检查
- D 甲胎蛋白测定
- E 血PRL测定

正确答案：C 您选择的答案：

第189题 孕35周初孕妇，先兆子痫，患者突发腹痛，4小时后胎心消失，宫底明显升高，子宫强硬，有压痛，宫缩间歇子宫不完全放松，重度贫血貌，阴道少量流血，宫口开1指，头先露，下列何项处理最佳

- A 人工破膜后药物引产
- B 滴注催产素
- C 注射哌替啶调整宫缩
- D 急症剖宫产术
- E 宫口开全后行穿颅术

正确答案：D 您选择的答案：

第190题 24岁，10天前因停经41天，妊娠试验阳性，行吸宫流产术，今晨突然晕倒在地，体温37.5，血压10.0/7.0kPa(75/52mmHg)，脉搏100次/分，下腹压痛及反跳痛明显，外阴少量流血，宫颈举痛明显，宫口闭，子宫稍大，稍软，右侧似有一包块边缘不清，压痛，查WBC  $10 \times 10^9/L$ ，N 0.70。最准确的诊断是

- A 流产后右附件炎
- B 人工流产不全
- C 右输卵管妊娠破裂
- D 宫颈粘连
- E 急性阑尾炎

正确答案：C 您选择的答案：

第191题 初孕妇，25岁，停经50天，阵发性腹痛伴阴道流血3天，妇查：宫口开大1cm，有羊膜囊堵塞子宫口，子宫孕50天大小。最可能的诊断是

- A 过期流产
- B 先兆流产
- C 不可避免流产
- D 完全流产
- E 习惯性流产

正确答案：C 您选择的答案：

第192题 21岁，停经2个月，二天前在外自行坠胎，体温38.8，脉搏130次/分，血压正常，白细胞 $10 \times 10^9/L$ ，中性90，子宫如孕2个月大小，软，有压痛，经抗炎治疗，感染未能控制，突然大量阴道出血，下列哪项处理为宜

- A 催产素肌肉注射
- B 卵圆钳轻取胚胎，术后应用抗生素
- C 抗生素及催产素
- D 即刻刮宫除去病灶
- E 抗生素及止血药物

正确答案：B 您选择的答案：

第193题 初孕妇，妊娠36周，血压190/110mmHg，尿蛋白(++)，下腹及颜面浮肿，今晨起头痛剧烈，伴眼花，呕吐，胎位胎心正常，无宫缩，本例最恰当的紧急处理是

- A 立即剖腹产
- B 催产素静滴引产
- C 胎头吸引术
- D 人工破膜

E 解痉，镇静，利尿，降低颅内压  
正确答案：E 您选择的答案：

第194题 23岁，孕50天，在外院作人工流产。术后8天，小腹疼痛，阴道流血未止，量中等，有臭味，体温38℃，血象白细胞 $1.5 \times 10^9$  / L，中性0.9，Hb100g / L。如检：阴道内血性分泌物有臭味，宫体略大，触痛明显，附件略增厚而压痛，下列何项为该妇女的最可能诊断

- A 难免流产
- B 不全流产
- C 流产继发感染
- D 宫外孕继发感染
- E 急性盆腔炎

正确答案：C 您选择的答案：

第195题 某25岁初产妇，孕39周，羊水过多，规律宫缩10小时，破膜后突然剧烈腹痛，阴道少量流血，查体：血压95/56mmHg，脉搏120次/分，宫底剑突下一横指，有压痛。胎心胎位不清，宫口开大2cm，S+1。最恰当的处理是

- A 静点缩宫素
- B 立即剖宫产
- C 头皮钳牵引
- D 抗凝止血
- E 肌注哌替啶

正确答案：B 您选择的答案：

第196题 女，27岁，妊娠8周时出现阵发性下腹痛及多量阴道流血伴小块组织物排出，并引起失血性休克，应首先考虑

- A 先兆流产
- B 难免流产
- C 不全流产
- D 完全流产
- E 过期流产

正确答案：C 您选择的答案：

第197题 30岁，孕37+2周，已确诊为前置胎盘，出血多，血压9.33/6.67kPa，宫口开大4cm，头棘上2cm，胎心尚好，应选

- A 头皮钳术
- B 人工破膜术
- C 胎头吸引术
- D 剖宫产术
- E 产钳术

正确答案：D 您选择的答案：

第198题 初孕妇，孕37周，为羊水过多患者，规律宫缩10小时，破膜后突然剧烈腹痛，少量阴道流血，查：血压12.0/8.0kPa(90/60mmHg)，脉搏110次/分，宫底剑突下一横指，有压痛，胎心胎位不清，宫口开2cm，先露S+1。该例病人最恰当的处理是

- A 头皮钳牵引
- B 静脉滴注催产素
- C B超
- D 给抗凝药物
- E 肌注杜冷丁

正确答案：C 您选择的答案：

第199题 21岁，已婚妇女。停经80天，阴道少量流血3天，大量流血半天。入院查：面色苍白，血压80/50mmHg，脉搏120次/分，阴道内有鸭蛋白血块，宫口有组织物堵塞，子宫约50天孕大，两侧附件阴性，应诊断

- A 完全流产
- B 不全流产
- C 稽留流产
- D 难免流产
- E 先兆流产

正确答案：B 您选择的答案：

第200题 第一胎，停经37周，直至一周前血压均正常。近一周下肢浮肿，有头昏，视力模糊症状。血压21/13.3kPa(154/100mmHg)，尿蛋白(+)，尿E3：36.44μmol / 24h(10.5mg / 24h)，听胎心音正常，下列处理哪项最合适

- A 积极治疗，38周时终止妊娠
- B 积极治疗，等待自然分娩
- C 积极治疗24~48小时，终止妊娠
- D 立即人工破膜加静脉滴注催产素引产
- E 立即剖宫产

正确答案：C 您选择的答案：

第201题 30岁，孕1产0，孕34周，无原因少量阴道流血半天，不伴腹痛，宫颈着色著，处理为

- A 肛查宫口情况
- B 人工破膜
- C 静点催产素
- D 绝对卧床休息，严密观察
- E 剖腹手术

正确答案：D 您选择的答案：

第202题 女，28岁。停经38天，阴道出血8天，伴下腹隐痛，检查：宫颈无提痛，宫体略大，质中，附件无明显肿块及压痛，hCG(+)，要求人流。人流吸出物见到下列哪一项可排除宫外孕

- A 蜕膜组织

B 绒毛  
C A-S反应  
D 增生期子宫内膜  
E 分泌期子宫内膜伴蜕膜反应  
正确答案：B 您选择的答案：

第203题 女，30岁。停经46天后，下腹部隐痛半月余，然后阴道持续少量出血3天多，右侧附件触及鸡蛋大韧性包块，考虑为  
A 子宫肌瘤  
B 卵巢囊肿  
C 子宫内膜异位症  
D 陈旧性宫外孕  
E 妊娠黄体  
正确答案：D 您选择的答案：

第204题 妊高征患者，正常分娩胎盘自然娩出时失血不多，产后突然发生面色苍白，血压下降，脉搏细弱，其发病原因不考虑下列哪一项  
A 患者对失血的耐受性降低  
B 孕产期长期限盐，引起低钠血症  
C 产后腹压突降，内脏血管扩张，回心血量减少  
D 并发子宫破裂，内出血  
E 产前有血容量偏低，未很纠正  
正确答案：D 您选择的答案：

第205题 第一胎，孕35周，重度妊高症经治疗24~48小时，无改善。需终止妊娠时，下述哪项检查是不必要的  
A HPL测定  
B E3测定  
C NST或OCT检查  
D 宫颈粘液检查  
E L/S比值测定  
正确答案：D 您选择的答案：

第206题 女，30岁，孕2产1，1年前因中央型前置胎盘行子宫体部剖宫产，现妊娠7个月，6小时前突感剧烈腹痛，头晕，大汗淋漓，胎动停止，胎心音消失，胎体漂浮感，左下腹可扪及妊娠4个月子宫大小硬块，移动性浊音(+)，最可能的诊断是  
A 先兆子宫破裂  
B 腹腔妊娠  
C 子宫破裂  
D 胎盘早剥  
E 子宫不完全破裂  
正确答案：C 您选择的答案：

第207题 30岁妇女，第一胎，妊娠34周，原发性高血压合并妊高征，3小时前突然腹痛，阴道出血，以鲜红，如月经量。体检：血压70/40mmHg，宫底在脐上2指，子宫硬，肌壁松弛不完全，胎位不清，胎心音消失。颈管未消，宫颈口未开，最恰当的处理是  
A 立即扩张宫口，破膜，催产素静脉滴注引产  
B 立即人工破膜，等待自然分娩  
C 以抗休克为主，因死胎，不急于引产  
D 抗休克，尽快剖腹产  
E 立即作B型超声检查  
正确答案：D 您选择的答案：

第208题 第一胎，停经38周，一月前血压正常，近一周出现下肢水肿，伴头昏，眼花视力模糊，血压160/100mmHg，尿蛋白(+)，尿雌三醇10mg/24h，胎心好，产科处理应是  
A 立即剖腹取胎  
B 积极治疗一周，考虑终止妊娠  
C 积极治疗24~48小时，考虑终止妊娠  
D 积极治疗等待自然分娩  
E 立即破膜及静滴催产素引产  
正确答案：C 您选择的答案：

第209题 25岁，停经10周，阴道少量流血1周，大量流血3天，伴下腹胀痛，昨日起有畏寒发热，查血压80/60mmHg，脉搏120次/分，面色苍白，神清，外阴有活动性流血，子宫如50天孕大，软，宫口松，可容1指，宫口外仍有组织堵塞，子宫压痛明显，双侧穹隆未触及肿块，但有压痛。血红蛋白80g/L，白细胞 $18 \times 10^9/L$ ，中性85%，除立即抗休克抗炎治疗外，应作何恰当处理  
A 立即钳夹出残留之胚胎组织  
B 3天后再行刮宫术  
C 立即行刮宫术  
D 立即静滴催产素  
E 静点止血药  
正确答案：A 您选择的答案：

第210题 孕38周，先兆子痫，血压 $150/130$ mmHg(150/130mmHg)，下肢水肿(++)，尿蛋白(++)，尿比重1.024，血红蛋白120g/L，红细胞比容0.40，宫底剑突下2横指，左枕前位，胎心音140次/分，先露已入盆，胎心及骨盆正常，宫口松，颈管消失，OCT(-)，此时选择下列何种处理最恰当  
A 立即剖宫产  
B 硫酸镁解痉加扩容治疗至近预产期终止妊娠  
C 大量利尿药加降压药  
D 硫酸镁加扩容同时催产素静滴引产  
E 大量降压药

正确答案：D 您选择的答案：

第211题 28岁，女性，风湿性心脏病、二尖瓣狭窄病史5年。平时不用药，登三楼无明显不适。孕5月起活动时常有轻度心慌、气促。现孕38周，因心悸，咳嗽，夜间不能平卧，心功能Ⅱ级而急诊入院。在制定治疗计划时，最佳的方案是

- A. 积极控制心衰后终止妊娠
- B. 积极控制心衰，同时行剖宫产术
- C. 积极控制心衰，同时行引产术
- D. 适量应用抗生素后继续妊娠
- E. 纠正心功能，等待自然临产

正确答案：B 您选择的答案：

第212题 某孕妇，36岁，妊娠36周，自觉胎动消失1天而来院就诊。B超检查发现胎心胎动消失，确诊为死胎。正确的处理方法是

- A. 立即剖宫产
- B. 为防止产后大流血，应行凝血功能检查
- C. 等待自然发动宫缩
- D. 立即引产
- E. 以上都不对

正确答案：B 您选择的答案：

第213题 初孕妇，妊娠38周，妊高征头痛眼花一周，尿蛋白(+++)，尿雌三醇5.9mg/24h，监护结果：胎心晚期减速，此时恰当处理是

- A. 改善胎盘功能，维持妊娠
- B. 治疗妊高征待症状好转后剖腹产
- C. 治疗妊高征的同时立即剖腹产
- D. 催产素引产
- E. 治疗妊高征待病情好转后引产

正确答案：C 您选择的答案：

第214题 初孕妇孕36周，早孕时血压12/8kPa(90/60mmHg)，近一周来头痛，眼花伴视物不清1天，突然全身抽搐1次，急诊入院。查神志尚清，血压17.3/12.0kPa(130/90mmHg)，LOA，胎心148次/分，下述处理哪项正确

- A. 静滴硫酸镁同时剖宫产
- B. 引产
- C. 积极治疗，24小时内行剖宫产
- D. 积极控制抽搐，病情控制后6~12小时内终止妊娠
- E. 控制抽搐，稳定病情，至孕37周终止妊娠

正确答案：D 您选择的答案：

第215题 35岁，G3P0，妊娠37周，夜间醒后发现阴道流血多量，无腹痛，妊娠20周后反复出血4次，曾予保胎治疗，子宫软，压痛(-)，无宫缩，胎位LSA，臀部位耻骨联合上方高浮，胎心音140次/分，耻骨联合上闻及胎盘杂音，最可能的诊断是

- A. 中央性前置胎盘
- B. 部分性前置胎盘
- C. 边缘性前置胎盘
- D. 低置前置胎盘
- E. 轻度胎盘早剥

正确答案：A 您选择的答案：

第216题 28岁，初孕妇。孕32周，因全身浮肿及头痛来诊，妊娠前即有面部及下肢浮肿，查血压21.3/14.7kPa(160/110mmHg)，尿液检查常规蛋白(+++)，可见颗粒管型及红细胞，经治疗孕37周自然分娩，产后6周，血压降至17/10kPa(128/75mmHg)，尿蛋白(++)，水肿(+)。下列诊断以哪种可能性大

- A. 先兆子痫
- B. 妊娠合并肾炎
- C. 慢性肾炎基础上并发先兆子痫
- D. 妊娠合并慢性高血压
- E. 原发性高血压基础上并发先兆子痫

正确答案：C 您选择的答案：

第217题 25岁，初孕妇，孕36周，B超声诊断为前置胎盘，阴道流血多，血压80/60-mmHg，宫口开大4.0cm，先露头棘上2.0cm，胎心尚好，最恰当处理是

- A. 人工破膜
- B. 剖腹产
- C. 头皮钳
- D. 产钳
- E. 胎头吸引

正确答案：B 您选择的答案：

第218题 女，25岁。停经48天，一个月前曾不正规服用过探亲避孕药。现阴道少量出血5天，伴腹痛，B超示宫内早孕，下列哪项为最佳处理方案

- A. 注射黄体酮
- B. 注射绒毛膜促性腺激素
- C. 吸宫术终止妊娠
- D. 中药安胎
- E. 注射催产素

正确答案：C 您选择的答案：

第219题 女，30岁，妊娠34周，产前检查血压180/110mmHg，拒绝住院治疗，3小时前突然腹痛伴阴道流血，血压75/30mmHg，脉搏120次/分，宫底剑突下2指，板状腹，胎位不清，胎心音消失，宫颈未消失，最正确处理应是

- A. 立即剖宫产终止妊娠

- B. 抢救休克，静滴催产素(缩宫素)引产
  - C. 人工破膜，静滴催产素(缩宫素)引产
  - D. 抢救休克，因胎死宫内不急于引产
  - E. 抢救休克，尽快剖宫产，终止妊娠
- 正确答案：E 您选择的答案：

第220题 初孕妇，25岁，38周妊娠，双胎，LOA / RSA，头先露，平坐骨棘，宫缩规律，胎膜已破，宫口开大2cm。以下哪项处理是错误的

- A. 经阴分娩
  - B. 临产后静脉输液、备血
  - C. 胎儿娩出后子宫底加沙袋
  - D. 第1胎儿娩出后即静脉注射缩宫素
  - E. 第2胎儿前肩娩出后静脉注射缩宫素
- 正确答案：D 您选择的答案：

第221题 闭经5周，子宫稍大，软，附件可触及包块，妊娠试验阳性，宫腔吸出物约5g，下沉于水中，当晚突然下腹撕裂样痛，肛门坠胀感，血压下降，诊断是

- A. 子宫内膜炎
  - B. 子宫穿孔
  - C. 血液流入腹腔
  - D. 子宫颈管裂伤
  - E. 输卵管妊娠破裂
- 正确答案：E 您选择的答案：

第222题 23岁，停经10周前来就诊，诊断为"不可避免流产"，下列病史及体检哪项与诊断不符

- A. 宫口闭，阴道出血少于经量
  - B. 宫颈口可见羊膜囊
  - C. 阴道多量出血伴腹痛
  - D. 多由先兆流产发展而来
  - E. 宫口扩张，宫体如孕9周大小
- 正确答案：A 您选择的答案：

三、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第223-224题

停经11周，阴道少量流血10天，三天前阴道流血增多，下腹阵痛，伴有胎盘组织排出，昨起发热，今体温38.5℃，血压10/8kPa，心率122次/分，神萎。阴道检查：外阴有多量流血，宫口开，容一指，子宫口处可触及胎盘组织，子宫6+周大小，有压痛(++)，附件稍增厚，压痛(+)，腹软，无肌紧张及反跳痛，血红蛋白70g/L，白细胞 $16 \times 10^9/L$ ，中性0.90

1. 临床诊断是

- A. 难免流产
- B. 不完全流产
- C. 完全性流产
- D. 不完全性流产伴感染
- E. 完全性流产伴感染

2. 治疗上在抗感染抗休克的同时最恰当处理为

- A. 立即刮宫
- B. 三天刮宫
- C. 立即钳出残留胎盘组织
- D. 催产素静脉滴注
- E. 刮宫加催产素注射

正确答案：DC 您选择的答案：

第225-227题

患者33岁，停经35天，以突发左下腹撕裂样痛1小时就诊，现腹痛渐加重，发冷，Bp80/40mmHg，P120次/分，全腹压痛、反跳痛阳性，移动浊音阳性。妇科检查：宫颈举痛，子宫稍大、软，漂浮感，双附件区压痛，左侧明显，未触及包块。

1. 最简便又最能帮助迅速确立诊断的检查方法是

- A. B型超声
- B. 妊娠试验
- C. 腹腔镜检查
- D. 诊断性刮宫
- E. 后穹窿穿刺

2. 此患者最可能的诊断是

- A. 流产合并感染
- B. 急性输卵管炎
- C. 输卵管妊娠破裂
- D. 急性阑尾炎
- E. 完全流产

3. 对于该患者，最恰当的处理方法是

- A. 纠正休克后手术
- B. 立即进行开腹探查
- C. 纠正休克同时手术
- D. 输血
- E. 中药活血化瘀治疗

正确答案：ECC 您选择的答案：

第228-229题



某孕妇，32岁，以停经8个月为主诉来诊，产检时发现子宫脐上3横指，未闻及胎心。追问病史近一个月胎动消失。

1. 可能诊断为

- A. 胎儿窘迫
- B. 胎儿发育受限
- C. 死胎
- D. 过期流产
- E. 以上均不对

2. 下列处理中错误的有

- A. B超检查确定诊断
- B. 立即引产
- C. 凝血功能检查
- D. 阴道检查判定宫颈成熟度
- E. 产后仔细检查胎盘、脐带及胎儿

正确答案：CB 您选择的答案：

第230-231题

女，36岁，停经106天，尿妊娠试验阳性。妇科检查见阴道有不完全横膈，子宫左前方有15孕周大的圆形肿块，与子宫相连但可分离，B超宫腔内无胚胎，而宫旁肿块内有胚胎图像，手术所见妊娠肿块居于圆韧带附着处的外侧

1. 最可能诊断是

- A. 输卵管间质妊娠
- B. 卵巢妊娠
- C. 子宫残角妊娠
- D. 腹腔妊娠
- E. 宫颈妊娠

2. 最合适的处理是

- A. 全子宫切除术
- B. 切除残角子宫
- C. 全子宫切除+双附件切除
- D. 残角子宫切除+圆韧带复位
- E. 催产素静滴

正确答案：CB 您选择的答案：

第232-233题

初产妇，30岁，妊娠32+6周，阴道少量流血两次，今日突然阴道流血多于月经量，查血压110/75mmHg，脉搏96次/分，宫高31cm，腹围86cm，臀先露、未入盆，胎心144次/分

1. 诊断最可能是

- A. 胎盘早期剥离
- B. 妊娠合并宫颈癌
- C. 阴道静脉曲张破裂
- D. 前置胎盘
- E. 妊娠合并宫颈息肉

2. 下述治疗原则中错误的是

- A. 住院观察
- B. 绝对卧床休息
- C. 配血备用
- D. B超检查
- E. 立即剖宫产终止妊娠

正确答案：DE 您选择的答案：

第234-236题

女，28岁，诉妊娠4+月，昨搬重物后，腰酸，下坠感，今上午下腹始有阵痛，持续加重，半小时前阴道有流液，量较多，湿透内裤，急诊来院

1. 最可能的诊断是

- A. 先兆流产
- B. 难免流产
- C. 不全流产
- D. 完全流产
- E. 习惯性流产

2. 最有助于该诊断的检查是

- A. 测宫缩
- B. 听胎心
- C. 测阴道液体PH
- D. 尿hOG定性
- E. 血常规

3. 如确诊胎膜已破，此患者最适当处理是

- A. 安胎
- B. 刮宫
- C. 用宫缩药物尽早使胚胎，胎盘组织排出
- D. 抗炎
- E. 输血

正确答案：BCC 您选择的答案：

第237-238题

女，34岁，有连续3次晚期自然流产史，现妊娠4个月，阴道少量出血，下坠感。检查：宫颈口开约2cm，宫体前倾4个月妊娠大小，无宫缩，附件（-）。

1. 孕妇最可能的诊断是

- A. 不全流产
- B. 习惯性流产
- C. 完全流产
- D. 早期流产

- E. 过期流产  
2. 下列处理哪项最为重要  
A. 镇静剂  
B. 禁止性生活  
C. 黄体酮注射  
D. 维生素E  
E. 宫颈内口环扎

正确答案：BE 您选择的答案：

第239-241题

孕2月孕妇，平时体健，昨晚始下腹痛伴出血，量多，今日出血仍多并感头晕，眼花，来医院途中昏倒，急救入院，检查：外阴有大量血迹，阴道内积血块，宫颈口开，内可触及软性胚胎组织，宫体2月妊娠大小，面色苍白，血压9.3/7.3kPa(70/50mmHg)，脉搏120次/分

1. 估计出血量  
A 100ml  
B 200ml  
C 300ml  
D 400ml  
E > 500ml  
2. 最可能诊断  
A 难免流产伴休克  
B 不全流产伴休克  
C 前置胎盘伴休克  
D 输卵管妊娠伴休克  
E 胎盘早剥伴休克  
3. 此时最合适处理是纠正休克的同时给  
A 清宫  
B 催产素静脉滴注  
C 维生素K  
D 前列腺素  
E 升压药

正确答案：EAA 您选择的答案：

第242-243题

女，28岁，停经47天，阴道少量出血4天，尿HCG阳性，右下腹痛半小时伴里急后重感。体检：面色苍白，肢冷而湿，体温36.8℃，血压80/60mmHg，心率110次/分，右下腹压痛。妇科检查，宫口闭，宫颈举痛，子宫前位，正常大小，飘浮感，右附件触痛明显，后穹窿饱满。

1. 最可能的诊断为  
A. 阑尾炎  
B. 急性肠炎  
C. 右输卵管妊娠  
D. 卵巢囊肿扭转  
E. 子宫内膜异位  
2. 处理方法下列哪项是正确的  
A. 抗休克同时立即手术  
B. 先用抗生素  
C. 清宫术  
D. 药物止血  
E. 保胎

正确答案：CA 您选择的答案：

第244-246题

某女，28岁，停经9个月，单胎，B超检查发现胎头双顶径8.5cm，股骨长6.4cm，羊水深度4cm，胎盘2级钙化。阴道检查Bi shop宫颈成熟度评分3分。

1. 下列检查中，哪些对胎儿发育受限没有意义  
A. 胎儿胎心电子监护  
B. 尿E3和E/C比值  
C. TORCH感染检测  
D. 跨耻征  
E. 胎儿生物物理评分  
2. 如孕妇自觉胎动明显减少，胎心监护反复无反应型，应如何处理  
A. 促宫颈成熟后引产  
B. 促胎肺成熟后引产  
C. 立即剖宫产  
D. 促胎肺成熟后剖宫产  
E. 继续妊娠，并动态观察胎儿生长情况  
3. 若追问病史发现孕妇月经周期为2~3个月，而且目前胎儿宫内状态良好，应如何处理  
A. 立即剖宫产  
B. 立即引产  
C. 纠正预产期后继续妊娠，并动态观察胎儿生长情况  
D. 给予肝素等疏通微循环  
E. 以上均不对

正确答案：CDC 您选择的答案：

第247-249题

女，28岁，于妊娠早期有早孕反应，尿hCG阳性。于妊娠17周时感有胎动。B超示单胎，头位，见心脏搏动。现为妊娠26周，近二周来自觉胎动停止，腹部不再增大，来门诊检查。宫底平脐，未闻及胎心，复B超未见胎心搏动和胎动

1. 临床诊断是  
A 过期流产  
B 习惯性流产

- C 死胎
  - D 死产
  - E 葡萄胎
  - 2. 最需要的实验室检查是
  - A 白细胞计数分类
  - B 血糖
  - C 凝血功能检查
  - D 肝功能
  - E 肾功能
  - 3. 实验室检查正常, 此时首选的治疗方法应是
  - A 钳刮
  - B 雌激素+刮宫
  - C 雌激素+刮宫+抗感染
  - D 中期妊娠引产
  - E 肌注催产素
- 正确答案: CCD 您选择的答案:

#### 第250-252题

女, 28岁, 因停经52天, 阴道出血1周, 诊断先兆流产, 入院安胎。次日腹痛伴阴道流血增多, 蹲厕时见有组织物排出, 阴道出血仍不止, 腹痛减轻

- 1. 最可能的诊断是
  - A 难免流产
  - B 不完全流产
  - C 完全流产
  - D 稽留流产
  - E 习惯性流产
  - 2. 最有助于诊断的检查是
  - A B型超声检查附件有无肿块
  - B 阴道检查子宫大小和宫口开张情况
  - C 血 $\beta$ -hCG定量测定
  - D 后穹隆穿刺有不凝血液
  - E 阴道检查宫颈提痛
  - 3. 此时最恰当的处理是
  - A 清宫
  - B B超检查宫腔有无残留胚胎, 然后决定处理方针
  - C 催产素静脉滴注
  - D 抗炎+观察
  - E 宫腔镜检查
- 正确答案: BBA 您选择的答案:

#### 第253-254题

女, 32岁, 停经56天, 3天前开始有少量断续阴道出血, 昨日始右下腹轻痛, 今晨加强, 呕吐二次。妇检: 子宫口闭, 宫颈举痛(+), 子宫前倾前屈, 较正常稍大, 软, 子宫右侧可触及拇指大小较软之块物, 尿hCG(±), 后穹隆穿刺吸出10ml不凝血液。血象: 白细胞 $10 \times 10^9/L$ , 中性0.8, 血红蛋白75g/L, 体温37.5, 血压10/6kPa(75/45mmHg)

- 1. 最可能的诊断是
- A 不完全流产
- B 右卵巢黄体破裂
- C 右输卵管妊娠
- D 急性附件炎
- E 卵巢囊肿蒂扭转
- 2. 处理方法下列哪项是正确的
- A 抗休克同时立即手术
- B 白细胞较高先用抗生素
- C 次日复验hCG定量
- D 为排除流产可能先刮宫
- E 药物止血

正确答案: CA 您选择的答案:

#### 第255-257题

29岁孕妇, 妊娠32周, 3周内阴道少量流血二次, 今凌晨突然阴道流血多于月经量, 无腹痛, 血压13.3/10.7kPa, 脉率96次/分, 宫高30cm, 腹围85cm, 臀先露, 未入盆, 胎心音清楚, 144次/分

- 1. 应最先考虑的疾病是
- A 早产
- B 前置胎盘
- C 胎盘早期剥离
- D 宫颈息肉
- E 妊娠合并宫颈癌
- 2. 以下辅助检查中应首选哪一项对确定诊断意义最大
- A 血常规
- B 血小板测定
- C B超
- D X线摄片
- E 阴道检查
- 3. 下述何项处理是错误的
- A 住院观察
- B 绝对卧床休息
- C 配血备用
- D 口服镇静药片

E 肛指检查

正确答案：BCE 您选择的答案：

第258-260题

初产妇，孕37周，清晨骤醒发现躺在血中，急诊入院，查血压12 / 8kPa(90 / 60mmHg)，脉搏120次 / 分，神清，胎心音160次 / 分，阴道少量活动性流血

1. 其胎方位下述哪种可能性最少

- A LOT, 胎头高浮
- B BOA, 先露已衔接
- C 臀位
- D 横位
- E BOP, 先露未入盆

2. 此时所需的检查不应包括哪一项

- A 血红蛋白+出凝血时间
- B 配血
- C OCT(催产素激惹试验)
- D B超
- E 普鲁卡因皮试

3. 你认为最恰当的处理是

- A 止血，输液，等待足月终止妊娠
- B 争取破膜后头皮钳牵引压迫止血
- C 输血补液，待血压心率稳定，胎心正常后行剖宫产术
- D 立即备血，急症剖宫产术
- E 备血或输血情况下根据胎方位及胎产式决定分娩方式

正确答案：BCD 您选择的答案：

第261-263题

女，26岁，妊娠早期有早孕反应，尿HCG阳性，于妊娠17周时感胎动。B超示单胎，头位，见心脏搏动。现为妊娠26周，近2周来自觉胎动停止，腹部不再增大，来门诊就诊。宫底平脐，未闻及胎心，B超复查未见胎心搏动和胎动。

1. 临床诊断是

- A. 过期流产
- B. 习惯性流产
- C. 完全流产
- D. 死产
- E. 葡萄胎

2. 最需要的实验室检查是

- A. 白细胞计数分类
- B. 血糖
- C. 凝血功能检查
- D. 肝功能
- E. 肾功能

3. 实验室检查正常，首选的治疗方法

- A. 钳刮
- B. 雌激素+刮宫
- C. 雌激素+刮宫+抗感染
- D. 中期妊娠引产
- E. 剖宫取胎

正确答案：ACD 您选择的答案：

第264-266题

28岁，阴道大出血3小时急诊入院。体检：血压：80 / 50mmHg，阴道大量活动性出血，可见烂肉样物，子宫如6周妊娠大小，软，双附件区未触及肿物。

1. 首先应询问有无

- A. 避孕史
- B. 腹痛
- C. 外伤史
- D. 停经史
- E. 性生活史

2. 哪项体征对进一步处理最有意义

- A. 子宫软硬度
- B. 宫颈着色程度
- C. 附件有无肿物
- D. 黑格征是否存在
- E. 宫颈口开大程度

3. 正确的首选处理方案是

- A. 准备行剖腹探查术
- B. 边抗休克边清宫
- C. 给予大剂量止血剂治疗
- D. 立即抗休克，待休克好转行清宫术
- E. 行急诊B超进一步明确出血原因

正确答案：DEB 您选择的答案：

第267-268题

女，34岁，有连续三次晚期自然流产史，现妊娠4+月，阴道少量出血，下坠感。检查：阴道少量出血，宫颈口开约2cm，宫体前倾4+月妊娠大小，无宫缩，附件(-)

1. 孕妇最可能的诊断是

- A 不全流产
- B 过期流产
- C 早期流产

- D 习惯性流产
- E 完全流产
- 2. 下列处理哪项最为重要
- A 镇静剂
- B 禁止性生活
- C 黄体酮注射
- D 维生素E
- E 宫颈内口环扎术

正确答案：DE 您选择的答案：

第269-271题

第一胎孕36周，发现血压升高3周，今晨突然腹痛，诉为持续性，阵发加重，血压20 / 13kPa(150 / 98mmHg)，心率112次 / 分，尿蛋白(++)，阴道有少量出血

- 1. 体格检查最可能发现的子宫体征是
- A 子宫有规则阵发收缩，宫缩间期子宫完全放松
- B 子宫局部隆起似包块状有压痛
- C 子宫上段硬，下段膨隆压痛，交界处有环状凹陷
- D 子宫不规则收缩，较硬，压痛，宫缩间歇不完全放松
- E 子宫柔软，有压痛，无宫缩
- 2. 此时对诊断最有用的检查是

- A 血红蛋白
- B 白细胞计数+分类
- C 红细胞比积
- D B超
- E 眼底检查

- 3. 此时最有可能的诊断是
- A 先兆早产
- B 胎盘早剥
- C 先兆子宫破裂
- D 前置胎盘
- E 子宫肌瘤红色变性

正确答案：DDB 您选择的答案：

第272-274题

初孕妇，24岁，以妊娠33周，头痛6日就诊。查体：血压180/120mmHg，脉搏96次/分，宫高28cm，臀先露，胎心150次/分，全身水肿(++++)

- 1. 此时最重要的辅助检查是
- A 血红细胞计数及血红蛋白测定
- B 血红细胞压积
- C 血沉
- D 眼底检查
- E 尿常规
- 2. 患者住院，不应立即采取的措施是
- A 左侧卧位休息
- B 给予强心剂
- C 给予利尿剂
- D 给予降压剂
- E 给予解痉剂
- 3. 不受累的器官是

- A 脑
- B 眼
- C 肺
- D 心
- E 肾

正确答案：DBC 您选择的答案：

第275-277题

36岁，初产妇，孕37周，头胀头痛，下肢水肿已3天，突发持续性剧烈腹痛3小时入院。体检：贫血貌，血压20 / 13.3kPa，脉搏110次 / 分，宫高37cm，腹围102cm，子宫不放松，压痛可疑，胎位不清，胎心音听不清，肛查时发现阴道少量流血，宫颈管未消失，宫口未开

- 1. 下列诊断哪项可排除
- A 孕37周，死胎可能
- B 先兆子痫
- C 高龄初产妇
- D 胎盘早剥
- E 高张性宫缩乏力
- 2. 为尽快明确诊断，下述何项辅助检查应优先考虑

- A B超
- B 血常规
- C 阴道检查
- D 胎心监护
- E 胎儿生物物理评分

- 3. 其处理应首先考虑下列何项

- A 25%硫酸镁5g静滴
- B 静滴催产素引产
- C 剖宫产终止妊娠
- D 等待自然分娩
- E 根据胎儿情况决定分娩方式及终止妊娠时间

正确答案：EAC 您选择的答案：

第278-279题

某孕妇，孕2产1，现孕36周，近日感头昏眼花，今日突感持续性腹痛伴少量阴道流血。查：面色苍白，出冷汗，血压85/40mmHg，脉搏123次/分，尿蛋白(++)，血红蛋白50g/L，水肿(++)，子宫呈板状，宫底达剑突下，明显压痛，胎心胎位不清。

1. 诊断应除外

- A. 胎盘早期剥离
- B. 子痫前期
- C. 失血性休克
- D. 子宫不完全性破裂
- E. 失血性贫血

2. 主要处理措施是

- A. 输血后引产
- B. 吸氧
- C. 输液
- D. 输液、输血纠正休克同时行剖宫产
- E. 抗休克

正确答案：DD 您选择的答案：

四、A4型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第280-282题

33岁，35周妊娠，出现下肢水肿1周。体检：子宫底高度39cm，腹壁扪及多个肢体和两个胎头，并可听到两个胎心音(胎心率分别为133次/分，150次/分)。诊断为双胎妊娠。

1. 双胎妊娠的发生与下列哪种因素无关

- A. 胎次
- B. 年龄
- C. 家族
- D. 环境
- E. 药物促排卵

2. 若B超检查提示该孕妇的胎方位第1胎儿为臀位，第2胎儿为头位。分娩时易发生哪种并发症

- A. 胎头交锁
  - B. 活跃期延缓
  - C. 第二产程延长
  - D. 臀位后出头困难
  - E. 臀位的胎儿双手上举
3. 分娩时的处理下列哪项是错误的
- A. 第1胎儿娩出后立即断脐
  - B. 第1胎儿娩出后立即固定另一胎儿为纵产式
  - C. 第2胎儿胎肩娩出后立即注射缩宫素以防产后出血
  - D. 第1胎儿娩出后超过30分钟另一胎儿尚未娩出应行人工破膜
  - E. 如遇胎头交锁，应立即行断头术以保存第2胎儿

正确答案：DAE 您选择的答案：

第283-287题

28岁，G4P0，孕34周，头痛，视物不清，恶心、呕吐1周，突然牙关紧闭，面部肌肉抽搐，四肢肌肉强直，血压200/120mmHg，胎心120次/分。宫口未开，胎头浮，骨产道正常。

1. 诊断为

- A. 脑出血
- B. 高血压危象
- C. 子痫
- D. 低钙抽搐
- E. 癔症

2. 首选紧急处理措施为

- A. 解痉
- B. 镇静
- C. 降压
- D. 扩容
- E. 利尿

3. 若入院治疗6小时未再抽搐，血压180/120mmHg，最恰当的处理是

- A. 积极解痉、镇静，防止再次抽搐
- B. 治疗24~48小时，血压控制不满意即剖宫产终止妊娠
- C. 即刻人工破膜，催产素(缩宫素)静脉点滴引产
- D. 即刻剖宫产终止妊娠
- E. 进入第二产程后应予以助产

4. 若剖宫产时发现子宫体前壁呈紫蓝色，子宫收缩不良，其并发症可能为

- A. 前置胎盘
- B. 子宫破裂
- C. 胎盘早剥
- D. 子宫肌腺病
- E. 子宫畸形

5. 进一步处理为

- A. 输新鲜血
- B. 注射宫缩剂并按摩宫体，无效则切除子宫
- C. 立即切除子宫
- D. 宫腔填塞纱条
- E. 输纤维蛋白原

正确答案：CABCB 您选择的答案：

五、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第288-291题

- A. 羊水过多
- B. 羊水过少
- C. AFP正常
- D. AFP降低
- E. 以上都不是

- 1. 脊柱裂
- 2. 过期妊娠
- 3. 无脑儿
- 4. 先天肾缺如

正确答案：ABAB 您选择的答案：

第292-293题

- A. 胎盘早期剥离和羊水栓塞
- B. 双胞胎
- C. 妊娠合并心脏病
- D. 前置胎盘
- E. 羊水过多

- 1. 产科领域容易致成DIC的疾病
- 2. 妊娠末期五痛性阴道流血应首先考虑

正确答案：AD 您选择的答案：

第294-296题

- A. 硫酸镁
- B. 利血平
- C. 甘露醇
- D. 10%葡萄糖酸钙
- E. 低分子右旋糖酐

- 1. 25岁初孕妇，孕35周，血压160/100mmHg，下肢水肿++，尿蛋白+++，诉头痛，视物模糊。首选哪种药物治疗
- 2. 上述孕妇在治疗过程中，突然呼吸困难，膝反射消失。此时应选择哪种药物治疗
- 3. 上述孕妇在治疗过程中出现颅内压异常升高的临床表现，为了快速降低颅内压，宜选用何种药物治疗

正确答案：ADC 您选择的答案：

第297-298题

- A. 子宫下段组织脆弱收缩力差
- B. 子宫下段血运丰富
- C. 两者均有关
- D. 两者均无关

- 1. 前置胎盘发生产后出血的原因：
- 2. 胎盘早剥发生产后出血的原因：

正确答案：CD 您选择的答案：

第299-301题

- A. 羊水中甲胎蛋白高
- B. 脑室率大于0.5
- C. 足月妊娠应行剖宫产
- D. 孕妇尿E3呈高值
- E. 诊断很困难

- 1. 脑积水
- 2. 无脑儿
- 3. 联体儿

正确答案：BAC 您选择的答案：

第302-303题

- A. 先兆子宫破裂
- B. 前置胎盘
- C. 胎盘早剥
- D. 羊水栓塞
- E. 胎盘滞留

- 1. 孕37周，突发持续性剧烈腹痛，伴少量阴道流血，贫血程度与外出血不符
- 2. 初孕妇，孕29周，晨醒发现阴道流血，量多，色鲜，伴心悸

正确答案：CB 您选择的答案：

第304-307题

- A. 硫酸镁
- B. 催产素
- C. 麦角新碱
- D. 前列腺素
- E. 甘露醇

- 1. 4小时尿量<100ml者不用
- 2. 妊高征心衰治疗不宜用
- 3. 膝反射消失时禁用
- 4. 心脏病孕妇产后出血时禁用

正确答案：AEAC 您选择的答案：

第308-310题

A 2000ml  
B > 2000ml  
C 1000ml  
D 500ml  
E < 300ml  
1. 何项为羊水过多  
2. 何项为羊水过少  
3. 孕足月时正常羊水量约为  
正确答案：BEC 您选择的答案：

第311-312题  
A. 流产  
B. 早产  
C. 分娩  
D. 足月产  
E. 过期产  
1. 妊娠满28周至不满37足周分娩  
2. 妊娠满42周及其以后分娩  
正确答案：BE 您选择的答案：

第313-316题  
A. 前置胎盘  
B. 胎盘早剥  
C. 子宫破裂  
D. 胎膜早破  
E. 脐带脱垂  
1. 严禁行肛门检查  
2. 重度妊高征易并发  
3. 臀位破膜后易发生  
4. 无痛性反复阴道出血  
正确答案：DBEA 您选择的答案：

第317-318题  
A. 产后出血  
B. 凝血功能障碍  
C. 两者均有  
D. 两者均无  
1. 胎盘早剥易并发  
2. 前置胎盘易并发  
正确答案：CA 您选择的答案：

第319-321题  
A 易引起DIC  
B 易引起失血性休克  
C 易引起颈管粘连  
D 易引起迷走神经综合征  
E 最易致肠管损伤  
1. 稽留流产  
2. 不完全流产  
3. 人工流产手术中  
正确答案：ABD 您选择的答案：

第322-324题  
A. 2000ml  
B. 1500ml  
C. 800ml  
D. 300ml  
E. 1000ml  
1. 羊水过多为  
2. 羊水过少为  
3. 孕足月时羊水量约为  
正确答案：ADC 您选择的答案：

第325-329题  
A. 先兆流产  
B. 稽留流产  
C. 不全流产  
D. 完全流产  
E. 习惯性流产  
1. 容易发生失血性休克的是  
2. 自然流产连续3次或以上  
3. 可能发生弥散性血管内凝血(DIC)的是  
4. 胚胎或胎儿在宫内死亡仍未自然排出  
5. 阴道排出组织物后，子宫接近正常大小，宫口闭  
正确答案：CEBBD 您选择的答案：

第330-331题  
A 产后出血  
B 胎盘植入  
C 产褥感染



D 子宫胎盘卒中

E 席汉综合征

1. 与完全性前置胎盘无关

2. 与胎盘早期剥离无关

正确答案：DB 您选择的答案：

第332-334题

A 流产感染

B 稽留流产

C 先兆流产

D 难免流产

E 不全流产

1. 停经3月余，子宫40天妊娠大小

2. 停经11周，少量阴道流血3天，子宫符合孕月，宫口未开

3. 停经3个月，下腹胀痛，伴中等量阴道流血1天，子宫大小如50天，宫口松，容1指，宫内似有组织可触及

正确答案：BCE 您选择的答案：

第335-336题

A 流产

B 急性阑尾炎

C 卵巢黄体破裂

D 输卵管卵巢脓肿

E 子宫穿孔

1. 输卵管妊娠破裂需要鉴别的是

2. 陈旧性宫外孕需要鉴别的是

正确答案：CD 您选择的答案：

习题集 妇产科学 正常产褥

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 哺乳期妇女避孕应在产后

- A. 6周
- B. 12周
- C. 18周
- D. 24周
- E. 30周

正确答案：A 您选择的答案：

第2题 产后子宫复旧，下列哪项是正确的

- A. 子宫肌细胞数目减少
- B. 产后1周子宫降至盆腔内
- C. 产后8周子宫恢复到非孕期大小
- D. 子宫肌纤维的胞质减少，细胞缩小
- E. 产后第3周宫腔表面均由新生内膜覆盖

正确答案：D 您选择的答案：

第3题 符合正常产褥期子宫复旧规律的是哪项

- A. 产后30天，子宫体恢复正常大小
- B. 产后4周时子宫颈完全恢复正常形态
- C. 产后4天子宫颈内口关闭
- D. 产后子宫底每天下降3cm
- E. 产後一周，子宫于腹部不可扪及

正确答案：B 您选择的答案：

第4题 产后第4天双乳房胀，乳汁排流不畅，最常见的原因是

- A. 进食少
- B. 卧床不活动
- C. 未给新生儿早吸吮、多吸吮
- D. 未及早按摩、热敷乳房
- E. 乳头凹陷

正确答案：C 您选择的答案：

第5题 下列产褥期处理，哪项是错误的

- A. 冲洗外阴及阴道
- B. 鼓励产妇尽早自解小便
- C. 每日鼓励产妇早日下床活动
- D. 每日观察恶露量、颜色及气味
- E. 产后2小时内应不断观察产妇阴道流血量及子宫收缩情况

正确答案：A 您选择的答案：

第6题 关于恶露，下述哪种说法不正确

- A. 恶露包括血液、坏死蜕膜组织
- B. 血性恶露含大量血液，少量胎膜及坏死蜕膜组织
- C. 浆液恶露中有细菌
- D. 白色恶露中含大量白细胞、坏死蜕膜组织、表皮细胞和细菌等
- E. 正常恶露有臭味，持续4~6周，总量约500ml

正确答案：E 您选择的答案：

第7题 正常产后第三天，乳房胀满而痛，无红肿，乳汁少，伴低热。解决方法首选

- A. 皮硝敷乳房
- B. 生麦芽煎汤喝
- C. 用吸奶器吸乳
- D. 让新生儿多吸吮双乳
- E. 少喝汤水

正确答案：D 您选择的答案：

第8题 关于恶露，下述哪项不正确

- A. 血性恶露有少量胎膜和坏死蜕膜组织
- B. 浆液性恶露有较多坏死蜕膜组织
- C. 白色恶露中含有细菌
- D. 浆液性恶露持续时间为一周
- E. 血性恶露持续时间为3日

正确答案：D 您选择的答案：

第9题 下列哪项正确地描述了初乳与成熟乳比较

- A. 初乳及成熟乳中，均含有大量免疫球蛋白IgA
- B. 初乳中含有较多蛋白质，主要是白蛋白
- C. 初乳中脂肪及糖类含量较高
- D. 初乳持续约3天以后，逐渐变为成熟乳汁
- E. 大多数药物不经母血渗入乳汁中

正确答案：B 您选择的答案：

第10题 下列哪项符合正常产褥期子宫复旧的规律

- A. 产后30天，子宫体恢复正常大小

- B. 产后4周时子宫颈完全恢复正常形态
  - C. 产后4天内宫颈内口关闭
  - D. 产后1周, 子宫于腹部不可扪及
  - E. 产后子宫底每天下降3cm
- 正确答案: B      您选择的答案:

第11题 产后第四天, 双乳房胀, 乳汁排流不畅, 最常见的原因是

- A 进食少
  - B 卧床不活动
  - C 未及早按摩, 热敷乳房
  - D 未给新生儿早吸吮多吸吮
  - E 乳头凹陷
- 正确答案: D      您选择的答案:

第12题 母乳喂养时, 避免母亲乳头皲裂最主要的措施是

- A 喂哺前消毒乳头
  - B 喂哺后清洗乳头
  - C 苯甲酸雌二醇涂乳头以防皲裂
  - D 让新生儿早吸吮多吸吮母乳
  - E 保持新生儿正确吸吮母乳的姿势
- 正确答案: E      您选择的答案:

第13题 下列哪项是正常产褥期的表现

- A. 产后脉搏偏快
  - B. 胎盘娩出后子宫底平脐
  - C. 哺乳可加重产后宫缩痛
  - D. 产后24小时体温超过38
  - E. 产后24小时白细胞恢复至正常范围
- 正确答案: C      您选择的答案:

第14题 产褥期母体变化最大的器官

- A. 乳房
  - B. 子宫
  - C. 心脏
  - D. 肾脏
  - E. 肝脏
- 正确答案: B      您选择的答案:

第15题 下列退奶方法, 哪项是错误的

- A. 芒硝外敷
  - B. 口服溴隐亭
  - C. 生麦芽煎饮
  - D. 口服大量孕激素
  - E. 口服大量雌激素
- 正确答案: D      您选择的答案:

第16题 下列哪项是异常恶露

- A. 产后第3天, 恶露有血腥味不臭
  - B. 产后第4天, 血性恶露中有坏死脱膜
  - C. 产后第9天, 血性恶露
  - D. 产后第9天, 浆液性恶露
  - E. 产后2周白色恶露
- 正确答案: C      您选择的答案:

第17题 关于初乳, 下列哪项不正确

- A 呈淡黄色, 含有丰富的脂质
  - B 含蛋白质多
  - C 含乳糖较少
  - D 含β胡萝卜素多
  - E 含大量免疫抗体, 如分泌型IgA
- 正确答案: A      您选择的答案:

第18题 关于正常产褥的叙述, 哪项是错误的

- A. 出汗较多, 睡眠和初醒时更为明显
  - B. 产后约2周经腹部检查不易摸到子宫底
  - C. 子宫复旧主要是肌细胞数目减少及体积缩小
  - D. 浆液性恶露内含细菌
  - E. 一般在产后24小时内体温轻度升高, 不超过38摄氏度
- 正确答案: C      您选择的答案:

第19题 子宫降至骨盆腔内

- A. 产后8天
  - B. 产后9天
  - C. 产后10天
  - D. 产后11天
  - E. 产后12天
- 正确答案: C      您选择的答案:

二、B1型题: 以下提供若干组考题, 每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与

问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第20-22题

- A. 正常产褥
- B. 上呼吸道感染
- C. 胎盘胎膜部分残留
- D. 产后子宫内膜炎
- E. 子宫复旧不良

1. 足月顺产，产后第1天，T37.8 P65次/分，出汗多，阴道流血不多，宫底平脐，收缩好
2. 产后7天，恶露血性，量多，宫底脐下两横指
3. 产后3天，咳嗽发热，两肺呼吸音粗

正确答案：AEB 您选择的答案：

第23-26题

- A 产后3~5日
- B 产后1周
- C 产后10天
- D 产后3周
- E 产后6周

1. 产后胎盘附着处子宫内膜全部修复需
2. 产后子宫颈口完全恢复到正常形态
3. 产后子宫复旧缩小至降入盆腔内时需
4. 轻度会阴撕裂在产后几日能自行愈合

正确答案：EBCA 您选择的答案：

第27-28题

关于母乳喂养

- A. 催乳激素
  - B. 催产素
  - C. 哺乳方法不当
  - D. 让新生儿早吸吮多吸吮母乳
  - E. 喂乳前消毒乳头
1. 促使乳汁从乳房内排出的内分泌激素是
  2. 发生乳头皲裂的常见原因是

正确答案：AC 您选择的答案：

习题集 妇产科学 正常分娩

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 下列哪一项检查结果提示胎儿的肝脏已发育成熟

- A. 羊水中卵磷脂/鞘磷脂比值 $>2$
- B. 羊水中肌酐值  $2\text{mg}$
- C. 羊水中胆红素类物质值 $<0.02$
- D. 羊水中脂肪细胞出现率 $15\%$
- E. 羊水淀粉酶值  $450\text{U/L}$

正确答案：C 您选择的答案：

第2题 枕左前位分娩时，与胎儿双肩径进入骨盆入口的同时，胎头的动作是

- A. 复位
- B. 外旋转
- C. 仰伸
- D. 拨露
- E. 着冠

正确答案：C 您选择的答案：

第3题 关于正常产道，下列哪项是正确的

- A. 中骨盆平面的横径是骨盆各平面最短的横径
- B. 入口平面前后径比横径长
- C. 出口平面横径比前后径长
- D. 骨盆轴的上段向下向后，中段向下，下段向下向前
- E. 骨盆正常倾斜度为 $70^\circ$

正确答案：D 您选择的答案：

第4题 下列关于正常枕先露分娩机转顺序，正确的是

- A. 衔接-下降-俯屈-内旋转-仰伸-复位及外旋转
- B. 衔接-俯屈-下降-内旋转-仰伸-复位及外旋转
- C. 衔接-下降-内旋转-俯屈-仰伸-复位及外旋转
- D. 下降-俯屈-衔接-内旋转-仰伸-复位及外旋转
- E. 下降-衔接-俯屈-内旋转-仰伸-复位及外旋转

正确答案：C 您选择的答案：

第5题 下述哪项不是软产道的组成部分

- A. 子宫体
- B. 子宫下段
- C. 子宫颈
- D. 阴道
- E. 盆底软组织

正确答案：A 您选择的答案：

第6题 关于催产素静脉静滴，下列哪项是正确

- A. 用于低张型宫缩乏力以加强宫缩
- B. 用于轻度胎儿窘迫，需加快结束分娩
- C. 难产时，不宜使用
- D. 足月引产时，需大剂量方有效
- E. 用于多产妇引产更敏感

正确答案：A 您选择的答案：

第7题 枕左前位分娩时与胎儿双肩径进入骨盆入口的同时胎头的动作是

- A. 复位
- B. 外旋转
- C. 仰伸
- D. 拨露
- E. 着冠

正确答案：C 您选择的答案：

第8题 正常产程进展的标志是

- A. 规律宫缩强度
- B. 规律宫缩频度
- C. 宫口扩张及胎头下降程度
- D. 胎心率变化
- E. 产妇一般状况

正确答案：C 您选择的答案：

第9题 胎儿完成内旋转动作是指

- A. 胎头双顶径与母体骨盆入口斜径一致
- B. 胎头双顶径与母体骨盆入口横径一致
- C. 胎头矢状缝与母体骨盆横径一致
- D. 胎头双顶径与母体骨盆出口前后径一致
- E. 胎头矢状缝与母体中骨盆出口前后径一致

正确答案：E 您选择的答案：

第10题 接产要领不包括下列哪项

- A. 无菌操作，保护会阴

- B 协助胎头俯屈与仰伸
  - C 胎头仰伸时令产妇屏气
  - D 必须让产妇与接产者充分合作
  - E 让胎头在宫缩间歇缓慢通过阴道口
- 正确答案：C 您选择的答案：

第11题 下列哪项不是肛诊的内容

- A. 胎方位
  - B. 先露高低
  - C. 是否破膜
  - D. 宫口开大情况
  - E. 宫缩强度
- 正确答案：E 您选择的答案：

第12题 胎盘剥离的征象是

- A. 子宫体变硬呈球形，胎盘剥离后降至子宫下段，下段被扩张，子宫体呈狭长形被推向上，子宫底升高达脐上
  - B. 剥离的胎盘降至子宫下段，阴道口外露的一段脐带自行延长
  - C. 阴道少量流血
  - D. 用手掌尺侧在产妇耻骨联合上方轻压子宫下段时，子宫体上升而外露的脐带不再回
  - E. 以上都是
- 正确答案：E 您选择的答案：

第13题 关于分娩分期，错误的是

- A. 从规律性宫缩至胎盘娩出为总产程
  - B. 总产程分为3个时期
  - C. 从规律性宫缩开始到宫口开全为宫颈扩张期
  - D. 宫口开全至胎儿娩出为胎儿娩出期，初产妇为1h~2h
  - E. 胎儿娩出至胎盘娩出为胎盘娩出期约需30min以上
- 正确答案：E 您选择的答案：

第14题 关于骨盆出口，错误的是

- A. 前三角的顶端为耻骨联合的下缘，两侧为耻骨降支
  - B. 后三角的顶端为骶尾关节，两侧为骶棘韧带
  - C. 坐骨结节间的距离为出口横径
  - D. 耻骨联合下缘至骶骨尖端为出口前后径
  - E. 骶骨尖端至坐骨结节间径中点的距离为出口后矢状径
- 正确答案：B 您选择的答案：

第15题 临产后，阴道检查确诊胎方位时，以哪一条颅缝的方向为准

- A. 额缝
  - B. 冠状缝
  - C. 矢状缝
  - D. 人字缝
  - E. 额缝
- 正确答案：C 您选择的答案：

第16题 关于骨盆以下哪项是错误的

- A. 中骨盆平面是指从耻骨联合中点，经过坐骨棘止于骶尾关节
  - B. 骨盆入口平面呈横椭圆形，以利胎头斜径入盆
  - C. 真骨盆呈前浅后深的形态，它的形状、径线直接影响胎儿的分娩
  - D. 肛诊或阴道检查时可触到坐骨棘，是胎先露位置的重要标志点
  - E. 骨盆出口前后径大于横径
- 正确答案：B 您选择的答案：

第17题 产程中胎心监护，下列哪项是错误的

- A 听胎心应在宫缩间歇期，宫缩刚结束时进行
  - B 潜伏期应每小时听胎心一次
  - C 活跃期每30分钟听胎心一次
  - D 第二产程应每15分钟听胎心一次
  - E 每次胎心听诊应听1分钟
- 正确答案：D 您选择的答案：

第18题 当进入第二产程时何时开始保护会阴

- A. 宫口开全时
  - B. 儿头拨露使会阴后联合紧张时
  - C. 儿头着冠时
  - D. 儿头仰伸时
  - E. 儿头俯屈时
- 正确答案：B 您选择的答案：

第19题 有关分娩机制正确的是

- A. 衔接是指颅骨最低点接近坐骨棘水平
  - B. 正常情况下胎头以面先露入盆
  - C. 下降是连续性贯穿于分娩全过程
  - D. 内旋转动作在第一产程未完成
  - E. 子宫收缩力和腹压两者合力而发生仰伸
- 正确答案：D 您选择的答案：

第20题 分娩时最主要的产力是

- A. 子宫收缩力

- B. 腹肌收缩力
- C. 腹压力
- D. 膈肌收缩力
- E. 肛提肌收缩力

正确答案：A 您选择的答案：

第21题 关于分娩分期的叙述错误的是

- A. 总产程是指规律性宫缩开始至胎儿娩出为止
- B. 第一产程初产妇需12~16h
- C. 第二产程是从宫口开全到胎儿娩出
- D. 第三产程不超过30min
- E. 第二产程经产妇需1h或数分钟

正确答案：A 您选择的答案：

第22题 第一产程宫口扩张曲线，正确的是

- A. 潜伏期是指从感觉宫缩开始到宫口扩张3cm
- B. 潜伏期最大时限为16小时
- C. 宫颈扩张活跃期的加速阶段是从3cm至4cm，约需4小时
- D. 活跃期最大倾斜阶段，是从4cm扩张至9cm，约需8小时
- E. 活跃期减缓阶段，是从9cm至10cm，约需4小时

正确答案：B 您选择的答案：

第23题 下列哪项是正常产褥期的表现

- A. 产后24小时体温超过38
- B. 产后第一天宫底达脐平
- C. 产后脉搏一般偏快
- D. 产后24小时白细胞应恢复至正常范围
- E. 产后二周恶露开始转为浆液性

正确答案：B 您选择的答案：

第24题 脐带处理中最没有必要的是

- A. 结扎前，以2.5%碘酒消毒脐根部及周围
- B. 距脐根0.5cm处结扎第一道，于结扎线外0.5~1cm，再结扎第二道
- C. 结扎应松紧适度，以防脐出血或脐断裂
- D. 于第二道结扎线上0.5~1cm处剪断断面以碘酒，酒精消毒后包扎
- E. 处理脐带时，应注意新生儿保暖

正确答案：A 您选择的答案：

第25题 肛诊了解胎头下降程度的骨性标志是

- A. 耻骨弓
- B. 坐骨棘
- C. 坐骨结节
- D. 骶尾结节
- E. 坐骨切迹

正确答案：B 您选择的答案：

第26题 下列哪项不属于肛查了解的范围

- A. 先露的高低
- B. 宫口开大情况
- C. 骶耻内径长度
- D. 中骨盆平面大小
- E. 胎方位

正确答案：C 您选择的答案：

第27题 进入产程中的子宫收缩的特征，下列哪项是错误的

- A. 是不自主的节律性收缩
- B. 宫缩具有对称性
- C. 宫缩的子宫底部为最强烈，子宫下段收缩最弱
- D. 子宫肌纤维在宫缩时变短变宽，间歇时松也恢复如旧
- E. 子宫收缩间隔越来越短，持续时间越来越长

正确答案：D 您选择的答案：

第28题 第一产程中用温肥皂水灌肠哪项禁忌是错误的

- A. 胎膜早破
- B. 见红
- C. 心脏病，心功能Ⅲ级
- D. 胎位异常
- E. 初产妇宫口扩张4cm以上

正确答案：B 您选择的答案：

第29题 有关破膜的处理错误的是

- A. 破膜后即听胎心
- B. 记录破膜时间
- C. 注意羊水性状
- D. 胎头尚未入盆者，破膜后应卧床休息
- E. 破膜超过24h，给予抗生素预防感染

正确答案：E 您选择的答案：

第30题 下列哪项不应作会阴切开

- A. 初产妇阴道助产手术时

- B 会阴过紧或胎头过大  
C 早产时预防新生儿颅内出血  
D 经产妇胎儿窘迫需立即结束分娩者  
E 估计分娩时会阴撕裂不可避免者  
正确答案：D 您选择的答案：

第31题 下列关于子宫下段的叙述中，哪项不正确

- A．子宫下段系子宫峡部形成，非孕时长1cm  
B．临产后由于子宫收缩及回复的影响，峡部被拉长而形成子宫下段  
C．子宫下段常被产科医生选择为剖宫产术子宫切开处  
D．子宫下段为被动扩张段，随产程进展而越来越长越薄  
E．分娩受阻时，生理性缩复环上升达脐或脐上，形成病理性缩复环  
正确答案：B 您选择的答案：

第32题 胎盘附着面的子宫内层完全修复需到产后何时

- A 产后1周  
B 产后2周  
C 产后4周  
D 产后6周  
E 产后8周

正确答案：D 您选择的答案：

第33题 决定分娩的三要素中错误的是

- A．子宫收缩力是分娩的主要力量  
B．子宫上段肌肉产生有规律的阵发性收缩称阵缩  
C．子宫收缩有对称性  
D．子宫收缩上段弱、下段强，称极性  
E．子宫体部肌纤维收缩时变短、变粗，间歇时放松，但不恢复到原来长度而较前略短称缩复作用  
正确答案：D 您选择的答案：

第34题 骨盆出口横径是指

- A．坐骨结节前端内侧缘之间的距离  
B．坐骨结节中段外侧缘之间的距离  
C．坐骨结节后端外侧缘之间的距离  
D．坐骨结节后端内侧缘之间的距离  
E．坐骨结节前端外侧缘之间的距离  
正确答案：D 您选择的答案：

第35题 下列哪项不是胎盘剥离的征象

- A．阴道少量流血  
B．产妇感到轻松，血压下降  
C．阴道口外露的一段脐带自行延长  
D．宫体变硬呈球形，宫底上升达脐上  
E．用手掌尺侧在耻骨联合上方轻压子宫下段时，外露的脐带不再回缩  
正确答案：B 您选择的答案：

第36题 作接产准备时，对外阴部消毒的顺序应是

- A．会阴及肛门周围-阴阜-大腿内上1/3-大小阴唇  
B．阴阜-大小阴唇-会阴及肛门周围-大腿内上1/3  
C．大腿内上1/3-会阴及肛门周围-大小阴唇-阴阜  
D．大小阴唇-阴阜-大腿内上1/3-会阴及肛门周围  
E．大小阴唇-大腿内上1/3-阴阜-会阴及肛门周围  
正确答案：D 您选择的答案：

第37题 临产的主要标志是

- A．不规则宫缩  
B．见红  
C．规律性宫缩，阴道流血  
D．规律性宫缩，宫颈口扩张  
E．规律性宫缩并逐渐加强，伴宫颈口扩张和胎先露下降  
正确答案：E 您选择的答案：

第38题 肛查了解胎头下降程度的骨性标志是

- A 骶岬  
B 骶骨  
C 坐骨结节  
D 坐骨棘  
E 坐骨切迹

正确答案：D 您选择的答案：

第39题 下列哪项不符合正常胎盘剥离情况

- A 子宫体变硬呈球形  
B 宫底向上升达脐上  
C 阴道口外露脐带自行延长  
D 向下压迫宫底脐带延长  
E 耻骨联合上方轻压子宫下段，脐带不回缩  
正确答案：D 您选择的答案：

第40题 下列哪项不是胎盘剥离征象

- A 宫底升高且软



B 子宫底升高且硬  
C 阴道少量出血  
D 外露脐带延长  
E 压耻骨联合上方，脐带不回缩  
正确答案：A 您选择的答案：

第41题 下列哪个现象不属于临产诊断依据

A 渐增性节律性宫缩  
B 阴道流水，pH碱性  
C 子宫颈管消失  
D 宫口进行性扩张  
E 先露部下降

正确答案：B 您选择的答案：

第42题 第一产程中肥皂水灌肠，下列哪项不应列入禁忌证

A 胎膜早破  
B 见红  
C 心功能Ⅱ~Ⅲ级的心脏病  
D 胎位异常  
E 初产妇宫口扩张4cm以上

正确答案：B 您选择的答案：

第43题 枕先露肛查胎头下降程度为+2是指

A 胎头双顶径在坐骨棘平面下2cm  
B 胎头最低点在坐骨结节平面下2cm  
C 胎头颅骨最低点在坐骨棘平面下2cm  
D 胎头顶骨在坐骨棘平面上2cm  
E 胎头顶骨在坐骨结节平面上2cm

正确答案：C 您选择的答案：

第44题 当决定从阴道手术助产时，为了确诊胎方位，应从哪条颅缝结合囟门检查来作依据

A 冠状缝  
B 人字缝  
C 矢状缝  
D 额缝  
E 颞缝

正确答案：C 您选择的答案：

第45题 在分娩机转中，肛提肌对分娩的作用不包括

A 协助胎头内旋转  
B 协助胎盘娩出  
C 使胎头俯屈  
D 使胎头仰伸  
E 使胎头复位外旋转

正确答案：E 您选择的答案：

第46题 关于缩宫素引产正确的是

A 用法为缩宫素10单位+5%葡萄糖500ml 静滴，滴速为30滴/分钟  
B 适用于胎心110~160次/分钟时  
C 用于多产妇效果好  
D 为最常用且有效的引产药物  
E 前次剖腹产，此次宫缩乏力是适应证

正确答案：D 您选择的答案：

第47题 关于分娩的先兆症状错误的是

A 见红多在分娩开始前24~48小时  
B 见红是分娩即将开始一个比较可靠的征象  
C 初产妇见红血量比经产妇多  
D 假阵缩的特点是持续时间短且不恒定，常夜间出现，清晨消失  
E 哌替啶能抑制假阵缩

正确答案：C 您选择的答案：

第48题 进入第二产程的标志是

A 宫口开全  
B 胎头拨露  
C 产妇屏气、肛门放松  
D 宫缩时会阴膨隆肛门放松  
E 胎先露降至坐骨棘水平

正确答案：A 您选择的答案：

第49题 新生儿窒息的处理错误的是

A 整个复苏过程必须保温  
B 胎头娩出后立即清除呼吸道内粘液和羊水  
C 在呼吸道通畅的基础上行人工呼吸  
D 纠正酸中毒  
E 倒提双足，拍打背部，使口中粘液和羊水排出

正确答案：E 您选择的答案：

第50题 胎头在进行内旋转动作时，除子宫收缩力外，下列哪项为主要参与因素

A 腹肌收缩力

- B 膈肌收缩力
- C 胎儿胸锁乳突肌收缩
- D 肛提肌收缩
- E 会阴深横肌收缩

正确答案：D 您选择的答案：

第51题 初产妇第二产程中，何时应开始保护会阴

- A．宫口开全时
- B．胎头仰伸时
- C．胎头着冠时
- D．胎头外旋转时
- E．胎头拨露使阴唇后联合紧张时

正确答案：E 您选择的答案：

第52题 临产时，下列哪种可以灌肠

- A 胎膜已破，先露S+1，胎心音正常
- B 阴道出血，量较多
- C 臀先露，胎心好
- D 胎膜未破，宫口开2cm，先露(+)，胎心音正常，血压19 / 13．5kPa
- E 产程顺利，估计1小时内胎儿即可娩出

正确答案：D 您选择的答案：

第53题 关于产时子宫颈口扩大，下列哪项是错误的

- A 是子宫收缩将子宫下段向上牵拉的结果
- B 前羊水囊的作用
- C 破膜后胎头直接压迫子宫颈
- D 无头盆不称时，宫颈口扩张的快慢，对产程的长短起决定性作用
- E 初产妇宫颈管消失和宫口开大同时进行

正确答案：E 您选择的答案：

第54题 关于子宫下段，下列哪项是错误的

- A 系由子宫峡部形成，非孕时长约1cm
- B 临产后子宫收缩极性的缘故，峡部被拉长形成子宫下段
- C 下段为被动扩张段，随产程进展而越来越长越薄
- D 子宫上下段肌壁厚薄不同，在产程中上、下段交界处于子宫内面形成一环状隆起，称生理性缩复环
- E 子宫下段常被产科医师选择为剖宫术子宫切开处

正确答案：B 您选择的答案：

第55题 分娩中协助胎先露在盆腔中内旋转的肌肉是

- A．子宫平滑肌
- B．会阴浅横肌
- C．会阴深横肌
- D．肛门括约肌
- E．盆底肛提肌

正确答案：E 您选择的答案：

第56题 临产开始的标志，错误的是

- A．规律宫缩
- B．子宫颈管展平
- C．宫颈扩张
- D．见红
- E．胎先露部下降

正确答案：D 您选择的答案：

第57题 关于分娩机转的含义，下列哪项是错误的

- A 俯屈，内旋转，仰伸复位，外旋转等动作都贯穿于下降过程中
- B 胎头进入骨盆入口时以枕下前囟径衔接
- C 俯屈是胎头下降至骨盆轴弯曲处即骨盆底时受肛提肌的阻力而发生的
- D 内旋转是胎头最低的枕部在盆底受肛提肌收缩力而被推向母体前方即小囟门被推移至耻骨的下方
- E 正仰伸是在枕骨下部(粗隆)到达耻骨联合下缘时发生的

正确答案：B 您选择的答案：

第58题 下列哪一项为骨盆测量的正常值

- A．对角径11cm
- B．坐骨棘间径9cm
- C．坐骨切迹<2指
- D．耻骨弓角度90°
- E．骨盆倾斜度60°

正确答案：E 您选择的答案：

第59题 下述哪种情况可以灌肠

- A．经产妇宫口开至1cm
- B．子宫收缩甚强
- C．胎儿宫内窘迫
- D．重度子痫前期
- E．妊娠合并心脏病

正确答案：A 您选择的答案：

第60题 在我国，最常引起产妇死亡的原因是

- A．脐带异常

- B. 子宫破裂
- C. 羊水栓塞
- D. 胎膜早破
- E. 产后出血

正确答案：E 您选择的答案：

第61题 临产后子宫收缩特点，下列哪项不正确

- A. 节律性
- B. 对称性
- C. 极性
- D. 缩复作用
- E. 持续性

正确答案：E 您选择的答案：

第62题 第一产程中用肥皂水灌肠，下列哪项禁忌证是错误的

- A. 见红
- B. 臀位
- C. 胎膜早破
- D. 有剖宫产史
- E. 心功能 ~ 级

正确答案：A 您选择的答案：

第63题 接生过程中，下列哪项是错误的

- A. 宫缩时，接生者以手掌向上向内托压会阴体保护会阴
- B. 宫缩时，协助胎头俯屈
- C. 待胎儿枕骨下部显露于母体耻骨弓下时，协助胎头仰伸
- D. 在宫缩期不屏气情况下娩出胎头较在宫缩间歇期稍向下屏气娩出更利保护会阴
- E. 胎儿一肩娩出后应注意保护会阴

正确答案：D 您选择的答案：

第64题 下列哪项不是胎盘剥离的征象

- A. 宫底上升
- B. 子宫呈葫芦形
- C. 阴道少量出血
- D. 外露脐带延长
- E. 压耻骨联合上方，脐带不回缩

正确答案：B 您选择的答案：

第65题 正常分娩时胎头以哪一径线通过产道

- A. 枕下前凶径
- B. 枕额径
- C. 枕颏径
- D. 双顶径
- E. 双颞径

正确答案：A 您选择的答案：

第66题 正常分娩时，胎头以哪个周径通过产道

- A. 枕下前凶径
- B. 枕额径
- C. 枕颏径
- D. 双顶径
- E. 双颞径

正确答案：A 您选择的答案：

第67题 正常枕先露分娩时，仰伸发生于

- A. 胎头拨露时
- B. 胎头着冠时
- C. 胎头枕骨在耻骨弓后时
- D. 胎头枕骨下部达耻骨联合下缘时
- E. 胎头后凶在耻骨弓后时

正确答案：D 您选择的答案：

第68题 关于正常骨产道下列哪项是正确的

- A. 骨盆入口前后径比横径大
- B. 中骨盆平面横径比前后径大
- C. 骨盆入口平面是骨盆的最宽平面
- D. 中骨盆平面是骨盆最窄平面
- E. 站立时骨盆入口平面与地平面平行

正确答案：D 您选择的答案：

第69题 接生过程中错误的处理是

- A. 宫缩时，协助胎头俯屈
- B. 协助胎头俯屈，是变枕下前凶径为枕额径
- C. 应让胎头在宫缩间歇期娩出
- D. 胎肩娩出后，仍应注意保护会阴
- E. 宫缩时，接生者以手掌大鱼际肌向上内方托压会阴体

正确答案：B 您选择的答案：

第70题 胎头衔接是指

- A. 枕骨进入骨盆入口平面

B 顶骨进入骨盆入口平面  
C 双顶径进入骨盆入口平面  
D 双顶径到达坐骨棘平面  
E 双顶径到达坐骨结节平面  
正确答案：C 您选择的答案：

第71题 正常分娩时最主要的产力是

A．子宫收缩力  
B．肛提肌收缩力  
C．腹肌收缩力  
D．膈肌收缩力  
E．骨骼肌收缩力  
正确答案：A 您选择的答案：

第72题 有关分娩机转的概念中，下列哪项是正确的

A 俯屈：前囟位置下降最低  
B 内旋转：前囟转向母体前方  
C 仰伸：颈部紧贴胸部  
D 外旋转：胎头随肩胛的内旋转而外旋转以保持胎头与胎肩的垂直关系  
E 衔接：无论初产妇经产妇均在临产后衔接  
正确答案：D 您选择的答案：

第73题 新生儿娩出后首先应

A．断脐  
B．擦洗新生儿面部  
C．清理呼吸道  
D．刺激新生儿足部  
E．抓紧娩出胎盘及胎膜  
正确答案：C 您选择的答案：

第74题 下列哪个征象肯定进入第二产程

A．产妇进气向下用力  
B．胎头部分露于阴道  
C．产妇排尿困难  
D．子宫口开全  
E．脐带脱出于阴道口外  
正确答案：D 您选择的答案：

第75题 临产的重要标志是

A．见红、破膜、规律宫缩  
B．见红、规律宫缩、宫口扩张不明显  
C．见红、胎先露下降、尿频  
D．规律宫缩、破膜、伴有见红  
E．规律宫缩逐渐增强、伴随宫口进行性扩张和胎先露下降  
正确答案：E 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第76题 孕足月，初产妇，24岁，第二产程2小时30分钟，胎盘娩出后，有间歇性阴道流血并有血块排出，量超过500ml，查：子宫轮廓不清，首先应考虑为

A．阴道静脉破裂  
B．凝血机制障碍  
C．胎盘残留  
D．宫颈裂伤  
E．子宫收缩乏力  
正确答案：E 您选择的答案：

第77题 足月妊娠，规律性腹痛10小时，宫口开大5cm，先露部为头S-2，大囟门位于11点，小囟门位于5点，下述胎位哪顶是最正确的

A．枕左前位  
B．枕左后位  
C．枕右前位  
D．枕右后位  
E．高直后位  
正确答案：B 您选择的答案：

第78题 初产妇，停经39周，见红、阵发性腹痛8小时入院。体检：精神疲乏紧张，宫缩10～20秒／10～35分，宫缩时宫壁不硬，胎心好。肛诊：先露头，半固定，宫口容指尖，前羊水囊不明显，坐骨切迹容3横指。最恰当的处理是

A．剖宫产  
B．人工破膜  
C．催产素(缩宫素)  
D．哌替啶100mg肌注  
E．温肥皂水灌肠  
正确答案：D 您选择的答案：

第79题 一产妇临产8小时，肛查头先露，宫口已开全，先露+4，请问此时产力组成是下列哪种情况

A 子宫收缩力  
B 子宫收缩力+腹肌收缩力

- C 子宫收缩力+膈肌收缩力  
D 子宫收缩力+腹肌收缩力+膈肌收缩力  
E 子宫收缩力+腹肌收缩力+膈肌收缩力+肛提肌收缩力  
正确答案：E 您选择的答案：

第80题 初产妇，孕39周，食欲正常，昨晚8时起有腹部阵痛，一夜未睡，今晨就诊，精神疲乏，宫缩10~20秒，间隔10~35分钟，宫缩强度弱，肛查先露头，未入盆，宫口开1指尖，前羊膜囊不明显，骨盆测量无异常，最恰当的处理是

- A 肥皂水灌肠  
B 催产素，静脉滴注  
C 人工破膜  
D 哌替啶(杜冷丁)100mg肌注  
E 补液支持疗法  
正确答案：D 您选择的答案：

第81题 孕40周临产，规则宫缩12小时，破膜10小时。肛查：宫口开大5cm，先露+0.5，下列诊断哪项是正确的

- A 胎膜早破  
B 正常潜伏期  
C 正常活跃期  
D 潜伏期延长  
E 第一产程延长  
正确答案：C 您选择的答案：

第82题 经产妇，孕3产2，无难产史，孕39+2周，3小时前开始规则宫缩，急诊检查：宫缩持续45秒，间隙3分钟，胎心140次/分，头位，宫口开4cm，羊膜囊明显膨出，骨盆内诊正常，此时最恰当的处理是

- A 急诊室留观  
B 破膜后住院  
C 立即住院待产  
D 急送产房消毒接生  
E 灌肠以促进产程，减少污染  
正确答案：D 您选择的答案：

第83题 经产妇，产后第一天，诉下腹痛，查有低热，出汗，咽不充血，无恶心呕吐，腹泻，脐下二横指处触及一硬块上界，白细胞 $11.0 \times 10^9/L$ ，中性0.75，最可能的诊断是

- A 产后子宫内膜炎  
B 子宫肌瘤红色变性  
C 产后宫缩痛  
D 卵巢囊肿扭转  
E 子宫肌炎  
正确答案：C 您选择的答案：

第84题 初产妇，末次月经第一天为4月21日，于12月29日就诊。腹部检查：子宫底在剑突下2横指，枕右前位胎心140次/分，血压16/10.3kPa，尿蛋白(-)，本病例现在是

- A 妊娠满35周，子宫底高度符合正常情况  
B 妊娠满36周，子宫底高度低于正常  
C 妊娠满36周，子宫底高度符合正常情况  
D 妊娠满36周，子宫底高度高于正常情况  
E 妊娠满37周，子宫底高度高于正常情况  
正确答案：C 您选择的答案：

第85题 临产4小时，宫缩25~35秒，间隔4~5分钟，胎心140次/分，先露浮，突然阴道流水，色清，宫口开1指，下列哪项处理不当

- A 立即听胎心  
B 记录破膜时间  
C 鼓励产妇在宫缩时，运用腹压力加速产程进展  
D 超过12小时尚未分娩，加用抗生素  
E 卧床，抬高臀部  
正确答案：C 您选择的答案：

第86题 一初产妇，宫缩15小时自娩一3000g女婴，现胎儿娩出已8分钟，胎盘尚未娩出，阴道无流血，此时的处理下列何项不当

- A 查看子宫形态  
B 经肌肉注射催产素  
C 察看外露脐带有否向外伸长  
D 牵拉脐带或压迫宫底以了解胎盘是否剥离  
E 等待观察有胎盘剥离征象时协助胎盘娩出  
正确答案：D 您选择的答案：

第87题 孕妇23岁，20周妊娠，骨盆外测量结果如下。请问下列哪项为异常

- A 粗隆间径31cm  
B 髂前上棘间径24cm  
C 髂嵴间径27cm  
D 骶耻外径18cm  
E 骨结节间径7.5cm  
正确答案：E 您选择的答案：

第88题 初产妇，第二产程，何时应开始保护会阴

- A 宫口开全时  
B 胎头拨露使会阴后联合紧张时  
C 胎头着冠时

- D 胎头仰伸时
- E 阴道口见胎头时

正确答案：B 您选择的答案：

三、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

#### 第89-91题

26岁，临产17小时，阴道有少量淡绿色液体流出，宫缩25秒/6~8分，胎心音150次/分，肛查宫口开大2+cm，宫颈轻度水肿，S-2

1. 下列哪项诊断正确

- A 活跃期延长
- B 潜伏期延长
- C 原发性宫缩乏力
- D 胎儿窘迫
- E 头盆不称

2. 根据产妇病情，不应进行哪项处理

- A CST检查
- B 给病人吸氧
- C 静滴5%苏打水
- D 静脉推注安定10mg
- E 静滴催产素

3. CST监护出现频繁的晚期减速，胎心音160次/分，此日才应首选哪项处理

- A 左侧卧位
- B 静滴50%葡萄糖
- C 剖宫产结束分娩
- D 继续给氧
- E 静滴小剂量催产素

正确答案：BEC 您选择的答案：

#### 第92-94题

初产妇，40周妊娠，临产12小时入院，骨盆外测量正常，估计胎儿体重3200g，宫口开大5cm，羊膜囊突头先露"-1"，宫缩40~50秒/3~4分，中等强度，胎心3基线130次/分。

1. 应先做如何处理

- A 剖宫产
- B 人工破膜
- C 肌注哌替啶
- D 静滴催产素(缩宫素)
- E 温肥皂水灌肠

2. 若复查肛诊：大囟位于7点，小囟门位于2点。其胎位是

- A 枕右前位
- B 枕右后位
- C 枕左前位
- D 枕左后位
- E 高直后位

3. 若新生儿出生时心率110次/分，律齐，呼吸浅，不规则，四肢活动好，吸痰时喉部恶心，身体红润，四肢青紫。

Apgar评分为

- A 9分
- B 8分
- C 7分
- D 6分
- E 5分

正确答案：BCB 您选择的答案：

#### 第95-97题

孕妇，28岁，G1P0，39周妊娠。临产10小时入院。查：子宫底高34cm，腹围98cm，胎头先露，估计胎儿重3500g，胎心率142次/分。宫口扩张3cm，胎头位于坐骨棘水平上2cm。

1. 骨盆外测量时注意哪条径线

- A 粗隆间径
- B 骶耻外径
- C 耻骨弓角度
- D 坐骨结节间径
- E 出口后矢状径

2. 若观察宫缩持续20秒，间歇5~6分钟，强度中弱。4小时后宫口扩张4cm，胎头位于坐骨棘水平上1cm。以下哪项处理是错误的

- A 吸氧
- B 人工破膜
- C 胸膝卧位
- D 缩宫素静脉滴注
- E 胎心监护

3. 若阴道检查：骶耻内径11cm，胎头先露，有轻度颅骨重叠，胎方位LOP，胎头位于坐骨棘水平上1cm，宫口扩张4cm。以下哪项处理正确

- A 产钳助产术
- B 剖宫产术
- C 左侧卧位协助转胎位
- D 纠正骨盆倾斜度
- E 人工破膜

正确答案：BCB 您选择的答案：

第98-99题

产妇，31岁。宫口已开全，阴道检查头头矢状缝与骨盆横径一致，小囟门在3点，大囟门在9点

1. 属于哪种胎位

- A LOT
- B ROT
- C LOA
- D ROA
- E LOP

2. 胎头向哪个方向转动才能娩出

- A 顺时针转90度
- B 逆时针转90度
- C 逆时针转45度
- D 顺时针转45度
- E 不需转动

正确答案：AB 您选择的答案：

第100-101题

女，31岁。孕1产0，孕39+周，不规则宫缩2天，阴道少许血性分泌物，查血压16 / 10.6kPa(120 / 80mmHg)，宫高35cm，腹围100cm，胎心音（右下）158次 / 分，宫缩20秒 / 10~15分，肛查宫口开指尖，NST出现早期减速

1. 哪项诊断不正确

- A 胎儿宫内窘迫
- B 胎方位LDA
- C 活胎巨大儿
- D 先兆临产
- E 宫内足月妊娠

2. 病人入院经处理后24小时，腹阵痛加密，宫缩35秒 / 3~5分。胎心音140次 / 分，S-1，宫口开1+cm，此时不应采取哪项措施

- A 入产房待产
- B 肥皂水灌肠
- C 每隔1~2时听一次胎心音
- D 静滴催产素加速产程
- E 每4小时作一次肛查

正确答案：AD 您选择的答案：

第102-104题

一新生儿出生后一分钟，全身皮肤苍白，无呼吸，心率100次/min，规律，四肢稍屈，吸痰时无反应

1. 新生儿窒息的处理下列哪项是错误的

- A. 整个复苏过程必须保温
- B. 胎头娩出后立即清除呼吸道内粘液和羊水
- C. 在呼吸道通畅的基础上行人工呼吸
- D. 纠正酸中毒
- E. 倒提双足，拍打背部，使口中粘液和羊水排出

2. 如果新生儿得到复苏后，作动脉血气，pH为7.35，PaO<sub>2</sub>为8kPa(60mmHg)，PaCO<sub>2</sub>为6kPa(43.8mmHg)时，除下述哪项措施外均正确

- A. 注意保暖
- B. 预防感染
- C. 持续给纯氧
- D. 延期哺乳
- E. 肌注维生素K<sub>1</sub>

3. 复苏后为防止后遗症，下述哪项不正确

- A. 脱水剂
- B. 镇静剂
- C. 抗生素
- D. 止血剂
- E. 呼吸中枢兴奋剂

正确答案：ECE 您选择的答案：

第105-107题

一新生儿出生后一分钟，全身皮肤苍白，无呼吸，心率100次/min，规律，四肢稍屈，吸痰时无反应

1. 正常情况下胎儿娩出后首先处理的是

- A. 保暖
- B. 清理呼吸道
- C. 结扎脐带
- D. 记录出生时间
- E. 新生儿评分

2. 该患儿Apgar评分为

- A. 1分
- B. 2分
- C. 3分
- D. 4分
- E. 5分

3. 本患儿最先采取的急救措施应是

- A. 胸外心脏按摩
- B. 气管插管
- C. 面罩给氧
- D. 静脉注射碱性药物
- E. 应用呼吸中枢兴奋剂

正确答案：BCB 您选择的答案：

四、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与

问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第108-109题

- A. 胎头外旋转
- B. 胎头俯屈
- C. 胎头内旋转
- D. 胎头衔接
- E. 胎头仰伸

1. 双顶径通过骨盆入口，胎头最低点在坐骨棘水平
2. 胎头矢状缝适应骨盆与出口前后径一致的动作

正确答案：DC 您选择的答案：

第110-111题

- A. 左枕前
- B. 右枕前
- C. 左枕横
- D. 左枕后
- E. 右枕后

1. 胎头矢状缝在骨盆入口右斜径上，小囟在骨盆的左前方
2. 胎头矢状缝在骨盆入口右斜径上，大囟在骨盆的左前方

正确答案：AE 您选择的答案：

第112-113题

- A. 枕下前囟径
- B. 骨盆出口前后径
- C. 骨盆入口右斜径
- D. 枕额径
- E. 骨盆入口横径

1. 胎头以哪条径线进入骨盆(衔接)
2. 左枕前位衔接时胎头矢状缝在骨盆哪条径线上

正确答案：DC 您选择的答案：

第114-116题

- A. 妇女型骨盆
- B. 均小型骨盆
- C. 扁平骨盆
- D. 男子型骨盆
- E. 类人猿型骨盆

1. 入口、中骨盆平面及出口平面均是前后径大于横径
2. 入口横椭圆形，前后径变短，横径较长，中骨盆平面宽大
3. 入口前后径与横径几乎相等，中骨盆平面狭小

正确答案：ECD 您选择的答案：

第117-120题

- A. 11~12小时
- B. 6~8小时
- C. 1小时
- D. 1~2小时
- E. 5~15分钟

1. 初产妇第一产程约需
2. 经产妇第一产程约需
3. 初产妇第二产程约需
4. 初产妇与经产妇的第三产程约需

正确答案：ABDE 您选择的答案：



习题集 妇产科学 孕期监护及保健

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 自耻骨联合下缘中点到骶骨岬上缘中点的距离是

- A．骨盆入口前后径
- B．真结合径
- C．对角径
- D．中骨盆前后径
- E．骶耻外径

正确答案：C 您选择的答案：

第2题 自耻骨联合下缘到骶岬上缘中点的距离是

- A．骨盆入口前后径
- B．对角径
- C．真结合径
- D．中骨盆前后径
- E．产科结合径

正确答案：B 您选择的答案：

第3题 目前我国采用的围生(产)期是

- A 妊娠满20周到产后4周
- B 妊娠满28周到产后1周
- C 妊娠满20周到产后1周
- D 妊娠满28周到产后4周
- E 胚胎形成到产后1周

正确答案：B 您选择的答案：

第4题 骨盆测量数值低于正常值的是

- A．髂棘间径24cm
- B．髂嵴间径27cm
- C．骶耻外径18cm
- D．坐骨棘间径10cm
- E．坐骨结节间径7cm

正确答案：E 您选择的答案：

第5题 为判断胎儿肾成熟度，应测孕妇的

- A．血中甲胎蛋白值
- B．尿中雌三醇值
- C．尿中孕二醇值
- D．羊水中肌酐值
- E．羊水中人胎盘生乳素值

正确答案：D 您选择的答案：

第6题 关于胎儿电子监测，提示胎头受压的是

- A．NST无反应型
- B．胎心率加速
- C．早期减速
- D．变异减速
- E．晚期减速

正确答案：C 您选择的答案：

第7题 检查胎位的四步触诊法错误的是

- A．用以了解子宫的大小，胎先露、胎方位
- B．第三步是双手置于耻骨联合上方，弄清先露部是头还是臀
- C．第一步是双手置于子宫底部了解宫底高度，并判断是胎头还是胎臀
- D．第二步是双手分别置于腹部两侧，辨别胎背方向
- E．第四步双手插入骨盆入口，进一步检查先露部，并确定入盆程度

正确答案：B 您选择的答案：

第8题 末次月经为2001年3月25日，预产期应是

- A．2002年1月2日
- B．2001年12月2日
- C．2002年1月11日
- D．2002年2月21日
- E．2001年12月30日

正确答案：A 您选择的答案：

第9题 提示胎儿宫内缺氧的检查结果为

- A．缩宫素激惹试验阳性
- B．无激惹试验出现胎动时伴胎心加速
- C．胎儿头皮血pH值为7．30
- D．胎动15次/12h
- E．胎心监护出现早期减速

正确答案：A 您选择的答案：

第10题 目前我国采用的围生期的规定是

- A．妊娠满20周至产后4周

- B. 妊娠满28周至产后1周
- C. 妊娠满20周至产后1周
- D. 妊娠满28周至产后4周
- E. 胚胎形成至产后1周

正确答案：B 您选择的答案：

第11题 产前检查应从下列哪一时间开始最好

- A. 妊娠6周
- B. 妊娠8周
- C. 确诊早孕时
- D. 妊娠12周
- E. 妊娠20周

正确答案：C 您选择的答案：

第12题 下列哪项不属于胎盘功能检查

- A. 孕妇尿雌三醇测定
- B. CST试验
- C. 尿 $\beta$ -HCG
- D. 血清胎盘生乳素值
- E. 血清催产素酶值

正确答案：C 您选择的答案：

第13题 胎儿电子监测胎心率变化错误的是

- A. FHR基线变异消失提示胎儿有一定储备能力
- B. 基线胎心率为无宫缩时的FHR
- C. FHR指每分钟胎儿心搏次数
- D. 周期性FHR与子宫收缩有关
- E. 宫缩后FHR增加15~20次，可能是脐带静脉暂时受压

正确答案：A 您选择的答案：

第14题 高危妊娠选择终止妊娠的时间应取决于

- A. 胎动次数
- B. 宫颈成熟度
- C. 胎儿电子监测
- D. 宫底高度
- E. 胎盘功能和胎儿成熟度

正确答案：E 您选择的答案：

第15题 关于骨盆的外测量错误的是

- A. 髂棘间径(IS)正常值为23~26cm
- B. 髂嵴间径(IC)正常值为25~28cm
- C. 骶耻外径(EC)正常值为18~20cm
- D. 出口横径(TO)正常值为8.5~9.5cm
- E. 出口后矢状径正常值为8~10cm

正确答案：E 您选择的答案：

第16题 首次产前检查，下列哪个时间最合适

- A. 妊娠6周
- B. 妊娠12周
- C. 妊娠14周
- D. 妊娠20周
- E. 确诊早孕时

正确答案：E 您选择的答案：

第17题 下列哪项说明胎儿储备能力不正常

- A. NST试验反应型
- B. 胎儿心率基线静止型
- C. 催产素激惹试验阴性
- D. 胎儿头皮血pH值为7.45
- E. 胎动良好

正确答案：B 您选择的答案：

第18题 随着产前诊断的开展，由于产前诊断的需要(如遗传病的产前诊断等)，第一次产前检查的时间，应从传统的孕20周提前到

- A. 孕16周
- B. 孕12周
- C. 孕12周以内
- D. 孕10周
- E. 确诊为早孕时

正确答案：E 您选择的答案：

第19题 尿妊娠试验对下列哪项无诊断价值

- A. 早期妊娠
- B. 过期流产
- C. 异位妊娠
- D. 先兆流产
- E. 葡萄胎

正确答案：B 您选择的答案：

第20题 下列各项测定胎儿安危的方法中最简便而较准确的是

- A. 胎儿电子监护
- B. 尿雌三醇测定
- C. 胎动计数
- D. 羊膜镜检
- E. 缩宫素激惹试验

正确答案：C 您选择的答案：

第21题 胎盘功能检查方法不包括

- A. 尿E3测定
- B. 尿E/C比值
- C. 血清HPL值
- D. 缩宫素激惹试验
- E. 羊水脂肪细胞出现率

正确答案：E 您选择的答案：

第22题 关于胎儿电子监护，提示胎儿缺氧的是

- A. 加速
- B. 早期减速
- C. 变异减速
- D. 晚期减速
- E. 以上都不是

正确答案：D 您选择的答案：

第23题 首次产前检查最恰当的时期应是

- A. 停经6周
- B. 停经8周
- C. 停经10周
- D. 停经12周
- E. 确诊早孕时

正确答案：E 您选择的答案：

第24题 关于骨盆径线，下述哪项错误

- A. 髂棘间径是两髂前上棘外缘间的距离
- B. 骶耻外径 $<18\text{cm}$ 时有可能骨盆入口狭窄
- C. 坐骨结节间径 $<8\text{cm}$ ，表示骨盆出口狭窄
- D. 对角径长度减去 $1.5\sim 2\text{cm}$ ，即为骨盆入口前后径长度
- E. 粗隆间径可间接推测中骨盆横径长度

正确答案：C 您选择的答案：

第25题 关于绒毛膜促性腺激素，下列哪项是错误的

- A. 是由合体滋养叶细胞产生
- B. 是一种甾体激素
- C. 检测时可因与促黄体生成素有交叉反应而呈假阳性
- D. 妊娠8~10周时达高峰
- E. 葡萄胎妊娠在孕12周后hCG继续上升

正确答案：B 您选择的答案：

第26题 关于骨盆径线，下列哪项错误

- A. 髂前上棘间径是两髂前上棘外缘间的距离
- B. 骶耻外径 $<18\text{cm}$ 有可能骨盆入口狭窄
- C. 坐骨结节间径 $<8\text{cm}$ 表示骨盆出口狭窄
- D. 对角径长度减去 $1.5\sim 2\text{cm}$ 即为骨盆入口前后径长度
- E. 粗隆间径可间接推测中骨盆横径长度

正确答案：C 您选择的答案：

第27题 关于中期妊娠的诊断与监护，下列哪项是错误的

- A. 从孕早期至孕中期，胎动逐渐增多
- B. 从孕18~20周孕妇自觉胎动
- C. 孕20周左右利用听诊器能听到胎心音
- D. 孕30周可经腹壁触及宫内胎体
- E. 孕22周起胎头双顶径每周增加约 $0.22\text{cm}$

正确答案：A 您选择的答案：

第28题 自耻骨联合下缘到骶岬上缘中点的距离是

- A. 骨盆入口前后径
- B. 产科结合径
- C. 真结合径
- D. 对角径(骶耻内径)
- E. 中骨盆前后径

正确答案：D 您选择的答案：

第29题 OCT阳性是指在测试

- A. 早期减速在10分钟内连续出现3次以上
- B. 胎心率基线变异在6次以下
- C. 无宫缩时10分钟内出现3次晚期减速
- D. 在10分钟内晚期减速连续出现3次以上，胎心率基线变异在5次以下
- E. 早期减速出现频率达50%以上

正确答案：D 您选择的答案：

第30题 我国现采用的围生期是

- A. 从妊娠满28周至产后1周
- B. 围绕分娩前后1周以内的阶段
- C. 分娩前1周到分娩后24小时以内
- D. 妊娠20周以后到分娩后4周以内
- E. 妊娠28周以后到分娩后4周以内

正确答案：A 您选择的答案：

第31题 推算预产期的最可靠依据是

- A. 开始胎动的日期
- B. 开始早孕反应的日期
- C. 末次月经第1日
- D. 基础体温测定
- E. 妇科检查确诊早孕日期

正确答案：C 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第32题 初产妇，40周妊娠临产，产程进展顺利，LOA，先露部平坐骨棘，胎心监护突然出现变异减速，最低胎心率70次/分钟，持续50秒，本症有可能的原因是

- A. 慢性胎儿窘迫
- B. 胎头受压
- C. 胎盘功能减退
- D. 脐带受压
- E. 胎儿心脏病

正确答案：D 您选择的答案：

第33题 杜某孕36周，产前检查中发现胎儿近三周宫高增长缓慢。实习医师建议检查下列哪项，被主治医师否定，因该项检查不能反映胎盘功能

- A. 胎动计数
- B. 雌三醇(E3)测定
- C. 尿雌激素/肌酐比值(E/C比)
- D. 血清胎盘生乳素
- E. hCG测定

正确答案：E 您选择的答案：

第34题 女性，28岁。C1Po，末次月经是1994年4月25日，预产期应是

- A. 1995年1月2日
- B. 1995年2月11日
- C. 1995年2月1日
- D. 1995年3月21日
- E. 1995年1月30日

正确答案：C 您选择的答案：

第35题 25岁妇女，孕36周，G1P0，合并重度子痫前期需终止妊娠，下列哪项提示胎儿已成熟

- A. 羊水胆红素类物质用 OD450测值  $> 0.02$
- B. 卵磷脂与鞘磷脂比值(L/S)  $> 2$
- C. 羊水肌酐测定  $< 2\text{mg}\%$
- D. 羊水中脂肪细胞出现率达15%
- E. B型超声测胎头双顶径值8.0cm

正确答案：B 您选择的答案：

第36题 一产妇孕37周，产前检查时出现下列何种情况医生正确地决定应该作进一步检查，因为还不能提示是否有胎儿宫内缺氧(储血能力下降)

- A. 12小时胎动计数小于3次
- B. 胎动消失
- C. 胎动频繁挣扎
- D. 观察20分钟无胎动，提示胎儿储备能力下降
- E. 胎动受声振刺激后加强

正确答案：D 您选择的答案：

第37题 已婚妇女王某，停经40天，前来咨询下列哪项检查结果，医生告诉她该项检查对早孕诊断无帮助

- A. 基础体温双相且高温持续21天不下降
- B. 妊娠免疫试验(血 $\beta$ -hCG测定)
- C. 超声多普勒试验
- D. 黄体酮试验
- E. 尿雌三醇测定

正确答案：E 您选择的答案：

第38题 孕妇，32岁，42周妊娠，入院待产，检查：血压120/80mmHg，宫高35cm，腹围10cm，LOA，胎心130次/分钟，拟行胎盘功能检查，下列哪项表示胎盘功能减退

- A. OCT试验胎心率出现连续晚期减速
- B. 12小时胎动次数  $> 20$ 次
- C. B型超声羊水池最大直径  $> 3\text{cm}$
- D. 血清胎盘泌乳素  $> 4\text{mg/L}$
- E. NST试验有反应型

正确答案：A 您选择的答案：

第39题 女性，27岁。停经2个月，阴道出血3天，下腹痛1天，检查子宫增大如鹅蛋大小，宫口闭，下列哪项检查对确诊最有意义

- A 尿妊娠试验
- B A型超声
- C B型超声
- D 诊断性刮宫
- E 基础体温测定

正确答案：C 您选择的答案：

第40题 女性，26岁。既往月经规律，停经50天，近3天晨起呕吐，厌油食，伴有轻度尿频，仍坚持工作，可能的诊断是

- A 病毒性肝炎
- B 膀胱炎
- C 继发性闭经
- D 早期妊娠
- E 妊娠剧吐

正确答案：D 您选择的答案：

第41题 女性，25岁，末次月经为2004年12月9日，预产期应是

- A . 2005年9月16日
- B . 2005年10月16日
- C . 2005年10月12日
- D . 2005年9月27日
- E . 2005年10月2日

正确答案：A 您选择的答案：

第42题 女性，28岁。孕36周，产前检查胎背位于母体腹部左侧，胎心位于左上腹，宫底可触及浮球感，诊断胎方位为

- A LDA
- B LOT
- C BSA
- D LSA
- E LOP

正确答案：D 您选择的答案：

第43题 女，24岁，停经3个月就诊。平日月经规律，周28天，末次月经2003年8月9日。其预产期为

- A . 2004年5月18日
- B . 2004年6月16日
- C . 2004年5月16日
- D . 2005年1月6日
- E . 2004年6月2日

正确答案：C 您选择的答案：

三、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第44-46题

28岁妇女，G1P0。因预产期超过2周收入院。估计胎儿体重在3500g，先露头，未入盆

1.入院后首先考虑的问题是

- A . B型超声检查
- B . 引产
- C . 胎盘功能测定
- D . NST试验
- E . 详细询问末次月经及早孕反应

2.了解胎盘功能最常用而简便的方法是

- A . 胎动计数
- B . 尿E/C比值测定
- C . 羊膜镜检查
- D . NST
- E . 生物物理评分

3.生物物理评分中哪项异常时提示慢性缺氧

- A . 胎动次数
- B . 胎心率
- C . 胎儿肌张力
- D . 羊水量
- E . 胎儿呼吸运动

正确答案：EAD 您选择的答案：

四、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第47-50题

- A . 孕24周后
- B . 孕36周后
- C . 孕24 ~ 36周
- D . 孕30周后
- E . 孕16 ~ 20周

1. 产前检查应1周1次
2. 抽羊水作染色体检查
3. 腹部检查可区分胎头胎体
4. 宜作骨盆内测量

正确答案：BEDC 您选择的答案：

第51-54题

- A. 孕24周后
- B. 孕36周起
- C. 孕24 ~ 36周
- D. 孕30周后
- E. 孕16 ~ 20周

1. 产前检查应常规每周1次
2. 宜作骨盆径线内测量
3. 腹部检查可区别胎头，胎体
4. 抽羊水细胞作染色体检查

正确答案：BCAE 您选择的答案：

第55-57题

- A. 羊水中肌酐值
- B. 羊水震荡试验
- C. 羊水脂肪细胞出现率
- D. 羊水细胞学检查
- E. 羊水胆红素测定

1. 测定胎儿肝成熟度
2. 了解胎儿肺成熟度
3. 提示胎儿皮肤成熟度

正确答案：EBC 您选择的答案：

第58-60题

- A. 羊水肌酐值
- B. 羊水淀粉酶值
- C. 羊水胆红素类物质值
- D. 羊水卵磷脂 / 鞘磷脂比值
- E. 羊水中含脂肪细胞出现率

1. 推测胎儿肾脏成熟的指标
2. 推测胎儿肝脏成熟的指标
3. 推测胎儿肺脏成熟的指标

正确答案：ACD 您选择的答案：

第61-63题

- A. 早期减速
- B. 变异减速
- C. 晚期减速
- D. 缩宫素激惹试验阴性
- E. 无激惹试验有反应型

1. 脐带受压
2. 胎头受压
3. 胎盘功能低下

正确答案：BAC 您选择的答案：

习题集 妇产科学 计划生育、妇女保健

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 为预防人工流产综合征，下列哪项是错误的

- A 操作轻柔
- B 扩张宫颈不可粗暴，要逐步扩张
- C 反复吸刮宫壁
- D 吸宫时掌握适度的负压
- E 术前宫颈管内可放置卡孕栓

正确答案：C 您选择的答案：

第2题 人工流产术中突然头晕胸闷，血压下降，脉搏变慢，首先考虑

- A 子宫穿孔
- B 人工流产综合征
- C 术中出血
- D 羊水栓塞
- E 空气栓塞

正确答案：B 您选择的答案：

第3题 下列哪项情况不宜用口服避孕药

- A 慢性肾炎
- B 慢性肝炎
- C 糖尿病
- D 月经量过少
- E 以上都不能用

正确答案：E 您选择的答案：

第4题 最不适合行输卵管结扎的时间是

- A 月经干净后3~7天
- B 人工流产后48小时内
- C 正常产后48小时内
- D 哺乳期妇女应排除早孕后再行绝育术
- E 分娩后1周以上

正确答案：E 您选择的答案：

第5题 下述哪种情况不需要将节育器取出

- A 带器妊娠
- B 月经量超过以往3倍
- C 放置期限已满
- D 轻度腰酸、下腹部坠胀
- E 绝经后1年

正确答案：D 您选择的答案：

第6题 人工流产后10余天，仍有较多阴道出血，应首先考虑

- A 子宫穿孔
- B 吸宫不全
- C 子宫复旧不全
- D 子宫内膜炎
- E 绒毛

正确答案：B 您选择的答案：

第7题 关于节育原理，下述哪项是错误的

- A 工具避孕—阻止精卵相遇
- B 宫内节育器—阻止受精卵着床
- C 口服避孕药—抑制排卵，改变宫颈粘液性状
- D 输卵管结扎—阻断精卵相遇
- E 探亲避孕药—防止受精

正确答案：E 您选择的答案：

第8题 关于放置宫内节育器的并发症，错误的是

- A 子宫穿孔
- B 宫内节育器嵌顿
- C 月经过多
- D 盆腔炎
- E 宫颈糜烂

正确答案：E 您选择的答案：

第9题 关于避孕原理下列哪项是错误的

- A 宫内节育器阻止受精卵着床
- B 口服避孕药抑制排卵
- C 输卵管结扎阻碍精卵相遇
- D 工具避孕阻止精卵相遇
- E 探亲避孕药防止受精

正确答案：E 您选择的答案：

第10题 下列哪项不是取出宫内节育器的指征

- A 节育器移位

B. 霉菌性阴道炎  
C. 绝经后0.5~1年  
D. 放置节育器后出现月经紊乱, 经量增多已数月, 无明显改善  
E. 男方或女方已作绝育手术  
正确答案: B 您选择的答案:

第11题 下列哪项是口服避孕药的近期不良反应

A. 突破性出血  
B. 恶心、呕吐  
C. 糖耐量降低  
D. 体重增加  
E. 色素沉着

正确答案: B 您选择的答案:

第12题 关于产后检查, 下述哪项正确

A 产后1个月去医院做产后健康检查  
B 产后3个月去医院做产后健康检查  
C 产后42天去医院做产后健康检查  
D 产后56天去医院做产后健康检查  
E 产后半年去医院做产后健康检查

正确答案: C 您选择的答案:

第13题 人工流产综合征主要是由于

A 机械刺激子宫或宫颈引起迷走神经反射  
B 精神过度紧张  
C 术中出血过多  
D 吸宫不全  
E 羊水栓塞

正确答案: A 您选择的答案:

第14题 妊娠12周, 需终止妊娠, 常用的终止妊娠方法

A 钳刮术  
B 催产素静脉滴注  
C 天花粉肌肉注射  
D 负压吸引术  
E 利凡诺羊膜腔内注射

正确答案: A 您选择的答案:

第15题 妊娠60天时终止妊娠, 最常用的方法是

A. 钳刮术  
B. 负压吸引术  
C. 静滴催产素(缩宫素)  
D. 利凡诺羊膜腔内注射法  
E. 药物流产

正确答案: B 您选择的答案:

第16题 下列哪一项不是口服避孕药的禁忌

A. 严重心血管疾病患者  
B. 急、慢性肝炎或肾炎患者  
C. 急性宫颈炎患者  
D. 甲状腺功能亢进患者  
E. 哺乳期妇女

正确答案: C 您选择的答案:

第17题 我国现常用的避孕措施为

A. 避孕套  
B. 避孕药  
C. 宫内节育器  
D. 安全期避孕  
E. 免疫避孕

正确答案: C 您选择的答案:

第18题 关于人工流产下述哪项是错误的

A 人工流产是指妊娠10~21周以内用人工方法中止妊娠  
B 妊娠10周以内可用吸宫术  
C 妊娠10~14周可用钳刮术  
D 体温二次>37.5℃, 为禁忌证  
E 急性生殖器炎症为手术禁忌

正确答案: A 您选择的答案:

第19题 临床常用药流方法是

A. 米非司酮  
B. 卡孕栓  
C. 环磷酰胺  
D. 米非司酮+前列腺素  
E. 卡孕栓+前列腺素

正确答案: D 您选择的答案:

第20题 人工流产最常见的并发症是

A 吸宫不全



- B 子宫穿孔
- C 漏吸
- D 术后感染
- E 羊水栓塞

正确答案：A 您选择的答案：

第21题 关于输卵管结扎哪项是错误的

- A 结扎部位在输卵管峡部较好
- B 抽心包埋法成功率高
- C 取到输卵管要追溯至伞端再结扎
- D 经阴道手术较复杂，易发生感染
- E 因手术时间短，不必排空膀胱

正确答案：E 您选择的答案：

第22题 下列哪一项不是宫内节育器放置术禁忌证

- A 月经过多过频
- B 生殖器慢性炎症
- C 生殖器官肿瘤
- D 宫颈过松、陈旧性宫颈裂伤或子宫脱垂
- E 严重全身性疾病

正确答案：B 您选择的答案：

第23题 具有防止性传播疾病作用的避孕方法是

- A 宫内节育器
- B 阴茎套
- C 口服避孕药
- D 皮下埋植避孕
- E 安全期避孕

正确答案：B 您选择的答案：

第24题 我国现在最常用的避孕措施为

- A 避孕套
- B 阴道隔膜
- C 宫内节育器
- D 口服避孕药
- E 安全期避孕

正确答案：C 您选择的答案：

第25题 人流术后72小时突然阴道流血，最可能的诊断是

- A 吸宫不全
- B 子宫探针穿孔
- C 术后感染
- D 羊水栓塞
- E 空气栓塞

正确答案：A 您选择的答案：

第26题 放置宫内节育器的适应证是

- A 月经周期正常，经血量不多
- B 严重的急慢性系统疾病
- C 宫颈口过松或有重度陈旧性撕裂伤
- D 生殖器官炎症
- E 子宫畸形

正确答案：A 您选择的答案：

第27题 关于更年期保健内容，下列哪项不正确

- A 防治更年期月经失调
- B 定期接受妇女病普查
- C 合理安排生活，注意锻炼身体
- D 更年期保健是指年龄小于50岁妇女的保健
- E 进行肛提肌锻炼

正确答案：D 您选择的答案：

第28题 关于哺乳期保健内容，下列哪项不正确

- A 母乳喂养状况
- B 指导婴儿服饰
- C 指导避孕
- D 保持室内空气新鲜
- E 母乳喂养应定时、定量

正确答案：E 您选择的答案：

第29题 人工流产术中患者突然头晕，胸闷，出冷汗，血压下降应给予

- A 杜冷丁
- B 异丙嗪
- C 冬眠灵
- D 阿托品
- E 鲁米那

正确答案：D 您选择的答案：

第30题 关于人工流产下述哪项是错误的

- A 是指妊娠早期用人工方法终止妊娠的手术

B 指妊28周内用人工方法终止妊娠的手术  
C 负压吸引术适用于妊10周以内者  
D 钳刮术适用于妊11~14周  
E 体温二次, 37.5 为手术禁忌证  
正确答案: B 您选择的答案:

第31题 关于早产, 下述哪项正确  
A 妊娠满20周至不满37足周间分娩  
B 妊娠满28周至不满37足周间分娩  
C 妊娠满28周至不满38足周间分娩  
D 妊娠满28周至妊娠满37足周间分娩  
E 妊娠满28周至妊娠满38足周间分娩  
正确答案: B 您选择的答案:

第32题 负压吸引术最大的并发症是  
A. 组织残留  
B. 漏吸  
C. 误吸  
D. 子宫穿孔  
E. 感染  
正确答案: D 您选择的答案:

第33题 关于输卵管结扎术时间选择哪项不正确  
A 非孕妇女月经净后3~4天  
B 产后48小时内  
C 人工流产后48小时内  
D 非孕妇女在月经来潮前3~7天  
E 哺乳期排除早期妊娠  
正确答案: D 您选择的答案:

第34题 宫内节育器和类固醇避孕药相同的机制是  
A. 子宫内膜非细菌性异物反应  
B. 产生前列腺素  
C. 不利孕卵着床  
D. 抑制卵泡的正常发育和排卵  
E. 吞噬细胞功能明显活跃  
正确答案: C 您选择的答案:

第35题 关于输卵管结扎术的安全措施, 下列哪项不恰当  
A. 有感染存在或体质过度虚弱者, 暂缓手术  
B. 神经官能症或对手术有极大顾虑者必须慎重考虑  
C. 非孕手术应选在月经后10~20天  
D. 结扎前必须确认输卵管, 并追踪至伞端  
E. 人工流产后即可行结扎术  
正确答案: C 您选择的答案:

第36题 人工流产吸宫术适用于  
A. 妊娠3周内  
B. 妊娠10周内  
C. 妊娠12周内  
D. 妊娠14周内  
E. 以上均可  
正确答案: B 您选择的答案:

第37题 妊娠16周, 需终止妊娠, 最常用的方法是  
A 钳刮术  
B 催产素静脉滴注  
C 天花粉肌肉注射  
D 负压吸引术  
E 利凡诺尔羊膜腔内注射  
正确答案: E 您选择的答案:

第38题 妊娠8周时, 终止妊娠最常采用的方法是  
A 钳刮术  
B 芫花宫腔内引产  
C 负压吸引术  
D 静脉滴注催产素  
E 利凡诺尔羊膜腔内注射  
正确答案: C 您选择的答案:

第39题 关于围生期的规定, 下列哪项不对  
A 妊娠满20周至产后1周  
B 妊娠满28周至产后1周  
C 妊娠满20周至产后4周  
D 妊娠满28周至产后4周  
E 从胚胎形成至产后1周  
正确答案: A 您选择的答案:

第40题 关于母乳喂养哪项不对  
A 母乳是婴儿的必需食品

B 母乳含丰富的抗感染物质  
C 母乳喂养能延长生育间隔  
D 母乳喂养最佳时间是半年  
E 有利于促进婴幼儿心理和社会适应性的发育  
正确答案：D 您选择的答案：

第41题 关于孕期的妇女劳动保护，哪项错误  
A 孕期不得加班，加点  
B 满七个月后不得上夜班  
C 不得在孕期、产期、哺乳期降低基本工资  
D 劳动时间进行产前检查，可按劳动工时计算  
E 对有四次自然流产史者，方可调离原岗位  
正确答案：E 您选择的答案：

第42题 负压吸引术危害最大的并发症是  
A 组织残留  
B 漏吸  
C 误吸  
D 子宫穿孔  
E 感染  
正确答案：D 您选择的答案：

第43题 下列哪项是口服避孕药的不良反应  
A 血压升高  
B 类早孕反应  
C 体重减轻  
D 月经量增加  
E 引起继发不孕  
正确答案：B 您选择的答案：

第44题 解除宫腔粘连后为防止再次粘连应采取下列哪项措施  
A 宫内放置宫内节育器3个月  
B 阴道局部置消炎药  
C 全身抗生素  
D 宫腔纱布填塞  
E 止痛剂  
正确答案：A 您选择的答案：

第45题 下述哪项是输卵管结扎的禁忌证  
A 已婚妇女要求绝育  
B 第二次剖宫产时  
C 滞产产后  
D 正常分娩后48小时内  
E 心脏病心功I级  
正确答案：C 您选择的答案：

第46题 关于产后计划生育指导，哪项错误  
A 产褥期内禁忌性交  
B 产后首选的避孕措施为宫内节育器  
C 产后42日起应采取避孕措施  
D 哺乳者以工具避孕为宜  
E 不哺乳者可选用药物避孕  
正确答案：B 您选择的答案：

第47题 关于宫内节育器的放置，下列说法中哪个不正确  
A 生殖器官有肿瘤时不宜放置  
B 产后一般满3个月放置  
C 常规为月经干净后3~7日放置  
D 子宫畸形时无影响  
E 月经过多过频不宜放置  
正确答案：D 您选择的答案：

第48题 关于产前检查时间下述哪项错误  
A 妊娠20周起开始进行  
B 确诊早孕即行第一次产前检查，无异常于妊娠20周开始进行产前系列检查  
C 妊娠20~36周起每4周检查一次  
D 妊娠36周起每周检查一次  
E 非高危孕妇，妊娠产前检查次数为10次  
正确答案：A 您选择的答案：

第49题 宫内节育器的避孕机理主要是  
A 阻止精子和卵子相遇  
B 影响卵巢排卵  
C 阻止受精卵着床  
D 阻止精子进入输卵管  
E 影响卵子功能  
正确答案：C 您选择的答案：

第50题 一产妇产后半月月经未复潮，仍在哺乳要求避孕，经查：宫颈光滑，外口松，宫颈位于阴道口以上2cm，子宫大小正常，后倾，无压痛，活动，附件无异常。最佳的避孕方法是

- A. 口服避孕药
- B. 输卵管结扎
- C. 宫内节育器
- D. 阴茎套
- E. 阴道隔膜

正确答案：D 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第51题 29岁女性，人工流产术中突感胸闷、头晕、恶心。查体：面色苍白、大汗淋漓，血压70/50mmHg，脉搏50次/分。此时应首先给予

- A. 输血补液
- B. 阿托品静脉注射
- C. 苯巴比妥钠肌注
- D. 迅速清除宫腔内容物
- E. 阿拉明静脉滴注

正确答案：B 您选择的答案：

第52题 患者，30岁。二孕一产，月经过少一年，患滴虫性阴道炎，选用何种方法避孕

- A. 宫内节育器
- B. 安全期避孕
- C. 避孕套
- D. 阴道隔膜
- E. 口服避孕药

正确答案：C 您选择的答案：

第53题 女，28岁，哺乳期闭经。体检：宫颈着色，子宫如孕3个月大小，质软，双附件正常。做钳刮术，术中夹出黄色脂肪样组织，患者感到有剧烈牵拉性疼痛，伴恶心、呕吐。该患者的诊断是

- A. 人流综合征
- B. 子宫穿孔
- C. 葡萄胎
- D. 宫外孕
- E. 吸宫不全

正确答案：B 您选择的答案：

第54题 人流术后3天微热，下腹坠痛并有血性分泌物，子宫稍大，触痛明显，附件正常，应考虑

- A. 吸宫不全
- B. 子宫肌炎
- C. 子宫颈粘连
- D. 子宫复旧不全
- E. 宫腔积血

正确答案：B 您选择的答案：

第55题 患者，27岁。妊娠9周，初孕，人流术中突然头晕面色苍白，恶心，伴血压下降，脉搏细弱，最可能为

- A. 羊水栓塞
- B. 空气栓塞
- C. 人流反应综合征
- D. 吸宫不全
- E. 子宫穿孔

正确答案：C 您选择的答案：

第56题 妊娠8周行吸宫术后半月，阴道持续流血，量时多时少。妇科检查：宫口松，子宫如40天妊娠大小，较软，尿妊娠试验阳性，应考虑的诊断是

- A. 绒毛膜癌
- B. 侵蚀性葡萄胎
- C. 子宫内膜炎
- D. 吸宫不全
- E. 子宫复旧不良

正确答案：D 您选择的答案：

第57题 女，29岁，已服避孕药5个月，最初3个月月经来潮时间及量均正常，近2个月在经前5~7天，未停药前开始有少量阴道出血，持续至月经来潮。恰当的处理是

- A. 改用其他方法避孕
- B. 提前停药
- C. 加服炔雌醇
- D. 加服1/2~1片避孕药
- E. 用抗生素防治感染

正确答案：D 您选择的答案：

第58题 某患者，人工流产后，不规则流血15天，药物治疗无效，子宫稍大，软，宫口开大，应考虑

- A. 子宫内膜炎
- B. 吸宫不全
- C. 功血
- D. 宫颈粘连
- E. 子宫复旧不全

正确答案：B 您选择的答案：

第59题 女，26岁，G1P1，皮下埋植缓释孕酮类避孕药已3个月，不规则阴道少量出血2个月，用一般止血剂及抗生素

后无好转，应用下列哪种激素治疗为宜

- A. 孕激素
- B. 雌激素
- C. 雄激素
- D. 肾上腺皮质激素
- E. 雌激素+雄激素

正确答案：B 您选择的答案：

第60题 患者，妊娠7周。早孕反应严重，恶心、呕吐，人流后一周，无阴道流血，无腹痛，但恶心，呕吐持续存在，查尿妊娠试验(+)，最可能诊断

- A. 漏吸
- B. 吸宫不全
- C. 肝炎
- D. 子宫穿孔
- E. 盆腔炎

正确答案：A 您选择的答案：

第61题 女，妊娠8周要求终止妊娠。最常采用的方法为

- A. 钳刮术
- B. 利凡诺羊膜腔外注射
- C. 利凡诺羊膜腔内注射
- D. 负压吸引术
- E. 静滴催产素(缩宫素)

正确答案：A 您选择的答案：

第62题 人流手术，患者突然感到头晕、胸闷、检查：脉搏54次/分，血压70/50mmHg，此时应选何种药物

- A. 鲁米那
- B. 杜冷丁
- C. 异丙嗪
- D. 阿托品
- E. 50%葡萄糖+维生素C

正确答案：D 您选择的答案：

第63题 女，27岁，G2P1，产后半年月经未复潮，仍在哺乳，要求避孕。查宫颈光滑，外口松，宫颈位于阴道口以上2cm，子宫大小正常，后倾，无压痛，活动，附件无异常。选用以下哪种避孕方法好

- A. 宫内节育器
- B. 口服避孕药
- C. 安全期避孕
- D. 阴茎套
- E. 体外排精法

正确答案：D 您选择的答案：

第64题 患者，28岁。人流术后42天，下腹坠痛2天，不伴发热，检查：子宫增大，触痛明显，可能的诊断是

- A. 子宫内膜炎
- B. 宫颈粘连
- C. 子宫复旧不良
- D. 月经不调
- E. 吸宫不全

正确答案：B 您选择的答案：

第65题 人工流产后38天五月经，近4天下腹及肛门坠痛难忍，子宫近鸭卵大，附件正常，首先应如何处置

- A. 尿妊娠试验
- B. 再次吸宫
- C. 剖腹探查
- D. 探宫腔
- E. 子宫造影

正确答案：D 您选择的答案：

第66题 30岁，孕5产3，月经(3~4)/(24~34)天，量中等，阴道前后壁膨出，宫颈糜烂°，宫口松，子宫后位正常大，附件正常，要求避孕，何法最好

- A. 阴道隔膜
- B. 宫内节育器
- C. 口服避孕药
- D. 阴茎套
- E. 安全期避孕

正确答案：C 您选择的答案：

三、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第67-69题

24岁女性，停经58天，13天前行人工流产吸宫术。术后持续阴道流血。

1. 初步考虑的诊断是

- A. 子宫穿孔
- B. 吸宫不全
- C. 子宫内膜炎
- D. 子宫复旧不良
- E. 漏吸

2. 为明确诊断，首先应选用的辅助检查法是

- A. 腹腔镜检查
  - B. 子宫镜检查
  - C. B型超声检查
  - D. HCG测定
  - E. 血常规检查
3. 确诊后首选的治疗措施是

- A. 应用抗生素
- B. 抗生素+宫缩剂
- C. 抗生素+止血剂
- D. 抗生素+清宫术
- E. 宫缩剂+清宫术

正确答案：BCD 您选择的答案：

#### 第70-71题

女，32岁，有先心病史，心功能无改变，第2次行剖宫产术，要求行绝育术。

1. 应选用的绝育措施为

- A. 宫内节育器
- B. 口服避孕药
- C. 工具避孕
- D. 安全期避孕
- E. 输卵管结扎术

2. 手术时间最好选择在

- A. 第2次剖宫产术时
- B. 剖宫产后24小时后
- C. 产后月经恢复后，月经干净3~4天
- D. 剖宫产后48小时内
- E. 人流术后48小时内

正确答案：EA 您选择的答案：

#### 第72-74题

患者，24岁。人流术后一周，突然阴道流血增多，伴腹痛，无发热，查子宫稍大软，压痛(±)，附件正常

1. 可能诊断是

- A. 漏吸
- B. 吸宫不全
- C. 子宫内膜炎
- D. 子宫穿孔
- E. 羊水栓塞

2. 上述病例，为确诊应行的检查是

- A. 血hCG
- B. 宫腔镜
- C. B超
- D. 腹平片
- E. 子宫造影

3. 该病人诊断为吸宫不全的下一步处置应为

- A. 刮宫术
- B. 子宫切除
- C. 催产素肌注
- D. 益母丸口服
- E. 观察经过

正确答案：BCA 您选择的答案：

#### 第75-76题

女，30岁，孕2产1，儿子健康，月经量少，患滴虫性阴道炎。

1. 近期宜选用以下哪种方法避孕

- A. 口服避孕药
- B. 宫内节育器
- C. 避孕套
- D. 安全期避孕
- E. 输卵管结扎术

2. 经灭滴灵(甲硝唑)等药物治疗3个月后，阴道炎治愈，欲长期避孕首选的避孕方法为

- A. 口服避孕药
- B. 宫内节育器
- C. 避孕套
- D. 安全期避孕
- E. 输卵管结扎术

正确答案：CB 您选择的答案：

#### 第77-79题

患者，34岁。既往有风心病史，心功无改变，重复剖宫产术

1. 术中应选的避孕措施是

- A. 上环
- B. 输卵管结扎术
- C. 口服避孕药
- D. 工具避孕
- E. 安全期避孕

2. 关于结扎时间的选择哪项正确

- A. 二次剖宫产时
- B. 剖宫产后一个月
- C. 人流术后一周内
- D. 月经前3~7天

E 滞产产后  
3. 结扎术中的注意事项哪个不正确  
A 抽心包埋法, 成功率高  
B 提出输卵管, 追溯到伞端后再结扎  
C 有生殖器感染者不宜手术  
D 经阴道手术操作简单, 不易感染  
E 术前排空膀胱  
正确答案: BAD 您选择的答案:

第80-82题

26岁, 人流后1周, 发热6天, 右下腹痛2天, 追问病史术后有性交史。体检: 急性病容, 体温39, 血压90 / 70mmHg, 心率112次 / 分, 右下腹有压痛、反跳痛。妇科检查: 阴道有少量粉红色分泌物, 宫颈有举痛, 宫口闭, 子宫正常大、有压痛, 双附件稍增厚、压痛。白细胞 $150 \times 10^9 / L$ , 中性0.90。

1. 最可能的诊断是  
A. 急性盆腔炎  
B. 肾盂肾炎  
C. 肠炎  
D. 阑尾炎  
E. 膀胱炎  
2. 对指导治疗最有价值的检查是  
A. 血常规  
B. 血FSH  
C. 血沉  
D. 病原体检查  
E. 尿HCG检查  
3. 在化验结果出来之前最合适的处理是  
A. 解热止痛片  
B. 腹部置冰袋  
C. 少量输血  
D. 后穹窿穿刺  
E. 广谱抗生素静滴  
正确答案: ADE 您选择的答案:

第83-85题

患者, 27岁。早孕7周, 行人工流产术中, 患者突然恶心, 出冷汗, 查体: 面色苍白, BP 70/50mmHg, P60次/分

1. 该患者首先考虑为  
A 子宫穿孔  
B 羊水栓塞  
C 空气栓塞  
D 人流反应综合征  
E 漏吸  
2. 该患下一步处置为  
A 阿托品0.5mg im(肌注)  
B 异丙嗪25mg im  
C 氯丙嗪25mg im  
D 杜冷丁50mg im  
E 杜、非半量肌注  
3. 如何操作能减少上述情况的出现  
A 反复吸刮以防残留  
B 扩张宫颈要轻柔  
C 人流手术尽量在妊娠40天内进行  
D 人流手术时负压要大  
E 人流手术时要保证足够的手术时间  
正确答案: DAB 您选择的答案:

四、A4型题: 以下提供若干个案例, 每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息, 在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第86-89题

女, 24岁, 哺乳期, 孕46天行负压吸引人工流产术, 突然出现头晕、胸闷, 血压下降, 脉搏变慢。

1. 首先考虑  
A. 子宫穿孔  
B. 人工流产综合征  
C. 出血性休克  
D. 羊水栓塞  
E. 空气栓塞  
2. 进一步的处理  
A. 静注阿托品0.5~1mg  
B. 宫颈注射催产素(缩宫素)  
C. 在B超监视下继续清宫  
D. 剖腹探查  
E. 多巴胺20mg加入5%葡萄糖液250ml静滴  
3. 若器械进入宫腔出现“无底”的感觉, 考虑可能发生  
A. 漏吸  
B. 人工流产综合征  
C. 栓塞  
D. 子宫穿孔  
E. 感染  
4. 进一步处理为

- A. 立即停止手术
- B. 立即停止手术，给予催产素(缩宫素)和抗生素，并严密观察生命体征
- C. 在B超监护下继续清宫
- D. 在腹腔镜监护下继续清宫
- E. 剖腹探查

正确答案：BADB 您选择的答案：

五、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

#### 第90-91题

- A. I期
  - B. a期
  - C. b期
  - D. a期
  - E. b期
1. 侵葡、绒癌病变转移至阴道
  2. 侵葡、绒癌转移至左肺，多个病灶总面积占左肺的1/3

正确答案：CD 您选择的答案：

#### 第92-94题

- A. 改变宫腔内环境，妨碍受精卵着床
  - B. 杀精子或改变精子功能
  - C. 抑制排卵
  - D. 改变宫颈粘液性状，不利于精子穿透
  - E. 阻止精子进入宫腔
1. 带铜宫内节育器避孕原理为
  2. 外用避孕药膜的避孕原理为
  3. 阴茎套的避孕原理为

正确答案：ABE 您选择的答案：

#### 第95-98题

- A. 加用维生素B，继续服药
  - B. 继续服药加服1片避孕药
  - C. 停止服药5天后，服药周期重新开始
  - D. 改用其他避孕措施
  - E. 诊断性刮宫
1. 24岁，丈夫刚从外地回来，于月经第5天开始服避孕I号药，每日1片，出现恶心。如何处理
  2. 28岁，服避孕1号避孕，于月经第20天阴道出血，量多。如何处理
  3. 26岁，服避孕1号避孕，于月经第10天漏服1粒后有少量出血。如何处理
  4. 34岁，连续3个周期在停服避孕1号5天后不转经，如何处理

正确答案：ACBD 您选择的答案：

#### 第99-102题

- A. 易引起DIC
  - B. 易引起失血性休克
  - C. 易引起宫腔粘连
  - D. 易引起人流综合征
  - E. 易引起子宫穿孔
1. 人工流产术中反复吸刮宫腔
  2. 哺乳期妊娠子宫人流时
  3. 人流术中过度刺激宫颈
  4. 不全流产

正确答案：CEDB 您选择的答案：

#### 第103-106题

- A. 负压吸引术+取环
  - B. RU486+米索前列醇引产
  - C. 天花粉羊膜腔内引产
  - D. 利凡诺羊膜腔内引产
  - E. 水囊引产
1. 24岁，停经16周，有支气管哮喘史，B超提示宫内中期妊娠。应首选以上哪种方法引产
  2. 32岁，肾病综合征，日常服用泼尼松10mg/天，现孕20周，因病情加重，血压高达150/100mmHg，尿蛋白(++)，需终止妊娠，应采取以上哪种方法引产
  3. 36岁，剖宫产后8个月哺乳，闭经2个月，感恶心、呕吐。检查：宫颈着色，宫体前倾，12周大小，极软，尿HCG(+)。该妇女为过敏体质，要求终止妊娠，应选用上述哪种方法
  4. 32岁，置金属环10年，因停经40天来院就诊。妇科检查：宫颈着色，子宫体饱满、软，孕6周大小。尿HCG(+)。B超显示宫内妊娠、节育环上移。要求终止妊娠，应选用哪种方法

正确答案：DEBA 您选择的答案：

#### 第107-110题

- A. 易导致DIC
- B. 易引起失血性休克
- C. 易引起宫腔粘连
- D. 易引起人流综合征
- E. 易引起子宫穿孔



1. 人工流产术中反复吸刮宫腔
  2. 哺乳期子宫人流时
  3. 人流术中过度刺激宫颈
  4. 吸宫不全
- 正确答案：CEDB 您选择的答案：

第111-114题

- A. 易引起DIC
  - B. 易引起失血性休克
  - C. 易引起宫腔粘连
  - D. 易引起人流综合征
  - E. 易引起子宫穿孔
1. 人工流产中反复吸刮宫腔
  2. 哺乳期妊娠子宫人流时
  3. 人流术中过度刺激宫颈
  4. 不全流产
- 正确答案：CEDB 您选择的答案：

第115-119题

- A. 阻止精子进入女性生殖道与卵子相遇
  - B. 抑制排卵，改变宫颈黏液的稠度
  - C. 作用环节主要在宫颈黏液和子宫内膜
  - D. 通过局部效应，使子宫内膜发生慢性轻度非细菌性炎症反应
  - E. 利用药物杀死精子
1. 阴茎套
  2. 宫内节育器
  3. 短效避孕药
  4. 探亲避孕药
  5. 局部应用避孕药
- 正确答案：ADBCE 您选择的答案：

第120-121题

- A 5-氟尿嘧啶(5-FU)
  - B 更生霉素(KSM)
  - C 氮甲蝶呤(MTX)
  - D 6-巯基嘌呤(6-MP)
  - E 5-Fu+KSM
1. 侵葡阴道转移结节局部选用
  2. 绒癌脑转移，鞘内注射选用
- 正确答案：AC 您选择的答案：