

习题集 病理学 乳腺及女性生殖系统疾病

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 绒毛膜癌最常转移的器官是

- A 脑
- B 肝
- C 肺
- D 骨
- E 肾上腺

正确答案：C 您选择的答案：

第2题 乳腺癌的起源部位主要是

- A 导管上皮
- B 腺泡上皮
- C 真皮汗腺上皮
- D 纤维囊性乳腺病
- E 纤维腺瘤

正确答案：A 您选择的答案：

第3题 乳腺癌最先转移到哪个部位淋巴结

- A 同侧腋窝淋巴结
- B 锁骨上淋巴结
- C 对侧腋窝淋巴结
- D 纵隔淋巴结
- E 乳内淋巴结

正确答案：A 您选择的答案：

第4题 诊断早期宫颈癌最可靠的依据是

- A 有接触性出血史
- B 阴道镜检查
- C 盆腔检查
- D 宫颈细胞学检查
- E 宫颈病理切片检查

正确答案：E 您选择的答案：

第5题 绒毛膜上皮癌不同于恶性葡萄胎的病变是

- A 滋养层细胞增生明显
- B 增生细胞异型性明显
- C 可发生肺转移
- D 无绒毛结构
- E 阴道有转移结节

正确答案：D 您选择的答案：

第6题 子宫颈癌好发部位是

- A 子宫颈管
- B 子宫颈内口
- C 子宫颈外口
- D 子宫颈前唇
- E 子宫颈后唇

正确答案：C 您选择的答案：

第7题 乳腺癌时局部皮肤橘皮样外观主要是由于癌细胞

- A 阻塞淋巴管，皮肤水肿，毛囊汗腺处皮肤相对下陷
- B 压迫局部静脉，造成淤血水肿
- C 引起局部组织炎性渗出，水肿
- D 阻塞乳腺导管，造成乳汁淤积
- E 生长迅速，向皮肤表面突出形成结节

正确答案：A 您选择的答案：

第8题 绒癌的病理特点哪项除外

- A 滋养层细胞高度增生有异型性
- B 肿块有大量出血
- C 肿块有坏死
- D 形成绒毛结构
- E 癌细胞呈团、呈片排列

正确答案：D 您选择的答案：

第9题 宫颈早期浸润癌是指

- A 癌浸润深度不超过基底膜下5mm
- B 癌浸润深度超过基底膜5mm
- C 癌浸润深度不超过基底膜下3cm
- D 癌浸润深度超过基底膜1mm
- E 癌浸润深度在基底膜下0.5~1cm

正确答案：A 您选择的答案：

第10题 侵蚀性葡萄胎与绒毛膜癌的主要不同为

- A 浸润肌层

- B. 细胞明显增生和具异性
- C. 转移阴道结节
- D. 出血坏死
- E. 有绒毛结构

正确答案：E 您选择的答案：

第11题 乳腺癌的癌前病变是

- A. 纤维腺癌
- B. 纤维囊性乳腺病伴不典型增生
- C. 硬化性乳腺病
- D. 乳腺导管上皮汗腺样化生
- E. 乳腺结构不良

正确答案：B 您选择的答案：

第12题 恶性葡萄胎与绒毛膜癌主要的区别是

- A. 阴道转移结节
- B. 浸润肌层
- C. 细胞异型性
- D. 有绒毛结构
- E. 出血坏死

正确答案：D 您选择的答案：

第13题 下列哪项不符合葡萄胎

- A. 绒毛间质水肿，血管消失
- B. 绒毛滋养层上皮细胞明显增生
- C. 无胎动及胎心音
- D. 子宫体积比正常妊娠月份大
- E. 绒毛膜促性腺激素分泌减少

正确答案：E 您选择的答案：

第14题 浸润性子宫颈癌指肿瘤浸润深度至少要超过基底膜下

- A. 1mm
- B. 2mm
- C. 4mm
- D. 5mm
- E. 3mm

正确答案：D 您选择的答案：

第15题 乳腺癌最常见的组织学类型是

- A. 小叶癌
- B. 粉刺癌
- C. Paget病
- D. 浸润性小叶癌
- E. 浸润性导管癌

正确答案：E 您选择的答案：

第16题 关于子宫颈鳞癌发生发展过程下列哪一项是正确的

- A. 上皮增生—原位癌—浸润癌
- B. 早期浸润癌—原位癌—浸润癌
- C. 上皮不典型增生—早期浸润癌—浸润癌
- D. 原位癌—早期浸润癌—浸润癌
- E. 上皮不典型增生—原位癌—早期浸润癌—浸润癌

正确答案：E 您选择的答案：

第17题 乳腺癌最易发生转移的是

- A. 导管内癌
- B. 筛状癌
- C. 髓样癌
- D. 硬癌
- E. 粘液癌

正确答案：D 您选择的答案：

第18题 恶性葡萄胎与良性葡萄胎的主要区别是

- A. 绒毛消失
- B. 可见水肿绒毛
- C. 滋养细胞增生
- D. 绒毛侵犯子宫壁深部肌层
- E. 绒毛间质血管消失

正确答案：D 您选择的答案：

第19题 乳腺癌最常见的发生部位是

- A. 外上象限
- B. 外下象限
- C. 内上象限
- D. 内下象限
- E. 乳头部

正确答案：A 您选择的答案：

第20题 子宫颈癌发生和进展阶段的正确顺序是

- A. 非典型增生-浸润癌-原位癌-早期浸润癌

B. 原位癌-浸润癌-非典型增生-早期浸润癌  
C. 非典型增生-原位癌-早期浸润癌-浸润癌  
D. 原位癌-非典型增生-浸润癌-早期浸润癌  
E. 非典型增生-原位癌-浸润癌-早期浸润癌  
正确答案：C 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第21题 某乳癌患者，病检发现癌实质多，间质成分少，癌细胞呈片状或巢状，中央有坏死，间质无淋巴细胞浸润，应诊为  
A. 单纯癌  
B. 硬癌  
C. 髓样癌  
D. 小叶原位癌  
E. 导管内原位癌  
正确答案：C 您选择的答案：

第22题 中年女性，一年前有流产史，现阴道流血不止，贫血外观，子宫体积增大。近来咳嗽、咯血。最可能的诊断是  
A. 肺癌  
B. 肺结核  
C. 子宫绒毛膜癌  
D. 葡萄胎  
E. 子宫内膜癌  
正确答案：C 您选择的答案：

第23题 某患者乳腺发生癌变，病检发现癌细胞突破导管基底膜进入间质，呈实性条索、小梁或集团状，无明显腺样结构，实质与间质大致相当，此癌是  
A. 导管内原位癌  
B. 硬癌  
C. 小叶原位癌  
D. 髓样癌  
E. 浸润性导管单纯癌  
正确答案：E 您选择的答案：

第24题 某一女性患者，半年前人工流产后月经淋漓不断，现咳嗽，咳血入院，住院后，3个月死亡，尸检发现，左肺下叶圆形病灶为大片红染坏死物，周边有滋养层细胞，异型显著，应诊为  
A. 肺癌  
B. 绒毛膜癌  
C. 绒毛膜癌，肺转移  
D. 葡萄胎  
E. 肺癌转移  
正确答案：C 您选择的答案：

第25题 青年女性，闭经3个月，阴道不规则出血，血块中夹有水泡。检查发现子宫体积大，阴道壁有暗紫色结节、出血、坏死。最大可能是  
A. 宫外孕  
B. 葡萄状肉瘤  
C. 葡萄胎  
D. 恶性葡萄胎  
E. 绒毛膜癌  
正确答案：D 您选择的答案：

第26题 成年女性，半年前发现左乳外上象限有一无痛性肿块，近期生长快，直径约5cm。术后病理检查：肿物色灰白，质脆，界限不清。镜下瘤细胞排列成实性团片状，瘤细胞量与间质量大致相等，瘤细胞异型性明显，呈浸润性生长。病理诊断应为  
A. 恶性淋巴瘤  
B. 乳腺粉刺样癌  
C. 乳腺硬癌  
D. 乳腺不典型髓样癌  
E. 乳腺单纯癌  
正确答案：E 您选择的答案：

第27题 女性，52岁，阴道不规则出血，阴道镜检查见子宫颈有菜花样肿物，表面出血坏死。最可能的诊断是  
A. 宫颈糜烂  
B. 宫颈息肉  
C. 宫颈癌  
D. 宫颈囊肿  
E. 宫颈肥大  
正确答案：C 您选择的答案：

第28题 某孕妇体检时发现其血尿中HCG水平显著增高，该孕妇可能患有  
A. 宫颈癌  
B. 乳腺癌  
C. 葡萄胎  
D. 肝癌  
E. 肺癌  
正确答案：C 您选择的答案：

三、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第29-31题

- A. 葡萄胎
- B. 恶性葡萄胎
- C. 绒毛膜癌
- D. 子宫颈癌
- E. 乳腺癌

1. 子宫颈出现菜花状肿块、质脆易出血应考虑是
2. 癌细胞呈团块状排列、出血明显、无肿瘤间质，应考虑是
3. 乳头下陷、同侧腋窝淋巴结肿大，应考虑是

正确答案：DCE 您选择的答案：

第32-35题

- A. 癌前病变
- B. 原位癌
- C. 良性增生
- D. 浸润性癌
- E. 炎症

1. 乳腺导管内癌
2. 宫颈鳞状上皮重度不典型增生
3. 宫颈息肉
4. 乳腺实性癌

正确答案：BAED 您选择的答案：

第36-38题

- A. 子宫颈癌0期
- B. 子宫颈癌Ⅰ期
- C. 子宫颈癌Ⅱ期
- D. 子宫颈癌Ⅲ期
- E. 子宫颈癌Ⅳ期

1. 癌灶扩展到盆壁，累及阴道下1/3
2. 原位癌
3. 癌严格局限于子宫颈

正确答案：CAB 您选择的答案：

第39-41题

- A. 乳腺浸润性癌
- B. 乳腺导管内原位癌
- C. 乳腺小叶原位癌
- D. Paget病
- E. 乳腺炎样癌

1. 癌细胞来自小叶的终末导管及腺泡，未穿破基底膜，累及小叶
2. 癌细胞穿破乳腺导管或腺泡的基底膜而侵入间质者
3. 癌细胞局限于中小导管内，管壁基底膜完整

正确答案：CAB 您选择的答案：