

习题集 病理学 细胞与组织的损伤和修复

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 脂肪变性的病因是

- A. 营养障碍
- B. 感染
- C. 中毒
- D. 缺氧
- E. 以上均是

正确答案：E 您选择的答案：

第2题 下列情况，哪一项不是化生

- A. 萎缩性胃炎时，胃黏膜内出现肠上皮
- B. 骨化性肌炎时，出现数量不一的骨组织
- C. 慢性胆囊炎时，黏膜上皮变为鳞状上皮
- D. 慢性支气管炎时，假复层纤毛柱状上皮变为鳞状上皮
- E. 肝炎时，肝细胞大量增生

正确答案：E 您选择的答案：

第3题 引起气性坏疽的常见原因是

- A. 空气进入肌肉并且细菌感染
- B. 真菌感染
- C. 伤口合并腐败菌感染
- D. 由产气荚膜杆菌等厌氧菌感染
- E. 干性坏疽伴有感染

正确答案：D 您选择的答案：

第4题 下述哪项与液化性坏死无关

- A. 脑软化
- B. 化脓菌感染
- C. 急性胰腺炎
- D. 脂肪坏死
- E. 肾梗死

正确答案：E 您选择的答案：

第5题 湿性坏疽常发生在

- A. 脑、脾、肝
- B. 脑、肠、子宫
- C. 肺、肠、肝
- D. 肺、肠、子宫
- E. 肺、肾、脑

正确答案：D 您选择的答案：

第6题 下列器官坏死，哪一种属于液化性坏死

- A. 心脏
- B. 肺脏
- C. 肝脏
- D. 脾脏
- E. 脑

正确答案：E 您选择的答案：

第7题 细胞水肿时、主要发生病变的细胞器是

- A. 线粒体和内质网
- B. 高尔基复合体和线粒体
- C. 核糖体和内质网
- D. 内质网和中心体
- E. 核糖体和中心体

正确答案：A 您选择的答案：

第8题 肝细胞脂肪变性的脂滴其主要成分是

- A. 脂蛋白
- B. 类脂
- C. 胆固醇
- D. 脂褐素
- E. 中性脂肪

正确答案：E 您选择的答案：

第9题 对萎缩概念理解正确的是

- A. 组织或器官内细胞少和小
- B. 发育正常的器官、组织内实质细胞小和少
- C. 组织或器官内间质减少
- D. 萎缩性病变一般不能恢复
- E. 凡是比正常体积小的细胞、组织和器官

正确答案：B 您选择的答案：

第10题 下列哪项不属于细胞和组织的适应性反应

- A. 肥大

- B 增生
- C 萎缩
- D 变性
- E 化生

正确答案：D 您选择的答案：

第11题 下列不属于代偿性肥大的是哪项

- A ．经锻炼的骨骼肌肥大
- B ．高血压引起的心肌肥大
- C ．一侧肾脏切除后，另一侧肾脏的肥大
- D ．雌激素影响下的妊娠子宫
- E ．以上均不属于代偿性肥大

正确答案：D 您选择的答案：

第12题 下列哪一项再生能力最强

- A ．被覆上皮及淋巴造血组织
- B ．各种腺上皮细胞
- C ．肉芽组织
- D ．原始间叶细胞
- E ．骨膜细胞

正确答案：A 您选择的答案：

第13题 下列关于肉芽组织的描述错误的是

- A ．肉芽组织由新生的毛细血管及成纤维细胞构成
- B ．肉芽组织可抗感染保护创面
- C ．肉芽组织可填补创口缺损
- D ．肉芽组织鲜红色颗粒状、质韧
- E ．其中常有大量渗出液及炎细胞

正确答案：D 您选择的答案：

第14题 关于细胞水肿下列叙述中哪项是不正确

- A 细胞膜受损钠泵功能障碍所致
- B 胞浆疏松并透明
- C 胞核淡染或稍大，有时不清
- D 属于可恢复性病变
- E 继续发展，可形成玻璃样变

正确答案：E 您选择的答案：

第15题 脂肪变性常见于

- A ．肺
- B ．肝
- C ．脾
- D ．脑
- E ．脂肪组织

正确答案：B 您选择的答案：

第16题 高血压病时，血管壁的玻璃样变性主要发生在

- A 小动脉
- B 中等动脉
- C 大动脉
- D 静脉
- E 细小动脉

正确答案：E 您选择的答案：

第17题 下列哪一项不属于化生

- A 慢性萎缩性胃炎时胃粘膜内出现肠上皮
- B 食管粘膜内出现灶状胃粘膜组织
- C 骨化性肌炎时大量成纤维细胞增生并可见骨组织
- D 慢性膀胱炎时可见移行上皮变为鳞状上皮
- E 胆石症时胆囊粘膜出现鳞状上皮

正确答案：B 您选择的答案：

第18题 细胞浆嗜酸性坏死最常见于

- A 心肌梗死
- B 肺梗死
- C 病毒性肝炎
- D 脾梗死
- E 肾梗死

正确答案：C 您选择的答案：

第19题 萎缩细胞在电镜下，最显著特点是

- A 肌丝增多
- B 线粒体增多
- C 滑面内质网增多
- D 自噬泡增多
- E 粗面内质网增多

正确答案：D 您选择的答案：

第20题 细胞坏死镜下主要形态表现是

- A 核浓缩，核膜破裂，胞浆浓缩

B 核溶解，胞浆浓缩，核膜破裂  
C 核破裂，胞浆浓缩，胞核破裂  
D 核浓缩，核碎裂，核溶解  
E 核碎裂，胞浆浓缩，核膜破裂  
正确答案：D 您选择的答案：

第21题 细胞坏死的镜下主要形态变化是

A 核固缩，核碎裂，核溶解  
B 核固缩，核膜破裂，胞浆浓缩  
C 核碎裂，胞浆浓缩  
D 胞膜破裂，胶原纤维变性  
E 胞浆红染，基质解聚  
正确答案：A 您选择的答案：

第22题 哪一项不是引起萎缩的原因

A 肾盂积水  
B 幽门狭窄  
C 垂体功能低下  
D 四氯化碳中毒  
E 慢性肝淤血  
正确答案：D 您选择的答案：

第23题 有关坏死的说法，哪一项不对

A 组织坏死后，属于不可逆变化  
B 组织细胞坏死后1小时，光镜下即可看到其形态变化  
C 细胞核的改变是坏死的主要形态变化  
D 心肌梗死后血乳酸脱氢酶浓度升高  
E 肝细胞坏死血谷丙转氨酶升高  
正确答案：B 您选择的答案：

第24题 下列哪种增生属于再生性增生

A 溶血性贫血时骨髓增生  
B 肝炎时枯否细胞的增生  
C 阴道糜烂时上皮增生  
D 妊娠时垂体细胞增生  
E 雌激素过多时子宫内膜增生  
正确答案：A 您选择的答案：

第25题 下列哪一项不属于肉芽组织的功能

A 抗感染  
B 保护创面  
C 填补伤口  
D 机化凝血块  
E 伤口收缩  
正确答案：E 您选择的答案：

第26题 细胞内水肿的发生基础是

A 细胞内钠离子增多  
B 细胞内钾离子增多  
C 细胞内氯离子减少  
D 细胞内钠离子减少  
E 细胞内钙离子增多  
正确答案：A 您选择的答案：

第27题 肾小管上皮细胞变性中，哪种损害最轻

A 混浊肿胀  
B 水变性  
C 玻璃样小滴变性  
D 脂肪变性  
E 细胞空泡变  
正确答案：C 您选择的答案：

第28题 肉芽组织主要由下列哪项组成

A 成纤维细胞和新生毛细血管  
B 成纤维细胞和巨噬细胞  
C 炎性细胞和新生毛细血管  
D 炎性细胞和成纤维细胞  
E 新生毛细血管和巨噬细胞  
正确答案：A 您选择的答案：

第29题 肠上皮化生的概念是

A 胃黏膜上皮转变为肠黏膜上皮  
B 原来无上皮的部位出现肠黏膜上皮  
C 肠黏膜上皮细胞转变为其他上皮  
D 肠黏膜上皮细胞转变为胃黏膜上皮  
E 呼吸道黏膜上皮转变为肠黏膜上皮  
正确答案：A 您选择的答案：

第30题 结缔组织玻璃样变不可能发生于下列哪种疾病

A 结核的小干酪样坏死灶

- B 纤维素性心外膜炎
- C 矽肺
- D 纤维型星形胶质细胞瘤
- E 动脉粥样硬化症

正确答案：D 您选择的答案：

第31题 虎斑心的病变性质是

- A 萎缩
- B 玻璃样变性
- C 心肌脂肪变性
- D 心肌脂肪浸润
- E 变性

正确答案：C 您选择的答案：

第32题 细胞水肿发生的机制主要是由于

- A 内质网受损
- B 高尔基体受损
- C 中心体受损
- D 线粒体肿大和内质网扩张断裂
- E 核糖体受损

正确答案：D 您选择的答案：

第33题 肠上皮化生多见于

- A 慢性肠炎
- B 慢性萎缩性胃炎
- C 慢性胃溃疡
- D 肠腺瘤
- E 肠腺癌

正确答案：B 您选择的答案：

第34题 长期良性高血压患者全身血管的主要病变是

- A 大动脉硬化
- B 中等动脉硬化
- C 小动脉黏液样变
- D 细小结动脉玻璃样变
- E 细动脉脂质沉积

正确答案：B 您选择的答案：

第35题 细胞和组织的适应性反应不包括

- A 化生
- B 萎缩
- C 再生
- D 肥大
- E 增生

正确答案：C 您选择的答案：

第36题 电镜下，肝细胞脂肪变的脂滴形成于

- A 胞浆基质内
- B 线粒体内
- C 内质网内
- D 高尔基体内
- E 溶酶体内

正确答案：C 您选择的答案：

第37题 下列关于萎缩的概念描述哪项错误

- A 萎缩的器官比正常小
- B 萎缩的器官功能降低
- C 萎缩的器官质地变软
- D 病因消退后，早期组织细胞可恢复原状
- E 光镜下，萎缩的细胞可见脂褐素颗粒

正确答案：C 您选择的答案：

第38题 关于细胞凋亡坏死(固缩坏死)，下列叙述中哪一项不正确

- A 凋亡坏死(固缩坏死)见于许多生理和病理过程
- B 发生单个细胞坏死或小灶状坏死
- C 凋亡坏死不引起炎症反应
- D 可见凋亡小体形成
- E 凋亡坏死是由酶解作用所致

正确答案：E 您选择的答案：

第39题 一期愈合的下列叙述中正确是

- A 创面大边缘不齐
- B 需多量肉芽组织填平伤口
- C 创面不洁易感染，炎症反应明显
- D 见于手术即时缝合的切口
- E 愈合时间长，形成较大瘢痕

正确答案：D 您选择的答案：

第40题 下列哪项不符合二期愈合的特点

- A 组织缺损大

B. 创缘不齐  
C. 有感染  
D. 愈合时间长  
E. 愈后形成白色线状瘢痕  
正确答案：E 您选择的答案：

第41题 有关凋亡的概念，下列哪项是错误的  
A. 活体单个细胞或小团细胞的死亡  
B. 细胞膜和细胞器膜破裂  
C. 不引起急性炎症反应  
D. 凋亡发生于基因调节有关  
E. 病毒性肝炎中的嗜酸性小体为肝细胞的凋亡  
正确答案：B 您选择的答案：

第42题 下列各种组织，哪一种再生能力最强  
A. 骨骼肌  
B. 神经细胞  
C. 心肌  
D. 神经纤维  
E. 软骨  
正确答案：D 您选择的答案：

第43题 下列病变哪一项是正确的  
A. 慢性肝淤血晚期，脂肪变性主要位于肝小叶周围  
B. 磷中毒时肝脂肪变性主要位于小叶中心  
C. 白喉杆菌外毒素引起心肌脂肪变性，乳头肌常呈红黄相间  
D. 贫血时心肌脂肪变呈弥漫分布  
E. 脂性肾病时，远曲小管上皮脂肪变最明显  
正确答案：A 您选择的答案：

第44题 下列关于萎缩的描述哪项正确  
A. 成年人胸腺萎缩属于病理性萎缩  
B. 萎缩是一种生理现象  
C. 肾盂积水引起的肾萎缩属于内分泌萎缩  
D. 脑缺血所致的脑萎缩属于营养不良性萎缩  
E. 以上都不对  
正确答案：D 您选择的答案：

第45题 有关肝脏脂肪变性的发病机制哪项错误  
A. 饮酒促进三酰甘油合成  
B. 缺氧使载脂蛋白减少，三酰甘油蓄积  
C. 肝毒物质使载脂蛋白增多，三酰甘油蓄积  
D. 高脂饮食，血脂肪酸增多  
E. 糖尿病使三酰甘油蓄积  
正确答案：C 您选择的答案：

第46题 由纤维包裹所致的病变是  
A. 肺结核瘤  
B. 梗死瘢痕  
C. 矽肺结节  
D. 动脉瘤  
E. 纤维瘤  
正确答案：A 您选择的答案：

第47题 死后组织自溶与生前组织坏死区别的主要病变依据是  
A. 组织轮廓存在的情况  
B. 细胞核溶解消失情况  
C. 胞质结构崩解情况  
D. 胞内氧化酶丧失情况  
E. 病变周围有无炎症反应  
正确答案：E 您选择的答案：

第48题 老年性前列腺肥大属于  
A. 功能性肥大  
B. 内分泌性肥大  
C. 代谢性肥大  
D. 代偿性肥大  
E. 假性肥大  
正确答案：B 您选择的答案：

第49题 纤维素样坏死，常见于哪些组织  
A. 肌肉组织  
B. 结缔组织  
C. 骨组织  
D. 神经组织  
E. 脂肪组织  
正确答案：B 您选择的答案：

第50题 患慢性消耗性疾病时，最早发生萎缩的组织是  
A. 骨骼肌

- B 脂肪组织
- C 心肌
- D 肝实质
- E 脑组织

正确答案：B 您选择的答案：

第51题 湿性坏疽的叙述，下列哪项是不正确的

- A 常见于肺、肠和子宫等内脏器官
- B 坏死组织与周围组织分界不清
- C 由于动脉阻塞，静脉回流正常引起
- D 坏死组织内有大量腐败菌繁殖
- E 全身中毒症状重

正确答案：C 您选择的答案：

第52题 组织坏死后，组织细胞结构消失，坏死细胞蛋白凝固，正常保持其轮廓残影，此病灶属于

- A 干酪样坏死
- B 凝固性坏死
- C 液化性坏死
- D 坏疽
- E 气性坏疽

正确答案：B 您选择的答案：

第53题 肝脂肪变性时，其病理变化是

- A 肝脏缩小，表面有颗粒
- B 肝脏苍白，无血色
- C 肝增大，色淡黄
- D 肝脏分叶增多
- E 肝脏质地软，边缘锐

正确答案：C 您选择的答案：

第54题 脂肪变性原因中，下列哪一项不正确

- A 四氯化碳中毒
- B 缺氧
- C 饥饿
- D 败血症
- E 食过多脂肪

正确答案：E 您选择的答案：

第55题 下列哪种病变不属于机化

- A 坏死组织由肉芽组织取代
- B 大叶性肺炎合并肺肉质变
- C 闭塞性心包炎
- D 脾梗死瘢痕灶
- E 疔破溃后由周围组织修补

正确答案：E 您选择的答案：

第56题 下列哪种组织细胞再生力最强

- A 骨组织
- B 神经节细胞
- C 软骨组织
- D 心肌
- E 神经胶质细胞

正确答案：E 您选择的答案：

第57题 组织细胞缺损后由损伤周围的同种细胞来修复，称为

- A 修复
- B 增生
- C 再生
- D 创伤愈合
- E 化生

正确答案：C 您选择的答案：

第58题 引起虎斑心的病变，属于下列哪一项

- A 水样变性
- B 脂肪变性
- C 粘液变性
- D 玻璃变性
- E 坏死

正确答案：B 您选择的答案：

第59题 干性坏疽的叙述，下列哪项是正确的

- A 发生机制为动脉阻塞而静脉回流受阻
- B 腐败菌感染一般较重
- C 全身中毒症状重
- D 坏死区与周围组织没有界线
- E 多见于四肢末端

正确答案：E 您选择的答案：

第60题 哪种疾病不易发生玻璃样变性

- A 肾小球肾炎

- B 动脉粥样硬化
- C 高血压病
- D 酒精性肝炎
- E 支气管炎

正确答案：E 您选择的答案：

第61题 属于内分泌障碍性增生的是

- A 肾小管坏死后的再生
- B 缺碘引起的甲状腺增生
- C 宫颈糜烂时的上皮增生
- D 溶血性贫血时的骨髓增生
- E 慢性肝炎时的肝细胞增生

正确答案：B 您选择的答案：

第62题 关于萎缩，下列哪项是正确的

- A 凡是比正常小的器官组织细胞均可称为萎缩
- B 缺乏及血供断绝均可引起
- C 细胞内线粒体变小，数目不减少
- D 萎缩组织细胞不消失
- E 间质不减少，有时反而增生

正确答案：E 您选择的答案：

第63题 坏死的细胞代谢停止，功能丧失，并出现一系列形态学改变，下面哪种是细胞坏死最具特征的形态学标志

- A 胞浆内糖原减少
- B 溶酶体破裂
- C 核固缩、碎裂及溶解
- D 胞浆内出现微细结构破坏
- E 细胞体积变小，染色变浅

正确答案：C 您选择的答案：

第64题 于变性改变的病理现象是

- A 细胞水肿
- B 脂肪沉积
- C 玻璃样变
- D 炎症
- E 纤维素样变

正确答案：D 您选择的答案：

第65题 下列哪种器官最易发生脂肪变性

- A 心脏
- B 肺脏
- C 肝脏
- D 脾脏
- E 肾脏

正确答案：C 您选择的答案：

第66题 从同一胚叶的一种分化成熟细胞或组织转变为另一种成熟细胞或组织的过程称为

- A 间变
- B 化生
- C 增生
- D 再生
- E 瘤性增生

正确答案：B 您选择的答案：

第67题 “虎斑心”属于下列哪项病变

- A 水样变性
- B 黏液样变性
- C 玻璃样变性
- D 气球样变性
- E 脂肪变性

正确答案：E 您选择的答案：

第68题 下列哪种细胞是永久性细胞

- A 间皮细胞
- B 表皮细胞
- C 神经细胞
- D 呼吸及消化道粘膜上皮细胞
- E 淋巴造血细胞

正确答案：C 您选择的答案：

第69题 HE染色切片中，发现肝细胞体积变大，胞浆淡染呈空泡状。为确定空泡的性质，最常用

- A 苏丹 染色
- B 普鲁士蓝染色
- C 嗜银染色
- D 免疫组化
- E 电镜检查

正确答案：A 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第70题 将坏死组织被肉芽组织取代的结局称为

- A. 肉芽组织化
- B. 机化
- C. 纤维化
- D. 骨化
- E. 瘢痕化

正确答案：B 您选择的答案：

第71题 有一患者经常胃痛，钡透发现幽门区有一约1.5cm的缺损，临床诊断为慢性胃溃疡，溃疡处镜下可能见到何种主要病变

- A 病变区有肉芽组织长入
- B 病变区有钙化
- C 病变区有骨化
- D 病变区有平滑肌增生
- E 病变区有血管增生

正确答案：A 您选择的答案：

第72题 有一老年病人，诊断动脉粥样硬化症十几年，曾出现跛行，左下肢第一足趾逐渐变黑而疼痛，此足趾病变可能为

- A 贫血性梗死
- B 出血性梗死
- C 干性坏疽
- D 湿性坏疽
- E 黑色素瘤

正确答案：C 您选择的答案：

第73题 有一男性年青病人，患慢性肾炎，近年来症状加重，出现少尿、夜尿以及贫血等表现，此病人肾脏会出现何种改变

- A 肾脏体积增大，质地韧
- B 肾脏体积缩小，质地软
- C 肾脏萎缩，颜色红
- D 肾脏萎缩，质地硬
- E 以上都不是

正确答案：D 您选择的答案：

第74题 女，18岁，食欲不好，厌油腻，肝大，肝区疼痛，临床诊断急性普通性肝炎，此时患者肝出现病变为

- A 肝细胞气球样变
- B 肝细胞脂肪性变
- C 肝细胞透明变
- D 肝细胞碎屑坏死
- E 以上都不是

正确答案：A 您选择的答案：

第75题 有一患者长期饮酒，而后出现肝区疼痛，该病人肝脏的主要病变可能是哪一项

- A 肝细胞嗜酸性变
- B 肝细胞脂肪变性
- C 肝窦内皮增生
- D 肝细胞水样变性
- E 肝小动脉透明变性

正确答案：B 您选择的答案：

第76题 良性高血压病患者，长期不愈后，该病人全身血管出现的主要病变是

- A 大动脉硬化
- B 中等动脉硬化
- C 小动脉粘液样变
- D 细动脉玻璃样变
- E 细动脉脂质沉积

正确答案：D 您选择的答案：

第77题 有一学生，咽痛，高烧数天，尿蛋白(+)，此时患者的肾脏会出现什么样病变

- A 近曲小管上皮细胞混浊肿胀
- B 肾小管上皮细胞脂肪变性
- C 肾小管上皮细胞纤维素样变性
- D 肾小球入球动脉玻璃样变
- E 肾小管上皮坏死

正确答案：A 您选择的答案：

第78题 有一长期吸烟的病人，经常咳嗽，现以肺部感染入院，作痰涂片检查，发现脱落的气管粘膜上皮中有鳞状上皮，但细胞无异型性，此为

- A 气管粘膜上皮鳞状化生
- B 痰中混有食管上皮
- C 痰中混有口腔上皮
- D 气管粘膜上皮不典型增生
- E 气管粘膜上皮间变

正确答案：A 您选择的答案：

三、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次



或不被选择。

第79-81题

- A. 肝细胞浆的Mallory小体
- B. 大块瘢痕呈灰白色，半透明状，质韧
- C. 肾动脉增厚，均质红染，管腔狭窄
- D. 虎斑心
- E. 间质黏多糖蓄积
- 1. 结缔组织玻璃样变
- 2. 细胞内玻璃样变
- 3. 细动脉玻璃样变

正确答案：BAC 您选择的答案：

第82-85题

- A. 化生
- B. 机化
- C. 分化
- D. 再生
- E. 增生
- 1. 同一胚叶分化成熟组织转化另一种成熟组织的过程
- 2. 肉芽组织取代坏死组织、血栓以及渗出物的过程
- 3. 组织细胞从胚胎期不成熟细胞到正常成熟细胞的生长发育过程
- 4. 组织损伤后，由其邻近的健康细胞分裂增生完成修复的过程

正确答案：ABCD 您选择的答案：

第86-88题

- A. 干性坏疽
- B. 湿性坏疽
- C. 凝固性坏死
- D. 消化性坏死
- E. 干酪样坏死
- 1. 结核引起的坏死
- 2. 肠扭转引起的坏死
- 3. 脚的坏死，表面呈黑色，与周围正常组织边界清楚

正确答案：EBA 您选择的答案：

第89-91题

- A. 肥大
- B. 增生
- C. 萎缩
- D. 化生
- E. 代偿
- 1. 高血压病左心室增大称
- 2. 肾小管坏死后的再生
- 3. 间叶组织在压力转化为透明软骨组织

正确答案：ABD 您选择的答案：

第92-94题

- A. 干酪样坏死
- B. 脂肪坏死
- C. 坏疽
- D. 纤维素样坏死
- E. 液化性坏死
- 1. 乙型脑炎
- 2. 恶性高血压病细小动脉
- 3. 型梅毒发生的坏死

正确答案：EDA 您选择的答案：

第95-97题

- A. 干酪样坏死
- B. 脂肪坏死
- C. 坏疽
- D. 纤维素样坏死
- E. 液化性坏死
- 1. 急性胰腺炎
- 2. 淋巴结核
- 3. 产后子宫内膜炎

正确答案：BAC 您选择的答案：

第98-100题

- A. 细胞气球样变
- B. 细胞脂肪变性
- C. 细胞玻璃样变
- D. 纤维素样变
- E. 细动脉玻璃样变
- 1. 细胞水肿
- 2. 浆细胞胞浆中的Russell小体
- 3. 高血压

正确答案：ACE 您选择的答案：

第101-103题

- A. 老年性骨骼，脑组织的萎缩
- B. 小儿麻痹症所致的下肢萎缩
- C. 肾盂积水所致肾萎缩
- D. 脑缺血引起脑萎缩
- E. 垂体功能低下引起肾上腺萎缩
- 1. 生理性萎缩
- 2. 废用性萎缩
- 3. 压迫性萎缩

正确答案：ABC 您选择的答案：

第104-106题

- A. 糜烂
- B. 溃疡
- C. 窦道
- D. 瘘管
- E. 空洞
- 1. 皮肤黏膜浅表坏死性缺损
- 2. 坏死形成开口于表面的深在盲管
- 3. 两端开口的通道样坏死缺损

正确答案：ACD 您选择的答案：

第107-109题

- A. 机化
- B. 包裹
- C. 钙化
- D. 坏疽
- E. 气性坏疽
- 1. 较大范围的坏死，伴有腐败细菌的生长
- 2. 深部开放性创伤，合并厌氧菌感染
- 3. 坏死物不能完全溶解吸收，由新生的肉芽组织取代坏死物的过程

正确答案：DEA 您选择的答案：

第110-112题

- A. 细胞水肿
- B. 脂肪变性
- C. 萎缩
- D. 纤维素样坏死
- E. 包裹钙化
- 1. 风湿病结缔组织内出现
- 2. 肝细胞气球样变性是
- 3. 肺结核干酪样坏死转向愈合发生

正确答案：DAE 您选择的答案：

第113-115题

- A. 再生
- B. 修复
- C. 增生
- D. 化生
- E. 肥大
- 1. 实质细胞的增多
- 2. 组织损伤后由损伤周围的同种细胞修复的过程
- 3. 组织、细胞和器官体积增大

正确答案：CAE 您选择的答案：