

习题集 病理学 肿瘤

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 瘤细胞间变多见于下列哪种肿瘤

- A 腺瘤
- B 腺癌
- C 囊腺瘤
- D 甲状腺瘤
- E 混合瘤

正确答案：B 您选择的答案：

第2题 肿瘤组织分化的程度越高

- A 恶性程度越高
- B 越早发生组织坏死
- C 转移较早
- D 预后越差
- E 异型性越小

正确答案：E 您选择的答案：

第3题 恶性肿瘤的主要生长方式为

- A 内生性生长
- B 浸润性生长
- C 破坏性生长
- D 内翻性生长
- E 外生性生长

正确答案：B 您选择的答案：

第4题 腺癌的分化标志是

- A 呈巢状排列
- B 可见细胞间桥
- C 有腺样结构
- D 异型性小
- E 可见角化珠

正确答案：C 您选择的答案：

第5题 肿瘤细胞分化程度高是指

- A 肿瘤周围有较多的淋巴细胞浸润
- B 不容易引起器官的阻塞和破坏
- C 高度恶性的肿瘤
- D 有较大的异型性
- E 与起源组织相似

正确答案：E 您选择的答案：

第6题 下列哪项是恶性肿瘤细胞的最主要形态特点

- A 核大
- B 多核或异形核
- C 核仁大
- D 核染色浓染
- E 病理性核分裂象

正确答案：E 您选择的答案：

第7题 关于恶性肿瘤细胞核的变化下正确的是

- A 核浆比值小
- B 核体积大
- C 核浆比值大
- D 核多型
- E 核膜增厚

正确答案：A 您选择的答案：

第8题 一淋巴结作病理切片检查，淋巴结内见成团的异型细胞，并有病理性核分裂相和角化珠形成，应诊断为

- A 淋巴结结核
- B 淋巴结慢性炎症
- C 淋巴结转移性腺癌
- D 恶性淋巴瘤
- E 淋巴结转移性鳞癌

正确答案：E 您选择的答案：

第9题 肿瘤的恶性程度高低决定于

- A 肿瘤的发生部位
- B 肿瘤的肉眼形态改变
- C 肿瘤细胞的分化程度
- D 肿瘤的生长速度
- E 肿瘤的大小

正确答案：C 您选择的答案：

第10题 恶性肿瘤的主要特征是

- A 核形态不规则，大小不一且核分裂多见

- B 核分裂多见
- C 胞浆嗜碱性
- D 血管丰富
- E 浸润性生长和转移

正确答案：E 您选择的答案：

第11题 恶性肿瘤生长到多大需要血管供给才能生长

- A 0.5mm
- B 1.0mm
- C 1.5mm
- D 2.0mm
- E 2mm以上

正确答案：E 您选择的答案：

第12题 CEA在下列哪种肿瘤中较多见

- A 食管癌
- B 胃癌
- C 肠癌
- D 肝癌
- E 肺癌

正确答案：C 您选择的答案：

第13题 决定肿瘤性质的主要理论依据是

- A 肿瘤的间质成分
- B 肿瘤的实质成分
- C 组织结构情况
- D 肿瘤生长方式
- E 以上都不是

正确答案：B 您选择的答案：

第14题 下列有关肿瘤生长的描述哪项正确

- A 多数恶性肿瘤细胞倍增时间比正常细胞快
- B 细胞恶性转化初期，生长分数很低
- C 高生长分数的肿瘤，对化疗敏感
- D 实体瘤(结肠癌)生长分数高，对化疗敏感
- E 高度恶性淋巴瘤对化疗不敏感

正确答案：C 您选择的答案：

第15题 区别完全性葡萄胎及部分性葡萄胎的意义在于

- A 部分性葡萄胎可发展为绒毛膜癌
- B 完全性葡萄胎约2%~3%发展为绒毛膜癌
- C 完全性葡萄胎不发展为绒毛膜癌
- D 部分性葡萄胎有3%~4%发展为绒毛膜癌
- E 完全性葡萄胎全部发展为绒毛膜癌

正确答案：B 您选择的答案：

第16题 下列哪项不是完全性葡萄胎的病变特点

- A 滋养层细胞增生
- B 绒毛间质水肿
- C 绒毛扩大
- D 子宫肌层内有滋养层细胞侵袭
- E 绒毛间质一般无血管

正确答案：D 您选择的答案：

第17题 下列关于平滑肌瘤的描述哪项错误

- A 瘤细胞核呈枣核状，两端尖
- B 肿瘤多见于子宫，胃肠道
- C 瘤细胞排列呈束，互相编织
- D 很分裂像少见
- E 为一种良性肿瘤

正确答案：A 您选择的答案：

第18题 有关恶性肿瘤转移机制的描述哪项错误

- A 乳腺癌上皮黏连素表达减少，瘤细胞分散
- B 编码上皮黏连素的DNA插入癌细胞基因组，可使其丧失转移能力
- C 肠癌细胞表面的层黏连蛋白受体密度与其侵袭性呈正相关
- D 肠癌细胞表面的层黏连蛋白受体密度与其侵袭性呈负相关
- E 浸润性癌IV型胶原酶活性增高

正确答案：D 您选择的答案：

第19题 下列关于脂肪肉瘤的描述哪项错误

- A 多见于40岁以上成年人
- B 从皮下脂肪层发生
- C 肿瘤呈结节状
- D 瘤细胞分化差，见脂肪滴
- E 也可见到分化成熟的脂肪细胞

正确答案：B 您选择的答案：

第20题 来源于上皮组织的肿瘤是

- A 鲍文病

- B 癌肉瘤
- C 巨细胞瘤
- D 黑色素瘤
- E 胶质细胞瘤

正确答案：A 您选择的答案：

第21题 下列哪种为高分化鳞癌的病理形态特点

- A 鳞状上皮呈乳头状生长
- B 癌细胞分化形态仍保留鳞状上皮特征
- C 形成大小不一的鳞状细胞巢
- D 癌巢细胞间可见间桥并见角化珠形成
- E 癌细胞突破基底膜

正确答案：D 您选择的答案：

第22题 肿瘤的分级

- A 按肿瘤的大小
- B 按肿瘤间质和实质的比例
- C 按肿瘤是否转移
- D 按肿瘤浸润累及的范围
- E 按肿瘤的分化程度

正确答案：E 您选择的答案：

第23题 区别癌与肉瘤的主要依据是

- A 浸润性生长、无包膜
- B 异型性明显，有核分裂象
- C 通过血道转移
- D 组织来源
- E 肿瘤体积巨大

正确答案：D 您选择的答案：

第24题 下列不是肿瘤的疾病是

- A 霍奇金病
- B 鲍文病
- C 室壁瘤
- D 葡萄胎
- E 白血病

正确答案：C 您选择的答案：

第25题 有关肿瘤的形态结构描述哪项错误

- A 肿瘤的大小与肿瘤的性质，发生部位有一定关系
- B 脂肪瘤呈黄色，色素痣呈黑色
- C 实质多于间质的肿瘤一般较软
- D 实质多于间质的肿瘤一般较硬
- E 肿瘤组织发生坏死时变软

正确答案：D 您选择的答案：

第26题 诊断恶性肿瘤的主要依据是

- A 肿瘤迅速增大
- B 肿瘤局部疼痛
- C 瘤细胞出现明显异型性
- D 所属淋巴结肿大
- E 机体明显消瘦

正确答案：C 您选择的答案：

第27题 下列哪一项不属于乳腺癌的组织学类型

- A 粉刺癌
- B 小叶原位癌
- C 乳腺肉瘤
- D 浸润性导管癌
- E 乳腺炎样癌

正确答案：C 您选择的答案：

第28题 下列哪一种不是良性肿瘤

- A 精原细胞瘤
- B 横纹肌瘤
- C 卵巢浆液性乳头状囊腺瘤
- D 错构瘤
- E 脑膜瘤

正确答案：A 您选择的答案：

第29题 良性肿瘤的主要生长方式为

- A 结节状生长
- B 息肉状生长
- C 膨胀性生长
- D 蕈伞状生长
- E 隆起状生长

正确答案：C 您选择的答案：

第30题 乳腺癌时局部皮肤桔皮样外观主要是由于癌细胞

- A 阻塞淋巴管，皮肤水肿，毛囊汗腺处皮肤相对下陷

- B. 压迫局部静脉，造成淤血水肿
  - C. 引起局部组织炎性渗出，水肿
  - D. 阻塞乳腺导管，造成乳汁淤积
  - E. 生长迅速，向皮肤表面突出形成结节
- 正确答案：A      您选择的答案：

第31题 恶性肿瘤向邻近器官侵犯的主要方式为

- A. 直接蔓延
- B. 淋巴管播散
- C. 血管播散
- D. 种植播散
- E. 接触播散

正确答案：A      您选择的答案：

第32题 子宫颈癌扩散转移途径哪项最少

- A. 直接蔓延
- B. 血行转移
- C. 髓内淋巴结
- D. 髓外淋巴结
- E. 骶前淋巴结

正确答案：B      您选择的答案：

第33题 绒癌的哪项转移少见

- A. 血道转移至肺
- B. 血道转移至脑
- C. 淋巴道转移至腹腔
- D. 血道转移至肝
- E. 骨骼

正确答案：C      您选择的答案：

第34题 下列关于癌基因的说法正确的是

- A. 癌基因只存在于病毒中
- B. 带有癌基因一定患癌
- C. 癌基因指一段具有将正常细胞转换为肿瘤的核酸片段
- D. 在正常细胞中，原癌基因是由癌基因变化而来
- E. 以上说法都不对

正确答案：C      您选择的答案：

第35题 下列关于上皮肿瘤的描述哪项错误

- A. 外耳阴茎处乳头状瘤不易发生恶变
- B. 乳腺腺上皮增生，形成纤维腺瘤，是良性肿瘤
- C. 结肠多发性腺瘤，表面呈乳头状，绒毛状者恶变率高
- D. 外耳、阴茎处乳头状瘤易恶变形成乳头状癌
- E. 乳头状瘤，表面呈外生性生长，形成乳头状，菜花状

正确答案：A      您选择的答案：

第36题 关于良恶性肿瘤的区别，下列哪项错误

- A. 良性肿瘤生长慢，恶性肿瘤生长快
- B. 良性肿瘤异型性小，恶性肿瘤异型性大
- C. 良性肿瘤不转移，恶性肿瘤转移
- D. 良性肿瘤异型性大，恶性肿瘤异型性小
- E. 良性肿瘤无病理核分裂像，恶性肿瘤可见病理核分裂像

正确答案：D      您选择的答案：

第37题 确定高分化鳞癌的主要依据是

- A. 未发现有淋巴转移
- B. 病理性核分裂少见
- C. 有角化珠和细胞间桥
- D. 有癌巢
- E. 瘤组织细胞异型性不明显

正确答案：C      您选择的答案：

第38题 下列哪一项是诊断侵袭性葡萄胎的主要依据

- A. 绒毛高度水肿
- B. 绒毛间质血管消失
- C. 滋养层细胞增生
- D. 子宫肌层内有滋养层细胞侵袭
- E. 绒毛周围有血块

正确答案：D      您选择的答案：

第39题 物理致癌因素不包括哪一项

- A. X射线
- B. 氮芥
- C. 放射性同位素
- D. 丁射线
- E. 粒子

正确答案：B      您选择的答案：

第40题 诊断转移瘤的主要理论依据是

- A. 恶性瘤细胞侵入小静脉

- B 恶性肿瘤细胞侵入毛细血管
  - C 血中发现肿瘤细胞
  - D 瘤细胞栓塞远隔器官
  - E 在远隔部位形成与原发瘤相同的肿瘤
- 正确答案：E 您选择的答案：

第41题 原位癌是指

- A ．原发部位的癌
  - B ．一种晚期癌症
  - C ．黏膜鳞状上皮或皮肤表皮层重度非典型性增生，尚未突破基底膜
  - D ．皮肤表皮层的癌症，突破基底膜
  - E ．上皮内瘤变Ⅰ级
- 正确答案：C 您选择的答案：

第42题 骨肉瘤的主要诊断依据是

- A ．好发于青少年
  - B ．血道转移
  - C ．发生于长骨骨干
  - D ．出现肿瘤性骨组织
  - E ．可发生病理性骨折
- 正确答案：D 您选择的答案：

第43题 下列属于原位癌的是

- A ．隐性肺癌
  - B ．局限于管、泡内的乳腺小叶癌
  - C ．单纯癌
  - D ．胶样癌
  - E ．小肝癌
- 正确答案：B 您选择的答案：

第44题 诊断肉瘤的主要形态依据

- A 包膜消失
  - B 浸润生长
  - C 瘤细胞异型性明显
  - D 瘤细胞弥漫分布与间质分界不清
  - E 血行转移
- 正确答案：D 您选择的答案：

第45题 来源于间叶组织的恶性肿瘤是

- A 恶性淋巴瘤
  - B 恶性神经鞘瘤
  - C 恶性间皮瘤
  - D 恶性畸胎瘤
  - E 恶性黑色素瘤
- 正确答案：C 您选择的答案：

第46题 有关畸胎瘤的描述哪项错误

- A ．本瘤常发生于卵巢和睾丸
  - B ．含有三个胚层的各种类型组织
  - C ．有如一个畸形的胎儿
  - D ．可有良性、恶性两种类型
  - E ．畸胎瘤都是良性的
- 正确答案：E 您选择的答案：

第47题 网状纤维主要见于肿瘤何处有意义

- A 肿瘤腺管之间
  - B 癌细胞之间
  - C 肉瘤细胞之间
  - D 癌细胞团之间
  - E 转移癌细胞之间
- 正确答案：C 您选择的答案：

第48题 良性与恶性肿瘤判定中，最有诊断意义的是

- A ．生长方式
  - B ．生长速度
  - C ．肿瘤的异型性
  - D ．对机体影响
  - E ．出血与坏死
- 正确答案：C 您选择的答案：

第49题 乳腺癌最常发生于乳房的

- A ．外下象限
  - B ．外上象限
  - C ．内上象限
  - D ．内下象限
  - E ．中央部
- 正确答案：B 您选择的答案：

第50题 乳腺的典型髓样癌，镜下病理变化为

- A ．癌实质和间质都很少

B. 癌实质少，间质多  
C. 癌实质，间质都很多  
D. 癌实质多，间质少  
E. 癌实质无变化，间质少  
正确答案：D 您选择的答案：

第51题 下列哪种是上皮来源的良性肿瘤

- A. 脂肪瘤
- B. 纤维瘤
- C. 乳头状瘤
- D. 平滑肌瘤
- E. 血管瘤

正确答案：C 您选择的答案：

第52题 癌的肉眼形态，下列哪一种可能性最大

- A. 结节状
- B. 绒毛状
- C. 乳头状
- D. 火山口状溃疡
- E. 肿块状

正确答案：D 您选择的答案：

第53题 诊断肉瘤最主要的依据是

- A. 青年人
- B. 瘤细胞弥散分布
- C. 血管丰富
- D. 异型性明显
- E. 核分裂多见

正确答案：B 您选择的答案：

第54题 锁骨上淋巴结转移癌的原发部位最常见于

- A. 甲状腺
- B. 食管
- C. 乳腺
- D. 胃
- E. 肝

正确答案：D 您选择的答案：

第55题 决定肿瘤性质的主要依据是

- A. 肿瘤的大小
- B. 肿瘤的颜色
- C. 肿瘤的形态
- D. 肿瘤的组织结构
- E. 肿瘤的硬度

正确答案：D 您选择的答案：

第56题 恶性肿瘤的扩散方式概括起来有

- A. 直接蔓延和转移
- B. 血道转移
- C. 种植性转移
- D. 直接蔓延
- E. 淋巴道转移

正确答案：A 您选择的答案：

第57题 乳腺癌，最先转移到哪个部位淋巴结

- A. 同侧腋窝淋巴结
- B. 锁骨上淋巴结
- C. 对侧腋窝淋巴结
- D. 纵隔淋巴结
- E. 乳内淋巴结

正确答案：A 您选择的答案：

第58题 关于腺癌的描述哪项错误

- A. 常见于胃肠、胆囊、子宫体等处
- B. 常见于皮肤及骨组织
- C. 癌细胞大小不一，核分裂像多见
- D. 伴有大量乳头结构时称乳头状腺癌
- E. 腺腔高度扩张呈囊状称囊腺癌

正确答案：B 您选择的答案：

第59题 确定癌的主要依据是

- A. 有病理核分裂
- B. 细胞大小不一
- C. 浸润性生长
- D. 核深染，胞浆嗜碱
- E. 有癌巢形成

正确答案：E 您选择的答案：

第60题 下列哪项不是癌前病变

- A. 黏膜白斑

- B. 脂肪瘤病
- C. 慢性宫颈糜烂
- D. 结肠息肉状腺瘤
- E. 慢性萎缩性胃炎

正确答案：B 您选择的答案：

第61题 下列哪项不是恶性肿瘤

- A. 何杰金氏病
- B. 无性细胞瘤
- C. 纤维瘤
- D. 神经母细胞瘤
- E. 精原细胞瘤

正确答案：C 您选择的答案：

第62题 癌是

- A. 上皮来源恶性肿瘤的总称
- B. 上皮来源肿瘤的总称
- C. 一切肿瘤的总称
- D. 一切恶性肿瘤的总称
- E. 上皮和间叶组织来源恶性肿瘤的总称

正确答案：A 您选择的答案：

第63题 淋巴结内转移，龋首先见于何处

- A. 淋巴结门
- B. 淋巴结中央窦
- C. 淋巴结边缘窦
- D. 淋巴滤泡
- E. 淋巴结被膜

正确答案：C 您选择的答案：

第64题 霍奇金淋巴瘤的特点在于

- A. 发生在淋巴结的恶性肿瘤
- B. 由邻近的淋巴结向远处扩散
- C. 含瘤巨细胞即R-S细胞
- D. 有炎细胞浸润
- E. 可发生纤维化

正确答案：C 您选择的答案：

第65题 乳腺癌转移到哪处淋巴结较晚

- A. 同侧腋窝淋巴结
- B. 对侧腋窝淋巴结
- C. 纵隔淋巴结
- D. 锁骨上淋巴结
- E. 乳内淋巴结

正确答案：D 您选择的答案：

第66题 原位癌的概念是

- A. 镜下才见到的微小癌
- B. 没有转移的早期癌
- C. 上皮组织轻度不典型增生，并累及全层1 / 3
- D. 上皮组织中度不典型增生，并累及全层2 / 3
- E. 上皮组织重度不典型增生，并累及全层但未突破基底膜

正确答案：E 您选择的答案：

第67题 有关肿瘤分期的描述哪项错误

- A. 国际上广泛采用TNM分期系统
- B. T指肿瘤原发病灶
- C. N指局部淋巴结受累及
- D. No表示淋巴结受累程度大
- E. M指血行转移

正确答案：D 您选择的答案：

第68题 有关鳞状细胞癌的描述哪项错误

- A. 常发生在皮肤、口腔、食管等处
- B. 肉眼观呈菜花状
- C. 镜下癌细胞呈巢状，癌细胞间多无网状纤维
- D. 镜下癌细胞弥漫分布，癌细胞多有网状纤维
- E. 分化好的鳞癌有角化珠

正确答案：D 您选择的答案：

第69题 非典型性增生是指

- A. 增生的上皮细胞的形态呈现一定程度的异型性，但不足以诊断为癌
- B. 细胞增生，但不典型
- C. 细胞增生，细胞大小一致
- D. 细胞增生，核浆比例正常
- E. 轻度非典型增生称为上皮内瘤变 级

正确答案：A 您选择的答案：

第70题 下列哪项不是子宫颈癌的组织学类型

- A. 微灶浸润型鳞状细胞癌

- B. 高分化鳞癌
- C. 低分化腺癌
- D. 腺鳞癌
- E. 粉刺癌

正确答案：E 您选择的答案：

第71题 癌和肉瘤最根本的区别是

- A. 不同年龄
- B. 生长方式
- C. 转移途径
- D. 组织来源
- E. 发病部位

正确答案：D 您选择的答案：

第72题 有关肿瘤的概念哪项是错误的

- A. 肿瘤是局部组织细胞在基因水平上失去对其生长的正常调控
- B. 肿瘤是克隆性异常增生而形成的新生物
- C. 新生物常形成局部肿块
- D. 肿瘤细胞在不同程度上失去了分化成熟的能力
- E. 恶性肿瘤细胞分化程度高

正确答案：E 您选择的答案：

第73题 下列关于脂肪瘤的描述哪项错误

- A. 脂肪瘤常发生于背肩等皮下组织
- B. 脂肪瘤常为单发，亦可多发
- C. 镜下结构与正常脂肪组织相似
- D. 有包膜，手术易切除
- E. 脂肪瘤大小很一致，均为3~5cm大小

正确答案：E 您选择的答案：

第74题 关于肿瘤性增生的特点下列不正确的是

- A. 致癌因素去除后生长停止
- B. 具有异常的代谢和功能
- C. 能遗传给子代细胞
- D. 与机体不协调有害无益
- E. 细胞形态幼稚

正确答案：A 您选择的答案：

第75题 肿瘤发生淋巴道转移时，瘤细胞首先聚集在淋巴结的

- A. 包膜
- B. 髓窦
- C. 淋巴滤泡
- D. 边缘窦
- E. 门部

正确答案：D 您选择的答案：

第76题 绒毛癌的病理特点哪项除外

- A. 滋养层细胞高度增生有异型性
- B. 肿块有大量出血
- C. 肿块有坏死
- D. 形成绒毛结构
- E. 癌细胞呈团，呈片排列

正确答案：D 您选择的答案：

第77题 良恶性肿瘤的共同点是

- A. 大体形态相同
- B. 瘤组织增生
- C. 生长速度相同
- D. 分化程度相同
- E. 都浸润邻近组织

正确答案：B 您选择的答案：

第78题 含有三个胚层组织成分的肿瘤称为

- A. 混合瘤
- B. 畸胎瘤
- C. 胚胎瘤
- D. 错构瘤
- E. 癌肉瘤

正确答案：B 您选择的答案：

第79题 霍奇金淋巴瘤有诊断意义的细胞是

- A. R-S细胞
- B. 霍奇金细胞
- C. 陷窝细胞
- D. 多形性瘤细胞
- E. 嗜酸性细胞

正确答案：A 您选择的答案：

第80题 关于p53基因的描述错误的是

- A. p53基因是抑癌基因



B. p53基因与结肠癌、肺癌等有关  
C. p53基因异常方式就是点突变  
D. P53蛋白被称为是"分子警察"  
E. p53基因位于染色体17p13.1  
正确答案：C 您选择的答案：

第81题 下列哪一项不符合肿瘤性增生的特性  
A 细胞生长旺盛  
B 相对无止境性生长  
C 与机体不协调  
D 不断地丧失分化成熟的能力  
E 增生过程中致病因素继续存在  
正确答案：E 您选择的答案：

第82题 下列对非典型增生的叙述不正确的是  
A. 不能恢复正常  
B. 通常可见正常核分裂象  
C. 多发生在皮肤、粘膜表面的鳞状上皮  
D. 增生细胞有一定的异型性  
E. 分轻、中、重三型  
正确答案：A 您选择的答案：

第83题 良性肿瘤的异型性主要表现在  
A 瘤细胞核的多形性  
B 肿瘤组织结构紊乱  
C 瘤细胞的多形性  
D 核浆比值不明显  
E 可见核分裂象  
正确答案：B 您选择的答案：

第84题 有关影响肿瘤发生发展内在因素的描述哪项错误  
A. 从遗传的角度讲，肿瘤是基因病  
B. 瘤细胞的单克隆性扩增形成肿瘤  
C. DNA改变的主要靶基因是原癌基因和肿瘤抑制基因  
D. 肿瘤发生是长期多基因突变积累的过程  
E. 机体免疫监视功能在防止肿瘤发生上不起重要作用  
正确答案：E 您选择的答案：

第85题 肿瘤的间质主要指哪些成分  
A 血管  
B 淋巴管  
C 结缔组织  
D 血管及结缔组织  
E 网状支架  
正确答案：D 您选择的答案：

第86题 具有防癌或抗癌作用的元素是  
A. 镍  
B. 铬  
C. 铍  
D. 镉  
E. 硒  
正确答案：E 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第87题 有一妇女，产后阴道流血，检查发现宫腔内有一肿块，取出标本呈灰白和暗红色相间，镜下见二种细胞形态，一种为多核细胞，核深染，另一种为多角形细胞，而且胞浆丰富，核大明亮，有大片出血坏死。此瘤可诊断为  
A 宫内膜腺癌  
B 恶性葡萄胎  
C 绒毛膜上皮癌  
D 癌肉瘤  
E 平滑肌肉瘤  
正确答案：C 您选择的答案：

第88题 某青年，股骨下端肿瘤，切面灰白色，鱼肉状，镜下见多边形肉瘤细胞，异型性明显，见肿瘤性骨组织，X线检查有日光放射状阴影。可诊为  
A. 骨瘤  
B. 骨肉瘤  
C. 软骨肉瘤  
D. 骨髓瘤  
E. 尤文氏瘤  
正确答案：B 您选择的答案：

第89题 临床触诊，乳腺肿物为圆形，界清，可移动。取活检组织，镜下见乳腺小导管增生，管腔有的变细长，管腔周围有多量纤维组织增生，并疏松染成淡蓝色。此瘤可能诊断为  
A 乳腺腺瘤  
B 乳腺腺病

- C 乳腺纤维腺瘤
- D 乳腺纤维瘤
- E 以上都不是

正确答案：C 您选择的答案：

第90题 某人乳腺发生癌变，病检发现癌细胞突破导管基底膜进入间质，呈实性条索，小梁或巢团状，无明显腺样结构，实质与间质大致相当。此癌是

- A．导管内原位癌
- B．硬癌
- C．小叶原位癌
- D．髓样癌
- E．浸润性导管单纯癌

正确答案：E 您选择的答案：

第91题 某一女性患者，半年前人工流产后月经淋漓不断，现咳嗽，咳血入院，住院后，三月死亡，尸检发现，左肺下叶圆形病灶为大片红染坏死物，周边有滋养层细胞，异型显著。应诊为

- A．肺癌
- B．绒毛膜癌
- C．绒毛膜癌，肺转移
- D．葡萄胎
- E．肺癌转移

正确答案：C 您选择的答案：

第92题 某孕妇体检时发现其血尿中hCG水平显著增高，该孕妇可能患有

- A．宫颈癌
- B．乳腺癌
- C．葡萄胎
- D．肝癌
- E．肺癌

正确答案：C 您选择的答案：

第93题 某病人，腹膜后一肿瘤，结节状，鱼肉样，瘤细胞以多形性脂肪母细胞为主，形态多样。可诊断为

- A．脂肪瘤
- B．圆形细胞型脂肪肉瘤
- C．多形性脂肪肉瘤
- D．黏液瘤
- E．黏液样型脂肪肉瘤

正确答案：C 您选择的答案：

第94题 某宫颈癌患者，手术切除标本，病理检查镜下观癌组织突破基底膜，癌细胞似鳞状上皮的棘细胞，有角化及癌珠形成。应诊为

- A．低分化鳞癌
- B．高分化鳞癌
- C．中分化鳞癌
- D．子宫颈腺癌
- E．腺鳞癌

正确答案：B 您选择的答案：

第95题 有一男性病人，手术切除皮下结节状肿物，有完整包膜，切面为灰白色有纹理，质地硬韧。镜下见呈束状排列的胶原纤维走行交错，细胞核多为梭形，但无异型性表现，此瘤可诊断为

- A 瘤样纤维组织增生
- B 纤维瘤
- C 平滑肌瘤
- D 纤维组织细胞瘤
- E 以上都不是

正确答案：B 您选择的答案：

第96题 某患者，足底部黑痣，短期内长大，表面溃破，镜下见瘤细胞多边形，胞浆内有黑色素颗粒，核大，有嗜酸性核仁。应诊为

- A．皮内痣
- B．交界痣
- C．混合痣
- D．恶性黑色素瘤
- E．无黑色素性黑色素瘤

正确答案：D 您选择的答案：

第97题 某乳癌患者，病检发现癌实质多，间质成分少，癌细胞呈片状或巢状，中央有坏死，间质无淋巴细胞浸润。应诊为

- A．单纯癌
- B．硬癌
- C．髓样癌
- D．小叶原位癌
- E．导管内原位癌

正确答案：C 您选择的答案：

第98题 有一位妇女乳腺发现肿块，较硬，而且与周围组织境界不清。取活检组织，镜下见瘤细胞大小不等，核大深染，形态不规则，瘤细胞浆少；多呈索条状排列，少量呈腺样散在大量纤维组织内，后者有明显玻璃样变此瘤可能诊断为

- A 乳腺痛肉瘤
- B 乳腺低分化癌

- C 乳腺腺癌
- D 乳腺髓样癌
- E 乳腺硬癌

正确答案：E 您选择的答案：

第99题 有一位男性病人，胃部患有肿瘤，经手术切除，见胃粘膜完好，胃壁肿物境界清，有包膜，大小如鸡蛋，镜下瘤细胞为梭形，胞浆红染，胞核呈杆状，瘤细胞排成束状，局部有栅栏状结构。此瘤可诊断为

- A 纤维瘤
- B 瘤样纤维组织增生
- C 平滑肌瘤
- D 平滑肌肉瘤
- E 纤维肉瘤

正确答案：C 您选择的答案：

第100题 女，60岁，右颈淋巴结肿大3月，蚕豆大小，其可能性最小的病变是

- A 转移癌
- B 淋巴结反应性增生
- C 恶性淋巴瘤
- D 淋巴结结核
- E 转移性肉瘤

正确答案：E 您选择的答案：

第101题 有一妇女卵巢可见肿物，切面为多囊性，有粘稠胶冻状物充填。镜下见囊壁衬以单层柱状上皮并呈乳头状突向囊腔，核上部胞浆丰富淡染，瘤细胞分化较好。此肿物可能诊断为

- A 卵巢粘液瘤
- B 卵巢泡沫细胞瘤
- C 卵巢颗粒细胞瘤
- D 卵巢粘液性囊腺瘤
- E 卵巢浆液性囊腺瘤

正确答案：D 您选择的答案：

第102题 卵巢囊性肿物，切面见有毛发和油脂样物，镜下见皮肤鳞状上皮，皮下有毛囊和皮脂腺，另外还见到支气管柱状上皮，纤维脂肪组织以及少量甲状腺组织，此瘤可诊断为

- A 恶性畸胎瘤
- B 良性畸胎瘤
- C 错构瘤
- D 毛发瘤
- E 纤维脂肪瘤

正确答案：B 您选择的答案：

第103题 手术见肝有一肿物，无明显境界，颜色暗红，切开呈筛孔状结构，有许多红褐色液体流出，取材镜检，见多量管腔，管壁厚薄不均，并扩张迂曲，管腔内有多量红细胞。此瘤可诊断为

- A 血管瘤
- B 海绵状血管瘤
- C 毛细血管瘤
- D 淋巴管瘤
- E 囊状水瘤

正确答案：B 您选择的答案：

三、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第104-106题

- A ．HPV
- B ．EB病毒
- C ．HBV
- D ．幽门螺旋杆菌
- E ．SARS病毒

- 1 ．与子宫颈癌的发生有关
- 2 ．与肝癌有关
- 3 ．与胃炎及胃B细胞性淋巴瘤有关

正确答案：ACD 您选择的答案：

第107-109题

- A ．癌脐
- B ．间变性肿瘤
- C ．癌肉瘤
- D ．原位癌
- E ．癌珠

- 1 ．恶性肿瘤细胞缺乏分化，异型性显著
- 2 ．位于器官表面恶性肿瘤，瘤结节中央出血坏死下陷
- 3 ．一个肿瘤，即有癌的结构，又有肉瘤的结构

正确答案：BAC 您选择的答案：

第110-112题

- A ．乳腺浸润性癌
- B ．乳腺导管内原位癌
- C ．乳腺小叶原位癌
- D ．paget病

E. 乳腺炎样癌

1. 癌细胞来自小叶的终末导管及腺泡，未穿破基底膜，累及小叶
2. 癌细胞穿破乳腺导管或腺泡的基底膜而侵入间质者
3. 癌细胞局限于中小导管内，管壁基底膜完整

正确答案：CAB 您选择的答案：

第113-115题

- A. 平滑肌瘤
- B. 脂肪瘤
- C. 脂肪肉瘤
- D. 骨肉瘤
- E. 平滑肌肉瘤

1. 子宫肿瘤，镜下见形态一致的平滑肌细胞排列成栅状，核分裂少见
2. 腹膜后肿瘤，鱼肉状，镜下见分化差的梭形脂肪母细胞
3. 背部皮下肿瘤，淡黄色，分叶状，有包膜，镜下见成熟脂肪细胞

正确答案：ACB 您选择的答案：

第116-119题

- A. 碱性磷酸酶升高
- B. 酸性磷酸酶升高
- C. 胎儿硫糖蛋白升高
- D. 酸性和碱性磷酸酶升高
- E. 氧化酶升高

1. 胃癌
2. 肝癌
3. 前列腺癌
4. 骨肉瘤

正确答案：CABA 您选择的答案：

第120-122题

- A. 鳞癌
- B. 基底细胞癌
- C. 移行上皮癌
- D. 印戒细胞癌
- E. 单纯癌

1. 老年人面部皮肤癌，很少转移，对放射治疗敏感
2. 胃癌，癌细胞含大量黏液
3. 膀胱癌

正确答案：BDD 您选择的答案：

第123-125题

- A. 单纯癌
- B. 癌前病变
- C. 原位癌
- D. 癌珠
- E. 非典型性增生

1. 增生上皮细胞的形态呈一定程度的异型性，但还不足以诊断为癌
2. 某些具有癌变的潜在可能性的病变
3. 指黏膜上皮层或皮肤表皮层内的重度非典型增生，尚未突破基底膜

正确答案：EBC 您选择的答案：

第126-128题

- A. 黄曲霉毒素
- B. 芳香胺类
- C. 3,4-苯并芘
- D. 砷
- E. 苯

1. 可诱发膀胱癌
2. 可诱发肝癌
3. 可诱发白血病

正确答案：BAE 您选择的答案：

第129-131题

- A. 直接蔓延
- B. 淋巴道转移
- C. 血道转移
- D. 种植性转移
- E. 淋巴道合并血道转移

1. 晚期子宫癌侵犯直肠、膀胱
2. 胃癌穿破胃壁后种植到大网膜腹膜等处
3. 骨肉瘤等又发现肺的转移病灶

正确答案：ADC 您选择的答案：

第132-134题

- A. 良性肿瘤
- B. 恶性肿瘤
- C. 交界性肿瘤
- D. 癌前病变
- E. 非肿瘤性良性病变

1. 慢性萎缩性胃炎伴肠上皮化生

2. 白血病  
3. 卵巢黏液性囊腺病  
正确答案：DBA 您选择的答案：

第135-137题

A. 混合痣  
B. 皮内痣  
C. 交界痣  
D. 恶性黑色素瘤  
E. 畸胎瘤  
1. 痣细胞在真皮内呈巢状或条索状  
2. 同时有交界痣和皮内痣的改变  
3. 含三个胚层组织成分的肿瘤  
正确答案：BAE 您选择的答案：

第138-141题

A. 印戒细胞  
B. Reed-Sternberg细胞  
C. 透明细胞  
D. 组织细胞  
E. 嗜银细胞  
1. 霍奇金病可出现  
2. 肾细胞癌可出现  
3. 纤维组织细胞瘤可出现  
4. 阑尾类癌来自  
正确答案：BCDE 您选择的答案：

第142-144题

A. 交界性肿瘤  
B. 癌肉瘤  
C. 多发性瘤  
D. 畸胎瘤  
E. 腺瘤  
1. 腺上皮发生的良性肿瘤  
2. 来源于性腺或胚胎剩件中全能细胞的肿瘤，往往含有两个以上胚层的多样组织成分  
3. 肿瘤的组织形态介于良性肿瘤与恶性肿瘤之间  
正确答案：EDA 您选择的答案：

第145-147题

A. 多取血道转移  
B. 多取淋巴道转移  
C. 多取种植性转移  
D. 以上三者均可  
E. 很少发生转移  
1. 胃癌  
2. 基底细胞癌  
3. 绒毛膜上皮癌  
正确答案：DEA 您选择的答案：

第148-150题

A. 肝细胞肝癌  
B. 子宫颈鳞癌  
C. 燕麦细胞癌  
D. 皮肤癌  
E. 膀胱癌  
1. 与人乳头瘤病毒感染有关的癌是  
2. 与黄曲霉菌毒素和乙型肝炎病毒感染有关的癌是  
3. 与吸烟和大气污染有关的癌是  
正确答案：BAC 您选择的答案：

第151-153题

A. 子宫颈癌0期  
B. 子宫颈癌Ⅰ期  
C. 子宫颈癌Ⅱ期  
D. 子宫颈癌Ⅲ期  
E. 子宫颈癌Ⅳ期  
1. 癌灶扩展到盆壁，累及阴道下1/3  
2. 原位癌  
3. 癌严格局限于子宫颈  
正确答案：CAB 您选择的答案：

第154-156题

A. 多取血道转移  
B. 多取淋巴道转移  
C. 多取种植性转移  
D. 以上三者同时发生  
E. 不转移  
1. 子宫颈原位癌  
2. 绒毛膜癌  
3. 胃癌

正确答案：EAB 您选择的答案：