

习题集 病理学 血液循环障碍

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 混合血栓通常见于

- A 静脉血栓尾部
- B 心瓣膜闭锁缘
- C 毛细血管内
- D 静脉血栓体部
- E 静脉血栓头部

正确答案：D 您选择的答案：

第2题 关于慢性肝淤血描述错误的是

- A 肝细胞萎缩消失
- B 肝细胞脂肪变性
- C 肝细胞坏死
- D 肝间质纤维素渗出
- E 肝小叶中央静脉扩展充血

正确答案：D 您选择的答案：

第3题 DIC病人晚期出血的原因

- A 凝血系统被激活
- B 纤溶系统被激活
- C 凝血和纤溶系统同时被激活
- D 凝血系统活性>纤溶系统活性
- E 纤溶系统活性>凝血系统活性

正确答案：E 您选择的答案：

第4题 异常物体沿血流运行阻塞相应血管的过程叫

- A 梗塞
- B 梗死
- C 栓塞
- D 栓子
- E 血栓形成

正确答案：C 您选择的答案：

第5题 下述哪些疾病可引起槟榔肝

- A 右心衰
- B 左心衰
- C 门静脉高压
- D 缩窄性心包炎
- E 肠系膜静脉血栓形成

正确答案：A 您选择的答案：

第6题 下列哪项是DIC的直接原因

- A 血液高凝状态
- B 肝功能障碍
- C 血管内皮细胞受损
- D 单核吞噬细胞功能抑制
- E 高脂血症

正确答案：C 您选择的答案：

第7题 内皮细胞受损引起DIC与下述哪项无关

- A 激活内源性凝血系统
- B 激活外源性凝血系统
- C 激活补体系统
- D 激活纤溶系统
- E 激活激肽系统

正确答案：B 您选择的答案：

第8题 栓塞中最常见类型为

- A 血栓栓塞
- B 脂肪栓塞
- C 羊水栓塞
- D 气体栓塞
- E 瘤细胞栓塞

正确答案：A 您选择的答案：

第9题 下列哪一项不是血栓的结局

- A 化生
- B 机化
- C 再通
- D 钙化
- E 溶解吸收

正确答案：A 您选择的答案：

第10题 透明血栓的主要成分是

- A 血小板+纤维素

- B. 纤维素
- C. 血小板 + 白细胞
- D. 白细胞 + 纤维素
- E. 血小板 + 红细胞

正确答案：B 您选择的答案：

第11题 白色血栓形成的主要成分是

- A 纤维素
- B 中性粒细胞
- C 血小板
- D 单核细胞
- E 红细胞

正确答案：C 您选择的答案：

第12题 槟榔肝镜下的显著病变是

- A 肝小叶中央结构破坏
- B 中央静脉及血窦扩张充血和肝细胞萎缩及脂肪变性
- C 肝细胞脂肪变性
- D 肝细胞萎缩
- E 小叶中央静脉扩张充血

正确答案：B 您选择的答案：

第13题 DIC消耗性低凝血期

- A. 血小板计数减少，凝血酶原时间缩短，纤维蛋白原含量降低
- B. 血小板计数减少，凝血酶原时间延长，纤维蛋白原含量降低
- C. 血小板计数增加，凝血酶原时间延长，纤维蛋白原含量降低
- D. 血小板计数增加，凝血酶原时间缩短，纤维蛋白原含量增加
- E. 血小板计数减少，凝血酶原时间延长，纤维蛋白原含量增加

正确答案：B 您选择的答案：

第14题 羊水栓塞时，病理诊断的主要依据是

- A 肺小动脉和毛细血管内有羊水成分
- B 微血管内透明血栓
- C 肺泡腔内有角化上皮和胎粪小体等
- D 肺水肿和出血
- E 肺透明膜形成

正确答案：A 您选择的答案：

第15题 下列哪项不是DIC的原因

- A. 血管内皮细胞破坏
- B. 血小板和红细胞破坏
- C. 组织细胞损伤
- D. 肝功能障碍凝血物质增多
- E. 白血病

正确答案：D 您选择的答案：

第16题 瘀血常见的原因中没有

- A. 静脉受压
- B. 静脉血栓形成
- C. 静脉栓塞
- D. 器质性二尖瓣膜病
- E. 动脉栓塞

正确答案：E 您选择的答案：

第17题 华-佛综合征是指

- A. 肾功能衰竭
- B. 肾上腺皮质功能衰竭
- C. 肾上腺髓质功能衰竭
- D. 垂体功能衰竭
- E. 肺功能衰竭

正确答案：B 您选择的答案：

第18题 纤维蛋白被纤溶酶水解后生成

- A. FDP
- B. A肽，B肽
- C. 纤维蛋白单体
- D. 心肌抑制因子
- E. 血小板激活因子

正确答案：A 您选择的答案：

第19题 下述哪项是蛇毒的促凝机制

- A. 激活X因子
- B. 水解凝血蛋白
- C. 促进纤维蛋白溶解
- D. 触发外源性凝血过程
- E. 激活 因子

正确答案：E 您选择的答案：

第20题 下列不会引起空气栓塞的是

- A. 头颈部创伤

- B. 胸部手术
- C. 大隐静脉切开插管
- D. 分娩时子宫强烈收缩
- E. 胸部创伤

正确答案：C      您选择的答案：

第21题 下列对于慢性肺瘀血病变叙述错误的是

- A. 肺泡间隔增厚
- B. 肺泡壁毛细血管充血
- C. 肺泡腔内有红细胞
- D. 肺泡腔内可见大量中性粒细胞
- E. 肺组织内可见大量心衰细胞

正确答案：D      您选择的答案：

第22题 出血性梗死容易发生在

- A. 心
- B. 肾
- C. 肺
- D. 脑
- E. 脾

正确答案：C      您选择的答案：

第23题 梗死发生最常见的原因是

- A. 血栓形成
- B. 动脉腔狭窄
- C. 血管受压
- D. 动脉痉挛
- E. 静脉石

正确答案：A      您选择的答案：

第24题 出血性梗死的条件不包括哪一项

- A. 有双重血液供应
- B. 组织结构疏松
- C. 往往在淤血的基础上发生
- D. 组织结构致密
- E. 血管吻合支丰富

正确答案：D      您选择的答案：

第25题 下列哪个器官的梗死灶常为地图形

- A. 肺脏
- B. 心脏
- C. 肝脏
- D. 脾脏
- E. 肠管

正确答案：B      您选择的答案：

第26题 下列哪种情况不易发生气体栓塞

- A. 颈部外伤和手术
- B. 胸部外伤和手术
- C. 锁骨下静脉外伤
- D. 胎盘早期剥离
- E. 大隐静脉插管输液

正确答案：E      您选择的答案：

第27题 有关肝淤血时，下列哪一项是不正确的

- A. 中央静脉扩张
- B. 肝细胞萎缩
- C. 肝细胞脂肪变性
- D. 肝血窦扩张
- E. 小叶间静脉扩张、肝血窦狭窄

正确答案：E      您选择的答案：

第28题 引起脑栓塞的血栓性栓子多来自

- A. 左心
- B. 右心
- C. 骨盆静脉
- D. 肾动脉
- E. 下肢深静脉

正确答案：A      您选择的答案：

第29题 下列不可能合并血栓形成的疾病是

- A. 心肌梗死
- B. 动脉粥样硬化
- C. 血小板减少性紫癜
- D. 心内膜炎
- E. 静脉炎

正确答案：C      您选择的答案：

第30题 内皮细胞受损，启动内源性凝血系统是通过活化

- A. 凝血酶原

- B. 因子
- C. 组织因子
- D. 纤维蛋白原
- E. 钙离子

正确答案：B 您选择的答案：

第31题 淤血器官的形态特征是

- A. 色暗红，体积增大，切面湿润，功能增强，温度降低
- B. 色暗红，体积缩小，切面干燥，功能增强，温度降低
- C. 色暗红，体积增大，切面湿润，功能减退，温度降低
- D. 色鲜红，体积增大，切面干燥，功能减退，温度降低
- E. 色鲜红，体积缩小，切面湿润，功能增强，温度降低

正确答案：C 您选择的答案：

第32题 有关血栓形成的概念下列哪一项是错误的

- A. 血栓是在死亡后心血管内形成的
- B. 血栓是在活体心血管内血液成分析出形成的固体团块
- C. 血栓是在血管流动状态下形成的
- D. 血栓形成涉及心血管内皮、血流状态和凝血反应三个方面
- E. 血栓与血凝块不同

正确答案：A 您选择的答案：

第33题 血液循环中血栓随血流运行发生相宜的血管阻塞的过程称之为

- A. 梗死
- B. 血栓形成
- C. 血栓运行
- D. 血栓栓塞
- E. 栓子

正确答案：D 您选择的答案：

第34题 与血栓的形成无关的是

- A. 心血管内膜损伤
- B. 外源性凝血因子被激活
- C. 血流缓慢或涡流
- D. 内源性凝血因子被激活
- E. 血流加快

正确答案：E 您选择的答案：

第35题 急性肺淤血时，肺泡腔内的主要成分是

- A. 水肿液
- B. 纤维蛋白
- C. 炎细胞
- D. 红细胞
- E. 心力衰竭细胞

正确答案：A 您选择的答案：

第36题 下列心脏病很少引起肺淤血的是

- A. 高血压性心脏病
- B. 肺源性心脏病
- C. 风湿性心脏病二尖瓣狭窄
- D. 梅毒性心脏病
- E. 冠心病

正确答案：B 您选择的答案：

第37题 白色血栓的主要成分是

- A. 纤维素
- B. 中性白细胞
- C. 血小板
- D. 单核细胞
- E. 红细胞

正确答案：C 您选择的答案：

第38题 下列关于贫血性梗死的描述哪项错误

- A. 常发生于组织结构致密的器官
- B. 梗死灶灰白色
- C. 梗死灶边缘有充血出血带
- D. 坏死灶引起炎症反应
- E. 常发生于有双重血液供应的器官

正确答案：E 您选择的答案：

第39题 有关血栓形成，下列哪项是不正确的

- A. 下肢血栓多于上肢血栓
- B. 静脉血栓多于动脉血栓
- C. 静脉内多为混合血栓
- D. 心脏内多为红色血栓
- E. 毛细血管内多为纤维素血栓

正确答案：D 您选择的答案：

第40题 器官淤血的病理变化是

- A. 器官肿胀，暗紫红色，包膜紧张

- B. 器官发白, 渗出液增多
- C. 体积增大, 温度高
- D. 体积缩小, 红润
- E. 炎症反应

正确答案: A      您选择的答案:

第41题 手术后, 好发血栓的部位是

- A. 门静脉
- B. 颈静脉
- C. 肾静脉
- D. 冠状动脉
- E. 下肢静脉

正确答案: E      您选择的答案:

第42题 易发生贫血性梗死的器官是

- A. 心、脑、肠
- B. 肾、肠、脑
- C. 心、脾、肾
- D. 脾、心、肺
- E. 肾、心、肺

正确答案: C      您选择的答案:

第43题 手术后好发血栓的部位是

- A. 门静脉
- B. 颈静脉
- C. 肾动脉
- D. 冠状动脉
- E. 下肢静脉

正确答案: E      您选择的答案:

第44题 下列关于肺淤血的描述错误的是

- A. 肺泡壁毛细血管扩张
- B. 肺泡腔内有红细胞
- C. 肺泡腔内有大量的白细胞和纤维蛋白
- D. 肺泡腔内有水肿液
- E. 肺泡腔内有心衰细胞

正确答案: C      您选择的答案:

第45题 红细胞大量破坏可释放下述哪种物质而引起DIC

- A. 磷脂和ADP
- B. 因子和V因子
- C. 组织因子和凝血酶
- D. 纤溶酶和激肽释放酶
- E. 弹力蛋白酶和糜蛋白酶

正确答案: A      您选择的答案:

第46题 引起肺淤血的原因是

- A. 左心功能不全
- B. 右心衰
- C. 肺不张
- D. 肺换气障碍
- E. 以上都不是

正确答案: A      您选择的答案:

第47题 脂肪栓塞病人死亡原因常见于下列哪一种情况

- A. 急性右心衰竭
- B. 急性左心衰竭
- C. 肾功能衰竭
- D. 脑出血
- E. 心肌梗死

正确答案: A      您选择的答案:

第48题 DIC时微血管内的血栓称之为

- A. 白色血栓
- B. 混合血栓
- C. 附壁血栓
- D. 透明血栓
- E. 红色血栓

正确答案: D      您选择的答案:

第49题 DIC造成的贫血属于

- A. 缺铁性贫血
- B. 中毒性贫血
- C. 大细胞性贫血
- D. 溶血性贫血
- E. 失血性贫血

正确答案: D      您选择的答案:

第50题 下述哪项不是DIC时产生休克的机制

- A. 回心血量减少

B. 出血  
C. 补体激活  
D. 儿茶酚胺增多  
E. 纤维蛋白原降解产物(FDP)形成  
正确答案：D 您选择的答案：

第51题 局部组织因血流阻断而引起的坏死称为

A. 栓塞  
B. 血栓形成  
C. 机化  
D. 梗死  
E. 软化  
正确答案：D 您选择的答案：

第52题 最常见的液态栓子是

A. 血栓栓子  
B. 脂肪栓子  
C. 羊水栓子  
D. 细菌栓子  
E. 肿瘤栓子  
正确答案：B 您选择的答案：

第53题 弥散性血管内凝血(DIC)的最主要特征是

A. 广泛微血栓形成  
B. 凝血因子大量消耗  
E. 纤溶过程亢进  
D. 凝血功能紊乱  
E. 严重出血  
正确答案：D 您选择的答案：

第54题 有关血栓的论述，错误的是

A. 静脉血栓多于动脉血栓  
B. 下肢血栓多于上肢  
C. 动脉瘤内血栓多为混合血栓  
D. 静脉内血栓尾部多为红色血栓  
E. 毛细血管内血栓多为白色血栓  
正确答案：E 您选择的答案：

第55题 患者严重腹水，抽吸大量腹水后突然发生晕厥、出冷汗、四肢发冷等症状，其最可能的原因是

A. 病体虚弱  
B. 病情严重  
C. 腹腔血管减压后充血  
D. 脑栓塞  
E. 大出血  
正确答案：C 您选择的答案：

第56题 肺动脉及其分支栓塞的栓子来源于

A. 二尖瓣的疣状血栓  
B. 主动脉瓣的赘生物  
C. 体静脉和右心房的血栓  
D. 动脉及左心房的血栓  
E. 左心室附壁血栓  
正确答案：C 您选择的答案：

第57题 关于严重肺淤血的叙述，下列哪项是错误的

A. 肺泡腔内有水肿液  
B. 可见心力衰竭细胞  
C. 可发生漏出性出血  
D. 肺泡壁毛细血管扩张充血  
E. 肺泡腔内见有白细胞和纤维蛋白  
正确答案：E 您选择的答案：

第58题 一位在车祸时发生右大腿开放性骨折，患者面部青紫，呼吸困难，口吐白沫死亡，其最可能的死因是

A. 心肌梗死  
B. 气体栓塞  
C. 脂肪栓塞  
D. 脑出血  
E. 气胸  
正确答案：C 您选择的答案：

第59题 血栓对机体的影响哪项是有利的

A. 心瓣膜变形  
B. 微循环内广泛血栓，造成DIC  
C. 胃、十二指肠溃疡血栓对破裂的血管起阻塞裂口的作用  
D. 血栓脱落，造成阻塞  
E. 静脉血栓，阻塞血管  
正确答案：C 您选择的答案：

第60题 心力衰竭细胞最常见于

A. 冠心病

- B 肺心病
- C 右心衰竭
- D 慢性肺淤血
- E 肺褐色硬化

正确答案：D 您选择的答案：

第61题 DIC时血液凝固障碍表现为

- A 血液凝固性增高
- B 纤溶活性增高
- C 纤溶过程亢进
- D 凝血物质大量消耗
- E 溶血性贫血

正确答案：D 您选择的答案：

第62题 下列有关梗死叙述中，哪一项是不正确的

- A 双重血循环的器官不易发生梗死
- B 全身血液循环状态对梗死发生无影响
- C 动脉痉挛促进梗死发生
- D 有效的侧支循环的建立可防止梗死发生
- E 梗死多由动脉阻塞引起

正确答案：B 您选择的答案：

第63题 微血管病性溶血性贫血最常用的检查方法是

- A 红细胞计数
- B 血红蛋白浓度测定
- C 末梢血红细胞形态镜检
- D 红细胞脆性实验
- E 血浆胆红素测定

正确答案：C 您选择的答案：

第64题 慢性淤血引起的后果，下列哪项是不正确的

- A 漏出性出血
- B 血栓形成
- C 含铁血黄素沉积
- D 间质细胞增生
- E 实质细胞增生

正确答案：E 您选择的答案：

第65题 下述哪种血栓最常见

- A 心房内球形血栓
- B 二尖瓣上白色血栓
- C 下肢静脉混合血栓
- D 动脉瘤上附壁血栓
- E 上肢静脉内混合血栓

正确答案：C 您选择的答案：

第66题 肺动脉栓塞引起猝死的原因不包括哪一项

- A 肺动脉痉挛
- B 支气管动脉痉挛
- C 支气管及肺泡管痉挛
- D 肺出血性梗死
- E 心冠状动脉痉挛

正确答案：D 您选择的答案：

第67题 下列哪种因素与血栓形成无关

- A 血小板数量增多
- B 心血管内膜损伤
- C 血流缓慢
- D 癌细胞崩解产物
- E 纤维蛋白溶解酶增多

正确答案：E 您选择的答案：

第68题 大量组织因子入血的后果是

- A 激活内源性凝血系统
- B 激活外源性凝血系统
- C 激活补体系统
- D 激活激肽系统
- E 激活纤溶系统

正确答案：B 您选择的答案：

第69题 引起肺褐色硬化的最常见疾病是

- A 二尖瓣狭窄
- B 肺动脉瓣狭窄
- C 三尖瓣狭窄
- D 主动脉瓣闭锁不全
- E 肺动脉栓塞

正确答案：A 您选择的答案：

第70题 90%肺动脉血栓性栓塞的栓子都来源于

- A 下肢深静脉

- B. 上肢静脉
- C. 肝静脉
- D. 下肢浅静脉
- E. 门静脉

正确答案：A 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第71题 有一年青妇女，在分娩过程中突然呼吸困难，口唇及四肢末端发绀而亡。尸检肺血管内有角化上皮等物，此患者死因是下列哪一种

- A 血栓栓塞
- B 气体栓塞
- C 脂肪栓塞
- D 羊水栓塞
- E 瘤细胞栓塞

正确答案：D 您选择的答案：

第72题 有一老人，车祸时发生右大腿骨粉碎性及开放性骨折，在送往医院途中，该患者出现面部青紫，呼吸困难，口吐白沫而亡，其最可能的死因是

- A 心肌梗死
- B 气体栓塞
- C 脂肪栓塞
- D 脑出血
- E 气胸

正确答案：C 您选择的答案：

第73题 一患者左脚外伤后感染化脓，而后出现左腿麻木、发凉和水肿入院治疗。入院第三天突然出现呼吸困难，咳嗽、咯血以及口唇发绀等症状，在抢救过程中死亡，该患者可能死于下列哪一项疾病

- A 大叶性肺炎
- B 肺动脉栓塞
- C 肺出血性梗死
- D 败血症
- E 以上都不是

正确答案：B 您选择的答案：

第74题 有一病人患风湿性心脏病，二尖瓣狭窄合并关闭不全5年。如果对该病人作肺脏活检，在光镜下可能出现下列哪项病变

- A 肺泡壁毛细血管扩张充血
- B 肺泡腔内有红细胞
- C 肺泡腔内有心力衰竭细胞
- D 肺泡腔内有蛋白性液体
- E 以上各项病变都可出现

正确答案：E 您选择的答案：

第75题 有一位女教师，下肢静脉曲张，术中见静脉腔内有多个褐色物，堵塞管腔，该褐色物最可能是下列哪种病变

- A 静脉内血凝块
- B 静脉内血栓
- C 静脉内血栓栓子
- D 静脉内瘤栓
- E 以上都不是

正确答案：B 您选择的答案：

第76题 有一老人被人打后，入院检查中，出现口唇发绀，四肢凉，血压下降而死亡，其死亡原因最可能是下列哪一项

- A 心肌梗死
- B 脑出血
- C 动脉瘤破裂
- D 肺动脉栓塞
- E 心力衰竭

正确答案：A 您选择的答案：

第77题 一患儿；腹部剧烈疼痛，伴恶心、呕吐，以急腹症入院。术中见肠套叠，肠管暗红，表面无光泽，该处可见纤维素样物附着，该肠管可能发生下列哪种病变

- A 静脉淤血
- B 动脉充血
- C 肠管梗死
- D 急性肠炎
- E 以上都不是

正确答案：C 您选择的答案：

第78题 一患者主诉心悸气短，两下肢浮肿入院，查体：颈静脉怒张，心尖区可闻及舒张期杂音，肝肋缘下3cm，轻度压痛，AFP正常患者的肝脏可能出现下列哪一种病变

- A 肝细胞癌
- B 慢性肝淤血
- C 肝脂肪变性
- D 慢性肝炎
- E 以上都不是

正确答案：B 您选择的答案：



三、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第79-81题

- A. 白色血栓
- B. 混合血栓
- C. 红色血栓
- D. 透明血栓
- E. 血栓栓塞
- 1. DIC时全身微循环小血管内栓塞
- 2. 心瓣膜上的血栓
- 3. 血栓脱落随血流至远处

正确答案：DAE 您选择的答案：

第82-84题

- A. 血管内皮广泛受损激活 因子导致DIC
- B. 组织严重破坏，造成组织因子入血导致DIC
- C. 红细胞大量破坏导致DIC
- D. 白细胞大量破坏导致DIC
- E. 其他促凝物质入血导致DIC
- 1. 急性早幼粒细胞白血病是通过
- 2. 毒蛇咬伤是通过
- 3. 恶性肿瘤坏死是通过

正确答案：DEB 您选择的答案：

第85-89题

- A. 梗死灶地图形
- B. 梗死灶锥体形
- C. 梗死灶节段状
- D. 梗死灶发生液化
- E. 梗死灶发生出血
- 1. 心肌梗死
- 2. 肺梗死
- 3. 脾梗死
- 4. 肾梗死
- 5. 脑梗死

正确答案：AEBCD 您选择的答案：

第90-92题

- A. 纤维素样血栓
- B. 羊水栓塞
- C. 氮气栓塞
- D. 脂肪栓塞
- E. 混合栓塞
- 1. 股骨骨折
- 2. 潜水病
- 3. 孕妇生产时出现的栓塞

正确答案：DCB 您选择的答案：

第93-95题

- A. 瘀血
- B. 血栓形成
- C. 栓子
- D. 梗死
- E. 栓塞
- 1. 活体心血管内血液成分形成固体质块的过程称为
- 2. 静脉回流受阻，使血液淤积于小静脉和毛细血管内的现象是
- 3. 把能够阻塞血管腔的异常物质称为

正确答案：BAC 您选择的答案：

第96-98题

- A. 颈、胸部创伤时，静脉破裂，空气进入
- B. 肺毛细血管内有角化上皮、胎毛、胎粪等
- C. 寄生虫阻塞肝内门静脉分支
- D. 长骨骨折，游离的脂滴进入破裂静脉
- E. 肿瘤侵入血管
- 1. 羊水栓塞
- 2. 空气栓塞
- 3. 脂肪栓塞

正确答案：BAD 您选择的答案：

第99-101题

- A. 槟榔肝
- B. 脂肪肝
- C. 肝气球样变
- D. 黄色肝萎缩
- E. 肝脏结节状变化
- 1. 肝脂肪变性

2. 肝淤血

3. 肝硬化

正确答案：BAE 您选择的答案：

第102-104题

A. 楔形

B. 地图形

C. 节段形

D. 软化灶

E. 烧瓶形

1. 脑梗死灶为

2. 肠梗死形状为

3. 肺梗死形状为

正确答案：DCA 您选择的答案：

第105-107题

A. 含铁血黄素

B. 黑色素

C. 脂褐素

D. 胆红素

E. 血色素

1. 肺出血性梗死可见

2. 慢性肺淤血可见

3. 老年心肌细胞可见

正确答案：AAC 您选择的答案：

第108-112题

A. 心房纤颤时脑软化

B. 肝硬化时食管静脉曲张

C. 雷诺病

D. 槟榔肝

E. 急性阑尾炎

1. 栓塞

2. 充血

3. 淤血

4. 局部贫血

5. 侧支循环建立

正确答案：AEDCB 您选择的答案：

第113-115题

A. 纤溶系统异常活跃，FDP增多

B. 继发性纤溶系统激活，血中凝血因子和血小板减少

C. 纤溶系统异常活跃，血中凝血因子和血小板增多

D. 凝血系统被激活，血中凝血酶增多

E. 凝血系统被激活，FDP增多

1. 高凝期

2. 消耗性低凝期

3. 继发性纤溶亢进期

正确答案：DBA 您选择的答案：