

习题集 神经病学 偏头痛

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 最常见的偏头痛为

- A 典型偏头痛
- B 普通偏头痛
- C 特殊型偏头痛
- D 丛集型偏头痛
- E 血管性头痛

正确答案：B 您选择的答案：

第2题 预防偏头痛发作的常用药物有

- A 麦角衍生物类
- B 非类固醇类抗炎剂
- C  $\beta$ 受体阻滞剂
- D 神经安定类
- E 曲普坦类

正确答案：C 您选择的答案：

第3题 偏头痛临床特点不包括

- A 大多数在儿童和青年期发病，女性多于男性
- B 反复发作的一侧性搏动性头痛，可扩展至全头部
- C 头痛发作频率每周至每年1次至数次不等，偶见持续发作病例
- D 发作前都有视觉先兆
- E 头痛常伴有恶心呕吐，畏光怕声，活动加重，睡眠后减轻

正确答案：D 您选择的答案：

第4题 支持功能性头痛的描述有

- A 反复发作性搏动性头痛，睡眠后减轻，间歇期正常
- B 癫痫发作
- C 视力减退
- D 晨起时加重伴喷射样呕吐
- E 有神经系统阳性体征

正确答案：A 您选择的答案：

第5题 偏头痛患者应用咖啡因麦角胺片的正确方法是

- A 头痛发展至剧烈时服用
- B 头痛间歇期有规则地服用
- C 先兆症状来临后或头痛刚开始时服用
- D 头痛伴有恶心、呕吐时服用
- E 头痛出现后一般镇痛剂无效时服用

正确答案：C 您选择的答案：

第6题 偏头痛的防治，哪项不正确

- A 避免过度疲劳和精神紧张
- B 不要过饥、过饱
- C 不饮酒和摄进高脂肪食物
- D 避免摄进已知激发发作的食物
- E 发作后可用血管扩张药

正确答案：E 您选择的答案：

第7题 典型偏头痛的先兆症状可能是由于

- A 颅外动脉收缩
- B 颅外动脉扩张
- C 颅内动脉收缩
- D 颅内动脉扩张
- E 颅内和颅外动脉扩张

正确答案：C 您选择的答案：

第8题 偏头痛最常见的类型是

- A 典型偏头痛
- B 群集性头痛
- C 普通型偏头痛
- D 眼肌瘫痪型偏头痛
- E 基底动脉型偏头痛

正确答案：C 您选择的答案：

第9题 偏头痛最常见的临床类型是

- A 典型偏头痛
- B 普通型偏头痛
- C 眼肌麻痹型偏头痛
- D 偏瘫型偏头痛
- E 晚发型偏头痛

正确答案：B 您选择的答案：

第10题 治疗偏头痛发作，应选用

- A 心得安
- B 苯噻啶
- C 硝苯吡啶
- D 咖啡因麦角胺
- E 甲基麦角酸丁醇酰胺

正确答案：D 您选择的答案：

第11题 偏头痛的诊断依据是

- A. 多在青春期前后发病
- B. 头痛呈周期性发作，每次发作的过程相似
- C. 应用麦角胺制剂多有显效
- D. 可有家族史
- E. 以上都是

正确答案：E 您选择的答案：

第12题 预防偏头痛常用药物，不包括

- A.  $\beta$ -受体阻滞剂(如：普萘洛尔)
- B. 抗癫痫药物(如：丙戊酸钠)
- C. 抗抑郁药物(如：阿米替林)
- D. 钙离子拮抗剂(如：氟桂利嗪)
- E. 曲普坦类(如：舒马普坦)

正确答案：E 您选择的答案：

第13题 下面哪种发作类型属于偏头痛等位发作

- A 发作性头痛后伴有眼肌瘫痪
- B 先偏瘫，麻木、失语数十分钟后发生头痛
- C 周期性发生某些症状而无头痛，或与头痛交替出现
- D 耳鸣、共济失调，也可有嗜睡状态或跌倒发作
- E 发作迅速，持续1~2小时可完全缓解

正确答案：C 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第14题 女性，25岁，头痛3年多，每次头痛前有烦躁不安，视物模糊，头痛发作以右侧为主，并扩展至整个头部，呈搏动性，持续时间约10小时。神经系统检查未见异常，脑电图正常。诊断应考虑

- A 偏头痛
- B 三叉神经痛
- C 颅内占位性病变
- D 癔病
- E 癫痫精神运动性发作

正确答案：A 您选择的答案：

第15题 女，30岁，有偏头痛史5年，近2个月来发作频繁，为控制症状，急性期应首选

- A. 心得安(普萘洛尔)
- B. 苯噻啶
- C. 佐米格
- D. 西比灵
- E. 尼莫地平

正确答案：C 您选择的答案：

第16题 女，25岁，3年来有发作性幻视，几分钟后幻视消失，即出现头痛，头痛持续数小时渐缓解。发作时无抽搐、无意识障碍，不发作时完全正常。神经系统检查

(-)。诊断考虑

- A. 头痛型癫痫
- B. 颅内动脉瘤
- C. 肌紧张型头痛
- D. 短暂性脑缺血发作
- E. 偏头痛

正确答案：E 您选择的答案：

第17题 年轻女性，反复发作性头痛3年。每次发作前均有2小时左右烦躁，饥饿感，随之自觉出现一眼异彩，持续约30分钟，缓解后出现头痛，并常以眼症状对侧出现。头痛呈钻痛，搏动性，往往有恶心、呕吐，持续4~5小时后进入睡眠可缓解。考虑为

- A 头痛型癫痫
- B 丛集性头痛
- C 普通型头痛
- D 特殊型头痛
- E 典型偏头痛

正确答案：E 您选择的答案：

第18题 女，54岁，剧烈头痛伴呕吐2小时。既往无反复发性头痛史。神经系统检查无明显异常。诊断首先应排除

- A. 蛛网膜下腔出血
- B. 脑出血
- C. 颞动脉炎
- D. 偏头痛
- E. 脑梗死

正确答案：A 您选择的答案：

第19题 女性，35岁，发作性头痛4年，位不定，每次持续数小时至1天，发作前视物有模糊暗影，神经系统体检未见明显异常。脑CT未见异常，其母有类似发作史。头痛发作早期的首选药物是

- A 卡马西平
- B 麦角胺咖啡因
- C 苯噻啶
- D 阿司匹林
- E 苯巴比妥

正确答案：B 您选择的答案：

第20题 男，25岁，5岁起反复出现发作性右侧偏瘫，随后伴有左侧搏动性头痛，时伴失语，头痛约2~3小时可缓解，偏瘫约持续1天完全恢复。每年有3~4次发作，15岁后偶有类似发作。诊断可能为

- A 多发性硬化
- B 颅内动脉瘤
- C 丛集性头痛
- D 偏瘫型偏头痛
- E 癫痫

正确答案：D 您选择的答案：

第21题 男，16岁，不规则性头痛、头胀3年，多在午后出现，劳累诱发，休息后好转。体检：颈部肌肉紧张，双侧耳后有固定压痛，按压后减轻，神经系统检查正常。诊断首先考虑

- A 紧张性头痛
- B 脑血管畸形
- C 普通偏头痛
- D 脑动脉瘤
- E 脑肿瘤

正确答案：A 您选择的答案：

三、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第22-23题

男，28岁，右侧眶后持续性钻痛2天，出现复视，右上睑下垂。2年前有类似发病。患有慢性副鼻窦炎十余年。体检：右侧瞳孔散大，对光反射弱，右上睑遮盖瞳孔，右眼向上、下、内注视露白并有复视，余正常肾上腺皮质类固醇治疗10天后痊愈。

1. 最可能的诊断是

- A 青光眼
- B 脑动脉瘤
- C 脑动静脉畸形
- D 海绵窦血栓形成
- E Tolosa-Hunt综合征

2. 其病因是

- A 动脉瘤性扩张或微渗漏
- B 上颌窦炎症
- C 海绵窦硬脑膜局限性非特异性炎症或肉芽肿
- D 高凝状态
- E 化脓性感染

正确答案：EC 您选择的答案：

四、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第24-27题

- A 心得安(普萘洛尔)
- B 蔡普生
- C 赛庚啶
- D 麦角胺咖啡因
- E 舒马普坦

- 1. 非类固醇类抗炎药
- 2. 5-羟色胺受体激动剂
- 3. 5-羟色胺拮抗剂
- 4. 抗组胺药

正确答案：BEDC 您选择的答案：

第28-31题

- A 非类固醇消炎镇痛药物
- B 发作早期给麦角胺咖啡因
- C 5-羟色胺受体激动剂
- D 心得安、苯噻啶等药物
- E 皮质类固醇

- 1. 不常发作也不很强烈的偏头痛应用
- 2. 不常发作但很强烈的偏头痛应用
- 3. 对发作频繁，每月发作2次者用
- 4. 对麦角胺咖啡因无效的偏头痛可用

正确答案：ABDC 您选择的答案：