

习题集 神经病学 周围神经病

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 以下表现与格林-巴利综合征无关的是

- A．四肢无力
- B．腓肠肌压痛
- C．呼吸困难
- D．三叉神经痛
- E．双侧面瘫

正确答案：D 您选择的答案：

第2题 坐骨神经痛最常见的病因是

- A．马尾肿瘤
- B．椎体转移癌
- C．神经根炎
- D．腰椎间盘突出
- E．脊椎炎

正确答案：D 您选择的答案：

第3题 格林-巴利综合征治疗不恰当的是

- A．早期血浆置换
- B．早期大剂量免疫球蛋白治疗
- C．早期应用肾上腺糖皮质激素
- D．早期应用B族维生素等
- E．早期康复治疗

正确答案：C 您选择的答案：

第4题 原发性与继发性三叉神经痛的主要鉴别是根据

- A．是否存在“触发点”
- B．是否伴有神经系统体征
- C．是否伴有角膜炎
- D．是否伴有牙齿疾患
- E．是否疼痛范围较小

正确答案：B 您选择的答案：

第5题 格林-巴利综合征的临床表现是

- A．四肢痉挛性瘫痪
- B．四肢感觉障碍重于运动障碍
- C．一侧周围性面瘫
- D．明显的括约肌功能障碍
- E．以上均不是

正确答案：E 您选择的答案：

第6题 “扳机点”常见于

- A．三叉神经痛
- B．面神经炎
- C．症状性癫痫
- D．面肌抽搐
- E．偏头痛

正确答案：A 您选择的答案：

第7题 格林-巴利综合征经典的病理改变是

- A．华勒变性
- B．轴突变性
- C．节段性脱髓鞘
- D．血管炎
- E．嵌压性神经病

正确答案：C 您选择的答案：

第8题 特发性面神经麻痹不应有的症状是

- A 额纹消失
- B Bell (贝尔)现象
- C 耳后或下颌角后疼痛
- D 舌前2 / 3味觉障碍
- E 外耳道或鼓膜出现疼痛疱疹

正确答案：E 您选择的答案：

第9题 坐骨神经痛客观体征最重要的是

- A．Hoffmann征
- B．Lasegue征
- C．Brudzinski征
- D．Babinski征
- E．Romberg征

正确答案：B 您选择的答案：

第10题 原发性三叉神经痛，查体可发现

- A．面部感觉减退

- B. 患侧角膜反射消失
- C. 面部痛觉过敏
- D. 下颌反射减弱
- E. 没有阳性体征

正确答案：E 您选择的答案：

第11题 对慢性炎症性脱髓鞘性多发性神经病的正确描述是

- A. 90%的病例症状在1个月内达高峰
- B. 常有前驱感染史
- C. 呼吸衰竭发生率高
- D. 呈单相性病程
- E. 首选治疗药物是肾上腺皮质类固醇

正确答案：E 您选择的答案：

第12题 格林-巴利综合征伴有面神经麻痹与特发性面神经麻痹(面神经炎)的主要临床鉴别点是

- A. 有否皱额闭眼障碍
- B. 有否鼓颊提唇不能
- C. 有否肢体活动障碍
- D. 有否张口偏斜
- E. 有否伸舌偏斜

正确答案：C 您选择的答案：

第13题 原发性与继发性三叉神经痛的鉴别主要依据是

- A. 疼痛时间的长短
- B. 疼痛发作的频率
- C. 有无面部痛觉障碍，角膜反射有无改变
- D. 有无触发点或扳机点
- E. 疼痛的范围

正确答案：C 您选择的答案：

第14题 格林-巴利综合征的病因可能是

- A. 病毒感染周围神经
- B. 病毒感染脊髓
- C. 脊髓的自身免疫性炎症
- D. 周围神经自身免疫性炎症
- E. 细菌感染周围神经

正确答案：D 您选择的答案：

第15题 格林-巴利综合征脑脊液蛋白细胞分离现象出现的时间多见于

- A. 起病后一周内
- B. 起病后第一至二周
- C. 起病后第三周
- D. 起病后四周
- E. 起病后二月

正确答案：C 您选择的答案：

第16题 关于三叉神经痛的描述，不正确的是

- A. 疼痛以第二、三支最多见
- B. 大多单侧性发病
- C. 疼痛短暂、剧烈
- D. 疼痛区感觉过敏
- E. 有扳机点触发疼痛

正确答案：D 您选择的答案：

第17题 格林-巴利综合征脑脊液蛋白细胞分离现象出现的时间多见于

- A. 起病后一周内
- B. 起病后一至二周
- C. 起病后第三周
- D. 起病后一个月
- E. 起病后二个月

正确答案：C 您选择的答案：

第18题 格林-巴利综合征不常有

- A. 四肢对称性迟缓性瘫痪
- B. 脑神经障碍
- C. 脑脊液有细胞蛋白分离现象
- D. 大小便功能正常
- E. 病理反射持续阳性

正确答案：E 您选择的答案：

第19题 下列哪项不符合特发性面神经麻痹的表现

- A. 周围性面瘫
- B. 大多为单侧
- C. Bell现象
- D. 常伴面部感觉减退
- E. 急性起病

正确答案：D 您选择的答案：

第20题 原发性三叉神经痛不应有的表现

- A. 面部发作性剧痛

- B 患侧面部皮肤粗糙
- C 面部痛觉减退
- D 痛性抽搐
- E 有触发点

正确答案：C 您选择的答案：

第21题 原发性三叉神经痛的治疗应首选

- A 苯妥英钠
- B 卡马西平
- C 氯硝西泮
- D 纯酒精注射
- E 神经切断术

正确答案：B 您选择的答案：

第22题 原发性三叉神经痛的病因被认为可能是

- A 异位微血管襻的压迫
- B 多发性硬化
- C 听神经瘤
- D 鼻咽癌
- E 脑膜瘤

正确答案：A 您选择的答案：

第23题 格林-巴利综合征，最常受累的脑神经是

- A 一侧面神经
- B 双侧面神经
- C 动眼神经
- D 三叉神经
- E 双侧舌咽、迷走神经

正确答案：B 您选择的答案：

第24题 急性格林-巴利综合征，哪种治疗较为适宜

- A 大量抗生素静注
- B 吡啶斯的明口服
- C 大量糖皮质激素
- D 血浆交换疗法
- E 氯化钾口服

正确答案：D 您选择的答案：

第25题 下列哪一项不是格林-巴利综合征经典表现

- A 四肢弛缓性瘫痪
- B 四肢运动障碍重于感觉障碍
- C 腱反射消失
- D 尿潴留
- E 脑脊液呈蛋白-细胞分离现象

正确答案：D 您选择的答案：

第26题 关于格林-巴利综合征的描述，不正确的是

- A 大多急性起病
- B 四肢对称性、弛缓性瘫痪
- C 可伴有四肢末端手套-袜套型感觉障碍
- D 明显的膀胱直肠功能障碍
- E 常有CSF蛋白细胞分离

正确答案：D 您选择的答案：

第27题 脊髓灰质炎与格林-巴利综合征的主要鉴别点是

- A 起病时发热
- B 早期出现肌肉萎缩
- C 腱反射减低
- D 可出现球麻痹
- E 无病理反射

正确答案：A 您选择的答案：

第28题 特发性面神经麻痹(面神经炎)时不应用的治疗是

- A 皮质激素
- B 维生素B
- C 抗生素
- D 理疗
- E 眼膏眼罩

正确答案：C 您选择的答案：

第29题 原发性和继发性三叉神经痛的主要鉴别点是

- A 疼痛的剧烈程度
- B 疼痛的分布区域
- C 有否面部感觉或角膜反射障碍
- D 是否为反复发作
- E 对药物的治疗反应

正确答案：C 您选择的答案：

第30题 格林-巴利征不常有的表现为

- A 双侧周围性面瘫

B 四肢弛缓性瘫  
C 腱反射弱  
D 肌肉萎缩  
E 胸4以下传导束性痛温觉障碍  
正确答案：E 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第31题 女，50岁。双手指尖麻木、刺痛逐渐加重2年，多在劳累时加重，有时夜间“麻醒”，甩手或局部搓揉能减轻。绝经1年。体检：血压140 / 90mmHg，可引出Tinel征和Phalen征，右手桡侧3个半指针刺痛觉略迟钝，未见明显肌萎缩。电生理检查：右正中神经远端感觉潜伏期延长。诊断最可能是  
A．颈椎间盘突出症  
B．腕管综合征  
C．末梢神经炎  
D．肘管综合征  
E．腔隙性脑梗死  
正确答案：B 您选择的答案：

第32题 女，20岁。四肢无力3天，视物不清1天。1周前有腹泻，持续1天即愈。体检：神志清楚双眼向两侧注视均轻度受限，露白约2.5mm。四肢肌力4级，腱反射近乎消失，指鼻试验不准，跟膝腱试验欠稳，深浅感觉存在，病理反射阴性。该患者最可能是  
A．面神经炎  
B．重症肌无力  
C．Miller-Fisher综合征  
D．急性小脑炎  
E．肌营养不良  
正确答案：C 您选择的答案：

第33题 病人男62岁，有糖尿病史近日来出现口角偏右，左侧鼓腮不能，左提唇不能，双侧闭眼皱额等活动正常，病变位于  
A．右侧面神经  
B．左侧面神经  
C．右侧皮质脑干束  
D．左侧皮质脑干束  
E．左侧三叉神经  
正确答案：C 您选择的答案：

第34题 对嵌压性神经病描述不正确的是  
A．正常时经过狭窄解剖通道的神经由于反复的缩窄性压迫导致脱髓鞘  
B．临床表现似多发性神经炎  
C．严重的压迫可有轴突变性  
D．可服用非类固醇性抗炎药治疗  
E．肌电图呈失神经支配为手术指征  
正确答案：B 您选择的答案：

第35题 女，65岁，右面部发作性疼痛2年，诊断为原发性三叉神经痛。治疗应先用  
A．卡马西平或苯妥英钠等药物  
B．周围支神经纯酒精封闭  
C．三叉神经节射频热凝  
D．周围支神经切断术  
E．三叉神经根切断术  
正确答案：A 您选择的答案：

第36题 男性，16岁，突然四肢弛缓性瘫痪，双侧面瘫，一周来院，无尿便失禁，无发热，腰穿正常。病前无感染史，首先应想到的诊断是  
A．格林-巴利综合征  
B．脊髓灰质炎  
C．重症肌无力  
D．周期性瘫痪  
E．急性脊髓炎  
正确答案：A 您选择的答案：

第37题 患者男，70岁。左侧下颌部阵发性抽搐剧痛3天，不能吃饭。查：双额纹对等，闭目有力，面部感觉对称存在。诊断  
A．右面神经麻痹  
B．偏头痛  
C．左三叉神经痛  
D．右三叉神经痛  
E．左面神经麻痹  
正确答案：C 您选择的答案：

第38题 男，66岁，发作性左季肋部电击样疼痛3个月，常夜间痛醒。15年前曾因右上肺结核瘤手术。体检：精神差，胸背部皮肤完整，右T6棘突旁压痛。心肺听诊无异常，肝脾肋下未触及。神经系统检查无阳性体征。拟诊断为  
A．症状性肋间神经痛  
B．原发性肋间神经痛  
C．胆石症  
D．心绞痛  
E．椎管狭窄

正确答案：A 您选择的答案：

第39题 男，18岁，20天前四肢进行性无力，大小便正常。检查见四肢松弛性瘫痪，腱反射消失，感觉正常。腰穿，脑脊液检查：淋巴细胞 $5 \times 10^6/L$ ，糖 $4.4mmol/L$ ，氯化物 $125mmol/L$ ，蛋白质 $1.45g/L$ 。诊断考虑

- A. 周期性瘫痪
- B. 格林-巴利综合征
- C. 横贯性脊髓炎
- D. 脊髓压迫症
- E. 脑干脑炎

正确答案：B 您选择的答案：

第40题 20岁男性，四肢无力4天，无尿便障碍，无发热。查四肢肌力 级，四肢远端痛觉减退，腱反射弱，无病理反射，腰穿正常。首先考虑的疾病是

- A. 格林-巴利综合征
- B. 脊髓灰质炎
- C. 周期性麻痹
- D. 急性脊髓炎
- E. 重症肌无力

正确答案：A 您选择的答案：

第41题 男，24岁，两天前出现左耳部痛，继之有左眼闭合不全，口角右歪。检查见左侧皱额闭眼、提唇不能，左外耳道疱疹。诊断考虑

- A. 左侧Hunt综合征
- B. 格林-巴利综合征
- C. 右侧脑桥炎
- D. 右侧Bell麻痹
- E. 左侧中脑炎

正确答案：A 您选择的答案：

第42题 女性，55岁，二年来经常右上牙痛，拔牙后仍反复发作，每次发作15~30秒，进食时发作频繁，间歇时正常工作。查体：右上磨牙全部脱落，右面皮肤粗糙，其他未见异常。诊断考虑是

- A. 原发性三叉神经痛
- B. 继发性三叉神经痛
- C. 牙龈炎
- D. 牙周炎
- E. 丘脑痛

正确答案：A 您选择的答案：

第43题 24岁，男性，既往健康，午睡时出现口角歪斜，查左额纹浅，Bell征阳性，左鼻唇沟浅，舌伸居中，其他未异常。应首先采用的治疗是

- A. 针灸
- B. 激素
- C. 青霉素
- D. 血塞通
- E. 维生素

正确答案：B 您选择的答案：

第44题 男，45岁，提重物后突然出现右臀部向下放射性触电样疼痛1天，咳嗽或屏气时加重。体检：右腰4~5棘突旁压痛，右Lasegue征阳性，颈胸试验阳性，右踝反射减低。诊断可能是

- A. 坐骨神经炎
- B. 腰椎间盘突出症
- C. 腰肌劳损
- D. 髌关节炎
- E. 髌髌关节病

正确答案：B 您选择的答案：

第45题 女，57岁。左耳聋、耳鸣病史10年，无其他慢性疾病史。7个月前无明显诱因出现发作性左侧鼻孔及鼻背部电击样疼痛，每次发作持续1~2分钟；发作间隙期无任何不适；触摸鼻背部皮肤可诱发疼痛发作；卡马西平治疗(0.1g, 3/日)部分缓解。神经系统检查：左传导性耳聋，左侧角膜反射消失。诊断应首先考虑

- A. 原发性三叉神经痛
- B. 蝶腭神经痛
- C. 继发性三叉神经痛
- D. 鼻窦炎
- E. 非典型性面痛

正确答案：C 您选择的答案：

三、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第46-47题

女，12岁，右上睑下垂6个月伴视物重影，晨轻暮重。体检：瞳孔等大等圆，光反射正常。右上睑遮盖至瞳孔边缘，眼向四方运动均有轻度受限，四肢肌力正常，腱反射存在。

- 1. 最可能的病因是
- A. 格林-巴利综合征
- B. 重症肌无力
- C. 肌营养不良
- D. 海绵窦综合征
- E. 动眼神经损伤
- 2. 不恰当的检查是

- A. 头颅CT
- B. 神经电生理检查
- C. 新斯的明肌肉注射
- D. 胸部CT
- E. 疲劳试验

正确答案：BA 您选择的答案：

#### 第48-50题

女，50岁，不规则头痛、呕吐3个月，夜间头痛重，不发热。近1周头痛进行性加重伴癫痫发作2次，头颅CT检查未见异常。体检：意识清楚，颈略有抵抗，双眼视乳头边界模糊。胸部平片右中下肺野类圆形肿块。

1. 头痛应考虑为
  - A. 颅高压性头痛
  - B. 三叉神经痛
  - C. 丛集性头痛
  - D. 枕神经痛
  - E. 青光眼
2. 诊断高度怀疑为
  - A. 真菌性脑膜炎
  - B. 细菌性脑膜炎
  - C. 结核性脑膜炎
  - D. 癌性脑膜炎
  - E. 胶质瘤
3. 为明确病因，应进行的检查是
  - A. 头颅MRI
  - B. 脑脊液细胞学检查
  - C. 脑血管造影
  - D. 脑电图
  - E. 抗炎治疗

正确答案：ADB 您选择的答案：

#### 第51-52题

一青年男性，两天前，左耳后区疼痛，午睡后突然口角向右偏斜，查左额纹浅，闭目无力，左鼻唇沟浅，伸舌居中。

1. 诊断考虑为
  - A. 右动眼神经炎
  - B. 右脑桥炎
  - C. 左中脑炎
  - D. 右中脑炎
  - E. 左面神经炎
2. 治疗先采用
  - A. 激素治疗
  - B. 针灸
  - C. 氨苄西林静滴
  - D. 维生素C肌注
  - E. 曲克芦丁肌注

正确答案：EA 您选择的答案：

#### 第53-54题

男，39岁。3天前感右耳后疼痛，今晨起洗漱时发现右口角漏水，右眼不能闭合。体检：右外耳道见少量小水疱及卡他性分泌物，右侧额纹消失，试图闭眼时右眼闭合不全，有Bell现象，右侧鼻唇沟浅，示齿时口角向左歪斜。右舌前2/3味觉缺失，右乳突处压痛。

1. 最可能的诊断是
  - A. Meige综合征
  - B. 卡他性中耳炎
  - C. Ramsay-Hunt综合征
  - D. 急性乳突炎
  - E. 以上均不是
2. 其病因是
  - A. 茎乳孔狭窄
  - B. 非特异性炎症
  - C. HZV(herpeszostervirus)感染
  - D. 细菌感染
  - E. 乳突炎

正确答案：CC 您选择的答案：

#### 第55-57题

男，30岁，出差来本地。晚餐饮酒，次晨起床时翻身困难，四肢无力，不能行走，体检：神。志清楚，脑神经正常，四肢肌力3级，无感觉障碍，肱二、三头肌及膝反射正常。

1. 诊断首先考虑
  - A. 重症肌无力
  - B. 周期性麻痹
  - C. 多发性神经炎
  - D. 多发性肌炎
  - E. 格林-巴利综合征
2. 为明确诊断，首选的实验室检查是
  - A. 肌电图检查
  - B. 做头部CT扫描
  - C. 查脑脊液
  - D. 测血钾
  - E. 血肌酶谱检查
3. 治疗上首选
  - A. 肾上腺皮质类固醇

- B. 肌注新斯的明
  - C. 顿服10%氯化钾20~50ml
  - D. 大剂量维生素B族
  - E. 静滴5%葡萄糖注射液+维生素C
- 正确答案：BDC 您选择的答案：

#### 第58-62题

患者，男，18岁，早晨起床洗脸照镜子时出现右眼不能闭合，口角左歪，流涎，四肢活动良好。

1. 最可能的诊断是
  - A. 腮腺炎
  - B. 面神经炎
  - C. 动眼神经麻痹
  - D. 格林-巴利综合征
  - E. 脑肿瘤
2. 急性期治疗应首选
  - A. 电刺激
  - B. 维生素
  - C. 糖皮质激素
  - D. 抗生素
  - E. 手术
3. 如果患者左眼也闭合不全，面部表情动作消失，伴四肢无力，则最可能的诊断是
  - A. 腮腺炎
  - B. 面神经炎
  - C. 动眼神经麻痹
  - D. 格林-巴利综合征
  - E. 脑肿瘤
4. 如患者伴有左侧上下肢无力，则病变位于
  - A. 右面神经
  - B. 脊神经根
  - C. 右中脑
  - D. 右脑桥
  - E. 右内囊
5. 如出现第26题的情况，需立即作的辅助检查是
  - A. 腰穿脑脊液检查
  - B. 肌电图
  - C. 脑MRI
  - D. 脑子片
  - E. 脊髓MRI

正确答案：BCDCC 您选择的答案：

#### 第63-65题

30岁女性，既往健康，晨起发病，四肢无力，进行性加重，2天后来诊。查：脑神经正常，四肢肌力0级，腱反射弱，病理反射阴性，无感觉障碍

1. 应首先做的辅助检查是
  - A. 头部X线片
  - B. 头部CT
  - C. 牙部X线片
  - D. 脑电图
  - E. 以上都不是
2. 54岁的男性，上班时他人发现其口角歪斜，诊断为左侧面神经麻痹，不应有的体征是
  - A. 左额纹消失
  - B. 左眼裂大
  - C. 左鼻唇沟浅
  - D. 张口下颌向左偏斜
  - E. 左口角下垂
3. 本病例治疗时应先用
  - A. 大量抗生素
  - B. 激素
  - C. 针灸
  - D. 维脑路通
  - E. 卡马西平

正确答案：CDB 您选择的答案：

#### 第66-69题

30岁女性，既往健康，晨起发病，四肢无力，进行性加重，2天后来诊。查：脑神经正常，四肢肌力0级，腱反射弱，病理反射阴性，无感觉障碍

1. 首先应考虑的病是
  - A. 周期性麻痹
  - B. 格林-E利综合征
  - C. 癱病性瘫痪
  - D. 急性脊髓炎
  - E. 重症肌无力
2. 首先应做的检查是
  - A. 血钾测定
  - B. 腰穿检查
  - C. 头部CT
  - D. 高位颈椎X线片或MRI
  - E. 脑电图
3. 以上检查均正常，如何治疗适宜
  - A. 大量皮质激素

- B 大量抗生素
- C 新斯的明口服
- D 暗示心理疗法
- E 血浆置换疗法

4. 男性, 42岁, 近一个月来, 在刷牙时常出现右上牙部及右面部疼痛, 每次持续5~6秒钟, 神经系统检查无阳性体征, 其首先考虑的诊断就是

- A 牙痛
- B 三叉神经痛(第二支)
- C 三叉神经痛(第三支)
- D 鼻窦炎
- E 单纯感觉性发作(癫痫)

正确答案: BAEB 您选择的答案:

#### 第70-71题

男, 30岁, 进行性四肢无力2天, 进食呛咳1天。体检: 神清, 声低哑鼻音, 双侧提腭差, 咽反射消失, 颈软, 四肢肌张力低, 肌力 ~ 级, 腱反射(-), 双侧肘膝以下针刺觉减退, 跖反射无反应。

1. 临床的可能诊断为
  - A. 全身型重症肌无力
  - B. 格林-巴利综合征
  - C. 椎-基底动脉血栓形成
  - D. 周期性麻痹
  - E. 多发性肌炎
2. 目前认为临床上哪种治疗措施较为适宜
  - A. 环磷酰胺静脉滴注
  - B. 溴吡斯的明口服
  - C. 氯化钾的松静脉滴注
  - D. 氯化钾口服
  - E. 大剂量免疫球蛋白治疗

正确答案: BE 您选择的答案:

四、A4型题: 以下提供若干个案例, 每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息, 在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

#### 第72-75题

男, 16岁。四肢无力、麻木10天。发病10天前有腹泻, 持续2天愈。体检: 神志清楚, 双侧周围性面瘫。四肢肌力2级, 肌张力低、腱反射消失, 腓肠肌压痛, 短袜套样痛觉异常。脑脊液检查: 白细胞 $4 \times 10^6 / L$ , 蛋白 $0.6g / L$ , 糖 $2mmol / L$ , 氯 $122mmol / L$ 。

1. 该患者最可能是
  - A. 低钾性麻痹
  - B. 重症肌无力
  - C. 格林-巴利综合征
  - D. 急性脊髓炎
  - E. 多发性肌炎
2. 面神经炎与本病伴随的面瘫的鉴别取决于
  - A. 有无Bell现象
  - B. 有无乳突压痛
  - C. 是否伴随肢体活动障碍
  - D. 能否鼓腮
  - E. 有无感染病史
3. 若表现呈急性运动轴索型神经病的格林-巴利综合征, 最常见的感染病原体是
  - A. 空肠弯曲菌
  - B. 巨细胞病毒
  - C. EB病毒
  - D. 肺炎支原体
  - E. 乙型肝炎病毒
3. 典型的脑脊液改变出现在
  - A. 病程第1周
  - B. 病程第2周
  - C. 病程第3周
  - D. 病程第4周
  - E. 病程第5周

正确答案: CCAC 您选择的答案:

#### 第76-78题

男, 16岁。四肢无力、麻木10天。发病10天前有腹泻, 持续2天愈。体检: 神志清楚, 双侧周围性面瘫。四肢肌力2级, 肌张力低、腱反射消失, 腓肠肌压痛, 短袜套样痛觉异常。脑脊液检查: 白细胞 $4 \times 10^6 / L$ , 蛋白 $0.6g / L$ , 糖 $2mmol / L$ , 氯 $122mmol / L$ 。

1. 不推荐使用的治疗措施是
  - A. 血浆置换
  - B. 静脉注射免疫球蛋白
  - C. 保持呼吸道通畅
  - D. 肾上腺皮质类固醇
  - E. 支持、对症治疗
2. 若入院后第3天患者出现气促、呼吸困难、咳嗽无力、口唇发绀, 在吸氧(5L / 分)的条件下动脉氧分压为60mmHg。应立即采取
  - A. 给可拉明、洛贝林等呼吸兴奋剂
  - B. 气管插管、辅助呼吸



- C. 抗生素
- D. 肌注新斯的明
- E. 静脉滴注地塞米松
- 3. 该病最可能的主要死亡原因为
- A. 严重的营养不良
- B. 肺栓塞
- C. 心跳骤停
- D. 心力衰竭
- E. 呼吸肌麻痹

正确答案：DBE 您选择的答案：

五、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第79-81题

- A. Lhermitte征
- B. Beevor征
- C. Gower征
- D. Froin征
- E. Warner征

- 1. 当屈颈时，似有电流顺脊柱向下传导有时可达下肢，是脊髓颈段后索受激惹的表现
- 2. 第9、10胸髓节段损伤导致腹直肌下半部无力，当患者于仰卧位用力抬头时可见脐孔被腹直肌上半部牵拉而向上移位
- 3. 蛋白含量如超过10.0/L时脑脊液黄变，流出后自动凝结

正确答案：ABD 您选择的答案：

第82-85题

- A. 垂腕
- B. 猿手
- C. 爪形手
- D. 跨阈步态
- E. Wassermann征
- 1. 桡神经损伤
- 2. 尺神经损伤
- 3. 腓总神经损伤
- 4. 正中神经损伤

正确答案：ACDB 您选择的答案：