

习题集 神经病学 脑血管疾病

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 蛛网膜下腔出血时，出现一侧眼睑下垂时，其动脉瘤的部位可能在

- A 大脑中动脉
- B 前交通动脉
- C 后交通动脉
- D 基底动脉
- E 眼动脉

正确答案：C 您选择的答案：

第2题 脑血栓形成最常发生于下列哪条动脉

- A 大脑前动脉
- B 颈内动脉
- C 大脑中动脉
- D 大脑后动脉
- E 椎基底动脉

正确答案：C 您选择的答案：

第3题 蛛网膜下腔出血最可靠的诊断依据是

- A 头痛、呕吐
- B 脑膜刺激征
- C 腰穿时发现血性脑脊液
- D 一侧动眼神经麻痹
- E 偏瘫

正确答案：C 您选择的答案：

第4题 老年人蛛网膜下腔出血的特点是

- A 头痛、呕吐严重
- B 常有抽搐发作
- C 脑膜刺激征明显
- D 意识障碍多见，头痛不明显
- E 常伴眼底视网膜出血

正确答案：D 您选择的答案：

第5题 脑梗死溶栓治疗一般应在发病后多长时间内进行

- A 3小时
- B 12小时
- C 24小时
- D 1天
- E 3天

正确答案：A 您选择的答案：

第6题 青壮年脑栓塞，栓子来源最多者是

- A 风湿性心脏病伴房颤
- B 亚急性细菌性心内膜炎
- C 心肌梗死
- D 心脏粘液瘤
- E 动脉硬化性心脏病伴房颤

正确答案：A 您选择的答案：

第7题 适合手术治疗的高血压脑内血肿是

- A 丘脑出血，深昏迷
- B 内囊型血肿，深昏迷
- C 脑桥出血，深昏迷
- D 外侧型血肿，病情加重
- E 外侧型血肿，病情稳定

正确答案：D 您选择的答案：

第8题 脑栓塞的临床表现中，下述哪项是不正确的

- A 起病多急骤
- B 年龄多较轻
- C 多有脑膜刺激征
- D 常见局限性抽搐、偏瘫、失语
- E 多有风湿性心脏病

正确答案：C 您选择的答案：

第9题 短暂性脑缺血发作，出现相应的症状及体征完全恢复的时间应在(2000年试题)

- A 24小时内
- B 28小时内
- C 36小时内
- D 48小时内
- E 72小时内

正确答案：A 您选择的答案：

第10题 脑出血和蛛网膜下腔出血临床表现的主要鉴别是

- A 年龄

- B. 昏迷程度
- C. 有无神经系统定位体征
- D. 血压高低
- E. 起病缓急

正确答案：C      您选择的答案：

第11题 关于脑出血，最确切的诊断依据是

- A. 60岁以上发病
- B. 均有偏瘫
- C. 脑脊液血性
- D. 突然偏瘫、头部CT见底节附近高密度影
- E. 均有脑膜刺激征

正确答案：D      您选择的答案：

第12题 鉴别起病几小时的卒中病人是脑出血还是脑梗死的确切方法是

- A. 有无高血压
- B. 有无昏迷
- C. 脑脊液检查
- D. CT检查
- E. 脑电图检查

正确答案：D      您选择的答案：

第13题 高血压性脑出血最好发的部位是

- A. 丘脑
- B. 内囊及基底节附近
- C. 小脑
- D. 脑干
- E. 脑叶

正确答案：B      您选择的答案：

第14题 关于急性脑血管病的病因，下列何者是不正确的

- A. 脑出血最常见的病因是高血压和动脉硬化
- B. 脑栓塞最常见的病因是风心病合并房颤的心源性栓子脱落
- C. 脑血栓形成最常见病因是动脉炎
- D. 蛛网膜下腔出血最常见病因是先天性颅内动脉瘤
- E. 短暂性脑缺血发作最常见病因是动脉粥样硬化

正确答案：C      您选择的答案：

第15题 供给大脑半球前3 / 5部血液的血管是

- A. 大脑前动脉
- B. 大脑中动脉
- C. 颈内动脉系统
- D. 椎基底动脉系统
- E. 前交通动脉

正确答案：C      您选择的答案：

第16题 某老年男性患者，突然右侧偏瘫，偏身感觉障碍，偏盲，伴失语，病变部位很可能在

- A. 脑桥
- B. 中脑
- C. 内囊
- D. 顶叶
- E. 枕叶

正确答案：C      您选择的答案：

第17题 脑出血的内科治疗最重要的是

- A. 控制脑水肿
- B. 给止血剂
- C. 降低血压
- D. 抗生素治疗
- E. 给氧

正确答案：A      您选择的答案：

第18题 急性脑血管病中，发病最快的是

- A. 脑出血
- B. 脑血栓形成
- C. 脑栓塞
- D. 蛛网膜下腔出血
- E. 高血压脑病

正确答案：C      您选择的答案：

第19题 椎-基底动脉系统TIA的特征性表现是

- A. 眩晕
- B. 平衡失调
- C. 交叉性瘫痪
- D. 跌倒发作
- E. 吞咽困难

正确答案：D      您选择的答案：

第20题 脑血栓形成不宜采用的治疗措施是

- A. 溶栓治疗

- B. 抗凝治疗
- C. 抗血小板聚集
- D. 止血剂
- E. 防治脑水肿

正确答案：D      您选择的答案：

第21题 动脉粥样硬化引起的脑血栓形成最常发生于

- A. 颈内动脉及大脑中动脉
- B. 大脑前动脉
- C. 大脑后动脉
- D. 小脑后动脉
- E. 椎-基底动脉

正确答案：A      您选择的答案：

第22题 高血压病脑出血破裂的血管多为

- A. 大脑中动脉
- B. 大脑基底动脉
- C. 豆纹动脉
- D. 内囊动脉
- E. 大脑前动脉

正确答案：C      您选择的答案：

第23题 短暂性脑缺血发作重要的预防性治疗药物是

- A. 钙拮抗剂
- B. 脑血管扩张剂
- C. 溶栓剂
- D. 抗凝剂
- E. 抗血小板聚集剂

正确答案：E      您选择的答案：

第24题 脑出血与蛛网膜下腔出血的主要区别是

- A. 年龄大小
- B. 有否高血压
- C. 脑脊液改变
- D. 有无头痛
- E. 有无偏瘫

正确答案：E      您选择的答案：

第25题 一侧颈内动脉闭塞，可无临床症状，是因为

- A. 同侧颈外动脉未闭塞
- B. 对侧颈内动脉未闭塞
- C. 正常脑底动脉环可迅速建立侧支循环
- D. 双侧椎动脉未闭塞
- E. 颅内血管变异

正确答案：C      您选择的答案：

第26题 不属于椎基底动脉系统TIA的症状有

- A. 短暂性全面性遗忘症
- B. 闪光暗点
- C. 交叉性瘫痪
- D. 复视
- E. 共济失调

正确答案：B      您选择的答案：

第27题 脑出血与蛛网膜下腔出血之鉴别下述哪点最重要

- A. 活动中发病
- B. 头痛、呕吐
- C. 脑脊液含血量多少
- D. CT见脑实质内高密度灶
- E. 脑膜刺激征

正确答案：D      您选择的答案：

第28题 脑血栓形成最常发生于

- A. 大脑前动脉
- B. 前交通动脉
- C. 大脑中动脉
- D. 大脑后动脉
- E. 后交通动脉

正确答案：C      您选择的答案：

第29题 下列哪条血管闭塞最易导致偏瘫

- A. 小脑下后动脉
- B. 大脑中动脉
- C. 脊髓前动脉
- D. 小脑下前动脉
- E. 大脑前动脉

正确答案：B      您选择的答案：

第30题 脑血栓形成的最常见病因是

- A. 高血压

- B 脑动脉粥样硬化
- C 各种脑动脉炎
- D 血压偏低
- E 红细胞增多症

正确答案：B 您选择的答案：

第31题 蛛网膜下腔出血最常见的原因是

- A 先天性脑底动脉瘤
- B 颅脑外伤
- C 血液病
- D 血管畸形
- E 动脉粥样硬化

正确答案：A 您选择的答案：

第32题 大脑前动脉阻塞时出现小便失禁，是由于损害了

- A 额极
- B 旁中央小叶
- C 胼胝体前4/5
- D 扣带回
- E 额叶底部

正确答案：B 您选择的答案：

第33题 临床疑诊脑出血时，首选的辅助检查是

- A 脑CT
- B 脑MRI
- C 脑MRA
- D 脑DSA
- E 脑脊液检查

正确答案：A 您选择的答案：

第34题 椎基底动脉血栓形成不出现以下哪个症状

- A 眩晕
- B 眼球运动障碍
- C 吞咽困难
- D 失语
- E 交叉性瘫痪

正确答案：D 您选择的答案：

第35题 脑出血和蛛网膜下腔出血临床最主要区别点是

- A 年龄
- B 起病缓急
- C 昏迷程度
- D 血压高低
- E 有无局灶性定位体征

正确答案：E 您选择的答案：

第36题 短暂性脑缺血发作的定义不包括

- A 好发于50~70岁
- B 常反复发作，症状相对恒定
- C 每次发作持续数分钟至1小时，不超过24小时
- D 可遗留神经功能缺损
- E 男多于女

正确答案：D 您选择的答案：

第37题 心源性脑栓塞时，栓塞多发生在

- A 大脑前动脉
- B 大脑中动脉
- C 大脑后动脉
- D 椎动脉
- E 基底动脉

正确答案：B 您选择的答案：

第38题 椎基底动脉系统短暂脑缺血发作，不出现的症状是

- A 失写
- B 眩晕
- C 构音障碍
- D 复视
- E 交叉瘫

正确答案：A 您选择的答案：

第39题 颈内动脉系统TIA的特征性表现是

- A 对侧肢体偏瘫
- B 发作性眩晕
- C 眼动脉交叉瘫
- D 对侧偏盲
- E 对侧偏身感觉减退

正确答案：C 您选择的答案：

第40题 脑出血最常见的病因是

- A 脑动脉瘤

- B. 出血性梗死
- C. 高血压动脉硬化
- D. 血液病
- E. 脑血管畸形

正确答案：C 您选择的答案：

第41题 蛛网膜下腔出血最常见的病因是

- A. 高血压
- B. 血液病
- C. 脑动脉粥样硬化
- D. 先天性颅内动脉瘤
- E. 脑血管畸形

正确答案：D 您选择的答案：

第42题 有关急性脑血管病的病变部位，下、列何者是不正确的

- A. 脑血栓形成最易发生在大脑中动脉
- B. 脑栓塞以大脑中动脉阻塞最常见
- C. 脑出血的血管最多在豆纹动脉
- D. 脑桥出血多由基底动脉的旁正中动脉破裂所致
- E. 蛛网膜下腔出血以大脑凸面畸形血管破裂最多见

正确答案：E 您选择的答案：

第43题 基底动脉尖综合征是以什么为主要表现的一组临床综合征

- A. 脑桥病损
- B. 中脑病损
- C. 小脑病损
- D. 延髓病损
- E. 丘脑病损

正确答案：B 您选择的答案：

第44题 哪条血管闭塞可引起延髓背外侧综合征

- A. 大脑前动脉
- B. 大脑中动脉
- C. 大脑后动脉
- D. 椎动脉或小脑后下动脉
- E. 后交通动脉

正确答案：D 您选择的答案：

第45题 脑出血的预后与哪种因素有关

- A. 出血量
- B. 并发症严重程度
- C. 出血部位
- D. 出血量和部位
- E. 出血量、部位及并发症严重程度

正确答案：E 您选择的答案：

第46题 脑血栓形成患者服用阿司匹林，目的是

- A. 退热
- B. 抗风湿
- C. 扩张脑血管
- D. 抗血小板聚集
- E. 防止头晕

正确答案：D 您选择的答案：

第47题 一般认为，下列哪种情况的脑出血不适于外科治疗

- A. 血压 $<26.6 / 16\text{kPa}$
- B. 小脑出血血肿 $>10\text{ml}$
- C. 壳核出血血肿 $>40\text{ml}$
- D. 丘脑出血血肿 $>10\text{ml}$
- E. 生命体征和心肾功能正常，有脑疝形成可能

正确答案：C 您选择的答案：

第48题 颈内动脉系统短暂脑缺血发作最常见的症状是

- A. 对侧上肢或下肢的发作性瘫痪
- B. 对侧偏身感觉障碍
- C. 失语
- D. 同侧单眼失明
- E. 对侧上肢或下肢共济失调

正确答案：A 您选择的答案：

第49题 脑出血最常见的原因是

- A. 脑动脉炎
- B. 高血压和动脉硬化
- C. 血液病
- D. 脑动脉瘤
- E. 脑血管畸形

正确答案：B 您选择的答案：

第50题 短暂脑缺血发作的临床表现是

- A. 血压突然升高，短暂意识不清，抽搐

B 眩晕、呕吐、耳鸣持续一至数日  
C 发作性神经系统功能障碍，24小时内完全恢复  
D 昏迷、清醒、再昏迷  
E 一侧轻偏瘫，历时数日渐恢复  
正确答案：C 您选择的答案：

第51题 青年脑栓塞，栓子来源多见于

- A．风湿性心脏病伴房颤
- B．心肌梗死
- C．骨折的脂肪栓塞
- D．心脏黏液瘤
- E．心肌病

正确答案：A 您选择的答案：

第52题 对急性脑梗死患者，下列哪种情况不适于溶栓治疗

- A 发病6小时以内
- B CT证实无出血灶
- C 病人无出血素质
- D 出凝血时间正常
- E 头部CT出现低密度灶

正确答案：E 您选择的答案：

第53题 椎基底动脉系统供应的脑区有

- A．脑干、小脑
- B．脑干、小脑、丘脑后部
- C．大脑后2/5、脑干、小脑
- D．大脑后2/5、脑干、丘脑后部
- E．大脑后2/5、脑干、小脑、丘脑后部

正确答案：E 您选择的答案：

第54题 大脑中动脉皮层支闭塞后引起的对侧偏瘫有什么特点

- A 不伴有颅神经瘫痪
- B 偏瘫以下肢为重
- C 为均等性轻偏瘫
- D 偏瘫以下肢较轻
- E 上下肢均为0级瘫

正确答案：D 您选择的答案：

第55题 脑血栓形成患者出现运动性失语是病变损害了

- A 优势半球额中回后部
- B 优势半球中央前回下部
- C 优势半球角回
- D 优势半球额下回后部
- E 颞上回后部

正确答案：D 您选择的答案：

第56题 何时做头部CT检查，诊断脑梗死阳性率较高

- A 发病6小时以后
- B 发病12小时以后
- C 发病48小时以后
- D 发病18小时以后
- E 发病1周以后

正确答案：C 您选择的答案：

第57题 脑梗死的病因中，最重要的是

- A．动脉粥样硬化
- B．高血压
- C．动脉壁炎症
- D．真性红细胞增多症
- E．血高凝状态

正确答案：A 您选择的答案：

第58题 脑梗死临床表现中，不应有的症状或体征

- A 意识不清
- B 肢体瘫痪
- C 头痛
- D 抽搐
- E 脑膜刺激征

正确答案：E 您选择的答案：

第59题 脑出血最常见的出血血管是

- A 小脑的齿状核动脉
- B 基底动脉的旁正中动脉
- C 大脑中动脉的豆纹动脉
- D 脉络膜前动脉
- E 前交通动脉

正确答案：C 您选择的答案：

第60题 高血压病脑出血时，最常见的出血部位是

- A．小脑齿状核

- B. 小脑皮质
- C. 脑桥
- D. 基底核
- E. 延髓

正确答案：D 您选择的答案：

第61题 椎-基底动脉系统脑梗死，最佳的辅助检查是

- A. 头颅CT
- B. 头颅磁共振(MRI)
- C. 脑电图
- D. 腰椎穿刺
- E. 经颅多普勒超声

正确答案：B 您选择的答案：

第62题 高血压性脑出血最好发生部位是

- A. 皮质下白质
- B. 脑桥
- C. 小脑
- D. 脑室
- E. 壳核及其附近

正确答案：E 您选择的答案：

第63题 患者有偏瘫、偏身感觉障碍和偏盲，最可能有下述哪条血管闭塞

- A. 大脑前动脉
- B. 大脑中动脉
- C. 大脑后动脉
- D. 内听动脉
- E. 脊髓前动脉

正确答案：B 您选择的答案：

第64题 颈内动脉系统短暂性脑缺血发作的症状可有

- A. 阵发性眩晕
- B. 复视
- C. 交叉性瘫痪
- D. 吞咽困难
- E. 运动性失语

正确答案：E 您选择的答案：

第65题 颈内动脉系统TIA的临床表现有

- A. 眩晕
- B. 共济失调
- C. 复视
- D. Horner征交叉瘫
- E. 阵挛性痉挛发作

正确答案：D 您选择的答案：

第66题 关于脑出血的治疗，下列哪项是正确的

- A. 收缩压维持在16~18kPa
- B. 每日静脉补液量2500ml以上
- C. 大剂量止血芳酸
- D. 保持安静，积极抗脑水肿
- E. 发病后24小时仍不能进食者给鼻饲

正确答案：D 您选择的答案：

第67题 对多数蛛网膜下腔出血，防止再出虹的根本方法是

- A. 卧床休息4~6周
- B. 保持大便通畅
- C. 不再从事剧烈运动或重劳动
- D. 保持血压稳定
- E. 对先天性动脉瘤或脑血管畸形行手术治疗

正确答案：E 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第68题 男，62岁，高血压病史多年，晨练时突发头痛、呕吐、右侧偏瘫。体检：深昏迷，左侧瞳孔大，光反射消失，诊断

- A. 脑出血，左颞叶钩回疝
- B. 脑出血，右颞叶钩回疝
- C. 脑出血，小脑扁桃疝
- D. 蛛网膜下腔出血
- E. 颈内动脉血栓形成

正确答案：A 您选择的答案：

第69题 男，60岁，突然出现右侧肢体无力及不能讲话，体检：失语。右侧偏瘫，右侧感觉减退，右侧偏盲。临床诊断为脑血栓形成。闭塞的血管是

- A. 左侧大脑前动脉
- B. 左侧大脑后动脉
- C. 左侧大脑中动脉主干

D. 左侧颈内动脉  
E. 左侧小脑后动脉

正确答案：C 您选择的答案：

第70题 60岁男性，活动中突感眩晕，枕部疼痛、呕吐、步行不稳，凹分钟后昏迷，呼吸节律不整，诊断脑出血，其部位是

A 脑颞叶  
B 基底节  
C 脑室  
D 脑桥  
E 小脑

正确答案：E 您选择的答案：

第71题 64岁男性，高血压病史6年，某日晨起出现复视，右侧肢体活动不灵。查体：血压15 / 12kPa，左眼睑下垂，左眼外斜位，左眼球向上下内活动受限，右侧偏瘫，住院两天，无明显好转，初诊最大可能是：

A 脑出血(基底节区)  
B 短暂脑缺血发作  
C 脑栓塞  
D 椎基底动脉系统血栓形成  
E 颈内动脉系统血栓形成

正确答案：D 您选择的答案：

第72题 38岁女性，洗衣时突发右侧肢体活动不灵，查体：意识清，失语，二尖瓣区可闻双期杂音，心律不齐，右侧偏瘫，上肢重于下肢，偏身痛觉减退，首先考虑的诊断

A 脑血栓形成  
B 脑栓塞  
C 脑出血  
D 蛛网膜下腔出血  
E 短暂脑缺血发作

正确答案：B 您选择的答案：

第73题 男，56岁，突发言语不清、跌倒在地。小便失禁，无肢体抽搐。急送至医院急诊室。体检：昏迷，瞳孔左侧6mm，右侧3mm，血压180 / 110mmHg，心率65次 / 分，律齐，最可能的诊断为

A. 左侧脑出血  
B. 右侧脑出血  
C. 脑外伤(脑内血肿)  
D. 癌肿脑内转移  
E. 脑梗死

正确答案：A 您选择的答案：

第74题 男，65岁，突然出现剧烈头痛伴呕吐6小时，无发热，否认高血压病史。体检神志清，体温36.9℃，血压125 / 75mmHg，右侧瞳孔直径3.5mm，对光反应消失，上睑下垂，眼球上下及内侧运动不能，颈项强直，Kernig征阳性，CT提示脑正中裂及右大脑外侧裂、枕大池高密度影，该患者受累的脑神经是

A. 右侧滑车神经  
B. 右侧三叉神经  
C. 右侧动眼神经  
D. 右侧外展神经  
E. 右侧面神经

正确答案：C 您选择的答案：

第75题 80岁男性，突然出现头痛、呕吐、意识不清，血压27 / 16kPa，右侧瞳孔大，左侧偏瘫。此时，最重要的治疗是

A 外科手术  
B 降压治疗  
C 应用激素  
D 应用脱水剂  
E 应用止血剂

正确答案：D 您选择的答案：

第76题 男性，36岁，突起昏迷，四肢瘫痪，双侧瞳孔“针尖样”缩小。其最可能的疾病是

A 额叶出血  
B 脑桥出血  
C 小脑出血  
D 基底节出血  
E 蛛网膜下腔出血

正确答案：B 您选择的答案：

第77题 女，58岁，突然眩晕、右侧面部及左半身麻木3天，体检：右侧眼裂及瞳孔略小，对光反射灵敏，双眼可见向右水平眼震，腭垂偏左，右侧腭弓低，右侧咽反射迟钝，右侧指鼻和跟膝胫试验不准，右侧面部及左偏身痛、温觉减退，余检查(-)。最可能的诊断

A. 左侧中脑梗死  
B. 右侧中脑梗死  
C. 右脑桥梗死  
D. 右侧延髓梗死  
E. 右小脑半球梗死

正确答案：D 您选择的答案：

第78题 男，39岁，4小时前突然剧烈头痛，伴呕吐多次。体检：颈部轻度抵抗，克氏征(+)，布氏征(+)，体温37.2℃，血压140/80mmHg。其他神经系统检查阴性。诊断首先考虑

A. 脑膜炎



- B. 脑炎
- C. 脑出血
- D. 蛛网膜下腔出血
- E. 偏头痛

正确答案：D 您选择的答案：

第79题 女性，55岁，半年内出现3次突然不能言语，每次持续30分钟左右，第3次伴右侧肢体麻木，既往有房颤病史，神经系统检查正常，最可能诊断是

- A. 癫痫小发作
- B. 偏头痛
- C. 颈椎病
- D. 短暂性脑缺血发作(TIA)
- E. 顶叶肿瘤

正确答案：D 您选择的答案：

第80题 53岁，男性，饮酒中发生言语不清，呕吐，随即昏迷。查体：血压26 / 16kPa，双眼球向左共同偏视，右鼻唇沟浅，右侧肢体坠落实验阳性，对针刺无反应。诊断脑出血，其部位是

- A. 左侧基底节
- B. 右侧基底节
- C. 左脑桥
- D. 右脑桥
- E. 左顶叶

正确答案：A 您选择的答案：

第81题 男，33岁，2小时前突然出现剧烈头痛、呕吐。体检：神清。颈部抵抗，Kernig征(+)。余神经系统检查阴性。首先考虑为

- A. 脑出血
- B. 脑血栓形成
- C. 脑栓塞
- D. 蛛网膜下腔出血
- E. 高血压脑病

正确答案：D 您选择的答案：

第82题 男，62岁，2天前突然右眼黑矇，左侧肢体无力，约10分钟后恢复，今日又有类似发作一次，体检：未发现异常。血压150/90mmHg。依据临床表现，病变定位于

- A. 颈内动脉
- B. 颈外动脉
- C. 大脑中动脉
- D. 大脑前动脉
- E. 大脑后动脉

正确答案：A 您选择的答案：

第83题 男，48岁，突发昏迷，四肢瘫痪，双侧瞳孔针尖样缩小，最可能的诊断是

- A. 额叶出血
- B. 脑桥出血
- C. 小脑出血
- D. 基底节出血
- E. 蛛网膜下腔出血

正确答案：B 您选择的答案：

第84题 患者，女，28岁，看电视时突觉右侧上下肢不能活动，不能言语，无呕吐，无抽搐，有风湿性心脏病十年。最可能的诊断是

- A. 脑出血
- B. TIA
- C. 脑血栓形成
- D. 脑栓塞
- E. 蛛网膜下腔出血

正确答案：D 您选择的答案：

第85题 60岁男性，突发不能说话，右上下肢无力，约20分钟恢复，反复发作，发作后检查，神经系统正常。首先要考虑的诊断是

- A. 局限性癫痫
- B. 脑栓塞
- C. 癫痫发作
- D. 颈内动脉系统TIA
- E. 椎基底动脉系统TIA

正确答案：D 您选择的答案：

第86题 54岁女性，脑动脉硬化症病史3年，突感眩晕、呕吐、言语不清。查体：声音嘶哑、吞咽困难、言语含混，左眼裂小、瞳孔小、水平眼震、左面部右半身痛觉减退，左侧指鼻试验不准，诊断

- A. 左侧大脑前动脉血栓形成
- B. 右侧颈内动脉血栓形成
- C. 左侧颈内动脉血栓形成
- D. 右侧小脑后下动脉血栓形成
- E. 左侧小脑后下动脉血栓形成

正确答案：E 您选择的答案：

第87题 女，65岁，晨起言语不利，左侧肢体无力，两天后病情加重来医院就诊，测血压106 / 68mmHg，意识清，运动性失语，左侧偏瘫，可排除的诊断是

- A. 脑栓塞

- B. 脑血栓形成
- C. TIA
- D. 脑出血
- E. 腔隙性脑梗死

正确答案：C 您选择的答案：

第88题 女，75岁，晨起时出现头晕、右侧肢体无力。测血压150 / 95mmHg，右侧肢体肌力3级，左侧5级，头颅CT检查正常。临床诊断为

- A. 短暂性脑缺血发作
- B. 脑出血
- C. 脑血栓形成
- D. 蛛网膜下腔出血
- E. 以上都不是

正确答案：C 您选择的答案：

第89题 58岁男性，突然右眼失明，左上肢无力，2天后右眼视力好转，但左侧肢瘫加重，查体：血压15 / 12kPa，意识清，左侧中枢性面舌瘫，左侧上下肢瘫，左偏身感觉障碍，其阻塞血管

- A. 右侧大脑中动脉皮层支
- B. 右侧大脑中动脉深穿支
- C. 右侧大脑中动脉主干
- D. 右侧大脑前动脉深穿支
- E. 右侧颈内动脉

正确答案：E 您选择的答案：

第90题 男，65岁，头晕、步行不稳、饮水呛咳1周。既往有高血压病史。头颅MRI示延髓背外侧梗塞。闭塞的血管是

- A. 大脑中动脉
- B. 大脑前动脉
- C. 小脑后下动脉
- D. 小脑上动脉
- E. 大脑后动脉

正确答案：C 您选择的答案：

第91题 62岁女性，晨起出现讲话不清，右侧肢体无力，两天后因病情渐加重就诊。血压14 / 11kPa，意识清，运动性失语，右侧偏瘫，可完全排除的诊断是

- A. 脑栓塞
- B. 脑血栓形成
- C. 短暂脑缺血发作
- D. 脑出血
- E. 腔隙性脑梗死

正确答案：C 您选择的答案：

第92题 28岁女性，跳舞时突感剧烈头痛、呕吐，检查脑膜刺激征阳性，无肢瘫。应首先作何种辅助检查来确定诊断

- A. 脑电图
- B. 脑超声血流
- C. 脑动脉造影
- D. 腰穿
- E. 头颅CT

正确答案：D 您选择的答案：

第93题 男，80岁，突发意识不清，剧烈呕吐，血压220 / 120mmHg，右侧瞳孔大，左侧偏瘫。此时最重要。的治疗是

- A. 溶栓治疗
- B. 降压治疗
- C. 应用激素
- D. 应用脱水剂
- E. 应用止血剂

正确答案：D 您选择的答案：

第94题 女，58岁，3个月内两次突发言语不能，最近一次伴左侧肢体麻木，每次发作约15分钟并自行缓解，既往有房颤病史，神经系统检查阴性，最可能的诊断是

- A. 癫痫小发作
- B. 偏头痛
- C. 颈椎病
- D. TIA
- E. 顶叶肿瘤

正确答案：D 您选择的答案：

第95题 男，35岁，劳动时突发剧烈头痛、呕吐，一度意识不清，醒后颈枕部疼痛，右侧眼睑下垂，右瞳孔大，Kernig征阳性。最可能的诊断

- A. 急性脑膜炎
- B. 脑出血、脑疝
- C. 小脑出血
- D. 脑干出血
- E. 蛛网膜下腔出血

正确答案：E 您选择的答案：

第96题 58岁男性，高血压病史，演讲时突发头痛、呕吐、右侧偏瘫。在急诊室检查时病人昏迷，左侧瞳孔大，光反射消失，诊断

- A. 脑出血，左颞叶钩回疝
- B. 脑出血，右颞叶钩回疝
- C. 脑出血，小脑扁桃疝

- D 蛛网膜下腔出血
- E 颈内动脉血栓形成

正确答案：A 您选择的答案：

第97题 52岁脑梗死患者，病后第3天，意识不清，血压19 / 14kPa，左侧偏瘫。脑压2 . 74kPa(280mmH2O)，宜首先选用

- A 降血压治疗
- B 扩血管治疗
- C 尿激酶静脉点滴
- D 20%甘露醇静脉点滴
- E 肝素静脉点滴

正确答案：D 您选择的答案：

第98题 男性，61岁，突然意识不清1小时。头颅CT显示右侧大脑半球3cm×3cm×6cm高密度影，最可能的诊断是

- A 昏厥
- B 脑出血
- C 脑栓塞
- D 脑血栓形成
- E 高血压脑病

正确答案：B 您选择的答案：

第99题 男，65岁，平时有高血压、糖尿病多年。一天前发现左侧上、下肢活动受限，吐词不清，神志清楚。无明显头痛、呕吐，检查发现左侧上、下肢肌力3级，左半身痛觉减退。临床上考虑可能性最大的疾病是(1999年试题)

- A 脑出血
- B 脑栓塞
- C 短暂性脑缺血发作
- D 蛛网膜下腔出血
- E 脑血栓形成

正确答案：E 您选择的答案：

第100题 30岁男性，劳动中突感剧烈头痛、呕吐，一度意识不清，醒后颈枕部痛，右侧眼睑下垂，右瞳孔大、颈强，克氏征阳性。最可能的诊断是

- A 急性脑膜炎
- B 脑出血、脑疝
- C 小脑出血
- D 脑干出血、
- E 蛛网膜下腔出血

正确答案：E 您选择的答案：

第101题 46岁男性，突发头痛、恶心、呕吐，无明显肢体瘫痪，脑膜刺激征阳性，脑脊液呈均匀一致血性，下列哪一诊断最不可能

- A 蛛网膜下腔出血
- B 脑叶出血
- C 壳核出血
- D 尾状核头出血
- E 小脑出血

正确答案：C 您选择的答案：

第102题 男，56岁，突然头晕、呕吐8小时。体检：双眼向右水平眼震，右侧指鼻和跟膝胫试验不准，颈轻度抵抗。肌力和感觉检查无明显异常。血压150/90mmHg。临床诊断为

- A 右大脑基底核区出血
- B 左大脑基底核区出血
- C 右小脑半球出血
- D 左小脑半球出血
- E 蛛网膜下腔出血

正确答案：C 您选择的答案：

第103题 男，55岁。突发头痛、呕吐咖啡色液体，伴左侧肢体无力，迅速出现昏迷。既往有高血压病史。最可能的诊断是

- A 脑血栓形成
- B 脑出血
- C 短暂性脑缺血发作
- D 脑栓塞
- E 多发性脑梗死

正确答案：B 您选择的答案：

第104题 女，25岁，有风湿性心脏病伴房颤病史，2小时前突然出现右侧肢体无力，体检：右侧肢体肌力2级。头颅CT检查正常。临床诊断为

- A 脑血栓形成
- B 短暂性脑缺血发作
- C 脑栓塞
- D 脑出血
- E 蛛网膜下腔出血

正确答案：C 您选择的答案：

第105题 女，56岁，高血压病史7年，5小时前因吵架感头痛、恶心，右侧肢体无力，20分钟后出现意识不清。血压180 / 120mmHg，中度昏迷，双侧瞳孔2mm，对光反应存在，右侧鼻唇沟浅，右侧上下肢肌力2级，右侧病理征阳性。最可能诊断为

- A 脑血栓形成
- B 脑出血

- C. 蛛网膜下腔出血
- D. 脑栓塞
- E. 脑膜炎

正确答案：B 您选择的答案：

第106题 女，78岁，晨起进行性左侧肢体无力，有糖尿病史。体验：左鼻唇沟浅，伸舌偏左，左上下肢肌力 级，腱反射右 > 左，左侧跖反射无反应，左偏侧针刺觉降低。血压150/80mmHg，CT无异常。临床诊断为

- A. 右侧半球脑栓塞
- B. 右侧半球脑出血
- C. 右侧半球脑血栓形成
- D. 蛛网膜下腔出血
- E. 以上都不是

正确答案：C 您选择的答案：

第107题 男，70岁，晨起时出现头晕、右侧肢体无力，约半小，时后症状完全消失。头颅CT检查正常。临床诊断为

- A. 脑血栓形成
- B. 短暂性脑缺血发作
- C. 脑出血
- D. 脑栓塞
- E. 蛛网膜下腔出血

正确答案：B 您选择的答案：

第108题 54岁女性，劳动中突感头晕，相继左半身失灵，右眼闭合不全，双眼向左侧凝视，10余分钟后昏迷，双瞳孔小、四肢软瘫、高热，首先考虑的诊断是

- A. 小脑出血
- B. 脑桥出血
- C. 基底节脑出血
- D. 中脑出血
- E. 脑叶出血

正确答案：B 您选择的答案：

第109题 52岁男性，突发脑出血，头痛，呕吐，昏迷，血压25 / 12kPa，应迅速给予

- A. 止血治疗
- B. 降血压治疗
- C. 降颅压治疗
- D. 维持生命体征
- E. 防治血管痉挛

正确答案：C 您选择的答案：

三、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第110-113题

女，56岁，有房颤病史5年。突发眩晕、恶心呕吐6小时来院。体检：神志清，右侧瞳孔2mm，左侧瞳孔3mm，右侧面瘫，颈软，左侧半身痛温觉减退，血压110 / 70mmHg。

1. 下列诊断首先考虑的是

- A. 脑梗死
- B. 脑出血
- C. 多发性腔梗
- D. 短暂性脑缺血发作
- E. 蛛网膜下腔出血

2. 为定性诊断，最可靠的检查是

- A. 头颅MRI
- B. 头颅CT
- C. 颈部血管B超
- D. 脑电图
- E. 腰穿

3. 住院期间患者出现吞咽困难，右侧Horner征阳性。结合上述症状考虑诊断为

- A. 眩晕症
- B. Wallenberg综合征
- C. 丘脑综合征
- D. 闭锁综合征
- E. Weber综合征

4. 该征是由于下列哪支血管发生阻塞引起的

- A. 大脑中动脉
- B. 大脑前动脉
- C. 小脑后下动脉
- D. 大脑后动脉
- E. 椎基底动脉

正确答案：AABC 您选择的答案：

第114-116题

男，72岁，高干。因突发言语不清、右侧肢体活动受限1天急诊入院。

1. 根据主诉，通常不需要考虑的疾病是

- A. 脑出血
- B. TIA
- C. 脑血栓形成
- D. 癔症
- E. 颅内肿瘤

2. 为明确诊断首选的实验室检查是

- A. 腰穿
- B. 头颅CT
- C. 急诊心电图
- D. 血钾测定
- E. 脑电图

3. 若明确为脑血栓形成, 下列治疗正确的是

- A. 及时溶栓治疗
- B. 早期大量应用脱水剂
- C. 增进缺血区的血液和氧气供应, 降低脑代谢
- D. 绝对卧床休息1周
- E. 以上都正确

正确答案: BBC 您选择的答案:

第117-119题

女, 74岁, 晨起发现左侧肢体无力, 4小时内呈进行性加重, 有糖尿病史8年。体检: 左鼻唇沟浅, 伸舌偏左, 左上肢肌力0级, 左下肢肌力 级, 左侧面部和上肢感觉减退。血压135/75mmHg, 心率70次/分。

1. 根据临床症状, 最可能的诊断是

- A. 脑栓塞
- B. 颅内硬膜下血肿
- C. 脑出血
- D. 脑血栓形成
- E. 脑瘤

2. 可能阻塞的脑动脉是

- A. 右大脑前动脉
- B. 右颈内动脉
- C. 右大脑中动脉皮质支
- D. 右大脑中动脉主干
- E. 右大脑后动脉

3. 为进一步明确诊断, 首选辅助检查是

- A. 头颅MRI
- B. 脑电图
- C. 腰穿脑脊液检查
- D. DSA脑血管造影
- E. 头颅CT

正确答案: DCA 您选择的答案:

第120-122题

女, 65岁, 农民。高血压病史12年, 不规则服药, 某日晨起突发头痛, 意识不清, 35分钟后送至医院。体检: 昏迷, 血压220 / 120mmHg, 双眼右侧凝视, 左外旋位。

1. 最可能的诊断是

- A. 晕厥
- B. 脑出血
- C. 脑血栓形成
- D. 蛛网膜下腔出血
- E. 心肌梗死

2. 最可能的病变部位是

- A. 右侧脑干
- B. 右侧半球表面
- C. 右侧半球深部
- D. 左侧半球表面
- E. 左侧半球深部

3. 下列哪项检查对明确诊断最有价值

- A. 腰穿检查
- B. 脑电图检查
- C. 脑血管多普勒
- D. 头颅CT检查
- E. 开颅检查

正确答案: BBD 您选择的答案:

第123-125题

男性, 62岁, 突然出现剧烈头痛和呕吐8小时。无发热, 否认高血压史。体检: 神清, 体温36.9, 血压16.5 / 10kPa, 右侧瞳孔直径3.5mm, 对光反应消失, 上睑下垂, 眼球向上、下及内侧运动不能。颈项强直, 克氏征阳性。CT示脑正中裂及右大脑外侧裂、枕大池呈高密度影

1. 该患受累的颅神经是

- A. 右侧滑车神经
- B. 右侧三叉神经
- C. 右侧动眼神经
- D. 右侧外展神经
- E. 右侧面神经

2. 最可能的诊断是

- A. 脑干出血
- B. 脑室出血
- C. 内囊出血
- D. 小脑出血
- E. 蛛网膜下腔出血

3. 对进一步治疗及预防, 最重要的检查是:

- A. 腰穿
- B. 脑电图
- C. 听觉诱发电位

D 全脑血管造影

E 颅脑X线平片

正确答案：CED 您选择的答案：

第126-128题

男，63岁，晨起床时，发现言语不清，右侧肢体不能活动。既往无类似病史。发病后5小时体检发现：血压120/80mmHg，神志清楚，失语，右中枢性面瘫、舌瘫，右上、下肢肌力2级，右半身痛觉减退，颅脑CT未见异常。

1. 病变的部位可能是

A. 左侧大脑前动脉

B. 右侧大脑前动脉

C. 左侧大脑中动脉

D. 右侧大脑中动脉

E. 椎-基底动脉

2. 病变的性质是

A. 脑出血

B. 脑栓塞

C. 脑肿瘤

D. 脑血栓形成

E. 蛛网膜下腔出血

3. 应选择治疗方法是

A. 调整血压

B. 溶栓治疗

C. 应用止血剂

D. 手术治疗

E. 脑保护剂

正确答案：CDE 您选择的答案：

第129-131题

男，28岁，突发剧烈头痛、呕吐3天，伴发热1天。体检：神志模糊，瞳孔右6mm，对光反射消失，左3mm，对光反射灵敏，四肢均有自主活动，颈有抵抗，Kernig征(+)。体温37℃，血压140/75mmHg。

1. 临床的第一个诊断是

A. 脑膜炎

B. 脑炎

C. 急性硬膜下出血

D. 蛛网膜下腔出血

E. 脑出血

2. 为了明确诊断，首选辅助检查是

A. 脑电图

B. 腰穿脑脊液检查

C. 头颅CT

D. 头颅MRI

E. DSA脑血管造影

3. 治疗中哪一项是不正确的

A. 绝对卧床休息

B. 大剂量止血剂

C. 早期应用钙通道阻滞剂

D. 脱水降颅压

E. 保持大便通畅

正确答案：DCB 您选择的答案：

第132-133题

女，56岁，有房颤病史5年。突发眩晕、恶心呕吐6小时来院。体检：神志清，右侧瞳孔2mm，左侧瞳孔3mm，右侧面瘫，颈软，左侧半身痛温觉减退，血压110/70mmHg。

1. 患者出现交叉性感觉障碍是由于

A. 右侧三叉神经脊束核及右侧脊髓丘脑束损害

B. 左侧三叉神经脊束核及右侧脊髓丘脑束损害

C. 右侧三叉神经脊束核及左侧脊髓丘脑束损害

D. 左侧三叉神经脊束核及左侧脊髓丘脑束损害

E. 右侧丘脑损害

2. 下列治疗错误的是

A. 插胃管

B. 输入大剂量葡萄糖溶液

C. 华法令

D. 尼莫地平

E. 阿司匹林

正确答案：AB 您选择的答案：

第134-136题

男，63岁，1小时前闲聊时，突然言语不清，跌倒在地，神志不清，小便失禁，呕吐数次。体检：浅昏迷，烦躁不安，瞳孔左4.5mm，右4.0mm，血压180/110mmHg，心率57次/分，律齐。

1. 哪项检查对判断患者有无偏瘫没有意义

A. 肢体坠落试验

B. 两侧足外旋是否对称

C. 病理反射

D. 腱反射

E. 肌营养

2. 该患者治疗应立即采取的措施是

A. 降低血压

B. 给与促进清醒药物

C. 止吐药物

- D. 提高心率药物  
E. 甘露醇静脉滴注  
3. 如头颅CT报告一侧基底核区高密度影，诊断为  
A. 脑瘤  
B. 外伤性脑内血肿  
C. 癌肿脑内转移  
D. 脑出血  
E. 脑梗死  
正确答案：EED 您选择的答案：

第137-139题

男，25岁，突然出现短暂意识丧失，肢体抽搐，醒后剧烈头痛、呕吐。体检：GCS5分，神志模糊，瞳孔右侧8mm。左侧3mm，颈有抵抗，右侧眼底玻璃体下有片状出血。体温37℃，血压135 / 70mmHg。

1. 根据病史首先考虑的诊断是

- A. 癫痫  
B. 蛛网膜下腔出血  
C. TIA  
D. 急性脑膜脑炎  
E. 脑出血

2. 辅助检查首选

- A. 脑电图  
B. 腰穿脑脊液检查  
C. 头颅CT检查  
D. 白细胞计数  
E. 心电图

3. 下列治疗哪项不正确

- A. 大量止血剂  
B. 休息4周  
C. 溶栓治疗  
D. 尼莫通  
E. 保持大便通畅

正确答案：BCC 您选择的答案：

第140-142题

女性，55岁。高血压20年，不规则服药。某日晨突发头痛，意识不清，30分钟后送到医院。体检：昏迷，血压28 / 16kPa，双眼向右侧凝视，左足外旋位

1. 最可能的诊断是

- A. 晕厥  
B. 脑出血  
C. 脑血栓形成  
D. 蛛网膜下腔出血  
E. 心肌梗死

2. 最可能的病变部位是

- A. 右侧脑干  
B. 右侧半球表面  
C. 右侧半球深部  
D. 左侧半球表面  
E. 左侧半球深部

3. 哪项辅助检查对明确诊断最有价值

- A. 腰穿检查  
B. 脑电图检查  
C. 脑超声检查  
D. 头颅CT检查  
E. 开颅探查

正确答案：BCD 您选择的答案：

第143-145题

男，56岁的心房颤动患者，突然发生：命名物名困难。二周来共发生过5次，每次持续2~15秒。查体无神经系统异常。脑CT无异常。

1. 可能的诊断是

- A. 脑动脉瘤  
B. 脑血栓形成  
C. 脑出血  
D. 脑血管畸形  
E. 短暂性脑缺血发作

2. 主要累及的血管是

- A. 基底动脉系  
B. 椎动脉系  
C. 颈内动脉系  
D. 大脑后动脉  
E. 大脑前动脉

3. 最适宜的预防治疗是

- A. 阿司匹林  
B. 低分子右旋糖酐  
C. 丙戊酸钠  
D. 胞二磷胆碱  
E. 降纤酶

正确答案：ECA 您选择的答案：

四、A4型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、

B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第146-150题

女，54岁，突然出现言语不清，右侧，右肢体无力6小时。体检：运动性失语，右鼻唇沟浅，伸舌偏右，右侧肢体肌张力低，肌力2级，病理反射未引出。血压160 / 90mmHg，心率80次 / 分。有冠心病、房颤、糖尿病史多年。

1. 为明确诊断通常使用的检查方法是

- A. 头颅CT
- B. EBCT
- C. 头颅MRI
- D. 经颅血管多普勒
- E. 脑电图

2. 若行CT检查未见明显低密度灶，下一步处理最为恰当的是

- A. 急诊留观
- B. 考虑脑血管疾病收住入院作进一步检查治疗
- C. 立即降血压治疗
- D. 立即溶栓治疗
- E. 立即予以大剂量脱水剂

3. 若治疗后第3天，发现病人症状无明显好转，且有加重趋势，此时应给予

- A. 采用中性治疗方案，并予头颅CT动态观察
- B. 保持原有治疗方案不变，继续观察
- C. 动员病人转院
- D. 加用抗凝剂
- E. 鼓励病人下床活动

4. 如果CT发现在左侧基底节区低密度影中有少量点、片状高密度灶，诊断考虑为

- A. 脑出血
- B. 蛛网膜下腔出血
- C. 出血性梗塞
- D. 脑内钙化灶
- E. 脑囊虫病

5. 此时的处理为

- A. 使用止血剂
- B. 20%的甘露醇，辅以预防性抗感染治疗
- C. 使用辅酶A，ATP
- D. 华法令抗凝治疗
- E. 溶栓治疗

正确答案：ABACB 您选择的答案：

第151-154题

男，46岁，突发头痛、呕吐1小时就诊。既往有高血压病史。体检：血压165 / 95mmHg，神志清，颈项强直，Kernig征阳性，四肢肌力正常，Babinski征阴性。

1. 下列诊断首先考虑的是

- A. 脑梗死
- B. 脑出血
- C. 蛛网膜下腔出血
- D. 短暂性脑缺血发作
- E. 多发性腔梗

2. 为明确诊断，首选的检查是

- A. 脑电图
- B. 头颅CT
- C. 血常规
- D. 血钾测定
- E. 腰穿

3. 若CT提示脑正中裂及右大脑外侧裂、枕大池高密度影，诊断为

- A. 脑出血
- B. 脑梗死
- C. 脑肿瘤
- D. 蛛网膜下腔出血
- E. 动脉瘤

4. 下列治疗错误的是

- A. 尼莫地平
- B. 阿司匹林
- C. 卧床4~6周
- D. 保持大便通畅
- E. 止血剂

正确答案：CBDB 您选择的答案：

五、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第155-159题

- A 脑血栓形成
- B 脑出血
- C 蛛网膜下腔出血
- D 脑栓塞
- E 脑膜炎

1. 男性，41岁，2小时前突然出现剧烈头痛，伴呕吐，四肢活动好，体温正常，克氏征阳性

2. 男性，61岁，3天前睡觉醒后发现视野范围缩小。神志清楚，血压正常，心脏正常，右侧同向性偏盲，言语正常，肢体肌力正常，感觉正常



3. 女性, 65岁, 高血压10年, 糖尿病8年, 突发右上下肢无力, 说话不流利, 逐渐加重2天。神志清楚, 血压正常, 混合性失语, 右侧鼻唇沟浅, 伸舌右偏, 脑CT未见异常, 右上、下肢肌力0级, 肌张力低, 腱反射低下, 右下肢病理征阳性

4. 女性, 57岁, 高血压6年。6小时前因生气突发头痛, 呕吐, 右侧肢体不能动, 20分钟后出现意识不清。血压24 / 16kPa(180 / 120mmHg), 中度昏迷, 双瞳孔2mm, 对光反射存在, 右侧鼻唇沟浅。右上、下肢肌力2级, 右侧膝反射低下, 右侧病理征阳性

5. 男性, 43岁, 心脏病20年, 房颤2年。1天前突发意识丧失, 四肢抽搐3分钟左右, 10分钟后清醒, 左侧上下肢不能活动。神清, 血压正常, 心房纤颤。右眼无光感, 左上肢肌力0级, 左侧半身感觉丧失, 左侧病理征阳性  
正确答案: CAABD 您选择的答案:

#### 第160-164题

- A. 抗凝治疗
- B. 溶栓治疗
- C. 血液稀释疗法
- D. 脱水降颅压治疗
- E. 抗血小板聚集剂
- 1. 低分子右旋糖酐
- 2. 甘露醇
- 3. 抵克力得
- 4. 尿激酶、链激酶
- 5. 肝素

正确答案: CDEBA 您选择的答案:

#### 第165-166题

- A. 椎-基底动脉血栓形成
- B. 大脑前动脉血栓形成
- C. 大脑中动脉血栓形成
- D. 蛛网膜下腔出血
- E. 小脑出血
- 1. 有眩晕、眼震、构音障碍、交叉性瘫痪, 见于
- 2. 有偏瘫、同向性偏盲、偏身感觉障碍, 见于

正确答案: AD 您选择的答案:

#### 第167-170题

- A 椎基底动脉系统TIA
- B 颈内动脉血栓形成
- C 大脑前动脉血栓形成
- D 大脑中动脉血栓形成
- E 大脑后动脉血栓形成
- 1. 病灶侧单眼失明
- 2. 病灶对侧下肢中枢性瘫
- 3. 眩晕
- 4. 猝倒发作

正确答案: BCAA 您选择的答案:

#### 第171-173题

- A 大脑前动脉供血
- B 大脑后动脉供血
- C 大脑中动脉供血
- D 基底动脉供血
- E 椎动脉供血
- 1. 延髓外侧面
- 2. 脑桥
- 3. 枕叶

正确答案: EDB 您选择的答案:

#### 第174-178题

- A. 颈动脉型TIA
- B. 椎基底动脉TIA
- C. 内囊出血
- D. 高血压脑病
- E. 脑梗死

1. 女, 55岁, 突发剧烈头痛、呕吐, 发作性右侧肢体麻木, 抽搐一次, 血压260 / 130mmHg, 头颅CT检查未见异常, 经降压治疗后恢复正常

2. 女, 33岁, 阵发性眩晕1年, 每次约15~30分钟休息后好转, 再发伴恶心呕吐来院, 无大小便失禁。血压135 / 75mmHg, 右眼复视, 四肢肌力正常

3. 男, 65岁, 有高血压史10年, 左侧偏身感觉减退一周来院, 头颅CT示右侧基底节区低密度病灶

4. 男, 68岁, 左侧偏瘫1天, 血压180 / 120mmHg, 头颅CT示右侧基底节区高密度灶

5. 男, 53岁, 有高血压病史, 突发不能言语, 30分钟后好转。体检正常

正确答案: DBECA 您选择的答案:

#### 第179-182题

- A 腔隙性脑梗死
- B 短暂性脑缺血发作
- C 高血压脑病
- D 壳核出血
- E 脑栓塞

1. 58岁男性, 晨起出现右侧偏瘫、言语不清, 持续20分钟许, 头CT检查正常

2. 58岁男性, 高血压病史, 左偏身痛觉减退一周来院, 头CT右基底节小低密度灶(0.5cm)

3. 50岁女性, 突发剧烈头痛、呕吐, 发作性左侧肢体麻木, 抽搐一次, 血压26 / 17kPa, 头CT未见异常, 降血压后恢

复正常

4. 64岁女性，右侧轻偏瘫两天，血压24 / 16kPa，头CT左基底区小低密度灶

正确答案：BACA 您选择的答案：

第183-186题

A 大脑中动脉

B 大脑后动脉

C 大脑前动脉

D 椎动脉

E 基底动脉

1. 供应大脑外侧面血液的血管是

2. 供应枕叶血液的血管是

3. 供应脑桥血液的血管是

4. 供应延髓外侧部血液的血管是

正确答案：ABED 您选择的答案：

第187-190题

A 脑保护剂

B 抗凝治疗

C 溶栓治疗

D 血液稀释疗法

E 脑代谢活化剂

1. 低分子右旋糖酐

2. 20%甘露醇、维生素C

3. 肝素、双香豆素

4. 尿激酶、链激酶

正确答案：DABC 您选择的答案：