

习题集 精神病学 精神病学概论

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 关于精神症状特点以下哪项描述不正确

- A．症状的出现不受病人意识的控制
- B．症状一旦出现，难以通过转移令其消失
- C．症状的内容与外在客观环境相称
- D．症状出现可伴有痛苦体验
- E．症状均会给病人带来或轻或重的社会功能损害

正确答案：C 您选择的答案：

第2题 以下哪种疾病不属于神经症的范围

- A．恐惧症(恐惧症)
- B．焦虑症
- C．强迫症
- D．神经性厌食
- E．躯体形式障碍

正确答案：D 您选择的答案：

第3题 心理、社会因素作为原因在精神障碍的发病中起重要作用的疾病是

- A．精神分裂症
- B．心理生理障碍
- C．情感障碍
- D．精神发育迟滞
- E．创伤后应激障碍

正确答案：E 您选择的答案：

第4题 精神科诊断思维方式最佳的是

- A．横向诊断+纵向诊断
- B．横向诊断
- C．纵向诊断
- D．个体化诊断
- E．症状诊断

正确答案：A 您选择的答案：

第5题 定向障碍开始于意识障碍的哪种情况下

- A 嗜睡状态
- B 昏睡
- C 昏迷
- D 意识模糊
- E 谵妄状态

正确答案：D 您选择的答案：

第6题 强迫症状主要见于下列哪种疾病

- A．精神分裂症
- B．抑郁症
- C．神经衰弱
- D．恐惧症
- E．强迫症

正确答案：E 您选择的答案：

第7题 最常见的幻觉是

- A．九幻视
- B．幻触
- C．幻听
- D．幻味
- E．幻嗅

正确答案：C 您选择的答案：

第8题 在精神障碍的病因学中，促发因素是指

- A．遗传与环境因素
- B．创伤
- C．感染
- D．心理，社会因素
- E．躯体疾病

正确答案：A 您选择的答案：

第9题 早晨病人吃的是馒头和粥，医生查房问病人时，病人回答："早晨吃鸡、肉和鱼汤"，这是什么症状

- A．妄想
- B．幻觉
- C．虚构
- D．错构
- E．思维散漫

正确答案：D 您选择的答案：

第10题 关于记忆及记忆障碍，哪种说法是错误的

- A．记忆包括识记、保持、再认及回忆四个基本过程

B. 识记的事物越久远越易遗忘
C. 记忆障碍可分为记忆质与记忆量方面的障碍
D. 虚构症状多见于痴呆患者
E. 遗忘也可出现在正常人
正确答案：B 您选择的答案：

第11题 病人将一盏吊灯看成是一个牛头悬挂在那里是

- A 空间知觉障碍
- B 错觉
- C 幻视
- D 妄想
- E 非真实感

正确答案：B 您选择的答案：

第12题 脑器质性精神障碍的主要特点是

- A 智能障碍
- B 幻觉、妄想
- C 兴奋躁动
- D 沉默孤僻
- E 情绪低落

正确答案：A 您选择的答案：

第13题 患者听到有人斥责、讽刺、辱骂也，有人为他辩护、同情、赞扬他，查四处无人

- A 争论性幻听
- B 评论性幻听
- C 命令性幻听
- D 言语运动性幻觉
- E 读心症

正确答案：B 您选择的答案：

第14题 精神疾病是在各种因素影响下造成下列哪项损害所致的

- A. 大脑功能失调
- B. 小脑功能失调
- C. 锥体外系失调
- D. 锥体系失调
- E. 脊髓神经失调

正确答案：A 您选择的答案：

第15题 病人认为自己的思想通过广播而扩散出去，尽人皆知

- A 思维扩散
- B 思维被广播
- C 读心症
- D 被洞悉感
- E 思维化声

正确答案：B 您选择的答案：

第16题 病人感到脑内有一“智囊团”，该“智囊团”能发声，并经常告诉患者该做什么或不该做什么，这种症状属于

- A. 错觉
- B. 假性幻觉
- C. 思维被插入
- D. 思维被广播
- E. 被控制感

正确答案：B 您选择的答案：

第17题 导致老年前期痴呆最常见疾病是

- A 帕金森病
- B 肝豆状核变性
- C 阿尔茨海默病
- D 匹克病
- E 亨廷顿病

正确答案：C 您选择的答案：

第18题 脑内突然涌出大量异己的奇怪的念头，病人对此也感莫名其妙，且不能控制，这种症状可能是

- A. 思维奔逸
- B. 思维散漫
- C. 强制性思维
- D. 强迫性思维
- E. 病理性象征性思维

正确答案：C 您选择的答案：

第19题 我国精神疾病诊断(CCMD-3)分为

- A. 7大类
- B. 8大类
- C. 9大类
- D. 10大类
- E. 11大类

正确答案：D 您选择的答案：

第20题 病人表现为不言、不动、不食，面部表情固定，对外界刺激缺乏反应，肢体可随意摆动，诊断为何种症状

- A. 情绪低落

- B. 情感淡漠
- C. 情感高涨
- D. 木僵
- E. 痴呆

正确答案：D 您选择的答案：

第21题 病人大脑病变呈现弥散性器质性损害时，可出现

- A. 全面性痴呆
- B. 刚塞综合征
- C. 童样痴呆
- D. 重度精神发育迟滞
- E. 抑郁性假性痴呆

正确答案：A 您选择的答案：

第22题 精神病学(psychiatry)一词，来源于希腊语psyche和iatria，后二者合起来是

- A. 灵魂的意思
- B. 躯体的意思
- C. 治疗的意思
- D. 治疗灵魂疾病的意思
- E. 精神疾病的意思

正确答案：D 您选择的答案：

第23题 病理性激情是一种突然发作的非常强烈而短暂的情感障碍，多伴有意识障碍，常见于

- A. 神经症
- B. 孤独症
- C. 抑郁症
- D. 多动症
- E. 脑器质性精神障碍

正确答案：E 您选择的答案：

第24题 社会精神病学发展的范围不包括

- A. 流行病学调查研究
- B. 精神病管理模式的变革
- C. 社会发展和精神疾病
- D. 精神药物治疗学的进展
- E. 文化和精神疾病

正确答案：D 您选择的答案：

第25题 除哪项外，其他均为常见的注意障碍

- A. 注意增强
- B. 注意转移
- C. 注意疲劳
- D. 注意减退
- E. 注意涣散

正确答案：C 您选择的答案：

第26题 以下哪种疾病属于心理因素相关生理障碍

- A. 神经性厌食
- B. 焦虑症
- C. 适应障碍
- D. 神经衰弱
- E. 躯体形式障碍

正确答案：A 您选择的答案：

第27题 病人经常双臂挥动，并解释，“左臂代表全心全意为人民服务，右臂代表发挥人民的积极性，双臂挥动是发挥大家的积极性，全心全意为人民服务”。该症状是

- A. 感知觉障碍
- B. 逻辑倒错性思维
- C. 破裂性思维
- D. 思维鸣响
- E. 病理性象征性思维

正确答案：E 您选择的答案：

第28题 下述哪一种不属于生物精神医学范畴

- A. 神经生化
- B. 神经内分泌
- C. 精神药理学
- D. 精神疾病的流行病学
- E. 精神疾病遗传学

正确答案：D 您选择的答案：

第29题 精神科临床上常见的感觉障碍有以下几种，但不包括

- A. 感觉过敏
- B. 感觉减退
- C. 视物变形症
- D. 内感性不适
- E. 感觉消失

正确答案：C 您选择的答案：

第30题 下列不属于感知综合障碍的症状是

- A. 视物变形症
- B. 非真实感
- C. 空间知觉障碍
- D. 时间感知综合障碍
- E. 内感性不适

正确答案：E 您选择的答案：

第31题 下列哪种幻觉形式为临床最常见

- A. 幻听
- B. 幻视
- C. 幻嗅
- D. 幻味
- E. 内脏幻觉

正确答案：A 您选择的答案：

第32题 急性脑病综合征最基本的临床症状是

- A. 意识清晰度下降
- B. 动作紊乱
- C. 兴奋喊叫
- D. 谵语
- E. 思维不连贯

正确答案：A 您选择的答案：

第33题 下列哪项不是精神自动综合症的临床表现

- A. 假性幻觉
- B. 被控制感
- C. 强制性思维
- D. 意识障碍
- E. 影响妄想

正确答案：D 您选择的答案：

第34题 病人近一年来对家人变得冷淡，不去上学，不洗澡，不主动换掉衣服，对与自己有关的事无动于衷。这些表现属于哪种症状

- A. 情感低落
- B. 情感淡漠
- C. 情感倒错
- D. 意志减退
- E. 人格障碍

正确答案：D 您选择的答案：

第35题 易出现逆行性遗忘症状的疾病是

- A. 脑外伤
- B. 老年性痴呆
- C. 焦虑性神经症
- D. 精神分裂症
- E. 抑郁症

正确答案：A 您选择的答案：

第36题 病人呆坐于一旁，对医生的任何提问均不做回答，医生让其开口喝水时，患者却双唇紧闭，扭头逃避面前的杯子，该患者的症状可能是

- A. 缄默症
- B. 主动违拗
- C. 被动违拗
- D. 木僵
- E. 作态

正确答案：B 您选择的答案：

第37题 关于强迫观念，下列哪种说法是错误的

- A. 指某一概念在病人脑内反复出现
- B. 可表现为强迫性回忆、计数
- C. 可表现为强迫性穷思竭虑或强迫性怀疑
- D. 强迫观念就是强制性思维
- E. 强迫观念可以继发强迫行为

正确答案：D 您选择的答案：

第38题 脑局灶性病变时，病人听到事实不存在的鸣笛声，此种幻觉称为

- A. 原发性幻听
- B. 假性幻听
- C. 反射性幻听
- D. 机能性幻听
- E. 心因性幻听

正确答案：A 您选择的答案：

第39题 关于妄想，下列哪种说法是正确的

- A. 是一种病态的信念
- B. 是一种不符合事实的信念
- C. 是病人坚定不移的信念
- D. 是一种可以通过讲事实，摆道理进行说服的信念
- E. 是和他的文化水平相符合的信念

正确答案：A 您选择的答案：

第40题 精神病学作为医学的一个学科，在我国发展较迟。我国第一所精神病院开设在哪个城市

- A 广州
- B 北京
- C 苏州
- D 上海
- E 南京

正确答案：A 您选择的答案：

第41题 哪项不属于生物精神病学研究的范畴

- A 社会文化与精神疾病
- B 精神疾病的神经生化基础
- C 精神药物治疗学
- D 精神疾病遗传学
- E 神经放射学研究精神疾病

正确答案：A 您选择的答案：

第42题 关于病理性象征性思维，下列哪种说法是正确的

- A 属于思维内容障碍的一种
- B 正常人不可能出现象征性思维
- C 是思维形式障碍的表现之一
- D 与文化背景有关
- E 可以被人们共同理解

正确答案：C 您选择的答案：

第43题 从哪个世纪开始，法国"疯人院"院长比奈尔(PineI)去掉了精神病人身上的铁链和枷锁，把疯人院变成了医院，精神病被看作能治疗的疾病，精神病人被看作社会的成员

- A 16世纪
- B 17世纪
- C 18世纪
- D 19世纪
- E 20世纪

正确答案：C 您选择的答案：

第44题 轻度精神发育迟滞时，智商为

- A 30~49
- B 50~70
- C 20~34
- D <20
- E 75~99

正确答案：B 您选择的答案：

第45题 自知力与自知力障碍，下列哪种说法不正确

- A 自知力也称为领悟力
- B 病人自称自己有病，肯定有自知力
- C 自知力一般随着病情的好转而逐渐恢复
- D 有些精神病患者自知力并不丧失
- E 自知力完整是精神病病情痊愈的重要指标之一

正确答案：B 您选择的答案：

第46题 对于木僵的描述哪项是错误的

- A 面无表情
- B 不吃不喝
- C 意识障碍
- D 对刺激无反应
- E 呆坐呆立

正确答案：C 您选择的答案：

第47题 突然发生，完全不能用患者当时的处境和心理背景来解释的妄想

- A 继发性妄想
- B 关系妄想
- C 被害妄想
- D 原发性妄想
- E 超价观念

正确答案：D 您选择的答案：

第48题 病人对周围环境漠然置之，毫无感情，一切都无所谓，属于(1999年真题)

- A 情感低落
- B 情感倒错
- C 情感淡漠
- D 木僵
- E 痴呆

正确答案：C 您选择的答案：

第49题 医生查房时，患者诉说自己的内脏有牵拉、挤压、游走、蚁爬感。患者不能明确指出具体不适部位，诊断首先应考虑

- A 感觉过敏
- B 感觉减退
- C 视物变形症
- D 内感性不适

E. 感觉消失
正确答案：D 您选择的答案：

第50题 病人在意识清晰情况下，头脑中涌现大量思维，伴不自主感是
A 强迫观念
B 强制性思维
C 被动体验
D 物理影响妄想
E 思维被插入
正确答案：B 您选择的答案：

第51题 看到周围的人及动物、树木像木偶戏一样均变小了是
A 幻视
B 错觉
C 人格解体
D 视物显大症
E 视物显小症
正确答案：E 您选择的答案：

第52题 病人在意识清晰时出现幻视多见于
A. 神经症
B. 精神分裂症
C. 抑郁症
D. 躁狂症
E. 心理因素相关生理障碍
正确答案：B 您选择的答案：

第53题 按幻觉产生的条件分类，以下哪种幻觉不包括在内
A. 功能性幻觉
B. 反射性幻觉
C. 入睡前幻觉
D. 心因性幻觉
E. 真性幻觉
正确答案：E 您选择的答案：

第54题 精神病学作为医学的一个学科来说，其发展较其他医学科目要晚。现代精神病学的发展只有
A 50多年历史
B 100多年历史
C 150多年历史
D 200多年历史
E 300多年历史
正确答案：B 您选择的答案：

第55题 病人在旷野里听到两个人因为买一件物品而争吵不休，各说各的理
A 争论性幻听
B 指令性幻听
C 命令性幻听
D 思维化声
E 思维鸣响
正确答案：A 您选择的答案：

第56题 下列哪种组合是错误的
A 痴呆—记忆减退，判断错误
B 谵妄—幻觉，错觉，昼轻夜重
C 神经衰弱—焦虑，疑病，幻觉
D 精神运动性抑制—抑郁，冲动
E 意识障碍—谵妄，昏睡
正确答案：C 您选择的答案：

第57题 与思维破裂关系最密切的疾病是
A 精神发育迟滞
B 癔症
C 精神分裂症
D 躁狂症
E 偏执性精神病
正确答案：C 您选择的答案：

第58题 意识清晰状态下的幻觉常见于
A 精神分裂症
B 中毒性精神症
C 脑炎所致精神障碍
D 躯体疾病所致精神障碍
E 脑肿瘤所致精神障碍
正确答案：A 您选择的答案：

第59题 关于妄想，下列说法正确的是
A. 在意识障碍时出现的杂乱思维
B. 在智力缺损时出现的离奇想法
C. 在意识清晰的情况下的病理性歪曲信念
D. 是可被说服的不现实想法

E. 在意识中占主导地位的错误观念

正确答案：C 您选择的答案：

第60题 病人感觉自己的上肢变得很长，鼻子也变长了，这是什么症状

- A. 人格解体
- B. 非真实感
- C. 感觉减退
- D. 感知综合障碍
- E. 感觉过敏

正确答案：D 您选择的答案：

第61题 正常人在下列情况下可以出现错觉，但应除外

- A. 光线不足
- B. 恐惧
- C. 暗示
- D. 紧张情绪
- E. 期待状态

正确答案：C 您选择的答案：

第62题 关于妄想的概念正确的是

- A. 可以纠正的错误推理判断
- B. 一种病理性的歪曲信念、病态的推理和判断
- C. 不具有个人独特性
- D. 通常与文化背景和个人经历无关
- E. 妄想内容一般不涉及患者本人

正确答案：B 您选择的答案：

第63题 谵妄状态最常见的症状是

- A. 情感喜悦，动作多
- B. 意识范围狭窄
- C. 恐怖性错觉、幻觉
- D. 坚定不移的妄想
- E. 思维中断

正确答案：C 您选择的答案：

第64题 在精神障碍的心理、社会因素中，不包括下列哪项

- A. 应激性生活事件
- B. 人格特征
- C. 营养不良
- D. 情绪状态
- E. 性别

正确答案：C 您选择的答案：

第65题 病人自觉大脑突然涌现出大量不自主的、杂乱无章的陌生思维内容是

- A. 强制性思维
- B. 思维散漫
- C. 强迫性思维
- D. 思维奔逸
- E. 被洞悉感

正确答案：A 您选择的答案：

第66题 临床上最常见具有诊断意义的幻觉是

- A. 非言语性幻听
- B. 言语性幻听
- C. 幻视
- D. 幻嗅
- E. 幻味

正确答案：B 您选择的答案：

第67题 紧张性木僵见于哪种精神疾病

- A. 抑郁症
- B. 癔症
- C. 精神分裂症
- D. 神经症
- E. 反应性精神障碍

正确答案：C 您选择的答案：

第68题 记忆障碍在脑器质性精神障碍的早期主要表现为

- A. 顺行性遗忘
- B. 逆行性遗忘
- C. 错构
- D. 虚构
- E. 近事遗忘

正确答案：E 您选择的答案：

第69题 病人认真讲了一番话，但周围的医生们不理解病人要说明什么问题，这是什么症状

- A. 思维奔逸
- B. 思维散漫
- C. 思维贫乏
- D. 思维中断

E. 思维迟缓

正确答案：B 您选择的答案：

第70题 病人坚持不在床上睡，坐于走廊，是因为感到床在运动，此症状是

A 妄想

B 感觉倒错

C 非真实感

D 幻觉

E 空间感知综合障碍

正确答案：D 您选择的答案：

第71题 妄想是

A 大量涌现的不自主的观念

B 不能被说服的病态信念

C 无法摆脱的重复出现的观念

D 抽象的概念荒谬地具体化

E 思维联想连贯性障碍

正确答案：B 您选择的答案：

第72题 下列哪种情感反应不属于情感性质的改变

A. 情感高涨

B. 情感低落

C. 恐惧

D. 焦虑

E. 情感倒错

正确答案：E 您选择的答案：

第73题 朦胧状态的特点，下列哪项是错误的

A 突然发生，突然清醒

B 意识范围狭窄

C 可出现有条理的复杂行为

D 定向力不全

E 发作后有回忆

正确答案：E 您选择的答案：

第74题 看到周围的楼房、树木、人物变得比正常时大的许多是

A 人格解体

B 视物变小症

C 错觉

D 视物显大症

E 空间知觉障碍

正确答案：D 您选择的答案：

第75题 病人在饮食中尝到一种奇怪特殊的味道，实际不存在

A 幻嗅

B 幻味

C 幻触

D 错觉

E 假性幻觉

正确答案：B 您选择的答案：

第76题 妄想按起源可分为

A. 原发性妄想与继发性妄想

B. 系统性妄想与非系统性妄想

C. 被害妄想与夸大妄想

D. 疑病妄想与虚无妄想

E. 钟情妄想与物理影响妄想

正确答案：A 您选择的答案：

第77题 精神发育迟滞起病于

A. 16岁以前

B. 18岁以前

C. 20岁以前

D. 22岁以前

E. 25岁以前

正确答案：B 您选择的答案：

第78题 在各种生物、心理以及社会环境因素的影响下，大脑功能失调，导致认知、情感、意志和行为等精神活动出现不同程度障碍为临床表现的疾病，称为

A 精神分裂症

B 情感性精神障碍

C 神经症

D 心身疾病

E 精神疾病

正确答案：E 您选择的答案：

第79题 意识障碍状态下的幻觉常见于

A 精神分裂症

B 抑郁症

C 脑器质性精神病

D 更年期精神病

E 偏执性精神

正确答案：C 您选择的答案：

第80题 关于幻觉，下列哪项是错误的

A 是一种感觉障碍

B 可分为真性幻觉与假性幻觉

C 也可见于器质性精神障碍患者

D 评论性幻觉对诊断精神分裂症有重要价值

E 意识障碍的患者也可出现幻觉

正确答案：A 您选择的答案：

第81题 下列哪一项不是妄想的特点

A 无事实根据但坚定不移相信

B 内容与个人利益安全密切相关

C 具有个人特征，不同于集体共有信念

D 内容受个人经历和时代背景影响

E 是一种虚幻的知觉体验

正确答案：E 您选择的答案：

第82题 关于痴呆综合征哪项是错误的

A 有意识障碍

B 全面性智能减退

C 注意力集中

D 有消极观念

E 妄想

正确答案：A 您选择的答案：

第83题 关于知觉障碍下列哪项是错误的

A 一般在意识清晰时产生

B 多见于颞叶癫痫和脑器质性病变

C 患者对外界事物的体验障碍

D 患者对大小、空间的体验障碍

E 患者对自身形态的体验障碍

正确答案：B 您选择的答案：

第84题 幻觉的定义是

A 对客观事物的错误感受

B 对客观事物的歪曲

C 缺乏相应的客观刺激时的感知体验

D 客观刺激作用于感觉器官的感知体验

E 缺乏客观刺激时的思维过程

正确答案：C 您选择的答案：

第85题 关于幻觉的定义正确的是

A 感觉性的错误

B 现实刺激时知觉体验

C 一种虚幻的知觉

D 一种异样的感觉

E 虚假的感觉

正确答案：C 您选择的答案：

第86题 病人静点时将直输液管看成是一条蛇是

A 感知综合障碍

B 虚构

C 谵妄

D 幻觉

E 错觉

正确答案：E 您选择的答案：

第87题 关于错觉的定义正确的是

A 无客观刺激时的知觉体验

B 对客观事物歪曲的知觉

C 可以纠正的一种知觉障碍

D 对客观事物作出相反印象的知觉障碍

E 以上都不对

正确答案：B 您选择的答案：

第88题 产生错觉的因素是

A 环境因素

B 心理因素

C 意识状态

D 个体因素

E 以上均是

正确答案：E 您选择的答案：

第89题 病人看到房屋倾斜，汽车变得扭曲，电线杆像筷子一样细，这种现象是

A 非真实感

B 视物变形

C 错觉

- D 幻视
- E 人格解体

正确答案：B 您选择的答案：

第90题 急性中毒性精神障碍最重要的一个临床症状是

- A 兴奋失眠
- B 错觉
- C 烦躁不安
- D 不同程度意识障碍
- E 行为异常

正确答案：D 您选择的答案：

第91题 病人常侧耳倾听，称室外有人讲他坏话，并常向窗外说：“我要和你们辩论”等。该症状最可能是

- A 关系妄想
- B 被害妄想
- C 冲动行为
- D 言语性幻听
- E 错觉

正确答案：D 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第92题 女性，18岁，近两周时常听到声音说：“你完了，小心点”，为此紧张，恐惧。不愿出门，认为街上有人跟踪、监视并对她不利。这种症状是

- A 被害妄想
- B 幻听
- C 被控制妄想
- D 罪恶妄想
- E 幻觉妄想状态

正确答案：E 您选择的答案：

第93题 男性病人，29岁，近两年来，对工作失去兴趣，时常无故旷工，家庭责任心减退，对家人态度冷漠，生活懒散，整日无所事事，以上表现属于哪种精神症状

- A 情感低落
- B 情感不稳
- C 情感冷漠
- D 思维贫乏
- E 刚塞综合征

正确答案：C 您选择的答案：

第94题 王某，女，19岁，分裂样精神病，对医生说：“我肚子里总有一男子说话声，我做什么事，他总说‘你太懒了，这事做烂了’”。此症状是

- A 真性幻觉
- B 错觉
- C 幻视
- D 假性幻觉
- E 感觉障碍

正确答案：D 您选择的答案：

第95题 患者感到他的思维或行为被某种神秘的力量或仪器所控制是

- A 被害妄想
- B 疑病妄想
- C 夸大妄想
- D 钟情妄想
- E 物理影响妄想

正确答案：E 您选择的答案：

第96题 男性，25岁，近半年来时常自言自语，或微笑或愤怒，说听到许多人议论他，有表扬的，也有责骂的，以上症状是

- A 错觉
- B 关系妄想
- C 幻听
- D 被害妄想
- E 思维被洞悉感

正确答案：C 您选择的答案：

第97题 彭某，男，47岁，反复说：“你是医生...医生...医生，请你给我看病...看病...看病，我要回家...回家...回家”，该症状是

- A 思维破裂
- B 模仿言语
- C 持续言语
- D 刻板言语
- E 重复言语

正确答案：E 您选择的答案：

第98题 某学生，21岁，失眠半年，近1个月来学习成绩下降，不愿上课，不愿与他人交往，追问原因说：“大家都对我有偏见，讽刺的话让我受不了，去饭堂打饭时，他们故意咳嗽，是嘲笑我吃的太多，连学校的广播也议论我的事。”此病人的症状是

- A. 关系妄想
- B. 思维被洞悉感
- C. 被害妄想
- D. 罪恶妄想
- E. 象征性思维

正确答案：A 您选择的答案：

第99题 男性，26岁，生活懒散，面无表情，父母来看他，从不称呼父母更无问候言语，只顾埋头吃零食，视父母兄妹如陌生人

- A 情感平淡
- B 情感淡漠
- C 情感迟钝
- D 情感低落
- E 情感倒错

正确答案：B 您选择的答案：

第100题 男性，65岁，脑出血，有意识障碍，不时大喊“床上有毛毛虫，树、生、飞、我写字…塑料盒…一去不复返…”，该症状是

- A 思维破碎
- B 思维松弛
- C 思维不连贯
- D 思维中断
- E 思维插入

正确答案：C 您选择的答案：

第101题 谢某，女，17岁，近半年来一直低头不敢看人，经医生反复询问，答“看很多人脸都像在哈哈镜中的模样，有的很胖有的很瘦，看上去很可怕”，该症状是

- A 视物变形
- B 人格解体
- C 空间知觉障碍
- D 感觉倒错
- E 幻觉

正确答案：A 您选择的答案：

第102题 女性，50岁，突然听到儿子意外去世，立即不认亲人，看到儿子就在眼前说：“妈给你弄点好吃的”，随即给做龙虾等，家人劝阻不理睬，两天后突然清楚，病情经过不能完全回忆，该症状是

- A 强迫状态
- B 朦胧状态
- C 谵妄状态
- D 抑郁状态
- E 幻觉妄想状态

正确答案：B 您选择的答案：

第103题 刘某，男，30岁，由父亲陪同入诊室时，突然神情紧张地说：“爸，我嗅到毒气味”，停顿一下后又说：“这房间里肯定有毒气”，遂退出诊室，拒绝治疗，此症状是

- A 幻嗅
- B 错觉
- C 感觉障碍
- D 幻味
- E 幻听

正确答案：A 您选择的答案：

第104题 青年女性，每日乘车上班，某日再次乘车时，突然感到车子有了变化，四周气氛变得诡异，似有不祥预兆，但说不清具体内容，这属于何种精神症状

- A. 原发性妄想之妄想心境
- B. 被洞悉感
- C. 罪恶妄想
- D. 关系妄想
- E. 被害妄想

正确答案：A 您选择的答案：

第105题 某病人感觉周围的一切都被笼罩了一层灰纱，失去活力，如同梦境，这种症状是

- A. 幻视
- B. 错觉
- C. 空间知觉障碍
- D. 时间感知综合障碍
- E. 非真实感

正确答案：E 您选择的答案：

第106题 女性，23岁，问她“你是哪里人？”病人快速回答说：“我是中国人，祖国在我心中，我三中毕业，到山中去，矿物局中，我在矿山当会计……人类进入新的历史阶段，新的时代，培养一代新人，我们都是革命接班人”，此症状是

- A 思维不连贯
- B 思维松弛
- C 思维奔逸
- D 思维破碎
- E 思维扩散

正确答案：C 您选择的答案：

第107题 男性，35岁，病人住院期间，亲属告诉他相依为命的老母亲突然意外去世时，病人哈哈大笑

- A 病理性激情
- B 情感高涨
- C 情感脆弱
- D 强制性哭笑
- E 情感倒错

正确答案：E 您选择的答案：

第108题 某病人感觉父亲的双臂变得又粗又长，一伸手似乎就达到屋顶，这种症状是

- A. 错觉
- B. 空间知觉障碍
- C. 视物变形症
- D. 非真实感
- E. 幻觉

正确答案：C 您选择的答案：

第109题 男性，26岁，突然大喊大叫：“不得了啦，我爸爸被刺得稀烂，这儿净是戴铜帽子的人，你们看，他们正在刺我爸爸”。患者异常恐惧，此症状是

- A 幻听
- B 焦虑
- C 思维障碍
- D 假性幻视
- E 真性幻视

正确答案：E 您选择的答案：

第110题 女性，25岁，给丈人回信：“××：你好，冰天雪地，身体好吗？春暖花开了，你应该努力工作，汽车老在公路上……”。此患症状是

- A 思维破裂
- B 思维粘滞
- C 思维奔逸
- D 思维松弛
- E 病理性赘述

正确答案：A 您选择的答案：

第111题 鲁某，男，28岁，自述脑子空洞洞的，整天什么事也不想，常沉默不语，交谈时词汇量特别少，如问“谁送你来的？”答“父亲”，问“以前做什么工作”答“不知道”，该症状是

- A 思维迟缓
- B 思维贫乏
- C 思维中断
- D 思维松弛
- E 病理性赘述

正确答案：B 您选择的答案：

第112题 刘某，女，45岁，三年来经常感到胸前部不适和腹部不适，体内有一种“气”游走不定，怀疑患有“冠心病”和“胃癌”，经心电图、胃镜检查均正常，此症状是

- A 感觉增强
- B 感觉减退
- C 人格解体
- D 内脏幻觉
- E 内感不适

正确答案：E 您选择的答案：

第113题 某病人，将墙上的污点看成众多蚊子，遂拍打，这种症状是

- A. 感觉过敏
- B. 幻视
- C. 错觉
- D. 非真实感
- E. 视物变形症

正确答案：C 您选择的答案：

第114题 某女学生，17岁，认为自己所想的事都被别人知道了，如上街时想买蓝色围巾，却有人先将蓝色围巾买走：自己想拿杯子喝水，就有人将杯子先拿走，想乘车回家，就有人问需不需要乘车。病人认为别人完全明了她的想法，以上症状是

- A. 被害妄想
- B. 思维扩散
- C. 关系妄想
- D. 思维被洞悉感
- E. 被控制妄想

正确答案：D 您选择的答案：

第115题 孙某，男，20岁，每天总感到身体上有许多蚂蚁在身上爬，有电流击他，有人用针刺他的全身，非常疼痛，此症状是

- A 幻触
- B 错觉
- C 感觉过敏
- D 感觉倒错
- E 本体幻觉

正确答案：A 您选择的答案：

第116题 许某，女，16岁。别人讲什么话，病人就学什么话，如医生问她：“你叫什么名字？”答“你叫什么名字”问：“你今年多大岁数？”答：“你今年多大岁数”

- A 刻板言语
- B 持续言语
- C 模仿言语
- D 重复言语
- E 病理性赘述

正确答案：C 您选择的答案：

第117题 男性，30岁，近一个月来反复照镜子，感到自己的耳朵特别大，脸变丑了，终日不敢出屋，此症状是

- A 妄想
- B 幻觉
- C 错觉
- D 定向障碍
- E 人格解体

正确答案：E 您选择的答案：

第118题 26岁，女性，病人称"有时眼前看到彩色光圈和几何图形，耳朵能听到一个乐团演奏肖邦的交响乐"，此症状是

- A 心因性幻觉
- B 真性幻觉
- C 假性幻觉
- D 幻视
- E 幻听

正确答案：B 您选择的答案：

第119题 男性，16岁，病人自述两月来脑子里总出现学校校长的半身头像，有时很清晰，有时不清晰，但却不是用眼睛看见的，该症状是

- A 记忆障碍
- B 错觉
- C 假性幻觉
- D 真性幻觉
- E 人格解体

正确答案：C 您选择的答案：

第120题 医生问："你哪里不舒服?"病人回答："我姓王，下雨了，做牛做马，心里好苦，要帮助好人做事....."，此属于何种精神症状

- A．思维贫乏
- B．思维破裂
- C．思维奔逸
- D．病理性赘述
- E．思维插入

正确答案：B 您选择的答案：

第121题 赵某，女，28岁，病人机械地重复一句话："我要去北京...我要去北京...我要去北京..."

- A 刻板言语
- B 重复言语
- C 持续言语
- D 模仿言语
- E 思维不连贯

正确答案：A 您选择的答案：

第122题 男性，38岁，病人自称有特异功能，看到自己身后站着一个人，并且听到这个人表扬自己的声音，这真是"远在天边，近在脑内"。该症状属于

- A 定向障碍
- B 幻听
- C 幻视
- D 真性幻觉
- E 假性幻觉

正确答案：E 您选择的答案：

第123题 女性，47岁，半年来逐渐出现坐立不安，搓手顿足，惶惶不可终日，心情忧郁，悲观厌世，无大脑迟钝，无行动迟缓，近一年来月经无规律，手足发热，有时出汗，全身不适

- A 心因性抑郁
- B 老年性抑郁
- C 精神分裂症后抑郁
- D 躯体病伴发抑郁
- E 更年期抑郁

正确答案：E 您选择的答案：

第124题 女性，32岁，病人表现紧张恐惧，坐立不安，有大祸临头之感，惶惶不可终日，说不清具体原因

- A 焦虑状态
- B 恐怖症
- C 情感暴发
- D 易激惹
- E 心境恶劣

正确答案：A 您选择的答案：

第125题 男性，50岁，病人15年来，无事实根据的认为单位上下合伙谋害他，反复到各级信访机关及公安局上访告状，劝说无效

- A 意志缺乏
- B 意志减退

- C 意志增强
- D 意向倒错
- E 矛盾意向

正确答案：C 您选择的答案：

第126题 朱某，女，19岁，告诉医生“整个世界已经停滞不前，岁月不再流逝，时间过得很慢很慢，真正体会到度日如年的感觉”。此症状是

- A 心因性幻觉
- B 假性幻觉
- C 空间知觉障碍
- D 时间知觉障碍
- E 感觉障碍

正确答案：D 您选择的答案：

第127题 李某，女，31岁，入院后每日总站在窗前愤怒地向外大骂。问其原因，答到：“我听到单位许多同事站在外面议论我，诬陷我，说我作风不好”，此症状是

- A 错觉
- B 感觉障碍
- C 联想障碍
- D 幻听
- E 情感障碍

正确答案：D 您选择的答案：

第128题 男性，56岁，当被问及“上次药吃完了没有？”病人答：“上星期的今天，也就是星期五上午，你给我开了21粒鲁米那和21粒苯妥英钠，我早上吃一粒鲁米那、一粒苯妥英钠，中午也吃……，晚上也吃……，到今天正好吃完，此症状是

- A 思维散漫
- B 破裂思维
- C 思维不连贯
- D 诡辩论
- E 病理性赘述

正确答案：E 您选择的答案：

第129题 周某，65岁。医生问他：“你吃饭了吗？”答“刚吃过”，问：“你多大岁数了？”答“刚吃过”。问：“你家在那里住？”答：“刚吃过”。

- A 刻板言语
- B 模仿言语
- C 重复言语
- D 持续言语
- E 音韵联想

正确答案：D 您选择的答案：

第130题 王某，男，20岁，入院五天，吃饭总是吃几口后就将饭菜倒掉，问其原因答：“我吃几口就能尝出饭里有农药味，我不敢吃”，此症状是

- A 幻嗅
- B 幻味
- C 幻听
- D 幻视
- E 幻触

正确答案：B 您选择的答案：

第131题 女性，46岁，情绪低落，对周围一切感到兴趣索然。自觉工作太吃力，一切懒于料理，不参加外界活动，整日卧床少动

- A 意志缺乏
- B 意志增强
- C 意志减退
- D 作态
- E 蜡样屈曲

正确答案：C 您选择的答案：

第132题 一酒精中毒病人刚进诊室，看到地上的电风扇说道：“你这小鬼站在这里干什么，还不快走”。定睛细看后又说：“哦，我看花眼了，是个电风扇”，此症状是

- A 错觉
- B 幻觉
- C 定向障碍
- D 妄想
- E 感觉障碍

正确答案：A 您选择的答案：

第133题 男性，20岁，大学生，患者到电影院看到门前有四根大石柱，立即体验到这四根石柱刺在自己的心脏，电影院的人都在嘲笑他，立即离开电影院

- A 妄想心境
- B 妄想回忆
- C 妄想知觉
- D 被害知觉
- E 关系妄想

正确答案：C 您选择的答案：

第134题 女性，23岁，因爱人车祸身亡而突然精神失常，时哭时笑，问：“你多大岁？”答“5岁”，问“你在何处工作”答“我是幼儿园小宝宝”，此症状是

- A 自知力缺乏
- B 假性痴呆
- C 后天性痴呆
- D 错构
- E 虚构

正确答案：B 您选择的答案：

第135题 男性，50岁，癫痫史15年，一次合理要求遭到无理拒绝后，突然双目圆睁，面色苍白，双手震颤，勃然大怒，拿出一把水果刀，企图行凶，被阻拦，突然倒地，呼之不应，过后遗忘

- A 情感倒错
- B 情绪不稳
- C 情感脆弱
- D 病理性激情
- E 病理性半醒状态

正确答案：D 您选择的答案：

第136题 肖某，女，23岁，近一月来躺在床上常感到有人在给自己按摩，胃肠内有异物插入，非常难受，有时感到胃中有一个像乒乓球样的东西，该症状是

- A 妄想
- B 错觉
- C 内感不适
- D 内脏幻觉
- E 感觉倒错

正确答案：D 您选择的答案：

三、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第137-139题

中年男性，近年来与妻子关系紧张，常失眠，夜间盘问妻子一天的行踪，并搜索包内物品，白日跟踪妻子，认为妻子与单位的男同事有不正当关系，曾写信到单位“检举揭发”，打匿名电话警告妻子单位的男同事，吃饭时认为菜里有洗衣粉的味道，怀疑是妻子与别人联合起来对付他。

1. 病人是否存在妄想?若有，属于哪一种

- A. 嫉妒，被害妄想
- B. 嫉妒，关系妄想
- C. 关系，被害妄想
- D. 罪恶，钟情妄想
- E. 无妄想状态

2. 病人有哪一种幻觉

- A. 幻嗅
- B. 幻听
- C. 幻视
- D. 幻味
- E. 幻触

3. 此病人考虑为

- A. 人格障碍
- B. 心境障碍
- C. 恐惧症
- D. 精神分裂症
- E. 焦虑症

正确答案：ADD 您选择的答案：

第140-142题

一中年女性，在家属陪同下首次来院门诊，精神检查发现有关系妄想。

1. 如考虑为精神分裂症，其妄想特点应为

- A. 所产生的信念有事实根据
- B. 妄想是逐渐产生的
- C. 妄想内容不涉及安全和个人需要
- D. 妄想内容缺乏逻辑性
- E. 不会伴有情感低落

2. 如考虑为抑郁症，其妄想特点应为

- A. 是一种原发性妄想
- B. 所产生的妄想一定有事实根据
- C. 常伴幻觉
- D. 妄想的产生与情感低落有关
- E. 妄想是诊断的有力依据

3. 如为精神分裂症，可能伴有的其他症状有

- A. 意识障碍
- B. 思维形式障碍
- C. 智能障碍
- D. 情感高涨
- E. 定向力障碍

正确答案：DDB 您选择的答案：

四、A4型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第143-144题

青年男性，近半年来逐渐出现生活懒散，不愿工作，神情呆滞，有时暗自发笑，有时叹气，说听到鸟叫的声音或火车鸣笛声。

1. 对精神疾病诊断最有意义的症状是

- A. 失眠
- B. 情感不稳
- C. 幻听
- D. 意志活动减弱
- E. 钟情妄想

2. 若病人半年前，有头部撞击史，应最先作哪些检查

- A. 血液生化检查
- B. B超检查
- C. 头颅CT扫描
- D. 脑脊液检查
- E. 颅骨X线摄片

正确答案：CC 您选择的答案：

五、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第145-149题

- A 影响妄想
- B 强制性思维
- C 痴呆
- D 关系妄想
- E 木僵

- 1. 在意识清晰情况下出现全面智能减退
- 2. 无意识障碍而出现言语、动作；情感的抑制
- 3. 感到自己的思想和行为被一种仪器所控制
- 4. 脑内突然涌现大量杂乱无章的联想，无法控制
- 5. 认为周围环境中的无关事物和自己有关

正确答案：CEABD 您选择的答案：

第150-152题

- A. 被害妄想
- B. 夸大妄想
- C. 关系妄想
- D. 自罪妄想
- E. 疑病妄想

- 1. 病人无根据的认为自己犯下了滔天大罪，对不起国家和人民
- 2. 病人无根据的认为自己感染了可怕的病毒，大脑已被吞噬，将不久于人世
- 3. 病人觉得周围人说话指桑骂槐，含沙射影，都是针对他的

正确答案：DEC 您选择的答案：

第153-155题

- A 联想结构障碍
- B 联想速度障碍
- C 联想数量障碍
- D 联想自主性障碍
- E 联想形式障碍

- 1. 思维破裂
- 2. 强制性思维
- 3. 思维贫乏

正确答案：ADC 您选择的答案：

第156-160题

- A 联想过程缺乏一定方向，概念间缺乏内在联系
- B 大脑中反复出现的观念，明知不必要，却摆脱不了，感到非常痛苦
- C 以往经验在记忆中大量脱失
- D 持续地重复某一单调的语句
- E 缺乏事实依据，患者却坚信不移的病理信念

- 1. 遗忘
- 2. 妄想
- 3. 刻板言语
- 4. 强迫观念
- 5. 思维破裂

正确答案：CEDBA 您选择的答案：

第161-163题

- A 蜡样屈曲
- B 情绪低落
- C 思维奔逸
- D 焦虑
- E 恐怖

- 1. 属于抑郁症是
- 2. 属于精神分裂症是
- 3. 属于躁狂症是

正确答案：BAC 您选择的答案：

第164-165题

- A. 赘述症
- B. 持续言语
- C. 模仿言语
- D. 刻板言语
- E. 思维散漫

1. 病人在回答问题时多次单调重复同一个答案

2. 病人在叙述一件事时不紧不慢，但加大许多不必要的细节，无法使他讲得扼要一点，一定要按他原来的方式讲完

正确答案：DA

您选择的答案：

第166-167题

- A. 假性幻觉
- B. 功能性幻觉
- C. 内脏性幻觉
- D. 反射性幻觉
- E. 内感性不适

1. 病人告诉医生，每当他听到自来水的流动声时，就同时听到有人议论他的声音

2. 当某一感觉器官处于功能活动状态时，出现涉及另一感觉器官的幻觉

正确答案：BD

您选择的答案：

第168-172题

- A 血液
- B 粘液
- C 脑脊液
- D 黄胆汁
- E 黑胆汁

1. 希波克拉底(Hippocrates)提出了精神病的体液病理学说。其含意是人体内存在着4种基本体液，它们如果正常混合起来，人就健康。这4种液体不包括哪一种

2. 抑郁症是由于人体内哪种液体过多所致

- A 言语运动性幻觉
- B 被控制感
- C 错觉
- D 听幻觉
- E 似曾相识

3. 病人对从未见到过的人感到很熟悉

4. 病人感到自己的身体不由自主的由外力操纵

5. 病人在不言不语时自觉和正在说话一样

正确答案：CEEBA

您选择的答案：

第173-175题

- A 童样痴呆
- B 情感高涨
- C 睡眠障碍
- D 强制性哭笑
- E 情感倒错

1. 属于精神分裂症是

2. 属于脑血管性精神障碍是

3. 属于躁狂症是

正确答案：EDB

您选择的答案：

第176-178题

- A. 幻觉
- B. 妄想
- C. 错觉
- D. 内感性不适
- E. 感知综合障碍

1. 对客观事物歪曲的知觉

2. 缺乏现实刺激时的知觉体验

3. 躯体内部产生的不舒服的异常感觉，性质、部位往往描述不清

正确答案：CAD

您选择的答案：

习题集 精神病学 心理生理障碍

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 对于神经性厌食症，下列哪条是错误的

- A 担心发胖而故意节食
- B 绝大多数为青少年女性
- C 常具有强迫性人格
- D 比平均体重值减轻40%以上
- E 女性闭经，男性性功能减退

正确答案：D 您选择的答案：

第2题 治疗神经性贪食症的药物首选

- A 抗精神病药
- B 三环类抗抑郁剂
- C 单胺氧化酶抑制剂
- D 抗焦虑药
- E 抗癫痫药

正确答案：B 您选择的答案：

第3题 有关心身疾病的发病机制下述哪项是错误的

- A 情绪为心理因素影响躯体功能的媒介
- B A型性格可能与紧张的发生有关
- C 个体易感性与心身疾病无关
- D 生活事件、心理社会因素与心身疾病有关
- E 个体对刺激的评价和应对方式与心身疾病有关

正确答案：C 您选择的答案：

第4题 关于神经性厌食错误的是

- A 进食量明显低于正常人
- B 存在内分泌紊乱
- C 可伴发抑郁症状
- D 可出现自杀行为
- E 同于正常节食

正确答案：E 您选择的答案：

第5题 心身疾病与下列哪些因素有关

- A 情绪
- B 生活事件
- C 性格
- D 个体易感性
- E 以上都是

正确答案：E 您选择的答案：

第6题 心理生理障碍，又称心身疾病，是指

- A 与心理因素密切相关，以精神症状表现为主的疾病
- B 一个与社会因素密切相关以精神症状表现为主的疾病
- C 一组与心理因素密切相关以躯体症状表现为主的疾病
- D 一组与心理社会因素密切相关，躯体症状表现为主的疾病
- E 一个与心理社会因素相关以躯体症状表现为主的疾病

正确答案：D 您选择的答案：

第7题 关于夜惊下列哪种说法是正确的

- A 常见于青年人
- B 发生在睡眠前三分之一阶段
- C 发生于REM睡眠时段
- D 发作时意识无障碍
- E 每次发作约持续30分钟以上

正确答案：B 您选择的答案：

第8题 有关心身医学与心身疾病的发病机制下述哪项是错误的

- A 心理因素影响躯体内脏功能是通过情绪为媒介来实现的
- B 心身疾病与心理社会因素有密切联系
- C 所有的消极情绪对人体有害无益
- D 个体易感性与心身疾病的发生发展有关
- E 有人提出A型行为模式与冠心病的发生有关

正确答案：C 您选择的答案：

第9题 下述内容有一项不是心身疾病

- A 偏头痛
- B 支气管哮喘
- C 过敏性结肠炎
- D 神经症
- E 经前期紧张症

正确答案：D 您选择的答案：

第10题 神经性厌食常发生于

- A 青少年男性

- B. 青少年女性
- C. 中年男性
- D. 中年女性
- E. 老年女性

正确答案：B 您选择的答案：

第11题 神经性呕吐的特点是

- A. 常伴有明显器质性病变
- B. 不能自控反复食后呕吐
- C. 体重明显减轻
- D. 与心理社会因素无关
- E. 自发的反复呕吐

正确答案：E 您选择的答案：

第12题 下述疾病中有哪项不属于心身疾病

- A. 梅尼埃综合征
- B. 原发性青光眼
- C. 消化性溃疡
- D. 原发性高血压
- E. 慢性酒中毒

正确答案：E 您选择的答案：

第13题 有关心身疾病的阐述下述哪项是错误的

- A. 主要由情绪因素引起的
- B. 以躯体症状为主的
- C. 与植物神经系统有关
- D. 以精神症状为主要病理
- E. 发病前存在心理社会因素

正确答案：D 您选择的答案：

第14题 以下哪种疾病不属于心身疾病

- A. 原发性高血压
- B. 神经性呕吐
- C. 糖尿病等
- D. 紧张性头痛
- E. 抑郁症

正确答案：E 您选择的答案：

第15题 神经性贪食的主要特征是

- A. 食后呕吐
- B. 食后产生内疚感
- C. 持续性的暴食
- D. 发作性暴食
- E. 食前、食后呕吐

正确答案：D 您选择的答案：

第16题 有关失眠症的诊断标准，以下哪项是正确的

- A. 每周失眠2次，持续1月以上
- B. 每周失眠3次，持续2月以上
- C. 每周失眠3次，持续1月以上
- D. 每周失眠2次，持续2月以上
- E. 每周失眠3次，持续3月以上

正确答案：C 您选择的答案：

第17题 对单纯厌食宜选用的精神药物是

- A. 安定(地西洋)
- B. 舒必利
- C. 卡马西平
- D. 多塞平
- E. 碳酸锂

正确答案：B 您选择的答案：

第18题 失眠症治疗时最常用的药物是

- A. 地西洋类
- B. 氯丙嗪
- C. 多塞平
- D. 奋乃静
- E. 阿米替林

正确答案：A 您选择的答案：

第19题 心身疾病不包括

- A. 甲状腺功能亢进
- B. 糖尿病
- C. 冠心病
- D. 支气管哮喘
- E. 重症肌无力

正确答案：E 您选择的答案：

第20题 与心理和社会因素密切相关，以躯体损害为主的疾病是

- A. 心身疾病

- B. 抑郁症
- C. 心因性精神障碍
- D. 焦虑症
- E. 癯症

正确答案：A 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第21题 女性，18岁，近一年来认为自己过胖，每日专注于自己的体重、体型，严格限制每日进食量，偶有贪食情况，但饱餐之后，立即自行呕吐，或服泻剂，现出现畏寒体温偏低，月经停止，比标准体重减轻25%，经详细询问病史及各种检查即往无躯体疾病病史，最可能的诊断

- A. 神经性厌食症
- B. 神经性贪食症
- C. 结核症
- D. 痛症
- E. 甲状腺功能不全

正确答案：A 您选择的答案：

第22题 男性，30岁。诉说睡眠中常被噩梦突然惊醒，引起恐惧不安，通常在夜间睡眠的后期发作，该病人可能的诊断是

- A. 睡行症
- B. 夜惊
- C. 梦魇
- D. 急性焦虑发作
- E. 癯症

正确答案：C 您选择的答案：

第23题 女性，40岁。担心工厂效益不好，自己可能会下岗而造成数月来焦虑紧张，晚上失眠。这时用哪类药物效果较好

- A. 氯丙嗪
- B. 丙咪嗪
- C. 艾司唑仑
- D. 锂盐
- E. 奋乃静

正确答案：C 您选择的答案：

第24题 男性，31岁，因长期出差，近半年来出现入睡困难，白日感头昏、全身乏力伴恶心感，曾服安定2片/晚，疗效不持久，此后曾多次改服催眠类药品，疗效不佳，为此紧张不安，不能有效工作，体检无异常，颅脑CT(-)，否认精神疾病史。此病人诊断为

- A. 旅途性精神病
- B. 神经衰弱
- C. 焦虑症
- D. 失眠症
- E. 人格障碍

正确答案：D 您选择的答案：

第25题 男童，11岁，近2周采出现夜间入睡2~3小时后起床，并在床边摸索，片刻后至厨房，再自行返回睡觉，动作机械，历时半小时左右，醒后不能回忆，体检、神经系统无异常、颅脑CT(-)、脑电图(-)。该患者诊断考虑为

- A. 精神运动性癫痫
- B. 夜惊
- C. 睡行症
- D. 分离性漫游
- E. 梦魇

正确答案：C 您选择的答案：

三、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第26-28题

女性，21岁，舞蹈演员。8个月前，因同事偶说了句“最近胖了”遂采取各种措施节食，家人劝阻时，以食欲不佳等理由拒绝进餐，体重由以往54kg降至32kg(身高1.65m)，近3个月来出现闭经，体检见皮肤干燥、苍白，形体消瘦，严重营养不良。

1. 根据以上病史，最可能的诊断是

- A. 人格障碍
- B. 心因性反应
- C. 神经性厌食症
- D. 焦虑症
- E. 癯症

2. 宜行哪种治疗方案

- A. 静脉高能
- B. 补充维生素类
- C. 家庭治疗
- D. 认知治疗
- E. 心理治疗、营养支持治疗及适量精神药品

3. 此类病人死亡原因多见于

- A. 自杀
- B. 意外

- C. 营养代谢障碍及感染
- D. 消化道出血
- E. 以上都不是

正确答案：CEC 您选择的答案：

第29-30题

7岁女童，性格腼腆，近1个月来频繁出现夜间睡眠时哭喊，多在前半夜，并拍打被褥，神情恐惧，难以唤醒，约5分钟后安静重新入睡，次日不能回忆夜间发生之事。

1. 根据以上病史，诊断考虑

- A. 夜惊
- B. 分离性漫游
- C. 情绪障碍
- D. 梦魇
- E. 恐怖症

2. 可行的治疗方案是

- A. 少量安定(地西泮)
- B. 氯丙嗪
- C. 丁螺环酮
- D. 多塞平
- E. 不需治疗

正确答案：AA 您选择的答案：

第31-33题

男，32岁，近二月上床后近2小时方能入睡，每周3~4次，只能睡眠2~4小时，晨起后感觉疲乏，精神不振，诊断为失眠症

1. 失眠症最常见的病因是

- A. 心理生理因素
- B. 精神病的伴发症状
- C. 药物依赖的伴发症状
- D. 睡眠中呼吸困难引起
- E. 酒类依赖的戒断症状

2. 对慢性失眠症的治疗，下列哪种说法是错误的

- A. 强调定时作息
- B. 入夜后避免兴奋
- C. 入夜后避免用浓茶、咖啡
- D. 应该躺着阅读书刊
- E. 尽量改善周围环境

3. 对解除短期失眠症，最安全的药物应首选

- A. 舒乐安定
- B. 硝基安定
- C. 三唑安定
- D. 阿普唑仑
- E. 安定

正确答案：ADA 您选择的答案：

第34-35题

女性，19岁。近半年来关注于自身体重，采取多种方法节食。导致明显体重减轻，比平均体重减轻15%以上。近三个月来闭经，体检可见严重营养不良。

1. 你认为该学生诊断为什么疾病

- A. 严重营养不良
- B. 人格障碍
- C. 神经性厌食
- D. 原发性闭经
- E. 癯症

2. 最佳的治疗方案为

- A. 认知行为治疗+躯体支持疗法+抗抑郁剂
- B. 输液或鼻饲补充营养
- C. 心理治疗
- D. 抗精神病药治疗
- E. 精神分析

正确答案：CA 您选择的答案：

四、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第36-38题

- A. 认知行为疗法
- B. 氟西汀+认知行为疗法
- C. 苯二氮草类治疗+认知行为疗法
- D. 苯二氮草类治疗
- E. 氯丙嗪

1. 失眠症

2. 神经性呕吐

3. 神经性贪食

正确答案：CBA 您选择的答案：

第39-42题

A. 发作性暴食，食后采取呕吐、导泻或禁食来阻止发胖

B. 通过节食，自我诱发呕吐，过度运动达到体重减轻，存在害怕发胖的超价观念

C. 自我诱发的反复呕吐，呕吐物为刚进的食物，体重保持在正常体重的80%以上
D. 发生于睡眠的前1/3阶段，伴尖叫，哭喊，惊恐，醒后不能回忆，多见于儿童
E. 睡眠时有噩梦，有强烈的梦境体验，伴情绪紧张、心悸等，见于任何年龄
1. 神经性呕吐
2. 神经性厌食
3. 梦魇
4. 夜惊
正确答案：CBED 您选择的答案：

习题集 精神病学 神经症及癔症

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 明显与心理因素相关的躯体疾病是

- A. 癔症
- B. 反应性精神病
- C. 疑病性神经症
- D. 疼痛
- E. 心身疾病

正确答案：E 您选择的答案：

第2题 行为疗法对下列哪种强迫症状有效

- A 强迫性回忆
- B 强迫性穷思竭虑
- C 强迫性对立思维
- D 强迫性仪式动作
- E 强迫性计数

正确答案：D 您选择的答案：

第3题 神经衰弱的核心症状是

- A. 思维迟钝
- B. 无愉快感
- C. 情绪不稳定
- D. 精神易兴奋
- E. 精神易疲劳

正确答案：E 您选择的答案：

第4题 焦虑症治疗药物常用

- A. 氯丙嗪
- B. 地西泮
- C. 氯丙咪嗪
- D. 卡马西平
- E. 碳酸锂

正确答案：B 您选择的答案：

第5题 伴有躯体症状的焦虑病人，首先应与下列哪种疾病鉴别

- A. 呼吸系统疾病
- B. 消化系统疾病
- C. 心血管系统疾病
- D. 泌尿系统疾病
- E. 骨骼系统疾病

正确答案：C 您选择的答案：

第6题 苯二氮草类药物的催眠作用机制是

- A. 与GABA受体亚单位结合
- B. 增强GABA能神经传递和突触抑制
- C. 与β亚单位苯二氮草受体结合
- D. 促进GABA的释放
- E. 减慢GABA的降解

正确答案：B 您选择的答案：

第7题 诊断强迫症需与哪种疾病相鉴别

- A. 精神分裂症
- B. 抑郁发作
- C. 焦虑症
- D. 脑器质性精神障碍
- E. 以上都是

正确答案：E 您选择的答案：

第8题 焦虑症的核心症状为

- A. 注意力集中困难
- B. 精神焦虑
- C. 躯体焦虑
- D. 记忆力减退
- E. 睡眠障碍

正确答案：B 您选择的答案：

第9题 关于惊恐发作的特点，以下哪种说法不正确

- A. 发作过后有担心再发作的心理
- B. 发作时意识不清楚
- C. 发作时间一般5~20分钟，很少超过1个小时
- D. 常表现为明显的自主神经症状
- E. 发作有不可预测性和突发性

正确答案：B 您选择的答案：

第10题 焦虑性神经症常伴有躯体症状，主要是

- A. 疲乏
- B. 自主神经功能亢进
- C. 出汗
- D. 性功能障碍
- E. 上腹不适

正确答案：B 您选择的答案：

第11题 疑病症与精神分裂症的鉴别主要是

- A. 后者疑病内容常离奇、不固定，前者多较固定
- B. 后者有思维障碍及幻觉、妄想，前者无妄想
- C. 后者缺乏自知力，不积极求治，前者积极主动求治
- D. 后者经抗精神病治疗有效，前者则困难
- E. 以上均是

正确答案：E 您选择的答案：

第12题 疑病症是一种

- A. 牵连观念
- B. 是恐惧的心理状态
- C. 是对自身健康的过分担心
- D. 是神经衰弱的表现
- E. 是分裂症早期症状之一

正确答案：C 您选择的答案：

第13题 关于脑衰弱综合征，错误的叙述是

- A. 核心症状是易兴奋和易疲劳
- B. 睡眠障碍是其常见症状之一
- C. 可继发于许多躯体疾病
- D. 可见于精神分裂症
- E. 对于神经衰弱具有诊断特异性

正确答案：E 您选择的答案：

第14题 下列哪一种药物最常用于焦虑症的治疗

- A. 氟哌啶醇
- B. 碳酸锂
- C. 安定
- D. 五氟利多
- E. 卡马西平

正确答案：C 您选择的答案：

第15题 下列哪一条是神经症的特点

- A. 具有可证实的器质性基础
- B. 病人对自己的病有相当的自知力
- C. 具有鲜明的幻觉妄想症状
- D. 强烈的自杀意念并有自杀行为
- E. 智能发育障碍

正确答案：B 您选择的答案：

第16题 焦虑症不应出现下述哪一条症状

- A. 焦虑
- B. 紧张
- C. 恐惧
- D. 幻听
- E. 植物神经系统症状

正确答案：D 您选择的答案：

第17题 CCMD-3关于神经症病程标准为

- A. 符合症状标准至少3个月
- B. 符合症状标准至少4个月
- C. 符合症状标准至少2个月
- D. 符合症状标准至少6个月
- E. 符合症状标准至少12个月

正确答案：A 您选择的答案：

第18题 关于癔症，以下哪种说法是错误的

- A. 多见于女性
- B. 首发年龄20~30岁
- C. 临床主要表现为分离症状和转换性症状
- D. 60%~80%的患者可在一年内自发缓解
- E. 癔症的预后较差

正确答案：E 您选择的答案：

第19题 神经衰弱最主要的症状是

- A. 精神容易兴奋和脑力容易疲乏
- B. 情绪烦恼
- C. 生理心理症状
- D. 睡眠障碍
- E. 疼痛

正确答案：A 您选择的答案：

第20题 神经衰弱的临床表现为

- A. 疲劳、睡眠障碍、头痛
- B. 多疑、多虑、幻觉
- C. 抑郁、轻生观念
- D. 遗忘、智力减退
- E. 呆滞、平淡、懒散

正确答案：A 您选择的答案：

第21题 针对焦虑症下列哪一种说法是错误的

- A. 焦虑症的发作者有遗传基础
- B. 焦虑症患者运动后血中乳酸较对照组高
- C. 焦虑症患者有去甲肾上腺素能活动增加
- D. 焦虑症的发生可能与5-羟色胺功能增高有关
- E. 焦虑症患者的发病与脑内病毒感染有关

正确答案：E 您选择的答案：

第22题 下列哪种情感活动符合焦虑症

- A. 欣快感
- B. 情感倒错
- C. 情感低落
- D. 焦虑
- E. 情感淡漠

正确答案：D 您选择的答案：

第23题 神经衰弱的情绪症状主要是

- A. 烦恼、紧张、易激惹
- B. 情感高涨
- C. 情绪低落
- D. 焦虑
- E. 情感淡漠

正确答案：A 您选择的答案：

第24题 以下哪种疾病不属于神经症的范围

- A. 恐惧症
- B. 焦虑症
- C. 强迫症
- D. 躯体形式障碍
- E. 失眠症

正确答案：E 您选择的答案：

第25题 有关癔症发作与癫痫大发作的鉴别要点，以下哪种说法不正确

- A. 癫痫大发作时意识完全丧失
- B. 癫痫大发作时瞳孔多散大且对光反应消失
- C. 癫痫大发作常有咬破唇舌、跌伤和大小便失禁
- D. 癫痫大发作抽搐无规律性
- E. 癫痫大发作后完全不能回忆，脑电图检查有特征变化

正确答案：D 您选择的答案：

第26题 下列疾病中最适用心理治疗的是

- A. 神经衰弱
- B. 抑郁症
- C. 躁狂症
- D. 精神分裂症
- E. 精神发育迟滞

正确答案：A 您选择的答案：

第27题 癔症性躯体障碍主要表现为

- A. 运动障碍与感觉障碍
- B. 遗忘
- C. 意识障碍
- D. 双重人格
- E. 癔症性神游

正确答案：A 您选择的答案：

第28题 强迫症与恐惧症的区别在于

- A. 出现焦虑反应
- B. 明知不对难以控制
- C. 是否回避
- D. 有无精神因素
- E. 有自主神经症状

正确答案：C 您选择的答案：

第29题 神经衰弱的记忆力减退是由于

- A. 睡眠障碍
- B. 思维迟钝
- C. 情绪不稳
- D. 注意力难以集中
- E. 焦虑不安

正确答案：D 您选择的答案：

第30题 癔症发作最有效的治疗方法是

- A. 行为治疗
- B. 镇静药物
- C. 暗示治疗
- D. 抗精神病药
- E. 物理治疗

正确答案：C 您选择的答案：

第31题 对强迫症有特殊效果的是下列哪一种药物

- A. 氯氮平
- B. 多虑平
- C. 佳静安定
- D. 氯丙嗪
- E. 氯丙咪嗪

正确答案：E 您选择的答案：

第32题 神经衰弱的最佳治疗方案是

- A. 森田疗法
- B. 31娱疗法
- C. 生物反馈训练
- D. 抗焦虑药物
- E. 心理治疗与药物治疗相结合

正确答案：E 您选择的答案：

第33题 癔症的情感障碍主要表现

- A. 情感低沉
- B. 情感爆发
- C. 情感不协调
- D. 情感高涨
- E. 情感淡漠

正确答案：B 您选择的答案：

第34题 强迫症治疗的药物宜选用

- A. 氯丙嗪
- B. 脑复康
- C. 维生素B族
- D. 氯丙咪嗪
- E. 安慰剂

正确答案：D 您选择的答案：

第35题 关于躯体形式障碍，以下哪种说法不正确

- A. 是一种神经症
- B. 有持久的担心或相信各种躯体症状的优势观念
- C. 躯体症状被认为是心理冲突和个性倾向所致
- D. 常伴有焦虑或抑郁情绪
- E. 常伴有妄想

正确答案：E 您选择的答案：

第36题 下列关于神经症的诊断不正确的是

- A. 有恐惧、焦虑、疑病、神经衰弱症状
- B. 有社会功能受损或无法摆脱的精神痛苦
- C. 排除精神分裂症、偏执性精神病、心境障碍等
- D. 符合症状标准至少1个月
- E. 主动求医

正确答案：D 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第37题 女性，35岁，公司职员，2年来害怕坐电梯，进入电梯后即出现心慌、紧张、出汗等不适感，但能控制情绪。近1年来，竭力避免接触电梯，宁愿徒步上11层楼，此后发展到不敢单独乘公共汽车，不敢去浴室，甚至害怕独处，该病人可能是

- A. 焦虑症
- B. 强迫症
- C. 疑病症
- D. 神经衰弱
- E. 场所恐怖症

正确答案：E 您选择的答案：

第38题 女性，32岁，患神经衰弱3月余，未经治疗，主要表现为头痛、失眠、脑力疲乏、精神易兴奋，应选择下列哪种药物进行治疗

- A. 安定
- B. 氯氮平
- C. 阿米替林
- D. 氯丙咪嗪
- E. 氯丙嗪

正确答案：A 您选择的答案：

第39题 男性，30岁，父亲在2年前因胃癌去世。此后常感上腹部隐痛不适，但饮食正常。因怀疑上腹部脏器恶性病变，反复在医院行相关检查，均无异常发现，医生多次解释仍不能消除其疑虑，继续到各地求医，该病人的诊断考虑

是

- A. 强迫症
- B. 焦虑症
- C. 精神分裂症
- D. 疑病症
- E. 神经衰弱

正确答案：D 您选择的答案：

第40题 女性，55岁，农村妇女，家境较差。一日在马路上不慎被车撞倒，当时无昏迷等症状，去当地医院住院诊治并未发现异常，出院时家人无意将住院结算单放于床头。出院后病人像变了个人，白天不做家务，站在路边，称找肇事汽车，喃喃自语，不认识家人，或哭泣或大发脾气，该患者应诊断为

- A. 癔症
- B. 焦虑症
- C. 抑郁症
- D. 心因性精神障碍
- E. 老年性痴呆

正确答案：A 您选择的答案：

第41题 男性，34岁，工人，近3个月来因工作劳累，出现失眠，情绪烦躁，焦虑不安，无故担心，同时感心慌、胸闷，体检无异常发现，查EKG、T3、T4、TSH无异常，该病人的诊断为

- A. 神经衰弱
- B. 焦虑症
- C. 抑郁发作
- D. 疑病症
- E. 恶劣心境

正确答案：B 您选择的答案：

第42题 女性，26岁，已婚。一周前因生气而出现心情不佳，四肢发麻，抽动、双下肢瘫痪，但无神经系统损害的特征，该病人可能的诊断是

- A. 神经衰弱
- B. 抑郁症
- C. 反应性精神障碍
- D. 癫痫
- E. 癔症性躯体障碍

正确答案：E 您选择的答案：

第43题 男性，50岁。近年来经常无故焦虑、担心，伴有前胸不适感，夜间经常失眠，虽经多项检查，但均未发现有阳性结果，对此最适合的治疗是

- A. 抗焦虑药物治疗
- B. 抗精神病药物治疗
- C. 心理治疗
- D. 抗焦虑药物+心理治疗
- E. 抗精神病药物+心理治疗

正确答案：D 您选择的答案：

第44题 男性，40岁，1年前提拔到领导岗位，近半年出现脑力活动效率明显下降，体力易疲劳，有时回忆和联想增多且控制不住，兴奋伴有不快感，但无言语运动增多，易激惹，肢体肌肉酸痛，醒后感到不解乏，不愿上班。最可能是患有

- A. 躁狂症
- B. 焦虑症
- C. 神经衰弱
- D. 抑郁症
- E. 恐怖症

正确答案：C 您选择的答案：

第45题 女性，18岁，高中学生，长期以来感头昏脑胀，学习困难，注意力不易集中，精神易疲劳，经长时间休息，不能消除疲劳感，当参加娱乐活动时，疲劳迅速改善，该病人的诊断最可能是

- A. 抑郁发作
- B. 神经衰弱
- C. 焦虑症
- D. 人格障碍
- E. 癔症

正确答案：B 您选择的答案：

第46题 女性，32岁，患神经衰弱近1年，未治疗，现来诊，应首先选择下列哪种药物

- A. 抗焦虑药
- B. 抗抑郁药
- C. 抗躁狂药
- D. 抗精神病药
- E. 催眠药

正确答案：A 您选择的答案：

第47题 男性，38岁，2周前在人群中突然感到呼吸困难，四肢发麻，伴喉部阻塞感，有濒死感，感心脏停跳遂大声呼救，EKG及心脏、肺部检查虽无异常，但不能消除余悸，该病人最可能的诊断是

- A. 广泛性焦虑症
- B. 恐怖症
- C. 疑病症
- D. 急性惊恐发作
- E. 神经衰弱

正确答案：D 您选择的答案：

第48题 女性，19岁，学生。近1年来经常脑内反复思考问题，如做数学题时，反复核对答案，明知不对，但又无法控制，最可能的诊断是

- A. 神经衰弱
- B. 焦虑症
- C. 癔症
- D. 强迫症
- E. 精神分裂症

正确答案：D 您选择的答案：

第49题 女性，22岁，1年前开始复习准备报考研究生，近半年出现没有精力，脑力迟钝，注意力不集中，记忆力差，心情紧张而不能松弛，易激惹，有时感觉头痛、乏力，入睡困难，最近一月加重。最可能的诊断是

- A. 抑郁症
- B. 焦虑症
- C. 恐怖症
- D. 强迫症
- E. 神经衰弱

正确答案：E 您选择的答案：

第50题 女性，40岁。朋友患肝炎后，一年来总觉得自己的肝区疼痛、恶心、食欲减退，去多家医院重复检查肝功能指标均为正常，经B超、腹部CT检查也无异常，但患者总觉得不适而苦恼，怀疑患了严重的疾病。该患者的可能诊断是

- A. 强迫症
- B. 神经症
- C. 疑病症
- D. 焦虑症
- E. 精神分裂症

正确答案：C 您选择的答案：

三、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第51-53题

女性，35岁。近半年因患焦虑症间断服用地西泮类药物，目前症状改善

1. 该病人需维持多长时间后逐渐停药

- A. 2~6周
- B. 2~4周
- C. 6~8周
- D. 8~10周
- E. 10~12周

2. 以防症状反跳，停药过程不应短于

- A. 6周
- B. 2周
- C. 4周
- D. 8周
- E. 12周

3. 该病人如长时间服用地西泮类药物，最常见的副反应是

- A. 反应慢
- B. 成瘾性
- C. 嗜睡
- D. 头晕
- E. 记忆力差

正确答案：ABB 您选择的答案：

第54-55题

女，32岁，初中文化，村干部，已婚。因绝育术后双下肢无力，不能行走2年之主诉入院。入院后神经系统检查无定位体征

1. 该病人最可能的诊断是

- A. 情感性精神病
- B. 癔症转换障碍
- C. 抑郁症
- D. 周围神经疾病
- E. 脑器质性精神障碍

2. 该病人治疗应首选

- A. 心理治疗
- B. 抗焦虑药治疗
- C. 抗抑郁药物治疗
- D. 支持治疗
- E. 神经营养药物治疗

正确答案：BA 您选择的答案：

第56-59题

男性，26岁，无明显诱因出现担心门未锁好、煤气未关好，需反复检查，方可离去，为此影响生活、工作。

1. 这是一种什么症状

- A. 躁狂症状
- B. 牵连观念
- C. 焦虑症状
- D. 强迫症状
- E. 强制性思维

2. 这种症状常见于哪种疾病

- A. 精神分裂症早期
- B. 偏执性精神病
- C. 广泛性焦虑
- D. 强迫症
- E. 恐惧症

3. 这类症状常可用什么方法治疗

- A. 心理治疗
- B. 抗抑郁药物+心理治疗
- C. 巴抗精神病药+心理治疗
- D. ECT治疗
- E. 苯二氮草类治疗

4. 病人数周后称, "这是为了防止有人捉弄我", "这是自我防卫的需要", 并认为自己所作所为完全合理, 此时要考虑哪种疾病

- A. 情感性精神病
- B. 精神分裂症
- C. 偏执性精神障碍
- D. 强迫症
- E. 脑器质性精神障碍

正确答案: DDBB 您选择的答案:

第60-62题

男性, 18岁, 学生, 近1年来出现反复洗手, 每次洗手时间可达30分钟, 对做过的题目不放心, 反复检查, 以致耽搁考试时间, 明知无需如此, 却不能自控, 为此苦恼不堪, 当被阻止其洗手或检查时, 即出现烦躁不安。

1. 该病人的诊断考虑

- A. 神经衰弱
- B. 精神分裂症
- C. 强迫症
- D. 焦虑症
- E. 躁狂发作

2. 该病人的症状属于

- A. 强迫性观念、强迫性动作
- B. 广泛性焦虑
- C. 情绪不稳定
- D. 强制性思维
- E. 被动体验

3. 该病人最佳治疗方案为

- A. 说服、教育
- B. 心理治疗+氯米帕明
- C. 生物反馈治疗
- D. 小剂量氯丙嗪
- E. 安定(地西洋)

正确答案: CAB 您选择的答案:

四、B1型题: 以下提供若干组考题, 每组考题共用在前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第63-64题

- A. 恐惧症
- B. 急性焦虑发作
- C. 反应性抑郁
- D. 躯体形式障碍
- E. 癔症

1. 女性30岁, 两年来常感到躯体不适, 嗝气、反酸、恶心, 四肢不固定部位疼痛, 气短、胸闷、躯体及多项实验室检查均无异常发现。该病人可能的诊断是

2. 男性, 16岁。在与同学争吵以后表现为强烈恐惧, 并伴有出汗、面色苍白、震颤、心跳加快、呼吸加快、气透不过来的感觉。该病人可能的诊断是

正确答案: DB 您选择的答案:

第65-67题

- A. 强迫观念
- B. 强迫行为
- C. 惊恐障碍
- D. 强制性思维
- E. 被害妄想

1. 患者出现不可自控的反复数建筑的玻璃, 若出现漏数, 会重新计数, 此症状属于

2. 患者感到有大量的不受自我意志支配的联想涌现, 有种被强行塞入脑中的感受。此症状属于

3. 在安全环境下, 患者感到一种突如其来的惊恐体验, 有濒死感, 可伴有呼吸困难, 四肢麻木, 全身无力。此病情属于

正确答案: BDC 您选择的答案:

习题集 精神病学 躯体疾病所致精神障碍

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 诊断躯体疾病所致精神障碍的依据是

- A．明确有躯体疾病的依据
- B．躯体疾病与精神障碍在病情转归上，有时间上的密切关联
- C．存在功能性精神障碍的症状
- D．排除遗传、环境等因素对该病的影响
- E．以上均是

正确答案：E 您选择的答案：

第2题 症状性精神病最特征性症状是

- A 幻觉
- B 失语症
- C 不同程度的意识障碍
- D 被害妄想
- E 智能障碍

正确答案：C 您选择的答案：

第3题 躯体疾病所致精神障碍的精神症状，除了

- A 脑衰弱综合征
- B 急性脑病综合征
- C 精神自动综合征
- D 慢性脑病综合征
- E 情感障碍

正确答案：C 您选择的答案：

第4题 关于急性脑病综合征的意识障碍表现，错误的是

- A 错觉
- B 幻觉
- C 被害妄想
- D 关系妄想
- E 逻辑障碍

正确答案：D 您选择的答案：

第5题 躯体疾病所致精神障碍一般具有以下临床特点，但除外

- A．精神障碍与原发的躯体疾病的病情在程度上有平行关系
- B．精神障碍与原发的躯体疾病在时间上常有先后关系
- C．精神障碍有独特症状
- D．治疗原发疾病及处理精神障碍可使精神症状好转
- E．躯体疾病常引起意识障碍，慢性躯体疾病常引起智能障碍和人格改变

正确答案：C 您选择的答案：

第6题 躯体疾病所致的精神障碍不包括下列哪种疾病

- A．营养代谢疾病
- B．内分泌疾病
- C．感染
- D．心脏病
- E．颅内肿瘤

正确答案：E 您选择的答案：

第7题 躯体疾病所致精神障碍的共同特点，除了

- A 精神症状多发于躯体疾病高峰期
- B 躯体疾病严重时，精神症状明显
- C 精神症状随躯体疾病好转而减轻
- D 精神症状多具有昼重夜轻的波动性
- E 躯体和(或)神经系统有病理体征及实验室的阳性所见

正确答案：D 您选择的答案：

第8题 男性，甲状腺功能减退并伴有幻觉妄想，使用抗精神病药物治疗，最好应用以下哪种药物

- A．利培酮
- B．氯丙嗪
- C．多塞平
- D．地西泮
- E．氯氮平

正确答案：A 您选择的答案：

第9题 躯体疾病所致精神障碍处理原则中，最重要的是

- A．积极治疗原发的躯体疾病
- B．支持治疗
- C．加强护理
- D．大剂量的抗精神病药
- E．心理治疗

正确答案：A 您选择的答案：

第10题 下列哪项不是躯体疾病所致精神障碍的发病机制

- A．毒素作用

- B. 神经递质改变
- C. 酸碱平衡紊乱
- D. 能量供应不足
- E. 原发性颅脑功能障碍

正确答案：E 您选择的答案：

第11题 甲状腺危象时伴精神障碍最主要的症状是

- A. 意识障碍
- B. 妄想
- C. 抑郁
- D. 焦虑紧张
- E. 思维迟缓

正确答案：A 您选择的答案：

第12题 关于甲状腺功能减退伴精神障碍，以下哪种说法不正确

- A. 婴幼儿期患病可导致呆小病
- B. 儿童期发病一般不导致智力发育低下
- C. 成年发病主要表现为记忆减退、抑郁
- D. 发展到粘液水肿时，可伴有妄想及幻觉
- E. 具有甲状腺功能减退的临床表现和实验室阳性发现

正确答案：B 您选择的答案：

第13题 躯体疾病所致精神障碍中，精神药物使用原则

- A. 起始量应小，逐渐加量，症状稳定时，逐渐减量
- B. 起始量应小，快速增至治疗量后，维持不变
- C. 起始量应小，快速增至治疗量后，再逐渐减量
- D. 起始量应大，症状稳定后逐渐减量
- E. 起始量应大，症状稳定后，快速减量

正确答案：A 您选择的答案：

第14题 急性脑病综合征最基本的症状有

- A. 意识清晰度下降
- B. 动作紊乱
- C. 兴奋喊叫
- D. 谵语
- E. 思维不连贯

正确答案：A 您选择的答案：

第15题 最常见的急性脑病综合征的意识障碍是

- A. 嗜睡
- B. 昏睡
- C. 昏迷
- D. 意识模糊
- E. 谵妄状态

正确答案：E 您选择的答案：

第16题 女性，空腹血糖高，临床诊断糖尿病所致精神障碍，症状表现以抑郁为主，这时治疗措施应为

- A. 控制糖尿病
- B. 控制糖尿病+选择性5-羟色胺再摄取抑制剂(SSRI)
- C. 选择性5-羟色胺再摄取抑制剂(SS-RI)单独使用
- D. 三环类抗抑郁药物单独使用
- E. 对症治疗+心理治疗

正确答案：B 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第17题 女性，34岁，一年来，情绪激动、失眠、心悸、疲乏、消瘦、话多、动作多、注意力不集中、突眼，诊断为甲状腺功能亢进所致精神障碍，其治疗原则哪项是错误的

- A. 积极治疗原发病
- B. 控制甲状腺功能亢进
- C. 防止感染
- D. 禁用精神药物
- E. 心理治疗

正确答案：D 您选择的答案：

第18题 女性，46岁，全身乏力，嗜睡，少言，动作缓慢，畏寒，体温低于正常，皮肤干燥、增厚、粗糙，呈非凹陷性浮肿，智力、记忆力减退，听觉减退，步态不稳，共济失调，幻觉、妄想。该患者诊断为甲状腺功能低下所致精神障碍，其治疗措施哪项是错误的

- A. 甲状腺素治疗
- B. 防止感染
- C. 足量抗精神病药物
- D. 慎用催眠药
- E. 慎用麻醉药

正确答案：C 您选择的答案：

第19题 女性，42岁，十年来，畏寒、少汗、乏力、纳差、嗓音粗、月经不调、便秘、少言、少动、表情淡漠，近来出现面色苍白蜡黄，眼睑、颊部虚肿、呆钝、愚蠢，一过性幻视，该病人最可能的诊断是

- A. 甲状腺功能低下所致精神障碍

B 甲状腺功能亢进所致精神障碍
C 肾上腺皮质功能减退所致精神障碍
D 肾上腺皮质功能亢进所致精神障碍
E 精神分裂症
正确答案：A 您选择的答案：

第20题 女性，26岁，分娩时大出血，出现呆滞、情感淡漠、缺乏主动性、言语减少、思维迟钝、闭经、乳房萎缩、阴毛和腋毛脱落，诊断为脑垂体前叶功能减退所致精神障碍，该病人治疗以下哪项是错误的

A 肾上腺皮质激素
B 甲状腺素
C 雌激素
D 慎用奋乃静
E 慎用氯丙嗪
正确答案：E 您选择的答案：

第21题 女性，28岁，以往体健，性格内向，近1年来怕热、心慌，食量明显增加，体重减轻，月经紊乱，诊断为甲状腺功能亢进症。经治疗后，病情好转。近2周来出现失眠，烦躁易怒，听不进相反意见，言语增多，诊断考虑为

A．躁狂发作
B．内分泌紊乱所致精神障碍
C．精神分裂症
D．分裂样精神障碍
E．反应性精神障碍
正确答案：B 您选择的答案：

第22题 女性，13岁，满月脸、多血质外貌、向心性肥胖，皮肤紫纹、痤疮、高血钾、情绪不稳定、烦躁、易激惹、幻觉状态、四肢肌肉无力、震颤，该病的诊断最可能是

A 精神分裂症
B 神经症
C 肾上腺皮质功能减退所致精神障碍
D 肾上腺皮质功能亢进所致精神障碍
E 甲状腺功能亢进所致精神障碍
正确答案：D 您选择的答案：

第23题 男性，50岁，因受凉后出现咳嗽，咳痰，高热2天，诊断左下肺炎，住院当日上午，出现情绪烦躁，言语减少，夜间突然惊恐不安，双手上举，自言自语，不配合医生体检，测体温39.8℃，根据患者临床症状应考虑的临床初步诊断是

A．反应性精神病
B．焦虑性神经症
C．精神分裂症
D．躯体感染所致精神障碍
E．高热惊厥
正确答案：D 您选择的答案：

三、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第24-26题

女性，33岁，一年来乏力，发热，关节痛，面颊部有蝶形红斑，口腔鼻腔粘膜溃疡为无痛性，二个月来，病人兴奋、躁动，幻听、幻视，被害妄想，关系妄想

1．以下哪项检查对诊断最有帮助

A 血常规
B Coombs试验
C 抗核抗体
D 血沉
E 抗“O”

2．以下哪项是主要治疗措施

A 肾上腺皮质激素
B 阿司匹林
C 环磷酰胺
D 硫唑嘌呤
E 氯喹

3．以下哪类药物易诱发红斑狼疮样反应，除了

A 抗生素
B 非甾体类抗炎药
C 抗结核药
D 磺胺类
E 抗精神病药

正确答案：CAE 您选择的答案：

第27-29题

患者女性，低热不退，临床诊断为系统性红斑狼疮所致精神障碍，临床表现以抑郁为主。而临床上各项躯体检查指标表明躯体疾病较为严重，且既往有青光眼病史

1．该病人治疗的重点是

A．治疗系统性红斑狼疮
B．支持治疗
C．控制精神症状
D．三环类抗抑郁药物单独使用
E．对症治疗+心理治疗

2．如治疗抑郁情绪应首选哪种药物

- A. 氟西汀
 - B. 阿米替林
 - C. 艾司唑仑
 - D. 氯丙咪嗪
 - E. 马普替林
3. 禁用哪类药物
- A. 选择性5-羟色胺再摄取抑制剂(SSRI)
 - B. 三环类抗抑郁药物
 - C. 艾司唑仑
 - D. 米氮平
 - E. 文拉法新

正确答案：AAB 您选择的答案：

第30-32题

男性，65岁，既往有高血压病史约5年，血压控制不稳定，饮酒史30年，3~4两/日。某日中午饮2两白酒后，突然出现口齿不清，瘫软在地，送往医院途中，情绪烦躁，神情恐惧，要拔除输液管，不能辨认亲人。

1. 根据病情，最可能的诊断是
- A. 癔症
 - B. 焦虑性神经症
 - C. 脑血管病所致精神障碍
 - D. 分裂样精神障碍
 - E. 急性酒精中毒
2. 首选辅助检查为
- A. 颅脑CT
 - B. 血液酒精浓度测定
 - C. 血淀粉酶
 - D. 脑脊液常规、生化
 - E. 脑电图
3. 首要处理方案是
- A. 暗示治疗
 - B. 肌注安定(地西洋)10mg
 - C. 静脉快速滴注20%甘露醇
 - D. 肌注氟哌啶醇、东莨菪碱混合液
 - E. 补充大剂量维生素，并输液促排泄

正确答案：CAC 您选择的答案：

第33-35题

男性，35岁，三年来多尿，口渴，多饮，多食，疲倦无力，注意力不集中，失眠，情绪低落，少言、少动，主动性差，反应迟钝，心烦，紧张。一周来兴奋不安，躁动，语无伦次而住院

1. 下列哪项检查对诊断最有帮助
- A. 血常规
 - B. 尿常规
 - C. 血糖测定
 - D. T3、T4、TSH测定
 - E. ACTH兴奋试验
2. 该患者最可能的诊断是
- A. 糖尿病所致精神障碍
 - B. 甲状腺功能亢进所致精神障碍
 - C. 肾上腺皮质功能亢进所致精神障碍
 - D. 甲状腺功能减退所致精神障碍
 - E. 肾上腺皮质功能减退所致精神障碍
3. 该患者的治疗原则是
- A. 应用肾上腺皮质激素
 - B. 甲状腺素
 - C. 雌激素
 - D. 控制糖尿病
 - E. 控制精神症状

正确答案：CAD 您选择的答案：

第36-37题

女性，29岁，分娩时大出血，出现淡漠、呆滞、话少、思维迟钝、活动减少，闭经，乳房萎缩，阴毛、腋毛脱落，诊断为席汉病(Sheehan's disease)

1. 该患者的精神障碍为
- A. 脑垂体前叶功能亢进所致精神障碍
 - B. 脑垂体前叶功能减退所致精神障碍
 - C. 肾上腺皮质功能亢进所致精神障碍
 - D. 肾上腺皮质功能减退所致精神障碍
 - E. 甲状腺功能减退所致精神障碍
2. 该患者的治疗哪项是主要的
- A. 慎用安定
 - B. 慎用奋乃静
 - C. 禁用氯丙咪嗪
 - D. 激素替代法
 - E. 防止感染

正确答案：BD 您选择的答案：

习题集 精神病学 情感性精神障碍

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 抑郁患者的木僵哪项是错误的

- A 面无表情
- B 不吃不喝
- C 意识障碍
- D 对体内外刺激无反应
- E 呆坐呆立

正确答案：C 您选择的答案：

第2题 抑郁发作时，一日之内的规律是

- A 昼轻夜重
- B 昼重夜轻
- C 中午起逐渐加重
- D 中午最严重以后减轻
- E 半夜最重

正确答案：B 您选择的答案：

第3题 老年躁狂发作患者的情感特点是

- A 心境高涨
- B 情绪不稳
- C 欣快感
- D 易激惹
- E 情感倒错

正确答案：D 您选择的答案：

第4题 三环类抗抑郁药的副作用主要是

- A 锥体外系症状
- B 过敏反应
- C 心血管副作用
- D 粒细胞减少
- E 失眠

正确答案：C 您选择的答案：

第5题 CCMD-3中抑郁发作的病程标准是

- A 符合症状标准和严重标准至少已持续6月
- B 符合症状标准和严重标准至少已持续2周
- C 符合症状标准和严重标准至少已持续3月
- D 符合症状标准和严重标准至少已持续1月
- E 符合症状标准和严重标准至少已持续2月

正确答案：B 您选择的答案：

第6题 对抑郁性木僵病人，首选的治疗方法是

- A 心理治疗
- B 电抽搐治疗
- C 三环类抗抑郁药物(TCAs)
- D SSRI s
- E MAOI s

正确答案：B 您选择的答案：

第7题 抑郁症的核心症状是

- A 情绪低落
- B 思维贫乏
- C 情绪高涨
- D 幻觉
- E 入睡困难

正确答案：A 您选择的答案：

第8题 关于心境障碍的特点，以下哪项描述不正确

- A 显著而持久的情感或心境改变
- B 可伴有幻觉、妄想
- C 有反复发作的倾向
- D 可伴相应的认知和行为改变
- E 反复发作，大多数不能缓解

正确答案：E 您选择的答案：

第9题 老年抑郁症患者除抑郁心境外，另一种突出的情绪是

- A 情绪不稳
- B 情感倒错
- C 情感淡漠
- D 焦虑
- E 欣快感

正确答案：D 您选择的答案：

第10题 躁狂发作病人活动增多表现，除了哪项

- A 整日忙碌

- B 好管闲事
- C 引人注意
- D 生活节俭
- E 行为轻浮

正确答案：D 您选择的答案：

第11题 有关抑郁症的发病机制，以下哪种说法是正确的

- A．抑郁发作时有5-羟色胺升高
- B．抑郁发作时有5-羟色胺降低
- C．抑郁发作时有去甲肾上腺素升高
- D．抑郁发作时有多巴胺代谢产物降低
- E．抑郁发作有多巴胺代谢产物升高

正确答案：B 您选择的答案：

第12题 关于恶劣心境障碍的主要特点，以下哪项是错误的

- A．发病以心因为主，家族遗传史不明显
- B．晨重夜轻的节律改变不明显
- C．可伴有精神病性症状
- D．病期冗长，至少持续2年
- E．病前可有人格障碍基础

正确答案：C 您选择的答案：

第13题 下列哪种症状有助于抑郁发作的诊断

- A．智能障碍
- B．晨重暮轻
- C．遗忘综合征
- D．晨轻暮重
- E．意识障碍

正确答案：B 您选择的答案：

第14题 抑郁症最常见的妄想有

- A．罪恶妄想与疑病妄想
- B．物理影响妄想
- C．非血统妄想
- D．钟情妄想
- E．被控制感

正确答案：A 您选择的答案：

第15题 对于有严重自杀企图，使用抗抑郁药治疗无效的抑郁发作患者，可采用何种有效治疗措施

- A．心理治疗
- B．生物反馈治疗
- C．电休克治疗
- D．胰岛素昏迷治疗
- E．加用抗精神病药物

正确答案：C 您选择的答案：

第16题 关于继发性抑郁障碍的特点，以下哪个特点是错误的

- A．有明确的器质性疾病史
- B．可出现意识障碍
- C．可出现遗忘综合征及智能障碍
- D．心境障碍的症状随原发疾病的病情消长而波动
- E．既往曾有心境障碍的发作史

正确答案：E 您选择的答案：

第17题 躁狂发作的情感障碍特点是

- A．情绪紧张
- B．情感平淡
- C．情感幼稚
- D．情感高涨
- E．情感倒错

正确答案：D 您选择的答案：

第18题 抑郁症的主要临床表现是

- A．情绪低落、思维迟缓、意志活动减退
- B．情绪低落、思维贫乏、意志活动减退
- C．情绪淡漠、思维贫乏、意志活动减退
- D．情绪高涨、思维加快、意志活动增强
- E．情绪低落、思维迟缓、意志活动增强

正确答案：A 您选择的答案：

第19题 躁狂发作病人的躯体症状最不可能是

- A 面色红润
- B 躯体不适
- C 体重减轻
- D 心率加快
- E 便秘

正确答案：B 您选择的答案：

第20题 以下哪种方法是不适合抑郁症的心理治疗

- A．支持疗法

- B. 认知治疗
- C. 行为治疗
- D. 婚姻及家庭治疗
- E. 厌恶疗法

正确答案：E 您选择的答案：

第21题 通常三环类抗抑郁药物的每天治疗剂量为

- A. 50mg
- B. 50~70mg
- C. 75~100mg
- D. 150~300mg
- E. 300~400mg

正确答案：D 您选择的答案：

第22题 下列抑郁发作典型症状，不包括哪项

- A. 抑郁心境
- B. 思维迟缓
- C. 思维内容障碍
- D. 音联意联
- E. 意志活动减退

正确答案：D 您选择的答案：

第23题 典型抑郁症有以下的特点

- A. 昼重夜轻
- B. 昼轻夜重
- C. 昼夜无变化
- D. 上午重下午轻
- E. 下午重上午轻

正确答案：A 您选择的答案：

第24题 抑郁发作睡眠障碍的特点是

- A. 入睡困难
- B. 早醒
- C. 易惊醒
- D. 多梦
- E. 睡眠过多

正确答案：B 您选择的答案：

第25题 治疗抑郁发作的常用药物是

- A. 安定(地西洋)
- B. 苯丙胺
- C. 丙咪嗪
- D. 氯丙嗪
- E. 奥氮平

正确答案：C 您选择的答案：

第26题 情感性障碍的鉴别诊断，不包括下述哪项

- A. 精神分裂症
- B. 躯体疾病所致精神障碍
- C. 药物所致精神障碍
- D. 精神发育迟滞
- E. 脑器质性精神障碍

正确答案：D 您选择的答案：

第27题 抑郁发作的临床症状主要是

- A. 情感低落，思维迟缓，意志活动减退
- B. 情感淡漠，思维迟缓，意志活动减退
- C. 情感不稳，思维贫乏，意志活动正常
- D. 情感低落，思维贫乏，意志活动减退
- E. 情感淡漠，思维破裂，意志活动正常

正确答案：A 您选择的答案：

第28题 下列关于躁狂症的描述，哪项不正确

- A. 具有感染力
- B. 可情绪反应不稳定
- C. 注意力增强，持久
- D. 病前可有乏力，失眠等症状
- E. 起病可急性或亚急性

正确答案：C 您选择的答案：

第29题 治疗躁狂发作的常用药物是

- A. 安定(地西洋)
- B. 碳酸锂
- C. 鲁米那
- D. 阿米替林
- E. 丁螺环酮

正确答案：B 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第30题 男性，30岁，职员。无明显诱因下出现情绪低落、兴趣减退、思维迟缓、早醒。诊断为抑郁症，给予三环类抗抑郁药物治疗。常用的三环类抗抑郁药物有以下几种，但除外

- A．阿米替林
- B．多塞平
- C．丙咪嗪
- D．氯丙咪嗪
- E．吗氯贝胺

正确答案：E 您选择的答案：

第31题 男性，31岁，因诊断抑郁发作，给予三环类抗抑郁药连续治疗3个月，最常见的药物不良反应是

- A．肝损害
- B．锥体外系反应
- C．粒细胞缺乏
- D．口干、视物模糊、心律失常
- E．高热、肠麻痹

正确答案：D 您选择的答案：

第32题 女性，40岁。因诊断为抑郁症而给予三环类抗抑郁药物治疗，该类药物最多见的副作用是

- A．口干、便秘、心律失常
- B．肝损害
- C．皮疹
- D．锥体外系症状
- E．意识障碍

正确答案：A 您选择的答案：

第33题 女性，23岁，因恋爱受挫，近1个月来失眠，情绪低落，整日闷闷不乐，称"活着是件痛苦的事"，不思饮食，不注意仪容，不愿外出活动，时常流泪，认为自己能力低，脑子不灵活，又感前途渺茫，没有任何希望，曾服大量安定片自杀。体检、神经系统无异常，该病人的诊断为

- A．精神分裂症
- B．恶劣心境
- C．心理生理障碍
- D．神经症
- E．抑郁发作

正确答案：E 您选择的答案：

第34题 病人，女性，20岁。三周来因考试失败而出现情绪低落，兴趣缺乏，精力明显下降，易疲劳，言语动作减少，自觉"脑子笨，没以前聪明，像一块木头，世界看上去犹如灰色一片"。伴早醒，食欲下降、心烦。悲观失望，多次欲自杀而未遂。你认为该病人患有什么疾病

- A．神经衰弱
- B．抑郁症
- C．焦虑性神经症
- D．恐怖性神经症
- E．强迫症

正确答案：B 您选择的答案：

第35题 男性，40岁。因单位效益差而下岗在家，三个月后出现头疼、失眠、情绪低落、思维迟缓，责怪自己能力低，内疚，自觉连累了家人，曾有自伤行为。体检及神经系统检查未发现阳性体征。该病人诊断为抑郁症，下列哪种治疗方法不正确

- A．心理治疗
- B．改良电抽搐治疗
- C．氟西汀
- D．多塞平
- E．奋乃静

正确答案：E 您选择的答案：

第36题 女性，30岁。因婚姻问题出现情绪低落，对生活失去信心，同时不能很好照顾家庭，伴失眠，继而出现消极而求医，诊断为抑郁症，下面哪些症状不会为患者所有

- A．兴趣缺乏
- B．言语动作迟缓
- C．自责和厌世感
- D．睡眠障碍
- E．思维散漫

正确答案：E 您选择的答案：

第37题 女性，49岁，近半年来情绪低落，对任何事失去兴趣，自感体力不支，头昏，头痛，时常对家人表示愧疚，认为自己拖累了家庭，不如一死了之，曾打开煤气企图自杀，被制止后，又采取割腕自杀行为，认为只有这样才能洗清罪过，体检、神经系统无明显异常，该病人的诊断可能为

- A．恶劣心境
- B．心因性精神障碍
- C．神经衰弱
- D．抑郁发作
- E．焦虑症

正确答案：D 您选择的答案：

第38题 男性，68岁，以往性格内向，近1年来出现睡眠减少，爱管闲事，整日忙碌，兴高采烈，喜欢穿红色外衣，夸耀自己有用不完的财富，并称第三世界的贫民都是他救济的，脾气暴躁，狂妄自大，若不附和其观点即出现毁物甚至攻击行为。体检血压轻度升高，有慢性支气管炎病史10年余，神经系统未见异常，此病人的诊断可能为

- A．精神分裂症

- B. 躯体疾病所致精神障碍
- C. 老年期躁狂发作
- D. 脑器质性精神障碍
- E. 神经衰弱

正确答案：C 您选择的答案：

三、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第39-41题

女性，42岁，二个月来，情绪低落，兴趣索然，自觉“高兴不起来”，生不如死，“自己的脑子不灵了”，“像是生了锈的机器”，认为自己成了家庭和社会的累赘，“成了废物”，有胸闷、心悸、心慌的症状，自认为有严重心脏病，不能治愈。主动性言语及活动明显减少，生活被动，愿独处。曾多次自杀未遂，睡眠不好，早醒

1. 该病人的精神症状不包括

- A 情绪低落
- B 思维迟缓
- C 自责自罪观念
- D 夸大妄想
- E 意志活动减退

2. 该病人的思维表现不包括

- A 思维云集
- B 思维迟缓
- C 自杀企图
- D 疑病观念
- E 自责自罪观念

3. 该病人首要注意的问题是防止

- A 活动少而引起的合并感染
- B 拒食导致营养不良
- C 自杀行为
- D 冲动伤人
- E 症状波动的规律

正确答案：DAC 您选择的答案：

第42-45题

男性，26岁，一个月来，兴高采烈，话多，自觉思维敏捷“脑子特别灵”，“自己有超人才能”，整日忙碌不停，精力旺盛，爱表现自己，举止轻浮，好接近异性，食欲亢进，体重减轻，睡眠量减少，无疲倦感

1. 其精神症状不包括哪项

- A 心境高涨
- B 思维奔逸
- C 罪恶妄想
- D 夸大妄想
- E 活动增多

2. 该病主要表现为

- A 一般无幻觉
- B 明显的思维联想松散
- C 紊乱性兴奋躁动
- D 协调的精神运动性兴奋
- E 行为轻浮

3. 该病人的典型症状不包括

- A 情感高涨
- B 思维形式障碍
- C 思维内容障碍
- D 活动增多
- E 意志减退

4. 该病人治疗的首选药是

- A 氯氮平
- B 碳酸锂
- C 氯丙嗪
- D 氟哌啶醇
- E 卡马西平

正确答案：CDEB 您选择的答案：

第46-47题

女性，30岁，1年来常感下腹胀痛，曾在多家医院检查无异常，但仍紧张不安，近半年出现闷闷不乐，早醒，对事物兴趣丧失，感到自己的身体状况越来越差，认为自己得了绝症，时常对着家人哭泣，认为自己没有能力抚养子女，不但连累了家庭，给领导带来麻烦，还成为社会的负担，只有一死才能解脱。体检及神经系统无异常。

1. 该病人的诊断考虑为

- A. 精神分裂症
- B. 疑病症
- C. 焦虑症
- D. 抑郁发作
- E. 神经衰弱

2. 该病人适宜的治疗药物为

- A. 氯丙嗪
- B. 硝基安定
- C. 丁螺环酮
- D. 氟西汀
- E. 谷维素

正确答案：DD 您选择的答案：

第48-50题

女性，25岁。半年来因找不到合适工作，渐起情绪不好，常背地里哭泣，问其何故，说自己得罪了不少人，还说对不起父母养育之恩，给父母写遗书。整天愁眉苦脸，不愿出门，对任何事都不感兴趣，睡眠差。体检及神经系统检查未见异常。

1. 你考虑该病人诊断为
 - A. 神经衰弱
 - B. 反应性精神障碍
 - C. 精神分裂症单纯型
 - D. 抑郁症
 - E. 人格障碍
2. 根据你的诊断，用什么药物控制病情
 - A. 氯丙嗪
 - B. 奋乃静
 - C. 帕罗西汀
 - D. 氯氮平
 - E. 吡拉西坦
3. 该药物的见效时间为
 - A. 1周
 - B. 1~2周
 - C. 2~4周
 - D. 5周
 - E. 6周

正确答案：DCC 您选择的答案：

四、A4型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第51-54题

女性，53岁，10年前出现情绪低落与情感高涨交替出现，情绪低落时表现为早醒、闷闷不乐、不思饮食，对事物失去兴趣，足不出户，轻生念头明显，持续2~3个月后，突然转为话多，兴奋，整日忙忙碌碌，四处购物，爱交际，自感精力充沛，才智过人，持续1个月后，再次转为情绪低落，如此反复。体检及神经系统无异常。

1. 该患者诊断考虑为
 - A. 躁狂发作
 - B. 抑郁发作
 - C. 精神分裂症
 - D. 双相情感性精神障碍
 - E. 老年期抑郁症
2. 如果病人处于抑郁发作期，其适宜的治疗是
 - A. 舒必利
 - B. 安定(地西洋)
 - C. 阿米替林
 - D. 阿米替林及适量碳酸锂
 - E. 碳酸锂
3. 当病人服用碳酸锂时，做何种检查对监测血锂浓度有一定价值
 - A. 血常规
 - B. 肾功能
 - C. 心电图
 - D. 脑电图
 - E. 血沉
4. 碳酸锂早期不良反应表现为
 - A. 恶心呕吐，腹泻
 - B. 持续多尿，烦渴
 - C. 甲状腺肿大
 - D. 体重增加
 - E. 心电图低钾样改变

正确答案：DDDA 您选择的答案：

五、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第55-56题

- A. 情感淡漠
 - B. 抑郁状态
 - C. 痴呆状态
 - D. 脑衰弱综合征
 - E. 缄默状态
1. 意识清楚，记忆力差，生活自理能力下降，缺乏同情心，本能活动增多
2. 意识清楚，兴趣减退，思维迟缓、言语动作减少

正确答案：CB 您选择的答案：

第57-59题

- A. 环性心境障碍
 - B. 恶劣心境障碍
 - C. 双相障碍混合性发作
 - D. 抑郁发作
 - E. 躁狂发作
1. 持续心境低落，不符合任何一型抑郁的症状标准，同时无躁狂症状，病程至少2年

2. 心境高涨、低落反复交替出现,不符合躁狂或抑郁发作症状标准,病程至少2年
3. 以躁狂和抑郁症状迅速交替(数小时内)为特征,躁狂、抑郁均突出,至少持续2周
正确答案: BAC 您选择的答案:

第60-62题

A. 阻断D2受体
B. 使突触间隙的NA浓度下降
C. 去甲肾上腺素(NE)和5-羟色胺(5-HT)双重摄取抑制剂
D. 选择性5-羟色胺(5-HT)再摄取抑制剂
E. 单胺氧化酶抑制剂
1. 吗氯贝胺
2. 文拉法辛
3. 帕罗西汀
正确答案: ECD 您选择的答案:

习题集 精神病学 脑器质性疾病所致精神障碍

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 造成多发性梗死性痴呆(MID)的常见原因为

- A．颅内硬化动脉的血栓形成
- B．颅内动脉破裂出血
- C．颅外动脉的栓子
- D．颅外肿瘤转移栓子
- E．颅内肿瘤所致

正确答案：A 您选择的答案：

第2题 由于大脑局部区域损害，导致智能某方面障碍为

- A 全面痴呆
- B 心因性痴呆
- C 假性痴呆
- D 童样痴呆
- E 部分痴呆

正确答案：E 您选择的答案：

第3题 患者18岁之前，由于各种原因，造成大脑发育不良或受阻，智能发育停留在一定阶段，落后于同龄正常人群，社会适应不良

- A 痴呆
- B 精神发育迟滞
- C 遗忘
- D 错构
- E 虚构

正确答案：B 您选择的答案：

第4题 痴呆的主要特征是

- A．感知障碍
- B．记忆减退
- C．判断理解力下降
- D．不能自理生活
- E．缓慢出现的智能减退

正确答案：E 您选择的答案：

第5题 谵妄的特征是

- A．意识障碍
- B．感知障碍
- C．记忆障碍
- D．定向障碍
- E．以上都是

正确答案：E 您选择的答案：

第6题 老年性痴呆的病理学特征性诊断依据是

- A 脑神经细胞减少
- B 脑神经细胞缩小
- C 老年斑
- D 染色体溶解
- E 胶质细胞增生

正确答案：C 您选择的答案：

第7题 脑器质性精神障碍病理改变大多是由于

- A 脑肿瘤
- B 脑萎缩和变性
- C 脑代谢障碍
- D 脑中毒
- E 脑外伤

正确答案：B 您选择的答案：

第8题 下列哪种情况出现于癫痫性精神障碍发作时精神障碍

- A．自动症
- B．易激惹
- C．失眠
- D．人格改变
- E．极度抑郁

正确答案：A 您选择的答案：

第9题 血管性痴呆的特征是

- A．早期全面智能损害
- B．常伴错觉
- C．有阶段性波动，智能呈"岛状"损害
- D．早期人格明显损害
- E．定向障碍

正确答案：C 您选择的答案：

第10题 下列哪一项不是脑器质性精神障碍

A 神经系统阳性体征
B 脑病的病史
C 提示脑部疾病的物理化验异常
D 精神症状
E 明确的躯体疾病
正确答案：E 您选择的答案：

第11题 柯萨可夫综合征不可能出现的症状是
A 近记忆障碍
B 学习困难
C 虚构
D 智能基本正常
E 有意识障碍
正确答案：E 您选择的答案：

第12题 阿尔茨海默病属于
A 精神活性物质所致精神障碍
B 精神分裂症
C 神经症
D 人格障碍
E 脑器质性精神障碍
正确答案：E 您选择的答案：

第13题 不支持急性脑器质性精神障碍诊断的表现是
A 幻视
B 错觉
C 注意涣散
D 意识清晰
E 定向障碍
正确答案：D 您选择的答案：

第14题 下列属于阿尔茨海默病(AD)中度表现的是
A 容易遗忘新近发生的事情，可有焦虑情绪
B 学习困难，思维迟缓，生活能自理
C 忘记家人的名字，时常迷路。可出现错构、虚构
D 不知道自己的姓名，不认识亲人，出现神经系统受损症状
E 活动减少，语言功能丧失，生活完全不能自理
正确答案：C 您选择的答案：

第15题 关于痴呆的临床特点，最正确的是
A 是先天或大脑发育成熟以前由于各种致病因素，造成智力低下
B 老人儿童均可发生
C 多数病人意识不清晰
D 早期可表现为近记忆减退
E 常无器质性病变
正确答案：D 您选择的答案：

第16题 下列哪组疾病可引起痴呆
A 帕金森病，阿尔茨海默病，路易体痴呆
B 慢性硬膜下血肿，神经梅毒，脑外伤
C 甲状腺功能低下，高胰岛素血症，血卟啉病
D 一氧化碳中毒，酒精中毒，缺氧
E 以上均可
正确答案：E 您选择的答案：

第17题 阿尔茨海默病的病理特征以下哪种说法是不正确的
A 大脑皮质弥漫性萎缩
B 脑沟增宽
C 老年斑和神经元纤维缠结
D 脑室扩大
E 神经元气球样肿胀
正确答案：E 您选择的答案：

第18题 脑器质性精神障碍的高发年龄阶段是
A 老年
B 壮年
C 青年
D 少年
E 儿童
正确答案：A 您选择的答案：

第19题 由于大脑弥漫性器质性损害，导致的智能各方面障碍为
A 心因性痴呆
B 部分性痴呆
C 全面性痴呆
D 童样痴呆
E 假性痴呆
正确答案：C 您选择的答案：

第20题 下列哪项不属于脑器质性精神障碍

- A 脑炎伴发精神障碍
- B 老年痴呆
- C 脑血管病所致精神障碍
- D 躯体疾病所致精神障碍
- E 癫痫伴发精神障碍

正确答案：D 您选择的答案：

第21题 一个病人意识清晰，智能相对良好，但出现近事记忆障碍和在交谈中有虚构倾向，最可能的综合征是

- A. 谵妄综合征
- B. 慢性脑病综合征
- C. 急性脑病综合征
- D. 痴呆综合征
- E. 遗忘综合征

正确答案：E 您选择的答案：

第22题 枕叶肿瘤所致精神障碍的最特定的症状是

- A. 情感障碍
- B. 妄想
- C. 视幻觉
- D. 饮食异常
- E. 柯萨可夫综合征

正确答案：C 您选择的答案：

第23题 脑器质性精神症状的有无在于

- A 左侧大脑半球受累
- B 右侧大脑半球受累
- C 侧大脑半球受累
- D 大脑局部受累
- E 以上各项均可

正确答案：E 您选择的答案：

第24题 病人18岁以后由于各种原因所致的智能减退，称为

- A 痴呆
- B 遗忘
- C 精神发育迟滞
- D 虚构
- E 记忆减退

正确答案：A 您选择的答案：

第25题 急性脑病综合征的主要的精神障碍是

- A. 记忆障碍
- B. 思维障碍
- C. 人格障碍
- D. 意识障碍
- E. 情绪障碍

正确答案：D 您选择的答案：

第26题 关于阿尔茨海默病患者的死因，需除外的是

- A. 全身感染
- B. 肺炎
- C. 全身衰竭
- D. 记忆障碍
- E. 骨折

正确答案：D 您选择的答案：

第27题 下列属于脑外伤的急性精神障碍是

- A. 智能障碍
- B. 人格改变
- C. 脑震荡后综合征
- D. 意识障碍
- E. 脑外伤后精神病性症状

正确答案：D 您选择的答案：

第28题 关于遗忘综合征，下列哪种说法正确

- A. 一种选择性或局灶性认知功能障碍
- B. 一种广泛性认知功能障碍
- C. 一种半侧脑认知功能障碍
- D. 一种因深部加浅部脑受损而出现的认知功能障碍
- E. 一种严重的思维障碍

正确答案：A 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第29题 女性，66岁，近3年来无明显诱因下出现记忆力减退，将钱物分散收藏，事后不能回忆地点，对亲人漠不关心，不让孙子分享其糕点，病情最可能的诊断是

- A. 老年期精神病
- B. 血管性痴呆
- C. 阿尔茨海默病

- D. 情感障碍
E. 遗忘综合征

正确答案：C 您选择的答案：

第30题 男性，70岁，高中文化，患糖尿病，高血压多年，有脑卒中病史10多年，近2年来出现话多，常为重复话题，情绪不稳，计算力逐渐减退，有时不能算出100以内的减法，自觉记忆力下降明显，此病人最可能的诊断是

- A. 遗忘综合征
B. 阿尔茨海默病
C. 血管性痴呆
D. 假性痴呆
E. 意识障碍

正确答案：C 您选择的答案：

第31题 病人55岁，有高血压史10年伴高血脂史，近数月出现头痛、嗜睡并伴近事记忆障碍、易激惹，CT示脑部有大小不等

梗死小软化灶，伴有胶质细胞增生，形成小囊及稀疏区，下面哪个诊断正确

- A. 痴呆
B. 慢性脑病综合征
C. 早期阿尔茨海默病
D. 多发梗死性痴呆
E. 脑肿瘤所致精神障碍

正确答案：D 您选择的答案：

第32题 郭某，女，24岁，病人13岁时脑外伤昏迷一小时抢救脱险，此后性格有极大变化，易激惹，敏感多疑，20岁结婚后总怀疑丈夫有外遇，凡爱人和女同志接触，即怀疑有不正当关系。因怀疑爱人同事杨某是爱人的情妇，嫉妒不已，让爱人打杨某，遭爱人拒绝，一日发现杨某10岁女儿独自一人，便将其打伤。躯体检查未见异常，其诊断应为

- A. 精神分裂症偏执型
B. 偏执性精神病
C. 躯体疾病所致精神障碍
D. 脑外伤所致精神障碍
E. 人格障碍

正确答案：D 您选择的答案：

第33题 男性，71岁，因脑供血不足住院，住院期间整夜不眠，时常自言自语，在床边摸索，上述症状持续1周后，病情加重，出现情绪紧张，恐惧，严重时不能辨别家人，不认识管床医生，此病人的诊断考虑

- A. 阿尔茨海默病
B. 血管性痴呆
C. 反应性精神障碍
D. 柯萨可夫综合征
E. 谵妄状态

正确答案：E 您选择的答案：

第34题 男性，17岁，近半月低热37.8℃，讲话含糊，情绪易激惹，对父母态度粗暴，有时打骂，胡言乱语，自笑，乱窜病室，抽搐一次，有二便失禁。躯体检查：T：37.5℃，P：100次/分，BP 140/90mmHg。下肢肌张力增高，右侧巴氏征(+)，克氏征(-)。CSF：潘氏阳性，精神检查：意识模糊，表情呆滞，言语减少，偶有一言半语，称父母是“后爹娘”，无故自笑。头部CT正常，脑电图：弥漫性S波以额颞为主，有阵发性尖波发放。该患者诊断是

- A. 病毒性脑炎所致精神障碍
B. 精神分裂症
C. 脑肿瘤所致精神障碍
D. 癔症
E. 癫痫性精神障碍

正确答案：A 您选择的答案：

第35题 女性，65岁，自2年前搬至女儿家后，自觉记忆力逐渐下降，反应迟钝，产生无用感，近2个月来失眠，食欲减退，不主动外出活动，常觉得活着没意思，下列诊断不在考虑范围的是

- A. 神经衰弱
B. 痴呆(早期)
C. 老年期抑郁
D. 更年期精神障碍
E. 神经症

正确答案：D 您选择的答案：

第36题 36岁男性，病人23岁结婚后半年开始怀疑爱人作风不正，常争吵，打爱人，过后又同爱人说：“我也不信，就是耳朵里有人说你和别人有两性关系”，一次在田间劳动时突然看到全家人被一起埋在一个大坑里，当天突然将农场一台拖拉机砸毁，过后解释说是听到国家领导人在空中说：“快砸”，病人14~15岁时有抽搐发作4~5次，其祖母患有癫痫病，体格和神经系统检查正常，脑电各区爆发尖慢活动，头部

CT正常，其诊断是

- A. 癫痫性精神障碍
B. 精神分裂症
C. 偏执性精神病
D. 脑肿瘤所致精神障碍
E. 脑炎所致精神障碍

正确答案：A 您选择的答案：

第37题 王某，男，49岁，高血压病史10年，近3年来失眠，记忆力减退，工作效率下降，近一年来上述症状加重，言语不清，双手震颤，情绪低落，自责自罪，有时不认识周围人，裸体外跑。查：眼底动脉细呈铜丝状，双膝腱反射亢进，病理反射未引出，头部

CT扫描可见数个小的梗死灶，其诊断最可能是

- A. 早发性痴呆
B. 抑郁症

- C 脑血管病所致精神障碍
D 人格障碍
E 精神分裂症

正确答案：C 您选择的答案：

第38题 男性，33岁，一年来反复出现情绪低落，有自杀企图，有时又说：“我肯定被人害死”。癫痫大发作一次。神经系统检查：站立不稳，走路跌跌撞撞，右侧上下肢肌张力增高，右侧巴氏征(+)。精神检查意识清晰，被害妄想，反应迟钝，随地小便，表情呆板。脑脊液压力1.862kPa(190mmH₂O)，成分正常。头颅平片：蝶鞍明显扩大，鞍背及后床突已吸收消失。诊断是

- A 抑郁症
B 精神分裂症
C 脑炎所致精神障碍
D 脑肿瘤所致精神障碍
E 脑血管病所致精神障碍

正确答案：D 您选择的答案：

第39题 32岁男性，17岁时起病，走路不稳，偏向一侧，双手震颤，眼睛看不清字，成绩下降，25岁时出现癫痫大发作，27岁逐渐出现精神异常，吵闹不休，打人骂人砸东西，时有自言自语，随地大小便，吐字不清，流口水，患者妹妹有相同病史。查：意识清楚，兴奋躁动，傻笑，思维贫乏，智力低下，行为紊乱，血清铜氧化酶低于正常，有K-F环，肝脏

B超呈轻度结节性硬化，该患者诊断为

- A 精神分裂症
B 癫痫所致精神障碍
C 早老性痴呆
D 肝豆状核变性所致精神障碍
E 匹克病

正确答案：D 您选择的答案：

第40题 男性，21岁，农民，两月来在劳动中有三次突然站立不稳要跌倒，四天前在村里看电影时突然看到身体前方有两个火球，因害怕跑出影院，当天在家突然持木棒将电视砸毁，其妹拦阻时被其咬伤，又用铁锹将邻居家门窗砸碎，被众人扭送公安局，病人过后回忆说：“当天回家屋里一群人放火、打仗，以后就什么也不知道了”，脑电双额前部出现棘波和尖波，躯体检查正常，该患者诊断是

- A 癫痫性精神障碍
B 精神分裂症
C 脑外伤性精神障碍
D 癔症
E 反应性精神障碍

正确答案：A 您选择的答案：

第41题 男性，51岁，5年前患左侧大脑中动脉血栓形成，遗留右侧半身轻瘫，一年来认为自己患了癌症，到处求医检查均被否定，但患者仍坚信不移，多次自杀未遂。查：意识清，有命令性幻听、幻嗅、疑病妄想、被害妄想、情感脆弱、记忆力减退、理解力和判断力差，血压180/100mmHg，其诊断最可能是

- A 精神分裂症
B 抑郁症
C 早老性痴呆
D 人格障碍
E 脑血管所致精神障碍

正确答案：E 您选择的答案：

第42题 22岁男性，一年来性格变得固执任性，放弃工作而一心钻研数学、哲学，有时突然变得茫然，乱翻床铺，持续时间短暂，过后否认是自己弄的，认为是别人搞得这样，一次回家路上听到母亲在桥上哭，走到桥上又听到母亲在河里哭，于是跳进河里找，被救出，意识恢复后，感到奇怪。病人4岁和16岁时有癫痫发作史。脑电图见阵发性棘慢波，其诊断是

- A 精神分裂症
B 癫痫所致精神障碍
C 人格障碍
D 偏执性精神病
E 脑外伤性精神障碍

正确答案：B 您选择的答案：

第43题 35岁男性，病人一年前出现情绪低落，悲观厌世，近半年转为情感高涨，言语行为增多，自高自大，爱管闲事，讲话滔滔不绝，眉飞色舞，有感染力，病人四年前头部受过外伤，该患者诊断考虑

- A 躁狂病
B 抑郁症
C 双相情感障碍
D 脑外伤所致精神障碍
E 人格改变

正确答案：D 您选择的答案：

三、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第44-45题

女性，72岁，银行职员，高中文化，3年前开始记忆力下降，逐渐加重，刚吃完饭后就忘记，说没吃饭，记不住孙子的名字，把子女错认为别人，远记忆力尚可，经常吵闹要回原来人家，有时焦虑，简单计算尚可，复杂计算力差，在家乱翻东西，自己存折忘记放在什么地方，找不到认为被女儿偷去了，躯体及神经系统检查无著征

1. 该患者做哪项检查最有诊断意义

- A 头颅CT
B CSF

- C 脑电图
- D 智商测定
- E 精神症状总体量表
- 2. 最可能诊断为
- A 老年性痴呆
- B 脑肿瘤
- C 脑血管病
- D 人格改变
- E 抑郁症

正确答案：AA 您选择的答案：

第46-48题

商某，男，60岁，半年前因精神因素起病，表现失眠，好忘事，说话啰嗦，重复近4个月，愁眉苦脸，要自杀，少言少语，对对不起子女，翻箱倒柜，认错家人，既往高血压无卒中史，曾诊断“抑郁症”，“原发性高血压”，经治疗，一度病情好转，表现豁然开朗，对往事感到莫名其妙，2天后病情复发。躯体检查：BP 160/110mmHg，四肢肌张力增高，双手震颤，无病理反射。精神检查，阵发性意识不清，表情淡漠，缄默违拗，拒饮拒食，近记忆力明显减退，告诉事转眼即忘，远记忆尚可，能正确回忆重大生活事件

- 1. 下列哪项检查最有意义
- A 地塞米松抑郁试验
- B 测血压心脏功能，心脏X线检查
- C 头颅CT
- D 脑脊液
- E 智能测试

2. 最可能诊断是

- A 抑郁症
- B 老年性痴呆
- C 脑血管病所致精神障碍
- D 精神分裂症
- E 反应性木僵

3. 最有效治疗措施为

- A 抗抑郁治疗
- B 抗精神病治疗
- C 心理治疗
- D 脑血管病治疗
- E 按脑血管病所致精神障碍治疗

正确答案：CCE 您选择的答案：

第49-51题

高某，女，40岁，半月前患“感冒”，头痛，恶心，呕吐两次，发热，当时按“感冒”治疗。此后逐渐出现精神萎靡，疲乏无力，表情淡漠，卧床不起，不食，不语，问舌不答，时而独自发笑。既往健康。躯体检查：体温38.5℃，脉搏100次/分，呼吸20次/分，血压120/70mmHg，急性重症面容，体表消瘦，轻度脱水。神经系检查：嗜睡状态，右下肢肌张力增高，腱反射亢进，有踝车挛。精神检查：两眼呆滞，缄默不语，表情淡漠，蜡样屈曲，处于木僵状态。脑电图呈广泛中度异常

1. 下列哪项检查最有意义

- A CSF
- B CT
- C 血常规，心电图
- D 头颅平片
- E MRI

2. 最可能的诊断是

- A 精神分裂症紧张型
- B 反应性木僵
- C 病毒性脑炎所致精神障碍
- D 脑肿瘤所致精神障碍
- E 抑郁性木僵

3. 最有效的治疗是

- A 抗精神治疗
- B 心理治疗
- C 抗抑郁治疗
- D 手术治疗
- E 抗病毒+抗精神病治疗

正确答案：ACE 您选择的答案：

第52-53题

女性，54岁，优秀话务员，近几年怀疑丈夫有外遇，看电视时激动，控制不住，外出走失一周找不到自己家，住在露天，公安人员收留送回家，吃饭用手抓着吃，记忆力下降，行为幼稚。既往高血压7年，脑梗死后10个月，神经系检查：BP225/110mmHg，说话口齿不清，右侧下肢轻偏瘫症状，肌张力增高，巴氏征(+)。精神检查：意识清晰，智力减退，个人生活不能自理，有二便失禁

1. 最有意义检查是哪项

- A 头CT
- B EEG
- C CSF
- D 智商测定
- E 脑血流图

2. 本病例诊断考虑

- A 老年性痴呆
- B 脑血管性痴呆
- C 脑肿瘤所致精神障碍
- D 脑炎所致精神障碍
- E 精神发育迟滞

正确答案：AB 您选择的答案：

第54-56题

男性，48岁，既往有冶游史，25岁时有皮肤损害，31岁时结婚，妻子第二年怀孕流产，3年前因精神因素呈兴奋状态，大声喊叫，焦虑、苦闷、坐立不安，夜间看见一个人腾云驾雾。躯体检查：无著征，神经系统检查：右瞳孔缩小，光反射消失，面神经不全麻痹，手指及眼睑轻微震颤，右上J皮霍夫曼征(+)。精神检查：有幻听，“耳边听到滔滔不绝说话声，发出粗鲁的谩骂声”，记忆力减退，情绪低落，易激动

1. 首先应检查哪项

- A 康华试验
- B 头CT
- C CSF常规
- D EEG
- E 智商测定

2. 本病例诊断考虑

- A 脑血管病所致精神障碍
- B 脑梅毒所致精神障碍
- C 早老性痴呆
- D 精神分裂症
- E 抑郁症

3. 本病例治疗

- A 脑血管病治疗
- B 抗梅毒+抗精神病
- C 抗精神病
- D 抗抑郁
- E 按老年痴呆治疗

正确答案：ABB 您选择的答案：

第57-59题

13岁女性，两年前起病，于生气后突然大叫一声，随之倒地呼之不应，牙关紧闭，双眼上视，头颈后仰，四肢抽搐，无二便失禁，无舌咬伤。发作停止后对整个过程不能回忆，未给予特殊处置，照常上学。2个月后于夜间入睡后又出现抽搐，有小便失禁。抽搐停止后，突然起床冲出门外，无目的漫游，呼之不应，冲动毁物，持续2小时后恢复清醒，对经过全无记忆，此后反复有类似发作，平均每月三次

1. 在以下检查中最可能见到异常的是

- A 心理测试
- B CT
- C MRI
- D EEG
- E 头颅平片

2. 该患者最可能的诊断是

- A 神经症
- B 癔症
- C 急性应激障碍
- D 癫痫
- E 脑肿瘤所致精神障碍

3. 最有效的治疗措施是

- A 心理治疗
- B 氯丙嗪治疗
- C 卡马西平治病
- D 手术治疗
- E 电休克

正确答案：DDC 您选择的答案：

第60-62题

崔某，男，43岁，近20年来每年发作一次鬼神附体，以大仙口气说话，要求父亲烧香拜佛，持续数小时后痊愈，一个半月前开始疲乏无力，不认家人，好忘事，小便尿在裤内，右侧轻偏瘫，右手拿不住东西，好跟别人说话。既往史：23岁时有冶游史。神经系统检查：两侧瞳孔不等大，右瞳孔边缘不整齐，左侧椭圆形，右侧瞳孔光反射消失

1. 哪项检查最有必要

- A 心理测验
- B EEG
- C CSF
- D 康华试验
- E 头部CT

2. 最可能是哪个诊断

- A 大脑梅毒所致精神障碍
- B 早老性痴呆
- C 精神分裂症
- D 癔症
- E 脑肿瘤

3. 最有效治疗

- A 脑手术
- B 氯丙嗪
- C 大脑代谢剂
- D 心理治疗
- E 梅毒治疗

正确答案：DAE 您选择的答案：

第63-65题

男性，22岁，半年前起病，表现：有时头痛头昏，部位不定，未予处理。话多，要办一个一千人的工厂，要当经理，周游全世界，有好几个女朋友，情绪高涨。诊断躁狂症，经碳酸锂，氯丙嗪治疗后症状消失。神经系统检查无异常，2个月后意识清楚，情感淡漠，话少动作缓慢，不洗澡，不换衣服，记忆力好，无自杀观念，阵发性剧烈头痛，用头

撞墙，每次半小时左右，曾癫痫大发作一次，喷射性呕吐一次。神经系检查，眼底视乳头水肿，右侧肢体肌张力增高，巴氏征阳性，脑电图中度异常，大量病理高波幅 θ 波，左侧较多，脑超声波中线向右移0.3cm

1. 首先应做哪项检查

- A 头部CT
- B 复查脑电图
- C CSF
- D 抑郁症评定量表
- E 躁狂症评定量表

2. 最可能诊断是

- A 躁狂症
- B 抑郁症
- C 躁狂抑郁症
- D 脑肿瘤所致精神障碍
- E 癫痫所致精神障碍

3. 最有意义治疗措施是

- A 抗躁狂治疗
- B 抗抑郁治疗
- C 抗癫痫治疗
- D 手术治疗
- E 抗精神病治疗

正确答案：ADD 您选择的答案：

第66-68题

女性，53岁，三个月前在火车上急性起病，突然不认识女儿，恐惧说：“头痛，眼前有甲虫飞舞，兴奋，应当杀死她。”耳边听到儿子，女儿说话声，经当地治疗症状消失。一周前当听到儿子死亡的消息复发，症状同前，既往高血压史5年，躯体检查：BP 200/90mmHg，神经检查正常，精神检查：意识模糊，恐惧，有幻觉，思维不连贯，智力减退，记忆力差，有时意识清晰，叙述自己儿子已死亡，性格急躁，易激动，血压升高时精神症状加重

1. 最有意义检查

- A 头CT
- B EEG
- C CSF
- D 人格测定
- E 头部超声波

2. 本病例诊断考虑为

- A 脑血管病所致精神障碍
- B 老年性痴呆
- C 反应性精神病
- D 躯体疾病伴发精神障碍
- E 精神分裂症

3. 本病历治疗应采取

- A 抗精神病治疗
- B 治疗血管病
- C 脑血管制剂
- D 脑血管病+抗精神病
- E 心理治疗

正确答案：AAD 您选择的答案：

第69-71题

老年病人出现远事记忆受损，智能减退，难以胜任简单家务劳动，不能正确回答自己的亲人的名字与年龄，饮食不知饥饱，外出找不到家门，举动幼稚，不知羞耻等表现。

1. 对于该老龄患者的疾病诊断，何者正确

- A 老年期痴呆早期
- B 老年期痴呆中期
- C 老年期痴呆晚期
- D 老年期抑郁症
- E 正常老年衰退

2. 该老年患者如果是老年期痴呆后期应有哪些症状

- A 丧失生活能力需人照顾
- B 幻觉
- C 妄想
- D 远记忆障碍
- E 注意力不集中

3. 该老年患者如果是多发性梗死性痴呆会存在哪些因素

- A 颅内硬化动脉的血栓形成
- B 颅内动脉破裂出血
- C 颅外动脉的栓子
- D 颅外肿瘤转移栓子
- E 颅内肿瘤所致

正确答案：BAA 您选择的答案：

第72-73题

高某，男，63岁，4年前开始，近1年日益加重，不认识女儿，摔废旧物品，出门找不到家，不会穿衣，常呆坐，呆立呆望，不言不语，对人冷淡，不关心家人。既往史：有冶游史。躯体神经系统检查：无异常精神检查，意识清，定向障碍，记忆障碍，个位数计算正确，两位数加法常错，夜间不眠，到处摸索，说身边有人唱歌内容听不清，流露出悲观情绪，未见自杀行为，生活不能自理。化验：康华试验阴性，CSF正常，CT：脑萎缩，额颞叶明显

1. 最可能诊断是

- A 老年性痴呆
- B 脑血管性痴呆
- C 脑肿瘤

- D 麻痹性痴呆
- E 正常压力脑积水所致痴呆
- 2. 目前治疗效果预后如何
- A 无有效治疗, 预后不良
- B 手术治疗预后较好
- C 抗梅毒治疗, 预后较好
- D 治疗脑血管病后尚可
- E 脑脊液分流手术, 预后尚可

正确答案: AA 您选择的答案:

四、B1型题: 以下提供若干组考题, 每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第74-76题

- A. 以人格改变为早期症状的痴呆
- B. 潜隐发病, 以记忆力下降为主要表现的痴呆
- C. 片断遗忘, 智能正常
- D. 有痴呆症状伴明显的视幻觉及类帕金森氏病症状
- E. 遗忘综合征伴有脑震荡后综合征
- 1. 路易体痴呆
- 2. 阿尔茨海默病性痴呆
- 3. 可见于颅脑外伤性精神障碍之智能减退

正确答案: DBE 您选择的答案:

第77-78题

- A. 谵妄综合征
- B. 痴呆综合征
- C. 老年期痴呆
- D. 麻痹性痴呆
- E. 多发性梗死性痴呆
- 1. 病人65岁, 开始近记忆减退, 性格变得主观任性, 情绪急躁易怒, 多疑, 夜眠差, 以后远记忆受损, 理解、判断、计算等智能活动明显减退, 生活不能自理。
- 2. 病人出现意识障碍, 昼轻夜重, 注意力涣散, 记忆减退, 难以判断时间、人物和地点, 并伴有视幻觉和错觉, 有恐惧心理, 答非所问, 思维不连贯。

正确答案: CA 您选择的答案:

第79-80题

- A. 无意识障碍, 近记忆力障碍明显, 智能相对完好
- B. 逐渐加重的记忆障碍及痴呆
- C. 突发昼轻夜重的神志不清
- D. 发作性的意识障碍伴痴呆表现
- E. 以近记忆力障碍为首发症状可伴人格改变
- 1. 遗忘综合征的主要特征是
- 2. 谵妄状态表现为

正确答案: AC 您选择的答案:

习题集 精神病学 精神活性物质所致精神障碍

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 慢性酒中毒治疗多采用以下哪种方法

- A 戒酒
- B 综合性疗法
- C 对下治疗
- D 支持治疗
- E 心理治疗

正确答案：B 您选择的答案：

第2题 慢性酒中毒不包括以下哪种类型

- A 依赖综合征
- B 病理性醉酒
- C 酒中毒性幻觉症
- D 酒中毒性妄想症
- E 酒中毒性痴呆

正确答案：B 您选择的答案：

第3题 在引起药瘾的因素中，以下哪项是错误的

- A 药物的可获得性
- B 遗传素质
- C 人格的易感性
- D 社会文化因素
- E 人主观因素

正确答案：E 您选择的答案：

第4题 中枢神经兴奋剂是指以下哪种

- A 杜冷丁
- B 速可眠
- C 眠尔通
- D 苯丙胺
- E 可卡因

正确答案：D 您选择的答案：

第5题 药物依赖治疗原则是

- A 脱毒治疗+对症治疗+康复治疗
- B 单独脱毒治疗
- C 脱毒治疗+心理治疗
- D 脱毒治疗+抗抑郁药物
- E 镇静催眠药+心理治疗

正确答案：A 您选择的答案：

第6题 关于戒断综合征一般的表现哪项是错误的

- A 情绪改变
- B 幻觉或错觉
- C 判断力增强
- D 人格改变
- E 失眠

正确答案：C 您选择的答案：

第7题 震颤谵妄为

- A 长期大量饮酒者突然停饮后出现急性精神障碍
- B 慢性酒精中毒突然停饮后缓慢出现的精神障碍
- C 长期大量饮酒者停饮后出现的记忆障碍
- D 慢性酒精中毒停饮后出现的行为障碍
- E 慢性酒精中毒停饮后出现的情感障碍

正确答案：A 您选择的答案：

第8题 急性酒中毒不包括以下哪个类型

- A 酒中毒性脑病
- B 单纯醉酒
- C 病理性醉酒
- D 复杂性醉酒
- E 普通醉酒状态

正确答案：A 您选择的答案：

第9题 下列哪项不是吗啡镇痛药成瘾的精神症状

- A 情绪低落、消沉、易激惹
- B 痴呆
- C 用成瘾药后情绪高涨、活跃
- D 记忆力下降
- E 人格改变

正确答案：B 您选择的答案：

第10题 酒精中毒指饮酒后所致的

- A 躯体障碍

- B. 精神障碍
- C. 意识障碍
- D. 精神障碍和躯体障碍
- E. 戒断症状

正确答案：D 您选择的答案：

第11题 下列关于苯丙胺类药物药理作用叙述不正确的是

- A. 具强烈的中枢神经兴奋作用
- B. 中等剂量可致舒适感或情感抑郁
- C. 具正性和负性体验
- D. 不易产生躯体依赖
- E. 不易产生精神依赖

正确答案：E 您选择的答案：

第12题 关于阿片类药物依赖的治疗错误的是

- A. 替代治疗
- B. 非替代治疗
- C. 电休克治疗
- D. 社会心理治疗
- E. 行为治疗

正确答案：C 您选择的答案：

第13题 关于依赖综合征，错误的说法是

- A. 对饮酒的渴求，无法控制
- B. 固定的饮酒模式
- C. 耐受性逐渐增加
- D. 戒断后如重新饮酒，很少再现依赖综合征的全部症状
- E. 戒断综合征反复出现

正确答案：D 您选择的答案：

第14题 柯萨可夫综合征是下列哪种疾病的特有症状之一

- A. 精神分裂症
- B. 抑郁症
- C. 慢性铅中毒
- D. 酒精依赖
- E. 一氧化碳中毒

正确答案：D 您选择的答案：

第15题 处理酒戒断后震颤谵妄不恰当的是

- A. 给予安静的环境
- B. 注意保温
- C. 预防感染
- D. 控制精神症状
- E. 给予小剂量的酒

正确答案：E 您选择的答案：

第16题 下列哪种依赖药物在停药12-24小时内即出现戒断症状，2~3天达高峰

- A. 巴比妥类
- B. 苯丙胺类
- C. 吗啡
- D. 海洛因
- E. 大麻

正确答案：A 您选择的答案：

第17题 慢性酒中毒不包括

- A. 依赖综合征
- B. 酒中毒性妄想症
- C. 病理性醉酒
- D. 酒中毒性幻觉症
- E. 震颤谵妄

正确答案：C 您选择的答案：

第18题 导致药物滥用的原因是

- A. 家庭因素
- B. 同伴影响及压力
- C. 心理因素
- D. 遗传学因素
- E. 以上都是

正确答案：E 您选择的答案：

第19题 药物依赖形成的机制中哪项是不可能的

- A. 代谢耐药性和细胞耐药性
- B. 受体学说
- C. 脑敏感学说
- D. 戒断综合征的废用性增敏假说
- E. 生物胺学说

正确答案：C 您选择的答案：

第20题 以下哪种物质不属于精神活性物质

- A. 巴比妥类

- B. 苯丙胺
- C. 美沙酮
- D. 抗抑郁药物
- E. 烟草

正确答案：D 您选择的答案：

第21题 关于物质使用障碍，以下哪种说法是正确的

- A. 包括物质依赖和物质滥用
- B. 包括物质中毒和物质戒断
- C. 包括物质中毒和物质依赖
- D. 包括物质引起的精神病性障碍和物质依赖
- E. 包括物质滥用和物质中毒

正确答案：A 您选择的答案：

第22题 药物依赖是指

- A. 对药物强烈的渴求
- B. 对药物的需要
- C. 躯体依赖
- D. 精神依赖
- E. 服药后获得的特殊快感

正确答案：A 您选择的答案：

第23题 导致精神障碍的药物中毒中哪项不是非依赖性药物

- A. 强地松
- B. 阿托品
- C. 雷米封
- D. 杜冷丁
- E. 颠茄

正确答案：D 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第24题 患者男性，45岁，有饮酒史20年，现每天饮黄酒3斤，目前存在嫉妒妄想。若予以戒酒治疗，可采取以下措施，除外

- A. 小量抗精神病药
- B. 补充维生素
- C. 立即停酒
- D. 行为治疗
- E. 集体心理治疗

正确答案：C 您选择的答案：

第25题 患者男性，45岁，由于工作紧张、焦虑，导致晚上不能正常入睡，时常用安眠药来帮助睡觉，可导致成瘾的药物是哪种

- A. 氯丙嗪
- B. 氯普噻吨
- C. 甲喹酮
- D. 氯氮平
- E. 百忧解

正确答案：C 您选择的答案：

第26题 男性，31岁，因失眠长期服药治疗，突然停药12小时后，出现头痛，虚弱无力及肢体颤抖，所服药物最可能是

- A. 巴比妥类
- B. 苯丙胺类
- C. 苯二氮草类
- D. 吩噻嗪类
- E. 三环类抗抑郁药

正确答案：A 您选择的答案：

第27题 患者男性，25岁，系某大学的教师，平素不饮酒。在一次聚餐会时饮白酒三两后，瘫在地上，此症状最可能为

- A. 急性酒精中毒
- B. 急性精神障碍
- C. 行为障碍
- D. 情感障碍
- E. 记忆障碍

正确答案：A 您选择的答案：

三、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第28-29题

某男，43岁，不间断饮白酒史20年，有时清晨即饮酒，近1个月来出现失眠，无端怀疑妻子不忠，若其妻与异性交谈即发怒。

1. 所患疾病考虑为

- A. 精神分裂症
- B. 酒精性妄想症

- C. 人格障碍
 - D. 抑郁症
 - E. 反应性精神障碍
 - 2. 选择治疗方案最佳的是
 - A. 长期口服精神病药物
 - B. 戒酒、适量抗精神药物
 - C. 行为、心理治疗
 - D. 抗抑郁药物治疗
 - E. 脱离刺激环境，适量抗精神药物
- 正确答案：BB 您选择的答案：

第30-31题

患者女性，35岁，在家属陪同下首次来院门诊，诉有胆囊结石史且反复疼痛，精神萎靡不振，反复追问病史发现其多年来一直使用止痛剂。

- 1. 如考虑药物成瘾应为何种药物
 - A. 阿尼利定
 - B. 泰必利
 - C. 哌替啶
 - D. 布洛芬
 - E. 索米痛片
 - 2. 如考虑为药物成瘾会出现哪些依赖
 - A. 单独的精神依赖
 - B. 单独的躯体依赖
 - C. 药物耐受性增加
 - D. 精神依赖和躯体依赖
 - E. 行为依赖
- 正确答案：CD 您选择的答案：

四、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第32-36题

- A. Wernick脑病
 - B. 依赖综合征
 - C. 戒断综合征
 - D. 脑震荡后综合征
 - E. Korsakoff综合征
 - 1. 主要为记忆障碍，定向障碍，虚构
 - 2. 有眼球震颤，眼球外展受限伴定向障碍
 - 3. 反复使用某种精神活性物质，对该物质的耐受性增高，减少或停用后出现戒断症状
 - 4. 停用或减少精神活性物质出现意识障碍，幻觉及情绪改变的是
 - 5. 以失眠、头痛、情绪不稳、疲乏、注意力不集中为主要表现，实验室检查多无异常发现
- 正确答案：EABCD 您选择的答案：

第37-39题

- A. 依赖
 - B. 滥用
 - C. 耐受性
 - D. 戒断状态
 - E. 精神活性物质
 - 1. 又称为有害使用(harmful use)，是一种适应不良方式，由于反复使用药物导致了明显的不良后果，但没有明显的耐受性增加或戒断症状
 - 2. 在反复、长时间、大剂量使用某种物质后，或使用拮抗剂占据受体，绝对或相对戒断时出现的一组症状，再度用药可使症状获得缓解
 - 3. 指药物使用者必须增加使用剂量方能获得所需的效果，或使用原来的剂量则达不到使用者所追求的效果
- 正确答案：BDC 您选择的答案：

习题集 精神病学 精神分裂症

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 关于 型精神分裂症，下列何种说法是错误的

- A．以阳性症状为特征
 - B．对抗精神病药物反应良好
 - C．无认知功能改变
 - D．预后差
 - E．生物学基础是多巴胺功能亢进
- 正确答案：D 您选择的答案：

第2题 精神分裂症最突出的感知觉障碍是

- A．言语性幻听
 - B．错觉
 - C．内感性不适
 - D．非真实感
 - E．空间知觉障碍
- 正确答案：A 您选择的答案：

第3题 关于精神分裂症的临床特点，错误的是

- A．多数在青壮年发病
 - B．自知力丧失
 - C．常慢性起病、病程多迁延
 - D．偏执型是最常见类型
 - E．常有意识障碍和智能障碍
- 正确答案：E 您选择的答案：

第4题 氯丙嗪治疗精神分裂症最明显的不良反应是

- A．肝损害
 - B．粒细胞减少
 - C．过敏反应
 - D．抗胆碱能作用
 - E．药源性抑郁
- 正确答案：D 您选择的答案：

第5题 对第二代抗精神病药物的描述，正确的是

- A．能够有效地控制精神分裂症的阴性症状
 - B．除能拮抗中枢神经系统多巴胺受体外，还能拮抗中枢去甲肾上腺素受体
 - C．在治疗精神病的阳性症状方面不如传统的抗精神病药物
 - D．多数药物锥体外系副作用相对较多但其他副作用较少
 - E．主要包括氯普噻吨、氯氮平、利培酮
- 正确答案：A 您选择的答案：

第6题 关于精神分裂症的概述正确的是

- A．一组病因未明的精神疾病
 - B．多起病于青壮年
 - C．缓慢起病，病程迁延
 - D．有思维、情感、行为方面的障碍
 - E．通常有意识障碍及智能减退
- 正确答案：E 您选择的答案：

第7题 关于精神分裂症单纯型，下列何种说法不正确

- A．多在青少年期起病
 - B．病程缓慢
 - C．生活疏懒
 - D．兴趣及活动逐渐减退
 - E．常伴有幻觉、妄想
- 正确答案：E 您选择的答案：

第8题 使用过量氯丙嗪的精神病患者，如使用肾上腺素后，主要表现为

- A．升压
 - B．降压
 - C．血压不变
 - D．心率减慢
 - E．心率不变
- 正确答案：B 您选择的答案：

第9题 不属于抗精神病药物引起的锥体外系；症状是

- A．急性肌张力障碍
 - B．静坐不能
 - C．震颤麻痹综合征
 - D．意识障碍
 - E．迟发性运动障碍
- 正确答案：D 您选择的答案：

第10题 精神分裂症最常见的幻觉是

- A．幻听

- B. 幻视
- C. 幻味
- D. 幻触
- E. 幻嗅

正确答案：A 您选择的答案：

第11题 下列抗精神病药物哪一种为非经典药物

- A. 氟哌啶醇
- B. 氯普噻吨
- C. 奥氮平
- D. 舒必利
- E. 氯丙嗪

正确答案：C 您选择的答案：

第12题 关于精神分裂症的维持治疗正确的是

- A. 第一次发作维持治疗1~2年
- B. 反复多次者不需维持治疗
- C. 经典抗精神病药物维持治疗量应为急性期治疗量的1/3左右
- D. 非经典抗精神病药物维持治疗量即急性期治疗量
- E. 维持治疗期，不宜单一用药

正确答案：A 您选择的答案：

第13题 针对有幻觉妄想及情感平淡、意志减退的患者，宜选用的非经典抗精神病药物是

- A. 氯丙嗪
- B. 安定(地西洋)
- C. 氟哌啶醇
- D. 利培酮
- E. 泰尔登

正确答案：D 您选择的答案：

第14题 有关经典药物(又称第一代抗精神病药物)的特点，下列何种说法是错误的

- A. 阻断中枢多巴胺D2受体
- B. 可以产生锥体外系副反应
- C. 不产生催乳素的水平的升高
- D. 可以产生心血管副反应
- E. 可以产生肝脏副反应

正确答案：C 您选择的答案：

第15题 不属于精神分裂症阳性症状的是

- A. 言语性幻听
- B. 影响妄想
- C. 思维破裂
- D. 思维贫乏
- E. 紧张性木僵

正确答案：D 您选择的答案：

第16题 根据CCMD-3，下列哪项不符合精神分裂症的诊断标准

- A. 反复出现的言语性幻听
- B. 原发性妄想
- C. 自知力障碍
- D. 社会功能严重受损
- E. 一般继发于意识障碍

正确答案：E 您选择的答案：

第17题 有关非经典药物抗精神病药物利培酮的作用机制，以下哪一种说法是正确的

- A. 阻断中枢神经系统多巴胺受体还能拮抗中枢去甲肾上腺素受体
- B. 阻断中枢神经系统5-羟色胺受体
- C. 阻断中枢去甲肾上腺素受体
- D. 阻断中枢神经系统多巴胺受体和5-羟色胺受体
- E. 阻断中枢神经系统多巴胺受体和乙酰胆碱受体

正确答案：D 您选择的答案：

第18题 单纯型精神分裂症与神经衰弱最主要的鉴别点在于

- A. 病程迁延
- B. 无自知力
- C. 起病缓慢
- D. 有幻觉妄想
- E. 头痛失眠较轻

正确答案：B 您选择的答案：

第19题 精神分裂症的强迫症状与强迫性神经病的鉴别是前者

- A. 强迫症状明显
- B. 缺乏自知力及痛苦感
- C. 起病缓慢
- D. 与情绪有关
- E. 有反强迫意愿

正确答案：B 您选择的答案：

第20题 精神分裂症最多见的症状是

- A. 物理影响妄想

- B. 关系被害妄想
- C. 夸大妄想
- D. 罪恶妄想
- E. 嫉妒妄想

正确答案：B 您选择的答案：

第21题 紧张综合征主要见于

- A 精神分裂症紧张型
- B 精神分裂症青春型
- C 癔症
- D 神经衰弱
- E 躁狂症

正确答案：A 您选择的答案：

第22题 下列哪种症状对诊断精神分裂症的意义最大

- A. 思维奔逸，情感欣快
- B. 思维迟缓，意志活动减弱
- C. 情感焦虑，紧张
- D. 情感淡漠，思维破裂
- E. 交替出现的情感高涨、情感低落

正确答案：D 您选择的答案：

第23题 精神分裂症的特征性症状

- A 失眠
- B 注意力不集中
- C 意识范围缩小
- D 被洞悉感
- E 遗忘

正确答案：D 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第24题 女性，21岁，患精神分裂症1年，由于有支气管哮喘病，临床给予适当剂量奋乃静治疗，其主要不良反应是

- A. 锥体外系症状
- B. 肝损害
- C. 粒细胞减少
- D. 内分泌变化
- E. 迟发性运动障碍

正确答案：A 您选择的答案：

第25题 27岁，男性，病程5年，性格孤僻，不上班，将自己的东西都卖掉，流浪街头，睡门洞，在饭店讨饭吃，时有自言自语，经常呼唤着因病过世的母亲的名字。精神检查：意识清晰，衣着不整，表情淡漠，对人冷淡，常对人冷笑，孤僻离群，时有奇怪想法，如“不能利用出现的一种倾向掩盖另一种倾向”。躯体及神经系统检查无异常，该患者诊断是

- A 分裂性人格
- B 精神分裂症
- C 抑郁症
- D 精神发育迟滞
- E 脑器质性精神障碍

正确答案：B 您选择的答案：

第26题 男性，24岁。最近2月常感到非常害怕，并称：“家中有窃听器、摄像机监视，马路上有人跟踪，全家被人下毒。”你认为这是什么症状

- A. 思维散漫
- B. 被害妄想
- C. 被控制感
- D. 错觉
- E. 关系妄想

正确答案：B 您选择的答案：

第27题 男性，23岁，木匠，近1年来，不能专心做工，时常发呆，情绪低落，有时烦躁，认为邻居要加害于他，感到自己的事情还未说出来，别人就已经知道了，因此更认为自己不安全，时常无故哭泣，自言自语“为什么这样对我，我怎么办？”体检及神经系统检查无异常。该病人最可能的诊断是

- A. 抑郁症
- B. 恐惧症
- C. 心因性反应
- D. 精神分裂症
- E. 焦虑症

正确答案：D 您选择的答案：

第28题 女性，16岁。诊断为精神分裂症青春型，患者的病情特点中下列哪项不符合

- A. 联想散漫
- B. 片段幻想妄想，行为紊乱
- C. 情感平淡
- D. 急性或亚急性起病
- E. 治疗效果差

正确答案：C 您选择的答案：

第29题 24岁，女性，病程6年，说有人要害她，常自笑，好追求异性，有时打人摔东西，话多内容凌乱。精神检查：意识清晰，兴奋多语，思维松弛，欣快，主动接触异性，有被害妄想及非系统性妄想，活动增多而无目的性，躯体及神经系统检查未见著征，该患者诊断为

- A 精神分裂症
- B 情感障碍(躁狂型)
- C 脑器质性精神障碍
- D 人格障碍
- E 躯体疾病所致精神障碍

正确答案：A 您选择的答案：

第30题 女性，35岁，3年前开始怀疑丈夫对其不忠，时常争吵，近1年来，跟踪丈夫，搜查丈夫的文件包，常听到脑子里有一女子声音说“你可怜”“你真蠢”之类的话，因此不愿与家人同餐，不敢喝家中水，认为饭里、水里被放了毒药，认为丈夫与外人联合起来害她，病人常常哭泣。体检及神经系统检查无异常，此病人患有精神分裂症的哪种分型

- A．紧张型
- B．单纯型
- C．偏执型
- D．青春型
- E．未分化型

正确答案：C 您选择的答案：

第31题 男性，59岁，病程3~4年，主要表现不愿与他人接触，喜独处沉思，自言自语，大吵大闹，无故打人，言语少，情感淡漠，孤僻，赤足露胸，生活懒散，衣着不整，不洗澡，随地便溺，需要什么用手打手势示意，思维贫乏，自发言语杂乱无章。躯体检查：神经系统检查均正常，诊断为

- A 精神分裂症(衰退型)
- B 老年性痴呆
- C 人格改变
- D 脑器质性精神障碍
- E 精神发育退缩

正确答案：A 您选择的答案：

第32题 29岁，女性，十个月前起病，言语错乱，别人难以理解，骂人毁物，逐渐言语活动减少，不能与周围人沟通，近三个月来呆坐少语，自笑，认为自己的事别人都能知晓，有人要害自己。查：意识清晰，目光表情呆滞，耳边有命令性幻听，被害妄想，被洞悉感，有思维中断，躯体及神经系统检查无著征，该患者诊断为

- A 抑郁症
- B 精神分裂症
- C 脑肿瘤所致精神障碍
- D 内分泌疾病所致精神障碍
- E 偏执性精神障碍

正确答案：B 您选择的答案：

第33题 男性，32岁，近3个月来失眠，情绪烦躁，时常自言自语，说听到许多人在耳边议论他，有时是表扬他，有时是批评他；工作漫不经心，无故旷工，家人劝说，则有打骂毁物行为，体检及神经系统无异常发现。该病情的诊断考虑是

- A．焦虑性神经症
- B．躁狂症
- C．精神分裂症
- D．人格障碍
- E．神经衰弱

正确答案：C 您选择的答案：

第34题 女性，30岁。将自己的衣服反穿，以表示自己为人“表里一致”，这是什么症状

- A．强制性思维
- B．病理性象征性思维
- C．童样痴呆
- D．思维散漫
- E．思维贫乏

正确答案：B 您选择的答案：

第35题 病人男性，30岁，近半年总觉得有人跟踪他，常听见有人在议论如何对付他，继而出现闷闷不乐，整天闭门不出，写信到公安局要求保护。该病人最可能诊断是

- A．反应性抑郁
- B．抑郁症
- C．躁狂症
- D．精神分裂症偏执型
- E．精神分裂症单纯型

正确答案：D 您选择的答案：

第36题 男，28岁，以前精神正常，到某地出差刚下火车，突然感到要爆发战争了，因为好多人都往出口处跑。最可能的症状是

- A．错觉
- B．幻觉
- C．感知综合障碍
- D．原发性妄想
- E．继发性妄想

正确答案：D 您选择的答案：

第37题 男性，35岁。患有精神分裂症，在被害妄想支配下，到处上访。既往未曾治疗过，首选的治疗方法是

- A．抗精神病药物治疗
- B．SSRI 药物治疗
- C．心理治疗

- D. 电休克治疗
- E. 苯二氮卓类药物治疗

正确答案：A 您选择的答案：

第38题 病人男性，30岁。半年来深信自己的思想、行为被单位某领导通过仪器放出红外线所控制，使自己的想法，身体活动不由自主。该病人的症状是

- A. 被害妄想
- B. 夸大妄想
- C. 关系妄想
- D. 原发妄想
- E. 被动体验

正确答案：E 您选择的答案：

第39题 23岁，男性，三月前起病，说话语无伦次，常自言自语，说自己是神仙，是伟人，对异性有非分之想，攻击亲人。查：意识清晰，兴奋躁动，思维破碎，内容离奇，难以理解，认为门外有人要杀他，有一台电脑在影响他的大脑，使大脑在不停地转。躯体及神经系统检查未见著征，该患诊断是

- A 躁狂症
- B 抑郁症
- C 精神分裂症
- D 心因性精神障碍
- E 神经症

正确答案：C 您选择的答案：

第40题 男，18岁，近一年来对家人亲友变得冷淡，不去上学，不洗澡，不主动更换衣服，对与自己有关的各种事情表现得无动于衷。最可能的诊断是(2000年)

- A. 人格障碍
- B. 精神分裂症
- C. 抑郁症
- D. 恐惧症
- E. 创伤后应激障碍

正确答案：B 您选择的答案：

第41题 女性，17岁，学生，近半年来失眠，成绩下降，注意力不集中，怀疑同学在背后议论她，常与同学发生口角，因此不愿上学，将家中：门窗关严，认为邻居都知道了她的“丑事”，连报纸、电视上都播放与她有关的事情，不愿出门，体检、神经系统检查阴性。该病情考虑为

- A. 抑郁性神经症
- B. 人格障碍
- C. 神经衰弱
- D. 精神分裂症
- E. 心因性反应

正确答案：D 您选择的答案：

三、A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第42-44题

22岁男性，大学二年级学生，近一年来听课发愣，不作笔记，时有自语自笑，动作迟缓，吃一顿饭要一个多小时，病人5天前开始终日卧床，不吃饭，不知上厕所。精神检查：意识清晰，卧床不动不语，针刺其身体无反应，肌张力增高，令病人张嘴，反把嘴闭得更紧，把病人肢体摆成不舒服的姿势，可以保持很久不变，躯体及神经系统检查无异常

1. 病人不具备下列哪一项症状

- A 情绪低落
- B 情感淡漠
- C 蜡样屈曲
- D 违拗
- E 木僵

2. 该患者的正砥诊断是

- A 抑郁症
- B 脑炎
- C 精神发育迟滞
- D 癔症
- E 精神分裂症

3. 最有效的治疗措施是

- A 抗抑郁治疗(阿米替林)
- B 抗躁狂治疗(碳酸锂)
- C 抗焦虑治疗(安定)
- D 抗精神病治疗(舒必利)
- E 应用抗生素(头孢曲松)

正确答案：AED 您选择的答案：

第45-46题

男性，30岁，工程师，大学文化，一年前独自到树林中迷路时，听到两个割草人在谈话“在树林中看到一头黑熊”。找这两个人时旁边一个人都没有，四处寂静无声，后来在车间工作时看到了自己家墙上的钟和图画，或者“就是现在眼前”或者“在头脑里面”，“有时耳边听到一群不工作的人放肆地大量喝酒，对妻子到医院探视抱有憎恨，认为医生要毒死他。躯体检查：无著征

1. 该患者诊断考虑

- A 精神分裂症
- B 人格障碍
- C 癔病
- D 脑器质性精神病

- E 抗抑郁治疗
- 2. 本病例最有效治疗
- A 抗精神病
- B 心理治疗
- C 抗抑郁
- D 疗养、旅游
- E 针灸

正确答案：AA 您选择的答案：

第47-49题

女，35岁，半年前母突然病故，此后失眠、情绪低沉、不愿与人交往。近三个月来独处时常听见有声音对她讲话，说母病故与某人有关，故多次给公安机关写信反映母被害之事，后来又感到自己的思维、情感不由自己支配，自己的想法还未说出已人人皆知，常独自哭泣。神经系统检查未见异常，有慢性肝炎病史3年，目前肝功ALT80单位/L。

- 1. 该患者没有出现的症状是
- A. 被害妄想
- B. 强制性思维
- C. 情感低落
- D. 思维被洞悉妄想
- E. 言语性幻听
- 2. 该患者最可能的诊断是
- A. 抑郁症伴精神病性症状
- B. 反应性精神病
- C. 神经衰弱
- D. 精神分裂症伴抑郁症状
- E. 躯体疾病所致精神障碍
- 3. 该患者治疗首选的药物是
- A. 氯硝安定
- B. 氟西汀
- C. 氯丙嗪
- D. 丙咪嗪
- E. 利培酮

正确答案：BDE 您选择的答案：

第50-53题

病人男性，26岁。病程3个月，首次住院，入院诊断为精神分裂症，首次使用抗精神病药物。

- 1. 该病人不适合使用下列哪种药物
- A. 利培酮
- B. 奥氮平
- C. 氯丙嗪
- D. 奋乃静
- E. 氟西汀
- 2. 该精神分裂症患者急性期的治疗时间为
- A. 1个月
- B. 2个月
- C. 3个月
- D. 6个月
- E. 9个月
- 3. 该精神分裂症患者维持期的治疗时为
- A. 3个月
- B. 2个月
- C. 1~2年
- D. 6~9个月
- E. 9个月~1年
- 4. 该病人如用氯丙嗪常规剂量治疗，常需观察
- A. 锥体外系不良反应
- B. 心脏功能
- C. 血压
- D. 肝脏功能
- E. 以上都是

正确答案：EBCE 您选择的答案：

第54-55题

滕某，男22岁，一年前因精神刺激表现为郁郁不乐，认为自己有罪，耳边听到有说话声，内容说不出，有时侧耳倾听“地球隆隆响声”，问家人“为什么我想的事别人都知道”，看见小汽车非常恐惧，不出门，独处一隅，喝酒，自言自语。躯体神经系检查均正常。检查：意识清晰，一次突然对着打开的电风扇下跪说：“我有罪，该死”，近期听到电风扇有一男人说：“你是叛徒奸”，认为自己大脑被一名死者控制着，哭笑都不受自己支配，自己想事别人通过遥控器控制他，有时想事想到一半时，认为想法被一个死人“抽走”了，无法继续想下去。

- 1. 该患者的诊断是
- A 抑郁症
- B 精神分裂症偏执型
- C 反应性精神病
- D 偏执性精神病
- E 脑器质性精神病
- 2. 最有效治疗
- A 阿米替林
- B 心理治疗
- C 氯丙嗪
- D 脑器质性病治疗
- E 行为矫正

正确答案：BC 您选择的答案：

第56-58题

病人男性，20岁，病程3个月，入院后常侧耳倾听，说有人在室外议论他，说他是班上最坏的学生，要开除他，公安局派人跟踪监视他。患者到处找议论他的人却未能找到，因此常向窗外说：“我要和你们辩论……”

1. 该病人最可能的诊断是
A. 偏执型精神分裂症
B. 青春型精神分裂症
C. 单纯型精神分裂症
D. 未分化型精神分裂症
E. 紧张型精神分裂症
2. CCMD-3关于该型精神分裂症的病程标准为
A. 1个月
B. 2个月
C. 3个月
D. 6个月
E. 9个月
3. 该精神分裂症病人主要的妄想是
A. 被害妄想
B. 夸大妄想
C. 自罪妄想
D. 疑病妄想
E. 钟情妄想

正确答案：AAA 您选择的答案：

第59-60题

女性，28岁，1年前与丈夫离婚后，经常失眠伴头痛，近3个月来无原因的认为邻居指桑骂槐的议论她，走在街上，感到路人用别样眼光看她，行人的咳嗽、吐痰举动都是针对她的，认为家中被安装了监视器，自己的一举一动都被监视了，为此不思饮食，有自杀念头。体检及神经系统无异常。

1. 该病情的诊断最可能是
A. 焦虑症
B. 抑郁症
C. 心理生理障碍
D. 精神分裂症
E. 适应障碍
2. 根据以上精神症状，首选的治疗药物是
A. 丁螺环酮
B. 阿米替林
C. 碳酸锂
D. 第氯丙嗪
E. 安定(地西洋)

正确答案：DD 您选择的答案：

第61-64题

男性，30岁，1年前下岗。近5个月来觉得邻居都在议论他，常不怀好意地盯着他，有时对着窗外大骂，自语、自笑，整天闭门不出，拨110电话要求保护。

1. 该病例最可能的诊断是
A. 反应性精神病
B. 躁狂抑郁症
C. 偏执性精神病
D. 分裂样精神病
E. 精神分裂症
2. 该病人不存在
A. 幻听
B. 关系妄想
C. 被害妄想
D. 情绪低落
E. 行为退缩
3. 有诊断意义的症状还包括
A. 思维奔逸
B. 意识障碍
C. 木僵
D. 自杀
E. 妄想
4. 治疗应首先选用
A. 碳酸锂
B. 三环类抗抑郁药
C. 电休克
D. 苯二氮草类
E. 氯丙嗪

正确答案：EDEE 您选择的答案：

四、A4型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第65-67题

男性，27岁，外地打工，近2个月来整日卧床发呆，不愿工作，诉每日脑子里听到一男一女的激烈辩论，其内容都是与他有关的，感到工友们背后取笑他，给他“穿小鞋”，个别工友企图陷害他。体检及神经系统无异常。

1. 该病人的精神症状主要是
A. 争论性幻听、被洞悉感

- B. 关系被害妄想
C. 关系妄想
D. 争论性幻听，被害妄想
E. 被害妄想，物理影响妄想
2. 该病人给予氯丙嗪治疗，其适宜的治疗方案是
A. 大剂量冲击治疗
B. 不定时给药品
C. 持续小剂量给药
D. 配合以其他抗精神病药物
E. 从小剂量始，渐加大治疗量
3. 若在服药过程中出现轻度锥体外系反应，一般给予
A. 安定(地西洋)
B. 减少药量
C. 安坦
D. 安慰剂
E. 换药
- 正确答案：DEC 您选择的答案：

五、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第68-70题

- A. 奥氮平
B. 卡马西平
C. 西酞普兰
D. 啊普唑仑
E. 碳酸锂
1. 主要治疗抑郁症
2. 主要治疗精神分裂症
3. 主要治疗焦虑症
- 正确答案：CAD 您选择的答案：

第71-73题

- A. 偏执型分裂症
B. 单纯型分裂症
C. 紧张型分裂症
D. 妄想性障碍
E. 急性短暂性精神障碍
1. 以系统妄想为主要症状，内容较固定，有一定的现实基础，主要表现为被害、嫉妒、钟情等内容的是
2. 符合分裂症诊断标准，以思维贫乏、情感冷漠等阴性症状为主，从无明显的阳性症状。起病隐袭，病程至少2年的
是
3. 起病急骤，以片断妄想、幻觉或多种妄想、幻觉或言语、行为紊乱的精神病性症状为主，病程至少数小时至1个月
的是
- 正确答案：DBE 您选择的答案：