

习题集 药理学 抗真菌药和抗病毒药

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 治疗艾滋病患者隐球菌性脑膜炎的首选药是

- A. 两性霉素
- B. 克霉唑
- C. 酮康唑
- D. 氟胞嘧啶
- E. 氟康唑

正确答案：E 您选择的答案：

第2题 毒性大，仅局部应用的抗病毒药是

- A 金刚烷胺
- B 利巴韦林
- C 阿昔洛韦
- D 阿糖胞苷
- E 碘苷

正确答案：E 您选择的答案：

第3题 不良反应最小，可进入脑脊液的咪唑类抗真菌药是

- A 克霉唑
- B 咪康唑
- C 酮康唑
- D 氟康唑
- E 氟胞嘧啶

正确答案：D 您选择的答案：

第4题 对灰黄霉素的描述哪点不正确

- A 浅表抗真菌药
- B 口服有效
- C 局部应用无效
- D 局部应用有效
- E 对头、体、股、甲癣有效

正确答案：D 您选择的答案：

第5题 易透过血脑屏障进入脑脊液的抗真菌药是

- A. 氟康唑
- B. 制霉菌素
- C. 酮康唑
- D. 咪康唑
- E. 灰黄霉素

正确答案：A 您选择的答案：

第6题 对多种RNA和DNA病毒都有效的广谱抗病毒药是

- A. 金刚烷胺
- B. 利巴韦林
- C. 干扰素
- D. 碘苷
- E. 齐多夫定

正确答案：B 您选择的答案：

第7题 氟康唑抗真菌的作用机制是

- A. 阻止核酸合成
- B. 抑制细胞膜类固醇合成，使其通透性增加
- C. 抑制二氢叶酸合成酶
- D. 抑制二氢叶酸还原酶
- E. 抑制蛋白质合成

正确答案：B 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第8题 慢性支气管炎急性发作患者，伴发热。使用头孢他啶二周后，体温曾一度降至正常，症状缓解。后再次出现发热，经检查，口腔粘膜有白色念珠菌感染，此时抗生素拟改用

- A. 红霉素
- B. 氯霉素
- C. 青霉素
- D. 两性霉素B
- E. 环丙沙星

正确答案：D 您选择的答案：

第9题 男性患者60岁，糖尿病合并皮肤感染。长期服用四环素，近来咽部出现白色薄膜，消化不良，腹泻，疑白色念珠菌病，宜用

- A 灰黄霉素
- B 制霉菌素
- C 二性霉素B

D 阿昔洛韦

E 利巴韦林

正确答案：B 您选择的答案：

三、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第10-14题

A．两性霉素B

B．碘苷

C．氟康唑

D．利巴韦林

E．灰黄霉素

1．外用无效，口服治疗体表癣病的药物

2．治疗真菌性脑膜炎，可加用小剂量鞘内注射的药物

3．广谱抗真菌药

4．只对DNA病毒有抑制作用

5．对DNA、RNA病毒均有抑制作用

正确答案：EACBD 您选择的答案：

第15-18题

A 灰黄霉素

B 二性霉素B

C 制霉菌素

D 咪康唑

E 酮康唑

1．国产制剂称为庐山霉素的药是

2．外用无效，口服治疗体表癣的药是

3．治疗真菌性脑膜炎，并加小剂量鞘内注射用

4．毒性大，不作注射用的抗真菌药是

正确答案：BABC 您选择的答案：