

习题集 药理学 抗结核病药

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第1题 下列哪项不属利福平的不良反应

- A. 过敏反应
- B. 胃肠道反应
- C. 肝损害
- D. 周围神经炎
- E. 流感综合征

正确答案：D 您选择的答案：

第2题 主要毒性为球后视神经炎的抗结核药

- A. 异烟肼
- B. 链霉素
- C. 吡嗪酰胺
- D. 利福平
- E. 乙胺丁醇

正确答案：E 您选择的答案：

第3题 各类型的结核病首选药是

- A. 链霉素
- B. 利福平
- C. 异烟肼
- D. 乙胺丁醇
- E. 吡嗪酰胺

正确答案：C 您选择的答案：

第4题 用异烟肼时合用VitB6的目的是

- A. 增强疗效
- B. 延缓耐药性
- C. 中枢抑制
- D. 降低对神经的毒性
- E. 促进吸收

正确答案：D 您选择的答案：

第5题 抗结核药联合用药的目的不包括

- A. 增强抗菌效果
- B. 延缓细菌耐药
- C. 减少不良反应
- D. 交叉消灭耐药菌株
- E. 扩大抗菌范围

正确答案：E 您选择的答案：

第6题 下列叙述中，错误的是

- A. 利福平是广谱抗菌药
- B. 多数抗结核药都会损害肝脏
- C. 乙胺丁醇单用不易耐药
- D. 联合用药的目的是为了增强疗效
- E. 早期应用抗结核药疗效最好

正确答案：C 您选择的答案：

第7题 异烟肼的特点是

- A. 具有广谱抗菌作用
- B. 不能吞噬细胞内的结核杆菌
- C. 结核杆菌不易产生耐药性
- D. 杀灭活动期结核杆菌作用强
- E. 长期应用不损伤肝脏

正确答案：D 您选择的答案：

第8题 各种类型结核病的首选药物是

- A. 链霉素
- B. 对氨基水杨酸
- C. 异烟肼
- D. 乙胺丁醇
- E. 吡嗪酰胺

正确答案：C 您选择的答案：

第9题 异烟肼抗结核杆菌的作用机制是

- A. 抑制细菌分枝杆菌酸的合成
- B. 影响细菌细胞膜的通透性
- C. 抑制细菌核酸代谢
- D. 抑制细菌细胞壁的合成
- E. 抑制DNA螺旋酶

正确答案：A 您选择的答案：

第10题 利福平的抗菌作用机制是

- A. 抑制细菌分枝杆菌酸的合成

- B. 抑制细菌叶酸的合成
 - C. 抑制细菌DNA螺旋酶
 - D. 抑制细菌依赖于DNA的RNA多聚酶
 - E. 抑制细菌蛋白质的合成
- 正确答案：D 您选择的答案：

第11题 属广谱抗生素，兼有抗结核和抗麻风病作用的药物是

- A. 异烟肼
- B. 利福平
- C. 乙胺丁醇
- D. 吡嗪酰胺
- E. 对氨基水杨酸

正确答案：B 您选择的答案：

第12题 抗结核作用最弱的药物是

- A. 利福平
- B. 对氨基水杨酸
- C. 比嗪酰胺
- D. 链霉素
- E. 乙胺丁醇

正确答案：B 您选择的答案：

第13题 应用异烟肼时，常合用维生素B6的目的是

- A. 增强疗效
- B. 防治周围神经炎
- C. 延缓抗药性
- D. 减轻肝损害
- E. 延长作用时间

正确答案：B 您选择的答案：

二、A2型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第14题 结核性腹膜炎患者，在抗结核治疗中出现失眠，神经错乱，可能由哪种药引起

- A. 利福平
- B. PAS
- C. 乙胺丁醇
- D. 比嗪酰胺
- E. 异烟肼

正确答案：E 您选择的答案：

第15题 某糖尿病患者伴有浸润性肺结核，应用甲苯磺丁脲，利福平，链霉素，用抗结核药二月后，尿糖加重并出现肝功能不良，其原因是

- A. 甲苯磺丁脲有肝毒性
- B. 患者又染上了肝炎
- C. 利福平诱导肝药酶
- D. 链霉素的肾毒性
- E. 以上都不是

正确答案：C 您选择的答案：

第16题 某男，64岁。患脑梗塞多年，长期口服华法令6mg / d, 近日由于接触过开放性肺结核患者，为预防感染，口服异烟肼300mg / d，结果出现口腔、皮肤黏膜多处出血点，其原因是

- A. 异烟肼引起出血
- B. 结核杆菌感染
- C. 异烟肼抑制肝药酶，华法令代谢减弱
- D. 异烟肼损伤肝脏引起凝血障碍
- E. 异烟肼造成维生素B6缺乏而致

正确答案：C 您选择的答案：

三、B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第17-20题

- A. 可引起外周神经炎
- B. 可引起视神经炎
- C. 对动物有致畸形作用
- D. 可引起耳鸣，耳聋
- E. 可引起关节疼痛

- 1. 异烟肼
- 2. 利福平
- 3. 乙胺丁醇
- 4. 链霉素

正确答案：ACBD 您选择的答案：

第21-23题

- A. 异烟肼
- B. 链霉素
- C. 利福平

D. 乙胺丁醇

E. 对氨基水杨酸

1. 用药期间可引起眼泪、尿等呈橘红色的药物

2. 用药期间需定期检查视力、视野的药物

3. 用药期间应合用维生素B6药物

正确答案：CDA 您选择的答案：